

S7

Fisher

#32042

Die Lützow'sche Brig

XXII

1650—


#3085


2 works

N534

~~Handwritten text, mostly illegible due to fading and scribbles.~~

Exhibit 4 R 23 1st + 2d





CASPARI BAUHI-
NI BASILEENSIS

THEATRVM ANATO-
micum

*Novis figuris æneis illustratum
et in lucem emissum opera
et sumptibus Theodori de Bry
p. m. relicta Viduæ et
filiorum*

*Ioannis Theodori et
Ioannis Israhelis de Bry.*

32042

*Francofurti
at Moenum
typis Matthæi
Beckeri
Anno 1605.*



ILLVSTRISS.



POTENTISSIMO PRIN-
CIP. AC DOM.

D N.

MAVRITIO
HASSIÆ LANDGRA-
VIO COMITI

J N

CATZENELNBOGEN,
DIETZ, ZIEGENHAIN
& NIDDA &c.

PRINCIP. LITERATISS.
LITER. MECOEN. SUMMO.

DOMINO SVO CLEMENTISS.
demiss. OBSER. Ergò

CASPARVS BAVHINVS D.
THEATRVM hoc ANATO-
MIC. deuotè dedicat.

ТѢХН. ПОНО.



EPIST. DEDICA- TORIA.

PHILOSOPHIAM, sublimio-
rem illam melioris nostræ partis
informatricem, θαυμασιαν genuis-
se, summi Peripateticorum principis edicto
proditum (PRINCIPVM EMINEN-
TISSIME) nouimus. In corporis vero hu-
mani fabrica (quæ nobis hoc opere subiecta
est materia) ingerunt se tot, tanta, tamque
singulari admiratione digna, ut veneran-
da illa antiquitas, HOMINEM animal ad-
mirandum, ac vltius etiam progressa θαυμα-
στατά, miraculum omnium miraculorum
dicere non dubitarit. Hinc Zoroaster anti-
quissimus ille Philosophus & Rex, qui Ni-
ni temporibus emicuit, veteris Theologiæ
scientissimus inuentor, magicarumque ar-
tium, si Plinio credimus, in Perside primus,
in magia sua hominis admirandam fabri-
cam & immensam illam perfectionem con-

EPISTOLA

templatus, in hanc exclamationem prorupit:
se proditur.

το πολυπλάτης φύσεως ἀνθρώπου τέχνημα. Nimirum ipsam adeo Naturam, per quam nos
verius DEVM OPT. MAX. primum illum
omnis Naturæ τέχνηται, hominisque proto-
plastem intelligimus, audacia accusare au-
sus, quod tam admirandum opificium moli-
ri sit ausa. At Plato philosophorum antistes,
non contentus hominem miraculum appet-
tasse, adiecit diuinum miraculum. Et Mer-
curius nimirum ille cui ἑρμῆς nomen in-
didere, hominem etiam secundum esse Deum
vaticinatus est. Et in libello eius, qui est de
voluntate Dei mirabiliter concinnatus, oc-
currit grauior illa sententia, consideratione
digna, qua hominem miraculum magnum,
animal adorandum & honorandum, diui-
niore quodam spiritu concitus & interiore
scientia instructus, nuncupauit: quod in le-
gibus idem Plato confirmat. Est sane si
quod res est fateri volumus, ἀνθρώπος non so-
lum θαυμαστός sed θαυμαστότερος summaque ad-
miratione à summis & maximis cuiusvis
ætatis

D E D I C A T O R I A .

etatis ingenij habitus. Nec immeritò. Nam qui hominem admiratur, *DEVM* admiratur, qui totius magni mudi epitomen propositurus, hominem veluti paruum mundum creauit: qui illum nouerit, hunc nouerit, cum ad eius imaginē efformatus sit. At sint sane, vti Beatus Augustinus in lib. de spiritu & anima scribit, quedam supra intellectū humanum, quedam iuxta, quedam deniq; infra: tamen qui hominem rectē & probe nouerit, Deum ipsum tanquā eius causam efficientē nouerit. Vnde & augustū Dei templū & simulacrū dicitur à Theologis. Atq; vt eleganter vir quidā magni nominis prodidit, vt in numismate charagma Cæsaris, sic in homine *DEI* sculptura cōspicitur. Sed & quæ iuxta sunt intelliget, Angelos nimirum, quia non tātum eum illis intelligit, sed & Angelos à *DEO* humanis rebus, atq; adeo sibi præfectos nouit: imò Angelum etiā de homine dici & se aliquando in Angelum transmutandū; vt taceā Diuū Gregoriū & ipsum Angelum, animal rationale dicere ausum. Quod si superiora se & quæ iuxta sunt, intelligat, quis

EPISTOLA

non manifeste colligat, eum & ea quæ in se sunt, & quæ infra sunt, longe eximius cogniturū? Ergo & seipsum intelliget in se & quicquid cæli cōtinetur ambitu, infra se, q̃ omne illud eius gratia à DEO sit productū. Quamquā vt ingenuè fatear se ipsum noscere, ad q̃ tamen (vt Plato in Alcibiade scribit) omnes incitātur, huius mysterij primū ac potissimū difficultatis opus videatur. Profecto hoc est illud ἡρώτης τελευτή, quod Socrates, si Platoni credimus, de cælo traxit, & è quo descendisse aperte fatetur Iuuenalis. Referat nunc qui volet cum Cicerone ἡδὴ δὲ ad modestiæ mediocritatisq; commendationē, aut ad ipsam ergastuli animæ nostræ attentā & philosophicam inspectionem, semper tamen eo redibit. Nam quotus quisq; queso est, qui nō ex contemplatione sui, hoc est, animæ suæ ergastuli, suā ipsius miserā cum perfectione, ac nesciam sane utrā præ altera intelligat, nec inde non tantū sapientior sed & humilior fiat, & vt paucis dicam, melior. Sapientior, inquā, vel secundum Barbarū illum, quē non barbarè, verum scienter pronunciaſſe ferunt: rogatus

nam-

DEDICATORIA.

namque, quid in hac quasi mundana scena maxime putaret admirabile? Hominē respōdit, omnē planē admirationis captū excedere: ut qui non animalium modo princeps & rationis & mentis splendore diuinus sit, veluti naturæ totius interpres, sed tanquā Protheus, aut Chamæleon desultoria quadā potestate sese in quidiu subinde transformet. Ceterum exactissima illa omnium demutatio, qua mēte pia, oculis intentis ac vere philosophicis fabricam sui considerans, tandem in animæ florē reuocatus ad DEVM archytectū suum redit, hæc solida demū est sapientia, ac vera humanæ excellentiæ admiratio. Ex qua quidem qui nō ad se melior redeat, si quis sit, qui vel cogitare possit, is mihi ne hominis quidem perfectionem agnouerit. Qui vero etiā is sit, qui nō ex contemplatione sui fiat melior, non tantum non numisma Dei, (quod D. Hieronymus ait in quadam epistola) fuerit, sed ne animal quidem rationale: quippe in quo non ubi maxime opus est, rationis lumen sese ostendet, oportet enim nos ut scitè Aristoteles in 10. Ethicorum, nō quod

EPISTOLA

monent nonnulli, humana tantum sapere, quod
 sumus homines, nec mortalia, quia mortales,
 sed quo ad effici potest, immortalitati ipsos
 nos asserere, cuncta quoque efficere, ut ea degamus
 vita, quæ ab eo profluat, quod in nobis est,
 præstabilissimum: Qua sanè ratione homines.
 Homérico more *dividēis* Deo similes: sicut
 mali ab eodē nunc cervis, nunc tygribus, aut
 leonibus assimilantur. Sanè & ipsa philoso-
 phia à Platone dicitur, similitudo Dei, quam
 homo consequi possit. Quid inquires? possit
 modo, nec sit iam iam ad eam efformatus? Ef-
 formatus sanè ad eam ut possit esse, ac reuera
 sit, quod esse debet. Sui ipsius itaque speculatione,
 quæ oculis fit ac mente, animū surrigēs agno-
 scit, verum & omnipotentem creatorem sui.
 Verum diuersi in terrenā naturam reflectū-
 tur, eamque unā & solam tractant, fallaciosis
 ambagibus illecti, oblaqueatique, hanc co-
 gitant, huic affixi inhaerent, nec aliter magis
 efferuntur, quā ut persæpe quod M. Cato di-
 cebat, sūdicias humanas faciant. Sed imperi-
 tiores miremur minus: quoniam (ut dicitur)
 nec Falernum canes. Ergo huc animum at-
 tenda-

DEDICATORIA.

tendamus, huc oculos conuertamus, ut nos ipsos inspicientes, ex nobismet ipsis sapere discamus & tantisper omnia admirari, donec præter vnicum DEVM admiremur nihil.

Atq; ad hac quidem mysteria nos cõtemplatio nostri perducit, quæ sane nihil aliud est, quam ipsamet vera & genuina vniuersi contemplatio, cum in nobis ipsum vniuersum tam pulchre tam eximie elucescat. Sunt profectò in homine simulachra omnium quæ sunt. Propterea hominem colimitium ac orizontem corporeorum & incorporeorum, Synesius, vniuersi exemplar Theophrastus, & ἀντισταθμὸν tandemque μίξις τοῦ σωματικῆς veteribus dictum fuisse, iam translatitium est.

Verum idem Mercurius, nescio quid diuinus etiam in homine agnoscens, cum in naturam DEI transire scribit, tanquam ipse sit DEVS. Quin in libr. de sapientia, & potestate DEI, humanæ naturæ potentiam eximiam admiratus, audendum esse ait dicere, l'omine n quidem terreum DEVM esse

EPISTOLA

esse mortalē: DEVM vero cœlestem esse im-
mortalem hominem. Hic profecto tā est exi-
mius, vt cum ad duas res (quod Aristotelicū
est) natus sit, ad intelligendum & agendū,
tām augustis, tamq; felicibus auspiciis pro-
ductus pronascatur, vt nō elemētis modò ve-
locitate misceatur, & mentis acumine ad a-
stra ascendat, descendat in maris profunda:
sed hæc omnia planè in eo sint, & mirabili,
ne dicā ineffabili modo elucescāt: nec cœlum
tantum videas in maiori mūdo, sed in teipso
cominus contempleris, intuearis, mireris: vt
ni forsā videamur modestiæ mensum trans-
gredi, sit homo vel ipsis adeo cœlicolis præ-
stantior, vel saltim pari sorte potiatur, sicuti
verus Theologus pdere non dubitauit. Cer-
te potiore parte sui, corporis vero admiran-
da fabrica sit id, quod illi nō sunt. Nam qui-
cunq; cœlitum descendit ad terram, cœli de-
serit limitem: homo autem ubiq; simul esse
videtur, nec videtur tantum, sed esse affe-
ctat omnia. Non inhærebo amplius Animæ,
potiori parti eius: nec hominem totum ex a-
nima & corpore constitutū, quem nō obscu-
re ipsum

DEDICATORIA.

re ipsum vniuersum repræsentare cõstat, sed fabricam corporis eius admirabilem toto hoc opere inspiciemus, eandemq; quantũ in nobis erit, graphicè describemus, fabreq; depictam studiosæ iuuentuti exhibebimus. Non quidem corporis vniuersi appositã pulchritudinem, omniq; vsui accommodã, nec colorum, linearumq; concinnitatẽ (quæ alterius contemplationis est) quam veri Philosophi, fluxã & nõtham arbitrãtur pulchritudinẽ, sed partiũ situm, figurã, numerũ, magnitudinẽ, substantiã, actiones, vsus &c. rimabimur. Nã & alia ἀνδραποδονάπηνλος siue mango corpora laudabit, alia Hippocrates. Ille enim peregrinis magis & artificio omni venustatẽ, vti Galenus docuit, asciscit: hic verã pulchritudinẽ adiudicabit, quæ optimã corporis constitutione constet, partiũ efformatione legitima, numero debito, situ conueniẽti, magnitudine decenti, actioni obeundæ commoda. Hæc qui demonstrat, ne is mihi vera Anatomie non modo fundamenta, sed & quicquid superstruendum superstructum ostentare videtur: quod nobis quidem, in hoc opere

EPISTOLA

opere opus est propositum. Sed quid ad te;
 PRINCIPVM ILLVSTRISSIMORVM
 vere sapientissime & magnanime Heros, apud te;
 inquam quem Diuæ Pallas & Minerva condecorant;
 ac ita quidem condecorarunt, ut tui iam non multis;
 sed pene dixerim omnibus; tanquam Sol cæteris
 stellis merito quodam tuo præire; sed &
 prælucescere videaris. Præter enim florentissimi
 Principatus negotia, in turbulento hocce Imperij
 statu, sapienti felicique administratione, cui
 magis literæ cordi sunt? quis magis literatos
 clementia & fauore prosequitur? præter enim
 Academiæ Marpurgensis & Cassellanae proceres,
 quæ te verum patronum & defensorem agnoscunt,
 etiam exteri infiniti genium sublime admirantur.
 Et sane cum Germania hodie sit, literarum
 & literatorum splendore eminentissima,
 in eo tamen mihi etiam præ cæteris mundi
 Regnis maior & celebrior videtur; quod
 Principes habeat, & te in primis, literarum
 pariter & armorum admirabiles, ut iure de
 te illud Enni dixerim:

DEDICATORIA.

Esse bellipotentem, ac sapientipotentem.

Quare de tali tantoque Principe sibi Germania gratulatur, de te tanquã Principe Orthodoxæ fidei & fortitudinis exemplari, propemodum singulari, felices subditi gaudent, exteri admirantes consentiunt & gratulantur.

Sed ut ad rem accedam, solebant PRINCEPS INCLITE ij, qui apud antiquissimos Parthorum reges gratiam aucupabantur, non nisi munere suffulti, eorum atria spatari: res quidem etsi Barbaræ initiaturæ ad nostrorum tamen temporum præsentiam non illaudabiliter delapsa, ut quæ de selectiori benignioris frontis animo, submissa interioris suæ mentis deiectione, vadiumonium aucuparetur. Quo sane impulsu & ipse ductus, has iam dudum tibi PRINCEPS MAGNANIME destinatas meas lucubrationes, hilariori, quam eorum tenuior genitura exigit, alacri illa magni ingenij tui promptitudine, mentis incorporabili perspicacia, animi magnitudine, clementia principali

EPISTOLA

pali eò gratus accipies, quo libentius maximo tuo iudicio subiicio, fretus singulari illa clementia (honorario splendido comitata) paucos ante dies erga me hic Basileæ clementer exhibita.

Suscipe ergo has meas lucubrationes Anatomicas ex ipsa *anatomia* & optimis quibusq; fontibus concinnatas, & nouo Eiconum etiam nouarū, nec haëtenus editarum, accessorio illustratas. Merebuntur, vti spero, vt T. Clitararū & literatorū Patronus splendore præbeat, tutamine muniat: sin minus, vel in in eo honorificentius, ideoque confidentius prodibunt, q̃ tanti Principis patrocínio sint subiectæ. Quod si vero à virulentis liuidisq; calumniatorū morsibus defenderis Zoilus i-lia rumpet, & ad Theatrum, meum Botanicum absoluendum animus addetur. Vale Principum sapientissime & me in clientum tuorum numerum recipe. Dabantur prid. Kal. Aug. CIO. IO. CV. Basileæ.

T. CELSIUS

Humilis & obseruan.

CASPARVS BAVHINVS D. Anatomicus & Botanicus Acad. Basford.



CASPARI BAVHINI
BASIL. MEDICI ANATO-
MICI ET BOTANICI ORDIN.

&c. in suam humani corporis Ana-
tomen,

P R Æ F A T I O.

HOMINIS, qui à veteribus ^a μί- ^a Arist. 3. Phyl.
νόςκος dictus fuit (eo quod ^{17. & Auerro}
eius forma ceterarum omni- ^{eo quod homo}
um perfectionem complecta- ^{& cetera ani-}
tur: siquidem essentiam, cum ^{malia ex se}
elementis: vitam, cum plan- ^{moueantur,}
tis: sensum, cum animalibus: intelligentiam, ^{quemadmodū}
cum formis diuinis communem habeat) sub- ^{coelestiacorpo-}
stantiam cōstituentia Medicinæ Parens Hip- ^{ra. Gal. 3. v. u}
pocrates, ^b tali expressit Aphorismo: τὰ ἰχοντα, ^{part. 10. quia}
ἢ ὁρμῶντα, ἢ ἰχόμενα σώματα: & Medicorum Co- ^{tāta ars in ho-}
ryphæus ^c Galenus, Præceptorem imitatus, ^{minis cōposi-}
ἰχοντα, ἐν ἰχόμενα καὶ τὰ ἐνορμῶντα, siue continentia, ^{tionem, quanta}
contenta & impetum facientia vocauit: cu- ^{in mundo: vn-}
iusmodi esse dicit ^d τὰ στερεὰ μέρη τῶ σώματος, τὰ ^{de ēt in homi-}
ὕγρα, καὶ τὰ πνεύματα, solidas partes corporis, hu- ^{ne oculus, qui}
mores & spiritus. Continentia, ^d solidas par- ^{maxime So-}
tes nuncupat, vt quæ comprehendant tegāt- ^{lem refert.}
que humida: contenta, humores, vt qui à soli- ^b Hipp. 6. epid.
dis comprehendantur: & impetum facientia, ^{sect. 8 aph 19.}
spiritus, vt qui momento temporis & facile, ^c Gale. 1. diff
^{feb. 1 & lib. de}
^{tremores. He-}
^{rophil. in Isag.}
^{p. Alex. 2. qu.}
^{14. & Theo-}
^{phil. de urinis}
^{cap. 10.}
^d Gale. de trē.
^{5. diff. feb. 1. &}

A

& ci-

*Alex. in cōp. α',
ω, ρ, ι, κ, πέν-
και πώδη.*

& citra impedimentum in omnem corporis partem ferantur. Qua sententia adeo celebri & decantata hoc voluit Dictator Hippocra-

*c Quam ista
inter se rela-
tionem habe-
ant, prater Ga-
lenum elegan-
ter Syllu. com.
in Gale. lib. 1.
diff. feb. 2. ex-
plicauit.*

tes, quod Aretæus ^e elegantissime his verbis expressit: εἴτε μὲν γὰρ ἔρρωται ἡ φύσις, καὶ ἔστιν εὐκρα-
τος, πάντων μὲν κρατεῖται πᾶσι δὲ σημαίνει, καὶ ὑγρῶς, καὶ πνέυ-
ματι καὶ σερροῖσι, καὶ τῇ τέττων ἐν τῷ ζῴῳ, καὶ ζυμμετρὴ ἐς
ζωὴν διέπει τὸν ἄνθρωπον. Vbi natura valet, & bene temperata est, omnia quidem superat: omni-
bus etiam sui significationem præbet, & per humorem, spiritum & solida, horumque conuenientem ordinem & probam commode-
rationem, hominis vitam moderatur. Verum ex his, quæ ἡ φύσις σωματικὴν constituunt, propo-
situm nobis est de continentibus, seu solidis, vel partibus agere.

*f Hip. in prin-
cip. de natura
muliebri.*

*g Gal. 7. vsu
part. 9.*

h 7. vs. par. 25.

At cum diuino Hippocrare ^f monente, τὸ
θεῖον ἐν ἄνθρωποις ἵνα ᾤτιον, diuinum quoddam nu-
men in homine existat; & ^g Galenus Deum o-
pificem laudare iubeat, si laudem iustam &
meritam illi non inuideamus: quare ^h se con-
ditoris nostri, qui animalia fabricatus est, sa-
pientiam ac potentiam ne laudare quidem
fatis pro merito posse, fateatur, cum eiusmodi
opera, non laudibus modo, verum etiam hy-
mnis sint maiora: idcirco dum partium vsum
exponere vult, ait ⁱ se conditori nostro verum
hymnum componere, in quo existimet, ve-
ram esse pietatem, non si taurorū εκατόμβας ei
plurimas sacrificaret, & casias, aliaque sexcen-

ta vnguenta suffumigaret: sed si nouerit ipse primus, deinde & aliis exposuerit, quænam sit ipsius sapientia, quæ virtus, quæ bonitas: ignorantia quorum impietas sit, non si à sacrificio ac suffumigiis abstineat. Merito ergo, qui de hominis partibus dicere intendit, à Deo ipso protoplaste, à quo omnia, & sine quo nihil, principium sumere conuenit.

Quare cum HUMANI CORPORIS FABRICAM nunc quarto describere aggrediamur, supplices Deum vnum & trinum Hygiæ Panacæque parentem rogamus, vt huic nostro instituto adesse, totum opus dirigere & protegere clementer dignetur.

Cum vero corporis nostri, Philosopho k monete, variæ, imo sibi mutuo contrariæ sint actiones, ex vna similique parte corpus constare non potuit, licet vnum sit. Quemadmodum mundus causa partium, cum primarum, cœli scilicet, & Elementorum, tum secundarum seu mixtarum, varius admodum & dissimilis apparet; omnino tamē & perfecte vnus est. Ita corpus humanum (seu paruus mundus) vnum est & varium : vnum quidem & simplex partium continuatio, vnio, earūdem harmonia, consensus, conspiratio, propria denique^l circumscriptio, efficit. Varium vero, quia infinitis pene partibus, substantia, figura, situ, vsuque discrepantibus, diuiduum & multiplex est. Quare partes ipsa materia, for-

k *Arist. 2. hist. an. 1. & 2. par. an. 5. vnde caput, 1. lib. de partib. simila-*

^l *Gal'en. 1. v. s. par. 1.*

ma, sine & accidētibus distinguuntur; ita quidem, vt ratione materiæ remotæ, sed internæ,

quæ semen^m est, cuius materia à toto corpore defertur (vt in eam rem cap. 8. lib. de partibus similaribus disputauimus) & sanguis, aliæ

dicuntur Spermaticæ, aliæⁿ Sanguineæ, aliæ ex vtrisque mixtæ. Et si Philosophus^o vo-

luerit, omnes partes animalium sanguine præditorum, ex vna & eadem fieri materia,

sanguine^p nimirum, cum totius corporis sit materia: Semen vero ipsum non materiam,

sed solum formam exhibere: sicque corpus ex fœmina, animam vero ex matre esse; quam

sententiam Galenus^r refutauit; quandoque tamen, ex sanguine omnes partes fieri^f pro-

nunciauit: quatenus^t feminis parua est in vterum deiecta moles, nutrit autem istud &

amplificat sanguis: adde, quod & semē ipsum ex sanguine amplius elaborato fit. Ratione

vero materiæ proximæ, aliæ^u simplices, aliæ compositæ; illæ^x similes, hæ dissimiles di-

cuntur.

Ratione formæ, tot sunt^y differentiæ, quot sunt qualitatum combinationes. Ratione fi-

nis, ^z sic aliæ principes sunt, aliæ ministrantes: Ratione denique accidentium, ^{aa} variæ

& diuersæ exurgunt differentiæ. Quæ tamen omnes simul generantur, augentur & disci-

minantur, Hippocrate^{bb} docente his verbis:

ſiquē-

m Gale. 1. Se-
min. 4. & 5.
vide c. 6. de si-
milar.

n Gal. 1. Sem.
10. de constitu.
arti. 6. in arte
medic. & 1. de
sanit. tuend.

o Arist. 1. gen.
an. 20. vide ca-
put 5. similar.

p Arist. 3. par.
an. 5.

q Arist. 2. gen.
an. 4.

r Gale. 1. Sem.
4. & 5.

f Gale. 2. nat.
fac. 3.

t Gale. com. 1.
in lib. de natu-
ra Hipp. text.

37. vide ca. 6.
similar.

u Arist. 1. hist.
an. 1. & 2. par.
an. 1.

x Galen. 8. de
plati. & prin-
cip. lib. de A

natomia vi-
uorum, vide c.
9. similar.

y Vide c. 13. &
22. similar.

z Ga. art. Me-
dē. 5. de totius
morb. temp. 7.

2. ad Glaucon. 2. 14
vs. part. 1. vide cap. 10. similar.

aa Vide caput 14. similar

bb Lib. 1. de vict. rat. text. 21. Arist. 2. gen an. 1. vide cap. 6. similar.

ἄρα γίνεται δὲ τὰ μέλη αἷμα πάντα καὶ αὐξεται: καὶ ἔτε
 πρότερον ἐδ' ἐν ἑτέρῳ ἐτέρῳ, οὐδ' ὕστερον: discernuntur
 autem membra simul omnia & augentur, ne-
 que alterum altero prius, neque posterius; Et
 rursus ^{cc} ἀρχὴ μὲν ἐν ἐμοὶ δοκεῖ εἰσεμίσθῃ τῇ σώμα-
 τος, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως ἀρχὴ, καὶ πάντα τελευτή. Κύκλε
 γὰρ γραφέντος ἀρχὴ ἔχ' εὐρέθῃ. Mihi quidem vide-
 tur, principium nullum esse corporis (id est,
 à quo reliquæ partes ortu procedant) sed o-
 mnia similiter principium, & omnia finis: cir-
 culo enim scripto principium non inuenitur.
 At quæ pars primo oriatur, solus Creator, vt
 pie Galenus, ^{dd} euidenter nouit, rationabile
 tamen non omnes partes simul consistere:
 quare maiores naturæ, vt ex Hippoc. ^{cc} habet
 Philosophus, ^{ff} priores apparent: non enim
 omnes simul & æquali temporis spacio exor-
 nantur, & perficiuntur, sed prout singulæ & i-
 gnem & alimentum fuerint nactæ, vt diuini
 senis nostri verbis vtar. Umbilicalis siquidem
 vena primo ^{gg} perficitur, & reliquarum par-
 tium, ratione subtegminis ex sanguine geni-
 ti, origo est. Absoluuntur autem communi-
 ter quadraginta quinque ^{hh} diebus, siquidem

Sex in lacte dies; ter sunt in sanguine trini:

Bis seni carnem: ter seni membra figurant.

Sed cum de Partis nominibus, definitioni-
 bus, differentiis, & de iis, quæ circa hæc con-
 trouersa sunt, tam in genere, quam in specie à
 nobis dictum fuerit Libro Secundo vniuersa-

^{cc} Hipp. de lo-
 cis in homin.
 text. i.

^{dd} Gal. lib. an
 omnes partes
 simul.

^{cc} Hip. i. vict.
 rat. tex. 21. A-
 rist. 2. gen. an.
 vide cap. 6. de
 similar.

^{ff} Aristot. 2.
 gen. an. 6.

^{gg} Vide c. 18.
 in nostro libro
 de similar.

^{hh} Hipp. i. de
 diata, quidam
 43. dieb. qui-
 dam quatuor
 mensibus con-
 formationem
 habent. Idem
 de nat. pueri,
 scemina 42.
 masculus 30.

*diebus absol-
uitur tempus
animationis
in masculo spa-
tium dierum
40. in femina
vero 80. vel
circa. Panor-
mitanus ca. si
quis, de homi-
ne Fumus in
aurea armil-
la, tit. aborsus
part. 2.*

lis nostræ Anatomes, qui de Similaribus in-
scribitur, cum eo loci partium Similarium
Spermaticarum tractationem secundum qua-
tuor causas ex Hippocratis, Platonis, Aristot-
elis, Galeni & recentiorum Classicorum do-
ctrina proposuerimus, eo, & quidem ad secū-
dam editionem, Lectorem relegamus: hic e-
nim Corpus humanum cōsiderabimus, pro-
ut ab Anatomicis, dum dissectione partes o-
mnes & singulas accurate inquirūt, fieri con-
suevit.

Iam vero considerari potest primo & toti-
us, & partium facies externa, dein interna.
Quoad faciem externam, in præsens præci-
puas tantum partes duabus tabulis proposi-
tis, quarum prima anteriorem, altera po-
steriorem faciem exhibet, nominabimus; de
quibus breuiter Herophilus in Isagoge, seu
Medico, qui Galeno adscribitur, cap.

10. verba fecit.

T A B V L A P R I M A.

Anteriores partes exhibens.

A. Pars capillata, τριχωτός.

B. Frons, μέτωπόν.

c. Tempora, πρότεφοι.

d ad d. Faciei circumscriptio.

e. Maior, seu internus oculi angulus.

f. Minor, seu externus oculi canthus.

* Palpebra inferior immobilis.

g. Mala, μῆλα.

h. Bucca, γνάθος.

i. Nasus externus, ῥῖν.

k. Nares, μυκτῆρες.

l. Auris externa.

m. Os ex duobus labiis.

n. Mentum γένειον.

o. Collum, ἀυχὴν καὶ τράχηλος.

o. ad E. Truncus ὄλμοι.

p p. Iuguli, σφαγάι.

q q. Claves, κλεῖδες.

r. Pectus, στήθος.

f. Mamma dextra.

ff. Mamma sinistra, huic regioni epithemata cordialia applicanda.

t t. Papilla mammarum, θηλοὶ μαστοί.

u. Scrobiculus cordis, καρδία antiquis quae pars pro ventriculi orificio inungi consuevit.

u. ad E. Infimus venter ὠδὺς, γαστήρ.

x. Epigastrium, seu suprema infimi ventris pars.

y y. Hypochondria seu praecordia.

* Hepatica remedia hoc loci applicanda.

z. Regio umbilicalis, seu media infimi ventris pars.

A. Umbilicus, radix, venter, ὀμφαλός.

B B. Latera πλευραί.

C. Hypogastrium seu infima pars infimi ventris, ἡ τεύχον.

D D. Ilia, quibusdam κενεῶνες.

E. Pubes, seu pecten κλεῖς καὶ ἡ βη.

F F. Inguina, ubi bubones fiunt, βυβόνες.

G. Penis cum praeputio.

H. Testes cum scroto.

I I. Humeri, ἐπωρίδες.

K K. Brachia, βραχίονα.

L. Gibber, ἀγκυών.

M. Cubitus, πήχυς.

N. Brachiale, καρπός.

O. Postbrachiale, μετὰ καρπιον.

P. Palma seu vola manus, θέναρ.

Φ. Dorsum manus, ὀπίσθεναρ.

Q Q. Femoris pars anterior & media, cui cucurbitula affigi solent ad prouocandos menses, μηρόρ.

R R. Genu, γόνυ.

S S. Tibia, Κνήμην.

T T. Sura, γαστροκνήμιον.

V V. Tarsus.

X X. Dorsum pedis, ὑπόστος ποδός.

Y Y. Malleoli interni, σφυρά.

Z Z. Malleoli externi.

α α. Digiti pedis, δάκτυλοι τῶν ποδῶν.

β. Pars sub malleolo, in qua Saphana aperitur.

LIB. I.

TAB. I.



T A B V L A S E C V N D A.

Partes Posticas continens.

A. Synciput, βρέγμα.
 B. Vertex, κορυφή.
 C. Occiput, κοίς καὶ ἰνίον.
 d. ad d. Facies, ὁρὸς ὤπων.
 e. Supercilia, ὀφρύες.
 f. Palpebra superior, βλέφαρον.
 g. Globulus nasi.
 H. Ceruix, ἀνχὴν, vbi Nucha ea pars,
 quæ laqueo seu setaceo perfotari
 solet.
 I I. Humerus seu Axilla, ὤμος.
 K K. Scapula, ὠμοπλάται.
 1. 2. 3. Huic parti cucurbitula affigun-
 tur.
 4. 5. 6. 7. Dorsum, ὠτῶν.
 8. 9. Spina dorsi, ῥάχις.
 L. Locus sub axilla seu Ala, μαχαλάη.
 * Gibber brachii.
 M M M M. Latera.
 N N. Lumbi, vel renum regio, ὀσφύες.
 O O. Coxendicis regio, cui remedia ad
 Ischiadem applicantur.
 P. Os is sacri regio, huic in morbis re-

cti intestini applicanda sunt re-
 media.

Q. Coccygis regio.
 R R. Nates, κλῶνες.
 S S. Femoris pars posterior, quibusdā
 semen.
 T T. Popples, ἰγνός.
 V V. Sura.
 X X. Pēs seu paruus pes, πούς.
 Y T. Malleolus externus.
 Z Z. Calx seu Calcaneus, πτέρνα.
 a a. Planta pedis, κοῖλον ἔξω ποδός.
 b. Vlna, ὠλένη.
 c. Cubitus, πῆχυς.
 d d. Carpus.
 e e. Dorsum manus.
 g. Index, δείχωνος.
 h. Pollex, ἀντίχειρ.
 i. Medius, μέσος.
 k. Medius, seu annularis, ἰατρικ-
 κός.
 l. Auricularis, seu minimus, ὠτί-
 της.

Hac de partibus externis, usque præcipuis dixisse sufficiat: si quis enim ea-
 rum & nomina, tam Græca quam Latina, & explicationem plenam requi-
 rit, Librum Primum nostræ Anatomies, qui tertio editus est, & de Partibus
 Externis inscribitur, consulat.

LIB I

TAB II



*a Lib. 1. de dia.
ta.
b De inæqual.
intemp. 1. 7 de
usu part. 21.*

*c Lib. 7. usu
part. 21.*

d Lib. 1. c. 100.

Nunc Internas partes explicare aggredimur, quas vt recte conuenientiq; ordine pertractemus, totius corporis diuisiones præmittemus. Diuidimus **T O T V M**, cum Hippocrate^a & Galeno^b in Ventres & Artus. Ventres, id est, insignes cavitates, in quib. viscus quoddam nobile reconditum est; quare cum tria nobilissima viscera in animali sint, sine quibus viuere non potest, Cerebrum, Cor & Hepar: idcirco Ventres tres sunt, quibus principes hæ partes tanquam propriis domiciliis insident (quæ alias Galenus Principia^c vocat, quæ ipsum animal administrant) qui ratione harum partium & facultatum inde promanantium differunt. Primus est venter inferior, in quo Hepar eiusque ministri, cæteræque partes naturales sedem habent, & vulgo, sed improprie, **A B D O M E N** dicitur: de quo libro primo acturi sumus. Secundus Véter seu medius, Cordis & partium vitalium domicilium, qui **T H O R A X**, de quo libro secundo sermo erit. Tertius est superior, qui Cerebrum, partesque animales continet, & **C A P V T** nominatur, cuius historiam liber tertius exhibebit. Artus vero, qui melioris vitæ causa diuinitus concessi sunt, in summas **M A N V S** & **P E D E S** subdiuidimus, de quibus libro quarto. Quæ diuisio magis placet, quam Æginetæ,^d qui secutus Diodem Carystium, Corpus in Caput, Thoracem, Vêtre^m & Vesicam distraxit: quâ

Ari-

Aristotelis, ^c Ruffi, ^f & Oribasii, ^g qui in Caput, Collum, Thoracem, Manus & Crura diuisere (quam forte & Galenus * imitari voluit, dum corporis diuisionem innuit, in Cerebrum, Medullam ceruicalem, Medullā dorsalem, Medullam lumbarem & Artus) Thoracis nomine intelligentes non medium Vētre, sed vniuersum corporis ὅλμον seu truncum, qui est à iugulis seu clauiculis ^h ad inguina & pubem, vtrunq; nimirum Ventrem medium & infimum: imitati hac in re Hippocratem ⁱ & Ægyptios: ille enim Hepar in Thorace locatum scribit: hi vero totum corpus, Herophilo ^k referente, in caput, manus, thoracem & crura diuisere. Verum Galenum se-

^c Ar. 1 hist. 7.
^f Lib. 1. c. 3 &
lib. ult. c. 2.
^g Lib. 25. col.
lect. cap. 1.
* 5. de locis affe-
ct.

^h Ar. 1 hist. 7.
Thoracem eā
partem & ca-
uitatē appello,
quæ est à cla-
uiculis ad pu-
dendā usque.
Hac aliqui i-
gnorātes, Hip-
poc. anatomes

cuti ignarum pro-

nunciarunt, quod Hepar in Thorace locatum scripserit. ⁱ Lib. de arte text. 17. ^k In introduct. c. 10. At Fernelius 2. method. 1. diuidit corpus in regiones publicas & priuatas. Publicæ seu communes sunt tres, quæ in vniuersum corpus extenduntur. I. à Porta radicib. incipit, per eius ramos progreditur & terminatur in partes, ad quas Porta rami pertinent, ut sunt caua, hepatis, ventriculus, lien pancreas, omentum, mesenterium, intestina, quæ proprium receptaculum habent, Ventriculus: proprias expurgandi vias, Intestina. II. Publica regio à radicibus Caua incipit, sursum & deorsum excurrit, per grandes Caua rames in Abdomine & Thorace inclusos, & per insigniores ramos in brachia & crura extensos, terminatur in tenues venas ad singulas partes: idem de Arteria dicendum: huc spectant conuexa hepatis, Caua & Arteriæ rami, antequam in capillares desinant, quibus circumscripta tenentur & propria receptacula habet Vesicæ & tramiq; proprias expurgandi vias emulgentes, uretres & renum cavitates. III. Publica regio, complectitur Musculos, Mēbranas & Ossā, & omnem corporis molem, Membrana carnea & cute obuallatā: quæ incipit ab ingressu venarum & arteriarum capillarium in partes singulas, ac in summam cutim terminatur: ex horum animaduersione omnis fere medendi ratio deriuata est. Priuatae regiones sunt, quæ propriis sedibus consistūt, ut Cerebrum, Pulmones Rines, Vterus. Hac Fernelius videtur desumpsisse ex Galen. qui 7. meth. med. ult. & 13. eius. 15. docet Caua iecoris per Intestina: commixta per emulgentes & urinas habitum corporis, per caca cutis spiracula ac sudores expurganda: Cerebrum, per nares, palatum, pulmones per asperam arteriam & os.

cuti, infimum ventrē à thorace distinguimus, cum Truncus Diaphragmatis interuentu in duas diuidatur cavitates seu ventres: & cavitatem, quę supra diaphragma est, thoracem seu ventrem mediū; quæ vero infra diaphragma, imum ventrem appellabimus. Sic collum cum capiti ceu fulcrum sit subiectum, non est, quod à capite & thorace curiosius diuidamus.

Differunt autem hi tres ventres, & ratione compositionis & ratione situs. Ratione compositionis in eo, quod tantum supremus venter, seu Caput, totus sit osseus: huic enim natura os immobile sine musculis circumiecit; solos enim musculos infimo largita est: vt medio inter vtrosque posito & ossa & musculos.

*I Galen. 7. vfu
part. 21. Ar. 2.
part. anim. 9.
Venter omniū
ossibus vacat,
ne tumori im-
pedimēto sint,
qui per cibum
ingestū exsur-
gat necesse est
atq; ne in fœ-
tunis incre-
mento partuū
obster.*

Cerebrum namque ¹ in nullos vsus musculis indiguit, cum ipsum in omnibus animalibus motus voluntarii aliis partibus sit principium: quo fit, vt ipsi tanquam visceri nobilissimo, mollissimo & in excelsissimo corporis loco collocato, sicque variis iniuriis obnoxio, cranium totum osseum immobile, quasi murus, iure sit circumdatum. Venter autem imus totus carnosus, membranosusque constitutus, vt facile extendi ob assumendos cibos, fœtusque dum gestatur, auctorem, & intestina ad fœcum exclusionem comprimi possit. Si enim Hepati aut ventriculo septum eius generis aliquod in orbem fuisset circumfusum, vbi ci-
bus

bus & potus exciperetur? vbi foetuum moles recondideretur? quo denique excerneretur superflua, si nullus eis præesset musculus? Quare¹ si venter osse circumdatus foret, neque foemine concipere, nec homo semel ad saturitatem comedere posset; sed vt respiratione continua, sic esu assiduo indigeret: sicque vita nostra à Musis & Philosophia admodum esset aliena, neq; rebus pulcherrimis operam darc liceret: Iam vero cibo ac potu semel impleti, diem integrum sine molestia perduramus. Quod thoracē attinet, partim osseus, partim carneus conditus est: si enim ex solis ossib. factus fuisset, motum penitus amisisset, nec dilatari in inspiratione, nec deprimi in expiratione potuisset, q̃ propter respirationem necessarium est: si vero¹ contra totus carnosus &¹ ex musculis solis, inciderent hi pulmoni & cordi, eorumq; perennes motus impedirent, nemine eos expellēte; vt igitur simul spatium intus esset, simulque totum instrumentum prompte & expedite moueatur, & follis modo in respiratione eleuari & deprimi posset, musculi ossibus cartilagineis compagibus coagmentatis alternatim fuerunt interpositi: hacque ratione magis torac pulmones muniuntur. At quoad situm; Venter osseus cerebrum continens, in suprema corporis parte locatus est, propter oculos, cum ii speculatorum munere fungantur, qui ope nervorum

mu-

*m Gale. 4. v.
part. 7.*

munus suum absoluunt, quos ob mollitient cerebro vicinos esse oportuit. Thorax vero huic proximus esse debuit, cum vocis ^m & respirationis sit conditor; in quo enim vox formatur, is ori proximus esse debet (cum per os aerem & attrahat, & rursus emittat) quo vox commodè formari possit. His tertius venter succedit, qui si supremum locum occupasset, propter fæces quas continet, quæ deorsum mitti & expelli debuerint, in prolapsu, cerebrum & cor polluisent: si vero medium locum occupasset, voci formandæ impedimento fuisset.

*n Gale. inag.
intemp. 2.*

Harum partium ⁿ rursus vnaquæque in proximas sui, quæ *ὑποστέχῃ* Græce dicuntur, particulas diuiduntur, hæque in alias subdiuiduntur, vt in cuiuslibet ventris explicatione monebimus.

o Lib. 5. ad. anat. 6.

Iam vero, cum propositum nobis sit, toto hoc opere sectionis methodum obseruare, à ventre inferiore exordiemur; cum hic venter sit instar cloacæ, in quam tum primæ tum secundæ coctionis excrementa amandantur; cum ab eo sectionis fiat initium, etiam Gale-
no ^o monente, ne si alterius alicuius ventris partes prius inquirantur, interim cadauer propter excrementa intestinis inclusa, fœtere ac putrescere incipiat, sicque reliquarum partium sectio impediatur.

LIBER

LIBER PRIMVS,

DE VENTRE INFERIORE.

Ventris inferioris Diuisio.

C A P V T I.



VENTER inferior, ^a qui proprie γαστήρ, Poetis ^b νῆρ, δὲ τὸ ὅν νῆρ τὸ σὺν-
 πρέπειν, quod in eum cibaria conge-
 rantur: improprie ^c ἑπὶ γαστρίον dici-
 tur. Latinis venter & aluus: Celso, di-

^a καὶ λῆν: per
 Antonomasiā
 ab aliis κεν-
 ὶν: à Suida ῥα-
 ρες: Κλόνης: E-
 schyli Schol.

^b Homer. O-
 dyss. i. ἀπὸ
 Ἡρ. significat
 omnem caui-
 tatē, quo hu-
 mor alendis
 partibus con-
 tinetur.

^c Quia sit vī-
 tris integum ē-
 ῖν, ut Piccoi-
 homineus cre-
 didit.

^d Lib. 4. c. 1. i.
 mus venter ab
 illis ac pube
 abdomen su-
 sum versus ad
 praeordia per-
 uenit.

^e Columbo ea
 pars corporis
 quae am venter
 inferiorem di-
 uinit, Geci
 mus. epigastrium.

mus venter, vulgo, ^e sed male, abdomen nominatur. Est autem trunci media pars eaque inferior, intrinsecus diaphragmate à thorace distinctus: qui superne, cartilagine ensiformi: inferne, ossibus pubis: anteriorius, abdomine proprie dicto: posteriorius, lumborū vertebris & osse sacro: ad latera vtrinque, costis, ossibus ilium & coxendicis circumscribitur: qui cum & nutritionis & generationis membra continere debuerit, cavitatem omnium amplissimam obtinuit. Hic inferior est, quo recrementa vtriusque coctionis recipiat, & facilius extrudat: anteriorius & ad latera totus ^f carnosus, quo ob alimenta assumenda, & foetus gestationem dilatari possit, & ob faecum exclusiōnem comprimi.

Diuiditur in partem anteriorem & posteriorem. Anterior pars est, cui ^f ἑπὶ γαστρίον ἔσται nomen Galenus tribuit, & Arabibus Mirach vocitatur: quam Galen. ^g in tria diuidit, ὑποχόνδριον, τὰ ὡτὲ τὸν ὀμφαλὸν, καὶ τὸ ἡττον: quare eum imitantes, in partem seu regionem superiorem, mediam & inferiorem subdiuidi-

B

^f Galen. 7. 2. s. part. 21. Arist. 2. part. an. 9. 4. eiusd. 10. g. Corn. 2. aph. 53.

δριον.
i Multiplex
hypochondrij
apud Hip. ac-
ceptatio, sæpe
synecdochice
pro toto infimo
ventre, ut aph.
73. quib. hypo-
chondria diste-
ramur. Sic metony-
micos 6. Epid.
successiones hy-
pochondriorū
consideranda,
i est, partium
qua ibi conti-
nentur. Anto-
nomasticos pro
dextro, ut 3.
Epid. sect. 1.
hist. 2. hypochō-
drij distentio
molliter, &c.
k Vel quod τὸ
χόνδρον τὸ
κεῖται.
l Arist. 5. part.
in Lib. 4. ca. 1.
& 8. sed lata
significatione:
vel quasi pro-
xime subiecta
cordi.
n Hippocrat.
ο σφραγὶς. Pol-
luc.
p Quibusdam
ἐπιγαστριον:
ὑπογαστριον
Volcher.
q Et R. ffus.
r Lib. 1. hist. 4.

mus. Superioris, ^h quæ cartilagine ensiformi & costa-
rum finibus terminatur, partes tres sunt, duæ latera-
les, quæ proprie ⁱ Hypochondria quasi Subcartilagi-
nea, quod τὸ ὑπὸ τῷ χόνδρῳ, ^k id est, sub cartilagine sint,
cum costarum spuriarum cartilaginibus subiaceant.
Aristoteli ^l φρένες, eo quod sub diaphragmate sit eo-
rum locus; Celso ^m præcordia, quod sint circa ventri-
culi orificium, quod καρδιαν ⁿ vocarunt: in quorum
dextro hepatis maior pars: sinistro lien, & ventriculi
maior pars consistit.

Tertia pars est anterior, inter hypochondria me-
dia, quæ proprie ἐπιγαστριον, cum ei ventriculus sub-
iaceat, dicitur, vbi cauum illud, aliquibus καρδίη, ^o à
recentioribus scrobiculum cordis dictum, observa-
tur. Media seu regio vmbilicalis, ^p quæ finibus costa-
rum & linea recta ossis ilei vtrinque circumscribitur,
tres quoque partes habet, duas laterales, quas, cum
locus ossibus careat, κενεῶνας, inania Galenus, ^q & λα-
γῶνας à laxitate Aristotel. ^r vocarit, (ilia quibusdam)
in quarum dextra, cæcum intestinum cum coli par-
te: in sinistra, ieiuni & coli pars: & partem anteriore,
vbi vmbilicus ὀμφαλός, totius corporis centrum, cui
totum fere ieiunum subiacet. Inferior denique pars,
quæ sub vmbilico est, & ad pubis os vsque vergit, hoc
est, quæ à spina costæ superioris ossis ilei incipit, &
ducta vtrinque linea transversa ad medium spatium
inter vmbilicum & spinas ossium pubis sese extendit,
& nonnullis lata significatione parvus venter dici-
tur. Stricte tamen eam tantum partem denotare vo-
lunt, in qua sola vesica est, quomodo Diocles Cary-
stius sumpsisse videtur, dum corpus, in caput, thora-
cem, ventrem & vesicam diuisit: siquidem venter hic
paruus à magno distinguatur septo interiecto, à pe-
ritonæi productione facto, quæ productio à ceruice
vesicæ per eius partem posteriorem & fundum vs-
que

que ad vmbilicum extenditur, quam ligamenta tria, duæ scilicet arteriæ vmbilicales & vrachus dictus, sustinent. Dicitur Hippocrati ^f ἡ ἡγεῖα, Galeno ^t ἡ ἡγεῖα, γαστρον, Latinis imus venter & ^u aqualiculus, quod eo sordes confluant, cum & Vesica & Ileon intestinum, anteriore parte: posteriore vero rectum intestinum, & in mulieribus inter hæc, vterus medius situs sit. Hæc in tres similiter subdividitur partes, in duas laterales ad pilorum vsque exortum, quæ Illia Celso, ^x quod Ileon intestinum (& vasa spermatica) contineant, dicuntur. Anterior vero & media pars ad penem vsque, hypogastrium ^y proprie dicitur, cuius pars dextra & sinistra in femoris flexu pubi affixæ sunt βουβόνες Aristoteli ^z (quo nomine & tumores, qui in eis exoriuntur, donantur) inguina Latinis appellantur. Tertia vero & anterior pars, vbi pilorum est acerius, ἡ ἡγεῖα Hippocrati ^{aa} & Aristoteli: pecten, pubes, ^{bb} quamuis pubes proprie lanuginem seu pilos significet, qui supra pudendum virile & muliebri erumpunt, maribus decimo quarto, fœminis duodecimo vt plurimum, anno, quod maturitatis signum est: simul enim (vt Hippocratis ^{cc} verbis utar) ac via patet mensibus & genituræ, tum pilus in pube pueri & virginis, cuticula (cutim veram intelligit) rariore reddita, nascitur. His pudenda subfunt.

Posterior pars, quæ est à fine costarum ad ossis coccygis finem ^δ ἡ ἡγεῖα cinctum, quidam vocant: diuiditur in partem superiorem & inferiorem: superior, quæ est à dorsi flexu ad nates vsque, quæ lumbos constituit, ὀσφύες ^{dd} Aristoteles nominavit, quorum pars utrinque carnea ^φ ὄζα, pulpa, ^δ πρὸ τοῦ φανῆσαι à palpan- do dicitur ad cuius dextrum latus ren dexter, sini-

B 2

strum

nim ¹² & Polluc. ^λ αμπί-
on Galen. 3. de
artic.
f Lib. 2. aph.
35. at lib. de
nat. mulieb.
veia ^α αμπί-
on: & Areta-
us, vesicam cō-
tῆν veia ^α αμπί-
tam scribit.
t Lib. 7. v. f.
part. 22. &
Polluci.
u Persio: Su-
men Vesalio,
Columbo &
Fallopio, ali-
Sume aut Ru-
men à summa
mammarum, aliis
ἡ ἡγεῖα.
x Lib. 4. cap. 1.
Illia inter co-
xas & pubem
posita sunt, ut
veia ^α αμπί-
s. ad anatom.
6. & dissect.
musc. 26. ἡ
λας & λαγύ-
vas à laxita-
te.
y Totius no-
men retinet,
quia Hippo-
crates de hu-
midorum v. f.
ἡ ἡγεῖα πρὸς
totus est ven-

ter inferior. z Lib. 1. hist. an. 14. aa De nat. pueri, at 1. de mulieribus exorté-
rior: ἡ ἡγεῖα introd. immo venter Plinio, ^{λλ} αμπί. bb Quod ibi pudicitatis signa in-
ferunt c. De nat. pueri. dd Lib. 1. hist. an. 14.

cc Lib. 4. hist.
an. 10. ubi di-
cit, solū homi-
nem ἰχθυα habere,
licet & apro & leoni
Homerus tri-
buat.
ff. Lib. 1. hist.
an. 13.

strum ren sinister sedem habet. Inferiores vero post
lumbos partes carnosæ & globosæ, fissura, quæ διχά-
λα Herophylo, diuisæ; Aristotel. cc ἰχθυα, καὶ τὸ ἰχθύν
τοῦς καὶ θημέρους, quod sedentes sustineant, nominauit,
cui & ff γλῶττι: Latini nates ab innitendo, cum pul-
uinaris loco sint pinguibus, dixerunt. In horum me-
dio coccygis os: his recti intestini vltimum, anus seu
podex, tanquam in valle subiacet. Plura qui volet, ca-
put 11. & 13. Libri primi, qui de partibus externis agit,
consultat.

Constituunt autem infimum ventrem, partes du-
plices, quarum aliæ dicuntur continentes seu inue-
stientes, aliæ contentæ. Continētes, quæ proprie Ab-

gg Hoc docet
Gal. 5. vs. par.
14. Sic 6. Me-
rhodicutim &
musculosam
partem infimi
vētris epigast.
nominat. Ab-
domē, totū in-
fimu ventrem
vocant Colūb.
1. 3. ca. 22. & l
11. c. 12. Fallop
in institut, cui
tanquam sac-
cus, in quo vi-
scera continē-
tur. At Lau-
rent. anterior
est infimi ven-
tris pars, quod
videtur &

dominis & nomine exprimuntur: siquidem viscera
imo ventri inclusa abiant, & integendo tueantur,
vnde Græcis ἐπιγάστρον, & quasi circumventrem,
dictum volunt; etiam duplices sunt, aliæ communes,
aliæ propriæ. Communes sunt, Cuticula, Cutis, Pin-
guedo cum sua membrana, membrana carnosæ, & tu-
nica cuiuslibet musculo propriæ: hæ communes dicun-
tur, quod vna cum hoc ventre totum corpus vndiq;
cingant, pene & scroto excepto, quæ pinguedine ca-
rent: ob quam causam aliqui pinguedinem & cuticu-
lam quoque, vt excrementum, e continentium nu-
mero excludunt, quibus etiam partis definitio pro-
pria non competit: hæ ventrem inferiorē efformant
& inuestiunt. Propriæ sunt, muscoli decem, & perito-
naum, quæ infimum ventrem cum ossibus constitu-
unt, quibus nonnulli & omentum addunt: propriæ
cuntur, quia huic ventri sint propriæ, cum quilibet

ven-

Celsus lib. 4. ca. 1. voluisse. Archangelus partes continentes tam communes quam
propriæ Abdomen dicit. Platerus ventris inferiorem & anteriorem sedem, quæ hy-
pogastrium. Sic Epigastrii varia acceptatio, 1. Totus infimus venter, Columbo, et
Fallopius aut multis inferiorem ventrem esse. 2. Archang. partes infimi vētris con-
tinentes causa Gal. 6. meth. 3. Musculi octo Gal. 5. vs. par. 14. 4. Anterior & superior
infimi vētris pars. 5. Media pars anterioris & superioris infimi vētris Bauhinn.

venter peculiare obtineat, communibus subiectas: de quibus primum, dein de contentis, & ossibus sermo erit.

PARTES CONTINENTES

COMMUNES.

De Cuticula.

CAPUT II.

CUTICULA^a partim continētium prima, Grecis *ὀνίεππις*, quasi summa cutis, quod ei obducatur, dicitur: efflorescentia est cutis in ipsius generatione^b producta: dum enim natura in cutis generatione semini sanguinem miscet, vapor humidus sanguinis efflorescens, à calore intenso protrusus, & aeris frigiditate condensatus, in cuticulam vertitur: quare in nuper natis tota cutis rubra apparet, cuticula ob frigoris defectum nondum genita: mox vero à frigore externo ad caloris transpirationem impediendam, densatur, quomodo pulti ex vaporibus eleuatis cuticula supernascitur. Hoc facile deperditur, attritu & fricatione, vel vesicularum modo ab igne, aquaue, feruenti excitatarum à cute abscedens, facileque regeneratur: quare ex semine nasci non potest, cum partes spermaticæ semel ablatae non renascantur.

^a Quibusdam cutis ultima & eius operculum: cuticula summa Celso: cutis superficialis Galeno: alius superior pelli-cula.

^b Nonnullis ex sinibus rasorum capillarium, maxime nervorum ad cutim delatorum gignitur, sed tum dolet.

Alij ex cutis excremento non halituofo, non aqueo, sed cras-

B 3

siore exsiccat ex 3. hist. an. 11. inest in cute animalium lator quidam muccus, verum aliis minus, aliis magis, ut in tergore bubulo, ex quo glutinum facere solent. Ex semine non nascitur, alias esset pars corporis, at non est, non enim nutritur, cum in eam vena non pertingant: tum quia amissa decies millies resarcitur. Non ex sanguine, quia esset parenchyma, quod filamentis spermaticis attexitur: at nullum filamentum in eius distractione conspicitur: dein si ex sanguine esset, in diuturnis morbis absumeretur, ut alia substantia carnosae. Ergo ex excrementis: non prima coctionis, quia sunt faeces stercoraceae: Non secunda, quae sunt urinae bilis viraque ergo tertia coctionis, non halituofo, non aqueo, sed crassiore. c Hippoc. de carnib. corporis extremum aeri expositum à frigido & ventis ingruentibus. necessario pelli-culam contrahit. At Arist. 2. gen. an. 6. cutis carne siccificante efficitur: *ἀπὸ τῆς ἐν τῇ*

τοῦ;

*τοῖς ἐψίμασι
ἢ κελευμένη
ζῷοις: nec so-
lū propter ex-
tremum gene-
ratio eius, sed
etiam quod lē-
zando reside-
at, cum eua-
porari nō pos-
sit.*

tur. Tenuissima est, nisi forte labore continuo callo-
sior sit reddita, ne cutis subiectæ sensum hebetet: ce-
parum inuolucris pellucidis respondens, in vola ta-
men manuum & potissimum plantis pedum, vbi ob
continuum vsum atteritur, & quasi noua succedit,
crassior & durior euadit, quā serpentes singulis annis
exuunt; homines vero non nisi per morbū, vel quan-
do fucis vtuntur: cute densior & compactior, quare
humores aquei, qui à centro ad circumferētiā pro-
pelluntur, facillime cutim permeant, cuticulæ vero fi-
nibus continentur, vnde Ecchymata, phlyctides, &
tot pustulæ aquosæ, quæ hydroa nominantur.

*d Pene exan-
guis Laurent.*

(Est prorsus exanguis, cum ad eam nec venę nec ar-
teriæ perferantur; quare per additamentum crescere
videtur: sensus expers cuti supernascitur, quo eam ab
externis iniuriis tueatur, & exquisitum eius sensum
attemperando fiat sensus tactus medium; (siquidem,
vt ait Arist. e omnia quæ sentimus per media sentia-
mus, & nulla fiat sensatio per immediatum contactū
sensibilis & sensorii) hac enim auulsa dolorem senti-
mus, illaq; parte rerum contactum ferre non possu-
mus, quod in vlcere quotidie experimur, vt cute sub-
iecta sentiat quidem, sed sine iudicio & cum dolo-
re. Alter vsus, vasorum capillarium oscula contegere:
hac enim auulsa è venarum orificiis sanguis profluit;
verum & cutim tegit, ne cōtinuo humor exudet, vn-
de cutis in intertrigine semper madet: & tandem cu-
tim asperam, inæqualem, mollem & læuem reddit.

*e Lib 2. de a-
nim. text. 114.
Columbus de
cuticula vsu
nil hab. t.*

De Cute.

C A P U T III.

DE cute, eiusque meatibus egit Aristot. 3. hist. an.
II. & 5. gen. anim. 3. Galen. 2. vf. part. 6. & II. ciuf.

15. at de eius nervis 16. vñ. part. 2. Cuticulæ vera germanaque cutis^a subiacet, quæ Græcis δέρας^b δὲ τὸ τοῦ δέρας^c αἱ, eo quod excoriari possit, Hippocrati^c δέρας^d μιν, quasi δέρας^e, vinculum^e colligans corpus nostrum, cum illud totum ambiat, dicitur. Substantiam habet propriam, licet nervo & membrana assimiletur, cum sit candida, extendi possit, sensusque sit exquisiti, cæteris tamē membranis crassior: quæ ex^d semine cum sanguine probe mixto gignitur, quo tam de partibus spermaticis, quam sanguineis iudicium ferre possit, quare mediam naturam inter carnem nervumque adepta videtur: non enim, vt habet^e Galenus, plane exanguis est, vt nervus: nec omnino sanguine abundans, vt caro: sed veluti sanguine præditus nervus. Verum in eius constitutione pars spermatica sanguineam superat, cuius vt plurimum colorem refert; eius quoque nomine tantum per mediam cicatricem coalescit.

Hæc cum ex subiecta^f carne siccata & adstricta, Galeno^f docente, creetur, semper reliqua carne durior est, ideoque cicatricibus nulli pili infiguntur. Et hæc cicatricum generatio Platonem^g decepit, vt cutim ex genere carnis esse diceret: & Aristotelem,^h vt cutim carnem siccata pronuntiaret.

At cutis naturaliter albicat, pro ratione tamen humorum abundantium, etiam Hippocrateⁱ docente, & subiectorum corporum, colorem variat.

B 4

Humo-

res ad corporis superficiem delati in exilitates expanduntur, in cutem degenerant, concurrente sanguinis additione: quemadmodum folia leuissima nymphaeæ extenui pediculo expanso generari solent. Archangelo, sit ex semine, sicut membrana foetum inuoluentes. Vesalius, inter nervum & musculorum carnem quiddam plane modium, ac si ex mixtis utrisque constitueretur, e Lib. 1. temper. vit. f Galen. 3. meth. 5. g In Tymao ex 1. simp. 4. h Lib. 2. part. an. 1. 2. gen. an. 4. (Sed hoc non credendum, cum cutis à subiectis carnibus excoriari possit, & inter cutim & carnem interiecta sint pinguedo & panniculus, carnosus: hoc verum est de cicatrice, quæ cutis est vicaria) Galen. 5. simp. 16. i Lib. de succis, qualis humor, talis color in cute efflor. scit.

a Cutis nomine sate intelliguntur simul omnia quæ ad musculos abeunt, vt s. loc.

aff. 6.

b Hippocrat. lib. de arte dē-
pny vocat, lib.

de insom. 22. a-
mæ, lib. de v-
ctu in acut.

φασιν. In
homine Herc-
doto ἀνδρῶν
πῆ: Homero
ἀνδρῶν πῆν:
Herodoto, δέρας
βίς ἡρ.

c De off natu.
τὸ δέρας πέν-
των ἐν δέσει
τῷ ἐν δέσει.

d Columbus
ex vasorum
extremis di-
latatis gigni
credidit: alij
ex semine ge-
nitam vo-
lunt. Varolo

nervi mollio-

Humorum quidem, vt sanguinis, qui illam, vbi abundat, & cutis tenuis est, vt in facie, rubore tingit, maxime si vel calore vel aliquo animi motu excitatus copiosius affluat, quemadmodum eo frigore condensato, liuida redditur: sic biliosorum pallet, melancholicorum nigricat: sic humoribus vitiosis inquinata, vt in Ictero, flauescit vel nigricat. Ratione vero corporum subiectorum, vt carnis, cui si adhæreat, vt in malis & manibus fit, citius rubet: sic & pinguedinis, quæ si copiosior sit, æqualem albamque reddit; qua absumpta, cute rugosiore reddita & adumbrata, fulca fit, quemadmodum etiam ibi, vbi venæ maiores sub ipsa feruntur, liuet.

k. 4. 4. b. f. s. g. e. Crassa est munimentigratia, at tenuior, ^k quam fit in aliis animalibus; quæ à carne absque dolore auelli non potest, cum in eam omnium fere vasorum extrema definant, vnde ex vasorum extremis dilatatis eam prodire credidere: Mollis est, sensuque ^l exquisito prædita, quo externas iniurias, antequam internæ partes lædantur, persentiamus.

l. Galen 16. v. f. par. 2. 2. 3. ad a. cut. 2. et d. r. f. 3. b. f. an. 2. f. cut. carere dixit, maxime capitis quare p. ly. outant A. r. f. totem cu- r. cuti vnu- re, alij veram inreb. s. f. sed consideratam re pars simi- laris est, à ner Hæc, pro ratione ^m partium vel mollior, rarior, vt in facie, pene & seroto: vel durior, vt in ceruice, dorso, cruribus & plantis pedum: quædam in duritie ⁿ & mollitie media, vt est ea, quæ in interna manus sede, maximè in digitorum apicibus, cum iis apprehensio, fiat, & in manus ^o cute perfecta sit tangendi potentia, idcirco omnis excessus plane expers & temperatissima (quia tactus iudex, & omne instrumentum qualitat

uo distincta Non agnoscens Arist. veram cutis constitutionem, credidit cutim extimæ, carne porzionem exsiccatam, veluti exustam esse. hoc forsan credidit, quia in vulnerib. & ulcerib. vidit carnem cute priuatam, cute obducti exsiccantibus medicamentis, & extrema parte siccante: Sed hæc non cutis, sed cicatrix & cutis vicaria est: hæc Archang. & Laurent. in Ar. 3. gen. an 3. de differentiis cutis egit, & ingenii vires ex cutis & carnis (2. de anima 9.) substantia colligit, vt ingeniosi sint, qui mollis: inepti, qui durior & crassior cutim habent. At Gal. 2. temp. vlt. errare licet eos qui ex sola cute tctius temperi colligat. n. Gal. 3. meth. 5. o Gal. 1. simp. 4.

litatis P alienæ expers esse debet) nisi laboribus cal-
losa sit reddita, vt in fossoribus & remigibus. Sic quæ-
dam crassissima, q vt in capite: quædam crassa, vt in
collo: quædam tenuis, vt^r in lateribus, vnde titillatio:
quædam tenuior, vt in vola manuum: quædam tenu-
issima, vt in labiis.

Nec eodem modo partibus connectitur: quædam
enim à subiectis partibus separari potest facile, vt in
ventre inferiore & medio, brachiis & cruribus: ab al-
liis^r difficile, ob membranam carnosam, cui fibris, &
vasorum beneficio, pinguedine tamen iis in locis, vbi
ab illa excoriari potest, intermedia neçtitur: ab aliis
vero vix, vt in plantis pedum, volis manuum, quibus
ad firmiorem apprehensionem penitus connascitur,
carne frontis & totius fere faciei, maxime aurium &
labiorum, propter^r tendines & musculos, maxime
eum qui Latus dicitur, commixtos. Sic in fronte mo-
bilis, in reliquo hominis^u corpore immobilis est.

Cōtinua vniuersum corpus inuestit, nisi vbi mea-
tibus^x naturalibus, partim manifestis, certoque nu-
mero definitis, qui foramina dicuntur: partim ob-
scuris & infinitis, quos poros nominant, datur trans-
itus, vel ob intromissionem, vel emissionem, vel v-
trunque.

Foramina sunt, circa oculos palpebrarum fora-
mina transuersa, visionis causa: aures, propter auditū
ad sonorum intromissionem, & sordium expurgatio-
nem: nares, respirationis & odoris gratia, & mucoris
effluxuum: os, quo cibum & potum recipiat, & non-
nunquam vomat: papillas mammarum, vt per ea in
mulieribus infans lac fugat: penis glandem, quo se-
men vel vrina emittatur: podicem, quo stercora eiici-

B 5

antur:

ster. anim. 11. contextu perpetuo cutis in omnibus animalibus continuatur, nec
alibi interpellatur, quam vbi naturales meatus solent euaporare: atque etiam in
ore & vnguib.

p Aristot. 2. de
anima, recipi-
ens debet esse
densatum à
natura rece-
pti. Albertus
in solo homine
temperatam
credidit.

q Arist. 5. gen.
an. 3. τοῦ γὰρ
δέρματος τοῦ ἐν τοῖς
μυσκέσιν, αὐ-
τῆς καπνὸς κρᾶ-
σσις ἐστὶν. Co-
lumb. tamen
dicit, Aristo-
telē cutim ca-
pitis tenuissi-
mam facisse.

r Que Celsus
illa ab ina ter-
nuissima char-
te parte.

s Galen. 11. vs.
part. 15.

t Galen. 2. vs.
part 6.

u In multis a-
nimalibus cu-
tis mobilis: Sic
Eliphas cor-
rugatione cu-
tis muscas in-
terficit: in e-
quo, ceruino mo-
bilis, sic in ri-
no dum corpus
conglobat.

x Aristot. 2. hi-

antur: in mulieribus ad vteri sinum, rima ad virgam admittendam, foetum excludendum, vrinam & mēstrua profundenda: in foetu vmbilicus, vt sanguinem & spiritum nutritione & vita admittat, & in extremis digitis, vbi vngues affixi sunt.

y Deporia vi-
de Ar. 3. hist. 1.
Et 5. gen. an. 3.
z Quēdā Per-
sarum Regē ad
fenestras parā
das vsum scri-
bunt. Alberto
pratensis Et
diaphana.

aa In Timao.
bb Gale. com.
de fractur.

cc Addunt a-
liqui processu
sque cutis e-
mittat, vt in
facie propter
nasum Et au-
res: in thorace
propter mam-
mas Et papil-
las, in ventre,
propter testes

Et penem Sed
de digitis ma-
nuum Et pedū
idem dicere
possemus.

Sic vocauit
Galen. 1. sum.
c. 5. 2. v. part.
19. 4. eiusd. 12.
1. meth. 6. hinc
Aristoteles li-
bro de Spiritu.

1. Cutis, vena, arteria Et nervo constat.

Porosa y est, exiguis foraminibus instar z cribri re-
fertissima, quod sudores & pili qui erumpunt, com-
probant; (quare aa Plato cutim nassiculæ, qua pisces
capiuntur, assimilauit) ad liberam transpirationem,
quo tertiæ coctionis excrementa repurgari possint,
(vnde quibusdam emunctorium vniuersale dicitur,
cum internarum partium superuacua excipiat) qui
exigui & fere insensiles, ne maxima fiat spirituum dissi-
patio: in aliis tamen angustiores, in aliis latiores, hique
nullo negotio sudant, & ab internis minus afficiun-
tur: illi difficilime & facile excrementis retentis læ-
duntur: qui vt aperti seruētur, cuilibet pilus (de qui-
bus peculiari libro agemus) mucosa albaque radice
firmiter hæret, exceptis illis locis, vbi continuo atte-
runtur, vt in vola manus, &c. horum etiam ratione,
quandoque fasciæ bb in deligatione cruentæ appa-
rēt: imo & sanguis purus, vt in sudore Anglico, efflu-
xit. Hos, si laxari contingat, vt à profusiore gaudio &
croci liberaliore vsu, derepente hominem extingui
censent.

Quo vero nutriatur, viuat & sentiat, organa com-
munia dicta venas, arterias & nervos recipit.

Venas cutaneas dictas, duas à Iugularibus per ca-
put & collum dispersas: duas ab Axillaribus per bra-
chia, thoracem ac dorsum duas ad Inguina, quarum
altera à Cauæ ramo externo Epigastrica dicta (quæ
in sectione rupturæ in inguine sæpe cum periculo
vulneratur) quæ cum arteria versus ossis ilium spi-
nam fertur per cutim ad partes laterales nutriendas:
altera

altera magis interior, quæ sursum per abdominis cutim anteriorem ac lateralem deducitur; & extremis osculis iungitur cum cutaneis venis, quæ ab Axillari ortæ thoracis lateralem partem nutriunt, & ad Abdomen descendunt. Sic à parte posteriore sæpe à Lumbis & Muscula propagines habet, quæ per lumborum infimam regionem, pedes & infimum ventrem disseminantur, quarum dextræ cum sinistris, inferiores cum superioribus iunguntur, quod in vena frontis, spina, narium, sub mēto apparet: sic in mammis, in hypochondriis: in lateribus abdominis ac thoracis, ubi vena ab Epigástrica ascendens cum māmāria descendēte inuicem vnitur (eo modo, quo intrinsecus sub rectis abdominis musculis fieri dicem⁹) ratione cuius concursus & vnionis inter nares & abdominis exteriores partes, quæ in hypochondrio continentur, consensus: cum venæ descendentes à Cauæ ramis iugularibus circa iugulum nascantur, à quibus narium venulæ ortum habent, harumq; coniunctione sanguinis è naribus fluxio sistitur, si dextra nare fluente, hypochondrio dextro, sinistra sinistro, ex dictatoris nostri Hippocratis præscripto, affigamus. Sic in cubito sæpe Axillaris cum Humeraria ita iungitur, vt aliquando nil referat, siue hanc siue illam seces: Sic in crure propagines Saphenæ cum ramis Ischiadicæ copulantur. Eadem coniunctio datur inter exteriores atque internas, ita vt iugularis externa cum interna, mamillares externæ cum internis, axillares cum venæ sine pari ramis per media costarum spacia iungantur.

Sic abdominis cutaneæ cum interiorib. & in cruribus quoque internæ cum cutaneis nectuntur. Verra ergo, diuini Senis ^{dd} sententia, *ξύρροια μία, ξύμπνοια μία, ξυμπάδεια πάντα.*

Arterias vero ^{cc} paucas habet, quæ ad tempora, ^{dd Hip. de alimēto.} ^{cc Totidē arteria ramulos venarū committuntur Laur.} fron-

frontem, penem, scrotum & digitos exigua, quia non tanta caloris necessitas requiritur, inter cutim & membranam carneam feruntur: quæ cum dilatantur, ^{ff} aerem externum attrahunt: qua vero ad venas se aperiunt, quod tenuissimum, maximeque halituosum in iis sanguinis ad se trahunt.

Nervos non quidem proprios & definitos, sed ex ^{gg} Galen. 16. ^{us} part. 2. nervis, ^{gg} qui ad subiectas partes mittuntur, fibræ producuntur, quæ inæqualiter disseminantur, & in exilitates expansi in cutim absumuntur: duo tamen insignes circa papillas, vnde earum exquisitus sensus, conspiciuntur: sic cuti volæ plurimæ nervorum fibræ porriguntur, cum exquisitissimo sensu sit prædita, quemadmodum quoque ad vnguium radices & pudendi extremum: in aliis vero hebetior est sensus.

^{hh} Aristot. 1. *histor. anim.* 4. *tactus*, aut in parte corporis simili consistit, ut in carne, aut in aliqua generis eiusdem: denique in parte sanguinea, aut in ea, quæ ex proportionem

Vltus tactus ^{hh} externi immediatum esse instrumentum, ut externas iniurias, antequam interna lædantur, persentiamus: quemadmodum interni tactus sunt membranæ internæ. Dein, ut totius corporis ⁱⁱ commune & nativum sit tegumentum, muni-
mentum & ornamentum, cum illud circumdet & obtegit, quo tutius sub ipsa vasa ferantur, muscoli & viscera collocentur (vnde Aristoteles ^{kk} ad custodiam carnis constructam, dicit) eaque vestis instar à calo-

vice illius habetur. Vide 2. de Anima capite undecimo, ubi carnem medium tactus facit, non vero instrumentum: at instrumentum tactus esse quiddam intus in corpore abditum, quod potestate tale sit, quale actu sit tangibile, sed quid sit, non exprimit. Averrhoes & Thomas dicunt esse nervum. Avicenna pinguedinem sensus instrumentum facit. Picolhomineo cutis est medium tactus. Varolo, cuticula in sensatione tactus, tanquam medium deseruit. Laurentio, cuticula est medium tactus, cutis organum tactus. Aristoteles, medium tactus cum animali coniunctum esse vult. ⁱⁱ Galenus 3. ad anat. 1. de caus. morborum, 6. 14. method. 2. ^{kk} Hippocrates de carnibus, Galenus 8. *us* part. 1. & 3. aliment.

calore, ^{II} nimioque frigore defendat; & caloris ni- ^{II} Cum ea o-
mium effluxum cohibeat. ^{mnia habe-}
^{ant, quibus}
est sanguis; Dein, cum exquisitissimi sit sensus, eorum qua nocitura sunt, ad-
monet.

TABV-

T A B V L A III. ET IV.

Venas cutaneas quæ secantur, & scarificantur, exhibent: altera quidem anteriores, altera vero posteriores: quæ maiori ex parte in plerisque hominibus eodem modo distribuuntur, præsertim illæ quæ inciduntur.

a. 1. 2. Iugularis externa colli latera scandens, sine periculo vix secari potest, cuius rami in collo scarificantur.

b. 1. 2. Bipartita huius venæ sectio.

c. 1. Iugul. externa ramus interior, oris & hyoidis musculos petens lingua substernitur, vbi secari solet.

d. 1. 2. Ramus externus ad occipitium.

e. 1. 2. Rami ad buccam & nasum pertingentes.

f. 1. 2. Vena frontis, quæ in media fronte, vbi secari solet, cum eiusdem venæ lateris alterius ramo, iungitur.

g. 2. Vena puppis.

h. 1. Vena per tempora, cui iungitur portio venæ frontis.

i. 1. 2. Vena quæ ad aures fertur, & occipitium irrigat.

k. 1. Ramus ab axillaris parte superna prodiens ad musculos colli posteriores.

l. 1. 2. Ramus à cephalica ad cutim & musculos brachium eleuantes: hic scarificatio fit.

m. m. 1. 2. Vena Cephalica seu externa, brachij exteriora neruo comitata perreptans, quæ ad tuber elatius cubiti flexuræ secatur, forte tutius paulo humilius, vbi à neruo deflectit.

n. 1. Venule ex Cephalica per cutim brachij dispersæ.

o. 2. Ramuli à vena capitis ad scapulam externam, cuius pars quedam inter carnem & cutim fertur.

p. 1. Cephalica hic tripartito diuiditur.


q. 1. Primus ad musculos à tuberculo externo humeri pronatos, abit.

r. 1. 2. At secundus ad cubiti flexum hepaticæ ramo y. notato iungitur, vtriusque coniunctio z. notatur.

s. 1. 2. Tertius oblique super radium & partem anteriorem brachij fertur, ramulos cuti largiens, quorum præcipuus ad flexuram cubiti extrinsecus, vbi ad carpum peruenit, venæ Hepaticæ iungitur (in fig. 2.) & paulo inferius variè diuisa totam fere manû nabit.*



- t. t. 1. Vena hepatica, basilica seu interna, quibusdam axillaris, quæ in sinistro lienaris vocatur.
- u. 1. Ramus ex hepatica bipartito diuisus, internam & externam cutim nutriens.
- x. 2. Ramulus ad musculos cubiti & cutim, quæ externa eius pars tegitur.
- y. 1. Hepatica ramus anterior ad cubiti flexum Cephalica r. notato iungitur medianam 3. notatam constituens.
- z. 1. Ramus hepatica retro latus ad brachii caput internum diuisus.
- * 2. A prædicto ramus brachiale petens ramulis sparsis, & ad carpum supra minimum digitum Cephalica ramo iungitur.
1. 2. 1. Venæ duæ cubiti anteriores ab hepatica ramo, quæ per manus interiora cum nervis excurrunt, & in exortu loco hepaticæ secantur.
3. 1. Mediana, siue communis ex Cephalica & Basilica ramis conflata.
4. 1. 2. Venæ communis supra carpum partitio, à 3. & 4. cubiti communis vena ex duobus ramis conflata, ad cubiti exteriora, mox posteriora, iuxta 4. sinistra manus ad externam sedem propagata, & vicinis venis commiscetur: hæc non secatur.
5. 2. Huius partitionis ramus externus, manus externam partem adiens, ad ipsius internam quoque partem ramulos mittit.
6. 6. 2. Venæ communis ramus, qui sub pollice pro cephalica inciditur.
7. 2. Vena saluatella, venæ communis & cephalicæ ramus, qui sub minimo digito pro cephalica vel lienari secatur.
8. 2. Vena inter medium & annularem, quæ quibusdam Syele Aui-cennæ.
9. 2. Ramus versus digitum medium.
- A. A. 2. Surculi prodeuntes à venis, quæ geniculatim iuxta lumbos producuntur, qui in lumbis sacrificantur.
- B. 1. Rami ab Epigastrica prodeuntes, & ad 4. Abdominis musculos distributi, cuius insignior ramus in sectione Herniæ sæpe vulneratur.
- C. C. 2. Vena ab externo ramo trunci caua prodeuntes per musculos, & cutim natium dispersæ.
- D. 1. Venæ per musculos pectorales & mammas distributæ.
- E. 1. Venæ mammas petentes à Mammaria prodeuntes.
- F. F. 1. Venule à substratis ramis emergentes thoracem adeuntes, è quibus præ-



præcipue scarificantur in scapulis.

- † † 1. Ventrem petentes venula à subiectorum musculorum venis progressa.
 G. 2. Ramus qui per pectoris latus fertur.
 H. 2. Vena humerum, musculos scapula & glandulas sub axillis petens.
 I I. 1. Vena cruralis interior iuxta inguina emergens, & sub cute ad pedem
 progrediens, cui neruus toto ductu præponitur.
 K K. 1. Prædicta vena ramus per femoris interiora inguina adiens.
 L. 1. Vena cutim, quæ femoris anteriorem partem tegit, perreptans.
 M M. 1. 2. Cruralis per interiorem & exteriorem femoris partem delata.
 N N. 1. 2. Tibiæ interior, quæ sub cute in multos ramos diuisa fertur: & his
 aperiri potest, quando sanguinem mittere volumus.
 O. 1. Prædicta ad interioris malleoli partem anteriorem abit, & in pedis su-
 periora exhauritur.
 P. 2. Ramus à crurali vena, ad coxendicem, eius loci musculos & cutim ve-
 nulas mittens.
 Q. 1. Ramus 7. & 9. tibiæ musculo & cuti femoris surculos largiens.
 R. S. 2. Ex duobus propaginibus iunctis vena musculos posteriores femoris &
 cutim sursum perreptat.
 T. 2. Vena Poplitæ, quæ maiore parte sub cute per Poplitæ fertur, & in
 V. 2. Suræ cutem numerosa sobole spargitur.
 X X. 1. Cruralis venæ interior ramus ad suræ musculos & cutim.
 Y. 1. Tibiæ vena interior per illius interiora ad pedem internum neruo co-
 mitante delata, quam sub genu loco Saphenæ secant.
 Z Z. 1. 2. Cruralis venæ portio ad interioris malleoli posteriorem sedem, seu
 vena malleoli Saphenæ dicta, quæ sub interno malleolo seca-
 tur.
 æ æ. 1. Cruralis venæ exterior ramus, seu Tibiæ venæ exterior per illius ex-
 ternas partes & pedis superiora diuarcata.
 þ. 1. 2. Dicti rami portio per malleolum externum repens.
 γ γ. 1. Epedis venis illa est, quæ ad Pollicem Cephalicæ nomine, non tamen
 satis tuto, cum neruum adiunctum habeat, secatur.

De Pinguedine.

CAPVT IV.

PINGVEDO, quæ *πικρὴ*^a Græcis, & inter cutim
& ^bmembranam carnosam in homine sternitur,
in brutis vero membranæ subiicitur, ex sanguinis
puri elaborati & absolute^d cocti portione oleosa^e te-
nuiore & aerea, è venis tenuioribus roris instar exsu-
dante generatur, quæ à calore^f moderato (nimium e-
nim exurens calor consumeret; nimium imbecil-
lus, non concoqueret) ac membranarum densitate
coalescit; quare animalia hyeme densa cute pingui-
ora euadere videmus.

Quæ membrana neruea, tenuissima, densissima ta-
men sub cute vniuersum corpus ambit, quo omne
id, quod oleosum in vapores attenuatum interiores
membranas præterlapsus est, huic impingens ad-
hæreat, & in pinguedinem vertatur, ne aliquid,
quod corpori utile esse posset, pereat, eo modo, quo
videmus in destillationibus fieri, vbi licet capitellum
sit calidissimum, ob eius tamen densitatem vapores
vi ignis sublatis, statim in aquam condensantur.
Albet cutim^g in omnibus animalibus, propter mem-

^aGaza vocem
πικρὴν apud
Arist. male a-
dipem vertit,
cū *σαρὶς* adips
sit, unde plerū-
que indifferē-
ter pinguedi-
nis & adipis
voce vtuntur.

^bArist. 3. hist.
an. 17. inter
carnem & cu-
tim, 2. gen. an.
4. sub cute. Ve-
sal. præter ho-
minem & por-
cum & ericiū,
aliud quadru-
pes non occur-
rit, quod inter
cutim & car-
nosam membra-
nam adipem
nanciscatur.

C 2

bra- c Materiare-

motissima sanguis, 3. hist. an. 16. d Aristotel. 3. hist. 19. 3. part. an. 1. gen. an. 18. & 19.
e Galen. 2. temper. 3. & 16. vs part. 2. f Arist. 2. part. 5. à calore *πικρὴν* & *σαρὶς* sunt
sanguis concoctus, & 3. part. 9. est finis probæ coctionis: secuti sunt Vega, Argenterius,
Iouertius & Archangelus. Galenus à frigido voluit. 1. temp. cap. ult. & 2. temp.
3. quod oleosum in sanguine, fluxileque & pingue est, vbi in frigidum venit locum,
cogitur: sequuntur Vesalius, Fallopius & Laurentius. Sed non frigidum intelligant
quod actus tale sit: nam ex eo cruditas, sed debilem calorem. Archangelus à sextu-
plo calore concoqui & concreescere asserit. 1. à calore insito in oleoso sanguinis vapo-
re. 2. à calore insito membranæ. 3. à calore influente à corde per arterias in membra-
nas. 4. à calore influente ab hepate per venas cum sanguine. 5. à calore per antiperi-
stasin cumulatæ à partib. circumiectis membranæ. 6. à calore à partibus vicinis, cor-
de, & core, musculis, in uiuo accepto. g Ridendi qui albam putant, quod aerea substā-
tia compos sit, cum osse, cartilagine, ligamento, & tendinibus, vix quid candidius oc-
currat, quibus nihil a quæ terrenum in corpore reperias. Vesal.

branas albas, quibus adiacet, à quibus sanguis allabēs leuiter alteratur; at in homine minus, quam in ceteris alba est, in quibus modo subflaua, modo albicans conspicitur.

Hac, vt partes, ita & ætates aliquæ destituuntur;

*h Sic in arti-
culorū fluxio-
nibus impedi-
mento fuisse-
t, in artub. dor-
spina, nisi in
extreme oba-
sis.*

*i Galen. 13. vs.
part*

partes enim, ^h quibus inutilis esse poterat commo-
dam complicationem & distensionem impediendo,
ea carent: vt sunt cerebri, palpebrarum, penis scroti,
testiumque membranæ: quare à continentium nu-
mero à quibusdam excluditur. Quibus vero adest,
duritie & mollitie variat: cum in iis partibus quæ va-
lentius ⁱ moueri debuere, durior, adipis instar fibris
& venulis intertexta, vt in vola manus, digitorum in-
ternis sedibus (cum ibi plures tendines, nerui, vasa-
que sint, quæ ea humectat, inania spatia replet, & me-
lioris apprehensionis causa cutim æqualem reddit)
& pedis planta, maxime calce, quo commodius imi-
tamur, nunc sola, nunc cum humore crasso & lento
(qui adipis munus explet) ad partes ad motum a-
ptiores reddendas, earumque exsiccationem prohi-
bendam.

*k Lib. 14. vs.
part.*

l 6. ad. anat. 6.

m Substantia

& locis differ-

re ostendit 3.

h. st. an. 17. sic

2. part. an. 5.

sanguinis ra-

tione differre

monet.

n Lib. 3. fac. a

lm. 1. & 4. ac

21 simplic.

o Gal. 1. temp.

ult. Sic 6. ad.

ana. 6. à calo-

re liquefit, à

frigidaute cō-

uertatur.

Aliis vero partibus mollior & subflaua: sic in ex-
ternis manus & pedis partibus pauca: in clunibus,
propter maiorem vsum, copiosa. In frigidis humidif-
que animalibus, vt homine porco, copiosior: quare
Galenus ^k mulierem viro obesiorem, & in iis, qui o-
tiosam ^l vitam agunt, abundat; calidis & siccis, vt si-
miis, canibus venatoriis, nulla aut exigua. Sic in mo-
do natis, nulla: in consumptis vel fame, vel morbo,
vel ætate, aut nulla, aut pauca reperitur.

Differunt autem *πιμελι*, pinguedo, quæ in cornu-
tis axungia, in porcis lardum dicitur, & *λεγαί*, adeps
seu seuum, docētibus Aristotele ^m & Galeno, ⁿ quod
pinguedo mollior sit & humidior, calore celeriter
liquefcet, nec facile vbi liquata fuerit, rursus con-
crescit.

crefcit ac cogitur. Adeps vero durior & ficcior non facile funditur liquefcitue, fed fufus celerrime coit & congelatur, ac propterea animantibus totam naturam terreftriorem habētibus prouenit, veluti humidioribus pinguedo. In homine pinguedo fub cute copiofa, quia ipfius materia à denfiore craffioreque cute retinetur, quod comprobant ea animalia, quæ corium denfum habēt, hæc enim plurimum pinguedinis habēt, vt ex terreftribus fus, ex aquatilibus delphinus. At adeps in omento, renibus, corde, oculis, offium articulis, inter latum tendinem & cutem media volæ manus, interioriq; digitorum regione, veluti etiam pedis, habetur.

Vfus; primo partes tuetur; fic in clunibus puluinaris vicem gerit: in aliis partibus ad rectum illarum collocationem & motionem facit: quare & mufculi in obæfis interius quoq; illinūtur: fic vafis quæ ad cutim feruntur, molli fua fubftantia fubfternūtur, quod tuto deducantur, & inungendo humectentur, ne exficcata diftendantur, vel nuda abrumpantur: quare & cæteris partibus, vbi vafa maiora per ipfas incedūt, accrefcit: Dein fpatia vacua inter mufculos, vafa, & cutim implet ficq; corpus æquale, molle, album, pulchrumque reddit. Tum veftis inftar ꝑ calefacit, caloremue natiuum fouet, fua vifciditate effluxum prohibendo, craffitie & denfitate meatus occludendo, ne frigus penetrare poffit: & æftiuo tempore calorem, quo minus penetret, inhibendo. Tandem, vt in inediis ꝑ in alimentum conuertatur, dum caloris innati pabulum fit: liquatus enim formam vaporis fanguinei rurfus cōcipit, in venas remigrat, & in inediis extremis in alimētum partium cedit. Sic adipis vfus eft, calidas & ficcas partes oblinire & humectare, vt cor: motum faciliorem reddere, & à ficcitate prohibere, vt circa articulos maiorum offium & quorundam li-

p Pinguedo calida & humida, Ar 2. part. an. 6. & 3. eiusd. 9. Gal. 2. fm. 19. & 20. 11. eiusd. ca. de pingue. Auer. 5. coll. 26. Archang. fex rationib. calidā probat, 1. auctoritate Aristot. & Galen. 2. à materia. 3. à caufa efficiente. 4. à dominio elementorum in eius compositione, quia aereus eft, cū per fuma aqua fluitet. ex. 2. gen. an. 2. & 2. par. an. 5. ab effectis, quia refoluit & difcutit. 6. à fymbole quod cum igne habet, cuius propria alimentum videtur. q Galen 4. v. part. 11.

a Primi A- gamentorum externa sede: cartilaginum quoque ex-
 bes membra- tremitates, quo minus exsiccentur, tueri.
 nā carnosam

appellarūt. A-
 uic. 3. cant.

b Panniculus
 neruosus Fal-
 lop. neruosus,
 aut adiposus,
 in homine: a-
 liis membra-
 nea generalis
 corporis.

c Curt: us &
 multi alij ne-
 gāt Galenum
 agnouisse, cum
 tamen memi-
 nerit 3. ad. a-
 nat. 2. & 5. e-
 iusd. 7. mēbra-
 nā vocat cuti
 continuam &
 6. meth. 4. cu-
 tis extrinsecus
 ante stat, hac
 vero in mem-
 branam finit.

d Gal. 3. ad. a-
 nat. 2.

e Sub ala mu-
 sculosam esse
 hāc membra-
 nam. Ga. 1. ad.
 an. & 5. eiusd.
 7. asserit. Ve-
 sal. errant qui
 pāniculū car-
 nosum octo ab-
 dominis mu-

De membrana seu Panniculo carnosio.

C A P V T V.

De hac membrana eiusque separatione egit Galenus 3. ad-
 min. anatom. 2. & 5. eiusd. 7.

M E M B R A N A carnosā ^a ὑμὴν σαρκώδης, vulgo
 panniculus ^b carnosus, cum sola inter mēbra-
 nas carnosā reperiatur, potissimum in brutis: Galeno
^c ὑμὴν, membrana dicitur; quibusdam musculus mē-
 braneus, quia in illis animalibus, quæ totam cutim
 mouent, fibris carnosis adeo conspergitur, vt muscu-
 lus videatur esse. Est autem membrana, ex semine, re-
 liquarum membranarum instar pronata: in homine
 pinguedini subiecta, at in simiis, canibus, ouibus cuti
 proxime subiacet; quæ vniuersum corpus ambit, &
 cuti mediantibus venis plurimis, arteriis paucissimis
 & neruorū ppaginibus, quæ per hāc ^d ad cutim pro-
 repunt, accedentibus fibris membraneis, pertinaci-
 ter connascitur: membranæ vero musculorum sub-
 iectæ per fibras ^d tenuiores adhæret. Et cum dorso
 firmissime cohæreat, inde oriri dicitur, quæ membra-
 næ similis est, & ad axillas progrediens in canibus &
 simiis carnosior ^e redditur: Verū in modo natis car-
 nem, ob sanguinis copiam, qua tota est perfusa: in ad-
 ultis vero ob continuam exsiccationem, membra-
 nam refert, ita tamen, vt in anteriore colli parte ac
 fronte fibris suis carnosis nectatur, vt ab eo vix sepa-
 rari possit; & musculo ^f lato ita adhæret, vt eum con-
 stituere credatur. In homine ^g excepta fronte, immo-
 bilis:

sculos esse contendunt, & cuti membranam subtendi insciantur. ^f Μυῶδες πλάγ-
 γος Ga. 4. adm. an. 4. dicit. vide inter musculos buccar. ^g Audio, ait Vesal. homines
 fuisse, qui in thoracis regione & alibi etiā in corpore cutim mouere voluerint: quib.
 procul dubio membrana hac similis equorū aliorumq; carnosis membranis cōiigit.

bilis: in brutis vero huius interuentu cutis mobilis redditur, præfertim in collo, cuius motu muscas^h abigunt: at inferiore parte, qua musculorum membranas tangit ob lentumⁱ humorem, quo & pleræque membranæ oblinuntur, lubrica, ne musculorum motum impediat: sensum habet exquisitum, ita vt si ab humore acri vellicetur, rigor causetur.

Vfus; vniuersum corpus ambire, integere & defendere: Et ne à continuo musculorum motu pinguedo lique scat, impedire: vasa etiam ad cutim^k abeuntia fulcire: cum inter cutim & hanc membranamⁱ ferantur, non solum capillares venæ, verum & eæ, è quibus sanguis mittitur, arteriæ item vna cum nervis: & denique cutis læsæ, cum sine^l carne non coeat, consolidationem iuuare. In brutis vero sua densitate & crassitie sanguineos vapores retinet, vt in sanguinem conuertantur, & cutim mobilem reddit.

h Sic Elephātem cutis corrugationem muscas interficere asserunt: sic equi ex huius motu equitem minus exercitatum deiciunt.

i Aristot. cuti tribuit. 2. gen. an. 6.

k Galen. 3. ad. an. 2.

l Arist. 3. hist. 11, ubicunque cutis per se, ac sine carne est, vulnerata non coit.

exhibet figuram hominis, cui Cutis cum suis Venis, pinguedine, & totâ membrana carnosâ adempta sunt, ea tantum parte carneâ mēbranâ excepta, quæ musculi naturâ induit, quatenus musculis commiscetur: quē admodum etiam fibrarum ductus in musculos inferantur, demonstrat.

- a. Musculus frontis. ξ. Producens: eius tendo ξ.
 b. Musculus temporalis. η. Musc. radicum supinans.
 c. Musc. claudens palpebram. θ. Musc. superior radium pronans.
 d. Alas nasi aperiens. ι. Brachium flectentium secundus cuius initium κ. & tendo λ.
 e. Pars anterior ossis iugalis. ο. Portio musc. quorum alter brachiali, alter pollicis tendines offert.
 f. Muscul. labri superioris nasum petēs π. Ex carne primi pollicis internodiū.
 g. Masseteris principium. ρ. Musc. brachiali insertus seq. adiacet.
 h. Latus musculos carnosâ constans membrana. σ. Musc. in duos sectus tendines, quorū vnus primo pollicis articulo: alter in
 i. k. Principium quod à clauicula mediatē oritur & à summo humero. sequentes inseritur.
 l. Quod per obliquum ascendit versus partem anteriorem vsque ad l. τ. Musc. primus femoris, initium υ & tendo φ. insertio χ.
 m. Musculus brachium attollens. ψ. Musc. secundi femoris finis.
 n. Musculus pectoralis. ω. Musc. tertii femoris finis.
 o. Membraneâ huius masculi pars, quæ nervosâ tenuitati primi abdom. 1. Sextus tibia princip. 2. membrano-
 musculi iungitur. sus fere solus 3.
 gg. Inferius: carnea eiusdem portio ex 4. Tibia musculus nonus.
 6. & 7. costa. 5. Tibia octauus.
 q. Eius insertio. 6. Femoris sexti & septimi portio.
 r. Brachium deorsum habēs musculus. 7. Glandule inguinum.
 s. Musc. obliq. descendens abdominis. 8. Femoris octauus. 9. Tibia secundus.
 t t t. Musc. ferrati maioris insertio. 11. Malleolus internus.
 uu. Linea alba ad q̄ cōcurrūt ambo ob 12. Pedis musc. sextus: ortus.
 liqui descēdētēs totū abdom. Legētēs. 13. Finis 14. 15. Pedis septimus.
 x. Penis cute denudatus. 16. Tendo musc. pollicem erigentis.
 y. Vasa seminaria. 17. Musc. quatuor digitos extendens.
 α. Testes carnosâ memb. inuoluti. 18. Pollicem abducens.
 β. Musc. anterior cubitum flectens. 19. Ligamentum transuersum.
 γ γ. Posterior cubitum flectentium. 21. Tendo noni musculi pedis.
 δ. Musculus cubitum extendens. 21. Primus. 22. Quartus pedē mouens.
 ε. Musc. bicornis brachiale extendens. 23. Tendo tertii musculi.
 ζ. Musc. latum summæ manus tēdinē. 24. Musc. tertii os. 4. digitorū flectēs.

LIB. I.

TAB. V.



Membrana musculorum propria.

CAPVT VI.

^a Nonnullis à
periostic.

^b Differentiā
inter mēbra-

nam & tūni-
cā explicauit.

^c ad. anat. 11.
7. eiusd. 2. &

4. vs. part. 9.
vide c. 27. lib.

similarium.

^c Lib. 6. ad. a-
nat. 4. & 4.

vs. part. 9. non
scrupulosū esse

debere monet.

^d Archangel.
mēbranas sen-

sus tactus in-
strumētis sta-

uit. Laur. ab
iis sensus par-

tium interna-
rum.

^a Hipp. lib. de
art. Galeno.

^b Cum caput
illis tenue, vē-

ter latius, cau-
da oblonga &

angusta, Co-
lumb.

^c Similitudo à
mure & lacer

ta & piscis mu-

sculi forma.
Vesal.

MEMBRANA, quæ musculorum propria est, aliarum membranarum instar tenuis, neruosa fibrosaue, à fibris neruosis ^a musculorum orta, musculis tenuissimis filamentis annectitur, quam membranam, non tunicam vocamus: quod enim extrinsecus partes ambit, monente Galeno ^b ὑμὴν & membrana proprie dicitur, quod nomen etiam ab essentia habet: tunicæ vero seu χιτὼν appellatio vasorū corporibus, & quidem ab vsu debetur: quamuis & Galenus ^c & cæteri Anatomici indifferenter & membranæ & tunicæ nomine vtatur, quemadmodum plenius explicauimus in membranarum historia in parte altera libri de partibus similaribus.

Vsus huius membranæ est musculos inuestire, circumscribere, & à cæteris partibus separare, & iisdem sensum ^d tactus præbere.

PARTES CONTINENTES
PROPRIÆ.*De Musculis in genere.*

CAPVT VII.

MVSCVLVS, qui maximam partem corporis constituit, Græcis ^a μῦς dicitur, vel quod horum aliqui forma murem ^b excoriatum imitetur: vel quod pisci, qui musculus vocatur, similes sint. Latinis etiam Lacertus, quod ^c Lacerto similis videatur, dicitur: at cum varia sit musculorum forma, tam quoad ventrem, quam tendinem, idcirco certa figura eis tribui non potest. Verum musculus considera-
ri po-

ri potest vel ratione partium ex quibus conflatur, vel ratione sui vsus. Ratione compositionis, Galenus dicitur aliquando caro ex simplici carne & villis cō-
 texta, aliquando neruosum e corpus carne permix-
 tum. Quare musculus pars est instrumentaria & dissi-
 milaris, ex fibris f spermaticis, carne, seu fibris carno-
 sis, venis, arteriis, neruis & g membrana propria con-
 flata. Instrumentariam partem esse, ipsius actio o-
 stendit, & Galenus h inter primi generis instrumen-
 ta, cum ex similaribus componatur, retulit: quare &
 dissimilariis est. Fibris constat spermaticis (quas alii
 ligamentorum fibras, alii villos vocant) quæ funda-
 menta sunt omnium corporis partium, vniufque
 sunt i generis. Caro fibrosa his, non tam ad robur &
 ad molem circumfunditur, vt fibrarum permixtio-
 nem & ruptionem impediat (quemadmodum fibræ
 spermaticæ seu ligamentales carnem ne dissoluatur,
 firmant & custodiunt, actionemque cum tendini-
 bus perfectiorem reddunt) suo infarctu, ne contra-
 ctus tendo à suo corpore secedat, prohibeat, & ne
 vasa & fibræ spermaticæ ligamenta e à k perpetuo
 motu exsiccentur, in l obesis etiam intercedente
 pinguedine, impediat: visceribus m & partibus in-
 ternis propugnaculo sit, quam vt caro hæc non sim-
 pliciter caro, sed caro fibrosa primaria n musculi pars
 sit (quemadmodum in visceribus caro præcipua eo-
 rum pars statuitur) & actionis motionisue (facul-
 tate simul per neruos influente) causa princeps:
 cum in reliquo corpore talem non reperias, cum
 sola facultatis motricis influxum recipere pos-
 sit; so-

sculi substantia. Aristot. 3. histor. an. caro præcipua pars cuiusque instrumenti Gal.
 12. v. part. 3. tendo primum motus instrumentum, & musculus illis gratia con-
 structus: Lil. de plenit. neruus princeps musculi pars: quare 8. ad an. musculus com-
 mune, vt si nerui laedantur, totius statim musculi motus pereat. Vesalius, caro mul-
 tularum præcipuus auctor, cuius beneficio muscul. crassior redditus, sese breuiat &
 colligit, & partem mouet, & laxatus remittit.

d In art. med.
 c Lib. desin.
 medic.

f Artu med.

s. 6. v. part. 3.

10. eiusd. 9. 1.

ad. ana. 4. hæc

filamenta in

musculis ca-

teripraterie-

re, Archang.

g Galen. 1. v.

part. 8.

h Gal. de diff.

morb. 4. vide

& 1. clem. 9. 1.

meth. 6. & lib.

de similarib.

part. 1. c. 25.

i Galen. 6. v.

part. 8.

k Alexand.

l Carni mu-

sculorum nul-

lam adipem

intexi omnes

hactenus fal-

so prodiderunt

Vesal.

m Gal. 12. v.

part. 3.

n Galen. lib.

artis medica

caro fibrosa

propria mu-

o Gale. plures
facit carnis
species, 1. nat.
faculi. 6. 7.
adm. an. &
com 6. in Epi-
dem.

p Gal. 10. me-
rhod. 5. loc. af-
fect. art. med.
39.

q In arte med.
r Lib. de arte
quatuor pars-
es carnem in
orbem circū-
sitam habent,
quam muscu-
lum vocat, ha-
omnes et rem
habent. 4. A
phor 16. & 2.
de fractur. Ve
sal. nulli in v
niuerso corpo-
re similes p.
264. at Lau-
rentio p. 122.
huius generis
gingiuarū ca-
ro & quape-
nes glandem
constituit.

f Galen. 6. ad.
an. 11.

t Arist. 3. hist.
an.

u Gale. 1. nat.
facul. 6.

x Li. 10 meth.
ult. in solidis
partib. substā-

fit; sola etiam sese colligat, & remittat partem, quam trahit. Nulla enim pars seipsam mouere potest, nisi fibrosa sit & carnea, qualis est musculi caro. Quare vi- scera licet carnosae sint, cum tamen eorum caro non sit fibrosa, seipsa non mouent: sic etiam membranae & membrana carnosae ubi neruosa est, seipsas non mo- uent, quia fibrae illarum non sunt carnosae, quales sunt musculorum fibrae. Quare beneficione fibra- rum attractio, retentio & expulsio fiat, dubitatur: exempli gratia, venae attrahunt, retinent & expellunt quidem, verum hoc per fibras non faciunt, cum se non moueant, sed id quiescentes faciunt similitudi- nis vel dissimilitudinis ratione, veluti magnes facit, vt eleganter Fallopius.

Est enim caro^o quadruplex: prima est caro pro- prie dicta, p musculi interior pars mollis & rubicun- da, ex sanguine mediocriter resiccato genita, quam Galenus q saepe carnem fibrosam, propriamque mu- sculi substantiam vocat: quare etiam apud Hippo- cratem r aliquando caro idem est, quod musculus, cū eius praecipua pars sit. Dein caro est viscerum, quam similem & simplicem dixit Galenus: f Erasistratus παρέρχουσα, affusionem sanguinis vocauit: quae pro- pria est viscerum substantia & insensibilis est: quare insitam tantum, non influentem facultatem habere Galenus auctor est: haec viscerum vasa firmat, spatia inania opplet, & actionem t edit. Tum caro u est cui- libet parti peculiaris, quam carnosam substantiam Galenus x appellare solet. Piccolhomineus y nouam partem similem facit; qualis est in oesophago, ven- triculo, intestinis, vtero, vesicis conspicua, quae mem- branarum calorem fouet & auget. Quarto est caro glandularum, haec vasorum diuisionibus firmandis, quare mollis, apponitur, vt circa venam portam, pā- creas:
tia triplex, inώδης, υμενώδης & σπερνώδης, qua villos facit. y Vide c. 21. de par. simil.

creas:venas mesariacas,mesenterii glandulę:circa diuisionem cauæ in iugulo, thymus:sic in ceruice vbi iugulares, in axillis vbi axillares, in inguinibus vbi crurales in varios ramos diuiduntur, Humores ^z superfluos,vnde spongiosæ & raræ,ad se alliciunt,ne in nobiliores partes ruât; quare & trium partium principum superuacanea excipiunt,vnde vulgo emunctoria dicuntur; hæ enim intumescences ^{aa} visceris prauam dispositionem indicant. Quasdam quoque partes suo humore rigant,ne exiccatae ad motum ineptæ reddantur, vt sunt, quæ ad Laryngem & linguam, saliuam generant: sic quæ in oculorum angulis,eorum motum iuuant.Hęc breuiter de carnis generibus,redeamus ad musculum.

z Consule libellum Hippocr. de glandulis.

aa Hippocr. de Epid. sec. 2. Gal. 13. Meth.

Venas, omnes musculi habent, tanquam canales, vt alimentum aduchant. Arterias quoque, vt calorem eorum insitum perpetuo suo motu custodiant, vitalique calore illustrent. Nervos, qui sensum deferant, cum nulla ^{bb} ex seipsa sensum habeat; præsertim vero virtutem motiuam cum musculis ^{cc} à cerebro per nervos motus accedat, & sine his motio fieri non possit: siquidem his sectis, obstructis, aliterue læsis, motus pereat: Quare omnis ^{dd} musculus suum habet neruum, aliqui duos, vt diaphragma: aliqui plures, vt temporalis, qui quinque nervorum propagines recipit: hicque aliis in caput, aliis circa medium: & rursus in aliis per musculi superficiem, in aliis per musculi substantiam disseminatur.

bb Gale. 1. v. f. part. 8.

cc Gal. 1. motu musculi.

dd Velal. pag.

262. dicit aliquos musculos

nervus, vena,

& arteria continere: quem re-

prehendunt Columb.

& Fallopiu.

et Siceria Archag & Laur.

ff Gale. 1. v. f.

par. 9 κτ' αἰρεσιν κινῆσιν ὁργανὰ πᾶσι κινῆσιν ἢ φύσιν τῆς μεν

hoc

Membrana circumiicitur, vt musculum tegendo contineat, alterum ab altero distinguat, & à vicinis partibus separet, sensumque ^{ee} tactus præbeat.

Ratione vero vsus; Musculus pars est ^{ff} corporis organica, motus voluntarii instrumentum: vel est instrumentum eius motus qui secundum impetum sit:

hoc

ꝑꝑ Galen. 1. de
 motu muscul.
 ἀπὸ τοῦ κινήσε-
 ως τῆς κατὰ τὴν ὀ-
 πῆν οἱ μῦες ἐ-
 αῖν: Sic ἔσ. 1.
 v. par. 10. Ar-
 chag. vult pri-
 mā definitio-
 nem tā. ū ha-
 manis muscu-
 li: alteram ἔ-
 humanis ἔ-
 brutorū com-
 petere, volun-
 tatē duplicem
 esse, aliam ἔ-
 ἀπὸ τοῦ ἐπεστῆναι, α-
 λῆαν ἔ-
 ἀπὸ τοῦ ὄρεσθαι: prior
 vigilantium,
 posterior dor-
 miētū. ἔ-
 q̄d minus at-
 tēte facientū,
 Aristot. vocat
 ἐνὲννοον, spon-
 tανῆν. Motus
 spontaneus in
 brutis est, non
 α. volū: artus:
 in homine ve-
 ro motus est ἔ-
 spontaneus ἔ-
 voluntarius.
 Per spontaneū
 intelligētiū est
 principium in-
 trinsecum cō-

hoc est, ꝑꝑ ab interno principio, appetente scilicet fa-
 cultate. Galenus aliquando voluntarium, sæpe ani-
 malem vocat, vt à naturali distinguat: siquidem vo-
 luntarium hunc motum excitare possumus, frequē-
 tiorē & tardiorē facere, vel penitus sedare. Cuius
 motus instrumenta sunt cerebrum, nerui & muscu-
 lus: Cerebrum imperat, vbi an fugiendum, an perse-
 quendum diiudicauerit: neruus, impetum & faculta-
 tem mouendi defert: musculus, spiritibus animalib.
 illustratus obtemperat, & partē pro voluntatis impe-
 rio mouet: & quemadmodum eques^{h h} habenarum
 motu equū impellit, ita vis animę cerebro insita, ner-
 uis quasi habenis musculos mouet. Voluntas^{h h} enim
 similis est equiti, nerui habenis, & equus musculis.
 Musculus, eo quo diximus modo ex similarib. com-
 positus, in tres dissimilares partes diuidi solet, in
 principium, medium & finem.

Principium est, quod caputⁱⁱ musculi dicitur, & ex
 ligamentis, quę ab ossē oriri creduntur, generatur: si-
 quidem musculi pleriq; ab ossibus nascantur, ^{kk} & in
 ossa implantentur, iisque contractis vel remissis, ossa
 in articulis flectuntur vel extenduntur: nonnulli ta-
 men à cartilaginibus, alii à membranis oriuntur, & in
 eas desinunt. Quod in aliis, sed rarius, carnosum,^{ll} in
 aliis, & sæpius neruosum, in aliis mēbranolum, in aliis
 oblōgum, vel breuius, crassius vel tenuius est: nec pe-
 nitus sensu caret, cum in id sæpe neruus inseratur, &
 membrana vestiatur. Medium quod vētrem seu cor-
 pus nominant, tota fere carnosā, & tumēs pars est, &
 maiorem musculi molem constituit. Finis, qui cauda
 & ^{δορυφόρος}, quasi eneruatio, quod tota fere sit
 ner-

mouēdarū partium: hoc α. principium intrinsecū 'uplex est cognitio ἔ- appetitio, q̄
 duo in brutis sunt cognitio sensitiua, ἔ- appetitio sensitiua: p̄ter has in homine est et
 cognitio intellectiua, ἔ- appetitio intellectu. q̄ dicitur volūtas, hac Arch. p. 65. h h G.
 de caus. resp. ii Ga. 1. mot. mus. 2. ^{kk} Col. dicit quibusdā musculis tēdine in exortu cū
 carne misceri. ^{ll} Arch. principū neruosum, tēdinosum, mēbranof. nō raro carnosum:

*nū, non verò Gracū, sunt quidā tendines sine sensu. pp Gal. in arte med. Oribas. Aug-
gen lib. g. c. 2. de sangu. missione. Fallop. puncto tendine fieri cōvulsionem tradit, lib.
de partib. similar. c. 10. qq Cal. 1. mot. musc. 1. hoc de tendine dixit, non vero de toto
musc. ut Vesal Galenū reprehendendo cēsuit. 2. reprehendit Vesal. Galen. quasi vo-
luerit tendinē ex media portione nervi & media ligamenti fieri: cum Gal. plus dicat
de ligamento quā nervo concurrere. r r Gal 1. mot. musc. c. 3. at it. vs part. 5. omnes
dixit in tendinem desinere: quare Vesal. eum reprehendit: verum. Gale. de iis loqui-
tur, qui ossa movēt. si Gal. 1. mot. musc. 1. c. t Omnes dixit Gal Vesal. innumeris mu-
scul. tēne carēt, illi tānū habēt, q lōgo ductu ferūtur. Collū. nō cēs musc. intēdines de-
finiūt. Idē Fallu. &. Laur. At de musc. ossa movētib. Sic Falloj. nō sunt 3. aut 4. q ossa
movēt, q non habeāt chordas: sicut mī musc. quare primo sen etia non solanda.*

tereti, modo lato, modo longo, modo breui, modo vno vel duobus vel plurimis, vt in longissimo dorsi musculo & thoracis quinto (sic nonnulli perforati sunt) inferuntur: at non in ossium articulum, nec in ossium fines, vnde oriuntur, sed vt plurimum in caput ossis mouendi illud inuoluendo infiguntur. Qui vero aliud quam os mouent horum quibusdam sunt tendines, quibusdam vero non: aliud autem quam os mouent, muscoli oculorum, lingue, laryngis, testium & penis: ex quibus oculorum muscoli membraneas habent aponeuroses: penis autem & testium, carneis ipsorum particulis innascuntur: qui vero in faucibus, vt sunt lingue & laryngis, quidam tendines habent, quidam vero non. Sic quibusdam in medio tēdo est, vt in quarto maxillā inferiorem aperiente, & secundo pari ossis hyoidis: paucis statim ab exortu cum carne quasi mistus descendit.

Hacque ratione musculus primum & immediatum motus voluntarii spontaneiue est instrumentum.

Variant quoque muscoli ratione substantiæ, quantitatis, qualitatis, situs, ortus, implantationis & vsus, cum eorum adeo magna ^{ff} sit multitudo, vt eos, ne numerare quidem facile sit: partim, quia natura ^{ff} ita inter sese coalescunt, vt vnus videatur: partim, quia alii ex vno plures, vel ex pluribus vnum faciunt: attamen, quot sunt motus voluntarii in corpore humano, loco & tempore distincti, totidem ad minus sunt musculi suis terminis definiti.

Musculorum autem omnium actio est motio, quæ duplex est: primaria ipsius versus ^{tt} suum principium contractio, versus quod simul membrum, in quod insertus est, trahitur, quam oppositi ^{uu} musculi relaxatio sequitur. Secundaria est illius relaxatio, quam oppositi musculi contractio comitatur: quod in musculis

^{tt} Gal. 10. vs.
part. 9. & 11.
eius. 4.
^{uu} Gal. 1. mor.
tu. muscul. 11.
vs. part. 8.

sculis manus & pedes maxime conspicitur : singuli namque musculi x x singulos habent & simplices motus.

Sed de his omnibus acturi sumus in Libro tertio vniuersalis nostræ Anatomies, in quo partes similes sanguineas, hoc est, carnem eiusque genera, & mixtas siue cutim explicabimus.

xx Gale. 6. vs.
part. 8. & 11.
eiusd. 9. 12. 6.
eiusd. 8.

De Musculis decem abdominis.

C A P V T VIII.

Musculorum Epigastrii historiam Galenus, qui vtrinque quatuor constituit. lib. de dissect. muscu. proposuit, & cur octo debuerint esse, nec plures nec pauciores ex fibrarum positione ostendit, 5. de vsu part. 14. & 15. At 5. administ. anat. 6. & 7. administrationem duplicem docet: quare ibidem & lib. de dissect. musc. 26. eorundem verum situm exponit, quemadmodum & 6. method. meden. 4. At 5. loc. aff. 6. modum explorandi abdominis tumoris aperit, quare rectos primo loco posuit, tanquam eos, qui in medio sint abdominis, vt 6. method. 4. loquitur.

INFERIOREM ventrem obtegent musculi decem, vtrinque a quinque, abdominis musculi dicti, qui hoc ordine b siti sunt, vt primi occurrant oblique descendentes duo, & totidem ascendentes, qui obliqui externi & interni forte rectius nominarentur: dein pyramidales duo, recti duo, & vltimo transversi duo; sic à fibrarum ductu denominati, quibus se mutuo, tum recta, tum oblique intercussatim secant.

a Anatomici
pleriq; vtrinque
quatuor statuunt, Galenus
secuti, qui
5. adm. anat.
7. ait: πρώτων
τῶν μεγίστων,
& λοξῶν μὲν
τῶν ὑπεραντι-
ων, τοῖς λοξῶν,
πρίτων τῶν

D

Obli-

ὑπερείων, & τετέλετω, τῶν ἐννεοσπίων. Vesal. octonario comprehendit, & Columb. octo tantum esse contendit, addens, vanum esse dicere decem esse. Fallop. vtrinque, quinque esse asserit: Subscribunt Picolhomin. & Laurent. b Situs ratio à fasciis desumitur: 9 transversa & profundiores fascia magis premūt, minus recta, minimum obliqua.

ē Transuersa-
les superiores,
Mūlino: trās-
uerſi, Zerbo.

Quod fibra
ſu, erne obli-
que deſcende-
re ſtauantur.

Gal. diff mu-
ſcul. 26. & 5.
ad an. 6.

Volunt Ve-
ſal. Col. Fallo.

Archæ & c.
ex 6. 7. 8. 9. co-
ſtu, antequā

in cartilagineſ
deſinant, & à

tribus inferio-
rib. coſtis prin-
cipio carnoſo,

ſed tenui oriri,
ſenſim carnoſoſ
reddi, &

membranoſo
principio à

trāſuerſis pro-
ceſſibus ver-

tebrarum lū-
borum & c.

Veſalius &
Fallo. in os pu-

bis implantari
volent, quod

Colūm. repre-
hendit, ſiqui-

dem hos os nō

moueatur, ſicque munere ſuo fungi non potuiſſet.

h Diſſ muſc. 26. per quod cre-
maſter teſticulorum, vaſa ſpermatita & peritonei productio pertranſit.

i Secundus thoracis
muſculus, Veſal. Columb. Fallop. k Galen. s. ad. ana. 6

l Quartus thoracis
muſculus, Veſal. Fallop. at quartus. Col. m Brachii primus Veſal. Columb. Fallop.

n In nerueſas membranas deſcendere dicit, Gal. s. loc. aff. 6. mem raneum & vali-
dum tendinem s. ad. an. o. membranoſas tendines dicitur uſque ad diſſ. muſc. 26. o Gal.

diſſ. muſc. 26. p Linea quadam diuidens & albica s. diſſ. muſc. 26. & s. ad. an. 7.

Oblique ē deſcendentes ſeu obliqui externi [t. 6. AB.] ab obliquis fibris [t. 6. II.] ſic dicti in lateribus ſi-
ti: figura ſunt triquetra, & inter abdominis muſculos
maximi ē & latiffimi: hi carnoſi f ab oſſis ilii [t. 6. f.]
ſummitate, quo firmiores ſint, neruoſi à s pubis [t. 6.
g.] oſſe, vbi perforati h ſunt, & membranofi à mem-
brana ē ligamentis vertebrarum lumborum enata
prodeuntes ſurſum abeunt, partimque carnoſi ſe-
ptem, nonnunquam octo coſtis inferioribus, ante-
quam in cartilagineſ deſinant, adnaſcuntur (non ve-
ro inde ortum ducunt, cum potius ſurſum ferantur,
quā quod deſcendant: cum enim hi inſpirationi
thoraciſque dilatationi omnium ſententia inſerui-
ant, in thoracem inferi debuere, cum axioma ſit, o-
mnem muſculum trahere ad ſuum principium) &
Serrato i maiori [t. 6. e. e. t. 7. p. t. 8. O O O.] ad ſextam, ſe-
ptimam, octauam & nonam coſtam ceu k digitis [t.
6. b. b.] quibuſdam, quemadmodum & Serrato l poſti-
co inferiori, ad tres infimas coſtas inſeruntur: non-
nunquam neruoſa exilitate Pectorali m iunguntur:
partim lato [t. 6. C C.] neruoſo n membraneoque ten-
dine ad anteriora ferūtur, & in abdominis medio ad
lineam [t. 6. d d d.] candidam ita cocunt, vt ſimul velat
o tunicam vniuerſo abdomini obductam efforment,
qui inferioribus quoque tenacis glutinis interuentu
committuntur.

Linea Phæc candida [d d d. tab. 7. e. e. tab. 8. E E.] in
abdominis eſt medio, ex concurſu tendinum muſcu-
lorum abdominis (rectorum exceptis) genita; cū ob-
liquo-

liquo-

liquorum tendines ita arcte vniuntur, vt vnus tendo
videatur, & obliquorum inferiorum tendines trans-
uerforum tendinibus, vbi recti à se inuicem secedūt,
adnascantur, in quam & Pyramidales implantantur;
hæc à mucronata cartilagine neruosa ad ossium pu-
bis commissuram procedens supra vmbilicum latior,
infra vero angustior est; estque alba q̄ cum nulla caro
illi subiaceat, eius^r vsus musculos omnes tanquam
communi termino continere, quo dextri in dextris
& sinistri in sinistris remaneant; cui nonnunquam
pinguedo adiacet.

Oblique^r ascendentes [t. 6. D. t. 7. i. ab abdomine refle-
xus] seu obliqui interni, qui illos decussatim in speciem
χ^r literæ [t. 6. I H.] suis fibris obliquis ascenden-
tibus interfecant, mediam abdominis partem occu-
pant, & figura sunt triquetra ab ossis ilii appendice^u
carnosi, & à membrana prædicta, & ossis sacri spinis
membranosi orti carnosus fibris aduæti ilia tegentes
sursum tendunt, & quatuor, * inferiorum costarum
cartilaginibus carnosus nectuntur, qui ad abdominis
priora delati, in latum, neruosum membranosumq;
tendinem desinunt: qui vbi rectis [t. 7. h.] musculis
occurrit in duos tendines scinditur, quorum y alter
supra rectum fertur, alter infra eum incedit (cuius
nomine Galen.^z rectos musculos nullo externo mu-
sculo tegi, carnem intelligens, scriptum reliquit) vt
hoc complexu recti propter eorum lōgitudinem ro-
bustiores & tutiores à fractione reddantur, & vt in
medio trium musculorum constituentur, vbi non, vt
prius musculum membranæ modo obducunt, sed i-
ta rectorum intersectionibus adherescunt, vt ab ipsis
tendo, difficilime auelli queat, quos prætergressi, ite-
rum coeunt, arcte vniuntur, & vniati ad lineam al-
bam [t. 7. e. e.] quasi alteram membranam consti-
tutes abeunt, & superne mucronatæ, cartilagini, infer-

q̄ Gal. ad a-
nat. 7.

r Vide Gale. 5.
v. s. part. 14.

Subcontrarii
obliqui Gal. 5.
ad an. 7. tras-
uersales inte-
riores, Mundi-
no.

r Galen. 5. v. s.
part. 4.

u Dissect. mu-
scul. 26.

x Ga. 3. ad. an.
6. Col. inferio-
rib. costis. Ar-
chang. 12. &

11. costa carno
si copulantur

q̄ lato tendi-
ne 10. 9. 8. costa

in parte carti-
laginosa ne-
ctuntur.

y Meminit G.
diff. muscul. 26.

z Gal. 5. ad an. 7.

2 Vides loc.
aff. 6. vbi mu-
sculi nomine

carnem intelle-
xit, tanquam

præcipuam mu-
sculi partem:

quare eo loci

q̄ Rectos Pri-
mos dicit, &

tange id ma-
xime conspi-
cuos: pendens

modū explorā-
di abulminis

di abulminis


D 2

ne pau-

TABULA VI.

*Ventris inferioris musculos omnes proponit, à si-
nistris quidem obliquos: à dextris, pyra-
midalem, rectum & trans-
uersum.*

LIB. I. TAB. VI.



aa Pleriq; vo-
lunt pubis ossi
inseri.

bb Columbus
intestina pre-
mere, inferio-
ra thoracis cō-
stringere ex
septo auxili-
um ferre vult.

Archangelus
thoracem cō-
stringere ne-
gat, quia in
thorace na-
scentur, mu-
sculos autem

non mouere id
unde orian-
tur, sed id, in
quod inserun-
tur: dein quia

à partibus
essent costarū
oriuntur, qua
cum firma sint
moueri non
possunt.

ccc Massa pri-
mū meminit:
Sylvio succen-
turiati: Mu-

ne paulo aa infra vmbilicum concurrunt; superior
vero tendo ossibus [g.] pubis inseritur.

Hi quatuor venas & arterias habent à vena & ar-
teria muscula, iuxta lumbos enata, quæ per abdomi-
nis & peritonæi regionem disseminantur. Nerubs ab
extremis thoracis vertebra recipiūt, qui iuxta fibra-
rum ductus inseruntur.

Vfus proprius illorum quidem simul agentium,
& superiorem & bb lateralem; horum vero inferio-
rem & lateralem inferioris ventris partem, non to-
tam, cum tendines paulo infra vmbilicum subsistant,
sed ad pubem vsque vtrinque oblique comprimere,
cum in cartilaginofas & mobiles costarum partes in-
ferantur.

Pyramidales cc à forma dicti, ab externo pubis
osse [t. 6. F. t. 7. g.] principio carnofo, non admodum
lato, prodeuntes Pyramidis instar iuncti (rarius pe-
nitus vniti, vt vnum musculum constituent) capita
rectorum, à quibus peculiari membrana & dissimi-
libus fibris distinguuntur, obliquo fibrarum ductu
conscendentes in lineam albam, nunquam in rectos,
suo tendine, sed longitudine impares, vix quatuor
digitos transuersos æquantes, acuti desinunt. Quo-
rum vfus, vesicæ compressioni inferuire; nam si ho-
rum vnus agat, lineam albam deorsum oblique, & si
ambo

fouli vesicæ compressioni inferuientes Fallopio musculi parui obliqui, Archange-
lo: aliis Fallopiani: Vesalius & Andernacus superius rectorum musculorum prin-
cipium faciunt: Columbus carnosum rectorum principium vocat & negat muscu-
los esse distinctos contra Fallopiū distinctos esse sex rationibus astruit: quas & Ar-
changelus approbat: Primo, quia peculiari membrana circumscribuntur: Secundo,
qui huius fibra cum rectis non commiscetur: Tercio, quia fibras à rectis dissimi-
les obtinent. Quarto, quia semper in mediam lineam albam desinant. Quinto,
ab effectu, siq; dem vesicam dum leuiter mingimus, icuius oblique ad pubem com-
primant, cum obliqui ascendentes, id prestare nō possint. Sexto, quod ipse & alij plu-
res in seipsis hoc agnoscant. At Laurentius accedunt aliquando in viris & mulie-
ribus parui duo triangulares, quos Succenturiatos vocant, quasi maioribus epe-
m ferentes. Sunt autē idē Saluz, quia pubi obtenduntur appellare malunt.

ambo simul agāt, recta trahendo pubis partem (hinc quibusdam *in prælois dicti*) & vesicam subiectam, dum leuiter mingimus, comprimunt; violentis enim expressionibus vna cum his cæteri abdominis muscoli inferuiunt, ipsum totum & vna vesicam comprimētes; tum enim manifeste abdomen ad inferiora contrahi sentimus; quare hi muscoli oblique ascendētib; in subsidium veniunt (forte & descendētib; & transuersis eandem ob causam auxilio sunt, ita vt recte Succenturiatorum nomen ipsis tribuatur.) Quando enim absunt ^{dd} pyramidales (quod rarum est) tunc oblique ascendentes non primum ab appendice ossis ilii, sed inferius à ligamēto valido, quod ab appendice dicta ad ossa pubis percurrit, oriuntur: & tunc ii oblique deorsum comprimunt ea, quæ sub pube sunt, vt vesicam vrinariam: si vero adsint, tunc oblique ascendentes altiore regionem habent.

Verum & rectorum capitibus robur ^{ee} addere, vel nec collidantur, propugnaculi loco esse videntur: rectorum enim principium alterum non est, vt quidam opinati sunt: si enim leuiter mingamus, nec inspiratio, nec expiratio impeditur, quod fieret, si rectorum partes essent: siquidem rectis contractis, thorax etiam comprimitur: quare dum musculis contractis excernere volumus, inspirare non possumus, donec musculorum intensiōem remittamus.

^{ff} Recti [t. 6. EE. t. 7. a. t. 8. dependent & II. notantur,]

D 4

qui est: quando

tamen adest, pro musculo habetur, & suum munus obit. Columbus addit, non inferuire erectioni penis, quia illi non adherent: quod si iis penis sursum trahendus, & vulua sursum traheretur, Fallopius scribit, se hoc nunquam dixisse. ^c Quemadmodum tertius pedis musculus, qui adeo parvus est, nihilominus primo, secundo & quarto, qui maximi sunt, auxilio est. ^{ff} Longi seu recti, Carpo.

^{dd} Fallopius
asserit sibi nu-
quam datum
corpus in quo
desuerint. Et
si Columbus
ex eo probare
velit non esse
musculos, q̄ in
aliquibus non
reperiuntur,
qui sane hac
actione priua-
ti essent. Resp.
Fallopius &
Archangelus,
si pratermissi
sint, non id-
circo non esse
musculos,
quia palmaris


aliquando
quoque de-
est: quando

TABVLA VII.

*Ventris inferioris musculos rectos pyramidales
& transuersos, solis obliquis remotis,
exhibet.*

LIBI.

TAB. VII



gg Columbo qui à fibris rectis, & quod gg secundum corporis re-
 Archange- ctitudinem sint locati, nomen habent, & sub obli-
 lo. quorum neruosis tenuitatibus positi, & quibusdam

hh Columbo scuntur) ab anteriore ^{h^h} & superiore [t. 7. bb. t. 8.]
 ut plurimum offis pubis parte (non ab osse pectoris, quia pubis, i-
 duo principia lium & coxendicis ossa non mouentur) neruosi or-
 habes, neruo- ti, mox carnosii reddituri ventrem conscendentes circa
 sum alterum, vmbilicum ⁱⁱ quasi vniri [t. 7. f.] videntur, cum in ex-
 alterum car- ortu sunt proximi: quanto vero altius ascendunt tã-
 nosum, quan- to magis seiunguntur, [t. 7. ee.] latioresque reddun-
 doque unum tur, & ad offis pectoris latera ^{kk} vltimarum costarum
 solum carnei: verarum cartilaginibus sine ^{ll} carnosio & amplo [t. 7.
 intelligit Py c c.] adnascuntur: suntque carnosii & validi, vt ante-
 ramidales. Ve riora abdominis comprimant. In canibus vero & si-
 salio duplex miis, cum thorace sint longiore, hisce tendo mem-
 principium, v braneus continuatur, qui secundum pectoris longi-
 num superius tudinem exporrigitur, & ad primæ & secundæ co-
 internum, al- stæ interuallum carnosior redditus in primam co-
 zerum inferi- stam ^{mm} definit. Hi tres, rarius quatuor neruosas &
 us & exter- transfueras ⁿⁿ interfectiones [t. 6. char. 1. 2. 3. tabul. 7.
 num. ddd.] quasi internodia acceperunt. (Ita vt rectorum

ii Gal. 5. ad. a- singuli in plures musculos diuisi videantur, cum fi-
 nat. 6. & 7. bra non penitus rectæ sursum ferantur, sed ad has
 kk Gale. 5. vf. circumscriptiones obliquentur) quæ membranæ
 part. 14. 5. ad. sunt solidæ & firmæ, quarum vna sub vmbilico, duæ
 an. 6. 6. meth. vero, aliquando etiam tres supra consistunt, quæ par-
 4. 5. loc aff. 6. tim
 & de dissect. sunt
 musc. 26. hinc
 eos oriri volu-
 it, & ad pubis
 ossa deferri:

quem multi secuti sunt, vt Mundinus, de Zerbis, Carpus, Curtius, VVillichius &c.

ll Hinc tendinum experces dicunt Columbus & Archangelus. mm Sic Galen. de
 dissect. muscul. 26. rectorum vertex, tendo membranofus, ad thoracis principium
 ascendens, quod dissectionis Professores latuit, quia pectoris musculi ipsi incum-
 bunt. nn A Galeno non puto notatas has circumscriptiones, impressiones, de-
 lineamenta, siue aponeuroses, inscriptiones transversas, licet in simiis reperiantur.
 Columbus tres: Vesalius aliquando quatuor obseruauit.

tim ad eorum ^{o o} robur, cum validis actionibus sint ^{o o} *Sicut fi-*
 præfecti, potissimum in violenta expiratione: par- *lum quoa plu-*
 tim vt obliquati secundum orbicularem abdominis *ra habet in-*
 figuram, apposite peritonæum, obliquorum ascen- *ternodia, non*
 dentium tendinibus connexi (ne in profundum ad- *ita facile in-*
 modum contrahantur, & venter magis sphæricus *pitur, vt is*
 relinquatur) simul premunt. *destitutum.*

Venas habent, quas recurrentes vocamus, & arte- ^{pp} *Paulo su-*
 rias ab Epigastrica [t. 8. II. fig. 2. b.] (à qua & rami ad v- *pra umbili-*
 teri ceruicem mittuntur) in plures furculos, pro eo- *cum, hinc con-*
 rum nutritione & vita diuisas; quæ sub his sursum *sensus vteri*
 delatæ cum Mammariis internis [t. 8. K. K. figur. 2. a.] *cum mammis*
 quæ sub pectoris osse descendunt, circa [t. 8. figur. *Archangelus:*
 2. cc.] vmbilicum per Anastomoses ^{q q} seu extre- *circa hypochō-*
 mis ^{rr} iunguntur, quo fit vteri ^{ff} cum mammis, & ab- *dria in sum-*
 dominis cum ^{tt} naribus ratione vnionis, quæ per ex- *ma rectorum*
 ternas fit, consensus; Augetur consensus hic vteri *vteri cum mā-*
 cum mammis, per venas internas axillarem nimirum *mis, Fallippius*
 ramum, qui ad mammas abit & hypogastricæ ramos, *in medio mu-*
 qui ad vterum distribuuntur. Nervos habent ali- *sculi, quod cir-*
 quando quatuor, maxime circa medium ab extre- *ca vmbilicum*
 mis thoracis vertebris prodeuntes, ad eorum im- *est, sepe in re-*
 pressionem. Rectorum vsus proprius inferioris ven- *cens dissectis*
 tris eminentiorem & mediam partem, non deor- *cadaveribus*
 sum, sed recta ad spinam propellere & compri- *vidi, vt nihil*
 mere: & thoracis inferiora recta deorsum tra- *aperire pu-*
 hahendo deprimere, & expirationi violentæ in- *tem, etsi qui-*
 feruire. *dam dubitēt.*
Laurent.

^{uu} Transuersi, [t. 6. G G t. 7. l. l. lac t. 8. M.] portio e- ^{qq} *Non omnes*
 cedunt, plerique volunt usum esse, vt per eas mammarum & vteri fiat consen- *hæc vnionem*
 quem Hippocrates, Galenus & Medici omnes celebrarunt. ^{rr} *concedunt: &*
 Galen de dissect. ve- *ius horum qui cō-*
 nar. 8. ff Probat, quod nutritibus lactantibus, si menses erumpant, lac deficit, *cedunt, ut per eas mammarum & vteri fiat consen-*
 minima gracile sunt: si vero menses cohibeantur, mamma lacte turgent. Verum *quem Hippocrates, Galenus & Medici omnes celebrarunt. rr Galen de dissect. ve-*
 not solum consensus, sed etiam nutritionis gratia fit, cum in viris quoque reperti- *nar. 8. ff Probat, quod nutritibus lactantibus, si menses erumpant, lac deficit,*
 untur. ^{tt} Hinc cucurbitularum ad hypochondria affixio in hemorrhagia narium *minima gracile sunt: si vero menses cohibeantur, mamma lacte turgent. Verum*
 ab Hip. commendata. ^{uu} Latitudinales Munamo & de Zerbis: alii transuersales

TABVLA VIII. FIG. I.

*Musculos rectos infimi ventris cum suis vasis,
& infimum ventrem, remotis omnibus musculis,
peritoneo intectum ostendit. Fig. II. venas & ar-
terias à mammariis descendentes, & ab
Epigastrica ascendentes pro-
ponit.*

LIB. I. TAB. VIII.

FIG. I.

FIG. II.



ut Columbus,
Archangelus.
Galenus s. loc.
aff. 6. & de
diss. muscul.
26.

ius retrorsum flexa, quod positione transuersi sint, à transuersis [t. 6. K K.] fibris, quas secundum corporis latitudinem habent, dicti, infimi sunt, & ab interioribus notharum costarum finibus & membrana prædicta neruosi orti, carnosique redditi, ossibusque ilii [t. 8. N. ilij ossis sedes denudata, cui transuersi & obliqui musculi committuntur] adnati; vbi ilia inuestire, & ad exterius rectorum latus versus abdominis medium peruenere, tendine ^{xx} lato, nerueo, membranso & obliquorum instar reliquum abdomen tegentes, supra ad cartilaginem ensiformem, ante ad lineam albam, infra ad pubem descendentes, peritonæo ^{yy} contumaciter suo tendini adhærentes, vt in homine ab eo integre vix separari possint, progrediuntur: in pube vero hæc aponeurosis peritonæum relinquit, ipsumque nudum apparet. Vasa habent vt & obliqui.

xx Galenus
6. admin. a-
nat. s. de dis-
sect. muscul.
26. neutiquam
enim mem-
brana vti
multi censue-
runt, desitua-
untur.

yy Oribasius
de dissect.
musculorum
quadragesi-
mo octauo
scribit, fuisse
qui existima-
runt, corpus
ex his muscu-
lis & perito-
næo composi-
tum esse: &
Galenus dis-
sect. muscul.
26. s. ad anat.
6. method. 4.
quod ex hac
aponeurosi &
peritonæo con-
flatur, multi

Horum vsus proprius mediam & lateralem infimi ventris partem, & potissimum colon intestinum transuersim comprimere.

At tendines horum ^{zz} quemadmodum & obliquorum perforantur, vbi vmbilicus prominet, ob vasa vmbilicalia: dein vtrinque ^{zz} prope os pubis ad vasorum seminalium præparantium ad testes descensum, indeq; ciaculatoriorum ad prostatas, quæ vesicæ ceruici appositæ, ascensum; quæ per foramina [t. 8. **] peritonæi interiore tunica rupta, & productione dilatata, intestinum vel amentum il-
lapsum ^{aaa} Herniam causat: in mulieribus ^{bbb} vero etiam perforantur ad duorum processuum neruorum ab vtero prodeuntium, qui cremasteres dicuntur, transitum, qui in summam partem pu-
dendi

Medici peritonæum opinati. ^{zz} Columbus, Archangelus, Laurentius. ^{aaa} Galenus s. ad anat. 6. ^{bbb} Vesalius non nouit, at Columbus, Fallopius & Archangelus s. s.

tendi muliebris perueniunt; quare & mulieres bu-
bonocele laborant, & per sectionem sanantur.

Quod vero transuersi internum, recti medium,
obliqui externum situm obtinuerint, ratio ex deli-
gatura sumi potest, in qua fasciæ transuersæ magis
premunt rectis, hisque minus obliquæ.

Omniū autem musculorum abdominis (quo-
rum substantia partim carnea, partim membra-
nosa, vt ad motum firmiores sint) communis cum
cæteris musculis vsus est, vt dum quiescunt, par-
tibus subiectis sint ^{ccc} propugnaculo; omnia in
ventre contineant, & corpori calefaciendo opitu-
lentur.

Vbi vero vna ^{d d d} collecti versus sua principia
contrahuntur, & intro, cum subiecta mollia sint,
curuantur, à Diaphragmate ex spiritus retentione
depresso, adiuti, inferiorem ventrem aquabiliter
comprimunt: (seorsim enim agentes, modo hanc,
modo illam partem premunt) qua compressione
fæces, quæ in crassis intestinis violenter deturba-
ta, musculo ani orbiculari ^{ccc} qui sedem circulari-
ter complectitur, relaxato, foramen recludunt &
expellunt, idcirco excretionis instrumenta vocauit
Galenus ^{fff} at cum æqualis sit ab omni parte com-
pressio, æque facile ad superiorem meatum ad sto-
machum propellerentur ac ad anum; nisi Diaphrag-
ma ^{fff} situ suo obliquo, spirituque retento ea de-
primeret, & excretioni conferret. Verum vt fœtus
commode propellantur adiuuant, & hypochon-
dria constringendo costasque detrahendo, Tho-
racis motibus prosunt, quatenus vocem ^{ggg} effor-
mant, inspirationi & expirationi inseruiunt & vali-
dam efflationem, ^{ggg} spiritus cohibitionem, quam
Praxagoras (Gal. referente) πνέυματος κατάληψιν ap-
pellauit, efficiunt.

^{ccc} Gal. 5. vs.

part. 15.

^{ddd} Gal. 5. vs.

part. 14. & 15.

^{6. ad. an. 14.}

^{ccc} Gal. 6. ad.

an. 14.

^{fff} Gal. 5. vs.

part. 15. dissect.

muscul. 26. su-

perfluorū mu-

sculi: alimentari

instrumenta,

qua excernē-

dis excremen-

tis sunt desti-

nata 5. vs. par.

14. 6. ad. anat.

14.

^{ggg} Gal. 5. vs.

part. 14.

Quare

Quare cum hi muscoli & Thoraci & inferiori ventri opitulentur, thoraci quidem, quatenus interdum ^{hhh} noctuque ad respirationem efficiendam inseruiunt, at inferiori ventri statim tantum temporibus, tum cum fæces deturbandæ sunt, eatenus thoraci potius inseruire, & ad eius motum primario constitutos esse existimari potest. At quatenus hi soli infimum ventrem comprimunt, thoracem vero alii quamplures distendunt & contrahunt, eatenus primarius ipsorum vsus abdominis ⁱⁱⁱ cōpressio, cum ipsius ministerio addicti sint. Secundarius vero thoracis motus (& eatenus ad communes respirationis musculos recedendi) statui potest. Quod si denique musculus quilibet solus agat, tum obliquus descendens, coxam in suum latus: dexter in dextrum, sinister in sinistrum oblique trahit: obliquus ascendens pectus oblique ad costas adducit: transuersus vero abdomen, dexter quidem in dextram, sinister in sinistram partem trahit.

Observatione quoque dignum est, horum musculorum figuram, ^{kkk} siue agant, siue quiescant, ab aliorum diuersam esse, abdominis enim muscoli priusquam agunt, curui sunt & etiam in contractione, cum subiecta mollia sint, intro curuantur: cæteri vero omnes dum quiescunt, recti sunt; dum agunt, & curui redduntur, & propter ossa ad quæ impingunt, extra flectuntur.

De

hhh *Vesalius*
 & *Archangelus* dicit pro
 portione quada-
 dam respon-
 dere ei in foll-
 parti, quæ cle-
 uata aërem
 attrahit, &
 depressa aë-
 rem exprimit:
 collum autem
 hominis pro-
 portione respo-
 dere cū in folle
 parti, per quā
 firmam air
 ducitur &
 redditur, la-
 tiore folle par-
 te amplificata
 & compressa,

Abdominis
 ministerio ad-
 dicti sunt, li-
 cet thoraci
 quoque opem
 ferat Collum.
Fallop. respi-
 rationi inser-
 uire statuit
Laurent.

Hi Cibi poti-
 us quam Spi-
 ritus instru-
 mentis a na-

tura conditi, *Galen. 6. ad. anat. 14. s. vs. part. 14. & 15.* kkk Diuersum illis qui sunt in abdomine ab iis, qui in artubus & facie: hi cum tenduntur & ad principium retrahuntur, curuantur: illi dum tenduntur, exporreguntur, curuantur autem dum laxantur. *Gal. 1. motus musc. 3.*

De Peritoneo.

CAPUT IX.

Huius historiam & vsum Galenus 4. vs. part. 9. & 10. ad-
 ministrationem vero 6. admin. ana. 4. & 5. exhibuit.
 Huc quoque pertinet precedens tabula octava.

ABLATIS musculis eorumque tendinibus, mē-
 brana totam infimi ventris cauitatem succin-
 gens, occurrit, quam Peritonæū vocant, imitati Hip-
 pocratem^a & Galenum, ^b quibus περιτόναιον δὲ τὸ
 περιτέινεσθαι dicitur; eo quod omnibus partibus, quæ
 inter diaphragma^b & crura habentur περιτεταμμένον
^c circumtendatur, vel quasi περιτόνω, circumfirmo,
 cum omnia contēta viscera roboret. Arabibus com-
 muni membranarum nomine Ziphach,^d & nonnul-
 lis abdominis membrana vel tunica nominatur. Mē-
 brana hæc, quæ in imo ventre sita, oualem^e figuram
 [Tab. 8. A A B C D.] obtinet; omnium membranarum
 ventres succingentium amplissima & maxima, siqui-
 dem cauitatem totius corporis capacissimam succin-
 gat; longitudine & latitudine toti inferiori ventri re-
 spondet; ex filamentis spermaticis^f & sanguine ma-
 terno, parenchymatis forma affuso, tanquam princi-
 pio ex quo enascitur; siue à menyngibus cerebri spi-
 nalem medullam & neruos inuehiētibus ad primam
 & tertiam^g vertebrae lumborum producit, ideo-
 que ibi crassius est; vnde etiam tanquam à principio
 vbi & à quo prodit, cum inde non nisi disrupta sepa-
 rari possit.

E Con- longa, Archæ-

gelo: spharam oblongam vel vesicam refert, Plate. oblongi oui instar, utrū seu spha-
 ram aliquam, Vesalio. f Quare ex simplicium corporum numero, qua similitaria di-
 cuntur 6. ad. anat. 4. g Ex ligamentis, qua lumborum vertebrae, & os sacrum ilij
 ossibus committunt, Vesalio & Syluio à plexu nervorum validissimo, qui me inte-
 rio ortum dat Fallop. & Laur. à vertebrae lumborum perioestia Fallop. in insis.
 à menyngibus cerebri Archægelo.

a Qui 7. Epid.
 περιτόναιον δι-
 xit.

b περιτόναιος
 χιτών, ἡ ὑμὴν
 ἢ περιτόναιον
 σκέπασμα, 6.

ad. anat. 4.

c Galen. 4. vs.
 part. 9. & 10.
 vel à περιτο-
 νώ circum-

tendo, vel δὲ τὸ
 περιτεταμνέσθαι
 τοῖς τοκοῖς ἀν-
 γελοῖς, quod
 alimenti va-

sis pratēdatur,
 7. ad. anat. 2.

d Ziphach. &
 peculiariter
 Charmel.

e Sphæra mo-
 do cōstruētum
 est 6. ad. anat.
 13. sub sphari-
 ca, Col. globo-
 sa, rotūda ob-

h Gal. perito-
nas verticem
vocat 4. v.
part. 10.

1 Hip. 15. Coa-
cis

k Gal. 6 ad. a-
nat. 4. & 5.

m Simplex, ad
an Gal. 4. v.

part. 9.

n Gal. 5. ad. a-
nat. 6.

o Ut arcere
possit, Arist. 3.

part. 1. an. 11.

p Reticulum
dicere

naum propter
hystopē am-
plificabile esse

Archang.

q Vel leui sit,
& nihil pōde-
re offerat Ar.

3. part. an. 11.

r Ut omēum,
mēterū &

viscerum mē-
branas: tūm-

us hinc & re-
cari obtendi-

bit 6. ad. ana.

4. & 5.

s Gal. 5. ad. a-
nat. 6. ac 6. &

in 4. & 7. &

re 6. meth. 4.

Connectitur superius^h quidem, Diaphragmati i-
ta valide, vt eo inflammato i hypochondria sursum
conuellantur, inferius ossibus pubis & ilium; anteri-
us lineæ albæ, & transuersorum musculorum tendi-
nibus pertinacissime connascitur, (priuatim enim^k
& sola infra vmbilici regionem ad pubis ossa confi-
sit, quo enim^k propius ad vmbilici regionem accese-
rit, transuersorum tenui tendini connectitur) re-
tro transuersorum exortibus, & membranæ neruo-
rum à vertebis lumborum prodeuntium (vnde vul-
go enasci dicitur) omnibusque visceribus, quibus
membranam largitur.

Substantia huius membranosa^m tenuis, ⁿ sed ad-
modum valida & densa, ^o quo, dum venter ciborum
copia turget, vel foetus in vtero cōtinētur, distendi p
laxariq; possit. Tenuis^q parte anteriore, ne subiectis
partibus oneri sit, ita tamen, vt in viris à mucronata
cartilagine ad vmbilicum vsque crassius sit, quā iuxta
pubem, at in foeminis ab vmbilico ad pubem validius
est; in illis, potissimum crapulæ deditis, propter ven-
triculum; in his vero, quo dum foetus augetur, magis
distendi possit. Prope spinam circa lumbos crassius,
quia in multas^r membranas, quas visceribus tribuit,
extenuari debuit; latis aranearum^s telis similis; fir-
missimum tamen, vt viscera flatibus^t distenta repri-
mat, & ne extensione retentoue spiritu disrumpatur.
Intrinscus ob viscerum leuitatem, leue ac veluti hu-
more oblitum: & interdum adipem, quæ venas comi-
tatur, præsertim circa ventriculum & os sacrum, ad-
natam habet: extrinscus asperum & ^u fibrosum, vt
muscu-

† Hac prima est peritonæi utilitas 4. v. part. 9. u Fibras negat Vesal. secutus Gale.
6. ad. an. 7. qui simplex omnino corpus esse dicit, at Fallop. agnoscit: Si enim exten-
cas & a strabas vt rumpatur, acie oculorum in illud & oppositum lumen intentas;
quod in triplici genere fibrarū cōtextū: dein in omento, q peritonæi est pductio fibra
interna; multo magis peritonæo. Arch. similiter probat, addendo & alterā rationē. à
principis partim peritæā, q ex filamētis spermatici & affuso pprio parē: hystate sunt.

musculis aptius * adhæreat. Est autē vbique y duplex, x *Vesalio: for-*
 quod circa spinam conspicue apparet; cuius inferior *tius Columbo:*
 membrana venæ cauæ, Arteriæ magnæ & renibus *firmius Laur.*
 substernitur: altera superior & interior, hæc conte- *y Gal 6 ad a-*
 gens, vt vasa vndique tecta suos ramos inter z gemi- *na. 4. & 5. hoc*
 nas membranas tutissime mittant. Sic vasa vmbilica- *innuere vide-*
 lia duplicatum peritonæum permeant: arteriæ [*tab. b. à dimidio*
 9. a. 1.] quidem duæ ab inferioribus ad [*tab. 9. C.]* vm- *abdomine sur-*
 bilicum, ita ab vmbilico [*tab. 9. D. ad B. superius*] ad he- *sū versus sim-*
 par vena ipsa sursum fertur. In hypogastrio quoque, *plex, ab um-*
 vbi vesica locata est, manifeste aa duplicatur, amplum *bilico infra du-*
 spacium [*connexus peritonæi cum vesicat. 11. **] conliti- *plex. Sic & Va-*
 git, vt inter duas peritonæi membranas vesica conti- *rolo, ne ex re-*
 neatur. *cto incessu vi-*
scera inferiori
peritonæi par-

Foraminibus bb ad vasorum transmissionem do- *tem suo pōdera*
 natur, verum orificio proxime vasis circumnato, su- *premendo la-*
 perne quidem, qua Diaphragmati adhæret, tria ha- *dant. At Fer-*
 bet: partim à dextris ad Cauæ; alterum à sinistris, ad *nelio dua mē-*
 œsophagi cum ventriculo nexum cum cohærenti- *brana circa spi-*
 bus neruis: tertium ad Aortæ venæ sine pari & ner- *nam cōspicua*
 ui sexti paris transitum. Inferne circa anum, vesicæ *te priore adeo*
 & vtericercuicem; venas, arterias & neruos, quæ ad *coherentes, vt*
 crura mittuntur, & per peritonæum, abdominis mu- *vna cēscatur.*
 sculos ac cutim distribuuntur. Productiones quo- *Sic Archange-*
 que cc duæ [*tab. 8. H. H.]* vtrinque à lateribus vna, à pe- *lo vbiq̃ue ex*
 ritonæi exteriore membrana renibus subiecta iux- *duabus tūni-*
 ta os pubis, veluti canales laxiores, per tendines mu- *cis conficitur:*
 sculorum obliquorum & transuersorum extra ven- *& Laurentio,*
 tris cavitatem in scrotum ad testes abeunt, latius- *qui omnes hu-*
 que se explicantes, propriam eorum tunicam con- *mani corporis*
 stitunt: per quas vasa spermatica præparantia *mēbranas du-*
 stitunt: per quas vasa spermatica præparantia *plices facit, i-*
 stitunt: per quas vasa spermatica præparantia *mo & piāma-*
 stitunt: per quas vasa spermatica præparantia *trem, hac in re*

E 2

descen-

Cabrolii Chi-

vurgum & Anatomicum Monspeliensem secutus. z Gal. 6. ad. anat. 4. aa Quare
nec extra peritonæum est vesica, nec amplo peritonæi ambitu cōtinetur, vt reliqua
viscera, sed inter duas peritonæi tunicas latitat Laurent. bb *Fernel, vult nusquam*
perforari: sine vlla vera perforatione ait Syliuius. cc Gal. 4. v. sp. part. 13. meatus vel
ut fistula quadam 6. ad. anat. 13. 1. de semm. 15. veter. s. diuinos vocantur.

ad Vesalius in
foeminis dari
negat, quod in
his testes pen-
dula non pro-
mneant. Ad
struit dari Fal-
lo. Archang.
Platerus, Lau-
rent. probant
b. bonocle &
curatione per
sectionem.
c. c. Opinantur
pleriq; ruptu-
ram fieri peri-
tona perfora-
to, ubi tendi-
nes musculorū
abdominis per-
forantur. Sic
Pinas ait, dū
intestina in in-
guina descen-
dunt, dilata-
naturalē pro-
ductionem &
nouam produ-
ci tanquā va-
ginam imo &
uterum deor-
sum pelli &
fieri & intesti-
ni & uteri
prolapsum.

* Obserua-
mus in septua-
genario nobili

& quidem secundo, id quod Vesal. nominat omentum in productionibus peritonæi
deuolutum & mire adauctum, ad 4. aut 5. lib. pondus, at ventriculum detrahe-
ret, singultus causaret, & mortem, cum ager scrotum, ut solitus erat subligari ne-
glexisset: & molles ramices ex omenti prolapsu sunt. ff. ομφαλοκήλη. Plat. Laurent.
gg. Hac quinta est uisitas 4. vs. p. 9. & 17. 6. ad. anat. 4. h. h. In iecore & liene ti-
nuissima 6. ad. anat. 5.

descendunt & remeant deferentia ad vesicæ cerui-
cem vna cum musculis testium in viris; in mulieribus
vero duo ^{dd} processus ab utero ad supernam vuluæ
partem abeunt: verum hisce productionibus interi-
or membrana exactissime adhæret (à qua tamen iux-
ta os pubis sciungitur) hacque disrupta & exteriore
dilatata, prout vel intestinum vel omētum * illapsum
fuerit tam in viris, quam mulieribus herniam cau-
sat. Hæc productio sectione per cutim in inguine fa-
cta, si proxime ad abdomen vinculo intercipiatur, il-
lapsum quidem impedit, sed cum simul & vasa in
viris ligentur, testis adimitur. Sin vero non proxime
[ad** t. 8.] iniiciatur, tunc portione aliqua intestini
adhuc illabente, plurimum molestat, etsi foris nihil
protuberare conspiciatur, vix etiam tactu deprehen-
di possit, nouaque sectio, nouumq; vinculum requi-
ritur, vt exempla quorundam nos docuere. Anterius
denique in medio ventre, ubi vmbilicus est in fœtu
perforatur, vasorum vmbilicalium gratia, quo ali-
mentum à matre assumat, in adultis vero occlusum
est; & si referetur, ^{ff} Herniam vmbilicalem causa-
bit.

Tunicæ quoque particulares ab eo prodeunt, cum
nullum ^{gg} sub Diaphragmate sit instrumētum, quod
non operiatur tunica à Peritonæo initium fumente;
verum visceribus aliis tenuiorem, aliis crassiorem,
prout cuiuslibet necessitas postulabat, tunicam lar-
gitur, ^{h. h.} vt renibus crassam, at ventriculo, intestinis,
vesicæ, utero crassiorem, quæ viscerum proprias tu-
nicas

nicas cingit & ⁱⁱ communis dicitur. Verum & duæ ⁱⁱ *Viscerib. su-*
ab eo prodeunt duplicatæ omentum, nimirum & *perne situs, ut*
mesenterium; sic & ligamenta, ut est hepatis ligamen- *est hepar &*
tum. *ventriculus, à*

Venas & arterias obtinuit à vasis vicinis, superius *peritonai por-*
à phrenicis, posterius à musculis, quæ ad lumbos abe- *tionem septo ad-*
unt, & per peritonæi latera [t. 8. LL.] excurrunt: ante- *nata qua ve-*
rius & superne [t. 8. KK.] à mammariis sub sterno ad *ro inferius, ut*
rectos descendētib; inferne ab Epigastricis [t. 8. II.] *vesica & in-*
sub rectis ascendētib; furculos acquirit, pro nu- *testina, ab ea*
tritione & caloris innati custodia: aliquando etiam à *portione, qua*
vena ^{kk} spermatica ramuli communicantur. Nervos *ossibus pubis*
habet exiles, ab iis, qui abdominis musculis distribu- *committitur,*
untur, ut sensus ^{ll} particeps sit. *vestiuntur, 4.*
us. part. 10.
kk De dissect.
ven. 8.

Vfus est, partēs in imo ventre contentas ^{mm} obte- ^{ll} *Videndi qui*
gere: dein veluti medium ⁿⁿ esse inter viscera & mu- *sens. m tactus*
sculos, sicque obstare, quo minus inter muscutorum *adimunt, cum*
spacia vel omentum, vel tenuium intestinorum non- *nervorum sur-*
nulla, vel etiam sub cutem (yt in ruptura ipsius acci- *culos acqui-*
dit) intercitat, sicque dolorem excitent, ipsoꝝ mo- *rat. Vesal.*
tum impediunt, & difficiliorem superfluum ^{oo} de- ^{mm} *Hac pri-*
pulsionem causent: quod p̄batur ex peritonæo vul- *ma utilitas*
nerato, & non recte curato. Tum ut fæces ^{pp} citius *Gal. 4. us. par.*
propellantur, cum enim muscoli abdominis & Dia- *9. quam exi-*
phragma pro varietate situs sua contractione nō pe- *guam dicit, cū*
nitus æqualiter ventrem comprimere possint, peri- *intrinseca à*
tonæum sua continuatione id præstat, ut tanquam *musculis ma-*
manu premente citius propellantur; quo modo suc- *gnis, adipe*
cum ex herbis expressuri eas sacco indimus, & torcu- *multa & cute*
lari *crassa tegi pos-*
sint.

E 3

4. us. part. 9. oo Gal. 4. us. part. 9. pp *Tertia utilitas proposita 4. us. part. 9. Ves-*
sal. dicit, Galenum cum ceteris velle peritonæum in- *estina comprimere ad faciem*
exclusionem: at inquit hac exclusio cum sit voluntaria, à musculis fit, à quibus pe- *ritonæum impulsu compellit, si q. per accidens fæces exprimi. Idem dicit Archan-*
gelus. Respondit Laurentius, Galenum noluisse peritonæum per se & motu proprio, *sed ex euentu hoc præstare, dum sicci alimenti excrementa tanquam manu premē-*
do citius propellantur.

99 Gal. 4. vj
part. 17.
11 Quarta v-
tilitas à Gale.
proposita 4.
v. part. 9.

lari subiicimus; vnde torculari coarctato, ex omni
facci parte succus emanat. Quarto, vt visceribus o-
mnibus q̄q̄ imi ventris tunicam largiatur, & varia li-
gamenta producat. Quinto, vt omnia r̄firmiora
reddat, potissimum ventriculum & intestina, cum
facile flatibus & scæcibus distenta diuellantur, & col-
liget, quo propriis locis fixa hæreant & continean-
tur. Tandem, vt vasa in longum producenda tutissi-
me inter geminas eius membranas excurrant.

PARTES IN INFERIORE VENTRE CONTENTÆ.

C A P V T X.

Continentibus partibus explicatis, nunc con-
tentas enarrare oportet. Contentæ partes in i-
mo ventre considerari possunt, vel quatenus aliquæ
foetus, in vtero tanquam ergastulo conclusi, peculia-
res sunt: vel quatenus in homine tam in vtero con-
tento, quam vtero excluso considerari possunt. Prio-
ri modo occurrunt membranæ ipsum inuestientes,
& Vasa vmbilicalia alimentum deferentia. Posteriori
modo duplices sunt; vel enim inserviunt Nutritio-
ni præcedente coctione, vel Procreationi generisue
propagationi. Ad Nutritionem facientes, aliæ ad
chylificationem, aliæ ad sanguificationem perti-
nent. Ad Chylificationem; sic aliæ chylum confici-
unt & concoquunt, Ventriculus: aliæ concoctionem
adiuuant, Omentum & Pancreas: aliæ Chylum distri-
buunt & perficiunt, Intestina tenuia: alia chyli ex-
crementa crassa recipiunt & educunt, Intestina crassa
quæ cum tenuibus Mesenterio connectuntur. Ad
sanguificationem, aliæ chylum ex Intestinis exsugūt,
alterant & sanguinis rudimentum tribuunt, Venæ
Mesa-

Mesaraicæ, quæ eundem deferunt in Hepar ad Venæ Portæ radices, in quibus sanguis conficitur; aliæ confectum distribuunt, Vena Caua cum suis ramis.

Venæ enim sanguinis generandi simul & in omnes partes ferendi (vt Galeni verba habent) gratia factæ sunt; aliæ adiuuant, Hepatis parenchyma, radicibus Portæ & Cauæ circumfusum; aliæ eius excrementa recipiunt, & quidem vel bilem flauam, eamque vel tenuiorem, Vesica biliaria; vel crassiorem, Porus bilarius, qui recta ab Hepate ad intestinum abit; vel humorem sæculentum, Lien, qui ex Mesaraicis antequam Chylus alteratus ad hepar feratur, ad se allicit, eum concoquit, & laudabiliorem partem in sui nutritionem reſeruat; excrementitium vero vel sursum ad ventriculum per Vas breue, vel in aliquibus deorsum ad hæmorrhoidas amandat: vel sanguinem serosum, Renes duo, in quibus segregatio fit serî à sanguinis portione, quæ in renibus pro nutritione eorum remanet: serum vero per Vreteres in Vesicam defertur, & per Penem redditur.

Ad procreationem facientes, duplices quoque sunt, Viriles & Muliebres.

Viriles aliæ materiam feminis deferunt, eamque præparant, Vasa spermatica; aliæ elaborant, Paraſtata; aliæ vim prolificam tribuunt, Testes; aliæ semen prolificum deferunt, Vasa deferentia, vel iaculatoria: aliæ semen & humorem oleosum recipiunt, Prostata & Vesiculæ seminariæ: aliæ in vterum effundunt, Penis. De Muliebribus posteriori loco.

Verum ad has partes omnes cōmunia organa mittuntur, venæ quædem à vena portæ & cauæ, quæ nutrimentum;

Arteriæ ab Arteriæ magnæ trunco descendente, quarum aliæ Portæ ramos comitantur, à Cæliaca prodeuntes; aliæ Caviæ ramis iunguntur; quæ omnes ad vitam & calorem natium conseruandū faciunt. Nervi à sexto pari medullæ cerebri & medulla lumborum & ossis sacri, qui sensum, motumque iis quibus vtile erat, communicant. De his singulis sectionis ordinem obseruantes agemus; quare cum Vasa vmbilicalia inter duas peritonci tunicas ferantur, de iis primo sermo erit.

De Vasis Vmbilicalibus.

C A P V T X I.

a Lib. 1. hist. 13

b Quare Hip.

lib. de alim. 4

c δὲ ἀρτηριῶν

καὶ τῶν αἰσθητικῶν

ἐπιτομήν

φασὶν ὅτι

ἀντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

De his egit Galenus, libello de formatione fœtus 2. & 4.

Item 1. de semine, 15. vs. part. 4. & 5. & lib. de dissect.

ven. & art. 9. & lib. de dissect. vteri 10. Aristot. 2. gen.

anim. 4.

VAsa vmbilicalia dicuntur, quod per vmbilicum ferantur, & ex iis conuolutis Vmbilicus constituitur, qui ὀμφαλὸς διὰ τῆς ἐμπίειν, quod est ἀναπνεῖν, respirare, ratione arteriarum dicitur, quia fœtus per vmbilicum respirat. Aristoteli a ῥίζα γαστρὸς, radix ventris, quod per vasa b alimentum ex placenta vteri, seu hepate vterino, tanquam ex terra eliciatur. Latinis, vmbilicus ab vmbone, quod in medio ventris sit, imo corporis nostri c medium & centrum, si brachiis extensis circulum dimetiamur.

Est autem vmbilicus [t. 9. C.] segmentum vasorum d vmbilicalium, per quæ fœtus e in vtero alebatur; idcirco medio imi ventris implantatus, cum in fœtu sanguis tam alimentarius, quam vitalis ad huius ventris partes primum accedere debuerit. Sunt vero hæc vasa f duplicia; Vena vna, in brutis geminæ; Arteriæ

duæ,

a Lib. 1. hist. 13

b Quare Hip.

lib. de alim. 4

c δὲ ἀρτηριῶν

καὶ τῶν αἰσθητικῶν

ἐπιτομήν

φασὶν ὅτι

ἀντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

ντικεινὰ ἀ-

duæ, rarius vna ad vmbilicum introrsum in duas diuisa & Vrachus in brutis.

Vena vmbilicalis [t. 9. D. ad B.] venarum omnium prima, imo omnium partium principium perfectionis, ratione carnosæ substantiæ existit, cum sanguinē deferat & pro materia, ex qua omnia parenchymata efformantur, & pro nutritione omnium partium: quare & venæ portæ radix est; & vna cum arteriis ex semine ante ipsa^h viscera efformantur (cum vasa ante viscera formari Hippocrates & Galenus docuerint, siquidem sanguine & spiritu pro generatione partium foetus opus fuit; hæc autem per vasa, cum subministrentur, sequitur vasa ante partes generari) eo modo, quo semen in terram proiectum, primo à semetipso initium trunci simulque radicum producit, vt postea per radices truncus nutriri possit: ita in nostra primafiguratione, dum reliquæ partes formantur, simul etiam ductus vmbilicalis producit, quo foetus nutriri & augeri debeat. Vena [t. 9. D. ad B.] per geminas peritonæi membranas delata, & in foetu vmbilicum egressa, aliquando gemina, aliquando statim ab vmbilico diuisa, vt duplex appareat, cum

vasa plerique voluit, venam vnam, arterias duas, & Vrachum.

g Gal. forma. foetus ca. 2. & 4. ex semine eiaculatio. quod vulva vasorum orificiis adhaerescit, vasa generatur: idem 1. de semin. 13. Vesalii sententia fuit, oriri vasa hæc à venis & arteriis variis uterifundum petentibus, quæ à seminariis oriuntur, quæ peritonæi per foetus vmbilicum sunt ingressa, Venam quidem in pro

E 5

pria rima in iecoris cauo, quæ Porta Caudex à iecore labitur, inferi: Arterias vero ad vesicæ latera delatas in magna arteria propagines inferi, & illas communes fieri, ac si ab ipsis principium ducerent. In partu vero vasa ab utero & suis unde pronata fuerunt vasis eo modo abscedere, quo maturus fructus, aut in autumno folia suis pediculis ab arboribus abscedere, abruptique cernimus. Columbus voluit venam vmbilicalem à venis uteri oriri, & in venam portæ terminari. Arterias vero à ramis magna arteria ad os sacrum oriri. Arantio, Archangelo & Laurentio, vena vmbilicalis ramus est insignis trunci venæ portæ: Arteria vero ex bifurcatione arteria magna ad os sacrum oriuntur: Quare vena oritur ex matris venis uterinis, Vesal. & Columb. iecoris cauo inseritur Vesal. in venam portæ, Columb. portæ ramis bifurcata iungitur, Plater. ex hepate oritur & portæ ramus est, Arantio, Archangel. & Laurent. Imo ex semine & ad iecoris portas accedit. Varolo & Bauhino. h Hippocrates de carnibus, Galenus de form. foetus 2. 3. 4. & 1. semin. 13. 15. vs. part 4.

i Galenus 15. vs. part. 4.

TABVLA IX.

*Ventrem inferiorem, partibus continentibus tam
communibus, quam propriis remotis, & viscera
in naturali situ, omento teſta, vna cum
vmbilicalibus vasis ex-
hibet.*

FIG. II.



k Sesquipedalis seu semialna longitudine Vesal.

l Similis an fractus in vasis spermaticis videre est.

m Ex quorum numero obstruuntur generadonum liberorum numerum colligunt ex Albucasi. in introduct.

n Hippocrat. & veteribus chorion, id est, secundina, Galen. 15. vs. par. 5. Aristoteles Secunda 2 gener. anim. 4. eo quod non in prima formatione ex semine fiat, sed ut quid secundarium ex sanguinis partibus foeculentis postea aduenit. Pro

arteriis membrana intestinulo dicta obuoluta vlnarum ^k aliquot longitudine vena quidem ^l varicosa, vel nodis ^m referta, vt sanguis diutius remanens protenelli foetus alimento perfecte elaboretur. Arteriae vero, cum spiritum pro vita deferant, recte producuntur.

Vasa haec ad secundinam delata, ramos insignes per eam dispergunt, minores ad exteriorem partem ad hepar ⁿ vterinum seu placentam transeunt, plexum reticularem efformant, donec in tenuissima capillamenta abeant; vnde tanquam plantarum radices ex terra sanguinem maternum alimentarium & vitalem cum spiritu (cum a venis & arteriis maternis sanguis eo deferatur) eliciunt; & venae sanguinem in Venam Portae, & inde per Anastomoses in Venam Cauam effundunt. Arteriae vero, per quas foetus transpirat, sanguinem vitalem ad Aortam, & inde ad cor ad custodiam nativitaloris & vitam deferunt. Haec foetu excluso, prius tamen sanguine pro foetus alimento intro ^o represso, abscinduntur, & inuoluta vmbilicum constituunt.

Ne autem eorum portiones in corpore relictae inutilis sint, ^p in ligamenta abeunt; Vena quidem, cum ex fissura [tab. 9. B. & 13. E.] quae in hepatis caua parte est, prodire videatur, & inter duas peritonaei membranas ad vmbilicum perueniat, Hepatis fit ^q ligamentum; quae aliquando in hydropicis dehiscit, per

quam

batur exemplo abortus: 30 aut 40 dierum, in quo circa vmbilici radices iam factas, huius carnis nullum vestigium spectatur: quare non propter finem ibi coagulationis esse credit, Varolus. ^o Prudentia in ligando vmbilico opus dicit Aristotel. 7. hist. an. 11. ^p Non ut quidam crediderunt, in nihil abeunt, sed velut ligamenta quadam deseruiunt. Varolus. Quatuor haec vasa in lucem edito semper in ligamentum degenerare solent, hepar & vesicam suspendunt: hinc tanta vmbilici dignitas, ut Aegyptii pro supplicio grassatores hodie exuant corio, quos ita demum magno cum cruciatu diu vivere experiantur, si carnifex vmbilicum ferro non attingat: eorum rejecto illico expirant, vasis quatuor concidentibus, Laurent. ^q Galen. 6. vs. part. 21.

quam aqua in hepate genita per vmbilicum effunditur. Arteriæ [tab. 9. a. a. tab. 11. kl.] ab Iliacis ^t elatæ, vel potius ibi implantatæ per latera vesicæ [tab. 11. kl. tabul. 13. a. a.] per geminas quoque membranas sursum feruntur ad vmbilicum, eiusque ligamenta lateraliam fiunt.

Vrachus [tab. 9. b. tab. 11. i.] denique, seu vas vrinarium in ^f brutis à fundo [tab. 9. H. tab. 11. g.] vesicæ enatus inter binas arterias per geminas membranas peritonæi delatus, & per vmbilicum egressus longius in duo quasi intestina vesicarum instar expanditur, & Alantoidem tunicam, quæ brutorum est, constituit; in quam foetus ^t vrinam effundit, quæ ibi collecta tantisper asseruatur, dum foetus in lucem edatur.

In homine vero à fundo [tab. 9. H. tab. 11. g.] vesicæ ligamentum Vrachi [tab. 9. b. tab. 11. i.] effigie, sed nullo modo peruium exoritur, quod inter arterias [tab. 9. a. a.] vmbilicales abiens, vmbilico [tab. 9. C.] firmiter connexus vesicam extensant, & suspensam detinet, ne hac atque illac moueatur, & disruptionis ^u periculum incurrat. In adultis vero in tenuissimum filamentum definit, quo vesica peritonæo adnectatur & sustentetur, quod ab arteriis maxime fit, ne cum vesica distenta est, eius ceruicem comprimat. Sed de hisce vasis vmbilicalibus, quemadmodum de membranis foetum inuestientibus in foetus historia dicitur amplissime.

^t Ex matris arteriis uterinis, quæ à seminariis procedunt, Vesalio, ex ramis Iliacis, Columbo, Archangelo, Arantio & Laurentio: ex semine ortum ducunt, & Iliacis implantantur, Varolo, & Bauhino.

^f De Vracho egit Galen. 15. vsq. par. 5. Vrachus in homine & brutis, Vesal. Columbo, Fallo. Plater. Archangel. Laurent. Pinæo: in brutis tantum, Varolo, Arantio, & Bauhino.

^t Vrina in foetu excernitur per Vrachum inter Amnion & Alantoidem, Vesal.

De

Columb Fallop. Plater. Archangel Laurent. in foetu humano per penem, Arantio & Bauhino: Varolus voluit in vesica foetus retineri usque ad partum. ^u Quia totum illud, quod à sanguine remotum est, dum foetus in utero remansit, in vesica colligitur: unde pueruli tempore partus vesicam maximam lotio plenam habent, quare antequam escam capiant, plurimum mingunt, hac Varolus.

De Omento.

CAPVT XII.

De omenti ortu & officio egit Arist. 4. part. an. 3. & 1. hist. animal. 16. & 3. eiusd. 14. Galenus vero ipsius substantiam, vsum & connexionem 4. vs. part. 9. & 11. & 6. ad. anat. 5. explicauit.

a Hippoc. 1. de morbis, de natur. mulieb. & 3. aphor. 40. G. 6. ad. ana. 5. & 1. diff. vers. 1. de p. 1. Hipp. 5. Epid.

b Gal. 6. ad. anat. 5.

c Galen. 4. vs. part. 11.

d Vel ut Archangel. quod

quemadmodum rete capit aues

ita omētū sua densitate ad-

ipos vapores capit.

e Zirbus ad-

pinus Mauritanis, vulgo

vētris mappa.

f Arist. 3. hist.

14. & 4 par. 3.

g Ἰσίδριον, Ἰσίδριον δὲ ἀπὸ

δου, 3. hist. 14.

h Arist. 1. hist.

17. & 3. eiusd.

14. at 4 par. 3.

Ἰσίδριον δὲ ἀπὸ

δου, 3. hist. 14.

OMENTVM [tab. 9. 10. 11.] quasi operimentum; Græcis ^a ὀμπίλον, ab ὀμπίλω, innato, quod vētriculi ^b fundo [t. 11. bb.] & superioribus intestinis [t. 11. cc.] insidens velut innatet, vel ^c superuehatur: quemadmodum propter errabūdum vasorum ductū, quo retis piscatorii formam [t. 10. fig. 1. & 2.] refert γαργαλιῶν καὶ σαγῆν, rete ^d & reticulum dicitur: Arabibus Zirbus, ^e hoc omnia sanguinea ^f donantur, sed alia ^g pingue, alia membraneum obtinent: at homo ^b & simia maximum habet; vnde sæpe homines ^b epiplocomistæ, quasi omentigestatores dicuntur: quemadmodum in iis, qui venationibus & cursibus gaudent, membranæ simile est.

Membrana ^h est ampla in anteriore parte sita ad ventriculi [t. 9. PP.] fundum, & deorsum supra [tab. 9. KKKK.] intestina ad umbilicum, rarius ad ⁱ os pubis (quemadmodum in simiis & canibus) vsque expanditur, & communiter ^k secantibus lienem versus cōuolutū occurrit: nonnunquā ipso ^l anfractus ingreditur, & quādoq; in mulierib. vteri & vesicę fundū intercedit, vteri; os ^l cōprimēdo sterilitatē causare,

Dicta-

ἀόδης. 1. Arist. 4. part. 3. cuncta intestina complectitur. Gal. in homine extensa in omnia intestina 4. vs. par. 9 hinc Arch. omnia intestina vsq; ad ossa pubis integit. At 6. ad. an. 5. quibusdam animantib. haud multo infra quā umbilicus est, cōsistit, in quibusdā ad pubis ossa. k Hoc non solū in suspensis, sed & aqua suffocatis, & morbo morbus, in sanis ita notauit, Vesal. supra lienē quoq; situm est, licet secus scripserit Hipp. Col. 1 Quacūq; prater naturam crassa non concipiunt, iis omentū os vteri comprimit, & priusquā extenuentur, non concipiant. Idē de natura muliebri, omē-
tū prapingue superincumbens vteros comprimit, neq; genituram suscipere sinit.

Dictator statuit. Nonnullis post partum circa ventris medium collectum remanet, ita vt non leues sæpe dolores perferant. Quod si meatui in scrotum descendenti incidat, mollem herniam causet; quo affectu nullum animal præter hominem & simiam tentatur.

Connectitur semper^m ventriculo [t. 9. M. N. O.] lieni & colo; [t. 10. fig. 2. G. G. H. H.] aliis vero partibus modo iungitur, modo ab illis liberum est: non enim solum sublimē pendere debuit, facile enim in se ipsum colligeretur, multa que tegenda intacta relinqueret.

Formam Marsupii^o aucuparii [t. 10. fig. 1. & fig. 2. II.] refert, cum duplici membrana in fundo cōnexa (vel vt aliqui volunt, reflexa) constet, orificium [t. 10. fig. 1. b b b.] orbiculatum habet, quod posteriore sui parte elatius, quam anteriore ascendit, & inferius [tab. 10. fig. 1. & 2.] rotundum est.

Componitur ex membranis, vasis & pinguedine cœnosa & putrescibili: Membranis^r duabus (vnde peritonæum^r duplicatum quibusdam dicitur) subtilibus^r & leuibus (ne pondere intestina grauentur) sibi ipsis^r incumbentibus, constat: altera superiore, quæ ala [t. 9. K K K K. t. 11. a a a a.] superior, altera inferiore, quæ ala [t. 11. c c.] inferior dicitur. Superior & anterior ad^u ventriculi, [t. 11. a a. b b.] fundum à peritonæo ipsum obuolunte, eiusque tertiam tunicam constituyente oritur, & hepatis atque lienis cauo re-

ctali-

stitutum procedit, Gal. 6. ad. anat. 5. 1. Altera superposita aut elatior, altera subaita 6. ad. anat. 5. anterior & inferior omenti membrana, de diff. ven. 1. v. dependet Aristot. 1. hist. 17. 3. eiusd. 4. & 4. part. 3. Archangel. origo duplex, vbi & à quo proxime, vbi fundus est ventriculi, inde enim proxime nascitur, à quo proximum peritonæum est, remotum meninges cerebri. Fernellius omentum vult oriri iuxta spinam sub diaphragmate, vnde altero extremo in ventriculi fundum defigatur, à quo delapsum ventrem tegat, hinc reflexum colo intestino com-


m Gal. 6. ad. anat. 5.
n Gale. 4. v. f. part. 11.
o Gal. 6. ad. anat. 5. aut. marsupij sacculi aut pera.
p Columb. re. flecti dicit, voluit sursum re. flecti & lieni & ei coli intestini parti committi, quæ proxime ventriculum tangit, sicque duplicatum, formam marsupii referre, Archang.
q Compositio- nem hanc nomine originis expressit Gale. 4. v. f. part. 11. i G. 4. v. f. par. y. tenuissima & densissima, Archang. nullis fibris impleta, Vesalio.
r Ex duplici peritonæi cœplexu compo-

TABVLA X.

*Fig. I. Omentum integrum & vndique liberum
cum vasis per id disseminatis, sacculum aut rete
referens, exhibet. Fig. II. Omenti inferiorem
membranam superiore remota cum Colo
intestino & vasis pro-
ponit.*

LIB. I
FIG. 1

TAB. X.



Et a linea cum portione inferioris membranæ committitur. Inferior & posterior à peritonæo ad dorsum [t. 10. figur. 1. ccc.] statim sub diaphragmate, ortum ducit, quæ ad hepatis cauum delata eiusque portioni (sed * rarius) quemadmodum & diaphragmati, dextro ventriculi lateri & duodeno fere toto, lienisque cauo adnascitur, & sub ventriculo * colo [t. 10. figur. 2. G. G.] intestino (in canibus autem, nec colo nec alio intestino, at in simiis dextræ coli parti alligatur) toto ductu, quo sub ventriculi fundo, cui adnectitur, fertur, pertinaciter adnascitur, vt ipsi [t. 10. figur. 2. H. H.] mesenterii loco sit.

y Galen. 4. v. f.
part. 9.

Venæ y plures à sola vena portæ per has feruntur, ad superiorem quidem, à duabus ventriculi fundum petentibus, (quæ Gastroepiplois dextra [t. 12. H. & X.] & sinistra) infinita sobole [t. 10. figur. 1. k. k. m. m.] deorsum oblique propagatis; ad inferiorem vero ab iis, quæ ad lienem [t. 10. figur. 1. u. X. figur. 2. B. C. D.] & quandoque quadruplici ramo, (vt in Venæ Portæ dicetur historia) sparguntur, quo omnia z nutriantur.

z Galen. 4. v. f.
part. 19.

Arteriæ [t. 10. figur. 1. u. fig. 2. C.] totidem à Cæliaca & Mesenterio ramq; vt viuat. Nervi [t. 10. fig. 1. x.] valde exigui, à sexti paris ramo costali, vt alicuius sensus fiat particeps, disseminantur.

aa Ar. 1. hist.
16. pinguis n. e.
brana 4. part.
3. membrana
est in iis, quæ
sæuim habet,
σευώδης: qui
pinguedinem
πινελώδης.

Pinguedo aa multa vndique vasis [t. 10. figur. 1. d. e. f.] (intermediis vero eorum spaciis nulla) circumfunditur, vt in mediocriter pingui ad libræ vel sesquilibræ pondus adcedat; cui exiguæ & innumeræ glandulæ interiectæ, quo humidum fœculentum in prima coctione segregatum depascantur; quare cum non generetur ex sanguinis portione, vt pinguedo & alius adeps, idcirco cœnosa est, fœculenta, & facile putrescit, hinc si propter vulnus aliquod è corpore

porc exciderit, illico putrescit, quod pinguedini sub cute aliaue parte non accidit.

Vfus pinguedinis omenti, ventriculi fundum (cum superior pars ^{bb} ab hepate insidente foueatur, eiusque nomine omentum altiore loco non prodit) & intestinorum calorem, qui, cum membranosa & exanguia sint, paruus est, tueri, eundemque ^{cc} fouere, non solum calore suo, qui venis & arteris plurimis intertextis augetur, sed etiam dum sua densitate caloris dissipationem, & exterioris frigoris penetrationem prohibet, sicque concoctionem iuuat: calefaciendi enim gratia factum esse ostendit Gale. ^{dd} exemplo eorum, in quibus per vulnus abdominis cruentum omentum excidit, liuidumque factum, partem lœsam adimere Medicos cogit (omentum enim ex Senis ^{ee} nostri præcepto, si procedat, vt putrefiat, necesse est) qui minus concoquunt, & plurimis operimentis extrinsecus agent: maxime vero, quando fere totum absectum est: vt cuidam gladiatori totum fere Galenus ^{dd} abstulit: qui quidem confestim sanatus, sed facile à frigore lædebatur, quare ventrem lœnis assidue obuolutum habebat. Et Philosophus ^{ff} omentum meliorem coctionem facere pronunciauit, quia pingue sit: pingue autem sit calidum, & calor concoquat. Alter vsus intestina humectare, cum ea modo extendantur, modo corrigentur, prout chylo vel facilius replentur, aut inaniuntur. Tertius, vt per ^{gg} inediam calori natiuo alimentum suggerat.

Membranarū vero vsus, ramos venæ Portæ & arteriæ Cæliacæ in vētriculum, lienem, duodenum & colon exporrectos fulcire: dein ventriculum, colon & duodenū dorso alligare: iecur & lienem copulare. ^{hh}

F 2

De chang. vt va-

porcs lenti sanguinei in imo ventre illis adhærescant, quo ipsarum densitate in adipem condensentur, ne id, quod in alimentum aliquando cedere possit, dissipetur. Ex Hip. de glandulis & hūc usum Laur. addit, vt copiosus humor an intestinis influēs, cum à glandulis excipi & absorbi nequeat, in omento velut æstuario, afferatur.

bb Ar. 4. par.

3.

cc Gale. 4. vs.

par. 11. sunt, q.

tantū calorem

fouere dicunt,

qui adipē sti-

gidū statuunt:

non a. calefa-

cere, cū tamen

adeps calidus

sit: & nonnulli

adipem corre-

tum frigidum,

liquatum ca-

lidum, puerili

distinctione di-

cant. Arch.

dd Gal. 4. vs.

part 9.

e Lib. 1. de

morb. in princ.

ff Omēto na-

tura abutitur

ad cibi melio-

rem cōcoctio-

nē, vt facilius

ceteris que ci-

bus cōcoqua-

tur, 4. par. an.

3. calor n. vim

habet conco-

quendi: & dē

πῶν θερμὸν, &

dē ἐπιπλοῶν

πῶν

gg Gal. 4. vs

part. 11.


hh Addit Ar-

T A B V L A XI.

*Ventrem inferiorem exhibet, omenti membrana
superiore dilacerata & sursum extensa, & ven-
triculo sursum tracto, quo omenti humilior mem-
brana & intestina suo loco posita, con-
spiciantur.*

LIB. I.


TAB. XI.



De Vena Porta & Arteria Celiacæ.

CAPVT XIII.

POsteaquam de infimi ventris partibus continen-
tibus tam communibus, cuticula nimirum, cute,
pinguedine, paniculo carnosio & membrana mu-
sculorum propria, quam propriis, musculis scilicet
decem & peritonæo dictum fuerit. Vasorum quin &
vmbilicalium & omenti historiam exposuerimus,
nunc de venæ portæ & arteriæ celiacæ ramis, verba
facienda sunt, cum horum vasorum distributio,
antequam intestinorum historia tradatur demon-
strari debeat, sic Anatomica methodo, vbi vni-
us tantum cadaueris copia est, requirente. Verum
antequam de venis agamus, tabulam duodecimam
præmittemus, quæ infimi ventris viscera, propriis se-
dibus adhuc contēta, omnium oculis proponit: cum
viscerum situs naturalis à medico praxin facturo o-
mnino cognosci debeat. Quare & costarum inferio-
rum fines contractæ sunt, & peritonæum septo trans-
uerso adhærens, cum ipso septo reflexum, quo
hepatis, ventriculi & lienis sedes re-
cte considerari possit.



TABVLA XII.

Viscera infimi ventris propriis sedibus locata, exhibet.

- A. Cartilago ensiformis.
- BB. Peritonaeum cum septo, cui superne nequitur, cum disruptis costis extrorsum flexum.
- CC. Hepatis gibba pars.
- D. Ligamentum hepar septo alligans: unde hepate intumesciente non solum septum offenditur, sed etiam ab ipsius pondere detrahitur, & partim tuissimam siccam in hydropicis causat: partim etiam septum detrahendo, dyspnoeam excitat, quae saepe hydropem multis mensibus praecedere consuevit, ita ut aegri decumbere non possint, sed in lecto sedere cogantur.
- E. Vena umbilicalis portio ad portas hepatis.
- FF. Ventriculus cibo repletus.
- G. Lienis portio.
- H. Cecum intestinum posterius.
- I. Crassorum intestinum principium.
- Ab I. ad K. Colon à rene dextro ad hepar: AK. ad L. Colon ventriculi fundo substratum: Ab L. ad M. Colon à liene ad os pubis.
- N. Colon in rectum desinens.
- O. Recti intestini initium sub vesica fundo.
- P. Coli depressa sedes.
- Q. Q. Cellula coli.
- RST. Intestina tenuia quae magis sub umbilico, quam supra locata.
- aa. Arteria duae umbilicales.
- b. Vesicae fundum.
- * Vesica cum peritoneo connexio.



De Venis in genere.

CAPVT XIV.

*a Gal. 7. ad. a-
na. 5. Vena to-
tius corporis
ex peculiari
vna constant
tunica: nā ex-
terior mēbra-
na ipsis nōnun-
quam adhære-
scēs, ubi colli-
gari quibusdā.
aut fulciri aut
contegi deside-
rant, illuc solū
accedit.*

*b Fig. 2. Vena
cava portione
proponit à dex-
tro cordis sinu
ad ingulū usq;
conscendens,
quam fibrarū
in venarū cor-
pore nostro o-
stēditur, at fig.
3. fibrarū rursū
delineationē
pponit: in qua
A. trāuersas,
B. autē C.
utrinque ali-
quarum gene-
ris differētiās,
D. vero rectas:
at E. triplices
fibrarū generis
implexum ex-
primit.*

ET SI de Venis in genere fufe actum sit à nobis in libro secundo vniuersalis nostræ Anatomies, qui de partibus similibus fuit inscriptus, quo Lectorem relegamus, hic tamen pauca, ad institutum necessaria aspergamus. Vena instrumentum est corporis nostri commune, oblongum, teres, fistulæque in modum cauatum, ex tunica simplici & tenui & fibris compositum, sanguinem naturalem continens, & ad omnes corporis nostri partes nutriendas, vna cum spiritu naturali vago deferens. Substantia est membranosa, quo distendi, & rursus in se collabi possit. Tunica vnica est tenuis, triplici fibrarum genere intertexta, quæ ita obscuræ, vt potius potentia, quam actu inesse videantur, neque loco moueri possunt ob connexionem, atque densam mutuamque inter se texturam, (licet figura, quæ ^b Libro secundo, Tabula sexta habetur, clarius id demonstret, quam in Venæ substantia conspici possit) quæ non ob priuatam nutritionem, sed vt minus patiatur facta est. Nam cum sanguis aliquando nimium redundans venas violentis extensionibus distendat, aliquando rectis, & aliquando obliquis opus fuit, vt tunica ad positiones rectas & obliquas diuulsa, extendi, non autem lacerari possit, quod illis ob fibrarum ductum rectum, transuersum & obliquum in ipsius substantia latitantium accidit. Propriam hanc venarum tunicam sæpe altera communis cum adhærente adipe inuestit, quam à vicinis partibus mutuatur, vt in ventre inferiore à peritonæo, in thorace à pleura. Nam si quando longiore via duci, aut duriori cor-
pori

pori incumbere debuit, tum ex aliarum partium membranis conterminis aliam acquirit tunicam, eamque tenuem, tum ut tutius deducatur, tum ut vicinis partibus firmiter connectatur. At si visceri alicui vena inferatur, aut per muscoli caput distribuatur, huiusmodi tunica destituitur, tum quia non indiget, ab ipsis corporibus, per quæ fertur, firmata; tum quia sanguinis è vena promptam transfudationem impediret.

Est autem amplissima iuxta exortum, vbi truncus est, qui in ramos & propagines, hique in surculos & soboles desinunt: est & crassissima, cum ramus aliquis veluti à trunco deducitur.

Vfus venarum communis est, sanguinem continere & conseruare, cum extra venas statim putrescat: dein ad singulas partes corporis, vna cum sero, quod crassiorem sanguinem diluit, deducere & distribuere; tum calorem & spiritum naturalem ad partes deferre; hinc ligatis arteriis partes non statim emoriuntur; tandem sanguinem coquere & immutare, (ut dictum fuit in Secundo Libro.) Aliæ tamen præparant, ut Meseraicæ, aliæ concoquunt, ut Venæ Portæ radices in hepate; aliæ exactius elaborant, ut Venæ Cauæ rami maiores. Quibusdam tamen peculiaris adhuc utilitas tributa, ut Venæ Portæ ramis, vel potius radicibus Meseraicis dictis, Chylum è ventriculo & intestinis exfugere, ad hepar deferre. Aliis excrementa, quæ in corpore, maxime in venis redundant, velut sunt sanguis & serum expurgare. Sanguinem quidem, siue is quantitate aut qualitate peccet, ordinarie per Venas, quæ ad Vterum desinunt, in mensstruis expurgationibus; Vel ad anum, in hæmorrhoidum euacuatione; vel denique nullo ordine per venas desinentes in nares & os, rarius per eas, quæ
sub

sub cutē sunt, quod in equis frequenter fit. Serum vero ordinarie ex Caua eliciunt, & ad renes deferunt venæ emulgentes, interdum inordinate per cutaneos in sudore.

Quaternario autem numero omnes venæ comprehenduntur, quæ cæterarum omnium radices cēsentur; licet principium corporis humani seu pars, à qua reliquæ ortu prodeant, nullum sit, sed omnia similiter principium, & omnia similiter finis.

Prima est vmbilicalis vena, quæ omnium venarum prima est, cum in eam primo sanguis maternus influat, quæ fœtus nutritioni, dum in vtero est, subseruit. Altera est vena Portæ, vmbilicalis propago, ex caua hepatis, tanquam principio dispensationis emergens, quæ in ventriculum, intestina, lienem, vesicam biliariam, omētum & mesenterium ramos suos spargit. Tertia vero est Vena Caua, venarum amplissima, ex gibba hepatis prodiens, quæ ad vniuersi corporis partes, tam intrinsecas quam extrinsecas innumerata ramorum serie propagatur, ita tamen vt plures & ampliores iis, quæ copiosiore alimento indigent, largiatur; exceptis tamen iis partibus, in abdomine quidem, quibus à vena portæ rami fuere communicati; in thorace vero Pulmonibus, qui per Venam arteriosam sanguinem accipiunt; & in capite cerebro, quod à sinubus duræ matris sanguinem è venis in eos effusum, recipit. Verum in hepatis substantia Cauæ rami cum Portæ propaginibus extremis osculis inter se conuiuent, & multis locis per transversum continuantur. Quarta vena est arteriosa, quæ ex dextro cordis ventriculo pronata dicitur, cum tamen rectius ex Aorta, quemadmodum arteriam venalem ex Caua primum nasci (vt in fœtu obseruare licet) statuatur, & frequenti propagine in pulmones dispēfatur, hæc licet Cauæ non sit continua, in communem tamen

cauita-

cavitatem; dextrum scilicet ventriculum ambæ spectant.

Sed cum de vmbilicali dictum sit, & de vena arteriosa in thorace agendum sit, nunc vena portæ, Cauæ postmodum historiam persequamur.

Vena magnæ ad Portas Hepatis, & Ramorum eius descriptio.

C A P V T X V.

De Venæ portæ nomine & mesaraicarum vtilitate Galenus 4. v. s. part. 2. egit: at quomodo eius truncum vnum esse, ex usu fuerit, & quod commodiori loco locari non potuerit 5. v. s. part. 2. ostendit. Distributionem vero lib. de dissectione Venarum 1. explicauit, septem præcipuos ramos constituens, quem plerique Anatomici secuti sunt.

QUAM Venam Portæ nominare solent [t. 13.] & tanquam propago^a vmbilicali venæ^b continuatur, ex Caua Hepatis^c parte, quam (scilicet partem^c vel etiam^d ingressum) Galenus cum tota^d Asclepiadarū familia πύλας, portas vocauit; inter duas paruas Hepatis eminentias, (ne à vertebrarum corporibus comprimatur) Hippocrati^e πύλας, nuncupatas progrediens; Venarum est post Cauam maximam; quare Galeno^f μεγάλην, magna; cui Caua, μεχίση, maxima dicitur: vel μεγάλη φλέψ ἐπὶ πύλας, magna vena, quæ ad portas est: communiter venam^h ἐπὶ πύλας, vel τὴνⁱ πρὸς τὰς πύλας, quæ ad portas est, nominat, quod per eius radices, venas nimirum Mesaraicas & ramos, chylus à ventriculo & intestinis exsuctus velut per portam (vnde πύλαςⁱ ἢ παῖς) ad hepar defe-

a Obiciunt nobis minora non posse maiorum esse principium: & quis fluminum maximorum ortus, & totius corporis nostri, vel etiam maximarum arborum principium?

b Hoc Vesal. negat, asserit Columb.

c Diff. ven. 1. quam portas vocant.

d G. 4. v. s. par. 2. ait ingressum hunc portas aspiens vir, & cum eo Hipp. & tota Asclepiadarum familia vocauit.


e De corpore. refert. Iecur vero duos vertices habet, quos πύλας vocaret dextra parte locatos. At Gal. 4. v. s. par. 2. ingressum in hepar portas Hippoc. appellasse asserit.

f G. 4. v. s. par. 20. vena hepatis magna, quæ omnes mesaraicas venas ex-

cipit, & 5. v. s. part. 1. g Diff. ven. 1. h Sapissime ita appellat, quia partem, unde exit πύλας vocat (quare φλέψ τῆς πύλης dici et potest) 5. v. s. p. 2. diff. v. 1. i G. 6. plac. 3.

TABVLA XIII.

Venam portæ eiusque ramos, quæ ad vesicam bilariam, ventriculum, lienem, omentum, mesenterium & intestina mittuntur, exhibet.



k Gal. 6. ad. a.
nat. 10.

l Nonnullis por-
ta iecoris, aliis

ianitrix: non-
nullis nō tota-

vena, sed dum-
taxat pars ipsi-

us q̄ primū a
iecoris substā-

tia libera cer-
nitur hoc no-

mine dona-
tur: alij portā

& ostiariam.

m Gale. arbori-

similitudi-

no usus nō has

sed venas me-

saraicas, radi-

ces nominat:

quare Vesalio

ex iecoris ca-

ue enata, aut

verius rami

in iecoris sub-

stantiam dis-

persi. Columb.

Archang. &

Laur. radices

vocant.

n Ga. de form.

fact. 4. & 7.

plac. 3.

o Hipp. lib. de

alim.

p Extremis ca-

pillaribus ve-

na Porta in p.

fundo iecoris

deferatur, & idcirco hepatis manus mesaraicæ dictæ
fuere. Vocavit & ^k *σελεχιαῖαν*, quod caudici [t. 13. B.]
truncoue sit similis, cum ab ea tanquam *σελεχες* trū-
co, rami, ad plerasque infimi ventris partes mittan-
tur. Medici Venam^l Portæ, Arabes Venam Lacte-
am, quod chylum lacti similem alliciat, nomina-
runt.

Hanc, doctrinæ causa, diuidimus in radices, trun-
cum & ramos. Radices ^m per hepatis substantiam,
vnde tanquam a principio ⁿ distributionis & ^o radi-
cationis oriuntur, disseminatæ [t. 13. ch. 1. 2. 3. 4. 5.] exi-
guæ & numerosæ sunt, quæ sensim in maiores, & hæ
in grandiores adhuc coeunt, donec omnes versus e-
ius medium in hepatis caua iuxta dorsum vnitæ insi-
gnem truncum [t. 13. B.] constituent, qui extra hepar
fertur; ac radices hæ in hepate in medias p Venæ Ca-
uæ radices (vt Tab. 34. ostenditur) osculis iunguntur; (at
in canibus tot soboles q̄ producuntur, quot hepar fi-
bras obtinet, cum in q̄ singulas singulæ diuidantur,
quæ tamen omnes in vnum trūcum coeunt. Possunt
tamen & radices & rami dici; radices, & quatenus hæc
Vena hepatis germē dicitur, & quatenus sanguinem
inde ad alias partes deferunt; Rami vero, quatenus
mesaraicæ, quas Galenus arbori assimilans, radices
vocauit, chylum exsuctum, sursum per truncum in
hos ramos per hepar distributos deferunt.) Non-
nunquam a Venæ Portæ radicibus ab extremo apice
sinistræ partis hepatis iuxta eius ligamentum ramus
egreditur, qui diaphragmati communicatus per po-
steriora descendens sub Pancreate cum aliis ex Venæ
Portæ trunco enatis iungitur; aliquando etiam rami
aliquot ex eodem loco lienem adeunt, inq; eius sub-
stantiam disseminantur.

Trun-

occurrūt extrema partes Caua. Archan. q̄ G. diff. mus. 2. & addit. eibus a vētricu-
lo & intestinis ad has partes ascendit: hinc p̄ venas ad ipsas fibras in iecur, p̄meat.

Truncus [t. 13. B] ab Hepate^r descendens paulum oblique deorsum^f sub duodeno fertur, sedem stabilem supra vertebra nactus, qui inter ventriculum & intestina, tanquam loco commodissimo, & inter utraque medio distribuitur, cum equa debuerit venarum ad omnia nutritoria instrumēta distributio esse. Si enim magis^r descendisset, à ventriculo secessisset; si magis ascendisset, & ab intestinis distaret, & in ventriculum, cum is modo distendatur, modo concidat, lubricū accessum habuisset. Quare ab hac plures propagines in imo ventre in ventriculum, intestina, omentum & lienem distribuuntur.

Truncus [t. 13. B] antequam diuidatur, duas^r paruas propagines ex eius sede anteriore de se mittit.

I. Cysticas^v gemellas [t. 13. C c. & t. 35. g.] quæ ex sinistra magis trunci parte prodeuntes sursum & dextrorsum reflexit, ad vesicæ biliaræ collum & corpus exiguae capillorum modo (sicuti per albam oculi tunicam) distribuuntur.

II. Gastricam^x dextram [t. 13. D.] quæ multo inferior, & ex dextra magis trunci parte exorta, dextrorsum delata, ad posteriorem tantum ventriculi partem, & pylorum tenues ramulos spargit.

Mox Truncus^y sinistrorū inclinans in duos Ramos insignes [t. 13. E.] diuiditur, in elatiorem^z seu sinistrum, & humiliorem^{aa} seu dextrum. Elatior [t. 13. F.] licet totus fere in ventriculum & omentum absumatur, ab usu tamen Splenicus dicitur, quia crassiores succi partem ex chylo in Mesaraicis alterato, antequam is ad hepar feratur, ad se alliciat, & ad splenem deferat (ut in splenis historia dicitur) quare etiam supra Mesaraicarū [t. 13. G.] truncum locatus est. Humilior qui Mesentericus [t. 13. G.] quod pene totus per Mesenterium feratur. Splenicus^{bb} omenti membrana & glandoso corpore suffultus, trans-

part 2.

i Diff. ven. 1.

c Laurēt. quatuor dicit, his duabus addēs

Gastro epyloidem & intestinale, quas ex Mesenteria emergere se obseruasse scribit.

v Cysticus

Lauren.

x Gastricus

Laur. primum dicit Galen.

diff. ven. 1.

y Caudex diuiditur in duos maximums nummos Vesal.

z In aliquibus simis initio unicus, statim ab exortu bifariam scinditur, parte una ventrem altera lienem adit: etiam dua sint in exortu mutuo se contingunt Gal. diff. venar. 1.

aa Primum ramus ad cœcum ventris Galen. 1. diff. ven. 1.

bb Sinisterramus Vesalio

quartus ramus, Columbo: tertius

Archang. S. le

nici quatuor

furculi, Ga

sticus minor,

Epiploicus de

xter, Corona

ria stomachi-

ca & Epiploi-

cus, Laur. po-

sterior.

cc nonnunquā

quāquam ra-

mus priusquā

ad splenem ca-

put pertingat

magna vena

ad vētricū gib-

ba attollitur,

ramos tum ad

splenem, tū ad

concaua ven-

tris vsq; ad os

ipsius emittēs.

Gal. diff. ven.

i. ramus pri-

mus Columbo

& Archang-

gelo.

dd primira-

mi pars altera

Columb.

cc In inferio-

re omenti mē-

brana venula

exigua ab ijs

orta qua sub

concaua parte

vētriculi por-

riguntur. Gal.

de diff. ven. i.

uersum ad splenem fertur; & antequam in eū absu-
matur, ab eo pdeunt rami alij ante, alij post ipsius di-
uisionem. Ante diuisionem alij ab elatiore, alij ab
humiliore sede promanant; & ab elatiore duæ.

I. Castrica minor [t. 13. K.] & sinistra, in ventriculi
gibbosam partē posteriorem paucis ramis diffunditur.

II. cc Gastrica maior, [t. 13. N.] quod omniū ven-
triculum adeuntium capacissima, sub ventriculo ad
superius orificiū oblique fertur, & in eum dispergi-
tur, tribus de se missis ramis, quorū vtrinque; [t. 13. Oo.]
vnus ad vētriculū mittitur, medius vero sursum per-
gens ipsius superius orificium instar coronæ cingit
& dd Coronariam stomachicā [t. 13. Q.] constituit, (q̄
in canibus valde conspicua est) à qua rami alij exi-
gui sursum ad oesophagi finem, alij deorsum ventri-
culo offeruntur. Nonnunquam & alter ramus ab al-
tera propagine pronascens deorsum fertur, & ante-
rius [t. 13. R.] pylorum frequentibus furculis ambit.

Ab humiliore tres.

cc Epiplois dextra [t. 13. L.] gracilior deorsum ad
dextram omenti membranam inferiorem, & ad co-
lon ei annexum furculos deriuat.

II. Epiplois postica [t. 13. S.] insignior in duos ra-
mos plurimum separatos diuiditur, ex quibus furcu-
li deorsum ad omenti membranam inferiorem, qua
colon instar mesenterij dorso connectit; & coli par-
tem excurrunt. In canibus à splenico ramo, nulla ve-
na ad colon mittitur.

III. ff Pancreæ [t. 13. M.] inter vtramque; Epiploi-
dem tam superne quam inferne venæ pilorum instar
graciles in Pancreas disseminantur.

His propaginibus productis, trūcus [t. 13. F.] Sple-
nicus in Ramum superiorem & inferiorem [t. 13. T.]
finditur, hiq; in alios.

Aramo

Tertius ramus, Columbo. quartus Archangelo. ff De diff. ven. i.

A ramo superiore, rami modo tres, modo et plures enascuntur, modo vnus à summo, ppe splenem ramo, ^{gg} quē VAN BREVE, [t. 13. Z. superius] aut venosum vocant; q in alijs maius, in alijs minus, (hiq; facilius illi difficilius mediam ferunt, hinc etiam nonnulli si minimo interuallo edendi tempus præterierint, in syncopen incidunt; per hunc quoq; ramū fiunt sæpe lethales vomitiones nigræ) qui superiore omenti membrana suffulti in sinistram partē fundi ^{hh} ventriculi, aliquando altius, ⁱⁱ inferuntur, vt sanguinem melancholicum naturalem, qui in splenis alimētum mutari non potuit, in ventriculi fundum, quandoq; eius os ⁱⁱ eructet, quo aciditate sua torpescētē ^{kk} appetunt, antequam ob nimiam indigentiam os ventriculi corrugetur, excitet; acetosa. n. appetitum promouere, acetaria, quæ in cœna præponuntur ad nonnum appetitum prouocandum, docēt; & adstrictione sua ^{ll} id corroborēt, & ventriculi concoctionem promoueat. Nonnunquam & ab altera huius rami propagine, venæ ad ventriculum feruntur. Hæ splenem ventriculo pertinaciter colligant.

A ramo inferiore duæ prodeunt:

I. ^{mm} Epiplois sinistra [t. 13. V.] ad sinistram inferioris membranæ omenti partē, vno atq; altero furculo distribuitur; potissimū quando Epiplois postica angustior est: quare hæc non semper ⁿⁿ reperitur.

II. Gastroepiplois sinistra [t. 13. X.] satis insignis dextrorsum reflexa, fundum ventriculi sinistra parte cingit; cuius exigui ramuli cum dextræ ramulis implicantur, & extremis sese mutuo ^{oo} contangunt, & superiori membranæ omenti à sinistris frequentes ramulos largitur.

G 2

Reli-

rami non meminit Laur. nn Et Vesalius monuit. oo Gal. diff. ven. 1. illarum viring; quibusdam membranis insident per elatiorem ventriculi gibbam circumspunt: contra vero pars vna corporis ipsius admittantur & insident.

gg Gal. 5. vs. part. cap. 4. 6. ad an. 10. diff. ven. 1.

hh A lienis capite ad gibba ventriculi diff. ven. 1.

i Ad fundum præcipue eructat; quod si perius orificiū cōiugiet, nunquam videt.

Vesal. à liene in os ventriculi surrigitur

Archang. à liene versus orificiū superius vena pertingit. Varolius in ventriculi fundum

Et os. Laur.

kk Quæ eribit capiamus, cuius multis sæpe magnisque

negotii præpedium obliuisceremur. Columbus.

ll Gal. 5. vs. part. 4.

mm Gal. diff. ven. 1. huius & sequentis

maxime circa
eius mediā se-
dem, multis in
ipsum veluti
radicibus in-
serta.

qq Cōmunis
seniētia, ut si
mulieri ali-
mentum dese-
rant, & ex ie-
iunio feculen-
tia sanguinem
expurgēt Ves.
ii Gal. diff.
ven. 1.

rr Rami tres,
Hamorrhoi-
dalis, Caca-
lis, Mesentericus,
Laur.

ss Diff. ven. 1.
meminit : ra-
mus tertius ex
trunco, Ga-
stroepiploicus,
Laur.

tt Hic secundus
est ramus Co-
lumbi & Ar-
changel.

vv Gal. l. c.
hanc primam
facit : deinde al-
teram que ad
pylorū mitti-
tur : mox in ra-
mos insignes

diuidit. xx Gal. l. c. postquam Gastricam qua ad pylorū abit, & intestinale recensuit, hanc subiungit, quā dicit in ieiunum primū, deinde in omne deinceps tenue in-
testinum fissura multiplici diuidi : postrema parte tum cecum intestinum, tum exi-
guam coli partem, &c. Ramum s. & 6. faciunt Columbus & Archang. at Laur.
ramum dextrū vocat, & in Hamorrhoidalem, Caca-lem, & Mesentericū diuidit.
yy Diff. ven. 1. vs. part 20.

Reliquum vtriusque rami numerosa sobole [t. 13. r. Z.] in cauam & pp mediam splenis lineam, varie im-
plexa implantatur, & per totum ipsius corpus distri-
buuntur, vt fœculentum qq succū expurgent, eumq;
ad splenem deferant. A dextro venæ portæ [t. 13. G.]
ramo, qui rr humilior & amplior est, anteaquam di-
uidatur, duæ venæ prodeunt.

I. ff Gastroepiplois dextra [t. 13. H.] ex latere rami
supra diuisionē, in Mesentericas, nonnunquā ex trū-
co; rarius tt ex sinistro ramo prodit, & à dextris ven-
triculi fundum antierius & posterius multis surculis
exiguus, cauitatem eius subeuntibus intertextit, & o-
menti superiorem membranam perreptat, & ad me-
diam ventriculi sedem ramulis suis cum Gastroepi-
ploide sinistra [t. 13. X.] iungitur. In canibus modo ab
intestinali prodit, modo deest, tumque sinistra vtri-
usque loco est.

II. Intestinalis [t. 13. I.] quæ ex ramo, nonnunquā
etiam ex trunco, promanat, ad duodeni medium &
ieiuni principium, secundum eorum longitudinem
recta deorsum fertur, ramulis nonnullis per superius
omentum, & per pancreas capillorum modo præte-
nuibus dispersis. Mox totus ramus, [t. 13. G.] vbi me-
senterio cōmittitur, in ramos tres Mesentericos abit.

Mesenterica dextra [t. 13. b.] duplex, xx quæ in ie-
iunū, ileon, cæcū & coli partem dextram posteriore
seu caua parte implantatur, & innumeras venarū so-
boles, velut arboris cuiusdam radicū yy tenues ex-
tremities, quibus proportionē respondent, diuisa
venas Mesaraicas [t. 13. d d d d.] constituit; quæ inter
duas

diuidit. xx Gal. l. c. postquam Gastricam qua ad pylorū abit, & intestinale recensuit, hanc subiungit, quā dicit in ieiunum primū, deinde in omne deinceps tenue in-
testinum fissura multiplici diuidi : postrema parte tum cecum intestinum, tum exi-
guam coli partem, &c. Ramum s. & 6. faciunt Columbus & Archang. at Laur.
ramum dextrū vocat, & in Hamorrhoidalem, Caca-lem, & Mesentericū diuidit.
yy Diff. ven. 1. vs. part 20.

duas Mesenterij membranas, quibus plures glandulae securitatis gratia interiectae oblique feruntur, & ab intestinis (ad quorum tunicam, non cavitatem, cum ea crusta succingat, ἀνασφουριτῆται, ^{zz} seu osculis hiant) chylum, quemadmodum radices à terra succum exsugunt; quare in ieiuno & ileo frequentiores, cum ex his, quam ex crassis plus succi sit exsugendum. Verum non solum ut succum hunc deducant ^{aaa} creatae, sed ut attrahant simul; & Hepati praeparent, modo (ait Galenus) quo ipsum similimo, cum natura ipsi sint adsimiles, & primum germen ex illo ducant: quare posteaquam ei tribuerunt sanguinis ^{bbb} principium, rudemue formam, & ex ijs, & ab eo crassior pars à splene per ramum splenicum [t. 13. F.] attractus fuit, ad Hepar deferunt. Quo enim modo baiuli ^{ccc} in promptuaria repurgatum frumentum, in communem ciuitatis officinam concoquendum deferunt, ut mox ad nutriendum utile fiat; sic venae Mesaraicae alimentum in ventriculo elaboratum ad communem totius animalis coctionis locum, Hepar nimirum deferunt, non ^{ddd} ut in eius substantiam effundant, ut ibi in sanguinem commutetur, sed in Venae Portae radicibus in interiore & caua Hepatis parte referuetur & elaboretur, cum ijs sanguificandi vis ab Hepate ^{eee} tribuatur, ut pluribus in

G 3

Hepa-

quam is ad hepar perueniat. Idem 2. de plac. 8 Quo vide & 3. Temper. 2. 4. sanit. tuend. ult. de diff. morb. 7. 6. epid. 5. com. 1. At Vesalius negat membraneo & coriaceo vena corpori sanguificationis vim inesse, & si quae esset album, procrearet non secus quam ventriculus omnia ut lacteum colore emutat. Sic Columbus sanguificationem his adimit, propter tenuem venarum tunicam, albamque earum substantiam: probare conatur exemplo ventriculi, testium & mammarum. At Varolus, ubi sanguificam dispositionem in venis mesaraicis acquisiuit, iecur ingreditur, sanguinisque supremam dispositionem adipiscitur. ^{ccc} Communiter creditur per eius substantiam dispergi, ut ab ea coquatur, & in rubrum sanguinem, qualis ipsa est, conuertatur. ^{ddd} Gal. 1. v. par. 16. Sanguinis autem generandi simul & in omnes partes ferendi gratia vena facta sunt: Vena autem ab hepate virtute naturalem accipiunt; & 2. facti 9. ^{eee} Natura, ait Gal. 4. v. par. 19. toti mesenterio venas effecit proprias intestinis nutriendis ipsi dicatas haudquaquam ad hepar traicientes.

zz Gal. 4. v. par. 17. at Colubus vult non modo intestina amplecti, sed et ad internam usque causam perforare.

aaa Gal. 4. v. par. 2. bbb Galen. 4. v. par. 12. verba haec sunt.

Quapropter & venis quae ad ventriculum & universa intestina pertinent, inest facultas quaedam sanguinis effectrix, quae succum qui ex cibis distribuitur venis in sanguinem mutare naturale est, prius-

ff Cum in venis
ait Gal. 3. fac.
nat. 13. quæ mul-
tum spatium in-
ter hepar & par-
tem circa ventrem
occupant abun-
dantia fuerit ali-
menti sursum fer-
tur in hepar: cum
autem vacua sunt,
& nuntii auent,
per easdem ipsas
in hepate rursus
trahitur. lbi. per
eamdem venam si-
mul & alimentum
in hepar defer-
tur, & rursus ab-
eo in ventericulum
trahitur, sed non
eodem tempore.
Sicut alio in te-
pore spiritum re-
cipimus, aliorum
spiritus foras mitti-
mus, ita alio te-
pore secur ex ve-
tre, alio venter ex
secore trahi.

ggg Admiran-
tur (ait 4. v.
part. 19.) non-
nulli si per quas
venas prius di-
stributio ad he-
par facta est, per
easdem rursus a-
liquando sangui-
s benignus recurrit, cum aliorum natura operum ignari, tum vero roboris in attrahendo instrumen-
torum nutritione egent. **hhh** Columbus censuit extrema unicuique mesaraicarum membra-
nam apponi qualem in vesica cauitate extremis venteris apposuit, quod a nemine sit animaduer-
sum: At Laurentius figmenta mera esse dicit: Archangelus rationibus pluribus refutat. 1. ve-
narum punctum designant, puncto valvula adponi non potest. 2. quando sanguis ad intestina e-
lenda egrederetur. 3. quando pravi humores vel sponte, vel ope medicamenti à toto in intestina
protrudi possent, Si membrana adesset, egressum impidientes. 4. Aliorum venarum extrema
addenda erant, ut impidirent à partibus in venas refluxum. Deceptus fuit à crusta illa quæ ex-
crementu tertie concoctionis genita intestina uocingit, quæ velut operculum ora venarum mesa-
raicarum obducit: Sicuti cuticula omnia venarum cutanearum ora cooperit. **iii** Gal. 3. fac. nat.
13. **kkk** Gal. diff. ven. 1. **lll** Hic septimus ramus est Columbo & Archangelo. **mmm** Quare
non solum e porta, sed etiam causa sanguis exhauritur. hug. fluentibus morbi abdominis sese
suero curati: sic & morbi sanguinei thoraci & capiti, quod Hippocr. in suis aphorismis monuit.

eundem coli finē sub recto [t. 13. ff.] intestino descen-
dit, cuius extremū seu anū [t. 13. gg.] aliquot furculis
exiguīs, orbiculatim amplectitur; per quas (sæpe in
splenis non obstructionib.) sanguinis, sæculenti ni-
miū redundantis, qui in nonnullis statis tēporib. ex-
cerni solet, expurgatio fit. Hęc aliquādo à ramo sple-
nico, à quo & vas breue originē ducit. Hęc de ramis
Venæ Portæ. Differt autē Vena Portæ à Vena Caua, q̃
illa sit laxior & mollior, hęc densior; quia illa magis
attractioni, q̃ expulsionī, cū per ipsum splen & He-
par plus attrahant; q̃ expellant: Hęc vero cōtra ma-
gis expulsionī, q̃ attractioni inseruiat; cum per cauā
sanguis ad vniuersum corpus, concurrentē tamen
omniū membrorū attractione expellatur. Vfus venę
Portæ, vt ab ea rami distribuuntur, q̃ aut ad nutritio-
nem faciant, vt qui partibus naturalib. quibus Caua
ramos non impertit, sanguinē deferant: aut alicuius
excremēti expurgationē, vt ramus splenicus, q̃ cras-
sum ac sæculentū humorē ad se ex trūco Venæ Por-
tę, antequam chylus ad hepar pueniat, multo tñ lau-
dabili succo pfusum allicit, vt in splene dicitur, Vas
breue Hæmorrhoidalis. Alij rami ad cibi in vētricu-
lo cocti, & in chylum cōmutati, & in ijs alterati, & p
sanguine^{ooo} præparati ad Hepatis portam distribu-
tionē faciunt; quales sunt venę, q̃ ad ventriculum &
intestina, q̃ Melaraicę dicuntur, mittuntur. Alij de-
niq; sanguinē conficiunt, quales sunt radices dictę
Venæ Portę p carnem hepatis disseminate. Tota autē
Vena Portę intrinsecus latitat, nec ad cutim perue-
nit; quare ipsius rami nō inciduntur, nisi forte circa
podicē, vbi Hæmorrhoidas constituit (quibus san-
guisugę aliquando & consultius applicantur) & in
mulierib. ad ceruicem vteri.

G 4

De

sum deducere nutrimentū ex ventriculo, sed attrahere simul & hepati præparare modo quo ipsum
simillimo: quippe quę naturā ipsi sint adfines, & primum germen ex illo ducant. Aristot. de
f. irit. 4. ad intestina & ventrem Venę & Arterię committuntur, quę par est alimentum attra-
here & vni in carnes mox distribuendum.

Quare 1. à por-
ta, internas &
occultas con-
stituit cacochy-
miam, v. n. n. t.
quę à cauā ex-
ternas & pletho-
ram minuunt.
Cōtribus à Splē-
nico ramo ortum
ducere vult. Fer-
nelius 1. phys. 11.
à ramis venę cau-
e in antrum esse
deductus videtur
voluisse. Arch-
ang. à Splēnico
à quo est vas
breue.

non Per hunc
sæpe in lienem ot-
structione, aut al-
lio ipsius vi
quando non vni-
uersus sæculen-
tus sanguis, vel
nullus in lienem
absorbetur, vel
in ventriculum
eructare nequit,
melancholicus
sanguis per in-
testinalia excerni-
tur: quod Vesali-
us probat exem-
plo cuiusdam
qui diu hæmor-
rhoidibus labo-
rauit, & in eo
splen post mor-
tem paruis re-
peritur. Idem
sentit & Laur.
ooo Gal. 4. v. f.
par. 2. partibus
diuina quadam
virtutes a condi-
tore indicat: vni
quidem non so-

De arteria cœliaca, mesenterica utraque, quæ venæ Portæ ramos comitantur.

C A P V T X V I.

De huius distributione consule Galenum libro de dissectione venarum & arteriarum cap. 9. 6. admin. anat. 6. & cur venam comitetur. 5. vs. part. 2.

Hipp. libr. de corde, arteria magna diaphragma penetrās, in vē- trem inferiorem, mesenterium & intestina excurret.

ARTERIA magna quæ ἀόσλη dicitur, & de cuius origine & substantia in Thoracis historia dicturū sumus, ē sinistro cordis ventriculo: tanquam à principio dispensationis & radicationis egressa, in duos diuiditur truncos, minorem qui sursum delatus per superiorem thoracis partem, brachia, collum & caput distribuitur: maiorem qui ad spinam deflexus deorsum mittitur, ex quo velut omnium Arteriarum trunco rami prodeunt, alij per inferiorem thoracis partem, alij vbi iam diaphragma permeauit, per infimum ventrem propagati, anteaquam truncus ipse subdiuidatur, & in crura excurrat.

Truncus, qui per inferiorem ventrem defertur, ramos duum generū profert; alios qui Venæ Cauæ ramos comitantur, alios qui Venæ Portæ (arterias enim cum venis per totum pene corpus ^a iungi infra dicetur.) De his sermo nunc erit.

a Gal. 5. vs. par. 2. 6. eiusd. c. 17. & pluribus aliis locis: docet Venas cum arteriis συναρκεσθαι.

Arteriæ, quæ Venæ portæ ramis vndiq; attenduntur, tres sunt, Cœliaca, [t. 14. fig. 1. m. t. 17. ch. 6.] Mesenterica superior [t. 14. fig. 1. t. 17. ch. 10.] & inferior [t. 17. ch. 12.] Cœliaca [t. 14. fig. 1. in e. t. 17. ch. 6.] sic dicta quod plurimos ramos ad vētriculum mittat, arteria est insignis, quæ cum ad Portæ similitudinem ventriculo, omento, duodeno, ieiuni initio, coli parti, hepatis, vesicæ biliaris, pancreatis & lienis varios ramos offerat, de ea ad imitationem Portæ agemus, suisque ramis nomina imponemus.

Hæc

Hæc ex Aortæ ad spinam sitæ ^b anteriore ^c corpore, cum coniuge careat, prodiens elatiori sede inferiori omento toto ductu suffulcitur, mox in duos dividitur ramos, dextrum [t. 14. fig. 1. n.] graciliorem & sinistrum [t. 14. fig. 1. n.] paulo ampliorem, qui ex vena quasi radice emergunt, & sub ventriculi posteriore sede venæ Portæ in Pancreate adnectuntur.

Dexter [t. 14. fig. 1. n.] fursum ad Hepatis cauum abiens, aliquo vsque progressus plures spargit ramos, alios ab elatiore, alios ab humiliore parte, ab elatiore parte.

I. Gastrica dextra [t. 14. fig. 8. p.] quæ è medio ductu prodit, furculos in ventriculi orificij dextri posterioriorem sedem distribuit.

II. Cysticæ gemellæ [t. 14. fig. 1. f. fig. 2. x. t. 17. c. 8.] duæ exiguæ ad bilis vesiculam abeunt.

Ab humiliore vero parte:

I. Epiplois dextra [t. 14. fig. 1. o. fig. 2. h.] quæ inferioris omenti dextræ sedi & colo ipsi adnexo, offertur.

II. Intestinalis [t. 14. fig. 1. 9. fig. 2. d.] quæ ad duodenum & ieiuni initium mittitur.

III. Castroepiplois dextra [t. 14. fig. 1. r.] insignior ad dextram fundi ventriculi sedem retorquetur, & superiori omento innixa in fundi ventriculi anteriora & posteriora, vsque ad eius medium ramulos frequentes spargit.

Reliquum rami dextri in hepatis cauum [t. 14. fig. 1. t. fig. 2. y. t. 17. ch. 7.] non tamen profunde terminatur, vt vitalem ei spiritum deferat.

Sinister ramus [t. 14. fig. 1. v.] seu Arteria Splenica obliquo & flexuoso ductu per ipsum [t. 14. fi. 2. j.] Pancreas ad Lienem [t. 14. fi. 2. m.] progreditur, & dextro ramo insignior, ne facile obstruatur, cum non solum vitalis spiritus copiam lieni suggerat, verum etiam


TABVLA XIV.

Figura 1. trunci Arteria magnæ portionem exhibet, à qua Cœliaca arteria prodit, quæ suis ramis venæ portæ ramos comitatur. Figura 2. venarum portæ & arteriarum cœliacarum mutuum connexum cum pancreate & splene proponit.

FIG. I.



FIG. II.



crassio rem & fœculentâ spirituoſi ſanguinis in Aorta contenti materiam in lienem, quaſi euomat & expurget. Hæc cum Splenicæ venæ ſit attenſa, pari ratione cum ipſa ſoboles diſtribuit ab hanc enim ante diuiſionem parte ſuperiore prodeunt.

I. Gaſtrica maior [*t. 14. fig. 1. x.*] quæ ventriculo poſteriore & elatiore ſede propaginem offert, à qua ſoboles [*t. 14. fig. 1. y.*] in mediam ventriculi ſedem; altera Coronaria ſtomachica [*t. 14. fig. 1. 2. fig. 2. g.*] ad oriſicium ſuperius, illud coronæ inſtar cingit, ramuloſq; corpori ventriculi & ſtomacho tribuit.

II. Gaſtrica ſiniſtra [*t. 14. fig. 1. a. fig. 22. aa.*] maioris eſt ſoboles dextrorſum in ventriculi ſuperiora exporrecta, quæ vtrinque diſtributis ſurcilis pylorum adit.

Ab inferiore vero parte:

I. Epiplois poſtica [*t. 14. fig. 1. β. fig. 2. e.*] prodiſt, quæ mox in duos valde diductos diuiditur ſurculos, hiſque in alios, qui in inferius omentum & colon illi adnexum propagantur.

II. Epiplois ſiniſtra [*t. 14. fig. 1. γ.*] etiam ad inferius omentum mittitur, & in eius latus ſiniſtrum excurrit.

Rami huius [*t. 14. fig. 1. δ.*] reliquum lienem accedit, & in ramum ſuperiorem & inferiorem, diuiditur & hi in alios diuiſi, donec plurimis ramis lienis [*t. 14. fig. 1. ε.*] cauum attingant, & per ipſius ſubſtantiam diſpergantur, ynde.

I. Gaſtroepiplois ſiniſtra [*t. 14. fig. 1. ε.*] ex eius inferiore parte pullulat, quæ ſuperiore omento ſuffulta dextrorſum contorquetur, vt ſiniſtram fundi ventriculi ſedem pereptet, geniculatim ramulos anteriori & poſteriori parte & ſuperiori omento largiens.

II. Vas breue arterioſum [*t. 14. fig. 1. δς.*] ex eius ſuperiore parte in ſiniſtrum fundi ventriculi latus ſuperius inferitur.

Mefen-

Mesenterica vero duplex est, & vtraq; ab anteriore sede, superior quidem infra coeliacam, inferior vero infra spermaticas, prodit.

Superior [t. 14. fig. 1. 2. t. 17. char. 10. fig. 2. p.] in superiore mac propemodum vniuersam mesenterij partē propagatur, suisq; propaginib. numerosis in ieiunū, ileon & coli partem ad dextrum renem spargitur.

Inferior [tab. 14. fig. 29. q. t. 17. ch. 12.] humiliorem mesenterij sedem subit: ac potissimum in coli sinistram partem, ac rectum intestinum distribuitur, & cum venis ad extremum podicem descendens, hæmorrhoidales [t. 14. fig. 2. π.] constituit. Harum vñ non tam calorem largiri, quam suo motu & spiritu vitali mesenterium cum intestinis à putredine & corruptione conseruare; non desunt, qui velint has purissimam chyli portionem ad sanguinis arteriosi generationem exfugere, & in sinistrum cordis ventriculum deferre: Verum valuulæ arteriæ magnæ principio appositæ, quæ viam ab arteria in cor, & non contra occludunt, obstare videntur.

De Intestinis.

CAPVT XVII.

Intestinorum structuram explicauit Galenus, tenuium quidem 4. vs. pari. 17. & 5. vs. part. 3. at crassorum 4. vs. part. 18. ordinem vero 6. admin. anat. 9. Tunicas 6. admin. anat. 7. & 4. vs. part. 8. Aristoteles vero 3. par. anim. 14. & quomodo ratione intestinorum animalia inter se differant 2. hist. animal. 17. quæ exanguibus & sanguineis tribuit 4. hist. animal. 3. vide & Isagogen Herophil. Galeno adscriptam cap. 11.

INTESTINA seu interranea Græcis ² ἐντερά, ³ τὸ ἐν τῷ στήθει, quod in intima corporis sede locata

d Arteria pluri-
ma copia in-
testina acce-
dunt, ut puris-
simam chyli
partem ad san-
guinē arteria-
lem genera-
dum idoneum
exfugāt & ad
cor deferant:
qua sententia
de actione &
usu Arteria-
rū mesaraica-
rum à commu-
ni opinione re-
mota. In sini-
stro ventriculo
cordis hūc san-
guinē generari
omnes sciūt:
at nullus tran-
situs à dextro
in sinistru, quā
re hac materia
ab intestinis
desumitur, &
per Arterias
rectum ad cor
fortur. Acced-
dit quod in fœ-
tu dua Arter-
ia umbilica-
les in lumborū
régione Aortæ
ingrediuntur,
quæ situm cō-
siderantes ve-
teris dixerunt
fint: arterias san-

guinem arterialem ad cor infantis deferre. Vaulus. Gal. 3. fac. nat. & 4. vs. part. dixit arterias mesaraicas portionē chyli ad se ipsas ex intestinis trahere Vaul. l. 3. c. 4. a Χολάδες, quod in ea deriuetur χολὴ bilis: aliis ἐνχοιλία & ἐνχάλα. Barbari chordas appellant: hinc fides testudinum, cum ex arcescentibus fiant intestinis, chor-

de dicuntur.

Veteres Corni

ci interanea

vocant, unde

de antiquum

exenterave.

Sed hic non o-

mnia visce-

ra abdomi-

nis intelli-

mur, seapecu-

liariter, qua

ab inferiore

ventriculi o-

rificio ad vo-

dicem ferun-

tur.

b Hippocrat.

de struct. ho-

min. tredecim

subitorū. Ve-

salio ubi as-

salitas ut plu-

rimum 14. &

dimidium lon-

ga. Archax-

gelo sexies pal-

mo uno & se-

misse deficien-

te aquant, cu-

iuseq; hominis

longitudinem:

aliquādo pau-

lo plus vel mi-

nus.

c Gal. 4. vs.

part. 17.

d Aristot. 3.

part. 2. 14.

e Columbo

substantia ner-

ura ventri-

culi substā-

sia non d' similis.

Fallop. substantia omnium n. rufas

sint: hęc maiorem infimi ventris cauitatem implent
[situm eorum naturalem tab. 11. & 12. exhibet] & cum ven-
tris longitudinem plurimum superent, quo in eo cō-
tineantur, variis modis conuolui [tab. 11. 12. & 15.] de-
buerē, quomodo funem longum in sacculum repo-
situri variis circumuolutionibus, obuoluimus: hęc
que Mesenterij beneficio [vt tab. 16. ostenditur.] con-
nectuntur, eoque & omenti interuentu doiso colligantur, & ab Ilij ossis cauitatibus sustinentur: Sunt
autem corpora oblonga, & quidem communiter se-
xies longiora eo homine, cuius sunt intestina, tere-
tia, globosa, quo capaciora sint, minusq; iniuriis ex-
ternis obnoxia: concaua. sed non æque capacia: con-
uersionibus^c orbiculatis donata (excepto ipsorum
principio [t. 15. 1. & 2.] & fine, ne ingressum & exitum
impediant) ne alimentum^c ocys elabatur, non ab-
soluta chyli distributione, & subito^c alium adsume-
re cogat, sicq; gulositatem insatiabilem suggerat, &
vt loquitur^c Plato, à Philosophia & Musis reuocet,
(quemadmodum ea animalia, quorum intestina à^c
ventriculo ad anū aut recta aut laxa sunt, insatiabi-
lia & gulosa sunt; cū laxitas^d intestini auiditatē cibi
augeat, rectitudo auiditatē accederet: hinc Aristote-
li^d voracia dicuntur: quare quæ continentiora^d ef-
se conuenit, hęc anfractus plures habent) & vt fæces
contineant, ne crebrius deicere cogamur more ani-
maliū voracium, quæ vt assidue pascuntur sic assidue
egerūt, sed per longa interualla reddamus. Quæ cum
ventriculi orificio dextro seu piloro continuantur,
sed substantia^e tenuiore, quæ ob innumeras venas,
quas ieiunum & leon habent insertas, breui tempo-
re quam plurimum, & per plurimas venas alimen-
tum hepar adsumat: quod non fieret, si alius se-
cundus ventriculus priorem exciperet: tot enim
vena-

venarum orificia applicari non possent, sicque tarda & diuturna fieret distributio, & plurima alimenti pars venarum apprehensiones effugeret.

Et licet ab orificio dextro ventriculi ad anum usque unus sit ductus, ita ut unum tantum dici possit Intestinum; tamen cum substantia, figura, officio, situ, magnitudine & anfractu numero variet, ideo ratione substantiæ duo constituuntur Intestina, Gracile^h, siue tenue & crassumⁱ siue amplū.

Gracilia [t. 15. fig. 1.] quæ Plauto lactes, tria, duodenum, ieiunum & ileon, quæ licet eandem prope modum amplitudinem seruent, tamen situ, longitudine & venis mesaraicis distincta internoscuntur & ieiunum circa principium, qua dorso connectitur, interdum amplius obseruatur.

Crassa [t. 15. fig. 2. & 3.] totidem, cæcum, colon & rectum, situ, figura, magnitudine & figura differentia, quorum colon & rectum illis capaciora sunt: (quare veteres & in sex diuisere:) Ratione figuræ, alia recta, ut duodenum & rectum; cætera anfractibus donata. Ratione officij, quædam chylo & perficiendo^k & distribuendo destinata, tenuia nimirum & angustiora, quo minima cibi portio ab ipso rum tunica & vasis tangatur, quædam facibus colligendis dicata, ut sunt crassa.

Ipsa tenuia, partim ut nobiliora mediam [tab. 12. R S T. tab. 16. CCCC.] sedem totam fere vmbilicalem, & hypochastrij regionem occupant (secus vero in canibus vnde veteres tenuia^l superiora, crassa inferiora, quod humanis corporibus non conuenit;

f Ar. 2. hist. an. 17.
g Intestinarum natura quatenus intestina eadem est, sed magnitudine & anfractu numero exariat: elephantis latissima: sui in multes orbes conuolutum & longissimum o.
an. 9.
h Mixæ: ἵντερ Gal. diff. ven. 1. dicuntur & λεπλά, τὰ ἐν τῇ ἀρχῇ, ἀγρία. Plauto Lactes, aut ob molliorem & candidiorem pinguedinem, aut ab antiquo latcio, quod chylo m allicianz pantes et iam prisco vocabulo nominant, Laur.

i Hippocrat. de gland τὰ κῶλα vocat, qua homo maiora habeat, quam canis; & o. Epid. sect. 4. aphorif. 6. τὰ κῶλα similia habet canibus maiora tamen: vocat etiam intestina inferiora, qua sterces colligunt, libro de carnibus. Aristotelis pingua. k Galen. 4. vs. part. 17. & 18. l. Hippoc. de carnibus, inferiora intestina vocat, qua facies colligunt.

cum colon eminentiorem ^{le}lem occupet, dixere partim vero, vt Mesenterij cen. [t. 16. H.] sint proxima, quo venarum & arteriarum ^{im}mesentericus ramus breui spatio ad ea feratur, & chylum cito ad hepar transferant, crassa vero ad latera [t. 2. & 15. fig. 2. t. 16. E E E E.] locata, partim vt tenuibus cedant (& colon etiam ventriculi [t. 12. & F.] fundo annexum) partim vt valli instar tenuia & circumdant & tueantur, ne comprimantur, quæ illis ampliora, vt multa colligere possint.

m Gal. 6. ad
an. 9. diff. ven.
1. cui vt εκφυ
σις δωδεκαδίκ
τυλον & 6. ad
an. 12.

n Vesal. 12. di
gitorum, vt
plurimum in
viro Col. 12.
digitorum api
cibus metiri
possumus.

Archang. no
stro seculo vix
nouem apicos
æquat.

o Gal. 2. acut.
tex. 31. γὰρ ὁ
εκφυσις 2. τέρ
6. εκφυσις εἰς
πέντε & 5. vs.
part. 3. 6. ad
anat. 9. & 12.
ubi monet nō
nullis nō prius
intestinum di
ci, quam in

anfractus conuoluatur. p Columbo pylorus, ianitor & portonarius, & vt Fallop.
monet translato nomine ab orificio ventriculi inferiore. Archang. eius origo à
pyloro unde εκφυσις exortus, innatus, explantatio dicitur. q Gal. 5. vs. part. 3.
r In anfractus diuini, fuisse utile, Vesal. f Dissert. venar.

Gracilium primum [t. 15. fig. 1. 1. ad K.] quod ab Herophilo ^m δωδεκαδάκτυλον seu duodenum, à duodecim digitorum longitudine, ⁿ quam in nostris corporibus non assequitur, forte, quod homines nunc minoris sint staturæ; & Galeno ^o εκφυσις, id est exortus ^p seu processus nimirum ventriculi (quod nomē aliqui intestini primi orificio tantum tribuunt) hoc à dextris à q pyloro [t. 15. fig. 1. H.] ortum ducens, ad posteriora sub ventriculo reflectitur, vt vertebris lumborum ligamentis membraneis connectatur, quo recta deorsum feratur (si enim conuolueretur, chyli ingressus impediretur, eiusque refluxus causaretur, quin & venæ ex portis hepatis prodeunti & Arteriæ hepar adeunti, obstaculo esset, quamuis & locus circumuolutionibus desit.) & ad anfractuum principium [t. 15. fig. 1. K.] sub colo finit: arctissimum est, ne impetu chylus excidat: reliquis duob. crassius, quod venam ^f breuem à venæ portæ trunco, Intestinalem dictam (nullas vero mesaraicas) & arteriam à cœliaca recipit, quæ secundum huius longitudinem & ieiuni initium ducuntur: huic & pancreas subiacer (præsertim in canibus) vt vasa fulciat, & intestinum

lento

p Columbo pylorus, ianitor & portonarius, & vt Fallop.
monet translato nomine ab orificio ventriculi inferiore. Archang. eius origo à
pyloro unde εκφυσις exortus, innatus, explantatio dicitur. q Gal. 5. vs. part. 3.
r In anfractus diuini, fuisse utile, Vesal. f Dissert. venar.

lento humore irriget. Secundum, vñ 515, t ieiunum
 [t. 15. fig. 1. M.] dicitur, quod vt plurimum u vacuum
 reperiatur, idq; propter mesaraicas x innumerabi-
 les & magnitudine insignes chylum attrahentes, quæ
 prope intestini tunicam interiorem ἀνασφουήλαι y
 osculisue inhiant: innumerabiles sunt, quemadmo-
 dum & arteriarum) vt si quid y alimenti in transitu
 per primam circumuolutionem effugiat, per alteram
 ora vasorum, quæ elaboratum & y coctum succum
 contingere debent, contingat: si hanc quoque per
 tertiam vel quartam, vel aliquam sequentium, & sic
 tandem alimentum ipsis venarum osculis occurrere
 cogat, vnde fieri nequit, vt y corporibus naturaliter
 se habentibus succus nutriendo idoneus elabatur.
 Dein propter z hepatis viciniam promptissime ali-
 mentum rapientis. Tum, quia chylus præteriens ad-
 huc fluidus est. aa Principium [tab. 15. fig. 1. M.] ipsius
 à dextris sub colo vbi intestina conuolui incipiunt,
 coloris est liuidi: supra vmbilicum, cuius totam fere
 regionem occupat, multifariam in bb orbes conuo-
 lutum, situm, in Ileon finit, & longitudine duo-
 decim palmos & tres digitos, latitudine, si non
 inflatum sit, digitum paruum æquat. In cuius prin-
 cipium cc seu duodeni finem [t. 15. figur. 1. L.] Porus
 bilarius inferitur, vt postquam chylus iam præter-
 lapsus, bilem ab hepate deferat, qui sua acrimonia

t Hipp. de car-
 nib. Arist. 3.
 part. 4. Gal.
 4. vs. part. 17.
 5 eiusd. 3. sapa-
 etiam λεπιδόν
 vocat, quia di-
 cit exortum in
 tenuis intesti-
 ni s. vs. part. 3.
 u Quod nun-
 quā, quod ac-
 cipit continet
 Gal. introd. 8.
 quod semper
 inueniatur ina-
 ne, nec tantil-
 lum quidē ali-
 menti conti-
 neat: s. vs. par.
 3. & 6. ad. an. 9
 Vesal. reliquia
 intestinis ina-
 nius: Columb.
 & Fallop. sem-
 per in dissectio-
 nibus vacuum
 reperiunt.

Arch. in omni-
 bus vacuū &
 omni ferere
 priuatum. Va-
 rolo vel nulla,

H. inte-

vel pauca chyli copia reperitur. x Gal. s. vs. par. 3. & 6. ad. anat. 9. Hippoc. de
 carnibus vena tenuissima trahunt ex ventre & intestinis, qua supra ieiunū sunt,
 y Gal. 4. vs. part. 17. z Gal. s. vs. part. 3. ieiunum cum iecore vicina. aa Archang.
 alij in lucidum & fluxilem chylum occissime præterlabentes referunt: probabile,
 verum veritatem non attingit. Alij omnes cum Galen. s. vs. part. 3. cre-
 dunt à bilis acrimonia lacescitū omnia expellere, quod falsum, quia bilis dum
 chylus per intestina, præsertim superiora fertur, non extitit è suis ductibus, sed cum
 iam prolapsus est: hac Archang. bilis acrimoniam tertiam causam statuit, cum
 Vesalio, Laurentius, bb Gal. 6. ad. an. 9. cc Gal. s. vs. part. 3. & 4. vult in exor-
 tum paulo supra ieiunum inferi. Vesalius, Fallop. & Laur. in duodenum. At Co-
 lomb. ad intestina & ieiuni summitatem. Archang. in duodeni finem.

ce Galen. 6. ad
an. 9. 5. v. par.
3. diff. ven. 1.
m. introd. 11.
λεπτόν ἐν λεπτοῖς.
ff Gal. 6. ada-

nat. 9.
gg In intro
duct. 11. Vesal
nihil minus
ieiunium abi
les, quam ina-
nitione dirimi
potest, neque
minus duode-
num quam iei-
unium inane
reberitur.
hh Vesalio ie-
iunii initium
rubicundius,
ilei finis magis
albicat : ieiun-
ii initium for-
te inter secun-
dum magis in-
ane ileis ter-
mino: at in me-
dio ductu o-
mnia sunt me-
dia: Quare v-
bi ille initium
fit statuendū
non satis con-
ficere valeo.

intestina irritet, vt ad fæces contentas expellendas
& pituitam lentam adhærescentem deturbandam
insurgant: vnde quoque fit vt reliquis inanitus inter
ce disseccandum occurrat.

Tertium, quod ce λεπτόν, tenue, propter membra-
narum tenuitatem & εἰλεὶν δὲ τὸ τῆς εἰλεῖσθαι, circum-
uoluendo, quasi intestinum circumuolutum dicas,
& voluulus, ob plures circumuolutiones ad longio-
rem cibi moram vtiles, qui & Ileo morbo nomen
dedit: Subter vmbilicum ad Ilia & coxas vtrinque fi-
tum est, quod licet ieiuno continuum sit, & substan-
tia ff simile, differt tamen, quod neque vacuum re-
periatur, neq; tot vasis scateat: quare eius princi-
piū vbi intestinum rubere hh incipit, & pauciores
minoresque mesaraicæ inferuntur, quod sub dextro
rene à crasso amplexū; intestino, quod instar globi
[t. 15. fig. 1. O.] cuiusdam præmagni extuberat, exci-
pitur, & in ipsius latas sinistrum, vbi duo foramina
obtinet, vnum Ileo continuum, alterum vero humi-
lius cui cæcum iungitur, finit [t. 15. fig. 1. 2. 3. N.] Estque
intestinum longissimum palmum vnum & viginti
excedens, in latitudine digitum æquans. Et cum in-
testinum hoc solum in scrotum ii delabi possit, solum
etiam Herniam intestinale causabit.

Crassorum kk intestinorū initium [t. 15. fig. 1. 2. 3. O.]
est, vbi à dexteris instar globi cuiusdam prægrandis
extuberant, vnde appendix ll propendet, quod cras-
forum

Colombo, vtriusq; eadem substantia, idem color: horū discriminē inuestigo mesaraicis
que in ieiuno maiores & frequentiores. Laurentius his tribus notis distinguit, ieiunū
pluribus scatet vasis, paulo est rubicundius & vacuam magis apparet. ii Ileon
stercore plenū nō raro in scrotū delabitur, & propter stercoris duritiē intro remeare
non potest. Quare falsum cibi reliquias stercoris formā, cum primum cæcū attige-
rint acquirere. Probatur ruptura & iliaca passione, vbi stercus cum ieiune reici-
tur. Non enim à cæco resilit in Ileon, quia à nullo crassorū ne flatus quidē in tenuia
remeare potest. Archang. kk Laurent. crassa cenſet dicta, quod & crassiores tuni-
cas habeant, & crassiorem chylī partem contineant. ll Pisces & aues plures ha-
bent appendices, vt in eis tanquam penu cibis reſeruetur.

forum est primum, & τυφλόν, ^{mm} cæcum [*t. 15. fig. 1. 2. 3. P.*] dicitur, & ab obscuro usu nomen habet, aliis monoculus, quod vnum tantum foramen habeat; cui nonnulli ⁿⁿ duo tribuunt, quæ in eadem sint superficie adeo tenui interstitio distincta, vt vnum videatur: verum vnum Ilei intestini [*tab. 15. fig. 1. 2. 3. N.*] terminus est, alterum vero cæci seu appendicis initium: Hoc ex duobus capitibus Ilei sine [*tab. 15. fig. 1. 2. 3. N & O.*] & coli principio (nisi manuculis in hoc coli intestini extremum desinere, cui, vbi enascatur, ileon continuetur.) substantia factis crassa ortum ducit: in homine quidem appendix tenuis ^{oo}, oblonga & crassiori [*tab. 15. 1. 2. 3. P.*] lumbrico conuoluto, vel cuidam paruo sacco (vnde & faccus dicitur) acuminato similis, cæteris omnibus intestinis angustius & arctius: longitudinem quatuor digitorum & latitudinem pollicis æquans; reni dextro mediante peritonæo, à mesenterio omni libera, adnectitur: in canibus non item; quibus multo amplius est, & ortu nonnihil ab hominis variat, cum in canibus ex dextra magis, quam sinistra coli initij sede principium ducat. Verum veteres, non appendicem hanc, quæ ipsi colo apponitur, ipsiusque appendix videtur, cæcum vocarunt (vnde aliqui in brutis tria, in homine duo intestina crassa constituunt) sed id, quod à tenuium inte-

mm Arist. 3. part anat. 14. Gal. 5. vs part. 3. diss ven 1. nn Sane qui non vnum cū Græcis in cæco orificium, sed duo sibi proxima esse in medium adferat. Vesal. Nō pauci vnum foramen censuerūt per quod in eā cavitatem pateat & ingressus chyli & egressus facum. sed reuera duo sunt, pro vnū ileo vicinū in cæci capacitatem chylosa materia ingreditur: per alterum colo vicinū, stercore egreditur. Archang. oo Colla pars videtur, cui

H 2 stino-sua adest appē-

dix. Columb. Colon in duos quasi ramos diuidi videtur, alterum cæcum, sed vrene, alterum vero ileon producens Fallop. Colon habet quandam appendicem veluti sacculum oblongum, altera sui extremitate perforatum, cæcum appellatum, Vesal. Appendix hac lumbrici specie, intestini cæci appendix est, in qua multa asseruntur, non per dies tantum, sed etiam per menses: sic cerasorum nucleos post quatuor menses reiectos vidi, Laurent. pp Galenus 4. vs part. 18. sic & Columb. Non ignoro, quod hodie plerique contradicant, decepti, quod inter crassiora intestina censent id, vbi coli initium Galeno recensetur, ac si amplius quippiam faccus esset. Galenus suas caudatas simias secuit, quæ appendice hac destituebantur: At veteres qui homines secarunt, appendicem hanc cæcum appellarunt. Hac Vesalium

TABVLA XV.

Intestinorum tam tenuium, quam crassorum figuram & ductus, Coli VALVULAM, ani musculos & intestinorum tunicas exprimit.

FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.




FIG. IV.



finorum insertione ad colon PP vsque porrigitur, & globi alicuius [*tab. 15. figur. 2. ad O.*] ampli instar extuberat, pro cæco intestino sumpere; quare Galenus cæcum ad dextram dixit, ad sinistram autem colon emergere per dextra prius Ilia sursum ductū. Hoc veterum cæcum, quod coli initium dicimus, in simiis, canibus, suibus & bobus maximum existit, quibus prodesse videtur, ne cum prona incedant, in maximis ad anteriora motibus faeces ad tenuia recurrant.

99 Alimen-
to recipiendo
accommoda-
tum dicitur
in introduct.
11. & Ar-
chang. voluit
cæcum datum,
ne quid hu-
midi; liquidi
que alimenti
disperdat, sed
in illud
tanquam in
sacculum conie-
ctum asserue-
tur, dum in
iccur rapia-
tur.

re Galenus 6.
ad anat 5. ubi
& crassum vo-
cat. & 9 la-
xius intesti-
num, quod
colon dicitur.
Aristot. 3.
part. 14.
11 Galen. 5.
2. f. part. 3.
diff. ven. 1.

Vsum cæci 99 dixit Galenus, coli initium intelligens, cum sit veluti venter quidam crassus, vt excrementa recipiat; vt si quid in transitu per tenue intestinum distributionem fecellerit, & venas meseraicas sit præterlapsum, id omne diuturna in cæco mora plane exfugatur. Verum appendicis huius vsus est, dum fœtus in vtero continetur, vt fæces plurimæ & liquidiores, quæ pluribus mensibus collectæ sunt, excipiat, vbi vero adultiore facti, quia proportionem habita fæces in colo minori copia colliguntur, nec non aridiores & crassiores sunt, huius appendicis vsus cessat, quia fæces plurimum diminutæ, vt recte Constantinus, non amplius ad ipsum propelluntur, vnde vt plurimum contractus remanet, eadem quidem longitudine, sed non latitudine, qua infantia præditus erat, quemadmodum cum vmbilicalibus vasis fieri supra ostendimus.

Secundum crassorum [*tab. 15. figur. 1. & 3. ab O. ad Z. tab. 12. ab I. ad O. tab. 16. EEEE.*] quod laxius est intestinum, κωλον, scilicet colon dicitur, à κωλύω retardo, quod ratione cellularum [*tab. 15. fig. 2. 3. ΥΥ.*] quibus varie extumescit, fæces remoretur: vel δρότε κολάζεσθαι, à torquendo, propter dolorem colicum, qui in eo fit: huius principium cæcum [*tab. 15. fig. 1. 2. O.*] veteribus dictum, amplum est,

& ca-

& capacius multo, quam alia in parte, & rotundum, in dextro ilio situm [*tab. 12. ab I. ad K.*] cum ibi idoneum locum vacuum habeat, rene dextro altius appenso, cui adheret, & sub hepate bilis vesiculam contingens (cui aliquando etiam nectitur, eiusque contactu quandoque luteo colore tingitur) sursum reflectitur & conuolutum transuerlim sub ^{uu} ventriculi [*tab. 12. à K. ad L.*] fundo & supra gracilia intestina (vt hac ratione eminentiorem ^{xx} sedem obtineat, sed non in cane) progrediens ad sinistra spleni [*tab. 12. G.*] tenuissimis membranis nectitur (à liene ad os pubis [*t. 12. ab L. ad M.*] mox in posteriora flectitur ad renem sinistrum, cui firmiter alligatur (hinc fit, quod sæpe nephriticus dolor ^{yy} cum colico confundatur,) & arcus Scythici speciem exhibet: sed hoc in loco angustius est, ne splenem comprimat, quare quibus splen tumet, flatus vix erumpunt, nisi splen prematur: cellulis caret: & rursus sinistrorum, quasi ad vmbilici [*tab. 15. figur. 2. & 3. ab S. ad T.*] sedem ascendit, anfractum (hæc causa cur hoc loco colici cruciatus sint grauiissimi, in qua vidimus abscessus [*tab. 12. M.*] genitos & per cutem maturatos, eosdemque curatos) constituens ad ossis sacri initium delatus, ea fere regione, qua in altera assurgebat, recta in [*tab. 12. N.*] rectum desinit, à

H 4

quo
cui ^{et} *simpliciter*
commen. 4.
in 6. epidem.
alijs καὶ λον ap-
pellare ma-
lunt, quod si-
nus habeat
quam pluri-
mos. Arabi-
bis cellula-
tum dicitur.
nōnullis cras-
sum & ple-
num.
et Galen.
4. vj. part.
uu Colon pro-
tendens in de-
trum supra
vmbilicum
inter iecur
& lienem de-
orsum rursus
fersur, to-
tumque am-
plexum abdo-
num, in re-
ctum intesti-
num desinit
Galenus in
tractat. 11.
Aliis visum
cum conscen-

dere, & superequitare; Vesal. non supra ventriculum, vt Mundinus voluit, qui callide commentus erat, dum excrementa in hoc intestino detinentur, ventriculi coctionem adiuuari. Columb. Colon ad ventriculi fundum ascendit, cui superequitat ad alterum latus, &c. Fallop. fundo ventriculi insternitur. Archang. ^{xx} Talis situs propter nutritionem & coctionem, cum multa alimenta dura assumantur, qua nec ventriculus, nec tenuia intestina satis conficere possunt, hac in coli anfractibus detinentur, & cum colon ventriculo & hepati tanquam fonti caloris insternatur, concoquantur, & apta ad alendum reddantur, unde à mesaraicis rapiuntur. Archang. ^{yy} Galen. loc. affect.

zz Hic locus
propter clyste-
res & colicos
cruciatu à
Medicis cor-
derādu, quod
& Vesal. mo-
net.

quo angustia^{zz} quadam, veluti strictim premente
[tab. 15. fig. 2. à T. ad T.] vinculo disiungitur. Huius
longitudo [demonstratur tab. 15. fig. 2. & 3.] est circiter
palmarum septem totidemq; digitorum, & in lati-
tudine pugni magnitudinem æquat.

Amplissimum est omnium, quo flatuum, quos
sæpius rugire audimus, in prima coctione tam in
ventriculo, quam intestinis genitorum & portio-
nis chyli inutilis & fœculenti, quæ versus tenuium
intestinatorum finem remanserat, sit receptaculum
ne fæces^{aaa} assidue deiicere cogamur, quemadmo-
dum continuo intra corpus ex nutritione segregan-
tur, sed multa copia contineantur, & conuenienti
tempore excernantur.

aaa Gal. 4.
v. part. 18.
bbb In his fa-
ces figurari vo-
lunt, Laur. in
ipso quoq; ileo,
(quod probat
ruptura & I-
liaca passione,
ubi sercitur ve-
mitione rei-
citur) voluit
Archang.
ccc Gal. 4. v.
part. 17. Gale-
nus & homini
assignasset, nisi
hominum in-
testina canū,
intestinis re-
sponderet cre-
didisset, qui e-
iusmodi liga-
mentis carent.
Vesal.

Ad quod ipsius [tab. 12. Q. Q. tab. 15. figur. 2. 3. TT.]
cellulæ^{aaa} plurimum faciunt, hinc aues^{bbb} quæ-
dam, quarum intestinum fornices has non habet,
subinde excernunt, quare & inferiorem ventrem
quidam nominarunt.

Ne ergo impetu elabantur, vel vim expultricem
perpetuo stimulent, sursum primo [tab. 15. fig. 2.
& 3. ab O. ad Q.] fertur, dein deorsum vergens i-
terum prope finem [tabul. 15. figur. 2. & 3. ab S.
ad T.] ad superiora reflectitur instar S Romani: id-
circo communiter excrementa bis reddere cogi-
mur, primamque deiectionem altera statim se-
quitur.

Et quia amplum, idcirco^{ccc} ligamentis duo-
bus fortibus donatur: altero, quo supernis, alte-
ro quo infernis partibus valide alligatur, & bene-
ficio membranae externae ab inferiore omentimem-
brana enatae dorso iungitur, quo modo reliqua in-
testina mesenterij interuentu dorso colligantur; at
in canibus nulla ex parte omento alligatur, & liga-
mentis hisce caret.

Si enim

Si enim vt tenuia, angustum foret, distentum perpetuo torqueretur. Sed quia ex ventris compressione, quæ per musculos abdominis fit adiuuante diaphragmate, in alui excretionem, non minus fæces, putridique flatus ex Colo in Ileon relabi (cum ex Ilco [*t. 15. fig. 3. ab N. ad O.*] sursum in Colon ferantur) poterant, chylique distributionem perturbare, ac vomitum stercoraceū prouocare; quam per inferius foramen exire: quemadmodum in Iliaca fit passione, vbi intestinum tenue digito longius in se mutuo ingressum & implexum, tantam alui constipationem causat, vt cibus non descendat, per vomitum fæces liquidæ stercoris nidore inquinatæ, dein & stercus, non tamen ex crassis reiiciantur. Quare VALVULA adposita est Coli [*t. 15. fig. 3. x.*] principio, vbi Illo id iungitur, quam ab Anno 1579. in omnibus nostris Anatomijs hactenus demonstrauimus; quæ membranosa & crassa est, sursumq; spectat, cum cibi excrementa ex Illo in Colon non descensu, sed ascensu [*t. 15. fig. 1. 2. 3. ab N. ad O.*] ferantur: hæc facili labore inuenitur si qua per Rectum intestinū infundatur, & vna cum Colo suspensum teneatur; nihil enim aquæ, imo ne flatus, nisi vi adigas, pertransire videbis: eandem quoque expurgatis intestinis inuenies; sed iam à transfusione aquæ, cum id requiratur ad eorum expurgationem, labefactatam. Hinc & ipsorum Clysmatum materia, etiam Galeno ^{ddd} docente ad tenuia naturaliter peruenire nequit, etsi eorum vis medicamentosa etiam altius subire possit. Hanc Andreas Laurentius in nouo suo & elegantissimo opere Anatomico his verbis descripsit: Ad Coli principium Valvulam sæpe obseruauimus, dorsum spectantem hostioli instar, quam eleganter descripsit Bauhinus. (*p* hac honorifica nostri mentione, gratiam debemus) hæc sæcum & inutiliū hu-

^{ddd} Sic inquit s. meth. med. c. 12. superioribus intestinalis ulceratis, utendū est medicamentis per os assumptis: quod enim per sedem iniicitur, ad ea qua sunt vicina vetriculo subire nequit. Sic 13. meth. med. 17. quæ per sedem infusa sunt, ea omnino ad ieiunium vsque ascendere nequeunt: imo si admodum nitaris, fortasse tenue tantum intestinū continget.

morum refluxum ad supernas partes prohibet. At Archangelus, ad Cæcū, inquit, valvulas tres, quemadmodum in corde deorsum spectantes, quarum interuentu quicquid in crassioribus, siue sterces, siue flatus, prohibetur, ne in violentis abdominis compressionibus in tenuiora refundatur; quod & infusa aqua & in sufflatione & clysmatum iniectione quoque declarat.

Substantia Coli cæteris est carnosior, plurib. cellululis [t. 12. Q. Q. t. 15. fig. 2. 3. T. T.] seu concameratis concavitatibus, quæ varijs extuberantijs inæquale reddunt; donetur, vt si quid duriusculum ad alendum idoneum, nec in ventriculo, nec in tenuibus intestinis satis cōcoctum ad Colon peruenerit, in eius cellululis diutius hærens concoquatur, quatenus Colon ab Hepatis [t. 12. ad CC. & t.] & ventriculi calore (hec enim causa ipsius situs) fouetur & concoctum à venis mesaraicis exsugatur. At gracilia cellululis carent, ne chyli excrementa in ijs retineantur, chyli distributio impediatur, neue maiorem locum occupent.

Ne vero cellulæ hæ dissoluantur, per huius mediam & superiorem partem secundum eius longitudinem vinculum (elegantè à Laurentio descriptum) latitudine medijs digiti excurrit, quo laxato aut rupto, statim dissoluuntur: Vbi vero ad Rectum accedit, teres [t. 15. fig. 2. & 3. V.] redditur (cuiusmodi colon in canibus est) quo facilius excrementa, imo & flatus, qui modo taciti, modo cum crepitu exeunt, excludantur, & in portionem angustam & rectam definit.

Tertium crassorū (t. 12. O. ipsius initiū) [Sal. vesica fundo. t. 15. fig. 2. 3. 23. t. F. G.] Rectū eē à recto ductu, & ἀρχὴ, eē princeps, dicitur: q̄ principium habet, vbi intestina circumuolui desinunt, & à summo osse sacro recta deorsum ad extremū vsq; coccygem, quib.

ece ὁ δὲ re-
ctum Arist. 3.
part. 14. δι-
στέρετον A-
rist. lib. 2. hist.
an. 17. quod
nulli cui non
utraq; parte
dentes 3. part.
14. ἀπὸ τοῦ
σπέρματος Gal. 5.
vsq; par. dissect.
ven. 1. ἀπὸ τοῦ
δυσχερέματος 6.
ad. an. 9.
cccc Hip-
pocrate, mo-
nente Gal. diff. ven. 1. licet ἀρχὴ de ano etiam dicatur 5. Epid. ἐξ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς.

[t. 15.]

[*t. 15. fig. 4. hh.*] peritonæi interuentu firmiter conne-
 citur, ne dum grauiatur, suo pondere decidat, & in
 viris sub [*t. 15. sub. b.*] vesica, in mulieribus sub vtero,
 in anum [*t. 15. fig. 2. & 3. a.*] seu sedem, vbi amplius est,
 quam Hippocrattes ^{fff} laxam partem vocat, definit,
 & virorum [*t. 15. fig. 2. 3. d. locum ostendit.*] peni, & mu-
 lierum vteri ceruici, musculosæ substantiæ interuen-
 tu connascitur; hinc maxima est vesicæ & intestini
 sympathia in viris, sed maior vteri & intestini in mu-
 lieribus, ita vt sæpe exulceretur intestinum, & excre-
 menta per pudendum reiiciantur. Hoc commo-
 diori loco poni non potuit, in hoc enim paulatim
 collecta, opportune excerni possunt. Huius fini mu-
 sculus [*t. 15. fig. 2. 3. a.*] orbicularis circumiicitur, qui
 orificium constringat, quare σφικτηρις Hippocrati ^{ggg}
 & Galeno dicitur, ne nobis inuitis fæces excidant,
 sed solum voluntaria compressione exprimantur;
 hoc palimum [*t. 15. fig. 2. 3. à Z. ad a.*] vnum & semissem
 longum, tres vero digitos latum, satisq; corpulētum
 existit; & appēdices pingues exterius adnatas habet.

Hæc enarrata intestina, quatenus similia sunt
 ex substātia spermatica & sanguinea materia in pro-
 priam eorum carnem mutata constant. Quatenus
 vero partes sunt dissimilares, substantiam obtinent
 membranōsam, quo dum chylo, fæcibus & fla-
 tu turgent, sine molestia distendi possint, non ta-
 men vndique pariter crassam, cum gracilia tenuio-
 rem, crassa crassiorem habeant, quæ in tres Tu-
 nicas distrahitur, quarum vna [*tab. 15. fig. 4. ee.*]
 communis omnibus, quatenus mediate à ^{hhh} Pe-
 ritonæo ortum habet; at immediate ipsum duo-
 denum & coli pars ventriculo attensa ab inferiore
 omenti membrana; (non autem in canibus) ie-
 iunum vero, ileon & crassorum reliquum, à Me-
 senterij membranis suam tunicam habet; etenim
 mesen-

fff χαλαρόν
 ὁ ἀρχὴς citan-
 te Gal. diff.
 ven. 1.

ggg Memento
 Galeno diff.
 vulua 1.

hhh Gal. 4.
 vs. part. 17. &
 20. de tunicis
 etiam agit 74.
 vs. part. 14.

iii Intestino-
rum tunica
dura, sic enim
nominant cō
plexus unde
fiant non ad
modum pro
prie, cum tu
nica vocabu
lo operimentū
significetur,
Galen. 6. ad.
an. 7.

kkk Gal. 4.
v. part. 17.
Tunicarū nu
merus propter
vsum acqui
situm ac-
cessit: pericu
lum enim e
rat ne inte
rior tunica
nōnunquam
corroderetur:
ut ergo in ea
malum sista
tur, alia ex
trinsecus cir
cumiecta. 14
v. part. 14.
recipiūt enim
intestina bi
lempituitam,
& alia serosa
excrementa,
qua plerunq;

mesenterij membranæ vasa ad intestina deducentes
ipsis adnascuntur, vbi inuicem abscedentes singulæ
per intestinorum latus cōtendunt, & in tertiam eo
rum tunicam degenerant: hac donantur vt eis sit
loco ligamenti, & tutelæ gratia inuestiuntur. Duæ
[t. 15. fig. 4. ff. g.] propriæ iii partim vt kkk facultas ipso
rum expultrix validior sit, partim vero ad kkk secu
ritatem & patiendi difficultatem in multis morbis,
maxime in kkk dysenteria, vt interiore læsa, altera il
læsa conseruetur, quare multi kkk interiore tunica il
læsa nihilominus superuixerunt; vtraque tamen te
nuior & mollior quam in ventriculo, cū hic durio
ra & incocta excipiat, illa vero vt plurimum cocta &
attenuata. Harum prima [t. 15. fig. 4. ff.] seu exterior, ill
membranosa, valida tñ, maiori ex parte fibris trans
uersis donata; fibris etiam carnosus perfusa, vt calo
rē augeat, ad portiones chyli minus elaboratas præ
terlabentes concoquendas, vtque Musculorum in
star intestina contrahant, ad exigua quædam, quæ
abdominis compressione excludi non potuere, ex
pellenda: huic superinducitur, veluti velum quod
dam spissum tenuissimum tamen, ex fibris rectis
quamplurimis textum.

Altera interior, [t. 15. fig. 4. g.] in tenuibus mmm ru
gosa (in colo rugæ sunt in cellulas expansæ) vt chy
lum delabentem moderate remoretur, vt si portio a
liqua minus sit elaborata, concoquatur; dein vt à ve
nis commodè absorberi possit; rugæ hæ transuersæ,
cam exteriorē, & quidē quibusdam locis duplo
triplo-

a toto corpore confluunt. Ibid. Ill Interna exteriora nervosior, membranosa ma
gis ac durior est. Vesal externa crassior quam interior, quanquam contrarium as
serat Vesalius, estq; carnosa, Fallop. exterior tunica propriæ intestinorum, crassior
est interna. Archang interior nervosa Laur. mmm Fallopius assimilat cuti ex
teriori pudendi virilis: hæ non solum in uerso intestino conspiciuntur, sed et in non
everso digitis percipiuntur, dum in exterioribus intestinis i sum comprimitur. si

triploue longiorem reddunt; idcirco quoque rugari debuit; quæ rugæ mobiles ex vno loco in alium propelli possunt, vt moderate & non violenter chylum retineant. Est quoque neruosa, sed carnosa apparet, propter crustam membranæ speciem exhibentem, ex tertiæ coctionis excrementis ipsorum intestinorum genitam, eam succingentem, ne ora Mesaraicarum in interiorem tunicam prouenientia, obstruantur; neue interior tunica ex perpetuo chyli transitu, quemadmodum & Venarum ora callosa reddantur. Vtraq; tamen tunica propria, ad finem Coli & in recto crassior & densior est.

Fibras habent omnis ⁿⁿⁿ generis; interior obliquas, vt retineat; media ^{ooo} transuersas, vt expellat; rectæ pauciores ad ^{ppp} transuersarum tutelam, ne à sese ^{ppp} mutuo diuellantur, additæ; quare extrinsecus à rectis veluti ligamento colligantur; quemadmodum fasciis circularibus retinendis vincula recta iniicimus. Sed rectæ in tenuibus pauciores, in crassius plures, at in colo secundum eius impressiones: maximæ in recto, propter multa & dura excrementa illic congesta.

Vasa [t. 13. hac ostendit.] obtinent. Venas ^{qqq} quidem à vena [t. 13.] portæ; Arterias à Cœliaco [t. 14.] ramo & Mesenterico; ad duodenum enim & ieiuni principium Intestinalis longo ductu mittitur; ieiunum vero & ileon & coli pars à dextro ileo ad renem sinistrum, Mesaraicas [t. 13. ddd. t. 14. 3. 000.] obtinent, quæ per geminas mesenterij tunicas, ex ipsius quasi centro ex alto sursum & obliquo ductu feruntur: sunt. Venæ quidem ^{rrr} vt chylum ab intestinis ad hepar ^{ppp} deferant, & ab hoc sanguinem pro eorum alimento referant. Arteriæ, vt sanguine vitali perfundant, & earum ^{rrr} cum obli-

quo ductu inter duas tunicas vena feruntur, idcirco non rubet chylus permissione sanguinis in intestinis, Laur.

quoque flatus
turgidum luci
exponatur ap
parent. Arch-
angelus rugo-
sam, ait, de-
prehendes, s; ab
exteriore
disiunxeris o-
mnigenas s; fi-
bras consecuta
est, et s; obli-
qua sint co-
spectiores.

nnn Non tã-
tũ transuersis
constant vt o-
pinati sunt A-
natomici, sed
omni fibrarũ
genere, Fal-
lop.

ooo Gal. 4.
vs. par. 8. vil-
les transuer-
sas habent, ad
impellendum
idoneos, ad-
tractrice o-
nim non indi-
gebant. G. 6.
ad anat. 7.

pleræq; circu-
lares sunt, par-
te recta ipsis
superposita
sunt.

ppp Gal. 4.
vs. part. 17.
qqq Ar. de
spirat. 4.

earum rrr cum obli-

fff Lib. 4. vj.
part. 17.

Vesal. & ha
mibi ex inte
stinis aliquod
elicere viden
tur.

ttt Ex Rhafi
at Archange
lus vult in cras
sis verum esse
adipē, in graci
libus humidi
tatem. Varo
lus hunc mucū
pinguedinem
carosam appel
lat. Lauren
tius, pinguem
& concretum
humorem.

uuu Quomodo
adipis ope fa
ces precipitan
tur, cum in iis
cellula, vt diu
tius retinean
tur. Respondet
Archangelus:
Cellulae sunt,
vt faeces beni
gni alimenti
adhuc partici
pes, retinean
tur: Adeps, vt
faeces exhausta
tanquam mo
lesta per adipē
tanquam lu
bricā, celerius
foras exeant.

xxx Colon multo intus adipe in aequali infarctum visitur. Veteres intestina fatuo
regi comparabant, qui bellum non nisi laceffitus gerit. Laur. - yyy Aristot. 4. pari
an. 4. zzz Gal. 4. vj. part. 8. 17. & 18. in introduct. 11.

earum motu perpetuo à corruptione & putredine
conseruentur, quamuis & cibi modicum assumere
dixerit Galenus fff ad reliquam vero colli partem &
rectum intestinum à Mesenterica vena sinistra & Me
senterica arteria inferiore rectā producantur. Ner
uos à sexto neruorū pari; duodenum quidē exiguos à
stomachicis pylorū cigentibus, cætera vero intestina
vtrinq; à ramo, qui radicibus costarum exporrigitur,
acquirunt, vnde sensum acutissimum habēt; quo bi
lis & excrementorum stimulationem sentiant, quem
tamen mucus oblinens hebetiorem reddit.

Hæc extrinsecus pinguedine obducuntur, intrin
secus vero mucō oblinuntur, & fictilium ttt vasorum
modo inuitrantur, quo propter lubricitatem vvv ci
tius alui faeces præcipitētur (sunt qui xxx velint colō
intus adipe infarctum esse) & ne ob exquisitissimum
eorum sensum perpetuo irritentur.

Vfus intestinorum communis, vt sint instar terræ
yyy partibus alendis: nam vt in terra est alimentum
plantarum, vnde radicibus attrahunt, sic in intesti
nis chylus est, quem radices Mesaraicarum exsugunt,
vt hominem nutrant. Dein intestinorum tenuium,
vt sint instrumenta distributionis zzz alimenti, aliud
enim coquendi zzz, aliud distribuendi instrumētum
esse debuit; (si enim idem fuissent facile venæ simul
cum elaborato crudum alimentum adsumpsissent)
quare hanc ob causam facta sunt; siquidem chylus in
ventriculo confectus ad alias partes distribui debuit,
& partes vtilis ab excrementitiis segregari, quod per
venas sit mesaraicas; quæ tamen ex ventriculo omnē
exsugere non poterant, ob chyli copiam, quæ venarū
oscula obturaret, eo modo, quo multa aqua phyalæ
inclusa;

inclusa eadem inuersâ, ex angusto orificio, aut nullo modo, aut guttatim & difficilime exit; quare oportuit chylum longissimo ductu protrahi, ita vt in quolibet loco exigua quantitate contineretur; tunc enim portio conueniens per oscula vasorum attrahitur. Idcirco ex pyloro intestina tenuia & longissima dependent, ad quæ chylus ex ventriculo transmittitur, & per eorum longitudinem distribuitur. Verum in ipso transitu ^{zzz} coquitur adhuc alimentum, vt venis etiam omnibus sanguis, cum ijs facultas quædam concoctrix insit: quare & eorû ^{zzz} substantia ab ipsius ventriculi haud multû diuersa; maxime si forte portio chyli ^{aaaa} minus elaborata exciderit, ab ijs (cum facultas concoctrix insit) concoquatur: quare & omento, cum intestina membranosa sint, & pauco calore donentur, teguntur vt pinguedine sua fouentur. Tû vt ipsa crassa, fæces crassiores, cibiq; ^{bbbb} reliquias excrementitias, & bilem ab Hepate per meatum demandatam, vna cum flatibus, qui continue colliguntur, contineant; hæc etiam è corpore expellendis sint dicata, ad quod & crassi ^{aaaa} intestini latitudo facit, qui ceu secundus venter ipsis, quemadmodum vesica vrinis subiicitur; ad quod tamen muscoli ani, qui instar ^{cccc} claustri cuiusdam circumiiciuntur, plurimum faciunt, vt in ano dicetur.

De Mesenterio.

CAPVT XIIIX.

Galenus huius historiam 4. vs. part. 20. proposuit administrationem 6. administ. anat. 5. 6. & 7. Aristoteles vero 1. hist. 17. & 4. part. animal. 4.

MESENTERIVM ^a & μεσέντερον, à situ dictû, quod sit membrum ^b εν μέσῳ τῶν ἐντέρων, in medio

aaaa Gal. 4. vs. par. 18. ad Vesal. vi prius à ventriculo confecta, ab solutius paulo in ipso ductu immutentur. Gal. 14. vs. part. 14. intestina & ventriculus ex duab^{us} tunicis constat, vt quæ coctionis potius essent instrumenta, quam superfluum recepitacula, carnosior substantia erit accommodatior. bbbb Colon excrementa ex distributione segregata suscipit, in introduct. 11. cccc Gal. 4. vs. part. 19. à μεσεντέρῳ Gal. 4. vs. par. 20. Ar. 1. hist. 16. b Gal. 6. ad an. 6.

c 3. lib. 3. de
nat. deor. in
medio intesti
no usque ad
portas iecoris
ductus, ac di
recta v. a.
Vesalius ait,
Ciceronē pu
rasse Græcos
intestinum &
liquod intelli
gere.
d 4. Ar. 1. hist.
16. super, ait.
e Gal. 6. ad a
nat. 5. & 6. 4.
vs. part. 20. 5.
eiusd. 1. & in
introduc. 12.
f libr. 4. part.
anim. 4. non
nullis pingui
membrana
peculiariter
dicitur, cum
reliquis omni
bus pinguior
sit, & non
nullis media
num, Vesal.
g Diss. et.
ven. 9. per duo

medio intestinorum (non vt Cicero ^e medium inte
stinum, quasi peculiare sit intestinum) cum in ista
circuli inter ^d intestina medium [t. 16. fig. 1.] ad poste
riorem ipsorum sedem sitū sit, eaq; in orbem com
plectatur: dicitur & μεσάραιον, ^e à peculiari substan
tia; Lactes Gaza apud Aristotelem ^f reddidit. Huius
figura [t. 15. fig. 1. Q. 2.] circularis plana, in plicis con
tracta; at circa exortum angustum est, in medio am
plum, & in lateribus potissimum sinistro, vbi ad re
ctum [t. 16. fig. 2. Q. & R.] descendit, oblongum fit; id
circo Galenus ^g triplex dixit.

Principium ipsius ad primam & tertiam lumbo
rum vertebram, est à peritonæo, ^h vnde membranæ
fibræ producuntur, quæ in duas [t. 16. fig. 2. T. R.] me
senterij membranas abeunt; vnde lumborum & in
testinorum magnus consensus; cum inde quoque
nerui ad mesenterium ferantur; cōponitur enim ex
mēbranis ⁱ, neruis, venis, arterijs, glandulis, & adipe.

Membranas habet ^k duas [t. 16. fig. 2. T. R.] mutuo
accumbentes (in canibus vbi vasa non admittit, ita
connatæ sunt, ac si simplici membrana constaret, cū
adipe destituatur) easque firmas & robustas; tum ad
vasorum robur, cum vasa ^l permulta frequenti con
cursu deferantur ad intestina, quibus instar vincu
li ac validi munimenti est; tum ne intestinorum fi
tus in

ait mesenteria tum id quod ad dextram situm habens primariū, est coli partium:
tū id quod est omnium intestinorū medium, nam tertium mesenterium quod prope
sedem pertingit, in sinistra situm, nullam inde assumit arteriam. ^h Mesocolon ex
neruis à spina sub ventre procedentibus. Hippoc. de ofs. nat. & 6. epid. sect. 4. aph. 6.
vult ex ligamenti prodire ad spinam. Fallopio duplex est mesenterij origo, supe
rior circa primam, inferior circa tertiam lumborum vertebram, & quidem à ner
uoso plexu: idem voluit & Archangelus. ligamenti lumborum vertebrae conne
ctentibus, & os sacrum ilij ossibus committentibus, Laurent. i Ar. 1. hist. 16. La
tine ex membrana & pinguedine: & 4. part. 4. membrana est. ^k Gal. 4. vs. par.
20. & 6. ad anat. 6. quare nonnullis peritonæum duplex dicitur, vt Laur. 1. Ar. 1.
hist. an. 16. pendent ex vena maiori atq; aorta, venaq; permultas frequente con
cursu

tus in violentis motibus confundatur, & ea fortius dorso alligentur.

Venæ Mesaraicæ [t. 13. ddd. & t. 16. fig. 2.] per has diffusæ sunt innumeræ tenuissimæ veluti arboris^m cuiusdam radicum tenues extremitates, quas natura, vt in arboribus exiguas radices in crassiores colligit; ita hæc vasa sensim in^m maiora, & ea rursus in alia maiora cogit, vsque dum omnia in vnam venam, quæ ad portas abit, & ad Hepatis simā est, coegerit. ⁿ Arteriæ duæ, [t. 14.] Mesenterica superior & inferior ad intestina mittuntur, quæ Mesaraicas constituunt, quæ per Mesenterium quoque excurrunt, vt assiduo suo motu ventilando; & spiritū vitali illustrando, Mesenterium & Intestina à corruptione tueantur, quæ etiam omnes^m in vnam eamq; magnam dorso incumbentem iunguntur; quas Galenus^o aliquando ex vna radice statim bipartiri, aliquādo statim ab initio duplices obseruauit.

Nerui item P plurimis furculis sparguntur; duo quidem vtrinque singuli, ab ijs, qui à sexto pari costarum radicibus exporriguntur, qui membranæ modo dilatati, arteriarū ramos inuestiunt, quo nerui frigidiores, arteriarum contactu calidiores redditi, facilius vim animalem à cerebro manantem, intestinis communicent; tum à neruis q è lumborum vertebris prodeuntibus, idque sensus causa, quo molesta sentiens expultrice excitata, ea in intestina deponat. Hi cum venis & arterijs simul Mesenterij [t. 16. fig. 1. & 2. H.] centrum subeunt, per totum diffunduntur, & numerosa sobole inter eius tunicas ad intestina feruntur.

Glandulæ [t. 16. fig. 1. & 2. KK.] plures (ad quas venulæ etiam à^r mesaraicis capillorum modo præternues perueniunt) infinitis ramorum venæ portæ & arteriæ magnæ diuarcationibus interiectæ, propor-

curfu deferunt.

2. part. 3. & 4.

eius. 4. plena venarū multarum ac frequentium.

m Gal. 4. vs.

part. 20. 6. ad

anat. 6. & dis.

ven. 1. non so-

lū Hippocra-

tes, sed qui-

cunq; Anato-

mici celebres

fuerūt arboris

trunco assimi-

larunt. &c.

n Gal 4. vs.

part. (ait Ve-

sal.) vult in-

testinis & me-

senterio venas

offerri in iecur

non determi-

nantes: forte

aliquas cana-

propagines in

intestina disse-

minari indi-

cavit, quæ ipsi-

exutriedu cō-

ducerent: qua-

me adhuc la-

tent.

o lib. 6. ada-

nat. 6.

p Gal. 6. ad

anat. 6. exi-

guis admodū

s. vs. part. 2.

q Hos pleriq;

ignorarunt.

r Gal dis. ven.

1. & 6. ada-

nat. 7.

TABULA XVI.

Mesenterij exitum, situm, connexionem & vasa ostendit, intestinis à medio ventre seorsum & deorsum ad latera deductis. Fig. 2. Mesenterium è corpore exemptum exhibet.

FIG. I.



FIG. II.



tionem in magnitudine cum distributis propaginibus seruantes; horum tamen maxima [*t. 16. fig. 1. & 2. 11.*] ad ipsius centrum, vbi prima fit vasorum distributio, & vbi magis vasa collecta sunt: tum vt vasa fulciant ^f & diuidant: tum vt eorum compressionem impediant, ne chyli distributio retardetur; unde his [*t. 16. fig. 1. & 2. 11.*] aliquando scirrhus patientibus totius corporis absumptio sequitur: tum cum plurima vasa sublimia ^f atque erecta, atque tenuia ad Portæ truncum producantur, quæ longo interstitio à principio distant, tutum non fuit sine præsidio deduci; quare ^f glandulæ veluti cunei quidam ipforum diuisionibus incumbunt, ne in violentis ^t motibus collidantur, vel disrumpantur: & denique vt intestina humectent, quo ipforum concoctio fiat elixatione, hoc est, in calido & humido.

Adeps copiosus ex sanguine hic è vasis elabente, & membranarum densitate retento, his circumfunditur, quo media spatia impleat, & illarum partium calorem foueat, ad chyli qui per eas partes fertur præparationem pro sanguificatione.

Hoc licet vnum sit & continuū, tamen & ratione duplicis exortus, & ratione intestinorum, q̄ connectit & ratione duarum arteriarū diuidi potest ^v in id, quod tenuia intestina [*t. 16. fig. 2. L. M. M.*] in medio ventris, & μεσάρειον dicitur, & in id quod colon [*t. 16. fig. 2. N. ad O.*] in dextro & sinistro [*t. 16. fig. 2. P. ad Q.*] latere (non autem sub ventriculi fundo, cui omenti [*t. 16. fig. 2. O. ad P.*] beneficio nectitur) connectit, & inferiori sede [*t. 16. fig. 2. Q. ad R.*] recto intestino ad-

no ad-

*f Gal. 4. vs.
part. 20.*

*t Fallopius,
hunc usum
multū videri
ait. Archangelus aliquot
reijcit vtili-
tates: vt non
datas esse, vt
vena rectius
diuidantur, al-
lias in omni
venarum di-
ductione &
propagatione
forent, quod
non est: nec
ad ipsoꝝ di-
ductionem tu-
telam; quia
multa vena-
rum diductio-
nes sunt, quæ
his glandulis
priuata sunt:*

Laur. vt sint

*veluti ligamenta vasorū, ne in violentis motibus disrumpantur. v Gal. d. ss. ven.
& art. 9 in dextram, sinistram & mediam. Columbo, in tres partes diuisum, quorū
pars color: alia tenuia intestina: tertia vero crassa continet. Archangelus, ratio-
ne d. orum intestinorum & ratione originis duplex videtur, sed quia origines illæ
statim*

no adnascitur, & μεσώκωλον Hippocrati, x dicitur: partem etiam habet, y quam Mesenterij [t. 16. fig. 2. Q. ad R.] appendiculam nominant, ligamenti natura præditam; quare Galenus z in dextram, sinistram & mediam diuisit.

Vfus ipsius est, intestino tanquam communi ligamento inuicem colligare, & lumborum vertebris annectere, ne vel temere implicentur, vel ob pondus deorsum labantur, excepto colo, quod ea fede, qua ventriculo subtenditur, per omentum dorso colligatur; dein geminis suis membranis, vasa, quæ per eas feruntur, intersepire & aa fulcire, ne simul complicata se mutuo impedian; & quo tuto ad intestina pertingant, & ne illa, dum homo salit aut cadit, disrumpantur.

statim coeût,
idecirco vnum
existimatur.
x De ossium
nat. & 6. e-
pid. sect. 4.
aph 6.
y Gal 6 ad
anat. 6.
z De digest.
ven & art. 9.
per medium
existimat Ve-
salus illi in-
telligere, quod
ieiunum &
ileon colligat.
aa Gal. 4. v. f.
part. 20.

De Pancreate.

CAPVT XIX.

De hoc egit Galenus 5. v. f. partium, cap. 2.

PANCREAS, a quasi totum carnosum, ob similitudinem quam habet cū carne in corpore moderato, etsi in pingui pinguedo videatur: dicitur & b παλλίκεας. Corpus est c informe & laxum totum d glandulosum (quare Pandenon dicendū potius Archangelus censuit) & magnum, ad primam lumborum vertebram enatum: quod posteriori ventriculi parti eiusque fundo, duodeno [tab. 35. fig. 1. 2. t. 37. fig. 2. S.] & Venæ portæ ad renes vsque ad hepatis & lienis sedes diffusum subiicitur. Hoc in hominibus minus, quam in canibus rubet; & in brutis propter prouum incessum ventriculo superiacet: quod

a Gal. 4. v. f. part. 11.

b & πιν-
κεας dis. ven.
1. Columbo
affusio & la-
etes.

c Caro que-
dam informis
& laxa ante
lienem portus
& iecoris, cir-
ca multa va-
sa concresecit,
quemadmo-

I 3

vero

dum circa radices umbilici in fœtu secundina. Quare propter eandem necessitatem in nobis fuit, propter quam Hippocr. docuit in fœtu secundinam fieri, cum v-
triusque

triusque sub-
stantia pror-
sus similis sit,
utrumq; col-
ligatur proxi-
me antequam
alimentum
extrinsecus
adueniens ho-
par ingredia-
tur. Varolus.
d Gal. s. v. s.
part. 2.
e De dissect.
v. n. 1.

vero medio album est, ipsius est parenchyma; & propter candorem ac mollitiem quibusdam Lactes dicuntur. Venas habet e à vena portæ exiles, pro nutritione: arterias à Cœliaca, pro vita: nervos à sexto pari, & glandulas.

Vsus præcipuus, ramorum venæ portæ, Cœliacæ arteriæ & nervorum, qui ad ventriculum, duodenum, & potissimum renum splenicum, qui ad lienem fertur, quemadmodum & vas bilem continens, cum omnium ibi sit diuisionis principium, diuisiones fulcire, & à comprimantibus illæfos conseruare.

Dein quatenus est glandulis confertissimum, reliquias pinguedinis cœnosæ (seu crudiores pituitosioresque sanguinis portionem, quam cœnosam humiditatem Hippocrates vocauit) quam omētum & mesenterium continere non potuerunt, depasce-re, quo postmodum in internas partes purior sanguis illabatur. Tum vt ventriculi actio seu chylicatio elixatione fiat, hoc est, in calido & humido: dum enim crudiores & humidiores sanguinis portionem depascuntur; ab his infiniti vapores humidi & calidi expirant, qui vetriculo circumfusi eum complectuntur, ac si in balneo Mariæ foret. Tandem ventriculo f aliisque subiicitur puluinaris instar, ne is repletus lumborum vertebri innixus, eorum duritie lædatur; sic ventriculum & aortam intercedit, ne aorta à ventriculo plus iusto repleto comprimatur, sicq; spirituum vitalium liberior transitus ad inferiora impediatur.

Fallopium
hunc usum
non admit-
tit, quia in
brutis supra
ventriculum
iaceat: &

Archangelus

relicti, nam sic in brutis quæ prona incedunt, frustra esset: Crediderunt nonnulli falso pylorum ne quid inconcoctum effluat, occludere, ait Vesal.

De venæ

*De vena caueramīs per infimum ventrem
disseminatis.*

CAPVT XX.

*De origine venarum ex quonam viscere ortum ducant,
egit Galenus toto lib. 6. de placitis, Hippoc. & Platonis;
quemadmodum de distributione venarum per totum
corpus lib. 16. de vsu part. 13. & 14. libello item de dis-
sect. venar. & arter. à cap. 2. ad 9. Apud Hippocratem
multa & obscura habentur in libris de locis in homi-
ne, de sacro morbo, de ossium natura, & de natura
hominis.*

VENA CAVA, quæ κοιλὴ ^a καὶ μεγάλη, ^b caua & magna, ob insignem cauitatem veteribus & Galeno; cui nonnunquam ^c μεγάλην maxima dicitur. Hippocrates ^d ἡπατῖτιν, iecorariam nominauit. Hæc omnium venarum, excepta vmbilicali & vena portæ mater; principium aliud habet ^e γενέσεως, originis, semen ipsum, sicque eodem tempore cum reliquis spermaticis orta, cum hæ eodem tempore generentur, sed non ^f simul perficiantur, & exornentur: aliud ^e διοικήσεως & ῥιζώσεως, id est, dispensationis & radicationis, ipsum Hepar, eiusque nomine à ^h gibba Hepatis, vbi maior & crassior ipsius substantia, enata dicitur. Nam licet cauæ orificium ad dextrum Cordis sinum multo sit amplius, quam illius corporis amplitudo vllibi sit, non tamen exinde sequitur ex dextro cordis ventriculo eam, vt Aristotles ⁱ voluit, prodire.

I 4

Ad ca-

alius vult interdum quemadmodum & portam στελεχικῶν & ἡπατικῶν dici: nonnunquam caudicis venam. ^c Galen. de form. fact. 4. & libr. 7. de placit. 3. ^f Hippocr. 1. de dietæ tex. 23. de loc. in hom. 1. Arist. 2. gen. anim. 1. ^g Hippocr. ^h Gal. 4. vs. part. 2. 5. eiusd. 2. 6. de placit. 3. caua nulla certa designatur origo, cum sit generalis vena vniuersum corpus peruadens. Plater. ⁱ Arist. 3. hist. 3. 2. part. 9. & 3. eiusd. 4. 2. gen. an. 4. & cum eo Vesalius, qui dicit Galeni cōmentum falsum, quo cauam qua hepatis gibba cōmittitur, amplissimā esse astruit, & idcirco è corde

^a Gal. 14. vs. part. 7. diff. ven. 1. 6. loc. aff. 5. καὶ ἀδ. 5. vs. part. 2. ^b An. 1. hist. 16. qui à Porta vena non distinguit, vult enim ab hac & aorta (ita appellat venas & arterias) venas ad intestina ferri.

^c Gal. 4. vs. part. 5. ^d 2. Epid. & Gal. ἡπατῖ- τος καὶ καὶ καὶ. diff. ven. 1. V.

corde prodire
negat, quod
non similiter
ab aorta ena-
scatur, hoc
est, quod mox
ab ortu in 2.
truncos nō di-
uidatur, sed
recta secundū
cudis latera
ducatur. Sed
hac de re
Archangelus,
Laur & alij.
k Gal. 6. v. f.
part. 4.

l Gal. 16. v. f.
part. 14. &
Arist. 2. part.
4. & 6. 3. e-
iusd. s.

m Caua ra-
mi per hepar
exporrecti por-
ta ramis in-
cumbunt, &
vtriusq; vena
ramulorum
extrema oscu-
lis inter se cō-
ninent, &
multis locis
continuari

iam disseccantibus apparent. Vesal. p. 4. 58. n Sanguinem ex porta propaginibus in
caua soboles assumi adhuc credo, ait Vesalius part. 457. o Gal. 4. v. f. part. 5.

Ad Cauæ vero constitutionem [t. 33. fig. 2. & 3. &
tab. 34. hoc ostendit.] ex summis & orbicularibus hepa-
tis finibus, in gibba sede [t. 13. f. 2. CC.] innumeræ ve-
nularum [t. 33. f. 4. CC. 34. EEEE.] propagines antror-
sum disperse & sensim versus medium posterioris se-
dis [t. 34. CC.] ipsius hepatis prorepentes in insignio-
res venas coeunt; & hæ rursus in maiores, donec in
clatiore hepatis parte, qua dextram dorsi sedem re-
spicit, in duos insigniores [t. 33. fig. M. N.] ramos, alte-
ro in dextram, altero in sinistram hepatis sedem dis-
perfo, abeunt, qui in vnum caudicem [t. 33. f. 2. F. 4. A.
t. 34. A.] desinunt, qui venæ cauæ truncus dici con-
suevit. Quare cauæ truncus à dextris ^k ad postero-
rem hepatis partem se applicat, & quasi sinum in-
greditur, eiusq; substantiæ breuissimo ductu connas-
citur, qui secundum dorsi longitudinem situs, re-
cto ductu per vtrumq; ventrem fertur, quo dum to-
tam animalis longitudinem percurrit, sanguinem
l omnium partium nutrimentum in radicibus [t. 33.
f. 4. FF. t. 34. KKKK.] venæ portæ in hepate elaboratū,
& per cauæ radices, [t. 33. f. 4. CC. t. 34. EEEE.] quæ per
hepatis carnem confuse sparguntur, implicantur, &
cum Venæ Portæ radicibus multis [t. 33. f. 4. & t. 34.
hoc ostendunt.] in locis in transuersum se contangunt;
m multæ quoq; venæ portæ radices extrema sua in
medias [t. 33. f. 4. GGGG. & t. 34. LLL.] cauæ radi-
ces, quemadmodum multæ Cauæ in medias Por-
tæ infigunt; quo per has anastomoses ⁿ sanguinis
fiat transitus, quem acceptum per totum corpus
suis ramis diffundit. Caua enim est ceu ^o aquæ
ductus quidam sanguine plenus, qui riuos habet
quamplurimos à sese manantes paruos & magnos
in omnes

in omnes partes distributos: cum summa P namque p Gal. 16. vs.
 æquitate natura paruulas venas distribuit, cū omnes part. 14.
 partes alimento indigeāt, & nutriri necesse sit, quod q. Gal. dissect.
 ea vacuentur, & oporteat alimentum æquale esse co- ven. 1. 16. vs.
 piæ eius substantiæ, quæ defluit, quare tantum mit- part. 14. 6. de
 tit alimenti, quanto indiget. Sic cum à calidis ac mol- placit. & com.
 libus corporibus, & iis, quæ assidue aut vehementer 3. in lib. de art.
 mouentur, vt exempli gratia, à pulmonibus multum Falsum est,
 defluat, venam habent maximam: at quæ frigida & (ait Vesal.)
 duriores, & quæ moderatas edunt actiones, ipsorum quod Galenus
 substantiæ minimum dissoluitur, vt ossa; quare exi- cauam statim
 guas valde habent venas; in quorum medio omnes ab exorta in
 reliquæ sunt partes, quarum aliæ magis, aliæ minus duos trunco
 vacuantur & alimento P indigent. Aorta modo
 findit in supe-
 riorē & in-
 feriorē, & hęc
 grandiorē esse
 & qui ascen-
 dit strictiorē:
 nam quod di-
 cit descendētē
 plures partes
 nutrire quam
 ascendētē
 falsum: cū sub
 hepate pleraq;
 partes Porta
 ramis nutri-
 antur.

Hanc doctrinæ causa in [t. 7. lib. 2. A.] truncum q
 superiorem [t. 33. f. 3. D. f. 4. A. t. 34. supra A.] & inferio-
 rem [t. 33. f. 1. ad C. f. 4. B. t. 34. DD.] diuidimus: ille Dia-
 phragma pertransiens, & sursum conscendēs, quam-
 plurimos ramos in omnes superiores partes distri-
 buit, de quibus in Thoracis historia dicitur.

At truncus [t. 17. K.] descendens (qui respectu as-
 cendentis angustior est, cum partes superiores plus
 sanguinis requirant, plerisq; partibus in imo ventre
 contentis, à vena portæ ramos accipientibus) à dex-
 tris vertebrarum corpori adhærens (cui à sinistris
 [t. 17. L.] Arteriæ magnæ truncus accumbit) ante-
 quam hepati non amplius connascatur, paruos ra-
 mulos in eius substantiam dispergit, qui non in o-
 mnibus eodem numero sunt. Mox hepati non am-
 plius connatus, nonnihil oblique introrsum con-
 tortus descendit, & plures de se ramos deorsum
 spargit, de quibus nunc.


Truncus [t. 17. K. t. 7. lib. 2.] venæ cauæ inferior
 diuiditur in Truncum & Ramos: à Trunco, qui ad
 magnam vertebram, vt Hippocrates^r loquitur, seu
 I 5 os sa-

r Harum ve-
 narum ductū
 exposuit Gal.
 de diss. ven. 8.

f Hippocrat. 2.
 epid. sec. 4. ait:
 lecoraria per
 lumbos ad ma-
 gnam vsque
 vertebram

TABVLA XVII.

Venæ cavae & arteriæ magnæ ramos per infimum ventrem disseminatos proponit.



deorsum fer-
tur: ex hepate
vero sublata
per diaphrag-
ma cor recta,
dein ingula
petit.
Eustachius
contrariū vult
dextrā à trun-
co, sinistram ab
emulgente pro-
dire statuens.

os sacrum [t. 17. n. t. & 7. lib. 2. o.] excurrit, communi-
ter vtrinque; quatuor venæ prodeunt.

I. Adiposa sinistra [t. 17. g. t. 20. & 21. l. tab. 7. lib. 2. n.]
ex sinistro trunci latere prodit, mox diuisa partem
priorem ad adipem & ad exterioris membranæ renū
superiorem partem nutriendam, vsque ad renis me-
dium furculos mittit, vt & ad glandulam reni im-
positam: ad ipsum quoque diaphragma [tab. 17. A.] qui
interius satis insignes apparent & cū venis diaphrag-
maticis vniuntur.

Alteram vero partem in humiliorem membranæ
sedem distribuit. At dextra raro à trunco, sed ab elati-
ore parte, & medio ductu emulgentis [tab. 17. f. t.
20. h. t. 21. k. tab. 7. lib. 2. n.] oritur, quia hepar hoc loci
crassius [tab. 17. B. C.] viam ad cauam præcludit, quare
sinistra dextra plerumque superior, eodem modo,
quo sinistra distribuitur, aliquando etiam glandulā
reni impositam furculo perforans, qui tandem in
membranam exteriorē renis absimitur. Raro v-
traque ab emulgente producitur: adhuc rarius duæ
venæ à caua supra & prope emulgentis ortum, pro-
deunt, quæ in hanc membranam distribuuntur: qua-
rum superior, glandulæ propaginem largitur: infe-
rior vero furculo ei ramo, qui à spermatica eiusdem
lateris occurrit, cingitur.

Quod si emulgens sinistra ^u altior sit, tum ali-
quando ex ea adiposa sinistra originem ducit, ipsa
vero dextra à trunco. Si nonnunquam à dextris
inter adiposam & emulgentem alia vena prodit, quæ
in diaphragma, superiorem partem substantiæ renis
& in glandulam eius lateris ramulos dispergit. Mox
vbi cauæ truncus ad duodecimam thoracis & primā
lumborum vertebam peruenit, tum ex ea prodit.

II. Emulgens ^x ab officio, seu renalis ab insertio-
ne dicta, quæ omnium à trunco ^y prodeuntium

[t. 17. d.]

^u Aliquando
ab emulgente
vna oritur
Gal. de diff.
ven. 8.

^x Væ veno-
sum maximū
Galen. 14. v.
part. 7.

^y Galen. diff.
ven. 8. ἀρσεία
φλεβὸς & μα-
xima arterία
& vena in re-
nes. 5. v. part.
5. idem in Hip.
de nat. hum.
com. 2. tex. 12.
at 6. ad an 13
vena & arte-
ria in renes
haud exigua
magnitudinis.

[t.17.d.e.t.20.m.n. t.21.b.i.t.7.lib.2. θ. 1.] amplissima est, admodum crassa & brevis quia sunt veluti ^z stomachi attrahentes è renibus inseruientes, cōmuniter in homine & simia, quēadmodū & Arteria vtrinq; vna [t.17.sub.d.e.] aliquando tamen dextra ab exortu [t.22. fig.1.ch.1.2.] duplex, aliquando triplex, rarius vtrinq; gemina, quæ varietas nō modo in diuersis cadaueribus, verum etiam in vno & eodem reperitur: ita vt vasa dextrī lateris, ab iis, quæ à sinistris sunt, plurimum variēt. Horum exortus è directo sibi raro correspondent, ne alterius ^{aa} functio impediatur: siquidem sinistra dextra ^{bb} altior, in homine non vero canibus: cum sinister ren ob lienis paruitatem altior sit: dexter vero, cum hepatis magnitudini [ta.17.] cedere debuerit, inferior. Est quoque sinistra longior, ob venam spermaticam, quæ [tab.17.i.] inde prodire debuit. Nonnunquam etiam ab emulgentis sinistra humiliore sede, qua in renem implantatur, ramulus prodit, qui ad inferiorem pinguis membranæ partem mittitur, & sæpe cum spermatica iungitur. Vtraque emulgens breui & obliquo [vt tab.22. ostendit] itinere, (quo pictor non obseruauit) delata, circa mediam & concavam [t.21.ee.] renis sedem sæpe in ramos, antequam eorum cauum ingressæ sint non diuisæ, sæpe in medio ductu in duos ^{cc} aut tres, ^{dd} rarius quatuor aut quinque æquales ramos diuisæ, productæ, quasi anchoris quibusdam, vt Hippocrates ^{dd} loquitur, iactis in eorum ^{cc} cauitatem, quasi diuisis renum partibus vna cum vena ipsa arteria, descensu (non ascensu, quod rarum est, & tum quando humiliore loco prodiit) implantatur, hiq; in renum substantiam numerosa ramorum serie, donec in capillares abeant, digeruntur. Hæ è caua serum è sanguine emulgent & alliciunt, vt illum excolent, simul & sanguinis portionē pro renum nutritione deferūt.

^z Gal. 16. vs. pari. 14.
^{aa} Gal. 14. vs. par 7.
^{bb} Si dexter ren, vt plerumque accidit sinistro elatior, tunc emulgens dextra elatior & contra Vesical & addit. si sinistra emulgens sit superior, tum adipsam sinistra ex ea prodire.
^{cc} In tres quatuor & quinq; nonnunquam diuisa, Colum.

^{dd} De of. natura.

^{cc} Galen de ren aff. 3 at Arist. vena, renum cauum non subeunte
 3. hist 4. & 3. part. 4. sed intelligere videtur sinum, in quem vrina percolatur.

At ne

ff Gal. de diff.
ven. 8. ostendit
differentiam
huius vene in
similis & aliis
24. vs. part.
gg de dissect.
ven. 3.
hh Gal. semel
notauit, dex-
tra à trunco
accessisse: &
Vesalius sper-
maticam dex-
tram totā ab
emulgente.

ii Vasa semi-
naria in mu-
lieribus nō fe-
runtur in te-
stium caput,
sed deorsum in
matricis sub-
stantiam. Co-
limb.
kk Per singula
foramina sin-
gula, de diff.
ven. 8.
ll An de his
Hippoc. lib. de
genitura.

At ne in cauam remeet, natura valuulis in emulgen-
tibus locatis, quemadmodum & in venis splenis ob-
seruauimus, prospexit.

III. Spermatica^{ff} seu seminalis, quarum dextra
[t. 17. h. t. 20. & 21. o. t. 7. lib. 2. μμ.] quæ aliquando 88 du-
plex, ex ipsius trunci eminentiore sede [tab. 20. ad u. t.
21. p.] extuberante origine infra emulgentem, rarif-
sime ad emulgentem, à qua tamen nonnunquam^{hh}
& ramulum acquirit, enascitur, sinistra [tab. 17. i. t. 21. q.
tab. 7. lib. 2. λλ.] ab emulgente fere mediā humiliore
sede oritur, idque ne Aortam [tab. 17. L.] supergre-
diens propter venæ paruitatem periclitetur: à cuius
perenni motu vel disrumperetur, vel à proprio ma-
nere impediretur: huic etiam aliquando & ramulus,
à trunco [t. 20. x. y.] prodiens iungitur, Hæ oblique
descendentes & peritonæi productiones [t. 20. y. t. 22.
fig. 2. λ. tab. 7. lib. 2. ad μ. λ.] transeuntes supra os pubis
ad testium caput in varios anfractus conuoluta, cor-
pusq; varicosum [tab. 17. lib. 2. y.] adeunt, eō seminis
materiam à toto corpore deferentes, vt plenius libro
de partibus similaribus ostendimus. At in mulieri-
bus, licet idem sit exortus, [tab. 26. G. fig. 2. & 3. aa.]
peritonæo tamen non excidunt, nec ad pubis ossa
pertingunt, sed membranis pinguib; suffulta, alte-
ra portioneⁱⁱ ad testes [tab. 25. dd. ee. tab. 26. I.] altera
ad vteri fundum [tab. 25. ll. tab. 26. fig. 1. H. fig. 2. H. &
fig. 3. bb.] disseminatur: quin etiam furculos graciles
peritonæo [tab. 26. fig. 2. bb.] ac tunicis testes, ac vasa
hæc ambientibus largiuntur.

IV. Lumbares duæ [t. 17. mmm. t. 7. lib. 2. ξ] aut
tres^{kk} ab ipsius inferiore sede vertebrae spectante,
inter quatuor lumborum vertebrae geniculatim per
foramina neruis in vertebrarum lateribus exsculpta
ad spinalem medullam irrigandam, feruntur. A qui-
bus venæ duæ^{ll} ad spinalis medullæ latus vtrinq; vna
in ce-

in cerebrum ascendit, forte ^{mm} portionem materiae ^{mm} Arist. 10. prob. 5. 6. vi-
 seminalis à cerebro deferentes. <sup>sum semen la-
 bi per spinam.</sup>

Post has truncus ad sacrum os descendens [t. 17. u.]
 ad quartam lumborum vertebra[m] (ne ossis duritie
 & continuo arteriae motu lædatur) arteriae magnae
 [t. 17. ch. 14.] se subiicit, & in duos æquales ramos Iliac-
 os [t. 17. p. t. 7. lib. 2. O.] diuiditur: & literę A vel X inuer-
 si figuram referunt, qui oblique supra os ilij & pubis
 ad crus abeunt, ex quibus vtrinque ante diuisionem
 venae duae prodeunt.

I. Muscula superior [t. 17. np. np. tab. 7. lib. 2. π.] quae
 statim in ipsa diuisione à rami latere exteriori, non-
 nunquam à trunco, ante cauae partitionem prodit &
 transuersim per musculos ⁿⁿ lumborum & abdomi- ⁿⁿ Gal. diff.
 nis & peritonæum disseminatur: at non idem est v- ^{utr. 8.}
 trinq; exortus: & in canibus manifestior est.

II. Sacra [t. 17. oo. tab. 7. lib. 2. φ] quae parua, modo
 simplex, modo gemina, per superiora & anterio-
 ra foramina ad ossis sacri medullae nutritionem
 mittitur.

Tum vtrinque truncus Iliacus [tab. 17. r.] in pro-
 gressu bifurcatur in ramum exteriorem [tab. 17. c.
 tab. 7. lib. 2. c.] & interiorem [tab. 17. p. tab. 7. lib. 2. p.]
 hicque illo gracilior est ab interiore ramo venae duae
 prodeunt.

I. Muscula media [tab. 17. fff. tab. 7. lib. 2. τ.] inter-
 ioris rami exterior propago, quae in musculos fe-
 moris exteriorem coxae sedem occupantes, natium
 cutem, partesq; vicinas frequentibus ramulis trans-
 uersim [tab. 17. ff.] fertur.

II. Hypogastrica [t. 17. uu. t. 7. lib. 2. ι.] interioris
 rami interior propago, vena est insignis, aliquando
 gemina, quae cum in omnes fere hypogastrii partes alē-
 das distribuatur, multifariam diuiditur: huius pars alte-
 ra ad intestini recti musculos fert & hemorrhoidales

exter-

on Medici ha-
 dunt aut an-
 tiqui, Hyme-
 nis in uero
 cōfingen-
 tentō peruiūt,
 ans, quo
 quic
 quam ex uteri
 junctio per ip-
 sū cervicē deflue-
 re possit, &c.
 Sed cum hyme-
 carnea sit mē-
 brana trāsuer-
 simplicita, ob
 longa sectione
 peruiā, facile
 sanguinē trans-
 mittit, quem
 admodum al-
 bum profluuiū
 in puellā, quod
 admodū puel-
 lis obuenire,
 Aristoteles no-
 tauit. Vesal.
 p. 476.
 pp Gal de dis-
 ven. 8.
 qq Hippoc. &
 Gal. hoc volue-
 re. Vesalius
 dubitat, in nō-
 nullis mulierū
 cadaueribus
 nunquam hāc
 unionem se in-
 uenire potuisse,
 ait Columbus.
 Fallo. in instit.

externas constituit, per quas sanguis aliquando ab-
 undans & tenuis, ex caua huc decumbens sine dolo-
 re & torsionibus ventris, aliquando etiā sine dolore
 in ano (qui tamen in hæmorrhoidibus internis à ve-
 næ portæ ramo constitutis, adest) expurgatur: altera
 ad vesicam in viris & quidem furculis maioribus, in
 eius cervicem penemq; exporrigitur: in mulieribus
 vero parum deducta, pingui membrana [t. 26. EE.]
 suffulta, furculis quibusdam in vesicam, sed frequen-
 tioribus vteri humiliorem sedem, ipsiusque collum,
 [tab. 26. fig. 2. e.] per quas sæpe grauidis, & vt qui-
 dam volunt, virginibus menses expurgantur, dis-
 spergit.

Reliquum huius interioris rami ad os pubis abit,
 & ab externo ramo sobolem adsumit & simul [t. 17. y.]
 venam efformant, quæ peritonæum, dein decimum
 femoris musculum perforat, & ossis pubis foramen
 permeat.

Ab exteriori ramo [t. 17. p.] qui oblique crus ac-
 cedit, venæ tres, duæ antequam & vna postquam pe-
 ritonæo excidit, promanant.

I. Epigastrica [ta. 17. ch. 1. 2. tab. 7. lib. 2. ππ.] quæ ab
 elatiore sede externi rami, rarius à Crurali, emergit,
 peritonæo, abdominis musculis & cuti ramos offert.

Huius ramus præcipuus peritonæum permeans, v-
 trique sub recto musculo [tab. 8. II.] sursum fertur
 variis ramulis in transuersos & obliquos distributis,
 & circa vmbilicum aliquot furculis Mammariæ vene
 descendenti pp iungitur [tab. 7. lib. 2. μμ. t. 8. lib. 1. fig.
 2. cc.] per quas tantus sit vteri cum mammis qq con-
 sensus: siquidem hæ exitum habeant, ab ea diui-
 sione, vnde & illæ, quæ vterum & eius sinum acce-
 dunt, & extremis finibus cum extremis Mammaria-
 rum, quæ per internam thoracis regionem descen-
 dunt,

hanc unionem statuit. Laurentius dicit, multos existimare.

dunt, & ad mediū rectorum feruntur, quæ in descensu ramos per cartilaginum interualla ad mammillarum radices mittebant.

II. Pudenda [t. 17. ch. 15. tab. 7. lib. 2. ΔΔ.] quæ ab exterioris rami sede interna supra coxendicis os in femur prolapsi & peritonæum iam egressi, procedit, transuersum ossium pubis medium accedens, viris in scrotum, penisque cutim: & mulieribus in pudendi labra, nymphas, vicinasque partes numerosa sobole distribuitur.

III. Muscula inferior [t. 17. ch. 3. t. 7. lib. 2. Ω.] ab exteriori sede externi [tab. 17. ε.] rami deprompta, coxendicis articuli sedem peruadens in illius loci musculos, & cutim disseminatur.

Reliquas propagines ab utroque trunco [t. 17. ρ. ε.] prodeuntes, qui iam non amplius Iliaci, sed crurales dicuntur, in historia pedis explicabimus.

De arteria magna ramis, venæ cauæ ramos per infimum ventrem disseminatos committantibus.

CAPVT XXI.

Arteria magnæ per infimum ventrem distributionem Galenus explicauit libello de dissect. venarum & articularum cap. 9. libro 16. de usu partium cap. 10.

ARTERIÆ^a magnæ truncus [tab. 17. L. t. 18. R.] a^a ἀρτηρία πρὸς τὴν 14. de usu part. 7. ἀρτηρία Arist. 1. hist. anim. 16. ad undecimam thoracis vertebrā diaphragma [t. 17. ch. 4.] transiens, per infimum ventrem delatus, sinistræ vertebrarum corporum sedi innixus, & venæ [tab. 17. K. t. 18. Q.] cauæ sinistro [tab. 17. L.] lateri succumbens, vel ut ei locum det, declinans, priusquam ad penultimam lumborum vertebram, in nonnul-

K lis ad

lis ad os sacrum [t. 17. ch. 14. t. 18. l.] in duos truncos diuidatur Ramos septem profert, quorum alij venæ portæ ramos comitantur, vt sunt cœliaca [vide tab. 14.] & mesenterica duplex, qui ad ventriculum, mesenterium & intestina mittuntur, de quibus iam dictum fuit supra capite 16.

b Gal. 5. vs.
part. 2.

c Lib. de diff.
ven. 9. ostendit
quæ nam sint
venæ, quæ sine
arteriis per
corpus ferun-
tur.

d Duæ magni-
tudine præci-
pua ad renes,
dissert. ven. 9.
cur ea magni-
tudine effece-
rit, vide 5.
vsu partiū 5.
meatus ex ve-
na aorta vali-
di Aristot. 3.
part. 9. arteria
in renes inser-
ta, omnium, qua

Alij vero cauæ ramos peritonæo intestos comitantur, de quibus nunc; natura enim vbique fere cum venis arterias simul diuidit; partim b, quo membranæ, quibus venæ teguntur, ac vicinis partibus colligat, etiam arteriis sint vsui, partim vero, vt vasis sit conspiratio, ac materierum communio, cum paucae sint venæ, quæ coniuge careant arteria exceptis iis, c quæ summam cutim percurrunt: Omnium autem à trunco prodeuntium hic ordo est.

I. Cœliaca [t. 17. ch. 6. t. 18. 5.]

II. Mesenterica superior (t. 17. ch. 10.)

III. Emulgens seu Renalis [t. 17. d. e. tab. 18. a. b. sub venis] tam dextra quam sinistra, (raro enim tres vel quatuor, vel plures reperiuntur) insignis d & omnium, quæ à magna arteria oriuntur prope maxima, ab utroque truncilatre, vbi prima & secunda lumborum vertebra ligamento copulatur (raro è directo respondens) prodit, & oblique procedens ad cauitatem renum haud secus ac venæ diuisæ reni implantatur, & in eo absumitur, & magna ex parte, venarum e distributionem imitatur.

Harum vsus non tam vitalem spiritum deferre, quam serum, f quod copiose in Aorta continetur à vitali sanguine g expurgare: vix quicquam tamen

arte-

à maxima arteria oriuntur sunt prope maxima. Gal 2. nat. fac. 4. in renes maximum arteriarum iugum perrepat. 16. vs. par. 10. c Arteria non aliter, quam vena in renes inseruntur 14 vs. part. 7. f Arterias serum expurgare docet Gal 5 vs. part. 6. lib. contra erasistratum, an sanguis in arteriis. g Antequam ad sinistram cordis cauitatem accedat, Varolius, à corde serosam humiditatem vitali sanguini permiscam attrahunt, Archang & plerique feri in arteriis quam venis contineri, vult Laurent.

arteriæ renum membranæ pingui communicatur.

IV. Spermatica [t. 17. ch. 11. t. 18. h. i.] vtraq; h ex h Per paucis à
anteriori trunci, parte contiguâ [t. 20. a. 21. r.] prin- sinistra emul-
cipiis prodiit, quæ descendentes, dextra quidem ca- gente, ut Ga-
uæ truncum supergrediens, sui lateris venæ sperma- num voluisse
tica, quemadmodum sinistra sinistra venæ, mediante Columb. dicit.
peritonæo attenditur. Et in viris per peritonæi [t. 20.
2. 2. 22. a.] productiones testibus (quibus vt & tuni-
cis furculos præbent) flexuoso ductu applicantur,
vt ad eos sanguinem tum venalem, tum arterialem
cum spiritu vitali deferant, in fœminis vero, media
pars ad testes, altera ad vteri corpusⁱ fertur.

V. Mesenterica inferior [tab. 17. ch. 12. t. 18. K.]

VI. Lumbares [t. 17. mm. superius] posteriore
parte, quæ arteriæ trûcus vertebris committitur, per
foramina vertebrarum lumborum geniculatim de-
latæ, ad spinalem medullam, nec non musculos
vicinos & peritonæum distribuuntur; sed hæ quo-
que ad medullæ latus vna cum venis sursum ad ce-
rebrum feruntur.^k

i Et ab his ar-
terias umbili-
cales ortum
ducere voluit
Columbus, sed
vnde.

VII. Muscula superior [t. 17. mm. inferius.] quæ ad
lumbares etiam refertur, cæteris grandior, ad ab-
dominis latera, eiusque musculos frequenti sobole
excursit.

k Columbus
plures ramos
non recenset:
Muscul. m ad-
dit Laurent.

His ramis constitutis Arteria magna ad ossis sa-
ci principium [tab. 17. ch. 14. t. 18. l. t. 20. i.] cauam^l
ascendit, non propter^m dignitatem, sed ne ad os
cavum ascendens, cum perpetuò arteria moueatur,
l. t. 20. i. quo loci ratione partium quas perreptat,
l. t. 20. i. [t. 17. a.] dicitur, & vt caua supra corpus quar-
ta lumbæ vertebra in duos truncos instar a bi-
furcatione, sub cuius bifurcatione sacra [tab. 17. 00. tab.
17. 00. i.] prodiit, quæ suis furculis in ossis sacri fora-
mina, cuiq; medullâ fertur. Truncus, vero qui libet
[t. 17. a.] non procul à diuisione in ramum interiorem^{bus}

l De diff. ven-
æ art 9.
m Vesal hoc
voluit: ad os
vt scilicet ve-
na instar sub-
sterniculi ca-
uam arte-
riam insti-
subeat, per sua-
sum est omni-
bus.

[*t.17.p.*] graciliorem & exteriorem [*t.17.5.*] maiorem, qui crus petit, diuiditur.

Ab interiore duæ propagines prodeunt, exterior altera, altera interior.

I. Muscula inferior [*t.17.ß.*] exterior propago, transuersim [*t.17.f.*] ad exteriora inter os sacrum & coxendicis os in musculos ilium os & coxendicis articulum integentes, multis furculis distribuitur. Sic ad inguina nonnunquam ab alterutro trunco, ramus satis insignis oritur, q. cutim petit, & partes cutaneas ad pubem, ad ilia & abdomen pertinentes fouet.

II. Hypogastrica [*t.17.iii.*] eiusdem rami interior propago, omnium est amplissima, & recta deorsum in ossis sacri humiliorem sedem ad vesicam eiusque cernicem (nonnullis ad podicem, quæ etiam hæmorrhoidales dici possunt) & musculos os pubis tegentes distribuitur: at in mulieribus maior est & in vteri fundum numerosa sobole distribuitur, eiusq; ceruicem & vesicam furculis intertextit. Ramum quoque profert, qui sub bifurcata penis origine ad duo eius corpora caua mire implicata, vt veluti plexum efformet, ad glandem usq; defertur.

Reliquum rami interioris [*tab.17.p.*] deorsum repit, & arteriam vmbilicalem [*t.17.ad.x.*] secundum longitudinem. Aortæ delatam, & ad lateraⁿ vesicæ tutelæ gratia membranis fortibus alligatam, per quam foetus in vtero vivebat, & transpirabat, & in lucem edito in funiculum abiit, admittit, de quibus supra mox assumpta ab externo [*t.17.5.*] ramo vbi is in crus est prolapsurus propagine [*t.17.γ.*] quæ oblique deorsum mittitur, per pubis ossis foramen transit, & in musculos foramen id occupantes & vicinos, dispergitur.

Ab exteriori duæ propagines promanant; altera ante, altera postquam peritonæum permeauit.

I. Epi-

n Gal 15, vs.
part. 4. de diss.
ven 9.

I. Epigastrica [t.17.ch.2.2.] propago exterior sursum reflectitur, rectum musculum conscendit, & cū Mammaria circa vmbilici regionem præcipuis ramulis iungitur, reliquos furculo transuersim in humiliorem abdominis sedem dispensans.

II. Pudenda [t.17.ch.15.] interior est propago exigua, quæ non in tot ramos, quot vena diuiditur: hæcque transuersim & introrsum secundum pubis ossis commissuram ad pudenda, & in penis^o cutim absumitur: aliquando etiam arteriolæ ad inguinum glandulas mittuntur. Arteriæ reliquæ [t.17.ch.16.] in crus fertur, & cruales arterias constituit, de quibus in penis historia.

o Ne vna quidē cutim subit nisi forte exilis quæpiam in penis inuolucrū diffundatur. Vesal. 493.

De Renibus.

CAPVT XXII.

Renum historiam explicauit Galenus 4. vs. part. 6. s. eiusdem. 5. 6. 7. 8. libro de dignotione & curatione affectuum Renum, de vasis, 14. vs. part. 7. & 16. eiusdem 14. de vsu eorum 1. nat. facult. 15. 16. & 17. Administrationem 6. administrat. anat. 13. Aristot. 1. hist. 18. maxime 3. part. animal. 9.

RENES $\delta\alpha\tau\acute{o}\ \tau\acute{o}\ \rho\acute{\epsilon}\nu\epsilon\upsilon$, quod per eos vrina fluat, & $\epsilon\epsilon\phi\phi\acute{o}\iota$, quasi mingentes $\delta\alpha\tau\acute{o}\ \tau\acute{o}\ \nu\epsilon\iota\phi\epsilon\iota\upsilon$, à mingendo^a dicti, hominibus & omnibus quadrupedibus, a quæ animal generant, nullo autem pennato^b, nec squammato^b, excepta testudine, dati sunt. c Hi per raro eundem situm in hominibus seruant, & post intestina & d ventriculum paulum^e, sub hepate & lie-
ne [t.18. G.O.] iuxta^f spinam cauæ g & Aortæ late-


a Arist. 2. hist. 16.
b Arist. 4. par. anat. 1. humeris in corticem regentem, ut auiibus in pennas absumitur, cum exi-

K 3

ribus guo potu contenta sint, propter exanguem pulmonis naturam. c Arist. 3. part. anat. 9 in nonnullis ambus caruuncula, quadam latiuscula speciem renum ostendentes sed cum nullam habeant vesicam, his renum munis tribui non potest. d Gal. de ren. affect. 3. e Gal. 4. vs. par. 6. iuxta hepatis 5. vs. par. 5. f Arist. 1. hist. 18. ad spinam paulo altius quam ilia Gal. de ren. affect. 1. g Gal. 4. vs. par. 6. 6. eiusdē 3. & 1. nat. fac. 15. & 17.

TABVLA XIIIX.

*Ventrem inferiorem à membranis intestinis &
ventriculo inanitus exhibet, & plera-
que vasa huius ventris
proponit.*



remouimus, quo vasorum emulgentium implantatio rectius conspici possit. Tres enim venæ emulgentes, & arteriæ duæ in eum infigebantur: harum venarum duæ ex medio venæ cauæ trunco [6. 6.] prodeuntes, rectaq; descendentes, lateri dextro implantabantur, tertia vero emulgens [9.] ex sinistro cauæ venæ latere promanans, sub aortæ trunco delata, & in descensu cum Spermatice sinistra paulum cōiuncta [16.] progrediens, in sinistram renis partem inferebatur. At arteriarum altera, sub bifurcatione ex ramo Iliaco dextro [7.] altera paulo supra bifurcationem in ipsa aorta [8.] originem ducens, illa simplex in dextrum latus, hæc in ramos aliquot diuisa, in latus sinistrum se insinuabat. Sic & vreter sinister brevis à renis parte inferiore [19.] prodiens, in vesicam [f. 20.] infigebatur. Denique eo loci ubi Ren sinister collocari debebat, eius loco natura substantiam glandulosam & adiposam [c.] constituit, ad quam & vena & arteria emulgens [4. 5.] ferebantur: quemadmodum & à vena emulgente superiore Spermatice sinistra [4.] ortum ducebat. An forte in ijs qui circa os sacrum summos per interualla dolores perferunt, & omnia nephriticorum signa habent, talis sit alterius renis situs.

Horum dexter P. proxime Hepati subiacet propter eius molem in homine [t. 20. & 21.] altero est P. inferior, ipsi tanquam nobiliori cedens, & ad tertiam lumborum vertebra suam fine descendit, rarissime in sinistro elatior est, & tunc quando breuior est, vel pars Hepatis ei proxima excauata est, raro etiam situ 9 pares sunt, propter hepatis & lienis positionem.

K 5

addunt

uant. Vesalio dexter sinistro elatior: plerumq; Archangelus idem sentit, Columbum qui contrarium voluit, arguens, huncque situm nature legibus consentaneum esse: Eustarchius, qui homines secant, sinistram altiore dextro saepe inueniunt, 9 Renum positio in aequalis, 16. v. s. part. 10.

p. Contrarium
habetur s. v. s.
part. 5. & 6.

14. eiusd. 7. 6.
admin. an. 13.
dexter in o-
mnibus ani-
mantibus e-
minet altior:
apud Arist. 1.
hist. 18. 3. par.
an. 9. quod in
brutis obser-

r Gal. 14. vs.
part. 7. & 10.
cinsid. 10.

addunt etiam aliqui, propter ^r elatiorem demissio-
remue vasorum emulgentium originem: sinister ve-
ro ex parte lienis substernitur, ^r qui frequentius (at nō
perpetuo) illo elatior, cum illic lien tenuis sit, ita vt
ad primam lumborum, nōnunquam ad vndecimam
thoracis vertebra[m] ascendat: neuter tamen vnquam
alterum adeo superat, vt dimidia pars alterius verti-
ce sit eminentior. At in brutis ob primum incessum,

f Arist. 1. hist.
28. 3. part. 9.
Ruff. 2 part.
22. Oribas. 24.
coll. 27.

& quia lien deorsum magis vergit, ^r contrarius eor-
um situs est, ita vt in canibus, quo dexter altius col-
locetur, sinus hepatis impressus est (qui in homine
nec sinum habet, nec diuisionem vllam) vt ren al-
tius ascendere possit. Verum causa varij situs, sunt,
renum magnitudo aut paruitas, vasorum longitudo
aut breuitas, eorumq; positio magis minusue obli-
qua. Connectuntur beneficio membranæ externæ à
peritonæo pronatæ; quæ instar vinculi in propria
sede firmiter eas continet) lumbis, diaphragmati, &

r Rēnes pro-
xime iecori
spēs Are-
tæus de acut.
morb. cur. lib.
2 cap. 8.

dexter quidem cæco intestino, nonnunquam ^r hepa-
ti: sinister ^u colo (quare dolores nephritici flatuū &
excrementorū copia exacerbantur; & colicus à Ne-
phritico sæpe nō distinguitur) & lienis; quamuis &
aliæ fibræ ^x adhuc à peritonæo in gibbam renū par-
tem inseruntur: caux vero & aortæ, per vasa emul-
gentia [tab. 18. ab. t. 20. m. n. t. 21. h. e.] ipsi vero vesi-
cæ, [t. 18. p. cd. t. 21. m. n. t.] mediantibus vteribus iun-
guntur.

u Laxum in-
testinum re-
nibus per tu-
nicam perito-
næum copula-
tur. Gal. in 6.
epid. com. 2.
text. 6.

Duo sunt, quia vnus purgando y tanto excremē-
to aquoso non sufficebat, cum serosus y humor v-
tramq; bilem excrementitiā copiā superet: sic san-
guinis serosi fortior attractio fit, & vtraq; pars in at-
trahendo æqualis est; sicq; ^z vno obturato, ipsius tñ
attra-

x Num ner-
ui ab Hippoc.
vocati lib. de
nat. oss.

y Gal. 5. vs part. 6. vide & de ren. aff. 1. z Non concedit Archang. quia natura
nihil sit molita contra causas maleficas, fortuitas, & spontaneas.

tractio & perfusio non cessat. Quod si vnus^a foret, a
quod rarū est) necessario ob vim feri attractricem
equisitam ambos magnitudine y æquare debuisset;
ut sic corpus y in æquilibrio non foret, nisi mediæ
pinæ^b imponeretur, cauæ & aortæ resimâ facie in-
cumbens: hic vero situs tum sanguinis, tum spiritus
per cauam & aortam descensum liberio rem, cōpres-
sione impediuisset; quare Natura pro magno duos
paruos creauit, ne aut venter eminentior esset, aut a-
nimal in alterutrum latus inclinaret. Verum æque
rarum est, tres^c aut quatuor dari, sed eam conforma-
tionem non retinent; Tres semel notauit Eusta-
chius; quorum dexter naturaliter se habebat; sinister
solâ substantiâ renem referebat; vretre carens & fi-
guræ triangulæ; ex tertio, qui pene figuræ quadra-
tæ, vretre prodibat. Figura^d oblongi sunt, lati;
superiore tamen parte latiores, quam inferiore: an-
terius & posterius compressi, sed antèrèius eminen-
tiores, phaseolorum figurâ, exterius (quam par-
tem deorsum [t. 21. fig. 1. c.] vocant) ad ilia^e gibbo-
si, & rotundi; interius, quâ venam cauam spectant,
partim gibbi, partim concaui, ^d simi, ita vt quasi in
retusâ lineæ speciem curuati videantur; talis enim
pro vasis admittendis, & cauitate constituenda, re-
quirebatur.

Magnitudinem habent^f quæ ipforum actioni, se-
rosi humoris, expurgationi obeūda sufficiat, quam-
uis frequenter g magnitudine [t. 21. fig. 1.] pares non
sint; nec pro corporis ratione cōueniens proportio,
magis tñ longitudine variant, quæ fere 4. vertebra
æquat, at latitudo trium, vt plurimum, digitorum
est, &

instar. Aret. de signis diut. morborum libro secundo, capite tercio, testibus simi-
les. Ruffo secundo de part. duodecimo, rotundi in testudine rotundos dicit Eusta-
chius. Et semini Mandragora similis. c Gal. 6. admin. an. 13. f Gal. 5. vs. par. 6.
g Ruff. 2. part. 12. dexter panis aliter grandiorq.

a Alterū de-
ficere notauit
Arist. 4. gen.
an. 4. Fernel.
vnum vidit
mira magni-
tudinis. Va-
sal. vnum ob-
seruauit in
habetibus
ventrem im-
pense promi-
nentem.

b Eustachius
semel vidit
mediâ spina
innixū, Arch-
angelus vnū
magnum trans-
uersum supra
cauam & a-
ortam.

c Laurentius
unicum, tres,
& quatuor
obseruauit.

d Galenus s.
vs. part. 5. 6.
ad annot. 13.
at de ren. aff.
1. assimilat

Græca litera
Sigma Hippo-
crates de na-
tura oss. figu-
ra cordis tri-
buit, quia
ventres ha-
bent cordis

est, & sinister sæpe dextro breuior, & quidem in fœtibus insignis magnitudinis existit.

h. Democri-
tus. Hipp. de
nat. hom. Ar.
3. part. 9. vice
carnis eos ob
septos muniri;
adeo 3. hist.
17. ut ex vi-
seribus ma-
xime lingues-
cent. Voluit
Ar. 1. hist. 18.
Et 3. part. 9.
dextrum mi-
nus pinguem,
quod natura
dextra parvis
sicciior sit. hoc
falsum credit
Eustachius.
i. Ar. 3. part.
9. vult alime-
ti concoctio-
nem & humo-
ris secretiorē
procurare.
k. Ar. 3. part.
9. non intra
renes, cū den-
sum sit viscus,
sed circum re-
nes.
l. Vesalius ca-
ninum secare
iubet tāquam
macilentum:
hominis enim
& ouis, nimi-
rum pinguem
esse.
m. Gal. 6. ad
an. 4.

Adeps^h renibus copiose circumfunditur [t. 20. 00. pp.] cum propria vasa nutritionis gratia acceperit, ita ut in obesis penitus fere occultentur; cuius usus i renum calorem fouere, ne ob feri copiam cōtinuo dilabentem, calor sensum languescens extingatur, sicque omnis renum actio concidat, & ne vasa distentione periclitentur: quare & intrinsecus^k inter membranam distributionem vasorum succingentē, & inter vreteris ramos in homine: l in cane vero, inter membranam; quæ renum cauum efformat, instar molliissimi straguli substernitur, & suâ leni ac lubricâ humiditate feri acrimoniam obtundit.

Glandula (cuius inuentio Eustachio debetur) v- triq; reni parte superiore, quâ cauam spectat, adhæret, quæ exteriori membranæ firmiter hæret, ut sæpe non obseruanti renibus exemptis ipsi diaphragmatis mēbranæ iuncta relinquatur: quæ substantiâ & figurâ fere renibus respōdet; sæpe etiam depressâ, ut potius placentam referat, q̃ renem, longitudine duorum digitorū, latitudine vnius, crassitudine mediocri, quarum non semper par magnitudo; frequē- tius tamen dextra sinistram superat: ex posteriorib. aliqui, plures esse, sed non in omnibus reperiri vo- lentes, ex copiosiore materia genitas dicunt: harum sane usum ignoramus. Ad hanc aliquādo à caua iux- ta hepar furculus mittitur, aliquando ab adiposa ve- na furculum acquirit, aliquando vtrumq; habet.

Membranâ teguntur duplici; exteriorē m. a peri- tonæo iuxta humiliorem diaphragmatis sedem, qua peritonæo nectitur pronatam, quæ ipsis pertinaci- ter non adhæret [t. 20. 00. pp.] quâ cum inuoluantur, renum fascia dicitur; hæc venam adiposam [t. 18. X. T. t. 20. l. h.] recipit, & copioso adipe obuoluitur, sicq; renibus

renibus in uolucris, vinculi & mollis simul straguli loco est. Altera vero membrana, quæ renum propria, tenuissima est, & à tunica communi vasa cingente dilatata producit, quæ validissime ipsis connascitur, ut ipsorum carnē aliās firmam & densam compactiorem efficiat: & licet superficiem lubricam & splendentem reddat, adipem tamen caret, nullisq; vasis intertexta est: hæc intus reflexa vasa comitatur, vētres ⁿ subit, & ea vndiq; cingēdo, firmiora reddit.

Substantia [t. 19. fig. 2.] ipsorum caro ² est dura, cordi similis, nisi quod fibris (quarum vicem vasorum ^p fibræ suppleant) careat, densa ^q & compacta, quo calor inherens fortius & facilius attrahat id quod adeo propinquum erat (ad trahendum enim excrementum à longinquo ^r instrumentum laxum aptius est) & expellat, neue ^r sanguis, cum eo nutrirī debuerint, cum vrinis elabatur (qui si renes probe nutriturus est retineri, ac vndiq; diffundi debet) quod fieret, si caro immodice laxa foret. Verum vtrinque ad sinus [t. 21. ee.] ubi vasa emulgentia in maiores ramos diuiduntur, eorum substantia laxa admodum & inæqualis est. Hæc q; intrinsecus ductibus ab vteribus per ipsam excurrentibus perforatur, & partes à carne extuberantes notantur, quæ substantiā, figurā & officio glandularum (vnde forte quidam ^f ad glandulas retulere) naturam æmulantur. Extrinsecus vero superficie est instar hepatis læui & lubricā colore (in recte valente) subobscurus ^r & à colore phaseolorum rubrorum non longe distante, rarius intense rubro & splendente. Est quinetiam rarissimū hominis renes extrinsecus ^u inæquales esse, & quasi ex

multis

n Caua renū
non subire vo-
luit Ar. 3 p. 9.
o Hippocr. de
corp. resect.
malorum spe-
ciem referen-
tes. Aretaus
de acut. morb.
cur l. 2. cap. 9.
hepatis speciē
tribuit: Gal.
inter viscera
retulit. Hipp.
inter glandu-
las collocauit,
forte quia
multa humi-
ditate dele-
ctatur, vel ve
Gal. 3. alim 5.
quod substan-
tia tales pu-
tetur. Renum
generatio ex
materia pa. ũ
glutinosa, ab
exiguo calore,
multoq; frigi-
do per concre-
tionem geniti.
Hippoc. lib. de
carnibus.

p Hæc ratio-
ne Galenus
de ren. affect.
1. renū corpus
ex fibris &
carne consti-
tutū describit.

q Caro in renibus densissima. Gal 2. ad Glauc. 2. r Cal. 5. vs. part. 7. de ren. affect. 1. f Gal de vit. & spir. hoc monet Hipp. de gland. habent. & renes glandulas. r Russo 2. de part. 12. coloris lenticula & subcinerei: Vesal. colore maxime rubro & resplendente Eustachio, in iis qui bene valent subobscurus est: in testudine lutei sunt. u Arist. 1. hist. 18 3 part. 9. hominis renes tubulis similes dixit.

TABVLA hac renis dextri partem anteriorem fig.
 1. & partem posteriorem fig. 2. exhibet, quales erant in
 puero, quarto die post natiuitatem in Nosodochio Ar-
 gentinenſi Anno 1602. menſe Decembri, mortuo,
 eo quod podice non eſſet perforato, nec vri-
 na quicquam redderet.

FIG. I.





FIG. II.



multis renibus seu glandulis exiguis cōponi, quemadmodum in vrſo & boue obſeruatur; quod in duobus fœtibus, & in puella 11. annorum, & in quodam viro Romæ Eustachius notauit; quemadmodū adposita figura ostendit, quam Doctor Saltzmannus Argentinensis Medicus in hac arte studiosissimus, (qui in fœtu & notauit & depinxit) ad me misit.

Ventres duos habent, exteriorem & interiorem; exterior improprie sic vocatus, [*t. 21. d.*] quē Portam ^x vocant in ſima parte; vbi totus quaſi curuatus & & reductus plerūq; in tres partes diuiditur; tubere enim illic prominente, in duos ſinus ſatis alte pmi- nentes rursū diſtinguitur, & vaſorum bipartitorū [*1. 21. l. h.*] ramus vnus ſuperiori eius ſinus angulo, al- ter inferiori offertur in Renū ſubſtantiam diſſe- minandos, ex hoc & y vreter progreditur.

Vaſa q̄ ad renes mittuntur, ſunt venæ, arteriæ, & nerui. Venæ à caua ^z prodeunt; harū altera adiposa, [*t. 18. X. Y.*] quarū dextra raro à ^a trunco, ſed ab e- mulgente, ſiniſtra à Caua oritur, & ad exteriore tū- nicam eam irrigando numerosā ſobole diſtribuitur: interdum glandulæ reni impoſitæ ramulum offert, qui eam perforans rursū in tunicam abſumitur altera ab officio emulgens [*tab. 18. a. b. t. 21. h. 1.*] (quam cum arteria meatus Ariſtoteles ^b vocauit) communiter vtrinque vna, (in horum enim va- ſorum conſtructione varia eſt Natura, vt non mo- do in diuerſis ſubiectis, verum etiam in eodem ſæ- piſſime variant) inſignis & omnium à Caua ^d pro- deuntium ampliſſima, non quod multo alimen- to ^e in-

y Gal 6. ad
an. 13.

z Gal. 5. vſ.
part. 7. & 8.

Ariſt. 1. hiſt.
18. 3. part. 9.

à maiore ve-
na, aortique

3 hiſt. 4. 3.
part. 7

a Ex dextro
latere caua;
nō ut alijs cri-
bunt ex ſini-
ſtro produci-
tur.

b Sed non ad
cauā pertine-
re voluit 1.

hiſt. 18. vas
venofum ma-
ximum in v-

trumq; renem. Gal 14. vſ part. 7. ſunt tanquam ſtomachi attrahentes, 16. vſ par.

14. & 4. eiſd. 6. Aretaus de acut. morb. cur. lib. 2. cap. 6. alueolos vocat. c Si-
mus ſingula vtrinque: alijs autem quibuſdam animantibus bina. 6. ad anat. 13.

d De ven. & art. diſſ. 8. ampliſſima & breuiſſima, 14. vſ part. 7. 5. eiſd. 5. Sic & in Hip-
1ocr. de nat. hum. com. 2. text. 12. haud exigua magnitudinis, 6. ad anat. 13.

mento e indigeant, sed vt liberior & expeditior sero-
 fo sanguini transitus sit, à Caua^f trunco raro è dire-
 cto prodiens, breui & obliquo [t. 22.] itinere deor-
 sum lata, in simam s renum partem in duos ramos bi-
 partita inseritur, serosum sanguinem ex Caua eò de-
 ferens: in quibus valuulas, seri refluxum in Cauam
 impediētes, obseruauimus: cum eis ramus vnus aut
 alter venæ sine pari (quade re in thorace) vnitur,
 vt sit inter thoracem & renes consensus. Arteriam^h
 habet vtrinque vnā [t. 18. sub a. b. t. 21. sub h. i. t. 22. ch. 3.
 s.] ab arteriæ magnæ trunco, emulgentem insignem
 quoque, i quæ serosam humiditatem è sanguine^k in
 arteriis, & quidem copiosissimā contentā expur-
 gant; & vna^l calorem suppeditant, quo eorum frigi-
 ditatem, quā à seroso excremento recipere voluit
^l Galenus euincere possint. Hæc vasa primum bipar-
 tita cavitatem^m ingressa, statim in ramos, communi-
 ter quatuor diuiduntur, & in totā renum substan-
 tiam, vsque ad extremum varie disseminantur [tab. 19.
 fig. 1. G. G.] & ita attenuantur donec in capillares abe-
 ant, quæ carunculæ adeunt, vt per eas seri fiat perco-
 latio. Alio vase tertioⁿ pro sui nutritione non fuit o-
 pus, cum purum excrementum non trahant, quem-
 admodum vtraque vesica, quæ vasa alia habuerunt,
 per quæ illis alimentum suppeditatur. Neros^o v-
 trinque à sexti paris ramo stomachico (vnde tantus
 ventriculi & renum consensus, & in nephriticis ven-
 triculi subuersio & vomitus) habent, qui deorsum ad
 radices vertebrarum lumborum descendunt, & in
 renum membranā^p propriam distribuuntur: ve-

e Sed vt sint
 tanquam sto-
 machi attra-
 hentes 16. vs.
 part. 14. vide
 causam s. vs.
 par. s. multum
 vero & san-
 guinis attra-
 hunt s. vs. par.
 6.

f De hauri or-
 tu ac dissep-
 tione, non eodē
 semper modo
 Hipp. agit, vt
 videre est de
 nat. hum. de
 oss. nat. de loc.
 in hom. sed in
 lib. de resect.
 corp. recte.

g Gal. s. vs. p. s.
 h G. s. vs. part.
 7. 6. ad. an. 13.
 i Ga. s. vs. par.
 s. maximū ar-
 teriarum iugū
 in renes prore-
 pit 16. vs. part.
 10. & has dicit
 ppe maximas
 2. nat. fac. 4.
 causam reddit
 s. vs. part. s.
 k Erasistratus
 putauit renes
 solas venas ex-

L rum

purgare s. vs. par. s. l Gal. de ren. aff. r. m Gal. de aff. ren. 3. renum ventres in 4. aph.
 78. Archang. negat rectā in cavitates in renib. excavatas produci: contra quā Gal.
 s. vs. par. s. n Gal. s. vs. par. 7. 2. 8. o Obscurus neruus ac visum propemodum saltes
 s. vs. par. 3. perexiguū neruus Gal. in 6 Epid. com. 1. tex. 6. p Ga 2. loc. aff. 4. Colum. ad
 iunctam. Vesalio in internā cuniculā potius, quā in illorum corpore. Eustachius

cap. 27. & 24. plurēs nervi in renes & hepar inferuntur, nō modo mēbra- nā, sed etiam substantiam. Arch. in mem- branā & sub- stātiā, quod accuratissime Fallo. notavit q̄ Contra Gal. 2. loc. aff. 3. & de ren. aff. 3. r̄ Aristo. renes omnīū maxi- mē sentire scri- p̄si Gal. modo nullū, aut sal- tē obscurū tri- buit, modo per- spiciū: nam in 6. aph. 5. dolor inquit acutus sentitur. f̄ Deren. aff. 3. t̄ Ar. 3. part. 9. u Membranā cavitatem di- stinguere, vide apud Vesal. & Archang. x De ess. nat. y Colum. duas agnoscit cavi- tates, & ab al- iera Vreteres nasci, quam tamen cavitatē negat instar cribri efficiā esse: & Vesal. cribrū negat. Fallop. asserit se in hominis rene non inuenire sinum perforatū, nec ex- teriorem à Vesal. proditum, per quem emulgentes ferantur: nec ēt sinum secundum & interiorem Vesal. inuenit, sed aliū huius loco positū Quare Eustach. monuit ho- mines à canib. & pleviſq; aliis brutis in renib. plurimū asserre, cum in humano e- iusmodi cavitates non reperiuntur. z Fistula in renib. humanis sex, septē, octo, novē,

mi obseruentur fistularum seu ductuum forma) quo carunculas excipiant, cum in singulorum ductuum extremis carunculæ (quia reliqua renum carne duriores sunt, minus quoque coloratæ) quæ paruas glândulas referunt, ex renis substantia productæ, quæ acutæ sunt, papillis mammillarū similes operculi modo ingredientibus obstruant; quæ si secundum longitudinem dissecantur, in iis sulci & canaliculi, non secius ac ^a pili tenuissimi exsculpti obseruantur, quare angustissime perforatæ, ut vix capillum admittant, per quæ serum, ^b seu aquosus humor bile perfusus à sanguine segregatur, & sensim in has fistulas vretorum seu canales membranaceos (hoc colatorium est) percolatur, in communi illo sinu colligitur, indeque deorsum per vretes in vesicam mittitur (forte sulci hi in ipsa renum substantia, perinde ac foramina in pupillis mammarum sunt excauati.) Carunculæ autem hæ angustissime perforari debere, ne sanguis, qui pro renum nutritione, & quidem vi eorum attractrice propria per emulgentes allectus, vna cum sero & bile effluat (quod aliquando renum facultate segregatrice & retentrice labefactata, nonnunquam & meatibus latius ^c patefactis, & quidem absque dolore euenit) cum hæc non coctione, sed transfusione discernantur; non negantes tamen adhuc amplius in iis elaborari. Qui sanguis à renum carne quasi fugitur, & instar ^d fæcis cuiusdam ei aspergitur: inde paulatim vaporis modo in totum dispergitur, adhærescit, vnitus, atq; demum alimentum fit renibus. Verum cum ob tenuitatem parum alat, subinde multus attrahitur multumq; seri, quod retento sanguine per carunculas sensim exstillat. Hæc etsi à plærorumq; sententia aliena sint, commodè tamē demonstrari possunt, si vasis ingredientibus & vreteri egredienti stylus indatur, & ad simam partem sectio instituat: eleganti-

quarum non meminit Ves. nec Col. quia belluinos tantum secure in quib. non sunt Archang.

a Gale. de ren. aff. 1.

b G. 5. v. part. 7. foramina quadam, per quæ urina percolatur renū substantia concedere videtur, ne sanguis elaboratur.

c Gal. 6. Epid. com 1. tex. 1.

d G. 5. v. part. 6. hic notandi secundarii dicti humores, qui male ab Arabib. inuēti dicuntur, de quib.

Et Hipp. de a. lim. μέλλον τῶ φη οἶον τῶ φη καὶ τῶ φη.

Ga. 3. fac. nat. 13. αἷος φουσι αἷος φουσι, καὶ οἰοίσις, Et 10. meth. in febri hectica, siccitates quatuor ostendunt.

TABVLA XIX.

Fig. I. Vasa renum carne remota exhibet. Fig. II.

Renes caninos ad Vesalij imitationem dissectos.

Fig. III. Commentum de seri percolatione cum cribro proponit.

FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.



tius adhuc, si visceris carnem ab ipsis vasis separaueris, quemadmodum figura nostra [*t. 19. fig. 1.*] exhibet: quæ sane separatio, licet alias aliter senserimus, nos veritatem docuit. Sed hæc in canibus, cum eo modo non inueniuntur, & frequenter studiosi in eorum sectionibus, ob humanorum cadauerum penuriam, exerceri soleant, breuiter eorum structuram subiciemus.

è Frustra à natura conditos Asclepiadis se Etatores affirmant 1. na. fac.

13. & Erasist. quandoque id asserit 2. nat. fac. 4. Aristoteli nulla necessitate habetur, sed ut melius & locupletius 3. part. 7. forte quia partes, quæ animalibus necessario insunt, omnibus etiam inerunt: at animalia, quæ oua pariunt, aues piscesque, non habent renes, 2. hist. 16.

f Erasistratus per urinam segregationem fiat, scribit, sed quia ratione non docet, 1. de nat. fac. 16. & 17. & 4. vj. par. 13. serofus humor tripliciter colligi

potest: Vel propria natura ad eos fertur: vel vasis transmittitur, vel à renibus attrahitur. Auerroes voluit sua sponte ferri, quemadmodum & alimentum ad membra feratur, non autem à membris attrahi. Renes ad se allicere docet Gal. 1. na. fac. 13. 2. eiusd. 1. 6. loc. aff. 3. de ren. aff. 1. 9. compos. med. secundum loc. 2.

Renis canini structura [huc facit t. 19. fig. 2.] talis est; membrana renem proxime inuouens eius cauum subit, intus reflectitur, & non secus ac corpus membraneum, à quo vretes prodeunt, hinc inde expanditur, cui adeps adhæret, eique emulgentium in renem distributio incumbit; hæc plurima foramina habet, vasis in renem iter præbentia. Succedit corpus membraneum dictum, quod in plures ramos diuiditur, & tanquam operculum vasorum & adipi circumponitur, quod cum priore membrana in extremis partibus conatum, cauitatem quandam efformat, quæ eadem vasa & adipem continet. Huic corpori membraneo renis cauum, quod ab eo & renis substantia constituitur, incumbit, in cuius medio portio substantiæ renis gibbam eius partem respiciens, colore ab aliis variâs, & membraneo operimento carens, formaque nascentem lunam referens, non secus ac septum quoddam pendet, & membraneo corpori ita incumbit, ut eiusdem renis cauitas gemina esse videatur. At in humano rene eiusmodi cauitates non inueniuntur, sed varias emulgentias, & vretes in varios ramos per eius substantiam diuiduntur, & ab his cauitates, quæ in renibus sunt, efformantur. Vfus renum, propria facultate attractrice serosum humorem ob totius substantiæ si-

potest: Vel propria natura ad eos fertur: vel vasis transmittitur, vel à renibus attrahitur. Auerroes voluit sua sponte ferri, quemadmodum & alimentum ad membra feratur, non autem à membris attrahi. Renes ad se allicere docet Gal. 1. na. fac. 13. 2. eiusd. 1. 6. loc. aff. 3. de ren. aff. 1. 9. compos. med. secundum loc. 2.

potest: Vel propria natura ad eos fertur: vel vasis transmittitur, vel à renibus attrahitur. Auerroes voluit sua sponte ferri, quemadmodum & alimentum ad membra feratur, non autem à membris attrahi. Renes ad se allicere docet Gal. 1. na. fac. 13. 2. eiusd. 1. 6. loc. aff. 3. de ren. aff. 1. 9. compos. med. secundum loc. 2.

potest: Vel propria natura ad eos fertur: vel vasis transmittitur, vel à renibus attrahitur. Auerroes voluit sua sponte ferri, quemadmodum & alimentum ad membra feratur, non autem à membris attrahi. Renes ad se allicere docet Gal. 1. na. fac. 13. 2. eiusd. 1. 6. loc. aff. 3. de ren. aff. 1. 9. compos. med. secundum loc. 2.

potest: Vel propria natura ad eos fertur: vel vasis transmittitur, vel à renibus attrahitur. Auerroes voluit sua sponte ferri, quemadmodum & alimentum ad membra feratur, non autem à membris attrahi. Renes ad se allicere docet Gal. 1. na. fac. 13. 2. eiusd. 1. 6. loc. aff. 3. de ren. aff. 1. 9. compos. med. secundum loc. 2.

tiæ similitudinem, à sanguinis tam & venosi, quam arteriosi massa per vasa emulgentia trahere, sicque vtrunque sanguinem à sero repurgare: quæ enim particula^k per ampla orificia succum accommodatum trahunt, illum solum, purum & sincerum trahere non possunt, sed alterius & diuersi generis admistione; quare cum sero & sanguinis humidioris & tenuioris multum, & multum^k bilis flauæ à iecoris vesica non repurgatæ attrahitur. At serum à sanguine in ipsa alimenti concoctione, vi renum^l segregatur, eorumque facultas attractrix sanguinem in eorum substantiam pro^m nutritione reponit: serum vero tanquam inutile, facultas expultrix per caruncularum sulcos in fistulas membranofas (per quas & arenulæ è corpore renum vna cumⁿ vrina transeunt) vreterum^o percolat, quod in cauitate vreterum maiore colligitur, per hos P ad vesicam demandatur, ibi colligitur, statò tempore retinetur, & tandem inde tunc, cum^q ratio iubet, sphinctere laxato per penem expellitur. Bilis vero cum vrinis permeat, vnde & vrinæ flauescunt,^r

g Ex vena huius moris excrementum ad renes Arist. 3. part. 9. à vena, qua in gibba hepatis Galen. de util. respirationis ex concaua vena attrahitur 6. loc. affect. 3.

h Galen. 5. v. part. 5.

i Sanguis vniuersus, qui ad cauam peruenit, à renibus expurgatur 4. v. part. 13. s. eiusd. 5. 6. de plac. 4. & quidam perfectæ 5. v. part. 6. de renib. aff.

L 4

De 2.

k Galen. 5. v. part. 6. & 8. l Renes secernunt à sanguine urinam 1. nat. fac. 13. s. v. part. 5. de ren. affect. 1. 1. Sanit. tuend. 12. vide Hippocrat. de off. nat. Aristot. 3. part. 9. Gal. 6. Epid. com. 5. text. 4. m De renum affect. 1. n Lycus Macedo censuit urinam esse excrementum nutritionis renum 1. nat. fac. 17. s. v. part. 5. o Galen. 5. v. part. 6. p Hippocrat. de hominis structura. Gal. 6. plac. 4. q Gal. 5. v. part. 5. r Omnibus recepta fuit ante Vesalium opinio, adhuc à nonnullis reservata, in renibus duos esse sinus secundum visceris longitudinem sitos, vnum elatiorem, alterum demissiorem, quos transuersa quadam membrana, qua cribri modo sit peruia (quam renis celatorium vocarunt) distinguat, in superiorem sinum emulgentes, serosum sanguinem fundere, & per angustissima membrana foramina serum & bilè pertransire, sanguine propter crassitiem non penetrante, in inferiorem sinum, ex quo vreter prodeat, & urinam colatam excipiat: hanc opinionem explicet t. 19. fig. 3. A. Vasa emulgentia, qua serosum sanguinem in sinum primum B. effundunt, qui per cribrum E. colatur, in alterum sinum C. quem vreter F. excipit. Postmodum Vesalius (qui caninum aut caprinum sume-

sumere iubet, sibi ab humano ob pinguedinem metuens) & pleriq; ante Fallopiū,
 Renes duos sinus obtinere voluerunt, alterum ab emulgentium renem subeuntium
 extremis contextum, quod vasis modo canum, per renem corpus distribuat, mox
 in partem anteriorem & posteriorem diuisum, quorum quilibet sex, septem & plu-
 res crassos ramos producat, aequaliter à se distantes, ita tamen, vt anteriores cū po-
 steriōribus in exteriorē sede circulum constituentes uniantur sicq; mutuo cavitatē
 constituere, quæ sersum sanguinem suscipiat. Alterum à posteriore parte esse, inter
 illius corporis membranei ramos, qui portione aliqua substantia renum (citra ta-
 men nexum) intercedente in duas partes diuidatur, hicq; serum à substantia renis
 defillans suscipere, & ad vteretres mittere, hunc inter dissecandum humidum &
 exanguem occurrere: illum vero sinum sanguine plenum semper inueniri, pro hac
 sententia faciunt canini renes tab. 19. fig. 2. expressi.

De Vreteribus.

C A P V T XXIII.

De his egit Gal. 5. vs. part. 5. & maxime 13. 6. admin. ana.
 13. 1. nat. fac. 6. & 13. Arist. 1. hist. animal. 18. & 3. par.
 animal. 9.

^a Aselepiadis
 discipuli nega-
 bant meatus

manifestus à
 renib; ad vesi-
 cam, 1. nat. ja-
 cul. 13.

^b Ab vrina 6.
 admin. an 13.

^c Gal. 5. vs. par.
 5. 6. admin. ana.

2. & 13. Græci
 quicq; & eavōes,

et nō pōss; & pō-
 tuer; voca-

runt. Arist. 1.

VRETERES, ^a seu ab officio, vrinæ ^b ductores
 vasaue vrinaria; Græci & pntāpas, ^c ab & pēw, min-
 go, vocant. Hippocr. ^d & χετες, quasi aquæ ductus no-
 minauit. Vasa duo ^e sunt [t. 18. c. d. t. 20. q. q. t. 21. m. n.] v-
 trinque vnum (rarius duo ^f vel plures, in vnum tamē
 ante insertionem coeunt) quæ lumborum muscu-
 lis insidentia, inter geminas peritonæi membranas,
 quibus connectuntur (vt superius renibus inferius
 vesicæ, cum renes ^g vesicæ committant) modice ver-
 sus interiora reflexi, ne obliquum nimirum ductum
 efficiant, descendentes vesicæ [t. 21. ↓. t. 22. ch. 18. 20.]
 iunguntur.

Figura

hist. 18. pori & vena cava & nervosa, 3. part. 9. pori siue meatus, at Gal. 6. ad. anat.
 13. alia vas, alius meatus (vt Hippoc. 4. de morb.) alia arteria, alia vena dicitur.
 Stomachi 4. vs. par. 6. Hippoc. arterias appellasse videtur lib. nat. off. 2. Epid. sect. 4.
 vena & vesicam Hipp. de off. nat. vocat. d. De glandulis, & de resict. corp. c Gal. 1.
 nat. facul. 13. i. Achillinus notauit. Eustach. non raro duos, ac etiam plures. g Gal.
 5. vs. par. 5. vesica ex renibus dependet Arist. 3. part. 9.

Figura tertia^h palmum circiter longa, paleam latitudine imitantia, in calculosis sæpe ad modum intestini alicuius dilatata, concaua, literæ S. instar obliqua, in mulieribus vero lata, recta & breuia, hinc minore cum dolore calculos reiciunt.

Substantiam habent proprie albam, vnde nonnullis venæⁱ albæ dicuntur, &^k exanguem, crassam, neruofam^l (quare aliis neruosi canaliculi) ideo & validi^m sunt, quæ in nulla alia parte reperitur, nisi in vesica, cuius substantiæ interioriⁿ similes sunt, eique continuantur: ratione cuius substantiæ, & quod à vesica citra fractionem; à renibus vero integri separari possunt, à vesica originem eos ducere, pronunciare liceret, etsi à renibus^o enasci dicantur. Quam substantiam, quæ fibris obliquis ad distentionem donatur, si quis eorum propriam & peculiarem tunicam appellare volet, quam membrana communis à peritonæo pronata, roboris gratia inuefiat, non contra dixerimus.

Verum vretes, vbi interiorum renum ventrem succinxerunt [1. 19. fig. 1. F.] vt fistulas octo vel decem constituerunt, è sima renum parte egrediuntur: vel si mauis, dicas, vbi vreter renem (hominis non canis) ingressus est, latior paulo redditus in tres ramos, instar emulgentium, diuiditur, & in superiorem, inferiorem ac mediam regionem renis distribuitur, ex quibus rursus superior & inferior in tres alios subdividitur, medius vero in duos: hi breues & ampli finem latum obtinent, quo singulæ glandulam mammillarum papillæ similem, à renum carne pronatam instar operculi carnosum excipiant, quo per eas serum in singulas fistulas percoletur: sæpe etiam plerique ex his ramis in medio quoque perforantur, quæ non fecus, ac extrema ipsorum oscula glandulam similiter admittunt. Implantantur autem in vesicâ postero-

h Gal. 6. ad. 7. nat. 13. forma triangulares, Hippoc. de ref. corp.

i Celsi lib. 4. c.

1. Venarum corpori similes, Ves. arteriarum instar, Col. n. uæa ad. 10. n.

Laur. nec arteria, nec uenas nec nervos esse ostendit, G. 1 nat. fac. 6.

k Ar. 3 par. 10.

l Ar. 1. 1. ft.

8 neruosi canaliculi Arist. 2. de can. fig. diut. morbor. 3.

m Arist. 3 par.

9. prælogi fortis G. 5. v. 15.

6. ad. an. 13.

n Gal. 3. v. 15.

13. 6. ad. an. 13.

o De can. re-

nat. Ar. 1. 3.

fig. 4. ex. ne

in vesicâ ena-

scuntur Hipp.

de off. nat. ex

renu v. canicu-

ly Gal. 6. Epid.

com. 5. v. 4.

p. v. reu. am-

ca peculiaris

tunica 6. ad.

an. 15. non ha-

bet ductu tur-

cid. 1. n. f. 1. 6.

q In summum
vesica apicem
Hippocrat. de
resect. corp.
quomodo in-
figatur, vide
s. vs. part. 13.
r Galen. 3. vs.
part. 16. 6. ad.
an. 13.
s Nulla mem-
brana propria
obducuntur,
vt Galenus &
plerique Ana-
tomici cēsent,
sed solum ve-
sica substan-
tia ob obliquū
ingressum la-
xata est. Eu-
stachius, Lau-
rentius quo-
que ridet. At
Archangelus
ait, reuera v-
reterum ex-
tremis mem-
branas foris
intro specta-
ntes adpositas
esse. Asclepia-
des voluit se-
rum in hali-
tum resolu-
tum in vesi-
cam transmi-
ti, ibique in
humore priori

rem q & humiliorem [t. 21. f.] sedem (quia commo-
dius non poterat, cum vesica recto intestino adhæ-
reat) non longe ab eius ceruice inter duas vesicę pro-
prias membranas ad parui digiti latitudinem delati,
à se inuicem duorum circiter digitorum distantia,
obliqua r insertionē, angusto meatu vesicę cauita-
tem penetrant; ne vrina sursum ad renes remigret:
quod membranulis transuersis f valvularum instar
& follium membranulis similes à vesicę substantia
t minime diuersis vreterum insertionibus adpositis,
plures adscribunt: quarum etiam vsus sit, vrinę in ve-
sicam fluenti cedere, & ne eadem vesica admodum
distenta, vel etiam in ventris compressione regredi
possit, vreterum meatus occludere: & sane ita occlu-
duntur illi meatus, vt ne flatum, u cum vesica alicuius
suis à pueris inflatur, & ad collum arctissime col-
ligatur, erumpere sinant. Quare Galenus hos mea-
tus x prædicans, argumentum dicit esse excellentis
cuiusdam sapientiæ Conditoris nostri, simul & pro-
uidentię in animalibus condendis: sed impropria
hęc est membranulę vel operculi appellatio.

Vasa quoque recipiunt, capillorum modo tenues
venas & arterias à vicinis partibus: Nervos vero à
sexta coniugatione & medulla lumborum, vnde exi-
mius y eorum sensus, & exquisitus dolor, cum calcu-
li, vel in iis sunt, vel pertranseunt circa ilii regio-
nes.

Horum vsus, vt eorum tanquam canalium inter-
uentu vrina cum tenui bilioso excremento à renibus
eorum z vi à sanguine secreta, in vesicam, longe ab il-
lis distantem, & in ima abdominis parte veluti cister-
nam

similem concrefcere: contra quem Galen. 1. nat. facult. 13. & 2. eiusd. 1. disputat. Et
Gal. 1. nat. fac. 9. docet modum administrandi sectionem in viuis, vt quis lotium
per vretes in vesicam excerni videat. t Galen. 6. admin. anat. 13. u Gale-
nus s. vs. part. 13. x In 6. Epid. com. 5. text. 4. y Sensibiles de ren. affect. 3. z Ga-
len. s. vs. part. 3.

nam quandam sitam deferant; per quos & arenæ & calculi transeunt.

De Partibus Virilibus Generationi dicatis.

C A P V T X X I V.

ET si partes ad nutritionem facientes, nec dum absoluerimus, cum tamen Anatomica methodus, (quando vnius tantum corporis copia datur) nunc Generationi dicatarum partium demonstrationem requirat, earum historiam subnectemus; quæ cum duplices sint, Viriles & Muliebres, de virilibus primum sermo erit. Viriles licet variæ sint, omnes tamen in vnum conspirant, vt semen conficiant, ex quo tanquam principio, sua vi formatrice apto, homo generatur: hoc autem cum præparatione, coctione & elaboratione opus habuerit, pluribus ad id instrumentis eguit.

Quare alia materiam feminis deferunt, eamque præparant: Vasa spermatica: alia elaborant, Parastatæ: alia vim prolificam tribuunt, Testes: alia semen prolificum deferunt in propria conceptacula, vasa deferentia: alia ipsum veluti promptuaria recipiunt, & in tempus coitionis conseruant, Prostata: aliud in vterum effundit, Penis: ex quibus si vnum defuerit, omnis procreandi vis concidit. Ne vero canalis penis ab acrimonia feminis vel vrinæ lædatur, oleaginosum humorem natura creauit, & Vesiculis

indidit, quas feminarias alii
vocat.

De

De vasīs spermaticis præparantibus.

CAPVT XXV.

De his vide Galenum 14. vs. part. 12. & 13. 1. de semine 15.
Aristotelem 3. hist. animal. 1.

a ποτὶ φλεβί-
xoi Ari. lib. 3.
hist. 1. Vasa lū
baria Auicē.

b αἷμα πρὸς
vixā Gal. 14.

c vs. par. 10. Va-
sa proximam

materia semini
attrahē-

tia, appellāda
censet. Arch.

b Gale. 14 vs.
part. 12.

c De diff. vñ. 8.
t. 21. q.] non à

trunco prodiit, nam si ex eodem, quod

dextra, loco ortum traheret, arteriam magnam

[t. 21. g.] necessario supergrederetur, à cuius continuo ele-

uationis & depressionis motu, cum exilis sit, vel dis-

rumperetur, vel à proprio munere impediretur, ve-

utraque sibi inuicem impedimēto fuissent: quare ac-

hæc euitanda, ab emulgentis humiliore sede [t. 20. n. t. 21. i.] principium ducit, (cui nonnunquam à caua

trunco ramulus [t. 20. y.] commiscetur) & sanguinem

magis serosum ^e deuchit. Arteriæ duæ sibi proxima

[t. 20. a. t. 21. r.] ex Aortæ trūco medio longe sub emul-

gentibus prodeunt, vt tenuiorem ^f sanguinem & spi-

ritum magis defæcatum deducant: quarum dextra,

VASA spermatica, ^a quæ in ^b maribus maiora, du-
plicia sunt: alia præparantia, alia eiculatoria.
Præparantia [t. 20. t. x. a. tab. 21. o. q. r.] quæ ^c αἷμα πρὸς
vixā Galeno ^a dicuntur, quatuor sunt. Venæ duæ [t. 20. t. x. tab. 21. o. q.] Arteriæ duæ vtrinque vna [t. 20. a. t. 21. r.] Vena dextra [t. 20. t. tab. 21. o.] paulo ^c infra emul-
gentis [t. 20. m. n. t. 21. h. i.] exortum à trunci Cauæ ^d su-
periore, & anteriore sede; quasi oblongo & crassius-
culo [t. 20. u. t. 21. p.] tubere oritur, (cui ab emulgentis
furculum accedere Galenus notauit) quo puriorem
magisque coctum sanguinem deferat: sinistra [t. 20. x. t. 21. q.] non à trunco prodiit, nam si ex eodem, quod
dextra, loco ortum traheret, arteriam magnam [t. 21. g.] necessario supergrederetur, à cuius continuo ele-
uationis & depressionis motu, cum exilis sit, vel dis-
rumperetur, vel à proprio munere impediretur, ve-
utraque sibi inuicem impedimēto fuissent: quare ac-
hæc euitanda, ab emulgentis humiliore sede [t. 20. n. t. 21. i.] principium ducit, (cui nonnunquam à caua
trunco ramulus [t. 20. y.] commiscetur) & sanguinem
magis serosum ^e deuchit. Arteriæ duæ sibi proxima
[t. 20. a. t. 21. r.] ex Aortæ trūco medio longe sub emul-
gentibus prodeunt, vt tenuiorem ^f sanguinem & spi-
ritum magis defæcatum deducant: quarum dextra,

Cauæ

rarum est utrumque ab emulgente prodire. ^e Gal. voluit sic serosum sanguinem se-
mini cōmunicari, cuius acrimonia vi in seminis emissionē pruritus excitetur. Quod
Vesalius multis rationib. refutare studet. Et Colum. exempla adducit eorum, qui-
bus ob herniam testis sinister ablatus, qui tamen postmodum eadem voluptate, qua
anteperfruiuntur. & Erasistratus in arteriis sanguinem negauit: & Aristoteles se-
minales arterias sanguine vacuas voluit.

Cauæ truncum (t.21.fig.1.f.) conscendens, oblique ad venam properat; sinistra sui lateris venam accedit, quæ aliquando deest, tumque vena ipsa amplior est. Venis enim arteriæ ampliores sunt, quia plurimum spiritus vitalis in testes influere debet, quo semē perfectum, plurimo spiritu & calore vitali sit confectū.

Raro enim vtrique arteria deest: an forte in iis, qui steriles sunt, cum spiritus vitalis non influat? Hęc vasa, dextra vena cum arteria, & sinistra vena cum sua arteria, parum distantia (t.22.fig.2.θθ.) peritonæo incumbunt, & deorsum protensa fibrosis nexibus (t.22.fig.3.NN.) committuntur, supra vterem (t.20.q.q.t.21.fig.1.m.n.) oblique ducuntur, (sursum peritonæo (t.20.β.t.21.f.) in transitu communicatis) & ad inguina, peritonæi productionem (t.20.γ.t.22.λ.) quæ exactissime vasorum lateribus connascitur, cum nervo gracili à sexto pari, & Cremastere musculo (t.20.ϕ.) permeant, & tum extra ventrem delata, ad Parastatas (t.20.ε.t.21.η.) & elatiorem testis sedem feruntur; vbi

arteria cum vena commixta, vnum corpus & pyramidem (t.20.à.δ.ad.ε.) vtrinque depressam referens, efformant, quod ab innumeris venarum & arteriarum ramulis per Anastomoseis iunctis, quibus intertextitur, plexusque constituitur *κρυσσείδης* ^h *αδρ.δ.α.τ.ε.* corpus varicosum (t.20.δ.t.21.t.ε. & tab.22.f.2.μ.fig.3.C. initium, D.basin notat) & à pampinorum forma, pampiniforme dicitur: lubet corpus varicosum pyramidale vocare, ad differentiam Parastatarum, quæ etiam (t.20.ε.t.21.η.) corpora varicosa dicuntur. Horum vasorum usus, non solum sanguinem tum venalem, tum arterialem cum spiritu vitali, ad testium nutrimentum & vitam deducere; verum etiam materiam


(excre-

g Corpus hoc crucis aut lumbri-
crucis aut lumbri-
bricis plenum,
aut senis rusticici
suratemporum
ue cutim
varicibus tur-
gidam refert;
perraro autem
varices capre-
pactorum ac
pampinorum
vitis imagi-
nem expri-
munt, Vesalio.

^h Galen. i. de semin. pampiniforme: lumbrium quibusdam Arabum interpretibus, nonnullis *αλγμυα διστυάδες* retiformis plexus corpus varicosum, Vesal. Laurent. vus varicosum, Plat.

TABVLA XX.

*Ventrem inferiorem cum osse pubis diducto, quò
vasa generationi inservientia clarius con-
spiciantur, proponit.*



912. B.] citra connexum tamen, reflectuntur, & ^b in orbem reuoluti compacti capreoli formam referunt; quare *κισσοειδής* & *αἰσάρας* ex Herophilo ^c Galenus vocat. Sunt enim alba, oblonga, crassa, ^d teretia, conuolutionibus instar xylocampi distincta, quæ sensim angustiora fiunt, & vtrinque in vas deferens (cuius valis principium aliqui ^e dicere maluerunt) quod teretem neruum refert, desinunt; & cum horum substantia, testis substantia aliquantum solidior sit, mediam inter ^f vasa & testes naturam obtinent, durior scilicet his, & molliorem illis.

Hæc etiam exterius membranosa, nervosaue, & vbi conuolutiones non sunt, leuia, intus vero glandulosa, & si secentur fungosa, & quasi ex minimis veluti glandulis formata forent, conspiciuntur: vbi vero à testis tunica (à qua separari possunt) acutiori cultello remouentur, aspera, nec meatibus peruia apparent: sunt tamē qui velint, perexiles fistulas cum testibus continuari, ^h vt per eas vis spermatica à testibus promanet.

Harum vsus est, vel vt semen nondum elaboratum, è vasis præparantibus in eiacularia delabi non sinant; vel vt semen præparatum ad perfectam ⁱ elaborationem, testium irradiatione adiuuante, perducant, siquidem sæpe semine referti reperiantur, ita vt testiculos ^k liceat appellare ad testium differentiam. Dein, vt impediant, ne libido ^l vehemens crebraque excitetur.

M

De

bentes, & ad varicosum canalem seu vasa eiacularia spermatica deferentes, Vesalius.

i Excoquendo & dealbando semen perficiunt auctori definitionum: & in iis semen fieri ostendit Galenus.

k *Διδυμίδα* testiculum appellare possumus, & cum ipsi testi adhaereat, *ἰμίδυμίδα*, Fallop.

l *Arist. 1. gener. an. 4.*

b *Galen. 4. vs. part. 12. & 1. semin. 14. dicit varicū in stat.*

c *Gale. 14. vs. part. 11. & 13. 1. de semin. 15. d. Durius nerui modo dura, Vesal.*

e *Vesalius & Plater.*

f *Sic Galenus aut diuinans, aut ab Herophilo sumens, Fallop.*

g *Veluti etiā gurgulio: in crudo & cocto teste obserues, Fallop.*


h *Innumera fibra candida & crispa capreolorum vitu in modum conuoluta, per testium carnem varie disperguntur, ab ipsis testibus tanquam à terra succopla na, perfectum semen attra-*

TABVLA XXI.

*Renes cum vasis vrinariis & seminariis, caua,
& aortæ portione, cum testib. vesica & pene, figu-
ra quidem 1. anteriore facie, at 2. postero-
re ostendit.*

FIG. II.

FIG. I.



De Testibus.

CAPVT XXVII.

Historiam testium vide apud Galenum in introduct. 11. lib. de dissect. vuluæ 6. 14. vs. part. 10. 12. & 14. 1. de semin. 15. & 16. Apud Aristot. 1. hist. anim. 13. & 3. eius. 1. De ipsorum vero musculis egit Gal. 14. vs. part. 14. & lib. de dissect. musc. 27.

a Vnde in carne mine magnis testibus res ista agitur, id est, maxime viriliter. Sed non solum virilitatem, verum etiã masculorum salutem mortem quando que testantur: Si enim cum scroto laxati & oblongi, virum enervatum & moribundum: Si sursum contracti, & in angustum adducti seruatum iri, muliercula testantur. b Ab ὄρχαις: ὄρχαις autem dux est populi: quasi animantes, testiculos habentes, sint ductores totius gregis. Archangel dicuntur etiam ὄρχαιδες, ὄλχοι, κύαμοι: vide lib. nostrum de partibus externis capit. 12. c Vnde in Gracorum monumentis legitur Didymum tubicinem in adulterio deprehensum, ex nomine suspensum. d Arist. 1. hist. 13. e Nonnulli tuberculum aliquod præter naturam in scroto reconditum, pro tercio numerant. Archangel unicum aliquando reperit. f Galen. 14. vs. part. 12. & 1. semin. 3. g Aristotel. 1. gen. anim. 4. Animalia, quæ plures fœtus gignunt, frequentius coeunt, ut aues, testes abditos habent: Gignunt autem plures fœtus, quia breuiora sunt vita. & 14. vs. part. 12.

TESTES quod virilitatem^a attestentur, ὄρχαις^b forte ἀπὸ τοῦ ὄρχαν χεῖν, quod non nisi cum impulsu semen effundatur; vel ὄρχαν χεῖν, quod lasciuiendo semen profluat; & δίδυμοι^c gemelli, Herophilo, quod communiter bini^d sint ad fœcunditatem (rarius enim vnus, rarissime tres^e simul reperiuntur) sub ventre^f foras ad penis radicem propendentes, partim castitatis^g causa, cum ea animalia, quæ testes in abdomine reconditos habent, sint salaciora; si species cum specie, non vero indiuidua eiusdem speciei inter se conferantur: partim, ne vasorum spermaticorum longitudo & reuolutio minuatur: Cum enim sanguinis in semen mutatio, multa dispositione egerit, debere vasa Testes adeuntia longissimo ductu ferri, quo sanguis in transitu successiua alteratione ad formam feminis acquirendam promptior reddatur: cui longitudini cum ventris capacitas non suffi-

sufficeret, necessario Testes extra corpus fuere locati, quorum recipiendorum gratia scrotum factum fuit: sed ne eorum pondere, contra quod censuit Aristoteles, vasorum anfractus extendantur, nimium muscoli, de quibus postea, prohibent.

Sunt autem in viris, quam mulieribus maiores & calidiores, nō quidem ratione situs, sed ratione temperamentum totius corporis, quod in muliere frigidius, in viro calidius; quare in viris calor abundantior extra forasque protrusit; in mulieribus vero ob ignaviam caloris, intus remansere. Verum hoc esse, patet ex historiis eorum, in quibus calor vegetior redditus Testes extra protrusit, sicque in virum fœminam mutatam asserunt, quemadmodum peculiari libro, vbi de Hermaphroditis quoque agemus, monebimus.

Inuolucris integuntur communibus & propriis, communibus binis, quæ non solum omnibus corporis partibus communes sunt, sed etiam vtrumque simul inuestiunt: totidemque propriis.

Communium primum [t. 18. f.] ὄρχεον, ^k quasi bursa, scrotum & scortum ^l quod coriaceo facculo sit simile; molle & rugosum est, & veluti futura quadam interstinctum, ex cuticula & ^m cute, [t. 18. r.] quæ reliqua cute tenuior est, efformatum, cui nihil pinguedinis ⁿ adiectum est, quo facilius extendi, cum

M 3

testes

salus quatuor agnoscit: at Fallopius modo tres, modo quatuor. Columbus proprias tres dicit, reprehendes Vesalius, quod duas tantum tradiderit. Archangelo triplices membrana: alia communes testibus cum omnibus partibus corporis, quod scrotum dicitur: alia communes testibus cum ductibus seminariis, dua, altera à tendinibus musculorum, altera à peritonæi productione: alia propria ipsorum testium.

^k Galeno: ὄρχη Hippocr. 2. de mul. & lib. inter affect. ὄρχεις, Aristot. 1. hist. 13. ὄρχια 1. gen. an. 12. Sic & Helycio, cui & μαστορία, ἢ τῶν διδύμων ὀρχέων, bursa aut vasculum testium ^l Veteribus scortea appellabantur, quæ ex aluta aut pelle constabant, unde scortei nummi, qui ex corio fiebāt. ^m Cuticula cute & membrana carnosæ ab ossibus pubis dilapsa constituitur. Archangel. ⁿ Huic peculiare est, quemadmodum & fronti & peni.

h Gal. 14. v. f.
 parti. 10.

i In tunica maxima est controversia, alij tres, alij quatuor, alij quinque, vel sex numerant. Gal. de diff. uteri 9. tres tantum agnoscit, ὄρχεον, διὰ τὸν κῆλον ἰσχυρῶς: sic & introd. 11. Ve-

testes semine turgent, & corrugari & crassius, vt sit loco complurium membranarum, effici possit. Licet enim membranæ adsint, eæque vasis plurimis intertextæ, quas potissimum ad pinguedinis generationem requiri ostendimus, nulla tamen pinguedo adest, quia nihil oleosi remanet, quod in pinguedinem concreescere possit; Cum omne illud, quod à nutritione testium redundat, in semen commutetur.

o Ruffo & Aegineta lib. 6. cap. 61. *δερτὸν* vel *δερτὸν* dicitur.

Dartos Fallopio: at Vesal. & Columbus nomen non dedit. Archangelus non meministi huius, quia Scorti nomine vtræque completitur.

p Columbus tres fecit proprias, reprehendens Vesaliū, quod duos tantum habeat.

q Gal. de diff. vul. 9. Ruffo

& Aegineta: Elytroidis & erythroidis Vesalio. Erythroides Fallopio & Columbo cui propriarum prima est. & Quod ab ea oriatur, membrana, in qua venarum & arteriarum sunt helices huius posterior pars *ἐπιδία*. A nervea musculorum obliquorum descendentiū tenuitate Columbo & Archangelo. & Columbo hac propriarum secunda *δερτὸν* dicitur ex peritonæi substantia pronata, & Archangelo sic dicta à *δερτὸν* circubando, quod in ea testes quasi cubare videntur. u Quibusdam à venarum copia sic dicitur.

Alterum o *δερτὸν*, quod facile ab aliis separetur, dictum, quod à panniculo carnosio [t. 18. t.] longe quam alibi tenuiore, venis & arteriis referto producit.

His, ne nimio calore frigoreue lædantur, sicque infæcundi reddantur, inuestiuntur & suspenduntur, Peneque flaccido magis dependent: eo vero distento, cute tunc collecta & corrugata, & sursum cum Pene retracta, sursum quoque alliciuntur. Propriæ tunicae, quæ quemlibet distinctum inuestiunt, duæ p sunt: Prima exterior, *ἐλυττοειδὴς* q vaginalis [t. 18. u. vbi adhuc integra t. 22. f. 2. i. t. 20. ad φ. x. v. dissecta] a forma dicitur *ἐλυττοειδὴς*, id est, capreolaris Paulo; à peritonæi l processibus enata, valida est, & tenuis, quæ exterius fibris quibusdam membraneis [t. 18. u. ad t.] frequentibus, vt aliqui t peculiarem tunicam censuerint, Darto connascitur, & nonnullis fibris vtraque vaginalis committitur, interius tenuis, & aqueo humore obducta, venisque abundans. Huic quandoq; exiguæ fibræ carnosæ u affunduntur, (vn-

de

de ἐρυθροειδὴς ab ἐρυθρίδω, rubesco, Oribasio dicta) quæ ad testis fundum abeunt. In canibus vero, fibras has carnosas à peritonæi productione acquirit, quæ coeuntes in musculi morem eorum testes sursum trahere possunt. Huius membranæ vsus estimatur, vt dum testes vaginæ instar inuoluit, vasa spermatica testibus arcte nectantur; vel vt à vasis in testes fiat rudis feminis infusio: vel potius, vt à testibus facultas vasis affluat.

Altera interior, Albuginea^x dicta [tab. 20. ζ. t. 22. f. 2. u. fig. 3. QRS.] quæ à vasorum spermaticorum y tunica oritur, alba, crassa, z & valida admodum (vnde ὑμὴν νευρώδης πρόσφυσις Ruffo) immediate testis substantiam inuoluit, quo eius carnem mollem [t. 22. fig. 3. T.] ac laxam fulciat, & veluti constringat, ne laxior reddita, inutilis fiat; eiusque interuentu tanquam medio, vasa quæ dura sunt, & quæ testium substantiæ molli committi debuere, adnasci statuunt.

Figura sunt rotundi, a paruorum ouorum instar vtrinque leuiter depressi, & propter adnata vasa obliqui, & propter parastatas protuberante, maxime in iis, quibus Parastatæ ita laxo nexu cum testibus iunguntur, vt in lasciuis, ac si gemini Testes essent; horum pars superior protuberans caput, b inferior, quæ obtusior & amplior, fundum nominatur; dexterque, qui propter vasa à Caua & Aorta puriorem sanguinem & spiritum adferentia eo delata calidior est, varicosior

M 4

c cre-

menyngibus nervos in testes propagatos inuoluentibus. Columb. Fallop. & Laurent. unde oriatur, non ostendunt. z Dura & solida Laurent. a Galen. dissect. vte. p. orbiculares rotundi, sed paulo oblongi: Laurent. paulo admodum oblongiores. Vesal. figura orbiculari, at non acquisite, sed oblonga ouorum instar: Columb. magnitudo communis instar exigui gallinacei oui leuiter vtrinque compressi, Archangel. b Aristotel. & Galeno κειφαλή: inferior vero pars, Polluci πυδμή dicitur.

x ἐπιδιδυμίδα
quia circa te-
stem proxime
extensa Vesa-
lio & Archæ-
gelo (sed ma-
le vt Fallopi-
us ostendit)
Columbo, qui
propriam & terti-
am dicit,
at Galenus
per Epididy-
mida tuni-
cam non in-
telligit, vt ex
24. vs. part.
24. colligere
est. Dantos
veterum Vesa-
li. & Flater.

y Nonnullis
à peritonæi: at
Archangelo à

c *Vesalius* negat discrimen aliquod esse, & aliunde quam à matre vel minore impetu masculorum & foeminarum procreationē pendere.

d *Hinc veteres* mares in dextris, foeminas in sinistris & à sinistru generari dixerunt, extat *Hippocrat. 6. Epid. section. 4.*

e *Quare Galenus 14. vs. part. 7. testiculum sinistrum in matribus & matricem sinistram in foeminis sanguinem impurum adhuc atque excremento-*

creditur, eiusque lateris semen magis percoctum censetur, quare δ ἀρρενόγονος Hippocrati dictus. Sinister vero, qui θυλήγονος eidem, semine refertior est, eo tamen imbecilliore & serosiore, cum ab emulgentē materia deferatur; vnde natura foeminarum generationi potius intenta videtur: hi membranarum interuentu coniuncti, ex ossibus pubis & pene propendent.

Substantia^f testium glandulosa g est, alba, h lactea, i mollis, laxaque^k in viris, & ob venulas frequentes, & exiguas [t. 22. fig. 3. iii.] dispersas, spongiosa, nullam tamen cauitatem obtinente. Musculum vtrinque l vnum obtinere eumque oblongum [t. 20. f. t. 22. fig. 2. x.] gracilem, ab osse^m ilium pronatum, vel à ligamento valido, quod à spina ilii ad ossa pubis percurrit, ea regione, vbi infimi ventris muscoli transuersi finiunt, quorum tanquā partes isti muscoli esse videtur, & per tendinum obliquorum foramen egrediuntur, & extrinsecus iuxta inguina vasis testes accedentibus, eorumque capiti adnascuntur: nonnunquam ab anteriore ossis pubis parte fibræ aliquæ carneæ his communicantur, vt geminus (sicuti in similibus) obseruetur ortus. Horum beneficio Testes, cum natura penduli sint, suspenduntur (vnde κρεμασῆρες dicti) ne vasis seminariis oneri sint: verum etiam in coitu eos retrahunt, quo canali seminario breuiore reddito, facilius semen suggeratur: & vt Galenus monet, motus voluntarii sint participes.

Hi vt

sum humidum ac serosum recipere, dixit: & partes dextras masculorum, sinistras foeminarum esse generatrices. f *Aristot. 1. histor. 13. nec eiusdem natura cum carne, nec multum à carne dissidet.* g *Galenus dissect. vulu. 9.* h *Alba & mucosa veluti ex pituita concreta constructi, vt ratione similitudinis requisita inter generans & id quod generatur, seminale, quale est, produci possit, Varolm.*

i *Quibus enim semen & testes flauescunt, vitio aliquo laborant.*

k *Galenus 14. vs. part. 10. l Galenus dissect. muscul. 27.*

m 14. vs. part. 14.

Hi vt nutrianturⁿ & viuant, à spermaticis [t. 20. w.] materiam accipiunt; Neruum mediocrem^o à sexti paris propagine costali [t. 9. f. 1. iii.] interdum etiam duo nerui à vigesimo primo pari medullæ P in lumbis prodeunt) vt cum extra corpus propendant, acutissimo sensu tactus præditi sint) qui vasis spermaticis P postea coniuncti, deorsum feruntur, & in testium tunicas implantantur.

Horum qⁱ vsus (cum sine his, neque semen gigni, neque generatio perfectorum animalium perfici possit) facultate sua insita semini non tam^r formam & colorem, cum in substantiam testium^f non excidat, quam nomen & vim prolificam tribuere, & ita validam ac robustam, vt animal perfectum ex eo generari possit, quæ in masculis roboris & virilitatis, in fœminis muliebritatis causa existit; ob quam facultatem testes prima generationis instrumenta, & partes principes statuuntur.

Verum & corpus^t robore, multaue caliditate adaugent, vt ex castratis patet, quibus temperamen-

M 5

tum

rum medula Varol. ab ossis sacri Archangel. cateri prateriere. q Aristoteles 1. gen. anim. 4. vduiit, non propter necessitatem, sed propter commodiorem usum animantibus esse concessos: & viles tanquam textorum pendera, vt vasa seminaria defeculentia extindant, quo commodior fiat seminis eiectio.

r Semen ggnunt 14. vs. part. 10. & 13. sed non soli testes, contra hanc enim opinionem Galenus disputat 1. semin. 14. nequaquam inquit, in vasis semen reperiretur, si nihil ad seminis generationem facerent.

f Testium substantia ingenita facultate materiam per ipsarum substantiam diffusam, in semen conuertunt, quemadmodum hepatis caro saugificationis opifex cœsetur, Vesalius addit: vasa materiam testi preparatam, seminique efficiendo opportunam communicare, sed non id in vnâ amplam testibus incisam cauitatem, sed in tenuissimam eademque tunica subtili admodum formata vascula, per testis substantiam frequentissim. serie distributa: vt testis substantia (quemadmodum iecori caro) facultate sibi insita perfectam seminis naturam impertiat. At Laurentio in testium substantia semen excoquitur & perficitur, vt in man. mus lac, in cerebri substantia spiritus animalis, in hepatis parenchymate, sanguis.

t Galen. semin. 15.

n Vt mam.
nuiuntur la.
cte, sic testes
semine: san-
guine tamen
nutriuntur
rubente, sed
in lac & se-
men conuerso
quemadmo-
dum ossa me-
dulla nutre-
untur. Sic om-
nes humani
corporis par-
tes nutriun-
tur sanguine
vel rubente,
vel conuerso
in substanti-
am parti a-
lenda conue-
nientiore.
o Gale. 14. vs.
part. 13.

p Alumbo-

u Hip. 2. Epid.
sect. 1.

x Hip. 4. Epid.
aph. penult.

tum, substantia, habitus & mores mutantur, idque ob partium superiorum cum testibus cōsensum maximum, ab Hippocrate^u quoque expositum. Testis intumescens ex tussi, commonefacit nos consensus, qui est pectoris, mammarum, genituræ & vocis; * & quanta sit partium spiritalium cum genitalibus cōmunio, sic ostendit: Tussi sicca vexantur, quibus testes intumescunt, & tussis in testium tumore soluitur vena secta, & inflammatione tentati tussunt, quin etiam ex inguinum tumoribus febricitantibus, tusses succedunt. Denique præstantia cordi sunt similes, siquidem epithemata cordialia testibus applicata in summo virium languore, non minus quam cordi admoda, profunt.

De vasis semen deferentibus.

C A P V T XXVIII.

De his Aristot. 3. hist. animal. 1. Gal. 1. semin. 15. & 16. 14.
vs. part. 12. & 13.

2 Canalis seminarius, Fallop. Laurent.
Vas semen deferens aliquādo & iaculatorum vibratoremque dicimus quia à teste semen assumit, & ad penem defert, Vesal.

VASA Spermatica deferentia [t. 22. fig. 3. H. I. separata à testibus] πρός σπέρματινοὶ^a Herophilo^b partim extra abdomen in scroto, partim intus, in coxarum antro sita, duo sunt; vtrinque vnum ad caput testis, à Paraastatis, quibus continua sunt, producta: continuantur^c enim vasa præparantia [t. 21. f. 1. f. r.] paraastatæ [t. 21. f. 1. t. ad u.] & vasa deferentia [1. 21. f. 1. γ. α. β.] quibus pro vario officio & situ, nomina imponuntur.

Sub-

proprius deferentia quam iaculatoria, Archangel. b Galen. 14. vs. part. 12.

c Continuuntur hac & superiores attractores, media præparatores, infima latores dici possunt, Archangelo. Sic vero Vesalio nullum omnino vasi semen deferenti cum venis & arteriis testium communio est, quod ex sectione patet. Varolo: Vasa deferentia à testibus oriuntur: Columbo, à præparantibus vni deferens oriuntur.

Substantia sunt neruosa, ad humiliorem testis se-
 lem [t. 20. n. deferentis vasis descensus, i. ad n. reflexus: & ta-
 bul. 21. fig. 2. y. exortus huius vasis: descensus α. eius reuolutio β.
 .22. fig. 3. ab E. ad F. deorsum] contorta, & vbi à testibus
 recesserunt, teretia & candida, cauitate^d perobscu-
 ra, [t. 22. f. 3. H. deferentis vasis superficiem porosam, quate-
 nis inuolucro connascitur, ostendit] cum semen ratione
 spirituum, quibus turget, facile permeet; hæc sursum
 feruntur [t. 22. fig. 3. G.] & ipsis præparantibus [t. 20.
 ad A. e.] tenuis membranulæ interuentu connectun-
 tur; mox per^f productiones peritonæi [tab. 20. ad φ. t.
 22. fig. 2. o. p.] via, qua præparantia descenderant, ad pu-
 bis os (quo loci os cauitatem [t. 39. f. 12. 13. γ.] habet
 superficiariam, vt horum vasorum rotunditati ce-
 dat) feruntur; deinde neruorum instar deorsum re-
 flexa [t. 21. fig. 1. ab γ. ad ζ. tab. 22. fig. 2. π. 5.] & posteriore
 parte (humorem & candicantem iam continentia) sem.
 peritonæo connexa super vteros [t. 22. fig. 2. H. H.]
 deducuntur, & sub posteriore sede vesicæ super re-
 ctum intestinum iuxta vesicæ ceruicem paulo ante-
 quam [t. 21. fig. 2. δ. & tab. 22. fig. 2. τ. coitus deferentium]
 vniuntur, vtrinque dilatantur & crassiora reddun-
 tur, quorum lateribus vesiculæ seminariæ [t. 21. fig. 1.
 ζ. ζ.] dictæ adponuntur; ipsa vero deferentia, dextrum
 quidem in dextram, sinistrum vero in sinistram glā-
 dulam Prostata[m] [t. 21. fig. 2. H. H. tab. 22. fig. 2. φ.] oblite-
 rantur.

Horum vasorum vsus^h semen in Parastatis elabo-
 ratum, à testibus prolificum redditum ad Prostatas
 tanquam in promptuaria quædam deferre; vbi dex-
 trum vas cum sinistro coit, vt vtriusque testis semen
 simul eo feratur, & in vterum per instrumentum eia-
 culatorium seu Penem eiaculari possit: ipsorum vero
 ductus obliqui, perfectioni inseruiunt: quemadmo-
 dum enim dum aquam vitæ paramus, videm⁹ liquo-
 rem

Quemadmo-
 dum & fora-
 mina, q̄ à teste
 per intimam
 ipsius tunicæ
 eius corporis
 reuolutionem
 pertinent, Ve-
 sal.
 e Sursum adi-
 lia, Galen. 14.
 vs. part. 12.
 f Gal. 14. vs.
 part. 13. 6. ad.
 anat. 13. & 1.
 sem. 15.
 g De dif. vulu.
 9. 1. semin. 16.
 Aristot. 3. hist.
 anim. 1.

h Eorum mu-
 nus semē è te-
 stib. & epidy-
 mide in ve-
 sculas tāquā
 penu & prom-
 ptuariū trans-
 portare: coquū
 di n. & alterā-
 di nullavie eis
 tribuitur Lan.

TABVLA XXII.

*Fig. I. Naturæ lufum in renis finiftri fitu, vafis e-
mulgentibus & seminariis proponit. Fig. II. Va-
fa seminaria cum testibus. Fig. III. Testium
varias formas & partes ex-
hibet.*




FIG III




FIG II



rem prius ascendere, mox descendere: ita semē, quod corpus spumofum futurum erat, per huiusmodi sublimationem & descensum, fieri debebat.

De vesiculis seminariis dictis.

C A P V T XXIX.

VESICULÆ Seminariæ [*tab. 21. fig. 1. & 2. aperta ostenduntur*] inter vesicæ urinariæ & recti intesti-

a Ex vena & arteria coalescenti iuxta def. medic. auctorem compositi. Vasa deferentia in hos anfractus dilatari vult Arantius.

b Galen. meatuum seminalium extremā partem sic appellauit: varicosa & sinuosa corpora vocat Fallopius, qui inter neruicos eleganter descripsit, & à Vesalio prætermittas scribit, eumque potius

ni ligamenta, ad latera ^a vasorum deferentium, paulo antequam crassiora reddantur & vniantur, positæ (vtrunque vna) neruea, satis insignes & magnæ, quæ non instar aliarum vesicarum vnā cavitatem habent, sed anfractuolæ & varicum instar implicatæ sunt (quare *ῥαγάδες* ^b *κίρρως δὲ*, varicosos adstites Herophilus vocauit) ita vt plures esse videantur, in quibus semen multis mensibus coaceruari statuunt. Cum enim natura conseruationis humanæ speciei appetens sit, omne tempus ad procreandos liberos opportunum esse voluit, ad quod opus fuit, vt materia apta perpetuo subministraretur: at quia homo perpetuo illi incumbere non potest, & excrementum sit excernendum, idcirco etiam aliorum excrementorum instar colligi & coaceruari alicubi debuit, & ad tempus opportunum asseruari, vt inde eiacularetur; quare vesiculas has creatas aiunt, in quibus semen continuo ^c exoneretur: at ne copiosum semen in vna cavitāte contētum, corrumpatur, plures in his vesicis meatus & anfractus existere: qui etiam

vasa seminaria canina nobis descripsisse asserit: & ab Herophilo in arte Anatomica exercitatiss. primo obseruatas opinatur. At Laurentius tradit è recentioribus primum Rondeletium, & post eum Fallopium descripsisse, & has vesiculas semen asseruantes, Laurentius vocat.

c Fallopius vult in his semen multis mensibus coaceruari: Vesalius & Columbus harum vesicularum non meminere, nisi glandosum corpus intellexerint, in quo

am impediunt, ne vno coitu totum semen effundatur; quare semen ex his varicibus se sensim explicans, utius & moderatius exire.

Verum hæcenus vesiculas has humore oleagino-
so flavescente (quem illi Prostatis includunt) plenas
obseruauimus, quo meatus semini & vrinæ commu-
nis illinitur, ne seminis vel vrinæ acrimonia lædatur:
vel ne exsiccatum confideat & prohibeat, quo minus
facile per canalem lubricum, lotium ac semen feran-
tur: hoc enim in coitu repente ac simul elabatur vna
cum semine & sui sensum facit: reliquo tempore,
paulatim & sine sensu: addit Galenus^d ad venerem
humorem hunc excitare, inque coitu delectare.

De Prostatis.

CAPVT XXX.

De his egit Galen. 2. de semin. 6.

PROSTATĒ, quod ante stat, προστάειν ἄδωκεν
dicitur^b Herophilo dictæ; binæ sunt [tabul. 21.
fig. nim alteros

estis digitis comprimās, absque vesicularum compressione, nihil exire: Si vero
vesica premantur, illico semen, veluti lac ex mamma, ad fistulam virgæ ex-
rimitur.

Galenus 14. vs. part. 9. & 2. de semin. 6. humor, inquit, quidam spermatis simi-
lis verum longe tenuior, quem periti quasi vno ore omnes semen dixerunt, conti-
netur, contra quos disputat, & 14. vs. part. 11. ad venerem excitare, & meatus
vrinarius madore aspergere scribit. Verum in glandulis prostatidis collocavit Gale-
nus, & distinguere oportet vesiculas hæc a Prostatis, illa enim oleaginosa, hæ-
c andidam materiam continent.

Columbo, parastata: Arantio, glandosum parastata: glandosum assistens Fal-
lopio: siquidem Vesalius, qui glandosum corpus vocat, & Varolus voluere παγα-
νῆος ἄδωκεν Herophilo dici. Varolus duos testes appellat, prioribus mi-
ores.

Galenus 2. de semin. 6. 11. vs. part. 11. at 14. vs. part. 9. & 11. ἄδωκεν ὁ ἄμφοτερον
at. Archangelus scribit, se non meminisse, Galenum de his egisse.

gyri & obuo-
tiones sint. Pla-
ter. vesicas se-
men suscipien-
tes vocat. Lau-
ren ex his ve-
siculis veluti
per tabulos &
helices sensim
ad vesica cer-
uicem, sicut
lac ex mam-
mis exprimi
scribit. Varo-
lus ait, sub te-
stibus minori-
bus duas vesti-
culas, sicut cy-
stim sub hepa-
te locari, qua
semen perfe-
ctum resuda-
tione colligat,
& inde sicut
lotium è vesti-
ca emitti. Si e-
fig. nim alteros

c Gale. 14. v. fig. 2. n. n.] glandulæ, vtrinque *c vna* ad humilimam [*t. 20. e.*] vesicæ partem, eiusque cervicem supra Sphincterem [*t. 20. p. tab. 21. fig. 2. θ.*] vesicæ muscolum, vel potius inter collum vesicæ & musculos inferiores prius ad eius radicem, vbi vasa deferentia [*t. 21. fig. 2. δ.*] uniuntur, in cauo abdominis locatæ; antè & postè depressæ, à lateribus rotundæ, in quas, tanquam alteros testes vasa deferentia desinunt. Hæ membrana, quæ vasa deferentia inuestiebat, inuoluuntur densiore, ne cum prostata spongiosa sint, semen sponte diffluat, tenuissima tamen, & complurimis cæcis spiraculis peruia, quæ primo intuitu non sunt conspicua, sed cum primum glandulæ comprimuntur, apparent, quo per ea spiracula semen veluti granulatim, & instar seminis milii (eo modo, quo Mercurius in corio arctè conclusus exprimitur) in communem ductum exprimitur ad seminis quantitatem satis euidentem, vnde in congressu voluptas excitatur, cum etiam exquisitissimo sensu prædita sit, substantia earum dura est spongiosa, reliquis glandulis candidiore: quin & magnitudine *d* insignes sunt, quia tantum seminis in se continere existimantur, quantum ad quatuor vel quinque *e* fœtus procreandos, satis sit.

Harum vsus, *f* semen elaboratum & prolificum

*d Caudata si-
ma maxi-
mas obtinent,
e instar nu-
bium exteri-
us reuolutas.
Vesal.*

*c Archangelo pro quatuor vel quinque fœtibus. Columbo, ut tres, quatuor-
us fœtus seris facile possint, præsertim in facundioribus: vnde non mirum, etsi A-
ristoteles tanquam admirandum proposuerit, taurum cui execti erant testes, ta-
men genuisse.*

*f Sunt qui velint ad seminia generationem conferre, siquidem nullibi plus semi-
nis reperitur. Hoc si fieret, tum castrata animalia eius excretionem peterent,
quod Galenus refutat. Varolus vult in termino vasorum deferentium, duos
alios testes minores positos esse, qui semini extremam absolutionem prabe-
ant, cum ad eos vasa deferentia ferantur, quemadmodum preparantia ad te-
stis.*

cum à vasis deferentibus & recipere, & ad tempus confusionis referuare, forte & perfectionem quam tribuere: cum in his crassius & candidius, in ceteris vero partibus tenue & serosum existat, & inter disseccandum in nulla parte plus seminis reperitur. Hæ à musculis inferioribus penis [t. 23. f. 1. & 2. H. I.] sphincterem an [tab. 23. fig. 1. M.] pronatis, parte posteriore compressæ, semen in ductum communem [t. 23. fig. 2. G.] quem parte anteriore aperiunt, expriment: in quem insertio conspectum fere fugit, & tempore excretionis^h feminis aperitur. Verum & solida sua substantia vesicæ ceruicem sustinent, ne succidat, quo foramina angusta plerumque insensibilia, ad extremum ceruicis vesicæ producta, recta maneat, ne semine in exitu impediatur: quamuis & ipsius collapsu, urinæ excretio remoretur.

De vesica urinaria.

CAPVT XXXI.

Huius historiam vide apud Aristotelem 1. hist. animal. 18. 3. eiusd. 15. 3. part. anim. 8. 4. eiusd. 1. Galenus de ipsius cunicis egit 5. vs. part. 11. & 16. de eius musculo 4. vs. part. 19. 9. eiusd. 16. lib. de diff. musc. 28. 6. administ. Anat. 14. de vasis vero 5. vs. part. 8.

VESICA urinaria, quæ κύστις, ὅθεν τὸ κέντρον, id est, ὑπογαστήρ, abscondendo^a urinam, κύστις & ἐκ δόχος dicitur, in^b hypogastrio, cavitatem [t. 9. H. t. 11. 3. t. 20. r.] quam os sacrum, ossa coxarum & pubis efficiunt: semen intrassare, oleosa humiditate ureterum irrigare: tenuem humorem gignere ad titillationem excitandam. h Vesal. p. 644. refert exemplum cuiusdam Patanijs suspensi, qui gonorrhoea laborans, hos meatus omnes apertos & laxos habuit, maxime vasorum deferentium in ceruicem vesicæ.

^a Τὸ πρὸς τὸν κέντρον ἀπὸ τῶν ὀστέων ἀπὸ τοῦ κοιλίου Arist. 1. histor. anim. ^b In uno abdomine quod appellant, Columb.

g Galen. 2. de semin. 6. oleosum humorem continere voluit: & 14. vs. part. 9. humor quidam spermatis similis, sed tenuior ad voluptatem in coitu, & 14. vs. part. 11. humor, qui in corporibus glandulosis gignitur, in meatum urinarium effunditur, in masculis una cum semine in matricem delatus: in feminis & foras & in muliebri pudendum effusus. Aliis semen tantum continent, at Fallopio oleosa humore sæpe plena, utrumque continere Laurentius voluit, statuens semen prolificum excipere & as-

c Galen 5. v. f.
part. 16 supra
intestinum ve
trium.

d Galen 5. v. f.
part. 5.

formant, quam totam vesicam, cum magna sit, cum recto intestino, cui c ceruix vesicæ adiacet & connectitur, implent: in fœminis verò inter vterum [t. 24. f. T. vesicam, L. vterum, at t. 25. f. vesicam, p. vterum notat.] & os pubis locata; tum quia ad imas partes excrementorum d alimenti eductoria ob commoditatem excernendi locata esse conueniebat; tum quia viscera nutritioni inferuentia, & tâquam nobiliora locum supernum occupant: quamuis & tutelæ gratia ossa hæc (nō quod ad vesicæ custodiam antrum hoc natura confecerit) circumiecta sint: verum inter duas quoq; peritonæi tunicas quæ quasi proprium ventrem constituunt (vnde forsā Diocles corpus in capit, thoracem, ventrem, & vesicam diuisit) sub ossē pubis, quando vacua est, sedem habet: & quando inanis est, tum in sectione statim vix cognoscitur, cum pyri maiusculi magnitudinem nō excedat; quando vero plena etiam in ventris cavitatem protuberat, & tactu in pectineprehenditur.

Connectitur fundus & anterior sedes peritonæo [t. 9. l. t. 11. *] laxè tamen, auxiliantibus & ligamento [t. 9. b. t. 11. i. t. 23. fig. 7. & 8. VV.] ab ipsius fundo [t. 23. f. 7. & 8. Q.] enato, & ad vmbilicum [t. 23. f. 7. & 8. T.] delato, quod Vrachum vocant in fœtu, quo medio vesica annectitur; & duabus Arterijs [t. 9. aa. t. 11. k. l. t. 23. fig. 7. & 8. X.] vmbilicalibus resiccatis, ne cū homo rectus incedit: ceruici incumbat, & excretionē impediāt. In canibus, processus tantum à peritonæo vesicæ offertur, fundus vero non adnascitur; estque alba, & ad fundum levis, lubrica, (quemadmodū & [t. 21. f. 1. e.] intrinsecus) aqueo humore oblita.

Figura c oblonga, aliquantulum rotunda; [t. 21. f. 2. e. t. 23. fig. 3. 7. & 8. Q.] quam aliqui sphæræ, aliqui cucurbitæ assimilarunt: si enim globi modo rotunda foret, à circumiacentibus partibus nimium pre-

mere-

c Rotunda;
& circularis,
Col. sph. rica,
Fallop. globo-
sa, Archang.
rotunda &
oblonga, ut
cucurbita,
Plat.

meretur: concaua, f quo liquorem copiosum excipiat; & ex amplo fundo sensim in angustum coarctato, in ceruicem angustam definit: quare vesicæ partes duæ sunt, fundus & ceruix seu collum.

Substantia ipsius partim membranosa, neruosaue ad commodam extensionem cum subinde impleri, & vrinam continere debuerit, quo non semper, sed interposito conuenienti temporis spatio ad vrinam reddendam vrgeamur, & eiusdem corrugationem post vrinæ euacuationē: partim verò carnosā existit.

Membranā triplicem habet, communem vnam, & proprias duas; illa exterior à peritonæo, robusta, densaque, quā integitur & firmatur, vt vrinæ copia distenta, minime diuulsa, frangatur, hacq; alligatur recto intestino in viris, & mulieribus vteri

[*t. 25. r. vesica ceruix u. supra pudendum vteri ceruici inserta tab. 26. f. 1. o. vesica ceruix fig. 3. e. vesica, d. vteri ceruix.*] collo, &

vicinis coxarum ossibus: Propriæ verò duæ simul iunctæ, modo crassiores, modo tenuiores sunt, pro ut distenduntur aut arctantur: quæ in fundi elatissima parte, & circa ceruicem ob vreterum insertio-

nem duriores & crassiores existunt. Quarum interior lucida, candidissima, tenuis, neruea, omni fibrarum genere neruoso densissime texta, quemadmodum omnes membranæ, quæ plurimum distendi & contrahi debuere; quarum rectæ intimæ; transuersæ

extimæ, obliquæ verò mediæ, pro functionū, vt volunt, ordine, attractionis, retentionis & expulsionis, quas dicimus ad vrinā continendam & expellendam factas: hæc facile, si vesica aliquantulum inflatur, ab exteriori separari potest. At ne vrinæ acrimonia,

cum exquisita sentiat, lædatur, ipsius fundi interior capacitas veluti rugosa & mucosa (aliqui veluti villosam dicunt) vel potius crustosâ tunicâ mu-

f. Cavitatem unicā habēs: rarissime. n.

membranā quæ se pro

duas partes diuiditur, q

in Illustris. Principis O-

notis bacensis cadauere nu-

per observatiō.

g. Ar. s. hyst. 15. nervosa

crassa satis Columbo to-

tam nerueam fecerunt, cum

tamen partiū nervosa sit.

Fallop. in ob-

serv. at in in-

stit. nervosa

substantia di-

xit.

h Tres tuni-

cas habet, ut

ventriculus,

Fallop. Arch-

ang Lauren. duas, Vesal.

g. Columbo.

1 Quæ joliaa

crassa & du-

ra sunt, no v-

rina copia a-

crimonianaue

& calculorū

asperitate di-

uellantur,

Laun.

k Gals. vs.

part. 11.

N 2

nita, part. 11.

1 Fallopius vult has fibras omnes expellere. m Varolius.

nita, quæ ex excrementis tertiæ concoctionis vesicæ generatur. Propriarum membranarū exterior crassior est, fibris carnosus conspersa, non vt in musculo rubentibus, sed subalbidis, quales in ventriculi & intestinorum tunicis apparent: tales autem videntur, quia membranis candidis interiectæ, quæ non nunquam ex sanguinis affluxu ita fiunt conspicuæ, vt membranam carnosam diceret.

Fibras has obtinet, tū ob custodiam nō solum caloris alias imbecilli, sed et ne internæ membranæ fibræ in repletionē valde distentis, vrina excidat: tum vt versus suam originem contractæ, musculorum ⁿ paruorū instar vesicam, quæ harum beneficio quasi motu voluntario se constringit, coangustando, exigua in eo contenta excludant.

Foramina tria habet; duo in posteriore, & humiliori sede paulo antequā in ceruicē desinat, vbi vterum [tab. 21. f. 1. ↓. 4. t. 26. f. 1. M.] inter duas ° proprias tunicas est insertio, per quæ serum à renibus expulsum in eam sponte effunditur, non per resudationē, p sed per patentia [t. 26. f. 1. M.] foramina, quibus vere gurgitare (imo ne flatus pertransire etiam distentā) possit, propter obliquā p vterum insertionem, vtrinque membranulam seu valuulam, pari fere cum folliis q rationi apponi volunt, sed impropria hæc est valuulæ acceptio. Tertium vrinæ præbens exitum in eius ceruice est, quæ oblonga r satis, angusta, sub ossibus pubis delata, penisq; corporibus subiecta, aliquantulum idcirco r contorta, sursum ab ano ad r pudendi exortū fertur, quod Penis cāalem constituat. In mulieribus u vero breuior [t. 23. f. 8. circa N.] & latior

n Nulla pars seipsam mouere potest, nisi fibræ habeat carnosas (exceptis arteriis) vt secundum illarum ductum seipsam colligat & contrahat Fallop. Hinc aliquando in tromissa fistula argentea, vt suppressum lotium educatur, manifestum motū per sentimus, quo seipsam constringit & veluti si quādam manus

esset, fistulam arripit. o Vesalius & Plat. inter tunicam à peritoneo & propriam perreptare volunt: inter duas proprias Fallop. vt Aesclepiades voluit, hoc meatum ignorans: contra quem Gal. 1 fac. nat. 13. disp. p Gal. 3 r part. 16. q Sic etiam Vesal. & Columbo. r Semidigiti spatio Columbo. 1 Gal. r part. 16. t Gal. 15. r part. 3. u Gal. de diff. vuln. 1. lib. 1, r part. 3. breue & angustum Fallop.

& latior [t.25.f.] recta deorsum protensa, pudendo muliebri iuxta exteriorē & superiorem eius finē im-
plantatur, per quam fœminis vrina, masculis vero v-
rina & semen excernitur: quare his posterius [t.21.f.2.
n.n.t.23.f.3. & 7.R.] duæ glandulæ x prostata crassæ &
albæ appositæ sunt, vasorum semen deferentium in-
sertionē excipientes. Est autem ceruix fere y carnea,
plurimis fibris contexta, alijs quidem rectis, sub qui-
bus transfusæ latitant, quæ ad eius principium, &
quidem supra dictas glandulas, sitæ, eâ constringunt,
ne nobis inuitis z quouis abdominis cōpressu, & va-
lidâ spiritus retentione, assiduo vrina guttatim ef-
fluat: idcirco ab vsu sphincter a musculus; à figura
vero literæ Græcæ Sigma, Sigmoides dicitur: quibus
non nisi per voluntariam ac validam musculorū ab-
dominis & diaphragmatis compressionē, vrina ipsa
quantitate, vel qualitate, seu acrimoniâ, vesicam iam
stimulante, laxatis, cum conatu emingitur (si.n.in-
uoluntarie & sine sensu effluat, fit ob musculum vel
paralyti b labefactatū vel refrigeratum) rursusq; su-
pernarum c partium compressione cessante, contra-
ctis, d reliquæ meatui adhuc inhærentes expellun-
tur. Hunc latentem transfersum musculum inter fi-
bras rectas tunicæ exterioris, glandularum corpori
connatū qui videre volet, vesicam leuiter elixet. Ve-
rum etiam infra glandulas fibras aliquod transfersas
videbis, canalem orbiculariter [t.21.f.2. & t.23.f.3.7.8.
9.R.] cingentes quas pro Sphinctere hactenus de-
monstrarunt; quod si foret, tum nunquam semen si-
ne coitu, quemadmodum etiam in gonorrhæa egredi-
tur. hac enim parte musculum in coitu dilatarī o-
portet, quo dilatato simul & vrina excideret, vt in
superior Sphincter dicitur.

N 3

Vafa

[illegible]

*e Vasa vtrin-
qua tria vesti-
ca collum s.
v. part. 8.*

*f Gal. 5. v.
part. 7.*

*g Gal. 5. v.
part. 8.*

*h Gal. 5. v.
part. 5.*

*i Arist. 7. ge-
ner. an. 18.*

*k Aristot. 3.
hæst. 15.*

*l Galen. 5. fa-
cult. nat. 5.
v. part. 7.*

*statuit virā-
que vesicam
viri habere
proprie trahi-
di excremen-
tum: at con-
trarium sen-
tire videtur
o. de loc. aff.
in diabete.*

Vasa *e* habet, venas & arterias vtrinq; ad cervicis latera (ne per longam viam sine munimento ducantur, & tuto inferantur) quæ bifariam diuiduntur: quorum pars vna in totam vesicam multis furculis distribuitur: altera pars quæ in viris propter penem maior est, in mulieribus minor, deorsum secundum ipsius collum fertur: illâ ad nutritionem (non enim urinâ alitur, nec cum vrina portionem sanguinis, vt Renes suscipit, sed *f* purum excrementum, idcirco venis indiguit) hac ad vitam calorisq; recreationē, à venâ *g* cauæ & aortæ bipartito scisso ramo Hypogastrico; [*t. 17. au.*] quare in vesicæ inflammatione venâ malleoli interna secanda. In mulieribus vero, à vasis quæ vteri cervicem adeunt. Neros insignes à sexti paris ramis [*t. 9. lib. 2. fig. 1. & 2.*] costarum radicibus exporrectis, & medullâ ossis sacri promanantibus ad sensum excretionis eorum, quæ molesta sunt; vnde & acutissimi dolores, quando exulcerata est. Vfus, urinam *h* humidi *i* alimenti excrementum sensim à renibus colatam, & per vretres delatam; & alia sicca *k* excrementa, ex quibus calculi conficiuntur instar lagenæ suscipere, & quidē non à vesica *l* attracta, sed eò à renibus depulsa, & sponte suoq; pondere delapsa, vnde corporis matula nonnullis, & meatu constricto ad tempus excretionis opportunum retinere, quod partim facultate naturali, partim animali perficitur.

De pene seu virili membro.

C A P V T XXXII.

Penis situm explicauit Aristoteles 1. gen. animal. 5. quem admodum rationem & structuram Galenus lib. 15. v. part. 1. vbi ostendit nullo commodiore loco collocari potuisse, 2. & 3. ipsius musculus, lib. de diff. muscul. 29.

PENIS qui à pendendo nomen habet, & *καυλός* virga dicitur, diuersa tam apud Latinos, quam

Græcos

Græcos obtinuit nomina, quæ qui scire volet, quẽdmodum & eorum nominum rationem, librum nostrum quem de partibus externis humani corporis scripsimus, consulat.

Situs est, ad externam imi ventris partem [*t. 23. fig. 1. & 2.*] qui ad anum propius collocari nõ debuit, illi enim incumbens egerentibus negotiũ exhibuisset: nec supra ^a pubem vel ad hypogastrium, cum ^b nulum ibi sitos, quare ex ossibus pubis omnino exoriri debuit (ex posteriori. n. parte ne potuit quidem) & quidem ad eorũ radices, idq; ob coitionis cõmoditatem, intromissionis in sinum pudoris vtilitatem, & ne aliarũ partium actiones impediuntur: hic cum sit sine coniuge, idcirco in medio positionem habuit.

Oblongus ^c est, [*t. 23. fig. 1. & 2.*] rotundus, sed non exacte, cum elatiore sede, quam dorsum Penis vocant, paulo latior sit, & in obtusam acutiem desinat; & si testis iungas, tormentum bellicum referet. Crassitie & longitudine variat, tam ratione speciei, quam indiuidui: ratione speciei, tanta est, quãta speciei necessitas ad prolem procreandam requirebat: breuior tamen homini, quam multis alijs animalibus, cum homines, non vt bruta parte postica, sed per mutuum complexum, coeant. Ratione indiuidui, communiter pro membrorum proportionem formatum, nonnunquam parui magnum habeat, propter copiam eius portionis seminis paterni, ex qua penis factus est; quamuis & coitus abstinentiam magnũ efficere voluerit Galenus ^d. Longior censetur futurus, si vasa vmbilicalia [*t. 23. f. 7. VVX.*] non proxime ad vmbilicum in puello modo nato ligentur, idq; ob ligamentum, quod ex fundo [*t. 23. fig. 7. X.*] vesicæ (vrachum vocant) vmbilicum accedit, ita vt proximius ligato, vesica sursum trahatur.

Integitur penis pars propendens cuticula cute

TABVLA XXIII.

Musculos penis ani & vesicæ, penisque partes proponit: fig. 1. & 2. penem excoriatum coxæ hærentem. fig. 3. eum separatum cum vesicæ, fig. 4. & 9. penem absectum & transuersum dissectum. fig. 6. penis canalem diuisum. fig. 7. vesicæ & penis anteriorem sedem cum vasis vmbilicalibus. fig. 8. vesicam muliebrem. fig. 9. penis corporum faciem posteriorem exhibet.



*e Motus gra-
tia quoq. eest
Columb.*

non admodum crassa, quæ in flaccido laxa, in rigido tensa est; ipsius longitudini æqualis, ipsiusque ad glandis inferiorem partem connexa: & panniculo carnosio, qui hic nervosus est. Nulla pinguedo intericitur, ne in nimiam molem excrescat & ipsius actioni impedimento sit, neue ipsius mollities erectionem impediatur.

Penis pars duplex est: alia, & quidem præcipua ventri proxima & non pendula, quæ *ἰσχυρὰ* nominatur, infra ossium pubis commissuram consistens, ipsiusque medio in perinæo ligamentis & musculis validissime connexa, sursum sub testibus delata supra scrotum teres conspicitur. Altera pars est, quæ *ἰσχυρὰ* dicitur, & à superiore pubis ossium sede à corpore propendet si languidus sit, vel si distensus sit, sursum erigitur: hicque tantum fere quando rigidus est, prominet, quantum uterus intra muliebri corpore delitescit, quo intra mulieris sinum immisus, ad uteri orificium usque, sobolis gratia, semen eiaculari possit.

Debuit autem virile membrum tale formari, quale ad commodiorem coitum, seminis cum voluptate eiaculationem, & venereos pruritus requirebatur. Osseum ergo non debuit esse, ut in cane, lupo, vulpe, Vtero enim fuisset molestus, nihil voluptatis attulisset, quin & rigidus semper prominendo, & indecens, & multis peragendis impedimento fuisset. Non cartilagineum, quia distendi non potuisset, siquidem cartilago cavitatem non habeat, nec flaccescere, non venosum, ^f non enim tam celeriter repleti aut vacuari potuisset, & quia simplex eius tunica, tensionem validam non ferret: non arteriosum, licet tunicam crassam & duram habeat propter pulsum continuū, cui imperare non licet: non nervus est, quia nervi perspicuam cavitatem non habent, nec sua natura di-

lata-

*f Galen. 15. vs.
par. 1. Arist. 4.
part. anim. 10.*

latantur, ipforum quin etiam mollities tensionem impediret, non ligamentum, licet ad tensionem esset vtile, nullam tamen cavitatem haberent, & cum sensu carcant, pruritus non excitarent, non tendo: quia cavitatem non habent, & minus duri quam ligamenta: multo minus ex carnibus, vel glandulis componi debuit, neq; ex musculis, vel membrana.

Peculiaris ergo substantia aliqua, qualis in alia corporis parte non est, requirebatur (quare hic quoque opificis sapientiā miratur Galenus) quæ dura, & caua, quo citra molestiam & cum spiritu^h sunt referri erigi & etiam flaccescere possit, & sensu exquisito ob cœundi voluptatē, propter obscenam actionē, prædita foret: Eiusmodi autem sunt duoⁱ corpora [t. 21. fig. 2. ii. t. 23. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9. A. B.] quæ cum canali penē constituunt, quæ dura sunt, nervosa, & ligamentata^k æmulantur (vtrinq; vnū, quæ ab inferiore^l ossis pubis parte [t. 23. fig. 2. 3. CC.] vbi id crassius & teres est, & superiore coxendicis parte tum propter propriam substantiam, tum propter ipsius actionem tanquam à corpore stabili, vt rectū^m & stabile pudendum seruetur; ortum ducunt; quæ exterius teretia [t. 23. fig. 4. & 5. EE.] interna sede plana & inferne ad exortumⁿ dissident [t. 23. fig. 4. & 5. EE. duo corpora, G. canalis] quo canali^o à vesica producto locum dent: mox sursum delata, circa ossis pubis medium inuicem committuntur [t. 23. fig. 4. 5. F.] ita tamen vt media quadam linea alba distincta obseruetur, si penis per transuersum secetur [t. 23. f. 4.] inde deorsum reflexa ad glandē [t. 23. f. 4. 7. 9. D.] usq; in acutū angulum interne abeūt,

Penisq;

Aristoteles 1. hist. 13. innuit, & addit Galenum nunquam hac corpora rescuisse, nec agnouisse, Vesalius. k Ligamenta, Archang. nervi, Laurent. coreaciam fistulam referentia. Vesal. l Ex superioribus ossium pubis partibus Galen. 15. vs. part. 2. m Galenus 15. vs. part. 1. n Ac si manuum indices partibus internis iungeres. Vesalius. c De hoc Galenus 15. vs. part. 3. cui nōg & arīpμλ & dicitur: Vesalio, seminarium vesicae mentus.

g Corpus nervosum à pubis ossibus enatū. cauū & omni humore vacuū 15 vsu. part. 1. huius exortū non debite Galenus expens. is asserens, id ex superiorib. pubis ossis sedibus pronasci, Vesal. non à superiore, vt male Galenus, Columb. h Galen. 15. vs. part. 2. i Si dissecteris non vnā cōcauū reperies nervum aut ligamentū à pubis osse enatū, vt Gal. 15. vs. par. docuit, sed duo corpora, quæ nō vacua & humiditate indiga, vt Gal. noluit, sed fungosa & veluti carnea, vt A-

Penisq; longitudinem cum canali efformant, iisque glandis substantia obnascitur: sicq; Penis totius figura aliquo modo ? refert, quod notare conuenit, propter vsum catheteris, cuius in suppressione vrinæ vsus est, qui nixi dexteritate quadam intromittatur, vel canalem, vel vesicæ collum lædit, ita vt sanguis subsequatur, vel in vesicæ cavitatem non peruenit.

P Nō causa est
ut per trans-
uersam secanti
E sanguinem
manantem
surgenti pate-
bit. Ve al ca-
ua sunt, Fallo-
pius i. stit. fi-
stula modo ex-
cauata, Laur.
q Gal 15. vs.
part. 2.

1 Fungosa &
veluti carnea,
vt recte Arist.
1. hist. 13. mo-
nuerit, materia
E plurimo ni-
gricante san-
guine instar
farciminis im-
plentur Vesal.
fungosa mate-
ria plena, non
carnea, vt ex
Arist. Vesal.
asserit sed ner-
uea ac ita du-

Substantia eorum est quidem fistulæ modo P exca-
uata (vnde nerui caui & 9 caruernosi appellantur)
sed fungosa^r materia [tab. 23. fig. 4. 5. EE.] atq; san-
guine (vnde nigricat, quod propter putridi penis se-
ctionem notandum) repleta: quæ spongiosa, ac si
ex innumeris venarum^r & arteriarum [tab. 21. fig. 1.
nn. t. 23. f. 5. b.] (quæ insignes ex regione ossis sacri
[t. 17. tt.] eo mittuntur) surculis tenuissimis varie im-
plicatis, recte efformetur: rara & ^rporosa, quo spi-
ritu^u sanguineque tam venoso quam arterioso pene
per pruritus irritato, subito repleti prompta sint;
sicq; penis flaccidus cum glande turgere, erigi (hæc
enim vnica causa) & produci possit: & sedato pruri-
tu, iisdemq; partim dissipatis, partim in vasa remean-
tibus concidere, flaccescere, breuiorque reddi pos-
sit. Si enim semper x tensus fuisset, homini artes
tractanti, præsertim mala nauium scandenti, impe-
dimento fuisset, & iniuriis obnoxius, ac si quis ma-
num semper protensam circumferat: si semper laxus
inutilis fuisset ad id, cuius gratia creatus, quare so-
lo coitus tempore tendi, tumidus, rigidus & erectus
esse debuit. Tumidus quidem & ad tantam magni-
tudinem expansus, quantum opus fuit ad ceruicem
mulie-

ra, vt quasi nerui duritiem excedat. Fallop. causa sunt, carnem raram a mouente
E fungosam continent, idem in insti. ut. f Auctor lib. de genit. hoc videtur velle,
dum veras E neruos ab vniuerso corpore in pudendum desinere tradit. 1 Penè lie-
nis (substantia similis, quam crassis induit ligamentis, Columb. v Non à flatibus
si. uti putabant colicis distenditur, Plat. vnde Arist. 4. part. 10. x Galenus 15. vs.
part. 1. Arist. l. c.

muliebrē amplam apte replendam, quo vtriusq; pendenda incalescant: si enim semen intus conclusum extra tractu quodam euocandum erat, caliditate fieri debuit, & quidem ex motu virilis membri intra muliebrem sinum facto. Rigidus vero & rectus non solius coitus causa, sed quo meatu diducto ac directo semen quam longissime eiaculetur: Si enim obliquus esset (vt in *ἡσυχία διαίτα*, & quibus ob vinculum, quod ad finem penis habent meatus contorquetur, idcirco non possunt nisi vinculo abscisso generare) aut alicubi in sese concideret, tum ibi semen hæreretur. At ne spiritus influens per substantiam spongiformem cito dissipentur, hanc substantiam tunicæ quædam membranosa, densa ac robustissima (quas aliqui ex vasorum & neruorum, qui ad penem feruntur, commixtione ortas volunt) ea obducunt & fulciunt, quæ corpora penis nervosa idcirco dicuntur: quæ etiam crasse, quo distendi possint. Quando enim in appetitu venereo, per venas & arterias sanguis & spiritus plurima copia influunt, membrum illud, sicut intestinum flatu repletum, illico intumescit & induratur: quod à musculo sphinctere, qui ceruicem vesicæ & radicē corporum penem constituentium & extremitates intestinorum cingit, si contrahatur^a & spiritum in illis partibus abundantem ad penem exprimat, fieri videtur, ita vt motus voluntarius nō solum ad erectionem, sed etiam ad indurationem concurrat.

Canalis [*t. 23. f. 1. 2. 4. 5. 7. G.*] quē *ἐπίσπραν* & fistulam vrinariam vocāt, & porum spermaticum aliquando Galenus^b nominat à vesica [*t. 21. f. 1. λ. à vesica e. tab. 23. f. 6.*] prodit, cuius collum productius censetur, qui sub corporibus penis [*t. 23. f. 4. 5. G. sub. EE.*] positus, cum iis reflectitur (in quō reflexu si semen putridum in gonorrhœa subsistat, ibi canalem exulcerat)

y Gal. 15. vs. part. 3.

z Gal. 1 c. At
Ægnet. lib. 6.
ca. 54. Hypo-
spadæos vo-
cat, quibus
glans ab origi-
ne non perfora-
ta est, sed sub
pene foramen
habent, de his
Arist. 4 gen.
an. 4.

a Sicut viderimus
ingulares
venas in risu
& quavis cō-
pressione tho-
racis, nec non
venas cubiti
ab constrictione
nem ligatura
expandi ac in-
durari, Varol.
b Galen. 15.
vs. part. 3.

c De hac nil
habent Vesal.
Columb. Fal-
lop. Plat. Va-
rol. Laur. &c.
Archang. in-
terioris me-
minit.

d Substantiam
canalis Vesal.
Fall. p. Plat.
Varolus non
explicauit Co-
lumb. & Laur.
nihil aliud,
quam vesica
substantia ad
penis fines e-
longata.

e Arabestres
meatus in pe-
ne constituunt
unum vrina,
secundum se-
mini, tertium
viscido humo-
ri, qui hume-
ctum penem
subinde red-
dit, viro im-
pensius concu-
bitum appe-
tente.

f Meminit
Vesal. iuris stu-
dio si Forou-
tiensis.

g Gal. 13. v.

h Locum in quo Galenus de his erat acturus in lib. de ad. anat. una cum quinque & dimidio eius operis libris intercidit, una cum ipsius de mus. nris peculiari libro. At 15. v. part. duos solum habet secundum Viethram per totum penem digestos à me hæcenus non repertos, ait Vesal. p. 394. Archang. imitatus à Gal. duos priores non proponit. At Laur. quatuor ita descripsit duos secundum penem longi. tudine à superiore ossis ischii parte: alios à laterib. ossis pubis enatos, per latera penis f. rri.

rat) ac medius constitutus secundum longitudinem ad glâdis initiū, à corporibus simul coeuntibus [t. 23. fig. 4. s. F.] amplexus, porrigitur; cum enim per ipsum semen fluere debuerit, fistula hæc insculpi debuit.

Donatur autem membrana *c* duplici, altera interna tenui, qua & glâs integitur, ex tenui meninge nervos penis conuultiente enata, in qua circuli conspiciuntur, & exactissimus sensus, ut voluptatem à semine excitatam, cum per eum decurrit, percipiat: dein, ut canalem hunc circumscribat. Alteram habet externam carnosam ex fibris transuersis ad seminis & vrinæ expulsionem conflatam. Huius canalıs substantia *d* media laxa, [t. 23. f. 6.] fungosa, nigricans, quo simul cum corporibus nervosis ad seminis effusionem distendi, & vrinæ commodiorem excretionem flaccescere possit: qui ductus semini & vrinæ & humori oleaginoso è communis est, & anteriore sedē in foramen, per quod excretiones hæc fiunt, dehiscit, quod in iuuenibus collectum; in aliis pro ut cutis retracta est, plus minusve diductum est. Rarissimum enim est *f* dari distinctum meatū, vrinæ alium, & alium semini dicatum: cū enim *g* vesica prope esset constituta, non erat melius ad excernendum lotium alium efficere meatum, sed meatu seminis uti: quare vesicæ collum sursum ab ano ad penis exortū fertur. Ast cum motu voluntario hæc absoluantur, musculis indiguit.

Musculos ergo quatuor *h* habet, duos collaterales, vtrinque; vnum, qui a coxendicis [tab. 23. fig. 1. 2. K. L. in figura 1. adhuc hærentes principio fig. 2. dependentes ad insertionem] appendice infra corporum penis principium

nervosi

neruosi enati, mox carnosi, breues, & sequentibus
 crassiores fursū, oblique delati, in corpora penis, non
 procul ab exortu [t. 23. f. 2. CC.] inferuntur, & penem,
 (qui iam motu volūtario à spiritu & sanguine ex cō-
 stricto ani sphinctere eo propulso, erectus est) in cō-
 gressu dum simul contrahuntur, deorsum & anterius
 muliebri sinui inferendum, flectunt & donec opus
 absoluantur i sustinent. Alii duo inferiores [tab. 23. f. 1.
 2. H. I. fig. 1. adhuc adnati, at fig. 2. à principio dependentes] v-
 trinq; vnus ab ani sphinctere [tab. 23. fig. 1. M.] carnosi
 k exorti, longiusculi sunt, qui internis lateribus vin-
 cti, recta subtus secundum longitudinem delati ad
 medij canalis latera [t. 23. fig. 1. G.] implantantur (& in-
 uicē diuisi penis corpora non nihil amplexantur) quo
 inferiorē canalis partem, vtrinq; deorsum retractā,
 pene^l erecto manente, dilatent, breuemq; reddant;
 ne in corporum neruoforū repletionē, præsertim in
 obliquo penis inflexu constipetur, sicq; seminis exi-
 tum, vi spiritui in canalis cavitatem impulsu, qui to-
 tus sibi ipsi continuus, confertim quam celerrime &
 recta ad vterius peruenire debet, m impediatur, idcirco
 latissimum simul & rectissimum seruari oportuit.

Verum & prostates [t. 23. f. 3. & 7. RR.] comprimunt,
 vt semē, quod in iis turget tempore eiaculationis per
 earum membranā granulatim in canalem, vbi dein
 simul miscetur, exprimant, tum etiam in mictione,
 aliqui n canalē distendere, alij o in mictionis fine vri-
 næ residuum in ceruicis sine subistens exprimere vo-
 lunt. Si vero omnes quatuor simul agant, penis ra-
 dicem, quæ erectionis tentiginisve quandam vim
 obtinet, voluntario motu trahunt. Inter hos muscu-
 los in perinxo [t. 23. f. 1. inter M. & H.] seu interfœmi-
 neo (sic enim spaciū penem & anum incircedens no-
 minatur) calculi eruantur; fistulæ & vlcera hoc loco
 frequenter infestant, quare hic locus diligenter ob-
 seruandus.

i In meliando
 quibz opē ferru
 vult Celumb.
 k Illis similes
 qui à pectoris
 osse ad os refe-
 rans porrigun-
 tur, Vesal.

l Gal. 15. vs.
 part. 3. Ar-
 chang. hoc tri-
 buit, duobus
 musculus ab in-
 feriore parte
 ossis pubis cis-
 tis, qui per pe-
 nis truncum
 sparsu ad glan-
 dem ferantur.
 m A musculus
 inuari seminis
 excretionem,
 in epilepticis
 patet, in quib.
 ex conuulsione
 compressis mus-
 culis, fit glan-
 dularum com-
 pressio & in-
 voluntaria se-
 minis excre-
 tio.

n Vesalius vo-
 luit
 o Fallop. in in-
 sit. & Ar-
 chang.

Vasa

Vasa duum generum ad penem feruntur, alia externa, alia interna: venæ & arteriæ externæ [t. 17. tt.] seu cutaneæ, per eius cutim distributæ, à Pudenda prodeunt, quæ copiosæ & nonnunquam tanquam varicosæ nigricant. Venæ vero internæ geminæ ab hypogastrica [tab. 17. uu.] prodeunt; quæ cum ad bifurcationem mediam peruenerint, ferme semper in vnam coalescunt, & per corpus inter medias arterias ducitur. A qua sub osse pubis propago quædam insignis abdomen ingressa, per ligamentum, quod vesicam ossibus pubis nectit, disseminatur.

Sic arteriæ P geminæ internæ ab hypochastrica [tab. 17. uu.] insignes ad bifurcatam penis originem eius corporibus inferuntur, ita tamen vt inter eas vena media per dorsum penis vna cū neruo ad glandem valde implicata (forte fungosam substantiam constituentia) ferantur, quo spiritum & sanguinem in spongiosam substantiam penis, ipso per pruritum irritato effundant.

Nervi 9 quoque ab ossis sacri medulla prodeunt, quorum alij cutanei ad penis & testium cutim abeunt: vt externas molestias sentiant: alij interni, vtrunque vnus, isq; insignis sub ossibus pubis per mediam bifurcationem ad penis radicem ascendens, & inde ad ipsius musculos, & totum eius corpus, vna cum arteriis per dorsum ad glandem vsque varie dispersus percurrit, quo sensum & exactionem peni, præsertim glandi pruritus causa, quo ob actum venereum eget, tribuant, in his ganglia fiunt non dolorosa, quæ in causa sunt, vt dum penis erigitur, veluti arietinum cornu intentum, vt Fallopius ^f loquitur, turgeat & non distendatur.

Tan-

P Arterias has
 & vsum earum (qui est substantiam flaccidam spirituum affluxum erigere) nemo ante me agnouit, per quas alimen- tum quoq; fer- tur, cum in pe- ne nulla siue- ra, nullus ner- uus ut male Vesalius. Hac Columbus. At Archang. ve- nas, arterias et nervos agno- scit, quos ait, cæci ipsi & vi- derunt & vi- dere possunt, cur enim venis priuatus infæ- liciore sit con- ditione reli- quis partibus? & monetur musculus, hi autem per ner- uos agunt, &c.

Alias ascen-

dum erit, arterias vehicula esse crassioris sanguinis pro nutritione: easdem facultatem motricem vehere. q Nerui insignes ac valde manifesti, ita vt nisi lusciosos latere possint. Fallop. & Gal. 14. vsq; par. 13 nervi plures ad virgā, &c. In obseru.

Tandem summa penis pars carnosa [t. 23. fig. 1. 2. 3. p. 5. 7. 9. D.] tumens, & reliquum eius corpus (quod *Archang.* truncū aliqui appellant) ambitu excedens, quo reliquis partibus veluti cucurbitulæ fundū magis incalescat. equalis & turbinata, caput *ἐλάανος*, glās dicitur, q̄ coronæ modo (vnde *σεφάνη*) circulo cingitur, quæ mollis admodum est, ne vterum lædat: non nihil acutā, vt vteri orificio se melius accomodet, meliusve ingrediatur; exquisiti sensus, pruritus causā, cum magis alteri debuerit, cum ex motu & frictione, accedente imaginatione intentissima, seminis fiat ejaculatio, tenuissima membrana proxime intacta, quā Canalem succingens produxit, corporibus penis obnata; substantia spongiosa, quæ intus non caua, sed paulo solidior est.

Quo verò læuis, mollis & lubrica asseruetur, inuolucro donatur, quod à penis cute producta atque reflexa, exoritur, quod *περὶ ἡν* præputium à putando, eius vero prominentior pars, *ἀκροπόδιον* dicitur, quod in coitu nunc sursum, nunc deorsum fertur, vt hoc attritu magis incalescat, cum mulierum voluptate & tentigine: & ornamentum quoddam adferre nonnulli volunt: hoc in extremo aliquando contrahitur, vt reduci nequeat, nec glans sine medica manu aperiri possit. Et quò rursus tegi possit, membrana vel vinculo, quod *χαλινόν* *x* frenum seu fibulam appellant, & ex neruorum extremitatibus compositum quidam volunt, in inferiore parte cum summa glande ligatur, quod & seminis profusionem causat, dum per canalem motum & calorem Prostatis semen continentibus communicat: sæpe enim libidine turgente, leuissima eius y perfrictione semen effunditur.

In huius medio foramen, vt per hoc tum semen, tum vrina profundatur, cum communem canalem

u Gal 15. vs. part. 3. cutis epibysin appellat.

x Κόων ὁ κηρόδεστων caninum vinculi Archang. ligamentum vocat.

y Quæmadmodum à vilo copiose assumto, si quis digito supremū gula contingat, ob partium continuitatem ventriculus contrahitur, cibumq; contritum vomitur.

O am-

z Plato in Timaeo pudendū virile animal quoddam efficit censuit, quoniam ei insita vis, quae generandi valde est appetens. At non est animal, quia pars est animalis. Deinde vis generandi appetens, non illi, sed cerebro insita, quae in hūc funditur. Ergo non animal, sed animalis instrumentū ad procreationē comparatum.

aa Quemadmodum natura nasum dedit ad odorandum, quibus secundo ad vitium ad mucosa excrementa cerebri expurganda.

a Γεννηθεία μὲν ἐκ τῆς Hippoc. referente Galen. diff. uteri 1.

b Lib. 3. vsu part. 14.

c Lib. 14. vsu part. 11.

d Gal. 14. vsu

ambiat, quo loci amplius est, rursusque arctatur, quia si feminis mora intentiorem delactationem in glāde efficere debeat: quare hoc quoque loco gonorrhoea laborantes, propter feminis putridi in hac amplitudine asseruati acrimoniam, vlcerebus infestantur.

Vfus; factus est penis, quo mas & foemina, eorundemque semina concurrentia, simul misceantur procreationis causa; eo etenim deficiente omnis procreandi potestas adimitur; ipse vero canal, ut semen à Prostatis vsq; ad orificiū vteri, qui profunde in mulieris ventre locatus est, ciaculetur, unde instrumentū iaculatoriū quibusdā dicitur: per hunc quoque vrina licet propter^{aa} hoc nequaquam constitutus fuerit, cū sine eo mulieres mingant, tanquā per canalem aliquo vsque, ne nos conspurcemus, deriuatur.

Muliebres partes generationi inferuentes.

CAPVT XXXIII.

PARTIVM genitalium^a constructionem, si earū compositionē, magnitudinem, conformationē & reliqua omnia diligenti animo perpendatur in vtroque sexu, admirabile esse, recte Galenus^b monuit: Sunt autē duplices, viriles, de quibus iam dictū fuit, & muliebres, de quibus nunc sermo erit: Galeni^c fuit sententia, foeminā omnes partes habere, quas & masculus habeat forte, quia, cum foemina homo nata sit, quaecumque in homine masculo extabant partes; eadē in foemina reperiri debuere, & in eo duntaxat discrepare, quod in mulieribus quidē hā intus sunt conditae, in viris autē extra ad perinaeum sitae: quod in Talparū oculis etiā accidit. Quare partes aliā materiā feminis à toto deferūt, venae nimirū & arteriae spermaticae; alię semē elaborāt, corpus varicosum & testes, aliā semē perfectū deferūt, vasa deferentia, hocque vna cū virili semine recipit, cōseruat, elaborat, pro foetus generatione, vterus. Vterus verō scroto virili^d alli-

mila-


nilatur [videt. 29. f. 1.] quæ scrotū vterus, sit vniuersus
 ibi ossib. pubis ppendens: sicq; scrotū & vterū solo si-
 u & inuersione distare cēsent. Si enim scrotū inuer-
 ūm inter vesicā & rectū intestinū intro trudi singas,
 tunc testes, qui in scroto erāt, vtrinq; extrinsecus affi-
 ſtent, & quod antea scrotum erat; nunc vteri rationē
 obtinebit. Vteri vero collū loco penis erit, cum collū
 & penis idē sint longitudine, frictione & refractione,
 ab iisdē in eūdem ductū semen effundatur. Differunt
 tamē nomine situs, q̃ in mulieribus intus, in viro ex-
 tra sit: ductu, in muliere amplius, in viro angustus, pa-
 rietibus ductui circumiectis, qui in mulieribus te-
 nues quidē, at in viris crassi sunt, sed potius dicamus
 collū vteri collo scroti respondere: & peni virili, penē
 muliebrē quem clitoridē vocant. At Fallopius vterū
 figura peni virili admodum similem dixit; cum vteri
 corpus glandi respondere videatur: sinus autem seu
 collum: peni, ac si penis cum glande ad intra inuersus
 esset: testes vero cum vasis, virilibus assimilari posse:
 ac si natura masculos similiter ac fœminas iisdem or-
 ganis præditos esse voluerit, vt sibi penitus similes
 generare possint. Quare cum in prima formatione
 fœtus, & fœminæ, & masculo eadem membra gene-
 rentur, sit vt pro maiore vel minore calore masculus
 vel fœmina generetur; ita vt quando caloris vi hæc
 extra propelluntur, masculus fiat; quando vero præ
 caloris imbecillitate extare & foras emicare non pos-
 sunt, sed int' remaneat, fœmina nascatur. Quare fœ-
 mina tanto est mare imperfectior, quanto frigidior,
 quā tamē imperfectionē magna vtilitas cōsecuta est,
 cū fœminā quandā esse oportuerit: idcirco summus
 opifex partē totius generis nostri dimidiā sua sponte
 imperfectam creauit, tanquam ad generis instaura-
 tionem commodā; cum fœmina facta sit, vt esset re-
 ceptaculū seminis, ex quo nouus homo generaretur:

part. 6. quæ in
 capite etiā do-
 cet fœminam
 mare imperfe-
 ctorem esse.

Archangelus
 in viro irrede-
 cim requirit,
 qua etiam sint
 in muliere:

duas venas &
 duas arterias
 attractrices:
 duas parasta-
 tas, duos testes:
 duo vasa de-
 fectu, duos pro-
 statas & unū
 penem. Contra
 Laurent. viri.
 usque sexus ge-
 nitalia. & si-
 tus. & structu-
 ra, & numero,
 distingui vult.

TABVLA hæc XXIV. *ventrem inferioriorem mulieris ; intestinis remotis exhibet.*



a Vena & arteria seminales, materia seminis attractrices, ut testium ab uniuerso corpore.

Archang.
b Gal. diff. vteris à causa vena & arteria magna duarum & arteria: addit alia quatuor vasa in quibusdā mulieribus herophyllum vidisse, quā ab illis, quā in renes tēdunt, exortu vuluā incant, quod autē se in multis aliis animalibus, nisi in fœminā inuenerit potuisse.

c Arist. & Erasist. ut testatur Gal. lib. pro prio, solo spiritu plenas esse voluere, quib. Bonacciolus & Mercatus li. 2. cap. 1. assentire videntur.

d Vesal. hoc voluit p. 659. Fallop. vasa spermatica testatur arteria masculina antequā

sed hac de re in tractatu nostro de trāsmutatione sexus fœminici in virilem, plenius dicturi sumus.

De vasis spermaticis preparantibus.

CAPVT XXXIV.

De his Galenus egit 14. vs. part. 10. & 12. & libello de dissectione vteri, cap. 5.

VASA spermatica^a materiam seminis à toto deferentia, & alterantia quatuor^b sunt, duæ venæ & duæ arteriæ. Venarū dextra [t. 25. dd.] à trunco caua infra emulgentē, iuxta os sacrum pullulāt: sinistra [t. 25. ee.] ab emulgēte sinistra pedit, quia hoc latere arteria magna prope venā cauā sita est, quæ arteria cū perpetuo moucatur, si vena spermatica à trunco caua prodiisset, super arteriā deferri oportuisset: sicq; periculū fuisset, ne tenuis vena à perēni arteriæ magnæ motu rumperetur. Arteriæ vero ambæ [t. 25. g. h.] ab arteria magna trunco, sub emulgente prope os sacrum exoriuntur, spirituoso sanguine plenæ. Hæc licet eundem cū virilibus exortū habeant, nō tamen, ut in viris peritonæi cavitare excidūt, nec ad pubis ossa ptingant (uō enim fœminā foras maris instar, sed in suū vteri semē emittere conueniebat) nec etiā anteq̃ ad testes veniant, miscentur, quā in insertione & diuisione variant. In muliere namq; pinguib. membranis [t. 26. f. EE.] suffulta feruntur ad testes [t. 25. ii. t. 25. f. 1. F.] quo anteq̃ attingant, facta quadā venæ cū arteriæ, anastomosi in duas partes diuidūtur, quorū pars vna, seminariū [t. 26. f. 1. I. K.] vas, corpusq; varicosum cōstituit ramulis testibus & eorū tunicæ p nutritione cōmunicatis. Altera vero pars, membranā vteri fundo adnatā petit [t. 25. ll. t. 26. f. 1. H. f. 2. ff. t. fig. 3. bb.] in vteri latera distribuit, & potissimū ad elatiore fundi partē alimentū defert, quemadmodū etiā ad conceptus nutritionē, quo laudabili sanguine cōmode alatur: peque etiā vasa mensiū portio potissimū in mulieribus se

sed nō grauidis expurgatur. At in viris tota in corpus varicosum absumuntur. Differunt quoq; à virilibus breuitate viæ; cū enim semē muliebri tanta elaboratione nō indigeat, quanta virile, ppter ea ea vasorum longitudine opus nō fuit, quæ intra vētrem minime cōtineri possit. His admirabili anastomosi ad seminis delineationē implicatis, parastatæ^f exiguæ constituntur, cū & testes parui sint, & vasa spermatica parua, à quibus exigua vasa in testes dirigi s volunt.

De Testibus.

CAPVT XXXV.

Galen. de testib. egit 14. vs. part. 10. ac differentiā inter viriles & muliebres cap. 12. & 14. eiusdem libri ostendit, libro de diss. vteri 9. Cur autē alia animalia testes extra habeant, alia intus, vide Arist. 1. gener. animal. 12.

TESTES, qui infimo vētri [t. 24. M. N. t. 25. 11. t. 26. f. 2. ff.] ob innatā mulierū frigiditatē inclusi sunt, quo calidiores, magisq; fœcundi intus vtrinq; singuli, a vteri lateribus [t. 24. vteri fundū L. testes M. N. t. 25. vterus p. testes ii. t. 26. f. 2. & 3. c. vterus, testes ii. & ff.] supra fundū in non grauidis accumbunt: in vtero vero gerentibus, eā fere sedē occupant, qua ilium ossa sacro cōmittuntur, & laxis membranis [t. 24. OO. QQ. t. 26. fig. 1. EE. t. 28. M. N.] à peritonæo pductis, quæ mediā quoq; testium partē integunt, cōtinentur. Hi à mariū testibus differunt situ, cū intra abdominis cauitatē lumborū musculis incumbant; figura, quia nō ita crassi & rotūdi, sed antèrius & posterius lati^a & depressi [t. 26. f. 22. ii] superficie externa inæquali, ac si plures exiguæ [t. 25. ii.] glandulæ^b inæquales^c cum aliæ maiores, aliæ minores sint, iungerentur: oblongi [t. 26. f. 1. F. f. 3. ff.] sinuosi & caui, & præter exiguos in ipsis vasis plexus, humore^d aqueo instar crassiusculi lactis feri simili, inanis pleni, in ægris vero, veluti vesiculæ humore aquoso, alias lymphido, alias croceo, luteo tingente &

ad testes veniant, uti in viris, cum semine iuncta ferantur ultra testem.

c Gal. 14. vs.

part. 9.

f Testes mulierum Epididymidis non habent, aut si habent, ita parua sunt, ut vix appareāt. 14. vs. part. 14.

g Archang.


a Gal. 14. vs. part. 12. & dissect. vt. 9.

b Omenti & mesenterii glandulas referūt. Ves. & Plat.

c Multis inæqualib. tuberculis oppleta, Ves. p. 658.

d Vasorum seminaliū, ortus & ductus & testium substantia & conformatio, mulieres semē habere, utcumque persuadet, sed id humidius et frigidius virili Ves. 662. Fallopius asserit nunquā semen

TABVLA hæc XXV. *Ventrem inferiore
ventriculo & nonnullis membranis
proponit, quo vasa generationis re-
ctius conspiciantur.*



in testibus re-
perisse, sed vel
ut vesicas a-
qua, vel aqueo
humore alias
luteo, alias lym-
phido turgentes:
semē vero tan-
tū in vasis sper-
maticæ vel de-
latois voca-
tis. Resp. Ar-
chang. tantum
male affectas
secuisse Fallop.
quod probetur,
quia dicat, se
vidisse in i-
psis, veluti ve-
sicas aqua ple-
nas.

e Duo exempla
humoris foeti
di in testibus,
quarū altera
strangulatu
interijt, ha-
bet Vesal. 6. 8.
f Substantia
non ut viro-
rū testes mol-
li, verum du-
riore, Vesal.

graucolēti, referti, vnde vteri e strangulatus causatur
Differunt quoq; magnitudine, quia multo minores
substantia, quia humidiores & f molliores. Nec ita cō-
pacti, cum semē imperfectius genituri essent: tēpera-
mēto, & quia frigidiores, vnde earū semē est humili-
tenuius & aquosius. Forte vt ex hoc tenuiori, tanquā
ex aqua, & ex masculo crassiori, tanquā ex farina, fiat
veluti pasta in vtero ad hominis generationē fermē-
tanda: Si enim vtrumq; semē, crassum, densum com-
pactū ac glutinosum fuisset, nō potuissent per mini-
ma permisceri. Tandē inuolucris differunt, cū vnica
h tunica [t. 26. f. 1. K.] (siquidem in abdito, tutoq; locc
contenti pluribus opus nō habuere) quæ Dartos di-
citur Galeno, crassitie & duritie tunicæ virili cedens,
quæ ipsis vatidissime adnascitur, ac si cum eorū sub-
stantia continuum corpus essent: quæ vasa seminaria
excipit, & ipsorū substantiam inuestiendo continet.
verum & peritonæi processus testiuū mediam tantum
partem inuoluunt, vbi vasa spermatica suscipiunt.

Vsus testium, i vi in ista semen foecundum redde-
re: quarum enim testes male dispositi, hæ infœcun-
dæ & steriles sunt. Fœminæ namque non secus quam
mares, semen sed frigidius effundunt, etsi hoc Ari-
stoteles k neget: qui voluit humorem qui secernatur
per collum, non esse humorem seminalem, sed loci
proprium, vteri nimirum excretionem, quæ alijs
eueniat,

at Columbo non ita crassi & molles, quemadmodum in viris. g Gal. 14. vs part. 10.
h Gal. diff. vteri 9. dartos habent, cum careant elitroyde & seroto. Columbo vero
vna diuaxat membrana epididymis à nobis dicta circumdatur, & à peritoneo.
Platero tunica interiore propria & exteriori à membrana vteri deducta, inue-
stiuntur. i Fallopius ait testes in fœminis ad seminis generationem factos non
apparere: sed venas quæ ad vteri fundum feruntur, glandularum vicem præstare,
cum in ipsarum diuicatione sulcrum quoddam necessarium fuerit. Columbo se-
minis generationis gratia conditi: Archangelo, semen absoluentes id foecundum
reddunt. Laurentio, semen elaborant: Platero, forte ad seminis aliquam elabora-
tionem visua aliqui conferunt, licet materiam seminis minime admittant: vel
potius ad humectationē & diuicationē vasorū, quibus adiacēt, k 1. gener. an. 20.

eueniat, alijs non, vt quæ fuscæ sint, & viragines: cum monēte etiam Hippocrate¹ & Galeno ad perfectam generationem vtriusq; semen mistum concurrat, & singularum partium forma potentia contineatur: quare opus fuit loco, quo id reciperetur, talis autem vterus est, de quo mox sermo erit.

Hipp. 1. de diata. & lib. de nat. puer. Galen. 14. vs. part. 11. egit de semine mu-

liebri. Semen, inquit, in matricibus manet, cum foemina est conceptura, quod principium seu origo est membranarum & vasorum omnium. Ipsum enim amplius co-quitur, & initio statim ex semine foemina nutritur, tanquam id natura familiare magis sit, quam sanguis.

De vasis deferentibus, seu eiaculatorijs.

CAPVT XXXVI.

Galenus de his egit 14. vs. part. 10. & lib. de dissect. vteri 9. vbi hæc Dioclem, Praxagoram, Philotimum, Aristotelem, Herophilum & Eudemum ignorasse refert.

VAs deferens^a semen vtrinque [t. 25. mm. tab. 26. f. 1. *. f. 2. gg. f. 3. gg.] vnum est, quod alijs^b à præparantibus, alijs^c à testibus oriri volunt, quod per ligamentum vteri tanquam fulcro sustentatum fertur, nerueum & candidum: circa testem^d latum & amplum [t. 25. mm. tab. 26. f. 1. *. f. 2. gg.] membranofum, & nonnihil complicatum, vesiculam seminariam rugosam, qualis in viris ad prostates reperitur, referens, in medio insigne foramen habens, tubæ extremo orificio simile (hinc vteri tubam Fallopius^e nominauit) quod vasa spermatica ambiunt [t. 25. n. t. 26. f. 2. hb.] & capreolorum modo in se crispatur, cū magis rugosum [t. 26. f. 3. gg.] & flexuosum sit, quam in viris propter viæ breuitatē, vt viæ breuitas flexum multo sensu euident habent. diff. vr. 9. c Ita se habere ait in omnibus non solum humanis, sed etiam ouinis, ac vaccinis cadaueribus, reliquisq; omnium brutorum, per quam tanquam spiraculum vteri fuligines intra abdominis cavitatem exhalant.

*a à seæa corre-
p. n. x. diff. v-
teri 8.*

*b Laurentius
& à Castro.*

*c Pinaus qui
à testibus ex-*

*eunt meatus
seminarij, eo-*

*dem modo ut
in maribus*

continere se-

men conspi-

*ciuntur. Gal.
diff. vr. 9.*

d Iuxta te-

*stes lati sunt
& foramen*

f Fallop. & Plat.

220

CASPARI BAVHINI

Gal 14. v. part. 10. in foemina cum in ipsas matricas vasa inferuntur, cum constituant, ut in capacitatem internam semen excernerent, & cap. 11. ad semen à propriis testiculis trahendum, cornua fluere. ð. parata: ad virile semen, meatus quem collum vocat, & ad pudendum vergit. Varolus sperma in testibus genitum ad uteri cavitatem accedit: nam à testibus plurima ex eunt vascula per membranam quandam, velut menses

multitudine compensetur, cum non uti in viris, per peritonæi pductionem efferatur, quia testes non pendent. Vasa hæc deferentia, ubi à testibus paululum recessere, sensim angustiora [t. 25. mm. t. 26. fig. 1. * f. 2. gg.] fiunt, & non ad vesicæ collum, ut in manib. feruntur, sed ad uterum, ad cuius latera [t. 26. f. 3. kk.] quæ cornua dicuntur (vnde nonnulli f vasa deferentia prodire volunt) ubi pervenire, utrinque; [t. 26. f. 3. hh.] diuiduntur, & harum pars altera brevior sed amplior in sui lateris cornu [t. 26. k.] medium, & locum proximè implantatur, ut in id uterique; capacitatem semen perfecte coctum effundit: pars vero altera, quæ angustior est, sed longior [tab. 26. f. 3. ii.] secundum uteri latera ad eius cervicem [t. 26. f. 3. d.] utrinque; fertur, & infra os interius sub ceruice in prostatas^h inferiturⁱ quæ non ita ut in viris sunt conspicuæ, cum foeminarum semen non sit corpulentum: quæ semen ad tempus coitus conseruant; perque; hanc viam gravidæ in coitu, non vero orificio uteri interiore reposito, semen effundunt. Cum enim facta conceptione os uteri [t. 26. f. 1. inter C. & D. & f. 4. G.] exquisitè claudatur, mulieres tamen gravidæ coeuntes, semen profundant, necesse fuit alia via semen excerni, cum per cavitatem uteri undiquaque; repletam neutiquam ad orificium eius semen migrare possit. Et licet concessio in cavitatem uteri gravidæ effundi, cum os uteri non recludatur, nec ob metum abortus^k recludi debuerit, sequeretur eo

teriolum distributa, quæ in aliud vas insignitus deferens dictum desinunt, quod in supremam eius partem implantatur, & cavam ingreditur. h Columbus Parastatas appellat. quo d. sinere negat, sed ad matricis duntaxat cavitatem, in quam semen transfundatur. Quæ semen fundatur, non consentiunt, in matricis cornu voluit Gal & Vesal matricis tantum cavitatem, Columb in matricis & cavitatem & cervicem, Varolus & Laurentius non in matricis cavitatem sed in cervicem, Herophilus & Archangelus. i Vesiculas & glandulosas prostatas, mulieres non habent. Laur prostatas concedit Archang. k Sunt qui in coitu perpetuo os uteri recludi volunt, licet enim virile semen in utero fundum non recipiatur, m-

hebre

tur eo putrefacto, fœtum enecari: dum enim extra
 vasa consistit, circa noxam retineri non potest, imo
 veneni¹ quoque naturam inducit quod grauissima
 hysteriarum viduarum symptomata comprobant.
 Quare hic meatus [t. 26. f. 4. ii.] vt recte Varolus mo-
 net, ceruici implantari debuit: qui in ijs, quæ non
 conceperunt, ita exiguus est, vt non nisi à diligenti
 Anatomico obseruetur: at in grauidis amplissimus
 est: hinc forte cum longiore ductu semen feratur,
 nonnullæ grauidæ magis quam ceteræ in coitu dele-
 ctantur. At Fallopij fuit circa vasa deferentia senten-
 tia, hæc ab vteri [t. 26. f. 2. g.] lateribus seu cornibus
 oriri, sursumq; oblique è regione testium ferri, non
 vero à testibus prodire, cum ab ijs in sanis fere dimi-
 dij digiti transuersi spacio distent, nec vllum vas ap-
 parere, quod à testibus ad hos meatus transeat, sed
 tantum membrana tenuissima à peritonæo produ-
 cta simul copulari, non vero se inuicē tangere. Quod
 si vero vterus sit male affectus, & quidem vno latere,
 tum affecta tantum, non autem sana parte, testibus
 iungi: si vero vtrumq; latus afficiatur, vtrumq; vas
 deferens, cum vtraq; teste iungi.

*liebre tamen
 exitū require-
 re: quod vero
 non simul fœ-
 tus eiiciatur,
 fieri, quia al-
 ligatus sit &
 immaturus:
 idcirco primis
 mensibus coi-
 tum periculo-
 sum esse, dum
 embryo adhuc
 tenellus est, &
 ligamenta pa-
 rum valida.
 l Gal. 6. loc.
 aff. 5. maior
 noxa ex va-
 tento semine,
 quam men-
 struis.*

De vtero.

CAPVT XXXVII.

*Vteri situm, descriptionem & differentias Aristoteles 3.
 hist. animal. proposuit: at Galenus libello proprio de
 Vteri dissect. & toto fere libro 14. de vsu partium de
 eo egit.*

VTERVS naturæ^a campus est, in quem semen^a Ar. 1. gen.
 tam viri, quā mulieris partim effunditur; par-^{an. 2.}
 tim attrahitur; sanguisq; muliebris affluit, quod noua
 humani generis proles generetur, nutriatur, augea-
 tur, &

TABVLA hæc XXVI. *varias vteri è corpore exsecti figuras proponit. fig. 1. vteri ceruicem sursum conuolutam, & vesicam propter vtereres dissectam, fig. 2. & 3. vterum cum suis vasis exhibet. fig. 4. vteri fundum dissectum, eius tunicas & rimam pudendi dilatatam, ostendit.*



tur, & vsq; ad debitum tempus partus conseruetur. Anima namq; naturalis vegetansue quæ potestate in semine latitat, per totam feminis molem æquabiliter diffusa, in actu p. duci debuit. Quare vteri recipientis viribus & calore, accedente facultate efformatrice, quæ in semine viri potentia continetur, in actû educitur, & ex semine vtroq; procreat, & conformat æquabiliter simul, & semel eodẽ tempore omnes corporis partes, quoad fundamenta spermatica & substantiam solidam, quæ *ινώδης*, & *ὕμενώδης* dicitur: quoad vero fundamenta sanguinea, & substantiam *σπρωώδην*, seu ppria parenchymata, diuersis temporibus ea perfecit, prout singulæ & alimētum & ignē fuerint nactæ: sicque partes hepatis viciniore, prius quam remotiores perficiuntur: & ex quidem prius, in quæ prius sanguis maternus illabitur: illabitur aut primo in venā vmbilicalē ideo primo absoluitur sua substantia carnosa, à qua sanguis dein in alias partes deferitur, vt plenius in historia foetus dicturi sumus.

b In cæteris animalibus vulua potius dicitur teste Plinio l. 11. c. 37 idem tamē l. 8. c. 43. a sine, uterum tribuit. Dicitur etiam *καὶ*

Dictus autem fuit Vterus, qui proprie ^b mulieris est ab vtre, quia cauus est, & vtris modo foetum continens impleatur & distendatur. Hippocrati *ἡ γυνή*: ac communiter, ^d quemadmodum & Galeno *ὁ ὕστερος*, ^e quod extremum locum inter viscera obtineat, si non exacte, at saltem *κατὰ πλάτος*: iisdem quoque *μήτρα*, vulua mulierum loci & vtricus nūcupatur.

Situs

ἐξ ὧν de vulua suilla numerata quondam in deliciis apud Plutarch 8. sympt. prob 9. c Lib 2. epid. & Galeno citate de diffict vteri *γυνὴν λέγει ὁ γέννησις μὲν ἡ μήτρα, καὶ τὴν μήτραν*. d De prisc. med. de superfœ. Sic de locis in homine *αὶ ὕστερος* omnium morborum muliebrium causa sunt. e Gal. diff. ut 3. c. 4. 14. vsu part. 3. c. 15. eius. 3. at 6. loc. aff. s. non oportet sollicitos esse, *uterum ὕστερον ἢ μήτραν* appellamus: Sic Platoni in Timæo *μήτραν καὶ ὕστερον*. Arist 1. hist 13. t Soranus lib. de vte. & Pollux lib. 2. quamvis *ὕστερος* & *ὕστερον* dicantur etiam secunda, id est, omnia qua editum in lucem infantem statim sequuntur, apud Dioscoridem g Sic Gal. libellum de vtero inscripsit: at in lib. de vsu part. modo *μήτρα*, modo *ὕστερος* dicitur: Hipp. de loc. in hom. de superf. de his, qua vtero non gerunt. Videtur ab Hippocrate,

commu-

Situs est in corpore [t. 24. L. t. ab. 25. p. t. 28. L.] quia *communis*
 semen iniectū, ut suscitetur, multo calore eget: in in- *locus uterū*
 fimo ventre, cum supremus & medius ossibus circū- *istegē appel-*
 detur, in eo locari non debuit, quia fœtu crescente *latus: ipsa*
 dilatari non posset, sed fœtus compressus suffocaretur; & quidem parte eius infimā, quē hypogastrium *vero canis: as*
 & paruum ventrem vocant, partim ne instrumentis *metegē: libro*
 alimentum conficientibus impedimento sit: partim *anum de su-*
 propter facilem coeundi modum, facilioremq; fœ- *perforat. in*
 tus¹ exclusionem: quod ad inferiora, & ad crura exi- *τῷ μέσῳ τῆς*
 tus fœtui sit futurus facilior: in eo corporis antro *μήτρης. Ari-*
 & cavitare, quæ pelvis dicitur, ita ut antè ab os- *stoteles 3. hi-*
 se pubis, posterius ab osse sacro à lateribus ab ossi- *flor. i. inte-*
 bus Ilium, quam firmissimis vallis^k tutelæ gratiā cir- *rior pars utē-*
 cumdetur, uterus scilicet non grauidæ: cum in his *ex καὶ δελφίς:*
 fundus sacri ossis initium non superet, nec aliud *μήτρε δ' ὁ*
 præter rectum intestinum [tab. 24. K. tab. 25. q.] ei in- *καυλὸς, καὶ τὸ*
 cumbens tangat, nec etiam antè vesicam [tab. 24. *σπῆγμα τῆς υἱᾶ-*
 T. tab. 25. f.] etiam vacua superet: inter¹ vtrumque *ρῆς, matrix*
 namque & vesicam & rectum intestinum locatus *dicitur de col-*
 quo posterius velut¹ substerniculum quoddam ad *lo & ore utē-*
 spinam habeat, ne ossium duritie lædatur: antè *ri. Dicitur*
 autem vesicam, cui succumbit, & quæ ei præponi- *& ὑπὸ τῆς καὶ*
 tur sit veluti propugnaculum. Hinc colligās splen- *ἀσπείον κυή-*
 didum primæ nostræ habitationis domicilium, ut *θηλον, vas*
 qui ex fragili & peritura materia, inter stercus & v- *fœtum con-*
 rinam nati sumus, & in terram & puluerem reddi- *servans.*
 turi, quare qui superbimus Plinij dictum sedulo *h Lucillo bul-*
 perpendantes, inquentis: [Heu dementem ab his *ga. quasi fol-*
 initis existimantium ad superbiam se genitos,] in in- *liculus & lo-*
 fimi ventris medio, quo^m corpus sit in æquilibrio: *culus: hinc*
 Eamque ob causam pelvis in mulieribus amplior, *forte Gaza*
 unde *vocem υἱᾶ-*

P

vnde

hæstor. i. 1. ge-
 ver. an. 9. & 12. & 3. eiusd i k Hoc & Columbu fuit ac Archangel hos nihil di-
 cere ait, quia uterus extensus supra venterem venit. Res recte quidem in gra-
 uidæ, sed vix plurimum uterum vacuus est. 1. Diff. uteri: i. 14. vs par. 14. in Gal-
 1. 1. vs. part. 2.

vnde & nates illis grandiores & ampliores. At foetus crescente, cum parte superiore liber sit, sensim ad superiora extenditur ad umbilicum [*tab. 28. L.*] vsque gracilibus intestinis incumbit, ilia quoque in partu vicinis insigniter implet, nec ad amussim mediani sedem occupat, sed magis in dextram aut sinistram inclinatur, quod subinde ratione diuersitatis sexus ipsius foetus euenire solet, non tamen perpetuum est. Nonnunquam inter vesicam & uterum omēti portio incidit, & ob uteri os compressum sterilitas ab Hippocrateⁿ proposita, causatur.

n *Lib. 3. aph.*

46.

o *Quib. commi-
tatur &
adiaceat, ex-
plicatur de
diff. vte 4.*

p *Ligamen-
ta qua deorsum
vocat. expli-
cat 14. vte
part 14. qua
& apte pugnata
vincula o.
loc. aff. 3. no-
minat.*

q *In Timao,
referente et-
iam Gal. 6.*

loc. aff. 3. Py-
thagora, ani-
mal per sei-
ssim distin-
ctum Aretaeo,
viscus prope
an. matum,

o Connectitur partim substantia sua, partim p li-
gamentis quatuor, quorum duo superiora sunt, &
totidem inferiora: verum fundus [*tab. 25. p.*] ante-
rius, posterius & superius nulli parti adiacenti con-
nascitur, sed liber est, quo commode in gravidis dis-
stendi, in coitu & cupiditate concipiendi nunc sur-
sum, nunc deorsum sese mouere, & ad penis sum-
mum tanquam animal hiare possit, vnde Platoni
ἡ ὥν ἐπὶ θυμῷ τῆς ἀνδρὸς, quod libidinem explendo ani-
mal generet, dicitur: qui & odorem suauitate alle-
ctus mouetur.

At à lateribus ossibus Ilij, ligamentis [*tab. 24.*

OOQQ. *tab. 28. IK. tab. 26. fig. 4. III.*] membranosis à

r peritonæo enatis, quæ vasa quoque utero dedu-
cunt, & vespertilionum [*tab. 26. fig. 1. EE.*] alis assimi-
lari possunt, alligantur; quæ nonnunquam carneis
fibris [*tab. 24. PP.*] intertexuntur, (quare nonnul-
lis musculi^r dicuntur) quorum beneficio uterus,
cum in vtramque eius partem distribuuntur, deti-
netur,

& velut animal quoddam in animali. r *A lumborum musculis Galenus 14. vs.
part. 14. diff. vte. 4. ubi vult in utrasque partes uteri distribui. 1 Vesatio duo mu-
sculi, quorum beneficio uterus voluntario motu nonnihil & obscure deorsum, dum
mulieres Iliam contrahunt, ac ducunt & interitum, a deo crasse sentit, ut hac cornua
uteri esse aliquando crediderim. Archangelo, cren. astres uteri, quod eum suspen-*

netur, quæ licet valida sint, attamen laxa t admodum sunt, & mollia, ita vt in nulla alia parte adeo laxa reperiuntur, quia cum toto vtero extendi, & ipsum se-qui citra lacerationem debuere, cum vterus grauidæ, qui amplius maxime fuit, post partum in summam angustiam contrahi debuerit. Sed his quoque ligamentis, tanquam franis coerceri volunt, cum sæpe vt cum Hippocrate diuinus voluit u philosophus, per totum ventrem, maxime steriliū oberet; modo sursum vt Hippocrates x loquitur, diaphragma & hepar comprimendo suffocationis metum causans nunc ad lumbos, x & coxas irruit, doloresque excitat: maxime tñ sinistrum latus molestat: quare eas quæ conceptus inutiles gerunt, potissimum de molestia, dolore & morsione sinistri lateris conqueri sæpissime obseruauimus; nunc deorsum fertur y dum libidine turgēt, & nonnunquam vesicæ ceruicem comprimens, strangulatum causat: Verum vterus z non tanquam animal errandum aliās ad alium locum discurret, propriamque sedem relinquit, sed duntaxat dimouetur, & ab extensione retrahitur, cum ex menstruorum retentione venarum & ligamentorum vteri plenitudo oritur; & si aliquid descendit, id exiguum est. Et quando ad ventriculi fundum retrahitur fit propter conuulsionem vasorum, quæ modo ex repletionē, modo ex inani-

dant, alij asserunt esse membranas suspensorias: alij musculos: nos putamus esse membranas musculorum parietes, siue processus membranosos musculorum paruorum participes. Cæc. Colombo duo lata particula membrana. Gal 14. vs. part. 14. u Plato in Timæo, vt habetur apud Galenum 6. loc. aff. s. vterus cum sit animal, prolem generare cupiens, si diu infructuosum fuerit, succensens at gre fert, &

P 2

errans per totum corpus, & spiritus meatum obstruens respirare non sinens, in extremam anxietatem deicit, & multos alios morbos excitat.

x De his quæ vtero non gerunt: at Gal. 6. loc. aff. s. negat ad diaphragma pertinere, imo ne quidem ad ventriculum (intellige successione partium.) Absurdum etiam humoris desiderio ad viscera ascendere, cum per sua ora multa, ex concaua vena sanguinem attrahere possit.

y Aristoteles 7. hist. 2. multis desiderio coitus vel iuuenilis atatis ratione, vel quia diu abstinerunt, descendunt vteri, & menstrua sæpe ter in mense citantur. donec conceperint, quo facto ascendit, & suo situ constituitur.

z Gal, 6. loc. aff. s.

a De articulis, ubi popliteis articulum non secundum naturam moveri posse ostendit, quia coxa consentiat.

b Libro de partu Casareo S edito, ubi docetur modus factum vivum ex matre viva sine periculo vitæ extrahere. Idem testatur Auenzoar. cap. de exitu uteri: & Benivenius libr. de abditis, cap. 11.

c Auenzoar. libr. 2. tract. 5. cap. 4. scribit extracta matrice posse mulierem vivere, & Aegineta idem testatur.

tione oritur, non quod uterus vel animal sit, vel voluntarium motum possideat, vel supra ventriculum cōscendat. Et Hippocrates^a id videtur innuere, uterum non per se transmutari, sed à quibusdam alijs trahi. Nonnunquam tamen ita à pondere fœtus, vel difficultate partus, ligamenta relaxantur, ut vteri fundum deorsum feratur, & in sinum decidat: aliquando quoq; inversa ceruice extrapudendum, penis modo intra earum femora magnâ molestiâ propendet, ita ut quandoque Chirurgi manu auferatur, vel etiam sponte totus è corpore ligamentis putrefactis excidat, ut alibi exemplis^b ostendimus, cum fœmina sine vtero^c vivere possit: cum ipsius ad indiuidui conseruationem nulla sit necessitas, sed ad speciei tantum conseruationem, & fœtus generationem maxima nobilitas. Ceruix vero seu canalis, cum vicinis partibus, non tamen vndique connectitur. Ad latera membranis quoque adnascitur, & illarum interuentu laxè peritonæo connectitur: posterius ossi sacro^d & tenuioribus fibris cum aliquanta^d pinguedine recto intestino, cui toto ductu incumbit, & supra pudendum cum ano vnita coalescit, ut aliquando ex latere stercus per pudendum excidat. Anterior vesicæ ceruici [tab. 25. t. tab. 25. fig. 1. O. fig. 4. L.] & cum vteri ceruix latior sit, etiam ossibus pubis beneficio membranarum à peritonæo enatarum nectitur: hinc inflammato vtero tenesmus^e & stranguria causatur.

Ligamenta^f inferiora [tab. 25. o. o. tab. 26. fig. 2. k.] Similiter duo sunt, quæ nonnullis κρεμασῖνες dicuntur: Sunt autem processus nervosi, rotundi, lumbri-

d Galenus diff. ut. 4. e Hippocrates lib. mulieb. f Vesalius non meminit. Columbo processus uteri, quorum usum nemo ante ipsum exposuerit. Fallopius in institut. habet & Plat. Varolus uteri cornua vocat; Archangelus, Ligamenta uteri.

Lumbricis similes, rubentes, concaui, præsertim in extremo, vt insculptam membranam vaginalem referant, quæ cavitās aliquando & pinguedine infarcta reperitur. Hæc à lateribus [tab. 25. ad p. t. 26. ad c.] vteri^h vtrinq̃ue prodeunt, & in suo exortu vasa semen [tab. 25. m. o. t. 26. fig. 2. g.] deferentia contingunt, ad inguina ascendunt, & per peritonæi productionem, quomodo vasa spermatica virorum feruntur, & tendines musculorum obliquorum abdominis pertranseunt; hac productione dilatata, vbi tamen prius interior tunica eam cōstituens rupta fuerit, quemadmodum in difficiliore partu sæpe accidit, hernia mulieribus, vt in viris cōtingit, & ligaturâ post sectionem curantur.

His extra abdomen fibræ carnosæ ab osse Ilium prodeuntes, iunguntur, quæ musculos κρεμαστήρεςⁱ seu suspensores admodum paruos constituunt, qui nullam cum testibus communionem habent, secus quam viris, quorum vasis spermaticis assident.

Ligamenta hæc supra os pubis [tab. 26. fig. 2. l.] in latam ac neruosam exilitatem degenerant (cum membranâ quæ anteriorem ossis pubis partem tangit & inuestit, quasi permixta) cui Clitoris^k inhæret, ac alligatur, vt cum neruea sint, ideoque exquisitissimi sensus, ex eius attritu imaginatio hiscē ligamentis, & ab his, vasis semen deferentibus, comunicetur: quamuis horum vsus quoque sit, vterum, ne extra pudendum excidat, suspensum tenere (quemadmodum Cremasteres^l in viris testes suspendunt) firmare & roborare, tum propter grauiā onera, quæ sæpius diuq̃ue continet, tum propter ingentes conatus in partu excludendo, tum quoque

P 3

propter

vteri: Laurentio, quibusdam veterini cremastires.

g Carneotomentoreferunt, extra peritonæum, musculum cremasterem illi annexum, continet. Fallop.

h A testibus deorsum feruntur. Fallop. ab anteriore ossium pubis parte, à membrana ossa pubis inuestiente, & ascendunt ad tendines musculorum abdominis, & penetrant foris intro & in corporis vteri fundum lateraliter inseruntur, Pinao.

i Vesalius de musculis cremasteribus nil habet.

k Nullibi Clitorini, vt Columbus pu-

tat, attingens ait Fallopius. l Opinor, vt fœmina omnes prætes adessent, quæ sunt in viro, ideo pro cremasteribus & tunicis vaginalibus à natura factos hos processus geminos. Fallop.

propter humores à toto corpore huc defluentes, qui non tantum humectare, sed etiam partem relaxare possunt.

m Pinus.

Verum quatenus fibræ carnosæ intertexuntur, eatenus motui *m* inferuire volunt, & virilis seminis attractionem voluntariam à collo in vteri capacitatem adiuuare.

*n De diff. v
ters. 3. figura
proponitur.*

n Figura est rotunda [*tab. 25. p. t. 26. f. 1. A. f. 2. c.*] quo sit capacior, minusque iniurijs obnoxius supra aliquantum depressa [*tab. 26. fig. 3.*] vesicæ similis, si apices, quos cornua vocant, excipias; cum vteri & vesicæ fundus amplius sit, & ceruix angusta maxime in gravidis: at in non prægnantibus fundus latitudine ceruicis latitudinem non superat: nonnulli cucurbitulæ *o* compressæ assimilârunt, & formæ & attractionis causa, cum virile semen ad cauû vteri non perueniat, nisi ab eodem attrahatur: quod si vterum cum ceruice spectemus, rectius pyri *p* formam [*vide tab. 26. fig. 3.*] exhibere pronunciabimus, siquidem fundus ab angulis deorsum rectâ sensim arctior redditus, ad ipsius ceruicis principium fertur, quæ meatum aliquem longum & teretem refert: ita tamen vt fundus figuram rotundæ proximam obtineat, quo capacior sit, & iniurijs minus obnoxius.

*o Vt Soranus
voluit, ex eo
Fallopianus.*

*p Figura ac
magnitudine
pyro maiu-
sculo similis.
Archangelo,
Laurentio, &
Pinæo.*

*q De diff. vte.
2. vbi fundum
ad umbilicû
peringere vo-
luit, quod in
gravidis con-
cedi potest: et-
iam in brutis
aut Vesalius,
arguens Ga-
lennum.*

*r Tres qua-
tuorve digitos
longus, & 10-
quidam latu-
s Plat.*

Magnitudo *q* ipsius in omnibus non æqualis est, sed pro ratione ætatis, corporis, & imprægnationis variat; in virginibus, quia nondum perfecte, & adhuc augetur, paruus est & vesicæ matricibus maiores sunt, contra in perfectis; sic & in ijs, quæ venere non vtuntur, & in vetulis, quia exsiccata, paruus (vt quam minimum cætera comprimat organa) & crassus existit: Latitudine *r* duos digitos parum excedens, & longitudine vix vnquam trium digitorum longitudinem (fundum intelligas) æquat, vix ossis pubis & vesicæ altitudinem superans: in ætate florentibus maior

maior (sed eius quæ nunquam concepit, multo minor est) has enim magnitudinem convenientem ad concipiendum habere oportebat : illis vero tantum otiosis magnitudo superflua erat. Sic quæ vtero gestarunt, maiorem alijs habent, non tamen multo maior, quam manu comprehendi possit : in grauida pro foetus magnitudine in omnes dimensiones augetur. Sic à principio ad pudendum non æqualis est in omnibus terminis, ut plurimum tamen vndecim digitorum spatium est, in ijs quæ venere vtuntur.

Partes habet duplices : simplices & compositas. Simples, ligamenta, de quibus diximus, membranas, venas, arterias & nervos, quæ ipsum vterum constituent. Compositas quatuor, fundum, os vteri, ceruicem seu canalem, & pudendum externum. Membranas ^t duas habet, exteriorē & interiorē, quarum natura, ut multum & distendi & facile contrahi possint : exterior [tab. 26. f. 4. H. H. t. 24. 00. Q. Q.] quæ communis dicitur, & nervosa est, omnium quæ à peritonæo oriuntur crassissima, quare valida & vteri lateribus vtrinque adnata, & duplicata, quem tutelæ causa inuestit & roborat. Interior [tab. 26. fig. 4. E. E. t. 29. f. 1. A. B. C. D.] seu propria, (quæ duplex est) adeo tamen firmissimæ iunctæ, ut vix discerni possint, nisi in exulcerationibus, inter quas, sicuti inter geminas ventriculi tunicas, carnosæ fibræ collocatæ, quam ij, qui vtero vnā tunicam tribuunt, non tunicam, sed vteri substantiam appellant, cum tamen vnā cum exteriorē vteri substantiam constituent, membranosa, u densa, compacta, quo dum foetus augetur, dilatari, vbi exclusus sit, contrahi collabique possit ; at ratione

P 4

inte-

nem facilem in duas, ut reliqua omnes membrana, excepta pia matre diuidi posse asserit. u νευρωδές ποσ φλεβωδές ποσ. diff. vte. 6.

(1. Gal. 14.
vsu part 4.

t De diff. vt.
6. duas dicit,
exteriorē
simplicem :
interiorē sē-
ue propriam
duplicem,
quæ firmissi-
me cohaereat,
ut vix discer-
ni possit. Qua-
re 14. vsu par-
tium 14. vni-
cam dixit.

Vesal. in Ga-
lenum inue-
hens duas di-
cit, vnā à
peritonæo, al-
terā pecu-
liarē & vni-
cam, cū tan-
tum contine-
re debuerit.

Sic Columb.
& Laur. duas
propriās di-
cunt, alterā
propriā, al-
terā à peri-
tonæo. Arch-
angelus duas
dicit proprias,
sic & Pinæus,
qui & omni-

interioris membranæ carnea est, & admodum crassa, quo semen & fœtus calore foueat : & porosa, cum iuxta augmentum fœtus extendi debeat. Quare reliquas ventris tunicas crassitie superat, non tamen vndique eadem crassities, nec etiam ^x semper

^x *Diff. ute. 8.*

eandem crassitiem seruant : prima namque ætate, sicut parua, ita etiam tenues sunt : profluentibus vero iam menstruuis, pro magnitudinis ratione crassitudinem augent : minuitur vero tam ^x magnitudo, quam crassitudo, cum mulier concipiendi tempus excessit, vel menses non amplius fluunt : quorum principium & finis sunt, quando fœmina apta nata est concipere. Sic cum menstruorum purgatio instat, crassa ac tumens apparet, vtpote sanguinis humiditate irrigata. Sic eius quæ iam vterum gefcit, crassior, crassissima eius, quæ sæpissime. At conceptus ^y tempore crassescit, mollior redditur, & vbi concepit, crassior ^z est, & circa tempus partus ^a crassissima, ita vt postremis mensibus duorum pene digitorum crassitudinem, non vno tantum loco, sed vbiq; maxime versus elatiorem fundi ipsius partem, in quam vteri vasa coeunt, & secundinæ cohærent, æquet : cum non solum in amplissimam circumferentiam extendatur, sed etiam semper crassior fiat, & secundum quamcunq; sui partem à primo conceptu ad partû vsq; augetur. Ex copiosiore. n. sanguinis affluxu ob plurimas venas & arterias sparsim per eas diffeminatas, substantia ipsius carnosâ, fungosâ, spongix similis, & fungorû modo in multos cortices diui-

y In principio conceptus crassa : cum prope tempus pariendi accedit, maior quidem, sed tenuis euadit : crassitudo enim in longitudinem extensa absu-

mitur : hac Galenus de diff. ute. 8. Idem 14. vsu part. 14. quæ pleriq; sequuntur. At contrarium s. Etio ostendit, quando ob fœtum retentum vterus disseccatur. Etsane miror Galenum hoc dicere, cum paulo ante scripserit, quibus menstrua purgatio instet, crassam ac tumens appere. Iam vero vbi concepit, copiosus sanguis affluit. z In pregnante tunica tanto maior est, & tenuior, at magis membranæ ac minus carnea, quanto magis vterus in magnitudinem augetur, Vel alius hoc astruit. Hoc n̄ brutis, non vero homine concedimus. a Arantius, Plater. Varolus, Rossetus & Laurentius.

diuidua (vt sanguinis & spirituum copiam pro fœtus nutritione & vita contineat) redditur, cum calore infito adaucto adfluxus necessario fiat, sicque tumefit, & distenditur: & post partum non amplius affluente tanta copia ad pristinum statum redit. Si enim eam carnositatem & mollitiem nunquam acquirat, sterilitas perpetua causatur. Si vero aliquando talis non fiat, sterilitatem ad tempus inducit. Vnde videmus aliquas mulieres, quæ prius conceperant, postmodum annis aliquot steriles esse, & tamen denuo concipere.

Fibræ carnosæ^b inter has feruntur, quæ ipsius parenchyma cōstituunt, quo vteri calor ad conceptionem augeatur, quibus forte musculorum^c instar, vteri motus volūtarius excitatur, ad semen virile ad eius orificium iaculatum in capacitatem^d recipiendū, & ad conceptionem arcte complectendum, at in iis, quæ iam aliquandiu vtero gerunt, in interiori tunica, triplex fibrarum spermaticarū genus, multo manifestius conspicitur: recte quidem interiores, cum semē allicere debeant, quæ pauciores, quia opus ipsorum facile, cum recto membro ocyus eo feratur: obliquæ mediæ plurimæ & validissimæ, quo id quod conceptum, diutissime retineant: transuersæ extimæ, validissimæ quoque, quia tum earum vsus cum fœtus excludi debet.

Venarum & arteriarum inter vteri tunicas excurrentiū duplex genus fertur: duæ enim venæ, totidēq; arteriæ à spermaticis [t. 25. ll. t. 26. f. 1. H. f. 2. ff. fig. 3. bb.] eo feruntur, totidem ab hypogastricis, quæ ab inferioribus [t. 26. f. 2. e. & t. 29. f. 1. PP.] sursum feruntur, quo ab omnibus corporis partibus tam superioribus, quam inferioribus sanguis ad eū accedat: cū non soli vtero, sed etiā fœtibus alimentum deferant, & quo vniuersum mulieris corpus in menstruorū purgationibus

^b Fibrarū genus omne habet, cum semen attrahere, retinere & fœtū expellere debeat, 14. vsu part. 14.

^c An forte & sordes quasdam vteri excludūt, quæ solorū musculorū abdominis compressionē exturbare non poterant? Archæg.

^d Vt ceruus è profundis cuniculis serpentem nariū inspiratu allicit. ^e De vasis vnde de diss. vter. s. & 14. vs. part. 13. f. Diss. ut. s.

¶ Volunt aliqui, has quæ ad latera ossis sacri prodeunt in ceruicē vteri: illas à spermaticis in vterū ipsum, vel fundum propagari, verum iunguntur etiā Fallopio monente.
h Gal. 14. vsq. part. 9.

i Hanc contentionem ab Anatomicis neglectam dicunt Fallop.

exoneretur, sed venæ arteriis maiores sunt, Harum & altera, quæ à spermatica, & à superioribus descendit, per totum corpus eius, maxime per fundum, vt ei alimentum adferatur, diffeminatur: fines tamē vasorū, quæ^h in sinistram partem feruntur, cum finibus eorum, quæ in dextrā eius partem sunt, distributæ, vniuntur, quo Galeno monente, dextra pars exiguā ferrosam humiditatem assumat, sua acrimonia actionē excitet, & voluptatem præbeat, quemadmodum humores serosi, qui sub cute sæpe colliguntur, si incalescant, pruritus excitāt, & suo motu aliquā voluptatem adferūt: per hanc quoq; venam sanguinis menstrui pars potissimum in mulieribus, sed nō grauidis, prorumpit. Altera à cauæ ramo hypogastrico ad latera ossis sacri, circa os pubis, quæ maior est, & per latera ceruicis, seu canalis vsq; ad medium vterum ascendit, vbi cum superioribus coit. Hęc partim per vteri fundum, partim per ipsius ceruicem seu canalem distribuitur. Vasa autem, quæ per fundum ferunt, semper aliquot ramis vniunturⁱ, & quidem vel extra vterum, vel in ipsius substantia. Extra vterum superioris venæ rami cum inferioris surculis ad ceruicem vteri [t. 26. f. 2. e. cum h.] vbi vtrinque multiplicia vasa sunt, eaq; insignia, quasi digitatim disposita, iunguntur, & vnita eius substantiam penetrant, & in cavitatem desinunt: quæ anastomoses in grauidis, & quibus fluunt, aut fluxuri sunt menses, magis conspicuæ sunt: quod si vero non vniantur, tum ab inferiore vena, rami aliquot sursum feruntur, fundo inferendi. Huius hypogastricæ venæ rami vteri substantiam ingressi, cum superioribus à spermatica prodeuntibus ramis coeunt, & oscula interiorem vteri cavitatem subeunt, quæ cotyledones, seu acetabula dicuntur, quibus in conceptione hepar vterinum seu secundæ adhærent, vnde conceptus per umbilicæ

ilicalia, vasa alimentum acquirit, & vtero foetus cō-
ninitur: per hæc copiosior sanguis, quam pro ipsius
nutritione requirebatur, toto illo tempore, quo mu-
lier concipere potest, defertur, quo vbi cōceptio fieri
debet, sanguis præstō sit; tanquam alterum genera-
tionis principium, & quo foetui iam formato alimē-
tum subministratur: quare toto gestationis tempo-
re copiosus, copiosior tamen, quo pluri nutritione
foetus indiget: affluit, eo in lucem edito, ad mammas
pro lactis generatione refluat. At reliquo tempore,
cum copiosior sit, quam vteri nutritio requirat, id-
circo tanquam superuacuum singulis mensibus ¹ ex-
purgatur: siquidem retentus corrumpatur, varia-
que hystericas passiones (quæ tamen magis ex re-
tento semine, quam menstruis causantur) excitat:
cum quo nonnunquā etiam alia excrementa in san-
guine contenta, humorumq; colluies, aliis trium, a-
liis plurium dierum spatio expurgantur ^m: & com-
muniter noua luna iuuenes, vetulas plena luna ex-
purgat: quod idcirco notandum, quo virginibus
menstruis suppressis ad ea prouocanda in fine men-
sis aut principio noui lunij remedia administre-
mus. Altera tandem inferioris venæ ⁿ pars in cer-
uicem seu canalem [*tab. 26. fig. 2. e.*] inferitur, quo
si nimius sanguis, dum mulier grauida est, per va-
sa spermatica deferatur per has venarum anasto-
moses

*mos, ab his per meseraicas in ieiunum intestinum, tylorum & ventriculum fertur: nonnullis per mammas Hippocrate testante: aliis per alium fluere obseruari: sunt etiam (à Castro) referente, visa quibus per minimum digitum, & per annularem singulis mensibus sanguis perfunditur: altera cui per maiorem oculi sinistri angulum fluunt, aliis per sanguinis sputum. m Ex vteri vni non vero cervicis sa-
nis proueniunt, quia mulieribus vteri procidentia laborantibus ex ore fundi vteri sanguinem hunc excerni vidit Vesal. p. 660. per oscula in vteri cervicem desinen-
tia. Plat. per venas in vteri cervicem desinentes, purgantur grauida. Archangel.
Columbus vero probat multas purgari per collum potius, quam vteri corpus, quia
multo plura & maiora vasa, quam in ulla alia vteri parte: probat etiam exemplo
suspensa. Hic Pineus quoq; duo adducit exempla. n Disssect. vter. s.*

k Vide Gal. 6.

loc. affect. s.

l Menfes non

per diapedesin,

seu per resuda-

tionem, vt

voluit Arist.

2. gen. an 4.

sed per anasto-

mos in expur-

gantur, verum

non solum per

uterum expur-

gantur, sed vbi

obstructio est

variorum, etiā

per alias vias,

quibusdam per

nares, aliis per

os, & quidem

vomitum, in

quibus ex ca-

ua in porta ra-

p Galen. 6. loc.
aff. 5. cum pra-
gnantibus ora
venarū in cer-
uicem aperiun-
tur, sanguinem
excernunt. Et
5. aph. 60. ait,
vtero gestan-
tium sanguis,
qui ipsis inter-
dum lunariis
purgationibus
defluit, non ex
vteri venis,
sed cervicis
promanat.

q Ex ignoran-
tia fabrica hy-
menis, quem
neutiquā per-
foratum existi-
marunt, sin-
xerunt in vir-
ginibus ex ve-
nis humilior,
quam hymen
consistentibus
in cervicē vte-
ri deductis, pur-
gari. Vesal.
r De his Gal.
de diff. vt. 4.
f Gal. 14. vsu
part.

moses, non resecato orificio vteri, in cervicem exo-
neretur. Quare per has p gravidæ nonnullæ plethori-
cæ primis mensibus copiosiore sanguine, quam pro
fœtus nutritione opus est, affluente euacuantur, non
vero ex fundo, vt alias menstrua, tam in mulieribus
quam virginibus rectæ expurgari solent, alias san-
guinis copia fœtus suffocaretur, & vteri orificium
cum periculo abortus, resecari necesse esset. Idem d
arteriis, quæ venas comitantur, statuendum, quarum
etiam in nō gravidis vsus, calorem vteri augere, san-
guinem spiritumq; vitalem, qui & facultatem & ca-
lorem vitalem pro eius vita deferre; & motu suo ca-
lorem innatum ventilare, sanguinem agitare, sicq; a
putredine conseruare. An vero mensium tempor-
sanguis vitalis redundans expurgetur, ignorare non
fatemur. Verum à prædictis vasis, & à pudenda, exi-
guæ quoque venæ & arteriæ in pudendum & eius
colliculos feruntur.

Nervi r licet exiles, plures tamen retis modo inter
se impliciti, quo sensum exquisitū conferant, eo mit-
tuntur: ad elatiorem quidem fundi partem, à sext-
paris propaginibus extremis, qui costarum radicibus
exporriguntur, ad cervicem & humiliorem fundi se-
dem à medulla lumborum & ossis sacri (vnde mirus
vteri & cerebri, præsertim parte posteriore consen-
sus) vt molesta sentiendo expultrix exsurgat, in con-
gressu voluptas percipiatur (quare plures f ad cervicē
mittuntur, & ad partes, quæ circa pudenda sunt, cum
sensum exactiorem ob coitum venereum postulent)
motus vteri ad virile semen alliciendum & comple-
ctendū excitetur, cum in vtero fibræ sint, eaq; car-
nosæ, loco minimorum muscutorum. Hactenus de
simplicibus & similaribus vteri partibus, nunc de
dissimilaribus agendum erit.

De vteri partibus dissimilaribus.

CAPVT XXXIIX.

ET si ab vteri fundo vsq; ad a pudenda vnus sit & continuus ductus, cum tamen in eo variæ repantur partes, idcirco diuiditur in partē superiorem & fundum, os vteri, seu orificium interius ceruicis, ceruicem seu canalem, & pudendum externum.

Fundus, qui proprie vterus & matrix, Hippocrati κόλπος, sinus, Galeno c modo κόλπος, modo κύτος, sinus muliebris, modo d κύτος, cauitas & υδμή c fundus dicitur, omnium partium præstantissima est, cum eius gratia cæteræ factæ sint, & in eo x semine concepto fœtus generetur, alatur, viuatur, ugeatur, & conseruetur. Superior [t. 24. l. t. 25. p. t. 6. fig. 1. A. fig. 2. & 3. c. t. 29. fig. 1. fundum grauidæ dissectum xhibet] Est & latior vteri pars, supra os pubis, quo ro fœtus incremento dilatari possit, extrinsecus euus, æqualis, & velut aqueo humore oblitus, & trinquē ad latera superne, velut processum, seu pōius angulum emittit [t. 26. fig. 3. KK. fig. 4. ad A. & B.] uem Herophilus f dimidiati circuli reuolutioni asemilauit; Diocles g vero, & cum eo Galenus h κεράας, πὸ τῷ κέρατος, cornua nuncuparunt, quod vteri superficies ibi paulo sit eminentior, eo modo quo in itulorum capitibus prominentiæ vtrinq; apparent, um cornua nondum eruperunt; in hos semen i muliebre, cum in eos vasa deferentia [t. 26. fig. 1. * fig. 2. gg. f. 3. hh.] diff. vter. 3i

ἀποφύσεις μορφειδείς processus mammillares vocans) egit: quemadmodum & 4. vj. part. 11. κεραίας nominans. Vesalio obusi muliebris vteri anguli, pappilue. g Eudemo, πάλιν οἱ cirri: Praxagora & Philotimo κύτος sinus, dissect. ter. 2. & 8. & 14. eiusd. 11. Hippoc. de super fœt. ἐν τῷ κέρατι ἐτέρῳ ὑπερὸν. A. 3. hystor. 1. extrema plurimum vuluarum, qua κερατῶν cornua vocant, uolui perspectum est. 1 Semen in cornua Galen. 14. vsu partium 11. Vesal. olumbo, in vteri sinum iuxta ceruicem vesica, Herophilo, Archangelo in vumque Laurentio.

a Vesalius in fundum & ceruicem seu cololum, sicut vesicam diuidit, Pinaus, in pudendum, sinu pudoris, collum & corpus vteri.

b De nat. pueri αἱ μήτρας κόλπος ἐχουσα.

c Ut 14. vsu part. 3. si semē ἐν τοῖς κόλποις τῶν ὑπερῶν non repente incidet. Et 15. eiusdem 3.

e Dissect. vt. 1. at cap. 2 superiorem vteri partem esse dicit.


d Tῷ κύτῳ τῶν ὑπερῶν. 14. vsu part. 3. & 4.

f De his Gal. f. 3. hh.] diff. vter. 3i

TABVLA hac XXIIIX. *Mulieris gra-
uidæ effigies exhibetur, ventre decussatim aperto,
ex quo omentum ablatum est, quo ventricu-
lus, intestina, & vterus melius con-
spiciantur.*

LIB. I.

TAB. XXIIIX



k Vulva porci-
na, anfractuosa
sa & sinuosa
est. & 14. vs.
part. 4. sinuum
numerus mā
nulla equalis)
& in sinibus
fœtus gestat:
mulier autem
& cetera ani-
malia, quæ vul-
uam sicut mul-
lier habet, non
in cornubus,
quia minora
sunt, sed in v-
teri cavitare
fœtum habet.
Gal. diff. vt. 3.
vide & 14. vs.
part. 4.
l Gal. de anat.
parua (liber
est spurus) ma-
trix septē ha-
bet cellulas: se-
cuti sunt Theo-
logi, Scholasti-
ci Alb. Magn.

f. Alb.] inserantur, in non grauidis effunditur: ho-
si fundum per medium disseces, intrinsecus vide-
bis ad orificium vteri [tab. 26. fig. 4. G.] vtrinque pa-
uum angulum [tab. 26. fig. 4. ad A. & B.] proferre, qu-
sensum versus [tab. 26. fig. 4. A.B.] fundum sese expar-
dit. Horum vsus^k, vt vterus propter fœtus cominc-
ditatem cappacior reddatur, cum hisce duobus an-
gulis, tanquam duabus basibus, duo fœtus inniti vi-
deantur. Quare cum concipiendi sit instrumentum
cavitatem [tab. 26. fig. 4. A.B.] habet, eamque vnica-
cum nullæ in eo sint^l cellulæ, in sinum tamen dex-
trum^m, in quo mares & sinistrum, in quo fœmellæ
ex Hippocratis & Galeni decreto concipiuntur (c-
hoc monenteⁿ in dextro fœmineus fœtus raro con-
tineatur) beneficio non alicuius septi, sed tantum
lineæ vel futuræ [t. 26. fig. 4. C.D.] leuiter, vt in scro-
to, obscuriore tamen prominente, per ipsius superfi-
ciem mediam, antèrius & posterius secundum lon-
gitudinem perducta, quam *διχοεις*, medianam Ari-
stoteles^o nominauit, diuidi solet, idcirco antiqui
matrices perinde ac si duæ forent, appellarunt & mā-
tris numero correspondere dixerunt, rarissimū enī
est^p muliebrem vterum, vt in brutis bipartiri. Caui-
ta

Michael Scotus, Gentilis, Nicolus, Mandinus & Bonacchiolus, quemlibet sinum
scrobes vocant quemlibet decem rugosos influxus obtinere & septanas scrobes, ru-
gas autem septuaginta enumerant, quare eorundem fœtus concipi posse contendunt.
At Galen. de anat. viuorum, reprehendit eos, qui in muliere quinque vel septem
cellulas statuerunt: exemplo pyri arboris. Recte reprehenduntur, plures enim fœtus
à seminis copia in utero non cellulis, sed propriis in uolacris distinguuntur.

m Vteri omnium bipartiti sunt. Arist. 1. gen. an. 3. verum Galen. vt cū pueri
duo in vno vnum collum desinentes, ita & vbera duæ mulieribus 14. vs. part. 4.

n Hippoc. 5. aphor. 48. fœtuum mares in dextris, fœmina in sinistris sunt potius.
Galen. 14. vsu part. 4. & 7. vt plurimum musculus in dextra, fœmina in sinistra
& 6. loc. affect. s. raro aliter euenire compertum est. Discrimen sexus ostenditur
14. vsu part. 7. partim ex semine, partim ex matre.

o Lib. 3. hist. i. *διχοεις* & *διττοεις* habent omnes sinus geminos, &c.

p Vide exemplum in appendice lib. de partu Casareo.

is hæc [tab. 26. f. 4. A. B.] levis est, admodum angusta, q̄ba vulgaris vix capax, semen vtriusq; recipit, eoq; p̄pletur, cum quævis seminis portio ingressa eam ampleat, quam vndiquaque amplecti debuit, siquidem in quolibet seminis minimo, tota virtus formatrix adsit, ex quo misto & fermentato foetus generatur: sensim quoque sanguine pro eius nutritione & incremento affluente ampliatur, simulque vteri substantia excrescit.

Porositatibus pluribus quoque fundus donatur, cui pori cotyledonum ora existunt, quo sanguis nullo obstante facile è venis vteri in eius cavitatē gestationis tempore pertingat. In non prægnantibus, ut lurimū viscido quodā, & subalbido muco illitus est, colore inter pallidum & rubrum medio. Substantia pudēdis durior & compactior, ceruice vero mollior, & in suis angulis rugosior. At ex humilima fundi regione portio insignis exporrigitur, quasi penis landem [t. 26. f. 1. C. D.] referens, quæ obtuso suo mucrone ceruicis latera nusquam attingit, quæ pollicari utitudine longa, cæteris tenuior & angustior, ut vix cylindrum, aut ad summum paruum calami scriptoriū admittat, sed aspera, ne semē attractum facile effluat, quod in iis mulieribus fit, quæ ob vitiosos humores fabricam hanc partem habent, eiusque nomine sterciles sunt: quam partem, quæ fundi principium & infusius os intercedit, à Galeno Sorano & veteribus, ceruicem nominatam fuisse Fallopius credidit, hæc pars oramine [tab. 26. fig. 1. inter C. & D.] peruia est, quod alteram partem constituit.

Foramen hoc [t. 26. f. 1. inter C. & D.] ingressus est in undum vteri, quare Hippocrates τὸμα τῷ ὕστερον, el τῷ μὴ πέρων, os vteri, Galenus u ceruicis internū

Q

ori-

t Os vteri aut fundi ipsius Vesal. os matricis Columbo. u τὸ ἐντὸς τῷ μίον, τὸ ὕστερον. 14. v. part. 3. de hoc egit de dissect. ut. 7.

Vterus semē
genitale re-
spuit si humi-
dus sit. Arist.
7. histor. 2. ex
Hip. de his qua
vtero non fe-
runt.

Lib. 5. aph. 57.
De his qua
vtero non ge-
runt vocatur
iam τὸμα τῷ
superfœtali mu-
lieres, in quib.
stomachus post
primum conce-
ptum non ita
clauditur.

Lib. de super-
fœt. sapissime
hac voce uti-
tur.

x *Carpus, Columb. Laur.*

y *Lib. 1. de mo b. mulier. & de his, qua in utero.*

z *Hipp. de his qua in utero: aliquando tō sōmō pēuōspē-φειν, & in coxendicem prolabitur, tum digito immisso à coxa auelendū Hipp. 1. mulieb.*

a *Hipp. 5. aph. 51. Qua utero gerunt, iis uterios comprimitur, & Galen. in com. sios vteri claudatur conceptionis indicium.*

b *Gal. 14. vsu part. 3. 15. eius. 7. de diff. ut. 7.*

c *Gal. 6. loc. aff. 6.*

d *Gal. 6. loc. aff. 5.*

e *Cum Gal. 15. 25. part. 7.*

orificium nominauit: per hoc enim fundus rectâ in
cervicem dehiscit: hoc transuersum est, oblongum
forma os catelli x aut tindia piscis (quale est foramen
penis glandi insculptum) referens, ita vt totum orifi-
cium cum rima transuersa, quasi literam Θ referat
paruum & angustissimum, ne vel semen semel con-
ceptum facile effluat, neue quid noxi vteri cavitatē
subeat: recta fundum respicit, quo semen virile rectâ
ad orificium hoc per cervicem ciaculetur, & ab utero
facile attrahatur: si enim vel auersum vel transmuta-
tum sit, multa mala facere Hippocrates docuit y: tum
enim vterus semen non concipit, sed z confestim fo-
ras effluit. Sic & menses nullo modo, vel non nisi vio-
lenter & cum morbo prodeunt. Semper conuiuet, eo
excepto tempore, quo vterus in coitu semen virile in
vteri fundum attrahit, eoq; concepto, ita exquisitē
clauditur, vt vix acum b vel specilli aciem admittat, &
quidem c nouē mensibus adeo exacte clauditur (non
enim cum grauidæ semen effundunt, ex vteri fundo
id defertur, sed ex ceruice, vti dictum fuit cap. 36.) ra-
rum etiam est referari, vt prauī conceptus saluo fœtu
eiiciantur. At in superfoetatione recludi necesse est;
sic quando vterus non concepturus vtriusq; paren-
tis semen iterum eructat: aut cum in pollutione, aut
affrictione in nō grauidis semen excernit, aut quan-
do menses in non grauidis, humoresve vitiosi repur-
gantur, vt in muliebri d pfluuiō, vbi sæpe vniuersum
corpus, vtero nō affecto, expurgatur, vel vitiosi con-
ceptus eiiciuntur: vel deniq; vbi fœtus excluditur: eo
enim perfecto vsq; adeo distēditur, & patet, vt à fun-
do vteri ad pudendū vsque, vna prope æqualis sit ca-
uitas, quo per ipsum fœtus egredi possit, quod mirari
e possumus, intelligere nō possumus: quare sapientiā
& potentiam Conditoris & Protoplastes nostri, vel
hic maxime agnoscere, admirari & deprædicare de-
bemus;

emus: quando ad magnitudinem infantis referari
 ecesse est, quod sensim dilatatur, cū crassiore & den-
 ore [t. 26. fig. 4. ad G.] sit substantia, quæ ante partum
 rassiior redditur, eiq; viscidum quoddā corpus, glu-
 ino fere simile, connascitur, quo in partu commo-
 ius & citra lacerationem vel diuulsionem distendi,
 & naturaliter aperiri possit: hoc coronæ^f modo ro-
 undum fit, & quoties dehiscit, orbiculare redditur.
 Orificium hoc si nimia humiditate, vt fluore vteri,
 vel nimio coitu, vt in meretricibus, nimium laxe-
 tur, vel plus æquo & apertum sit, sterilitatem causat:
 quemadmodum etiam si præpingue & crassum: sic si
 aliosum reddatur, obstruitur: nonnunquam cancri
 & scirrhi incurabiles, maxime menstruis deficienti-
 bus superueniunt.

^f Obstetrices
 Gallæ, coronā
 Germanæ, ro-
 sam vocant.

^g Hippoc. 1. de
 morb. mulieb.
 5. aphor. 46.
 lib. de aere, a-
 quā & locis.

De ceruice vteri & hymene.

CAPVT XXXIX.

TERTIA pars vteri^a ceruix est [t. 26. fig. 2. & 3. d. a Ceruix, Ve-
 fig. 4. KK. s. i. ceruix sursum euerfa BB.] in quam pe-
 nis immittitur, quam Galenus communiter^b αὐχλῶ collum, Co-
 λῆς μήτρας, nonnunquam^c πρᾶχυλον, collum vocat, cui
 & σόμαχος^d dicitur. At Aristoteli^e μήτρα, καυλός, ἢ
 σόμα, τῆς ὑστέρας, matrix, ceruix, & ostium vteri:

Q 2

Lati- At Fallopius

quem Pinæus sequitur) ait in vteri ceruice Anatomicos fere omnes aliquantisper
 ipsos videri, veram ceruicem ignorantes, dum totum meatum, cui penis inditur,
 ceruicem vocant. Verum Galeni loca plura, præsertim duo, quæ subiiciemus, con-
 trarium ostendunt. b Τὸν ὑπεράνω αὐχλῶ εἰς τὸ γυναικείον αἰδοῖον τελευτᾷ. 14.
 v. part. 3. σῶμαχον ὁ καλεῖται αὐχλῶ ὃν εἰς τὸ γυναικείον αἰδοῖον κατὰ τὴν 14.
 v. part. 11. c Ἡ νόμφη σκέπτει τὸ γυναικείον αἰδοῖον σόμα, & τεύχεα 15. v.
 art. 3. αἱ μήτρας δύο εἰς ἓνα περαινέσθαι τεύχεα 14. eiusdem 4. at 6. loc. aff. 5.
 modo τεύχεα 14. modo αὐχλῶ, eodē capite nominat. d ὁ σόμαχος in muliebri puden-
 tum desinit. 14. v. part. 4. Sic & 14. eius. 3. & 13. Sic Hipp. lib. de morb. mulier.
 e Libro 3. histor. 1. ostium autem & ceruix, matrix dicitur: at 1. histor. 14.
 μήτρα ἔξω τῶν ὑστέρας.

f Voluit Ga-

leno & Sorano

κάλπον γυναι

κείον & αιδέον

γυναικείον dici.

At Gal fundi

cavitatē κάλ

πον appellauit,

vt ex 14. vsu

part. 3. & 11.

clare colligi-

tur, sed decipit

forte Fallopiū

locus Galeni,

qui libro de

affect. vter.

7. habetur:

παραινει δ' αὐ-

χλὼ ἕτος, εἰς

τὸν γυναικείον

κάλπον σὺν ὀρ-

τῇ, &c. vbi

loquitur de col

lo, quod in fun-

dum vteri de-

finis, non autē

in pudenda.

g Virile semen

omnium opi-

nione recta in

vteri corpus

inici debet, vt

fiat viriu, que

seminis occur-

sus & cōcepti:

et eum hac an-

gustia docet po-

tius, vi matri-

cis semē attrahi,

quā virga industria iniici

Pinus. h Alij vndecim.

ali j duo decim

digitorū dicunt quod rasculū.

Vesal. longitudo vndecim digitorū.

Columb. 1 Ru-

go, ut & membransus non carni agineus, vt Heraschylus voluit,

Columb. rugosus

vt bonum palatum, Laur. rugosus & asper, Pin. o

k Gal. ix vj part. 3. l Substantia

musculosa carnis vteri carne dura & cartilaginea, constans cuius naturā Hero-

philus gutturis summa parti comparat. Gal. dist. 21. 7. & 14 vj part. 7.

Latinis ceruix seu collum vteri & canalis: meatus est intra peritonæi cavitatem peluim dictam, inter rectum intestinum & vesicam ficos, fundi superfici magis candicans: cavitatem habens profundam & latam (vnde Fallopius f maluit sinum pudoris appellare) os vero multo angustius, qui ab interno sei fundi orificio [t. 24. f. 4. G.] ad os externum seu pu dendum [tab. 26. f. 4. O.] fertur, & cum oblongus sit quo semen viri ad vteri os & perueniat, vaginæ instar virile membrum cui respondet, recipit, quare ampli tudinem conuenientem habet, latitudine vix rectur intestinum excedens, qui in coitu pro ratione peni nunc breuior nunc longior, nunc latio, nunc angu stior fit, & pro mulieris libidine turgidior, angustio fit, & directior redditur, quare ipsius longitudo, noi minus difficulter, quam penis, describi potest, & li cet cum fundo continuetur, diuersam tamen sub stantiam obtinere videtur: membranofus enim i est & neruofus, vt dilatari & cōtrahi possit, in mollitie & duritie mediocriter se habens: substantiæ¹ nonni hil, fungosæ, & spongiformis, instar penis virilis. V enim penem augeri opus fuit, quo canalem hun impleret, ita quoq; conueniebat hunc in coitu ita ar ctari posse, vt pene in strictius comprehēderet, quoc ab arteriolis variis, quæ spiritu canalem replent acci dit, sicq; minor redditur: quare in libidine turgenti bus extuberat, carunculæ prominent (quod in vac cis & canibus ita apparet, vt eorum pudenda magni inflammationibus laborare videantur) cavitatis arcta tur: in Iuueniculis delicatior & mollior est, & indies durior

Pinus. h Alij vndecim. ali j duo decim digitorū dicunt quod rasculū. Vesal. longitudo vndecim digitorū. Columb. 1 Ru go, ut & membransus non carni agineus, vt Heraschylus voluit, Columb. rugosus vt bonum palatum, Laur. rugosus & asper, Pin. o k Gal. ix vj part. 3. l Substantia musculosa carnis vteri carne dura & cartilaginea, constans cuius naturā Hero philus gutturis summa parti comparat. Gal. dist. 21. 7. & 14 vj part. 7.

durior fit: ita ut quæ sæpius cōcepere, vel vetulæ sunt dum callosum, & quasi cartilagineum ob crebrum attritum, & assiduum mensium fluxū, habeant, quare Herophilus asperæ arteriæ assimilarit. Hæc ubi non distenditur, rugosa est: si admodum diducatur, lævis & lubrica, præterquam ea parte, qua in pudendum terminatur, at in canalis ingressu, & parte anteriore rugæ^m sunt complures orbiculares, ad maiorem a-

mantium voluptatem, quæ ex titillatione ab attritu oritur, dum glandis circularis prominentia ad dictas rugas, in mutuo complexo & naturali, non qui pecudum more fit, concubitu affricatur: Hæ rugæ in iuueniculis læuioribus & arctiores, canalisque angustior, ut digitum indicem vix admittat: non enim canalis cervicalisve latera conuiuent, sed cauitas mediocris inest, per quā nō tantum sanguis menstruus in virginibus grandioribus expurgatur, sed humores alij vitiosi in fluore albo, quas etiam in puellulis (ab Aristotele admoniti) quatuor & quinque annorum expurgari vidimus. Harum rugarum attritu & extensione voluit Soranusⁿ in venerem nondum expertis dolorē causari, & cum per eas venæ^o ferantur, iis disruptis sanguinem veluti si mactata esset victima, emanare. Venerum ceruix, quando nec semen intro fertur, nec fœtus excluditur, contorta^p atque obliqua est: Nam laxata in seipsam concidens rugas nonnullas & contorsiones habeat necesse est, quo partes in vtero contentas à refrigeratione tueatur, quare tum angustior & breuior existit, at in coitu ad penis, in partu ad fœtum formam diducitur, at menstruus fluentibus, maxime vero parturientibus, cum ceruix recta fiat atque aperta, & admodum distendatur, mulieres maxime refrigerantur.

In ceruicis huius fine immediate supra collum [tab. 26. fig. 2. m. fig. 3. e. fig. 4. L.] vesicæ in virginibus

Q 3

hymen

m Gal. 14.
v/ part 3.

n Fernel. ex
Auicenn. 21.
tertij, cap. 1.
& Rhasis 1. ad
Alman 6.

o Galen. de
anato. viiior.
in prima de
floratione di-
latatur collum
matricis, &
rumpuntur
quodam vena
subtiles, qua
sunt in dextra
parte ipsius col-
li, & exit san-
guis.

d Galenus diff.
est. vi. 7. 14.
v/ supartium 3.
ex Herophili
sententia.

TABVLÆ huius XXIX. Fig. 1. Uterum
 grauidæ diuisum, quo secunda adherescens con-
 spiciatur exhibet: At fig. 2. secundas ab vtero a-
 uulsas: fig. 3. inuolucrum, quo vrina fœtus con-
 tinetur: fig. 4. Allantoidē & Amnion, tunicas (vt
 volunt) cum apertas cum fœtus naturali situ:
 fig. 5. inuolucra fœtus tria secundum
 Vesaliū proponit.

FIG. I.



¶ *Hymen non esse, sed veras in ceruice, volunt Auicenna Rhafis, Fernel ex venulis fieri āniculum, Auerroes, Fallop. Archangelus aliquando dari, ali quando non statuit Collū. quē Archangelus reprehēdit: at Lauren tius ait, si reperiatur prater naturā institutum esse, quis enim illius foret v. sas.*
 ¶ *Fallop. & Archangelus, tenuem: Vesalius, carneam: Columb. crassam valde.*
 ¶ *Etenim creditam esse membranam transversim sitam, nunc exiremitate inferna sinus pudoris, nunc in medio cavitatis eiusdem sinus: hanc alij cribri modo perforatam esse, & per ea foramina urinam emitti: tanquam per plures tubulos, alij in medio esse vnicum foramen, ad hanc vasa ferri, quæ in primo coitu dirumpantur, unde in omnibus sanguinis fluxum fieri debere contendunt. Alij nullam membranam, sed latera sinus uteri adhaerescere in cuius distentione vasa rumpantur. Arabes quinque veras ad uterū uteri mediū utrinque inferi tradiderūt, quæ dextrarū vniarū oscula cū sinistris iungit. Ex his centonē ipsis appellatū, & sum q. hymē efformari: quas venas ex sanguinis potius profusione in primo cōgressu, quā ex dissectione imaginati sunt.*

hymen ¶ seu eugion dictum collocant [tab. 26. fig. 4. ad n.] quod multi voluerunt membranam esse tenuem, nerueam, non admodum crassam, per transversim sitam, quæ sinum claudat, in medio tamē anuli instar perforatam, ita vt minimi digiti apicem in adultis facile admittat, quo menses effluere possint, venulis conspersam, quæ primo concubitu dirumpatur, vnde & dolor & sanguinis profusio causatur, & tandē veluti in viris dum glandis frenum laceratur, ouanescere: hanc etiā simul pudendi labra colligare, cum huius foraminis amplitudo ante cōgressum inūtilis sit. Sed verā hymenīs historia, quā fuse & diligenter Seuerinus Pinæus regius chirurgus exhibuit, paucis subiiciemus. In medio fossæ, quæ in magna rima est, orificium sinus pudoris virginū semper absconditum manet, q. non in extremitate sinus, sed in extremitate productionis, quæ sinui appensa est, locatur. Hæc productio virginibus propria, longitudinē medijs transversis minimi digiti equat, quam superne circularis quædam cavitās cingit: figuræ est rotundæ, in acumen desinit, & in eius extremo foramen vnum, satis insigne, vt minimi digiti apicem admittat. Substantiæ est partim carnosæ, partim membranosæ, cū ex carunculis & membranis componatur: carunculæ quatuor myrthæ baccas referunt, quæ singulæ in quolibet sinus pudoris angulo, quasi in quatuor angulis sitæ sunt, membranæ carnosæ totidē eas connectentes, quæ nō transversim locatæ, sed omnes

omnes recte ab inferno sine sinus pudoris deorsum tendunt, & singulæ in singularum caruncularum interstitijs locantur, cum quibus æqualiter fere per-tenduntur. Verum hæ & carunculæ & membranæ, in alijs breuiiores vel longiores, crassiores vel tenuio-res, quam in alijs existunt: quemadmodum & orifi-cium in eius extremo in alijs latius, in alijs angustius, & tum maxime parum patet, quando carunculæ & membranæ carnosæ parum à se inuicem dissitæ sunt: vnde maior aut minor in primo concubitu (quam coitionem acerrimam Terentius dixit) difficultas. Hæc autem simul formam calycis parvæ rosæ semi-expan-sæ, cui foliola barbata capulam constituentia sublata sunt, referunt: Vel etiam productio hæc cum pudendis, Betonicæ garyophyllatæ maioris flori expanso assimilari potest. Hanc productionem Galenus^t membranam præputio similem videtur appellasse, cum sit producta, & in extremo perfora-ta, quæ tamen præputio paulo carnosior & mollior est. Vocant hymen, quasi limen, columnam, & clau-strum virginale: florem virgineum: Siquidem in-terger virginitatis notam illæsam solus^u significet. Quando enim penis sinum subierit, tunc membra-næ carneæ inter carunculas positæ, penitus ad sui ra-dicem vsque lacerantur carunculæ, ita atteruntur & diducuntur, vt aliquando coniunctam fuisse neges: vasa insignia aperiuntur; & dum lacerantur, dolor fit, qui in iuueniculis maior est, propter partium sic-citatem, minor tamen sanguinis propter vasorū exi-guitatem profusio: in grandioribus vero, & quibus menses iam fluere cœperunt, minor dolor propter hymenis humiditatem & laxitatem, maior tamen sanguinis, cum ampliora vasa sint, effusio fit. Omnes enim virgines, quamuis ætatem nubilem attigerint, primos congressus habent difficiles, & dolores aliæ

^t De diff. vte.

2. pudenarum

(ait) mulie-

bre extrinse-

cus pelliculæ

quandam in-

natam habet.

virorum præ-

putio corre-

spondentem.

^u Virginita-

tis signum di-

cunt, si filum

ab extremo

naso per me-

diam frontem

ducatur ad

sagittalis fi-

nem: Et hoc

collum eiusdē

puella in se cō-

prehendere

possit. Pinæus.

TABVLA hæc XXX. *secundinas cum va-*
sis vmbilicalibus, in fœtu humano deline-
tas exhibet.




FIG. II .



alijs maiores patiuntur, nisi tunc mēstruis laborant, vel tribus, quatuorue diebus ante fluxerint, tum enim facile & sine molestia penem intromittunt, ob partium humidarum relaxationem & lubricitatē, quāre & nullo fere dolore membranæ dilatantur: quam ob causam nonnulli suarum nuptarum, aliās castissimarum puellarum virginitatem suspectā habuere. Quare vel matres, vel mulieres, quæ honoris & famæ sponſarum curam habent, videant, ut sponſos, de sponſarum purgationibus, si patiantur, præmoneant: patiuntur autem sæpius dum nubūt virgines viro mature, bene habitæ, singulis mēſibus expurgari solitæ, quia tunc plurimum lætantur, corpusque magis saltando mouent, hinc ipsis mēſes accelerantur, diutiusq; fluunt.

Productionis huius membranæ laceræ, in extremo ambitu ferratæ seu dentatæ, aliquando vtrinque in lateribus iuxta rimam, valuarum instar (vnde valuæ Pinæo) ^x propendent, quæ Nymphis, cum quibus ^y figura & vsu conueniunt, multo minores sunt, quæ non deperduntur, sed quamdiu mulier nondum peperit, sursum ad ceruicis colliue orificium multo latius factum, reflexæ, referuantur: in his vero, quæ sæpius, & quidem magnos infantes pepere-re, aut quibus vterus prolabitur, & ceruix inuertitur, cum semper imminuantur, ceruicem versus sursum reductæ contrahuntur, & cum carunculis quibus adhærent, ita perfecte vniuntur, ut omnino deletæ videantur.

Caruncula ^z vero quatuor ^a myrti baccas referentes,

quemadmodum sæpe desunt, ita etiam frequenter virgines sine dolore ac sanguinis profusione, sponſos admittunt. ^a Sub aliis caruncula quatuor valuarum instar, quæ in virginibus apparent, membranulis quibusdam coeuntes anterior vna ad vesicæ orificium, posterior alia & dua laterales, non in transversum, sed in longum sita. Laurentius.

x Et Iouher
to lib. 5. de er-
roribus popul.
cap. 4.

y Ex his ali-
qui & nym-
phas consti-
tuere volunt,
sed ex mäter
intellecto Ga-
leno in intro-
duct.

z Varolus,
Alas vide-
tur appella-
re, quæ infer-
ne membra-
nula, cuius-
dam inter-
uentu simul
iungantur,
ideoq; dolo-
rem & san-
guinis profu-
sionem primo
concubitu fie-
ri, & hoc hy-
men ipsi dicitur:
quæ me-
branoia exili-
tates (addit)

rentes, ad interitum vsq; seruantur, cum in mulieribus etiam senio confectis conspiciantur: quarum vsus, quemadmodum & membranarum, cum sursum reflectuntur, proxime & immediate orificium ceruicis (veluti carnea productio collū vesicæ) ob-
 turare, & ingressum aeris frigidioris, pulueris, aut corpusculi alicuius impedire (quod & Nymphæ & labra pudendi adiuuant) & in congressu, maris pudendū titillare: his enim calefactis & spiritu turgentibus, penis ita constringitur potissimum in iuuen-
 culis, ac si manu vndiq; obductus comprimeretur.

Mox rima altera rugosa occurrit, quæ tanquam in fossa seu pronao magnæ rimæ sedem habet, & tanquam vallis angusta in circulari cavitae aditum ad interiora præbet, & orificium ceruicis constituit, quod Galeno ^b σόμα τραχήλες, & orificium exter-
 num ceruicis seu colli etiam nominant: per quod vi-
 rile membrum recipitur, vt mulieris partes ad se-
 minis effusionem excitet, & suum in id effundat.
 Quod orificium aliquando superuenientibus Rha-
 gadibus, vel magna cicatrice per morbum, angu-
 stius redditur, ita vt maritos amplius admittere non
 possint: nonnunquam etiam ob exulcerationem
 post partum penitus coalescit, quod semel in nobi-
 li matrona obseruauimus, in qua ne vestigium qui-
 dem foraminis vel rimæ apparuit, quæ cum toto an-
 no, ipsa malum celante à menstruis non fuisset pur-
 gata, varijs histericis conuulsivis affectibus confi-
 ctata, tandem interiit.

Ligamentū hic cutaneum in parte postica orificij
 exterioris ipsius ceruicis obseruandum, quod in vir-
 ginibus constrictius est; & ab eadē fossa contegitur:
 in ijs vero, quæ pepererunt, multo laxius existit, ita
 vt hæc ligamenti seu cutis ligamentosa laxitas, cum
 semper foetis, iisq; solis adsit (nisi vterus prolabatur
 in alijs)

^b Nymphæ

τεγν τῶ γυν-
 αικῆς αἰδοῖον
 σπέρμα τῆς
 χήλες. 13. vs.

part. 3.

T A B V L Æ huius X X X I. *fig. 1. fœ-*
tum dierum 14. in quo partes omnes delineatæ sunt, ex-
hibet fig. 2. fœtum abortiuum qui post 25. diem pro-
pter vasorum vmbilicalium ruptionem
sanguine priuatus, reie-
ctus fuit.

LIB. I.

TAB XXXI FIG. I.




FIG. II.



in alijs) foeturae signum vnicum sit: nonnunquam
tamen & rugositas cutis infimi ventris accedit.

*Du pudendo muliebri, nymphis, clitoride,
& labijs.*

CAPVT XL.

a Vide 14. vs.
part. 6. 11. 14.
11. eiusd. 3. ai-
diov. Hipp. de
superfœt. 1. de
morb. mul.
Gal. diff. vte.
2. & 2. At A-
ristot. γυναι-
κός αἰδίου v-
terū nominat.
b Forte à cu-
neo aut im-
pressione, &
fissura, quam
effingere solet,
Pinaus.
c Lib. 14. vs.
part. 16.

VLTIMA vteri pars dissimilari, Galeno^a αἰδίου
γυναικῶν, pudendum muliebri [t. 26. f. 2. l. fig. 1.
circa no.] dicitur: quibusdam Vulua, quasi vallis fe-
valua, cū per rimam amplissimam in duas partes di-
uidatur, quæ vt valvæ, quādo opus est, facile aperian-
tur & claudantur: dicitur & muliebregenitale, os ge-
nitale, os. cervicis vteri & cunnus.^b Est autem par-
ea, in quam ceruix seu canalis desinit, quæ extrinse-
cus anteriori ossiū pubis regioni innititur, & velut
cutacea quædam colli (vt Galenus^c loquitur) epi-
phiiis, siue additio, masculorū præputio respondēs
vbi partes plurimæ ac diuersæ etiam citra dissectio-
nem conspiciuntur. Harum enim alia plane externa
sunt, quæ absq; labiorū diductione se offerunt: alia
interne, quæ non nisi factâ labiorū digitis, in vtrum-
que latus separatione, patent: de his primo.

Est autem fossa ampla, in qua sunt foramen cer-
uicis vesicæ [tab. 26. f. 2. m. f. 3. e. f. 4. L.] cum earū
cula Nymphis & Clitoride: licet enim Hymen, ipsi-
usque membranæ ac carunculæ, cum rima & orifi-
cio cervicis, absq; dissectione etiam cōspici possint
tamen cum non ad pudendum, sed ad cervicem re-
ferenda sint, ea iam explicabimus.

Foramen ad cervicis vteri finem immediate sub
pubis osse, fere supra pudendum, parte anteriore est
quod ex vesicæ vrinariæ colli implantatione prodit
per quod vrina in extremam cervicis vteri partem
vel si mauis, in pudendum effunditur, quemadmo-
dum in masculo per canalem semini dicatum vrin-

quoq;

quoque promanat: in huius ambitu caruncula [t. 26. f. 4. p.] est seu monticulus carnosus, à quo foramen hoc tegitur, ne post redditam urinam aer externus vesicam per ipsius collum breue & latum subeat. quæ caruncula etiam, quæ fossam spectat, claustrum virginalē roborat.

Nymphæ ^d *νύμφαι*, Galeno: ^e aliis *πλεροῦ ὠματὰ καὶ* ^f *πλεπύ, ιε, f* alæ & Latinis, nonnullis carunculæ cuticulares dicuntur: productiones duæ sunt, vtrinque una in principio fere iunctæ, quæ ex limbo ligamentoso cutis in posteriore parte orificiū cervicis incipiunt, & inter vtrumque labrum delitescētes & vbique fere sese tangentes ad ossium pubis commissuræ finem ascendunt, quæ iunctæ eminentiam carneam produciunt, & ipsum Clitoridem instar præputii integentes vniuntur, & ad magnæ rimæ apicem prominente limbo: nea ascendunt, & ab earum medio quandoque productiores per magnam rimam extra labra pudendi aliquantum propendent, & quidem angulo obtusiorē, cum figura sint veluti triangulari: figura & colore cristam galli, quam sub gutture habet, referentes: substantia partim carnosa, partim membranosa molli, fungosa, tunica tenui tectæ: quæ aliquando vno in latere, rarius in vtroque, & rarius in virginibus, quam mulieribus in tantam longitudinem, vel ob humorum affluxum; vel ob attractionem, quæ digitis sit, excrescunt: vt propter impedimentum & dedecus (cum multis nationibus insignis impudiciæ argumento sint) quod adferunt, excisione sit opus (quæ tamen satis cruenta, & cicatricem difficulter suscipit) præsertim apud Ægyptios, quibus, Galeno ^h referent, hic affectus familiaris est; quare virginibus proximæ rupturis, antequam longius propēdeant, amputare solēt. Hæ præter magnam delectationem, quam cœminis in coitu patiunt, etiam vterum ab externis

^d Vesalio laxè implexus, cuticularis casti-
cula, quæ vultu
ph, κύπτεν ἐ-
πιδέειν ὅτι κα-
τέειν Græcis.
^e Lib. 15. of-
par. 3 sic volūt
dictas, quia hæ
prima spōrum
admittant.
^f Sorano, Fal-
lopio.
^g Alij distin-
guunt Nym-
phas & aias.

^h In introduc-
tō Ægyptiorū
lib. 10. cap. 70.
sunt qui non
nymphas, sed
clitoridē, Æ-
gyptios exci-
disse volunt.

tuentur, dum ceruicis orificio inferuunt, quemadmodum præputium peni virorum: nam hæ non solum labiorum istar rimam melius excludunt, sed etiam, ne aer frigidior, aut quid noxii ceruicem vteri aut vesicæ ingrediatur, cum vtrumque orificium immediate muniant, prohibent. Sic & vrinam tanquam inter duos parietes è rimæ fundo acceptam, tanquam è tubulo in oblongum spacium effusam, deducant: vnde late & cum sibilo absque labiorum pudendi irrigatione foras effunditur. Quare nymphæ dicuntur, cum meatui vrinario & orificio ceruicis vteri, è quibus tanquam è fontibus, quibus Nymphæ præfunt aquæ & humores profiliunt, adstent, & quia in ipsis venereorum delitiæ, propterea Poëtæ Nymphas per saltus & nemora Satyros, qui æstuabant quærere re-ferunt.

i Vesalius de Clitoride, nil habet: Fallop. eleganter descripsit, qui anatomicos pe-

nitus neglexisse scribit. Idem habet & Archag. Laurentio metula muliebris & penis fœminæ. k Russo, vide & Pollucem, quæ ῥύμφη & μύρτη appellatur.

l Quod est la-scivus hanc carunculam contrectare.

m Lib. 3. fen. 21. circa finē, Albucasi lib.

2. c. 71. & quos

primus Fallopius sequutus est. n Paruo peni qualem cuniculi habent, responde Plater. o Varolo caruncula veteribus nymp̃ha præterquam foramine, magnitudine virili membro respondet. p Ligamenta dicit Laurentius: ex duplici vel nervo intus spongioso, Archang.

Clitoris i Græcis κλειτορίς k ab obscæno verbo κλειτορίζει; l proprie virga, vel penis muliebris: dicitur Auicennæ m Albathara, id est virga: Albucasi, tingo: processus est paruus, in superiore, anteriore [26. f. 4. m.] & media pubis parte pinguiore, in rimæ maioris apice, vbi nymphæ conueniunt virili membro respondens: differt autem à pene virili longitudine, n canali o communi, & muscutorum vnus paris defectu: situ vero, substantia & compositione cum pene conuenit. Constat enim ex duobus corporibus neruosis (quæ ligamenta p quibusdam) foris quidem rotundis, duris & crassis: intus vero spongiosis, cauernosis, vt spiritu influente extendi, eoque dissipato flaccescere possit; acriore crassioreque spirituoso sanguine, vt in viris, refertis: quorum origo ab vtroque

quæ pubis osse, ad coniunctionem, quæ est cum osse
ischii initio distincto, sed quæ aliquântulum progressa
circa ossum pubis coniunctionem vniuntur, & pe-
nis corpus efficiunt, satis durum & solidum, quod in
extremum glandi simile definit: cui vtrinq; ad prin-
cipium musculus ¶ parvus adiungitur. Caput ipsius
tentigo ¶ proprie dicitur, q̃ tenuissima cute ex nym-
pharum coniunctione veluti præputio tegi videtur;
foramen habet, non tamen peruium: vasa quoq; per
eius dorsum, non secus ac per penem virile feruntur.

Hoc licet plerunq; leuiter tantum sub nymphis lati-
tans, producat, nec nisi firmiter digitis duobus in-
dice & medio appressis percipiatur, nonnunquam ta-
men adeo excrescit, vt extra rimam, penis instar pro-
pendeat, præsertim cum vestibis attritum & confri-
catum turget, & virilis penis modo inflammatur, eo-
que mulieres ad libidinem irritatæ abutuntur, cū ali-
is mulierib. virorum instar, coeuntes (hinc contem-
ptum virorum vocitant) & confricantes ¶ & mutuis
coitibus incubis ac succubis sese polluunt. Huius vsus,
qui & frenuli in pene: cum n. testes plurimum à pene
distent, ex Clitoridis motu & attritu cum ligamentis
inferioribus vteri, quæ exortu suo vasa semen defe-
rentia contingunt, inhæreat & alligetur, imaginandi
facultas ad spermatica vasa, alte admodum latitantia
delata, feminis motû & profusionem in ipsis pro pro-
is susceptione excitat; ad quod magnitudo insignis
non requirebatur: quare licet, per foramen hoc semē
non eiactuletur, per huius tamen frictionē mulieres
itillatæ, ipsarū facultas imaginandi ad seminis pfu-
sionē cōpellitur, eximiū n. pruritū efficit, p̃sertim in
is, q̃ raro venerē exercent, eandēq; expetūt, in quib.
planda etiam huius contrectatione semē effunditur:
hinc cœstrū Veneris, & Col. dulcedo amoris dicit, cum
in hoc delectationis mulierū p̃cipua ¶ sedes dū Vene-

q̃ *Ve penis mu-
sculos habet
& venas, Pla-
exiles muscu-
los quatuor.
Lauren. vnica
penis defectus
à virili differt
Pinnaus.*

¶ *Inuenali sa-
tyr. 6. clausit
adhuc ardens
rigida tentigi-
ne vulua.*

¶ *Leo African.
de africanib. in
Afric. & Mar-
tinis in Triba-
dum historia.
Hoc de duab.
Turcis Thes-
saloniensib. A-
matus refert.
& Roderic. à
castro testatur
se vidisse vti si-
pona ob similo-
scelus aliquos
mul. s. publi-
ce puniri. Tri-
bades dicuntur
à Cælio Aure-
liano, subiga-
trices à Plant.
¶ Hoc vult Co-
lū. negat Fal-
lop. & Plat.
¶ Columb. p̃ci-
pua in iura-*

*ma delectatio-
nis sedem se
inuenisse ait,
quæ sit in binis
l. carne. is, quæ
à laterib. ma-
tricis in hanc
etiam partem
desinant.
v Gale. 14. v. s.
part. 2.*

rem exercent, statuatur. Natura enim, quæ optasset si fieri posset, suum^u opificium (inquit Galenus) immortale, omnibus animalibus & concipiendi instrumenta, & ipsis instrumentis eximiam quandam voluptatis effectricem, tribuit, quo nullum animal genus pereat, sed incolume semper sit & superstes quod sane necessarium videtur, vt homines concitius coitu, alioqui actione turpissima, ad generis cōseruationem oblectentur: quæ voluptas à semini contactu, eiusque calore moderato ac benigno, via nerueas, ac maxime sentientes transeunte, causatur.

Partes denique, quæ extrinsecus conspiciuntur sunt, rima magna, labia & pubes. Quamprimum enim pudendi labra à se inuicem diducuntur, rimæ tres se offerunt: vna maxima, quæ prima est, & exterior: duæ minores & collaterales inter Nymphas quarum vsus, vt partes melius claudantur. At rima quæ *χισμος*, seu fissura maior & oblonga, à labiis constituitur, & ab ossibus pubis deorsum versus posteriora ad natium plicaturam ad anum tendit (cun foramine longior esse debuerit, ne foetus exitum impediat, cum cutis ipsis membranis crassior sit) quæ quo magis retrorsum vergit, tanto magis in latum & profundum augetur, & tanquam in fossam seu vallem cauam, & latam nauiculæ figurâ degenerat, & in limbo orificii ceruicis terminatur, in cuius fossæ medio orificium ceruicis seu canalıs locatum est: hæc rima est, quæ penem admittit, quæ pars visu obscœna censetur, ita vt defunctorum etiam foeminarum cadauera, auctore Plinio, contra quam virorum prona fluitent; seu natura earum pudori parcete: quam vis causa quoque referri possit in mulieris ventrem ampliolem, & quia aqua per pudendum ingrediens ventrem magis implet: & in pondus mamillarum quæ eas pronas reddunt.

Labi

Labia (ἀρρήμνα Hippocrati^x) duo succedunt, quæ x De locis in
rimam orificij externi constituunt: quæ oblonga sunt homine.
& mollia, substantia cutanea, carnosæ, quodammodo
mandulosa, spongiosa, cui duriuscula pinguedo sub-
ternitur, & quasi callosa, cute tenui contexta, quæ in
mulieribus lævigatiora & depressiora existunt. Ho-
tum extuberantiæ, colles seu y monticuli dicuntur, y Ala Vesalii.
& mons Veneris, & in ambitu magnæ rimæ impri- Nota, incolas
nuntur: qui in maturis pilis decorantur: pilorum Pegis puellis
tatem aceruas Pubes & Pecten, *Idem* dicit; Erumpunt infantib. pu-
vero pili ex cute, in mulieribus quidem crispî magis, denda filo cen-
quam in virginibus, & ad labra, quo rima melius la- suere ad usum
teat, pertingunt. Labra vero extiterunt, tum orna natura dun-
menti gratia, tum ne vterus refrigeretur, operimenti taxat relicto
enim instar opponuntur. exiguæ forami-
ne: postmodû
sponsus mem-
brum resecari
suo arbitrio cu-
rat, unguento
seu oleo ad me-
delam vulne-
ri infuso. Lin-
scotus cap. 17.
Idem refert.
Rodericus à
Castro lib. 1. c.
3. adhuc in fœ-
lici Arabia re-
periri, non pro-
cul à regione
preciosi Ioan-
nis iuxta vr-
bē Babel me-
lec, qui filiola-
rum vulvas
consuant.

Quod si vero in demonstratione vteri à partibus
externis ordiri lubeat, beneficio specilli vterini pro-
grediendum erit, & hoc ordine partes veniunt de-
monstrandæ: regio ossis pubis; pili in pube: monticu-
i, quibus pili infixi sunt: labia duo: rima maxima ex-
terior, inter labia os exterius constituens: fossa nau-
iculæ figura: rimæ duæ minores inter nymphas: nym-
phæ duæ: têtigo, quæ Clitoridis est caput, à nymphis
anquam præputio tectum, eiusque foramen, sed non
peruium; Clitoridis duo corpora, duoque muscoli:
foramen cervicis vesicæ, cum monticulo carnosio: li-
gamentum cutaneum: rima rugosa os cervicis con-
stituens; carunculæ quatuor, membranæque quatu-
or in virginibus hymen constituentes: cervix seu ca-
nalis vteri: hæc omnia sine incisione, cætera per inci-
sionem conspici & demonstrari possunt. Hactenus
de vtero.

Qualis vero sit Hermaphrodytorum seu Andra-
gynorum constitutio peculiari tractatu, in quo ipso-
um natura explicabitur, dicturi sumus.

De vtero ouis & canis.

CAPVT XLII.

Consueuimus in defectu cadauerum, Galenū imitati, iuuenes priuatis sectionibus in aliorum animalium dissectionibus exercere; quare singulis annis ouem pregnantem viuam propter motum fœtus, vasaque vmbilicalia, & membranas fœtum inuoluentes dissecare solemus; qualis ergo sit & ouis & canis vterus breuiter perstringemus.

In oue ergo à pudendo ceruix vteri ad sacri ossis summum pertingit, vbi vteri fundus incipit in lumborum regione sese aliquantum expandens: qui corporis oblongi compressi speciem refert: mox in duos processus, sursum spectantes, abit, qui instar cornuum arietis [t.27.f.2.E.] extrorsum curuantur. Fundi superficies externa membranarum modo lubrica & læuis est, quæ non secus ac ceruix ligamentis membranosis à peritonæo pronatis, vicinis partibus connectitur, per quæ etiam vasa ad vterum missa disseminantur. At fundi processus, qua inuicem diuiduntur lateribus internis læues etiam sunt, multisque partibus connascuntur, sed externa latera ipsi fundo membranis continuantur. Fundus duas quoque [t.27.f.2.D.] cavitates obtinet, quæ ad eius orificium [t.27.f.2.C.] quod in eius ceruicem pertinet, coeunt: qui sinu sublaui sunt, plurimisque tuberculis donantur; quæ tubercula in vtero, qui modo concipit, se aperiunt, & sinus efformant. Quod si vnicum fœtum gerant, vntantum vteri cavitates dilatatur: sin vero gemellos, tunc in cavitates qualibet vnus continetur. Duplici donatur membrana, externa [t.27.f.2.F.F.] à peritonæo, qua ligamenta procedunt, & quæ vasa ad vterum deducunt: interiore altera [t.27.f.2.G.] ac propria, quæ
vteri

uterum cingit. Inter quas tunicas magnus venarum & arteriarum occurrit numerus, mirusque implexus, qui multo manifestior, quam in mulieribus, & si tunicae diuellantur, conspicitur, circa quæ corpora rotunda verticillos referentia, quæ Acetabula dicuntur, quæ in mulieribus [t. 26. fig. 4. circa B. & D.] exigua, & vasorum oscula sunt.

Testes ad vteri latera [t. 27. f. 2. A.] sub cornuum apicibus locantur. Vasa vero vterum testesque adeuntia, eadem fere sunt & orta & ducta cum muliebribus, exceptis vasis semen in vteri cavitatem deferentibus, quarum implantatio manifestior est, ita ut specillum facile admittant. Talis est & capræ & vaccæ vterus.

Canum vero vterus [t. 27. f. 1.] ceruicem [t. 27. f. 1. L.] ad sacri ossis principium productam habet: at fundus statim ^a in duas [t. 27. f. 1. F G.] partes diuiditur, quæ ^a Mirabile, sensum in mucronem abeunt, & non in gyrum circumuoluuntur; sed recta producuntur, & cum multi ^{quod Gesnerus & alij scribunt, in Paria prouincia haud procul à Patagonum regione animal reperiri semiuulpam à nostris dicitur, cui natura duos concessit uteros, internum vnum ad generandam pro-} foetus in singulis partibus contineantur distinctim, partes istæ intestinorum modo implicantur & obliquantur. Desinunt autem hæ duæ [t. 27. f. 1. F G.] fundi partes in commune orificium [t. 27. f. 1. K.] quod in superiore ceruicis sedem pertinet. Tunicam duplicem habet, abet ^a peritonæo [t. 27. f. 1. D D.] à qua processus obtinet: alteram interiorem. Testes [t. 27. f. 1. C.] ad apicem duarum fundi partium collocantur. Vasa etiam, quemadmodum in ouino; quæ tamen tuberculis in suis Cavitatibus destituuntur.

R 4

T A-

liquis animalibus: alterum externum subter communem illum, ad fouendos, defendendosque catulos suos, quos inde non nisi lactandi causa promit.

TABVLÆ huius XXVII. Fig. I. Canis vterum exhibet; Fig. II. Vterum vaccæ (cui ovæ similis) propter cornua; Fig. III. Canis secundinam, Et Fig. IV. vaccæ secundinam ostendit.


FIG. I.



FIG. II.



III.



IV.



De Ano seu Podice.

C A P V T XLII.

De hoc 4. vs. part. 19. 5. vs. part. 14. & 15. at cap. 16. comparationem inter vesicæ & ani Sphincterem instituit: & administrandi modum 6. ad. anat. 14. & lib. de dissect. musc. 30. proponit. Aristoteles 2. hist. an. 17. & 4. gen. anim. 4.

a Arist. 3. par.

an. 14. q̄ pars

κνισσώδης ἐστὶ,

ἧς δὲ ἀνίσ-

λος alius pin-

guis, alius sine

pinguedine est

b Arist. 2. hist.

an. 17. Hip. de

carnibus qui

bus δὲ ἐδρεσε-

des ἀβέζουται

sedeo.

c Fallop. qua-

tuor esse dicit

ani musculos,

sphincterem

in duos diui-

dens. Laurent.

numerum non

ponit, & sphin-

cteres nomi-

nat.

d Hippocrati,

ut habet Gal.

de diff. vulu. 1.

& 4. vs. p. 19.

e De diff. musc.

30.

f Ga. 6. ad ar.

14. & dissect.

musc. 30.

PODEX πρῶτος^a καὶ ἀρχὸν^b Aristoteli, recti intestini finis, tribus^c donatur musculis, quorum primus Ani constrictor [t. 15. f. 2. 3. a. & t. 32. f. 1. E.] se Sphincter^d dicitur: qui ab inferioribus vertebris ossis sacri enatus, orbicularis (hinc δακτύλιος, annulus & latus fibris transuersis secundum intestini longitudinem, satis longo spacio eius fini circumfunditur, quod studiose notandum, propter exiectione excrementiarum & fistularum in ano, ita ut licet portio aliqua dissecetur, non tamen ipsius usus ita facit tollitur. Hic elatiore sede crassior quam inferiore, bi cuti ita connexus est, ut ab ipsa separari non possit, ut in palpebris & fronte quoque fit. Quare Galenus^e duos fecit musculos, primum & inferiorem cuti commixtum, cuticulosum musculum, vel carnosa cutim vocans: superiorem vero secundum & transuersum. Connectitur^f posterius ossi coccygis, quod ei subiicitur: anterieus, fibrosis nexibus vesicæ mectui, & peni [t. 15. f. 2. 3. d.] cuius musculis [t. 23. f. 1. H] principium [t. 23. f. 1. & 2. M.] exhibet, & vterique ceruicem ad latera, ligamentis teretibus à sacro osse in coxas^g dicis os productis, & sequentium musculorum^h insertionibus mire commiscetur. Huius munus animum sua innata constrictione ad amussim constringere & inuoluntariam egestionem, ut turpissimum & sur-

d.

diffimum incommodum prohibere (quibus enim ex paralyfi resolutus, aut quoquo modo vitiatuſ fuerit, quemadmodum & veſicæ, iis inuitis fæces exci-
dunt) & neceſſitate vrgente ex ſphinctere à pondere & excrementorum acrimonia laceſſito, accedente voluntaria compreſſione, quæ ratione iubente muſculis abdominis vtrinque vna cum diaphragmate contractis; adiuuantibus thoracem coarctantibus, & ſpiritum continentibus muſculis, ventriſque cauitate vndiquaque anguſtata abſoluitur, ano aperto & extrorſum protruſo, foras propelluntur.

Duo alii^h ani leuatores [t. 15. f. 2. 3. b c. & t. 32. f. 1. BC.] ^h Vef. monet aliquos tres fa-
ſub veſica latitantes non magni, ⁱ ſed membranofi cere: hos Lan.
latique, & tenues, à ligamentiſ pubis, coxendicis & non deſcribit.
oſſis ſacri ab internis partibus exorti, deorſum delati Archang. ani
ad ſedis vtramque partem producti inteſtinum am- leuatores quo
biunt, eiufque tunicæ exteriori, ſphincteriſque [t. 32. que nominat.
f. 1. E.] ſuperiori parti inferuntur, & portione quadam i Gal. 6. ad. a-
[t. 32. f. 1. D.] radici penis & vteri collo (vnde nonnul- nat. 14.
li tres fecere) adnaſcuntur. Hi poſt excretionem po- k Gal. de diſſ.
dicem^k ſurſum retrahunt: & ſi imbecilliores, reſolu- muſc. 30.
tiue fuerint, vel podex humorum pondere grauetur,
inteſtinum digitorum opera in ſuum locum reſtitui-
tur: verum hi muſculi ſimul quoque puden-
di originem trahunt.

T A-

TABVLA XXXII.

*Fig. I. Intestini recti portionem à corpore resectam
exhibet: At Fig. II. Lienis è corpore exem-
pti varias facies ostendit.*


FIG. I.



3.



FIG. II.



4.



FIG. III.



5.



De Liene.

CAPVT XLIII.

De Liene Aristot. 1. hist. an. 18. 2. eiusd. 15. 3. part. an. 7. 4. gen. anim. 4. Galen. vero 4. vs. part. 4. 15. & 16. 6. ad. anat. 10. egit.

a Celso lib. 4.
Plinio, Persio.
b Quod viscus
sit & inus ab
ditum.

c Gal. 6. ad. a-
nat. 10. Aristot.
1. hist. anim. 18
lien à laua a-
quale in omni
bus.

d Nō enim ut
vulgo credi-
tur sano homi-
ni ad abdomi-
nis quasi me-
dium, & an-
teriora promi-
net, nec tactu
admodum de-
prehēdi potest.
Vesal. 626.

e G. 4. vs. par.
16. 6. ad. an. 10

f G. 4. vs. par.
15. Ar. 3. part.

4. Lien hepatis

aduersus in iis, qui exquisitius constant.

g Hip. 6. epid. sec. 2. quib. lien deorsum ver-
git, his pedes & genua calent, narius & aures frigent.

h Liene carens & duplici liene
visum Arist. 4 gen. an. 4. corpus sine hepate & liene visum, cuius historiā vide in-
ter obseruationes, additas lib. de partu Casureo, quē Latinū fecimus: in quo vasa ex
carnosis redditis intestinis prodibant. Laur. meminit caauueris Lutetia dissecti sine
liene, in quo Splenicus ramus in exiguū corpus glādosum desinebat, & vena dua ha-
morrhoidales faculentū sanguinem expurgantes. i Triplici liene reperi, unum in sta-
magnitudinis, alterum dimidio minorē, tertium magnitudine oui columbini unū-
quisque sua vasa habebat Fullop. hoc in canibus non infrequens asserit Vesal. in suo
exam. k Arist. 1. hist. 18. 4. gen. an. 4. l Gal. 4. vs. part. 11.

LIEN, quod σπλὴν, Splen, ^a δὲ τὸ τοῦ σπλάγχχνος, id
est, ^b viscere; vel potius δὲ τὸ εἰς αὐτὸν ὀπισσῶς
τὰ φαυλιδέναι τῶν ὑγρῶν; ab eo, quod in seipsum at-
trahat malignos (vt creditur) humores, Græcis dici-
tur: in inferioris ventris sede [t. 18. 00.] clatissima, ^c
hypochondrio sinistro sub diaphragmate postero-
ra versus (quare in sanis ^d tactu deprehendi non po-
test, sed in iis, quibus præter modum intumuit, vt ad
abdomen medium porrigatur) ipsis vertebris & co-
stis spuriis, quæ ipsi tutelæ sunt, gibba parte innitens,
concauo ipsius ^e in dextram conuerso hepatis, ^f veluti
sinistrum hepar oppositus; inter ventriculum & co-
stas, vbi locus supererat, & in quibusdam altiori & aliis
decliuiori loco situs est. Communiter ^h vnus, rarius
duo vel tres ⁱ sibi inuicem impositi, magnitudine
neutiquam pares, sed tunica & vasis distincti, qui ra-
rissime deest, ^h & raro eius cum hepate situs immuta-
tus, vt illud ^k dextrum hoc sinistrum hypochondri-
um occupet, reperitur.

Connectitur Peritonæo & ^l omento, nonnunquā
exterius diaphragmati (in canibus nunquam) & re-
nis si-

aduersus in iis, qui exquisitius constant. g Hip. 6. epid. sec. 2. quib. lien deorsum ver-
git, his pedes & genua calent, narius & aures frigent. h Liene carens & duplici liene
visum Arist. 4 gen. an. 4. corpus sine hepate & liene visum, cuius historiā vide in-
ter obseruationes, additas lib. de partu Casureo, quē Latinū fecimus: in quo vasa ex
carnosis redditis intestinis prodibant. Laur. meminit caauueris Lutetia dissecti sine
liene, in quo Splenicus ramus in exiguū corpus glādosum desinebat, & vena dua ha-
morrhoidales faculentū sanguinem expurgantes. i Triplici liene reperi, unum in sta-
magnitudinis, alterum dimidio minorē, tertium magnitudine oui columbini unū-
quisque sua vasa habebat Fullop. hoc in canibus non infrequens asserit Vesal. in suo
exam. k Arist. 1. hist. 18. 4. gen. an. 4. l Gal. 4. vs. part. 11.

is sinistri membranæ externæ, gracilibus (nec tam alidis vt hepar, cum tam ponderosum nō sit) membranis à peritonæo, qua diaphragma succingit, tantam vinculis enatis: Interius vero superioris membranæ [t. 32. f. 2. C. C.] omenti, quæ lienis [t. 18. P. t. 32. f. H. H.] linæ adnascitur, & vaforum interuentu antea-
ius ventriculo, ^m quandoque posterius dorso iungitur.

Magnitudine, colore & ^u figura variat: homini enim crassus, magnus; sed hepate longe minor est, ne ventriculi dilatationem impediat; in nonnullis gravior, ^o quoniam facile humorum affluxu ob laxam aritatem augefcit; & in quibus à natura melancholicus succus copiosior, his Lien grandior p̄est. Et licet humor hic, respectu bilis flauæ & feri, paucus sit, tamen q̄ cum longo vitæ tractu allici oportuerit, & propter crassitiem contumax ductuque difficilis, idcirco paulo maior esse debuit. Color non idem, siquidem in fœtu, cum sanguine puro à materno liene repurgato nutriatur, vt hepar rubet: in adultis vero, cum succo crasso alatur, ex atro ^t obscuro nigricat, cum talis sit melancholici humoris naturalis color.

In quibus vero Lien præter naturam habet, talem colorem exhibet, qualem humor sortitus est, lividum, plumbeum, cinereum, porraceum: aliquando tunica instar ^f cartilaginis & colore & crassitie & luritie intectus: in cane vero, splendidius ^t hepate rubet.

Figura

abat: vt liene crescente, corpus reliquum extabescit, ita dtescente fisco. populus de-
superatur. q Gal 5. vs pari. 6. r Subliuidu, Columb. atro & perquam obicuro
lore in homine nigricat. Vesal. subnigricans, Plat. ruber nigrore perfusus, Archan.
Eiusmodi notauit Andernacus, & ego quoq; in nobili Galli cadauere hydropico
me condito in acidulis Griesbachianis anno 1601. obseruau. t Sues vero & boues
lbicantem magis habent. Hominis viscera utiliter aliquando in aqua elixantur,
ut in calidam submerguntur, cum fluxilis sanguis examini obstat. Vesal.

m Ventri lien
annectitur,
qua omentum
obducit Arist.
1. hist. 18.

u Gal. 6. ad. a-
nat. 10.

o Fernel. scri-
bit, lienem vi-
sum mole &

magnitudine
naturalis ecur
superare, quod
exist. matū ie-
cori ad sangui-
nis confectio-

nem opulari.
Vesal. simile
habet in que-
dam, qui iste-
ro nigro mor-
tuis. Ander-

nacus viginti
librarum ob-
seruauit.

p Lienis ma-
gnitudo dete-
rior paruitate
& quibus cor-
pus floret; lien
minuitur: quō-
bus lien auge-

fcit, corpus mi-
nuitur. Vnde
Traianus Im-
perator fiscum
lienem appel-

u Longus Gal.

4. 1. f. 0. art. 16.

Arist. 1. 1. hist. 18

x Derefect ca.

y Si prater na-

turam sit va-

ria est figura,

triangularis,

penitus globo-

sa, variis ex-

tumescentiis

exasperata, a-

cuminata, bi-

partito secta,

aliuq; modis

varia. Cum e-

nim viscus si-

rarum & spō-

giosū, & quā-

uis humidita-

tem facile cō-

bibat, hac, il-

lam partem in

quam impetū

facit auget, sic

que naturālē

eius figuram

facile immu-

rat. Arch.

x Non enim

ut hepatis aut

renum exacte

laevis est, sed ob

scuris tuberib.

quemadmodū

elephanticoꝝ

cutis, varie ex-

tumescere cō-

suevit, etiam eius cutis colorem exprimens, Vesal.

Gal. 4. 1. f. 0. art. 15. 1. as veno-

dicatur. Columb. Galenum reprehendit, quasi veras & arterias non viderit in li-

ne: cui respondet Archangelus p. 136 falsore, rebendi Galenum, cum dixerit G-

lenus ramum ad lienem ferri à Porta: dein 4. 1. f. 0. art. 15. agit de arteriis & ad-

Archangel Columbū & Vesaliū pleraque 1. f. furatos à Galeno, cum non m-

minerint, nisi cum falsum adscribunt: b Gal. 3. 1. f. 0. art. 6 & 7.

Figura eius [t. 32. f. 2.] quamuis pro ratione partum, quibus accumbit, variet, est ^u oblonga, quantum ventriculi sinistra pars detecta requirebat; lata quodammodo & quadrangularis linguæ bubulæ, quæ linguosum fiscus quibusdam, vel vestigio humane vt habet Hippocrates ^x similis: superne paulo latior & in geminum obtusum angulum, inferne in vnum desinente; extrinsecus & latere sinistro aliquantulus gibba, & quæ diaphragma spectat, ita vt aliquomodo figuram globosam ^y imitetur, aliquando à costis [32. fig. 2. LL.] impressiones ^z habet; interius & latere dextro modice concaua, [t. 32. fig. 2. inter HH.] vt ventriculo cedat, vel potius incumbat, eiusque concauationem foueat (in canibus longior, arctior, magis concauus) per cuius cavitatis longitudinem mediā linea alba, [t. 18. P. & t. 32. f. 2. HH.] nonnullis eminentiis prædita, quo venas & arterias [t. 32. f. 2. N.] cum omento [t. 32. f. 2. BB.] admittat, ducitur.

Venæ portæ [t. 13. B.] ramus ^a Splenicus [t. 13. F.] infra hepar locatus, truncus insignis inferiore [t. 32. f. BB.] membrana omenti suffultus, transuersim ad lienem (aliquot prius de se missis ramis in Portæ hifloria explicatis) mittitur, & ad cauum [t. 2. f. 2. HH.] prius diuisus plurimis ramis [t. 32. f. 2. N.] in eius subfinitiam [t. 32. f. 2. I. K. & 13. a a a a. & t. 14. f. 2. ll. m.] absumitur, non quidem, vt in hepate conspicuis, sed ad tenuibus, paucis exceptis, vt fibræ potius quam vasa videantur, quibus crassus sanguis obducitur.

Hic succum crassum & terrestriorem futuri sanguinis partem ad lienem defert, vt ibi conficiatur b

atque

Gal. 4. 1. f. 0. art. 15. 1. as veno-
dicatur. Columb. Galenum reprehendit, quasi veras & arterias non viderit in li-
ne: cui respondet Archangelus p. 136 falsore, rebendi Galenum, cum dixerit G-
lenus ramum ad lienem ferri à Porta: dein 4. 1. f. 0. art. 15. agit de arteriis & ad-
Archangel Columbū & Vesaliū pleraque 1. f. furatos à Galeno, cum non m-
minerint, nisi cum falsum adscribunt: b Gal. 3. 1. f. 0. art. 6 & 7.

utque Spleni alimentum: At cum ab hoc succo^c pars aliqua crassior, quæ à liene attenuari & subigi non potuit, idcirco alendo inutilis, segregari debuerit, vana duplicia, quæ id recipiant, creata sunt. Alia quidem per quæ sursum in sinistram partem^d fundi ventriculi, nonnunquam vero versus ipsius orificium^e sinistrum humorem hunc eructat, qui sua aciditate appetentiam^f post chyli in venas hepatis ingressum excutit; quemadmodum acetaria in cœna proponi cōueniunt, vt nouum appetitum ex prandio quasi excitatum, prouocent: dein quatenus adstringendi facultate particeps est, ventriculum^g corroboret, quod omnis illius actio firmior sit, quod modo tribus, modis pluribus ramis à Splenica prodeuntibus, nonnūquam vno à summo prope lienem ramo, quod vas breue [t. 13. 2. ac t. 14. f. 1. arteria & notatur] seu venosum stomachum Galen.^h vocat, pronato, perficitur: hinc emissiones nigræ aliquando obueniunt: qui postmodum cum alimentis ad intestina defertur & excernitur; Huius rami beneficio quartana laborātes, vocatu ante & post paroxysmum, multum iuuantur; in quibus, quemadmodum omnibus fere melancholicis affectibus, non modo lien, sed etiam os ventriculi perficitur. Aliud vero vas, per quodⁱ deorsum mittitur: aliquando enim ramus deorsum ad extremum recti intestini Hæmorrhoidales [t. 13. g. g. & t. 14. f. 2.

^c Hæc nunc in portam & intestina per eundem ramum Splenicum: nunc in ventriculi fundum, per vas breue aut venosum: nunc in sedem per hæmorrhoides: nunc in renes per arterias emulgentes amandatur.

Laurent.

d Auicenna per venam coronariam ad os ventriculi priusquam lienem ingreditur melancholicum succum ferrugineum didicit. Galen. 3. fac. na. à liene in ommentum, inde ad tenuia intestina, per hac ad pilorum & tandem ventriculi fundum pelli scribit, ac 4. vs. partem per vas breue, à

S

ve-

immo prope lienem ramo, ad ventriculi fundum protenso, lib. de diff. ven. vas breue quibusdam tantum, non in omnibus reperiri affirmat. Laur. hoc canali obstructo recare potest in Splenicum ramum, & ab hoc, nunc in coronarium, nunc in hæmorrhoidalem, nunc in mesentericas venas. e Gal. 6. ad. an. 10. f. Alij utile dicunt, & amicū ventriculi functionibus, sicut bilis flaua ventriculo hostis sit: Alij hanc bilem, qua acere & acida sit, omnes ventriculi functiones adstringendo & colligando, corroborare. Alij vim ventriculi appetitricæ isto excremento incitari statuerunt. g G. s. vs. par. h Lib. 4. vs. par. 15. Vesal. vult à ramis lienem aduenientibus, tres non plures ramos enasci, in sinistrum ventriculi latum excurrant, non usque ad superius orificium. i Tertia venæ splenicæ ad pedicem abeunt, & quicquid est sanguinis alimenti lienis superflui, de-

deferunt pro in-
feriorum par-
tium alimēto,
ne disperda-
tur: dein si qd
superioris ex-
crementi pp
gravitate de-
orsum feratur
per has venas
in cōpressionib.
alibi, per caca-
illarum spira-
cula una cum
cibi rel- qis ex-
pellitur. Arch.
k G. 4. v. p. 15.
In lienis poti-
us tunica, quā
ipsius substan-
tia. Vesal. non
solū per tunicā
effunduntur:
sed et intra e-
ius substantiam
subeunt, quo sen-
tiens molesta,
vi expultrice
excitata, a se
appellat Arch.
in Gale. 4. v. f.
part. 15.
n Substantiam
exemplis ex-
plicat Vesal.
o G 4. v. f. par.
15 rara, laxa
admodū. s. v. f.
par. 7. lienē cō-
pactum magis
quā iecur vi-
scum, Plater.
p Instar solidio-
ris spōgia, aut

vena & arteria * notatur] internas (cum externā à Ca-
ua sint) constituens mittitur: quamvis hic humor sæ-
pe expurgetur per arterias, non solum in intestina,
sed ad emulgentes demandatus ad renes, ita vt recte
in affectibus melancholicis naturam imitantes, diu-
reticis utamur.

Arterias numerosas (plures quam hepatis) & ma-
gnas [t. 14. f. 1. u.] recipit à Coeliaca [t. 14. f. 1. m.] quæ ab
Aorta sub diaphragmate prodit, eadem fere ratione,
eodemque numero, quo venas, non solum, vt ei fa-
cultatem vitalem largiantur, sed etiam, vt perpetuo
k suo motu, calorem innatum succo sæculento pene-
obrutum, ventilando & fouendo corpus lienis tue-
antur, crassusque sanguis mutari & confici possit, sic-
que Lien expurgetur; Verum etiam humores fero-
fos, vna cū sanguine tenui & frigido, qui per Anasto-
moses vasorum assumpti sunt, ad Aortam deferunt,
qui ab emulgentibus arteriis in renes deducuntur;
hinc enim feri copia, quæ in Aorta est.

Nervos [t. 9. f. 1. lib. 2. κ.] exiles, à sexti paris ramo si-
nistri lateris costarum radicibus exporrecto, ipsius
tunicę insertos habet: an vero eius¹ substantiam sub-
cant, dubitamus.

Tunicam habet tenuem & simplicem ab omenti
membrana, quæ lienis rectæ lineæ innascitur, & à pe-
ritonæo fuit producta, enatam, quæ omni ex parte m
carnem eius, cum mollis sit & laxa, munit & cin-
git.

Substantiaⁿ ipsius [t. 32. f. 2. IK.] nihil aliud vide-
tur esse, quam crassus, niger admodum & concretus
sanguis, fibris frequentibus implicitus, cum sit ca-
ro (quam παρέγχυμα Erasistratus vocauit, quod ipsi-
us tenuissimis vasis fibras æmulantibus circumfun-
datur) mollis, rara, ° laxa admodum & spongiosa, p
quo facilius crassos succos à longinquo attrahat, (ta-
lis

lis enim q̄ substantia aptior est, quam si densa foret) attractos excipiat; quare & venæ per eam disseminate, molliores sunt & laxiores, vt facile humor excidat.

Vsum lienis nullum esse Erasistratus^r existimauit, & frustra à natura creatum, male pronunciauit. Plerique ipsius vsum statuunt, vt sit crassioris & fæculenti in hepate^r confecti sanguinis & in eo segregati, receptaculum; quemadmodum vesica biliaria flauæ bilis; quò sanguis purus & defæcatus ad omnes partes corporis, præsertim principes alendas, deferatur; quem tanquam sibi familiarem, & multo succo benigno perfusum, per portæ ramum Splenicum ingenita facultate alliciat, & quem hepar immutare non potuit, Lien perpetuo arteriarum motu, pro sui nutritione conficiat: quod vero alendo inutile sit, in ventriculum per vas breue eructare, quò sua aciditate appetentiam excitet, suaque adstrictione ventriculi actiones roboret. Verum si excremento solum recipiendo creatus foret, non in superiore, sed inferiore loco positus esset, vt vesica biliaria, quo commodius pôderolum illud excrementum susciperet. Dein cum paucissim⁹ sit humor hic, natura lienem maiorem non fecisset, quam vesiculam. Tum, amplam fecisset cavitatem crasso excremento suscipiendo accommodatam, quẽadmodum biliOSO humori tenui. Quarto, nulla pars, quẽ excrementis secernendis ordinata fuit, per eosdem meatus excrementa & suscipit, & per eosdem naturaliter ex-

lanioris pumtis. Laurent. q̄ Galen. 5. v. part. 7.

r Testatur Galenus 4. v. part. 15. haud

dubie per suus vulgi opinionem, lienem

cursoribus penderis & purgentis doloris

vitandigratia eximistulte credidit. Aristotel. 3. par.

non nisi ex euentu necessarium scribit,

hic quoque eicommunem vsum, quem

omnibus viscribus tribuit, quo ve-

na stabiliri possint. Dein ad concoctionem auxilia-

ri: vapores vagantes ex ventriculo at-

trahere & concoquere posse,

S 2

pur-

ut qui sanguineus sit. Rondeletius negauit lienem esse humoris melancholici receptaculum, quia humor is dum naturalis est, totus in ossibus alia que duras, & crassæque corporis partes, impendatur. Et cum eius in nobis portio minima sit, exercitendo nullam partem discatam esse: vti neque sanguineis recrementis, quæ sudoribus & insensibili transpiratione abeunt. Laurent. s̄ In hepate geniti 4. v. part. 15. Sic Gal. 1. san. tuen. de form. fact. 6. loc. aff. lib. de atra bile, lienem ad faculentis sanguinis expurgationem constructum, ideo ex aduerso hepatis locatum, voluit. Sic 3. fac. nat. 13 lien quod secinori crassius attrahit, præterea conficit, ac ad utilem mutat.

t *Columb. ait.*
nullam partē
excrementis nu-
triri, liene ex-
cepto, qui atra
biliario humo-
re nutriatur:
cum is sangui-
nē melanchol-
licū ab hepate
deferat.

u *Auerrhoes*
contrariū sen-
tit in para-
phrasi de ani-
mal. Lien, ait;
ex se sanguinē
non gignit: si-
gnum est, quod
una vena à
stomacho ad
lienem protē-
ditur, qua lien
à melancholia
expurgatur,
non autē chy-
lus attrahitur
Vlmi opinio in
liene præpara-

purgat, quod exemplo & renum & vesicæ biliaræ c-
doceri potest. Quinto, nulla pars excremento, quod
ad se trahit, alitur, sed sanguine laudabili. Sexto, quē-
admodum meatus biliarii per hepatis substantiam in-
ter cauæ & portæ radices dispersi sunt, quo bilem ex-
crementitiam hauriant: sic quoq; ex Splenico ramo
propagines per hepar spargi deberent, quod tamen
non fit. Et tandem si ex hepate fœculentus sanguis
expurgatus ad lienem feratur, tum necessum erit, ex-
crementitium huncce humorem regurgitare in ve-
næ portæ truncum, cum ex hoc, multum infra hepar
& supra Mesaraicarum venarum truncum, ramus
Splenicus ortum ducat.

Quare censemus, Lienem datum esse ad sanguinis
confectionem, quem vsum Aristoteles primus in-
uexisse videtur; & Galenus libello de respirationis
vfu, quemadmodum & Aphrodisæus y & Aretæus z
confirmarunt; Vesalius a vero & Fernelius suspicati
sunt: & Archangelus b alterum ipsius vsum fecit.

Lien ergo partem crassiorem & terrestriorem chy-
li in venis mesaraicis iam alterati, & sanguinis aliquā
dispositionem adepti, ex venarum mesaraicarū trun-
co, antequam chylus ad hepar feratur, ingenita fa-
cultate per portæ ramum Splenicum ad se allicit, que
post.

ri vitalem spiritum (id est tenuissimum sanguinem vitalis spiritus materiam) ind-
per lienis arterias in sinistrum cordis sin: mferri, & ibi cum aere misceri & perfici
perfectum in arterias omnes tanquam tubulos effundi. Laurentius negat lienem si-
gnificare: quomodo, ait, potuisset natura duo ista vasta & toti corpori famulanti
viscera in medio subtus cor disponere? Quomodo non superuacanea fuisset, si plur.
sanguinis conficiendi instrumenta condidisset, cui unū sufficere poterat & debebat
x. Idcirco 3. par. 7. Lien quasi adulteratū iecur videri scribit. .y. 2. Probl. 2. 1. de caus
& sign. chronic. a In exam. p. 124. nisi is etiam sanguinis conficiendo sit accommo-
dus. Platerus p. 155. Lien in sanguinis elaboratione potius, quam melancholici succi
attractione aliquid prestare, magna ipsius cum iecore in constructione affinitas, &
quod morbi ipsius aque atque hepatis sanguificationem ladant, satis declarant.
b Duplex usus, i. Vt repurget sanguinem à lutulento succo. 2. Vt hepatis opistulatu
cum minor est ad copiosorem sanguinem conficiendum.

postmodum hepar rectius chyli partes laudabiliores attrahat: alias ipsius vasis, à crasso illo crudoque sanguine obstructis, non modo laudabilis sanguificatio fuisset impedita, sed etiam icteri, hydropes, febres, scirrhi, aliaque mala causata, vt fieri consuevit, quando lien suo officio non probe defungitur, & vel ob imbecillitatem, vel meatuū obstructionem crassam & terrenam illam chyli partem non attrahit: quod etiā rami Splenici situs, qui infra hepar est, & nequaquam ab hepate prodit, comprobatur: Nec verisimile, succum crassissimum in hepate iam confectum, per angustissimas hepatis venulas regredi: non tamē negamus, in hepate sanguinem melancholicum gigni, sed eum, qui pars sit massæ sanguineæ.

Verum & chyli portio, per venas à ramo Splenico ad sinistram fundi ventriculi partem missas, exsugitur. Hunc exceptum, quo rectius confici possit, per longos circuitus deferri voluit, quem in innumeris vasis tenuissimis, fibrarumue implexibus per ipsius substantiam disseminatis (quemadmodum & altera chyli iam alterati pars, in plexibus vasorum per hepar disperforum, in sanguinē coquitur) multo otio, multaque præparatione conficit & elaborat, & in tenuiorem succum, beneficio caloris innati, adiuuante arteriarum plurimarum (cum succus sit crassior, *c Galen. 4. v. f. part. 15.* quam is qui ad hepar fertur) perpetuo ac valido motu concoquit; quo partim eius portio aliqua, Lienis fiat alimentum: partim vero, ad ventriculum, intestina, omentum & mesenterium per venas à Splenica prodeuntes, pro nutritione deferatur; quemadmodum Galenus concedit, venas mesaraicas ex ventriculo & intestinis chylum hepati offerre, & per easdē rursus sanguinem illis ipsis & omento adducere; cum enim eadem sit venarum à vena portæ propagatarū principium & substantia, eadem quoque erit earundem

*d Vesal. sic ha-
bat, auctor lib.
de respir. usu
Galeno falso
attribut. liene
ex ventriculo
& intestinis
cofectum cre-
morem, per ve-
nas ventriculi
& intestinorū
assumere, ac
sanguificatio-
nis organū esse
contendit. Et
nonnulli Medi-
ci, quemadmo-
dum in 4. de
mort. Hip. lie-
nē iecore ma-
le affecto, no-
mine iecoris
sanguinem e-
laborare affir-
mant.
c Si liē sangui-
nem nō depu-
ret, spiritibus
tenebra offun-
duntur: ad cor
cerebrūq; esse
runtur, & pal-
let liueq; uni-
uersū corpus:
vnde Strato-
nicus Cytha-
iædus, in Ca-
ria dicebat,*

dem actio. Huius forte pars aliqua in proximas arte-
rias rapitur, in aortam mittitur, ad calidissimum san-
guinem è sinistro cordis ventriculo hauustum contē-
perandum, & spiritus in eo mobiles remorandos, q̃
ad ingeniorum constantiam plurimum facit. Quan-
do vero hepate calloso, vel exeso, eoque non sangui-
ficāte, ^d Lien eius vices obit, portio elaborati sangui-
nis per ramum Splenicum in hepatis venas transmit-
titur, & per cauæ radices & ramos in partes alendas,
non secus quam sanguis is, qui in hepatis venis fuit
elaboratus, distribuitur. At quod in sanguinis vtilis
speciem ob nimiam alimenti crassitiem à liene tranf-
mutari non potuit, & ad nutriendum inutile est, par-
tim in ventriculum, partim in venas Hæmorrhoida-
les effunditur; interdum in portæ truncum, aut per
arterias splenicās ad renes defertur: vnde in Lienis
affectibus yrinx sæpe nigræ conspiciuntur. Quare
Lien hepati ad sanguinis confectionem opitulatur,
partim, quatenus sanguinem sui generis conficit,
partim quatenus crassiorem succum ad generatio-
nem purioris sanguinis parum idoneum auertit, vt
melior in hepate fiat sanguificatio; hacque ratione
sanguinē^e repurgare recte dicitur, & quasi illustrio-
rem reddere: hinc risus scdes ^f Lien antiquis diceba-
tur, & vulgatum illud, Splen ridere facit, cogit amare
iecur. Et Plato voluit, Lienem hepar speculi modo
nitens, atque perpolitum ad imagines exprimendas
reddere.

Merito ergo Aristoteli ^g hepar sinistrum dicitur,
qui in iis animalibus, quæ liene ^h carent, hepar tri-
patti-

mortuos ambulare, q̃ omnes Caurici populi Caria prope Rhodum propter lienis vir-
tutem, minus modis pallerent. ^f Hinc Persius Sat. 1. Sed tum petulanti splene cachinno:
hinc Viatico, risus organum. Sed lienem impedimento esse cursui creditum est, et
Plautus in Mercatore fidem facit: Genua hunc cursorem deferunt, perij, seditionem
facit lien, occupat præcordia. ^g Lib. 3. part. 7. ^h Pecori in Creta vix apparere scribit

partitum obseruauit: & Platoⁱ lienem expressum hepatis simulachrum, pronunciauit. Non ergo mirum, si lienis morbi æque ac hepatis, imo forte magis sanguificationem ledant: cum quanto magis lien suo defungitur officio, tanto purior in hepate sanguis conficitur. Ex dissectionibus idem probari potest, vbi sepe hepar magnitudine à lienē superatur, vel eidem correspondet, colore tamen & consistentia sanum. Verum, licet in vtroque viscere hominis sani sanguis generetur (vnde Aristoteles hepar & lienem cibi concoctionem iuuare scripserit, non solum vt Albertus voluit, quatenus ventriculum ei adhærendo calefacit,^k sed etiam quatenus, tum ex trunco mesaraicarum, tum ex ventriculo attrahit:) attamen in hepate copiosior, calidior & ad nutriendas partes carnosas accommodatior, in splene paucior, frigidior. nec ita probus gigni videtur; quod minuere voluit Hippocrates, dum ex iisdem & splen florescere, & corpus contabescere dixit. Tandem & calore innato, ac frequentibus, quæ illius carnem intertexunt, arteriis, ventriculi concoctionem adiuvat.

De Hepate.

CAPVT XLIV.

De hoc Aristoteles 1. hist. anim. 18. 2. eiusd. 17. 3. par. anim.

7. & 9. 4. de gen. anim. 4. Gal. 4. vs. part. 12. 13. & 14.

6. admin. anat. 8. & 11. egit,

HEPAR ἡπαρ^a Græcis, δὲ τῆς ἡπαιτίας, inopia, quod omnium partium inopiæ succurrat; siue τὸ ἥσσω τὸ εὐφραίνομαι; à lætando, cum in hac parte concupiscentiæ sedes sit. Latinis iecur, quod iuxta cordis vires suam potestatem exerceat. Inter

Landus, è q
in illis locis cre
scat Asplenū
herba, qua pe
coribus ea ve
scentibus lie
nem minuat.

Insectis quoq;
extra omnium
cōtrouersiam
non est lien,
quamuis illud
tritum pas
sim vsurpetur
ἐκεῖ καὶ μὴ αὖ
αὐτὸ ἔχει habet
& musca sple
nem.

i Tὸ ἡπαρ
ἐκ μὲν κίον ἐ
στίν, vt Gal ha
bet 4. vs. part.
7.

k Lienis bene
ficio cor refri
gerari, Ara
bes voluere: nō
autumno, cū
cor non con
tingat Vesat.

a Παρὰ τὸ ἐπὶ ἡ
ται, καὶ κυρ
τῶδες αὖ, vt A
pollonii inter
pres notat.

b Sic visum
fuit Oro Mile
sio, ex Camer
tin lexico.

e Iecur prius generari volu-
it Galen. cōtra partes principes merito recensetur, cum facultatis
vero Arist. cor naturalis, animæque altricis sedes sit & domicilium;
primo genera- quo omnia sanguinea donantur, & inter viscera *c* o-
ri statuit, qua mnia primo perficitur. Venarum *d* principium est,
tionem hanc non ratione originis, cum venarum principium se-
tractat Piccol men sit, & vasa ante viscera sint genita, sed distribu-
hominaus lec. tionis & *e* radicationis: ex eo enim duarum *f* validio-
29. lib. 2. Verū rum venarum exortus est: inferne ex caua, Portæ ve-
diximus oēs na; superne vero ex gibbā, caua vena prodire dicitur;
partes simul cum tamen caua ipsius posteriori sedi [*t. 33. f. 2. F. G. f.*
generari quo- 3. *M. N.*] duobus insignibus ramis per ipsius substan-
ad substantiam tiam dispersis, innascatur: quæ duo vasa, tanquam *e*
spermatricam, terra arborum radices enascuntur (quemadmodum
sed non omnes enim radicibus terra, sic venis hepatis caro circum-
simul efforma- funditur) per quas toti corpori alimentum submini-
ri & absolui, stratur: quare & *g* sanguificationis officina dicitur.
sed prout sin-
gula & ignem
& alimētum Situm est [*t. 9. F. F. t. 12. C. C.*] in infimi *h* ventris ela-
nata fuerint, tiore parte, quo velut in medio corporis locatū, san-
ut sup. ex Hip. guinem æqualiter sursum & deorsum distribuat; sub
docuimus.
d Venarū fons *i* diaphragmate digiti circiter transuersi distantia, ne
hepar, & non ipsius *k* motum impediat; licet aliquando in mortuis
alia nobilis ei contiguum sit, totumque sub costis demersum. At
corporis pars, maiori parte dextrum *l* hypochondrium occupat;
Fallop. At Ve- partim vt ventriculo [*t. 9. E. E. t. 12. F. F.*] & lienī [*t. 12. G.*]
sal. p. 458. ie- in sinistris locum relinquat (cum hæc tria totum spa-
cur mihi poti- tium occupent, vnde his tumentibus, ob loci angu-
us ex venis, q̄ stiam, respirandi magna difficultas oboritur) partim
ipsi intextur, propter dextrum cordis ventriculū, vt ad eum san-
quā vena ab guis euehatur. Verum & superiori, anteriori & dex-
ipso, vel etiam træ ventriculi [*vide t. 9. & 12.*] parti leuiter insidet, ne
in prima fœ-
tus confirma-
tionem originem

hunc

ducere videtur. e Τὸν φλεβῶν ῥίζωμ. Hippocr. de alimento. *f* Galen. 5. vs part. 2.
g Hipp. de morbis, ἐκ μυχλίου dicitur, fons & origo gratiose humoris: vateres τὴν ἐν-
-καρπον γῆν, id est, terram frugiferam vocarunt. h Hippocrat. de arte, in thorace
collocauit: per thoracem intelligens totam capacitatem, quæ est inter clauos & ossa
pubis. Sicut interpretatus est Aristot. 4. de partib. i Aristot. 1. hist. 18. *k* Gal. 4.
vs. part. 14. l Arist. 2. hist. 17. 3. part. 9.

hunc sua mole premendo, materias in eo receptas protrudat; & portione aliqua in sinistrum latus per-tingit, quo corpus in ^m æquilibrio sit (in canib. propemodum vtrunque latus, cum lienem gracilem & longum habeant, occupat) maxima tamen parte costis nothis subcingitur, iisque ab iniuriis muni-
tur.

Figura ⁿ propter [t.33.fig.1.&2.] partes adiacentes varia est, cum ipsius munus nullam propriam figurā expetat, sed magnitudinem & crassitiem sufficien-tem: est tamen facies alia exterior, quæ superior & po-sterior, lævis, æqualis, conuexa [t.17.B.G.tab.20.b b.tab.33.f.1.A.A.fig.2.C.C.] & rotunda (quæ ^o gibba & caput dicitur) quo diaphragmati cedat, eiusq; cavitati con-gruat; posterius vero sinus [t.33.f.2.ad F.G.] est ob-longus, quantus amplectendo Cauæ p caudici [t.33.f.2.F.G.] sufficebat, ne huius grauitate, vel diaphrag-matis motu comprimatur. Alia interior ^q seu inferi-or, inæqualis, & [t.17.C.C.t.18.B.B.&tab.35.f.1.B.B.C.] caua (quæ sima dicitur) vt ventriculo assumptorum copia [t.12.F.F.t.18.E.t.20.C.C.] turgenti cedat, & cum eū immediate complectatur, ^r tegat, suoque calore pri-mam chyli concoctionem foueat; In hac parte sinus duo sunt, alter à dextris insculptus, vt vesiculæ bila-riæ [t.35.f.1.P.] medium corpus excipiat; alter à sini-stris [t.33.f.2.L.t.35.f.1.H.] vbi stomacho transeunti ce-dit; in canibus priuato sinu renis dextri partem ad-mittit. Vbi vero vena portæ exit, propter eminenti-am aspera [t.35.f.1.F.F.] est, ne vena à vertebrarum cor-poribus comprimatur. A dextris ^f rotundum [t.12.C.C.t.33.f.1.A.A.] & crassissimum, à sinistris sensim atte-nuatur, & quasi in acutum angulum [t.33.f.2.ab L.ad I.] fertur, & parte anteriore in ambitu tenue est.

Vnicum est, cum magnitudo numerum compen-set, & in homine ^t maximum, & inter eos, qui corpo-

^m Attestatur
aues, quib. ie-
cur aqualiter
in vtroq; late-
re positum est.

ⁿ Figura glo-
bosam imita-
tur Piccolho.
tantū nō exa-
cte sphaerica
est. Columb.

^o Kup & & o-
ma gibba &
sima.

^p Arist. 1. hist.
18. iecur vena
maiori adne-
xū est, vena n.
qua à maiore
pificitur, ie-
cur transfigit.





^q Exterior ro-
tūda, interior
gibba & ina-
qualis Fallop.
altera gibba
seu cōnexa, al-
tera reducta
seu concava.

^r Piccolhom.
Hepar qbus-
dam lobis tā-
quam digitis
ventriculum
cōplectitur, &
vtriculū cir-
cumambit, vt
ab eo calefiat,
4. vs. part. 8.

^f Ar. 1. hist. 18.
t iuxta ppor-
tionē hominū.
vt & cerebrū
inter reliqua

TABVLA XXXIII.

*Hepar cum suis venis exhibet. Fig. I. eius anterior-
 rem. Fig. II. posteriorem sedem cum caua & por-
 ta trunco: Fig. III. caua venae portionem diuisam:
 Fig. IV. radices caua & portae per hepar spar-
 sas earumque anastomoses pro-
 ponit.*



animantia
grandius.

u An belluo-
nes idcirco ga
grādus hepar:
an contra, ut
trung, esse po-
test. Et si aliq
velint crapu-
la adeo abusu-
mi, ut ad nu-
cis duntaxat
molem rede-
at. Vesal.

x G 4. v. spar-
8. ait hepar q-
busdā fibris tā-
quā digitis vē-
triculū ad un-
guē complecti:
nec unū ipso-
rum numerū esse in
singulis ani-
malib. q. nec
figura, nec ma-
gnitudo ven-
triculi omnib.
exacte sit ea-
dem. Hipp. de
off. nat. & 6.
Epid. in lobos
quinq. secat,
quib. singulis
ppria nomina
Theophil. in-
didit. 1. focus.
2. mēsa. 3. cul-

re sunt maiore, maius habent, cum sanguinis copiam
pro toto corpore continuo conficere debuerit, nor-
solum pro eius nutritione, sed quæ etiam spirituum
procreationi & dissipationi sufficeret, cū plures sin-
in homine, quam brutis animæ functiones, quæ plu-
spiritus animalis dissipant, qui ex spiritu vitali, & hi-
ex sanguine gignitur; idcirco sanguine copiosiore in
homine opus fuit: in timidis u ac gulosis quoque ma-
ius, in illis, quia illorum facultas vitalis imbecillior
propter frigidiorē corporis temperiem, qui defe-
ctus facultatis naturalis robore suppletur; in his pro-
pter cibum copiosiorē assumptum; nam cum co-
piosius nutritur hepar, grandius quoque euadit. Et
plerumque integrum, ut cum homo rectus incedat
caua parte ventriculum [t. 9. & 12. hoc ostendunt] tegat
excepta anteriore & dextra parte, vbi fissura [t. 33. f.
ad B. t. 35. f. 1. E.] foraminis forma, quæ propter vmbili-
calis venæ [t. 9. D. ad B. t. 12. E. t. 17. I. t. 33. f. 1. B.] transitur
necessaria fuit: & parte posteriore, portiuncula caui-
tatem quam ventriculi vtrumque orificium relin-
quit, implet.

At in brutis* in lobos seu pinnae quatuor, vel quin-
que vel sex, quæ solo venarum interuentu continu-
antur, diuiditur, quo ventriculum instar digitorum
manus, cum eum ut homines vestibis fouere neque-
ant, complectatur; si enim integrum esset, cum pron-
incedant, id fieri non posset; quare aues, cum mag-
rectæ stent, bipartitum habent.

Connectitur spinæ lumborum, diaphragmati, &
liisque partibus beneficio peritonæi, à quo ligamē-

ter quod diuidat humores. 4. auriga quod recte ducat. An plures in homine lo-
Vesalius scribit, se nunquam hepar in fibras diuisum vidisse. Fernellius asserit, se
liquando in quinque lobos diuisum notasse, quale forte Galeno occurrit, freque-
tius autem solidum nullis fibris diuisum reperisse. Columbo, in homine integrum,
in lobos diuisum, ut Galen. voluit. Archangel. semel in duos lobos distinctum pr-
ter fissuram inuenit.

tria valida, ne, cum graue sit, aliquando decidat, ac cepit; quorum primum & dextrum [t. 12. D. t. 17. H. t. 20. d. t. 33. f. 2. H.] membranæ instar tenue, latum, neruofum & insigniter validū, à peritonæo, qua diaphragma succingit, enatum, ipsum hepar, in cuius tunicam degenerat, diaphragmati parte anteriore alligat, & suspensorium dicitur; quare hepate grauiore reddito, diaphragma detrahitur, & respiratio corpore erecto vel supino difficilior fit. Alterum vero & sinistrū [t. 18. C. t. 20. e. t. 33. f. 2. l. t. 35. f. 1. G.] fortissimum quoque teres, itidem à peritonæo pronatum, tenuiorē ipsius partem diaphragmati quoque nectit, vt vtrinque iecoris latera suffulta sustineatur; sed & costarum^z notharum cartilaginibus quandoq; cohæret. Tertium, vena est vmbilicalis [t. 9. D. ad B. t. 12. E. t. 33. f. 1. B.] foetu excluso arefacta, qua abdomini ad vmbilicum [t. 23. f. 7. & 8. Z. ad Y.] nectitur, ne hepar concidens diaphragma deorsum trahat; quamuis etiam, vbi Portæ [t. 18. I.] principium est, omenti portio adnascatur; sic & posterius gibba parte, vbi caua transit, peritonæo adhæret.

Membranam habet^a tenuissimam & simplicem, à venarum^b altera membrana, quæ à peritonæo est, enatam, quæ substantiam eius cingit.

Substantia ipsius, cum nil aliud sit, quam sanguis è venis effusus, cuius nomine rubet, & mollis est, ipsique circumfusus, qui à membrana circumiecta contentus concrefcit, idcirco *πατέρισμα*,^c id est, affusio Erasistrato dicitur; Galenus^d carnem, Hippocrates carnosum viscus vocauit.

Hæc inania^e spacia inter venæ cauæ & portæ radices, paucis arteriis interiectis, explet, quæ inordinate per ipsius substantiam, vt abstracta ipsius carne [t. 33. f. 4. & maxime t. 34. hoc ostendit] apparet, (vti ab annis viginti tribus in nostris Anatomiis demonstrare cō-

^y Ligamenta duo agnoscit
Columb. alterum circa venum cauā, alterum suspensoriū, quo diaphragmati iecur affigitur.

^z Syluius & Hollerius hoc obseruauit, at Archæan. asserit, se nunquā potuisse reperire, quoniā fortasse in mortuis concidē iecore, ob tenuitatem disrupta, obliuerentur.

^a Galen. 4. vs. part. 14. & 6. ad. anat. 11.

^b Aligamentis hepatis Venæ salio, à peritonæi membrana, Columb. Fallopio, Archæg. à peritonæo.

Laurent.

^c Gal. 6. ad. anat. 11.

^d 4. vs. par. 13.

^e Gal. 6. ad. anat. 11. separationem carnis hepatis à venis obscure proponit.

TABVLA XXXIV.

Venæ caue portæque radices per hepar disseminatas, earumque anastomoses exhibet, vna cum trunco venæ vmbilicalis F G. Portæ H I. & Caue C D. notato.



f Multi has nō agnoscūt. Ves. ait, utriusque venarumulo rū extrema o sculis inter se conueniūt, & multis locis cōgredi & continuari apparēt. Fallopius vero cōiunctionem vasorū in hepate, q̄ extrema porta cum osculis illarū q̄ à caua sunt si muliungi, & sibi inuicē respondere, non satis aperte cognosci. Arch. in iecoribus & crudis & coctis maximo rū animalium coniuunctiones extremorū diligētissime perq̄sui, has adhesiones nunq̄ tamē deprehendere potui: nā multis locis se non tangunt, & q̄ tangūt in transuersum, non longum se tangūt, vt angulos rectos cōstituerē videātur.

u Gale. 4. vs. part. 13. quare non sinum fecerit natura, sed plexum explicat.

sueuimus) disseminantur; ita tamen, vt longe plures radices portæ [t. 33. f. 4. & tab. 34. radices nigricantes portæ sunt] per inferiorem eius partem, pauciores per superiorem, & contra longe plures cauæ [t. 33. f. 4. & t. 34. radices albicantes cauæ sunt] per superiorem, pauciores per inferiorem (quare copiosior sanguificatio in sima, distributio vero copiosior in conuexa fit) innumeris propaginibus diffundantur; inuicem per transuersum [t. 33. f. 4. G G G G. t. 34. L L L.] per Anastomoses^f commissis; quamuis aliquando cauæ radices extrema sua in medias portæ radices infigāt, per quæ sanguinis ex portæ radicibus in cauæ fit transitus, ita vt hæ radices mirabilem & plexum (cuius nomine hepatis venarum principium forte dictum) ad perfectiorem sanguinis elaborationem constituent. At peculiaris & insignis Anastomosis notanda, quæ canalem [t. 34. M.] æmulatur, & veluti communis & continuus ductus existit, qui stylum satis magnum admittit, à quo in omnes vndique tam Cauæ quam Portæ venæ fibras minimas, via patet. Notandæ profecto sunt diligenter hæ venarum anastomoses, cum per eas materia peccans trāseat, quando habitus corporis deiectionibus expurgatur. Harum radicum [t. 34. K K K K. t. 33. fig. 4. F F.] inferiores paulatim colliguntur in crassiores, hæque in alias, donec in humiliore hepatis parte in vnum venæ portæ [t. 33. f. 4. E E. t. 34. H H.] truncum coeant. Superiores vero etiam [t. 34. E E E. t. 33. f. 4. C C C C.] paulatim in maiores, & hæ in alias coaceruantur, vsque dum in duos [t. 33. fig. 3. M N.] maximos coeant ramos in anteriorem Cauæ sedem, qua hepati innascitur, & diaphragmati incumbit, pertinentes, vnumque truncum constituunt [t. 34. A C. t. 33. f. 2. F. f. 3. D. f. 4. B.] hinc ex sima hepatis portæ vena [t. 17. a.] ex gibba vero cauæ [t. 17. K.] oriri vultgo di-

go dicitur. Inter has radices furculi [*tab. 35. f. 2. Q. Q. t. 36. f. 1. D. D. D. f. 2. a a a.*] tenues & graciles, venarum corpore, donati & in vnum caudicem [*t. 35. f. 2. a. t. 36. f. 1. E.*] collecti, bilem ab hepate ad vesiculam deferentes disseminantur, qui cum portæ radicibus coniunguntur, quo sanguis antequam in Cauæ ramos affluatur, à bilioso excremento repurgetur. Verum eadem substantia vasa quoque amplectendo, fulcit. Ad huius nutritionem sanguis in radicibus portæ elaboratus effunditur, & reliquum in radices Cauæ pro totius corporis nutritione & expellitur & attrahitur.

Arteriæ etiam [*tab. 14. f. 1. t. & fig. 1. y. tab. 18. L.*] ad ipsius simam partem, vbi portæ rami in suum caudicem coeunt, magis venis & candicantes, pauciores tamen & ceteras à Cœliaca [*tab. 14. fig. 1. m.*] in ipsius corpus diffusæ, vt calorem natium euentilando conferuent; quare simam tantum percurrunt; cum conuexa pars à perpetuo diaphragmatis motu, tanquam flabello ventiletur; verum & calorem vitalem deferunt; vt geminato calore sanguificatio felicior fiat; & vt vitalis facultatis fiat particeps: in toto namque corpore venæ & arteriæ mutuas sibi tradunt operas, hæ illis spiritum, illæ his sanguinem subministrantes.

Nervi^h duo parui [*t. 14. f. 2. y. t. 18. M.*] à sexto pari; alter à ramo, qui ad orificiū ventriculi [*t. 35. f. 1. O. t. 36. f. 1. O. t. 9. lib. 2. f. 1. x.*] superius mittitur; alter [*t. 35. f. 2. f. tab. 9. lib. 2. f. 1. y.*] à ramo, i qui costarum radicibus dextri lateris exporrigitur, per ipsius tunicam disperguntur, ne sensus expers sit, & à planta differat: exiles sunt, quia exiguo sensu, cum sit pars nutritioni tantum deferuiens, opus habebat; hinc non acuti,

T

sed

qui mesenterio disperguntur, cum quibus etiam rami arteriarum in ipsius substantiâ disseminantur. Platero duo nervi in tunicam hepatis desinunt.

g Gal. 6. ad. a.
nat. 11.
h A sexto pari
nervulus 4.
v. part. 12. ad
& Archang.
i Ab Anatom
micis ignora
tū asserit Ve
sal. & hunc in
ipsius tunicā,
illum in reco
ris substantiam
dispergi statu
it, vt à vira
tionali concu
piscibilis ani
ma pars cohi
beri possit, qui
bus cum freno
pro imperio v
tatur. Colum.
ramuli sexti
paris in ipsius
membranam.
Fallop. ab eo
nervos habet.

sed obtusi & grauantes potius hepatis dolores sunt; eius vero profunditas, propter tot humorum in eo motus, omni sensu caret.

k Gale. 4. v. f.

part 13 qualis

nulla in toto a

nimante alia,

6. ad. anat. 11.

Sic Vesalio, te-

nuior vasorū

tunica quam

alibi: at Colū-

bo, portæ radi-

ces in hepate

crassa satis sūt

præsertim quo

ad tunicam.

1 Lauren. vult

usum esse, vt

instita vi san-

guini ruborem

tribuat, & i-

ta per se & pri-

mo sola ciuget

in omni tunc.

m Colum. di-

cit membrum

esse sanguifica-

tioni dicatū,

nō vero ibi spi-

ritus natura-

lis generari.

Contra Arch.

probat fieri spi-

ritū naturalē.

n G. 4. v. f. p. 18

o Alias ex vē-

triculo in ve-

nas commodē

transiūni non

posset. 4. v. f.

part. 5.

p Gal. 4. v. f. par. 2. attrahunt, & hepati præparāt modo, quo ipsum similimo, quipp

qua natura ei sunt assimilēs, & primum germen ex eo ducant. Item 4. v. f. part. 12

Vfus hepatis, vasis affundi ne cohæreant, eadem-
que fulcire & stabilire, tum calore suo venas, cum e
loci subtilissimam^k habeant tunicam, fouere,^l quo
sanguificatio, quæ in radicibus Portæ in hepate fit,
recte absoluat^r: ipsis virtutem naturalem tribuere,
quasi irradiatione, eo modo, quo vasa seminaria à te-
stibus vim feminificam accipiunt: quin & spiritum
naturalem procreare; & tandem animam altricem
quæ omnibus partibus insidet, custodire. Quomodo
autem sanguificatio fiat, cum diuersæ sint opiniones
quas libro de partibus similaribus recensuimus, no-
stram sententiam subiiciemus.

Alimenta tam solida, quam liquida per os assum-
pta, & post masticationem deglutitione in ventricu-
lum delata, ab ipso concoquuntur, & in chylum
conuertuntur: hic postmodum pyloro reſerato, in
intestina protruditur, & si quæ ipsius portio minu-
elaborataⁿ exciderit, in intestinis concoquitur: hu-
ius tenuiorem & laudabiliorem partem (fæces enim
aluinæ in crassa intestina deturbantur) cum humide
illo,^o quod veluti aqueum excrementum est, in ven-
triculi coctione genitam, venæ portæ (quæ hepati
concauo infixæ est) rami ad ventriculum, & potissi-
mum intestina missi, exugunt. Venæ hæ, quæ mesa-
raicæ dicuntur, chylum assumptum attenuant, præ-
parant, & ei primum^p dant sanguinis rudimentum
chymusque fieri incipit: hic cum ad portæ truncum
deferri cœpit; crassiorem huius chymi partem Lien
per ramum Splenicum allicit; ne si totus ad hepar fe-
ratur, obstructiones causet, vti in Lienis vsu exposui-
mus

mus. Reliquum chymi, ex trunco portæ defertur in eius radices, quæ per simam, quam plurimæ & admodum graciles dispersæ sunt, tenuissima & tunica, (quemadmodum & Lienis, testium & mammarum vasa) donatæ, quo facile vis sanguifica ab hepatis carne subeat, sine qua sanguis ad nutriendum utilis confici non potest: à qua sanguificandi vim, quasi irradiatione, ut vasa spermatica vim seminificam à testibus habuerunt, accipiunt: in his in sanguinem mutatur, cum non è radicibus portæ in carnem hepatis chylus effundatur.

Quo vero diutius retineatur, & per multas alterationes ad minima redigatur, vel potius perfecte elaboretur, non est cautitas, quemadmodum in ventriculo, sed ex infinitis & arctissimis venarum ramulis, quo chylus extenuetur, ad exiguum redigatur, facileque in massam sanguineam ab hepate ambiente vertatur, quasi plexus efformatus est. Si enim cautitas insculpta foret, tum per canalem chylus immitteretur & emitteretur, sicque chylus adhuc crudus, nec perfecte in sanguinem mutatus, ad partes alendas ineptus, elaboretur.

Sanguine in portæ radicibus absoluto, ipsis desiderium inest eum deponendi, partim in carnem pro nutritione effundendo, unde & hepati desiderium attrahendi adest; partim in Cauæ radices, quæ potissimum per ipsius gibbam disseminantur, quibus etiam desiderium inest illud rapiendi, & tanquam canalibus (in quibus elaborator euadit) sanguinem purum ab excrementis repurgatum in omnes partes distribuendi: quæ Cauæ & Portæ radices licet nullo ordine per carnem hepatis distribuantur; multis tamen locis, exceptis ramis nutritioni hepatis deferuentibus, per anastomoses iunguntur, dum vel per transversum se contingunt, vel portæ extre-

q Gale. 4. vs. part. 13. Vesal. tenuior longe quam aliarum, qua per uniuersum corpus distribuntur.

r Addit Arch. idcirco etiam tennes esse, ut facile excidat.

Et effluit sanguis in substantiam hepatis.

f Galen. 4. vs.

par. 13. add. t.

Arch. propter

citã & copio-

lam sanguinis

productionẽ, cũ

plurima sint

partes, quarum

substantia assidu-

o, ab inge-

nito calore dissipatur, eam

assiduo reponi

oportet, quare

assidua & ve-

loci sanguinis

productione o-

pus est, q in ra-

dicib. portæ re-

cte absolvitur.

t Arch. vult.

ex porta radi-

cibus in hepar

effundi, inde

in caua radi-

ces transsumi.

¶ Vesal. p. 457. ab hepate sanguis in cauam derivatur, aut

saltem ex porta propaginib. in caua soboles assumitur.

¶ Galen. 4. vs. par. 5. Opiniones de sanguificatione. Pri-

ma Ar. 2. & 3. par. anim. Sic

& 3. hist. ani. in hepate, et

canali & riuulo cō. ineri san-

guinē: in Corde tāquā fonte & cōcepta-

culi, ubi sanguificatio fiat.

Secūda Auer-

rrhois est: in hepate prepara-

ri, in corde per-

fici, & inutilem ad alēdum, in cordis & arteriarum facultas affulserit. Tertia Ve-

salij lib. 3. c. 1. & 5. cum quo Iubertus de cad. 1. parad. 4. veras sanguificationi & per-

fecta cōtioni inservire: hepar vasis affundi, ne cohæreant, vasa stabilire, calore suo

hamatosin promouere & id ex Gal. 1. nat. fac. Et Fallop. ait, portam chylum elabo-

rando in sanguinem cōmutare. Quarta, Columbi, chylum à porta, & eius ramis ad

is coris concavū deferri, ac per eius substantiam d. spergi, ut ab ea coquatur & in ru-

brum sanguinem qualis ipsa est, conuertatur. Sic & Argenterius venis vim sangui-

ficandi penitus denegat. Quinta, Vega & Laurentij, qui & elaborationē & rubrifi-

cationē considerant, & venis omnib. præsertim hepatis proximis, vim tribuūt insi-

coquendi, alterandi, immutandi: ruborem vero sanguini tribuere solam hepatis car-

ma in Cauæ medias radices infiguntur & vice versa: sic enim ex Portæ radicib. ^t in Cauæ radices fit trans-

itus. Quo vero sanguis per angustissimos vasorum ductus transire possit, tenuis & aquosus humor serum nimirum, à quo nulla ^u particula nutriri potest, vehiculum præbet, quare *ὄχημα τῆς τροφῆς* Hippocrates nominauit. At cum assumptorum diuersæ fuerint partes, non omnes in laudabilem sanguinem mutari potuere, quare eo modo, quo in prima concoctione, quæ in ventriculo & tenuibus fuit intestinis, aluinæ fæces segregatæ fuere; sic in secundæ coctionis principio, quæ fuit in Mesaraicis, crassior & fæculentior pars à chylo segregata fuit, & Lieni demandata: in ipsa vero venarum hepatis coctione, duo excrementa secreta fuere, ne simul cum sanguine permixta, per totum corpus ferantur, quæ per proprios meatus in sua receptacula reponuntur: & quidem primo biliosum excrementum, quod partim in vesiculam, partim ad intestinum mittitur, ut iam dicturi sumus: dein ferusus humor, ubi iam ex radicibus portæ ex hepate

patefici, & inutilem ad alēdum, in cordis & arteriarum facultas affulserit. Tertia Vesalij lib. 3. c. 1. & 5. cum quo Iubertus de cad. 1. parad. 4. veras sanguificationi & perfectæ cōtioni inservire: hepar vasis affundi, ne cohæreant, vasa stabilire, calore suo hamatosin promouere & id ex Gal. 1. nat. fac. Et Fallop. ait, portam chylum elaborando in sanguinem cōmutare. Quarta, Columbi, chylum à porta, & eius ramis ad is coris concavū deferri, ac per eius substantiam d. spergi, ut ab ea coquatur & in rubrum sanguinem qualis ipsa est, conuertatur. Sic & Argenterius venis vim sangui-
ficandi penitus denegat. Quinta, Vega & Laurentij, qui & elaborationē & rubrificationē considerant, & venis omnib. præsertim hepatis proximis, vim tribuūt insi-
coquendi, alterandi, immutandi: ruborem vero sanguini tribuere solam hepatis car-
nem, quia sola rubeat. Sexta Archangeli, cui sanguificatio absoluta sit in radicibus
pæta, accersita vi sanguificandi ab ipsa carne & substantia hepatis: quibus radici-
bus insi desiderium sanguinem absolutum deponendi in hepatis carnem, quo cum
fuerit hepar nutritum, insurgere desiderium sanguinem sibi superfluum, quan-
quam optimum expellendi, simul quoque exurgere radicum Vena Cauæ deside-
rii illum exsurgendi & rapiendi, in omne corpus distribuendi. Septima nostra est
hic explicata.

pate in Cauam sanguis delatus, maiorem feri partem, cum venis^u onus sit alienum, Renes per emulgentes ex Caua (cum in hac quoque Vena sanguis * multo adhuc humore tenui & aquoso plenus sit) quemadmodum & per arterias, ex Aorta attrahunt.

x Galen. 4. v. f. part. 6.

Sanguis ab excrementis repurgatus per Cauam eiusque ramos per totum corpus distribuitur, & alteratur, ne, dum per eos fertur tempus y ipsi alimentum frustra pereat; & Cauæ rami feri partem secum vehant, quo per tenuissimas capillares venas ad partes corporis alendas deduci possit, & carnibus adspersi, qui paulatim vaporis, rorisue modo in totum dispergitur, adhærescit glutinis instar, & demum alimentum fit, quod & humidum radicale, & partium substantiam nutriendo & restituendo, conseruat. At feri illa per venas lata portio, tanquam inutilis in tertia concoctione seu nutritione, quæ in omnibus fit partibus, per sudorem & insensilem transpirationem, expurgatur.

y Galen. 4. v. f. part. 17.

De vesica biliaria.

C A P V T XLV.

Aristoteles 2. histor. anim. 15. Galenus 4. v. f. par. 12. & 13. 3. v. f. part. 6. & 7. & 6. admin. ana. 2. & 12. de hac vesica egit.

a In quibusdam animalibus non est vesica, sed soli porci bile ab hepate ad tenue intestinum velut derivatur 4 v. f. part. 12. Quos vero homines vesica caret Arist. refert & Plin. quos visa firmissima affirmat, hæc tamen non vidimus.

VESICA [t. 27. P. P.] biliaria, * quæ κύστις^b χολήδωχος nominatur, c bilis flauæ synceræ receptaculum est, in dextra & caua [tab. 35. B. B.] hepatis parte (quo citius bilem recipiat) sedem habet: at hepatis sinus insculptus est, quo superior, & media vesicula pars ei tenacissime connectatur; altera parte extra hepatis corpus propendente, vbi dextrum ventriculi latus & colon attingit, vtrumque sæpe fla-

b Archangelo dicta videtur, ἀπὸ τῆς κύστις, quæ est vas piscatorum, quo ut capiuntur pisces, ita cysti capitur bilis.

c Aliis bursa cholera citrina.

uitietingens, & succo per tunicas exsudante imbuens: vnde forsā quibusdam perpetui stomachi ardores.

d Firma oblonga & rotunda longiora cuiusda pyramido, Vesal. & Laur. Figura oblonga, Columbo: longiuscula & rotunda pyramido angustata, Plater. Figura globosa, sed excavata & oblonga pyramisculo aquatilis: Archang. c Galen. s. v. f. part. 6. f Membranea nerueaq; Vesal. & Platero, nervosa tenuisq; substantie Fallo. mēbranea Colubus & Laurentio. g Aiecoris tunica Vesalio. h Galen. s. v. f. part. 11. Laurentius ait intus rectis alligere, obliquis

Figura [t. 35. f. 2.] est oblonga, ^d ne à ventriculo comprimatur, subrotunda, concaua, quæ sensim angustior reddita in ceruicem definit.

Parua est, ^e lienis & renum respectu, licet succum tenuitate ac copia (inter eum, quem lien & renes attrahunt) medium trahat: quod aliis instrumentis omnibus hepar purgantibus, commodiorem & orificiorum trahentium maiorem numerum habeat.

Substantia ^f membranosa, quo repleta dilatari, & inanita subsidere possit: duplici enim membrana donatur, altera à ^g peritonæo fibris carente, qua ea sola pars, quæ extra hepar propendet, cum sola propugnaculo indiguerit, vestitur, eaque hepatis cauo alligatur. Altera propria, tenui densa & forti, talique proprietate prædita, vt à bile, à qua tamen reliquæ membranæ afficiuntur, non lædatur; quare licet vna sit, robore tamen & densitate suppletur; omni fibrarum ^h genere donata, quo ipsius substantia firmior sit, & dilatationi aptior, rectis interioribus, transuersis exterioribus; obliquis paucioribus & mediis. Hæc substantia quædam crustosa ex excrementis tertiae concoctionis ipsius vesicæ genita, ne à bilis acrimonia lædatur, succingit. ⁱ

Vasa habet; venas duas graciles, à Portæ ^k trunco cysticas [t. 35. f. 2. g. t. 36. f. 1. P. P.] gemellas, quæ (vt in alba oculi tunica) ad nutritionem distribuuntur cum sanguine, quemadmodum omnes corporis nostri

par-
retinere, foras transuersis expellere. ⁱ Archangelus & alterum usum addit, ne assiduo fluxu & refluxu bilis, facies interior callosa reddatur, & sic ora venarum excaceniur, nec sanguinem pro nutritione alliciant, & sic vesicula contabescat.

^k Galen. s. v. f. part. 8.

partes, non bile ¹ nutriatur: & per alia [t.35.f.2.Q.Q.t. 36.f.1.DD.f.2.aaa.] vasa^m purum & proprium excrementum attrahat, non vero permistum vt renes.

Arterias valdeⁿ graciles [t.35.f.2.e.t.36.f.1.N.] à Cœliaca, iecoris cauo exporrectas, quo harum assiduo motu agitata putredo impediatur.

Neruum [t.35.f.2.f.t.36.f.1.O.] paruum ac vix conspicuum, à sexti^o paris ramulo, qui hepatis tunicam perreptat, recipit: quæ vasa corpori vesicæ eodem loco ad collum [t.35.f.2.b.t.36.f.1.C.] infixa, & in ipsam tunicam dispersa, ad fundum [t.35.f.2.P.t.36.f.1.A.] vsque perueniunt.

Diuiditur in fundum, ceruicem & meatus bilarios. Fundus [t.35.f.1. & 2.P.t.36.f.1.A.] amplior vesiculæ pars est, qui inferiora^p respicit, [t.36.f.1.hoc ostendit] quando cum hepate in sua naturali sede est: rotundus est, à bile quam continet flauo colore tinctus, aliquid & nigro, cum bilis diutius retenta exurit, & in calculos leuissimos & multiformes condensatur.

Ceruix vero, angustior [t.35.f.2.b.] vesiculæ pars est, quæ fundo multo durior est, cuiusque fini sinus [t.36.f.1.B.f.2.t.] peculiaris apponitur: est & oblonga, superiora respiciens, & paulatim in angustum meatum [t.36.f.1.C.] definens, qui semicircularem figuram efficiens, in porum bilarium [t.36.f.1.H.] finit, vbi meatus communis [t.36.f.1.I.] constituitur.

Meatus duplices sunt (qui πόροι χολιδόχοι, quia bilem deferant, dicuntur) cum biliosum excrementum ab hepate bifariam expurgetur: impermixtum

T 4

nimi-

plurimi circa fellis vesiculam desinunt, vt bilem fœculentam è chylis arterialis segregatam eo transmittant, Varolus. o Galen s. vs. part. 8. sic Archangelus, nonnulli propter paruitatem non videntes denegarunt, quia cum bilis acris, non debuit sensum tristem percipere.

p Fundus sursum spectat cauo iecoris adharrens. Archangel,

l An nutriatur bile, vide Archangelū: Iubertus paradoxa scribit, rationes affert Verū sanguine ali constat ex Galen. s. vs. part. 7. & 12. bilem familia ritate quadā trahere, quā delectetur s. vs. par. 10. quare acrimonia nō laditur, & quia humoris attactu assueti, non patiuntur. m Galen. s. vs. part. 7. n Arteriam & neruum ab iis, quæ in viscus inferuntur, paruum utrinque admodum & vix conspicuum s. vs. part. 8. ha quia parua admodum nonnulli vesicula denegatas censuerūt, Archangelus:

TABVLA XXXV.

Fig. I. Ventrem inferiorem, ventriculo & intestinis sinistrorsum depressis, hepate eleuato exhibet, quo hepatis cauum, vesiculae connexio & vasa, eius appareant. Fig. II. Vesiculam exemptam, eiusque vasa, vt Anatomici pingunt, ostendit.

LIB. I.

FIG. I. TAB. XXXIV.




FIG. II.



nimirum & syncerum: dein permixtum & crassum, ex Galeni ⁹ sententia. Bilem enim impermistam ^r ex-
 ac^tque synceram, vasa [t. 35. f. 2. Q Q Q. t. 36. f. 1. D D D. f. 2. 4 4 4.] in hepar [t. 36. f. 2.] immissa, & quidem ex-
 gua, vt innumeram ramorum seriem constituent, in-
 ter cauæ [t. 35. f. 2. S. t. 36. L.] & portæ [t. 35. f. 2. R. t. 36. f. 1. F.] radices disseminantur, & simul in vnum [t. 35. f. 2. b. a. tab. 36. figur. 1. E.] meatum iuncti ad se ^f trahunt, & in vesiculam effundunt; quo quotidie impletur, & quotidie vacuatur (& vt quidam ^f volunt, in ere-
 ctis quidem animalibus ex vesicula ab hepate leuiter compressa, in brutis vero à ventriculo) per meatum [t. 35. f. 2. b. t. 36. f. 1. G.] qui in porum bilarium [t. 35. f. 2. c. t. 36. f. 1. I.] desinit, qui tenuissimus, ita vt specillum vix admittat, præcipue, vbi membranulæ [t. 36. f. 2. x.] bilis regressum impediunt, circa Ceruicem ex-
 tant.

Biliosum vero crassum, & permixtum excremen-
 tum, ab hepate trahit alter meatus, Porus bilarius di-
 ctus, [t. 35. f. 1. & 2. c. t. 36. f. 1. H. f. 2. yy.] inferiore mem-
 brana omenti suffultus, qui vas est oblongum, quod
 ab hepate ^r circulari etiam figura inseritur, non in
 ventriculi fundum, ne bilis sua mordacitate ventri-
 culum ad chylum, antequam concoctus sit, excer-
 nendum irriteret: non ad sedem, idque non tam ob-
 metum ruptionis ob viæ longitudinem, quam vt ex-
 crementum hoc dum excernitur, (hoc enim meatu
 obstructo icterus fit & excrementa alba sunt) pitui-
 tam plurimam etiam in tenuibus intestinis coacer-
 uatam incidat, internam eorum superficiem ^u de-
 tergat

^f Fallopius. t Fieri posse arbitror, vt ex iecore ad intestina meatus aliquis bi-
 lem deferat, ita vt ea in vesiculam quampiam prius non colligatur. Vesalius. Ve-
 rum huius pori bilarii explicatio post Galenum Fallopio debetur. Canalem propri-
 um, qui bilem ab hepate in communem canalem vehat, à quo dein bilis in duode-
 num præcipitur appellat Archangelus.

ⁿ Galen. 5. vs. part. 4.

tergat, & cum fœcibus in crassis intestinis collectis permista, ad excretionem sollicitet, quo vnâ cum ficis excrementis per aluum reiiciatur: sed ad intestina tenuia, & quidem non ipsorum principium, ne bilis conscendens in ventriculum feratur (quamuis, vbi ipsius copia adest^x ad ventriculum regurgitare contineuerit, quod biliosis naturis familiare est, quoties his ieiunis venter diutius torquetur) sed in duodeni^y finem [t. 35. f. 2. d. t. 36. f. 1. M.] ad ieiuni principium, inter vtramque intestini tunicam, oblique membranulis laxis^z orificio propositis, vel potius interioris tunicæ rugis arcte iunctis foramen hoc occludentibus, ne quid regurgitare possit: aliquando bifidus^a paruo interiecto spacio in idem intestinum inseritur, & bilem permistam ad intestinorum facultatem post chyli exsuctionem ad fœces excernendas irritandam, cum tenuiore bile defert.

Tertius etiam^b meatus nonnunquam reperitur, qui in fundum ventriculi bilem effundens inseritur: hique bilem quotidie euomunt, vocanturque *πικρόχολοι ἀκω;* quemadmodum ii, quibus ad ieiuni finem *πικρόχολοι κατ'ω*, appellantur, horumque deiectiones perpetuo biliosæ sunt.

Vfus vesiculæ^c bilem flauam impermistam, exa-

Etque

^x Biliosis naturis familiare est, quoties his ieiunis venter paulo diutius torquetur
Vesalius 625.

^y Duodeno non procul à ieiuni principio,
Vesalio: ad duodeni initium Fallopius: in Ephysim

Laurentio: per duodenum infusa Platero: duodenum intestinum ingreditur Valerolo: ad intestinorum productionis initium 6. ad a-

nat. 12. plurimum quidem unicus est in id intestinum, quod pylori & ieiuni medium est insertus, &c. quib. vero meatus unicus est, iis tota bilis influit in ieiunum 2. Temper. 6. ad ieiuni summitatem, Colum. 2. Dua membranula ad orificij latus, Ves. 2. Bis ac ter obseruauit Fallo. b De hoc Gal. 2. Tēp. 6. 2. acut. t. 31. & artis medica c. 74. (vbi scribit, hunc ductū ut plurimum non reperiri) meminit & s. v. par. 1. quare errant qui volunt frequentius ventriculi fundo quam intestino inseri. Vesalius in uno tantum obseruauit: Columbus constanter fatetur, se nunquam vidisse, sic & Fallopius. c Communis sententia, vesiculam omnem bilem excrementitiā à iecore ad sanguinis defecationem allicere, qua vesicula onusta, per ceruicem ac portum biliarium in duodenum deponere. At Fallopius & Archangelus volunt bilem ab hepate ad intestinum primo deferri, at cum non semper egeat bile, nec pateat semper ob meatum in intestino à chylo occlusum, ne fursum in hepar remeat, & sanguini-

TABULA XXXVI.

*Fig. 1. Vesicula biliaris exempta situm, formam
& vasa exhibet: at fig. 2. eandem hepatis adhuc
adnatam, sed apertam propter valuulas & po-
rum biliarium, qui ab hepate ad intesti-
num fertur.*

FIG. 1





FIG II.



guinem iterū
inspicit & cō-
spurcet, in ve-
siculam defer-
ri, ibique con-
tineri, donec
meatus in in-
testinum pa-

exacteque^d synceram (cum non per ampla orificia,
vt lien & renes, sed angustis prorsus finibus vasorum
à seipsa in hepar immisforum, succum hunc attra-
hat) ipsique familiarem, quæ extra venas est ab hepa-
te, quæ alias per vniuersum corpus delata, plurimum
obfuisse, icterum causasset, fulcipere, continere^e &
expellere.

teat. Sed huic opinioni resistunt valvula circa ceruicem. Tertia opinio est Galeni
quam sequitur. d Galen. 5. vs part. 6. e Subtile commentum, bilem in vesicula as-
seruari, vt iecur à putredine vindicet: verum sic plerisque corporis partibus, vesi-
cula bilis, ne putredinem contraherent, adhibenda essent, Vesal. 626.

De Ventriculo.

C A P V T XLVI.

a Arist. 1. hist.
16. 4. eiusd. 3.
3 par. 14. Hip.
6. epid. sect. 3.
& 4. vñd' vs
Hipp. de car-
nib. Apud Hip-
poc. κοιλίαν καὶ
κοιλίας omnē
cavitatem in-
signem signifi-
cat: aliquan-
do & paruas
cavitates, &
meatus.

b Hippoc. & E-
λενο. & Ga-
leno.

c Vt Aristo-

phani. d Aristot. 2. hist. an. 17. quadrupedes ouipara, cornigera altera maxilla den-
tata, quaternos habent sinus. Gula ab ore ad ventrem se applicat maiorem, q
intrinsecus asper ac probe gula commissuram: 2. sibi sinum adnexum habet, que
Reticulum vocant, intus similis reticulis mulierum implexis, ventre minor. 3. Hi
excipit Omasum, interius asper, cancellatus, crustatus, magnitudine reticu-

Consule Aristotelem 1. hist. an. 16. 2. eiusd. 17. 3. par. anim.

14. Galenum 4. vs part. 7. 6. ad. anat. 7. qui de tunicis
& fibris egit 4. vs part. 8. quemadmodum lib. 5. c. 11.
de fibris & cap. 12. & de tunicis, & de vtrisque eius-
que situ libro 4. cap. 8. de ipsius nervis 9. vs part. 11.
sic 6. ad. an. 3. egit de differentiis ventriculo, quæ pro
ratione alimentorum, quibus animalia vescuntur,
obueniunt.

Ventriculus tanquam paruus venter, qui κοιλία
a à cavitare, & γαστήρ^b (rectius γαστήριον)^c di-
citur, cibi & potus commune est receptaculum, &
corporis nostri culina: homini^d & animalibus v-
tramque maxillam dentatam habentibus, vnicus est
ruminantibus,^d quæ alteram tantum maxillam ha-
bent, quadruplex: pennatis vero triplex, de quibus
omni-

omnibus Aristoteles ingeniose, etiam Galeno cōmo-
nente, egit.

Situs est non prope os, nec in thorace, cum nullus
ibi sit locus, propter instrumenta respirationis & vo-
cis, quæ loca pectoris explent: dein, quia ossibus cir-
cumdatus est, quod ipsius extensioni impedimento
fuisset: sed necessario in ventre inferiore, [t. 12. FF.]
cum facile extensioni cedat, repositus est; & quidem
in eius parte, quoad fieri potuit, suprema, quo caui-
tati oris vicinus foret, cui per fistulam gulam dictam
iungitur: proxime sub diaphragmate inter [t. 12. CC.]
hepar & lienem FF. ventriculum notat] hepar & f lienem
in medio & quasi corporis transuersim inter vtrum-
que hypochondrium, quo cum intestinis continua-
retur, non tam ob chyli distributionem, quam vt ex-
crementa h commodius demissiore parte reponan-
tur, ne tetrus vaporibus cor & cerebrum conturbent:
maior parte i sinistrum hypochondrium [tab. 12. o-
bendit] occupat, quia hoc plus vacuum est, & pro-
pter orificii, quod superius dici consuevit, implan-
tationem, per quod cibaria recipit, quo hepatis dex-
teri lateri [t. 12. CC.] possidenti cedat, & hepatis
pondus ad lienem compenset, sicque corpus in æ-
quilibrio sit. Anterior nudus est, maxime cum
iurgat (contractus enim magis sub hepate occul-
tatur) vt tactu facile deprehendatur; quare fri-
gore facile afficitur, eiusque nomine præ reliquis
partibus, quo melior fiat concoctio, custoditur:

4. Aboma-
sum venter
ab eo iungitur
Omaso ampli-
or magnitu-
dine forma
longior, can-
cellis insus &
crustis multis
magnis & la-
nibus: mox in-
testinum se-
quitur. Idem
3. part. ca 14.
venter, Arsi-
nium si reti-
culus: Oma-
sum, Aboma-
sum. Et Ar-
changelus ru-
minantibus
geminum tri-
buit.

c Meum non
est de his age-
re, cum de iis
ingeniose A-
ristoteles, satis
habemus, si
solius hominis
constructio-
nem ad vni-
guem exponere
possimus,
ait Galenus

4. v. part. 17.

Pene ad umbilicum peruenire vult Columbus, cum vacuus sit, cum vero ingent-
copia turgat etiam longius progredi ait Archangelus.

Galen. 4. v. part. 7. in medio corporis positum asserit, & cum eo plerique Ana-
tomici: quod de superiori orificio dici posse, non autem de ventriculo, vult Vesalius.

Galen. 4. v. part. 7.

Licet Galen. secus sentiat, ait Columbus, quod inspectio & ratio improbant, Ar-
angel.

k Gale. 4. v.
part. 8.

Non spina ut
plerique cre-
diderunt, Ar-
chang.

In Alij somni-
ant anteriore
ventriculi se-
dem omēto in-
regi, Vesal par-
te anteriore e-
piploon tāquā
tegumentum
obrenditur.

Lauren.

In Gal. & eius
affecta pyloro
privatum tri-
buū: Pancreas
& eius cōstri-
ctiōni auxilia-
ri volunt, ve-
rum tum ne-
cessario orifi-
cium ambiret
& fibras habe-
ret, ut sphin-
cter, quidā li-
bris edocti, or-
bicularim in-
ferius orificiū
amplecti vo-
lunt, Vesal.

o Humanus
vērriulus ca-
nino similis, q-
nō multo am-
plior quam in-
testinum Ari-
stot. 1. hist. 16. forma perquam varius est, Vesal. cucurbita oblonga & rotunda.

stot. 1. hist. 16. forma perquam varius est, Vesal. cucurbita oblonga & rotunda. p
spondet, Columb. p Gal 4. v. part. 7.

dextra vero superiore & aliquantum anteriore parte
hepatis cauo [t. 12. F. sub C.] subiacet, & ab eo^k ample-
xatur, ut ventriculi calori fomentum addat: à sinistris
maiorē sui parte diaphragma contingit, quare ad-
modum repletus, diaphragmatis motum impediē-
do, dyspnœam causat: sic sinistrae posteriore & humi-
liore parte Lien [t. 12. G.] substernitur: posterius au-
tem sunt spina velut propugnaculum quoddam de-
sum, & lumborum muscoli, tanquam substernicu-
lum molle simul cum pinguedine adnata, quæ etiam
ventriculum calefaciunt: inferius intestinis & omen-
to adiacet, eique colon [t. 12. KL.] omenti interuen-
tu subtensum est, unde vtriუსque consensus non soli-
in colico dolore, sed etiam sumpto medicamento sæ-
pius nausea vomitusque causantur, hac excrementi
ad rectum pertranseuntibus.

Magnitudine varius est (Hippocrati quinque pal-
mos amplius) exemptus [t. 37.] enim & inflatus mul-
to maior est, quam in corpore esse possit, attamen si-
ue multum siue parum contineat, totum id ita pro-
xime complectitur, ut nihil vacui relinquat, quo re-
ctius concoctio perficiatur. Ne vero repletus pon-
dere suo decumbat, connectitur orificio sinistro (&
sophago [t. 37. fig. 1. 2. G.] continuatus) ipsi^l diaphrag-
mati: dextro [t. 37. f. 1. & 2. H. cum P.] duodeno iungi-
tur: parte posteriore & superiore spinæ incumben-
t primæ lumborum vertebræ adherescit: inferius mve-
ro, omento; alibi liberum, quo liberius distendi po-
sit: ipsius denique fundo, & præsertim pyloro, [t. 3.
f. 2. HP.] & duodeno Pancreas, nⁿ ut ea suffulciat [t. 3.
f. 2. S.] substernitur.

Figura [t. 37.] est ° rotunda, quo P^p capacior sit, m-
nusque læsioni obnoxius: oblonga, propter duo

pfiu

osius orificia, quæ barbito & pastorio similem faciūt; q Sacco fistu-
 i duodenum adhuc iunctum sit (in quadrupedibus lam ruficorū
 magis sphæricus est, quia dorsum habent acuminat- resert Plat.
 um) quæ pars caua est, quemadmodum ea quæ in-
 festina respicit & tangit, conuexa. A sinistris [t.37.f.
 2.M.] & in fundo amplior & rotundior, qui dextror-
 um sensim attenuatur, vt hepati cedat & cibus inde
 gradatim recedat:anterius [tab.37.f.1.LL.] æqualiter
 gibbus; posterius [tab.37.f.2.M.N.O.] dum adhuc in
 corpore est, duos gibbos ostendit, sinistram maio-
 rem, dextrum minorem & depressiorem, inter quos
 sinus, quos ventriculus exemptus & inflatus non
 ostendit, & propter dorsi vertebrae, [tab.37.f.2.O.]
 & vt trunco Cauæ & Aortæ descendenti cedat; &
 in canibus, & cæteris, quæ prona incedunt, anterior
 pars ciborum copia extensa laxior est, quam poste-
 rior & inferior, cum illa fundi officio fungatur. Ex-
 trinsecus læuis, planus & albicans; intrinsecus, [tab.
 37.f.4.] cum constrictus est, rugosus, subrubēs. Con-
 cauus est, eiusque cauitas amplissima, quo sufficien-
 tem cibi potusue copiam recipiat, ne ob nutritio-
 nem assiduo comedere cogamur, sed vt semel reple-
 to, alijs munijs vacare possimus, donec totus ci-
 bus vna vice ingestus, concoquatur & distribuatur.

Orificijs duobus in elatissima ventriculi regio-
 ne donatur: altero sinistro [tab.35.f.1.L. tab.37.f.
 1.G.] in media fere regione (quod manifestius ap-
 paret, quo ventriculus magis turget) circa vndeci-
 nam thoracis vertebrae, œsophago [tab.37.f.1. & 2.
 4.B.C.] continuatum diaphragmati annectitur:
 quod altero maius est, [tab.37.f.4.l.respectu m.] eius-
 dem cum œsophago amplitudinis, ne quid hic sub-
 istat: spissius & crassius altero, ne à transeuntibus
 liucllatur, sed vt semimanfos, duos, & crassos ci-
 pos, quos magnâ auiditate famelici aliquando de-

TABVLA XXXVII.

Ventriculum cum œsophago exhibet. Fig. I. anteriorem. Fig. II. Posterio rem faciem cum vasis ostendit. Fig. III. Ventriculi tunicas & fibras, at Fig. IV. ventriculum inuersum.

FIG I



FIG II




FIG III



FIG IV



glutimus citra offensam admittat : fibris circularibus carnofis [*tab. 37. f. 4. l.*] donatum, vt illud cibi potuque adsumpto naturæ impulsu coarctet, ne fumi eleuentur, quos plurimum ad perfectam concoctionem facere nonnulli voluerunt : siquidem i qui aliquid subito coquere volunt, ollæ os operculo, vt fumi retineantur, tegant. Dein ne vapores co vel cerebrum petentes, quod & gulosis, & ob intemperiem humidam fit, vertiginem, hemicraniam, suffusionem & foetidum anhelitum causet : quibusdam ob mœrorem ita constringitur, vt cibos solidos deglutire nequeant. Tum ne assumpta, prorsusupinoue decubitu, in œsophagum & os regurgitè

Hoc ob neruorum copiam [*tab. 37. f. 1. & 2. T. V. f. 2. X. I.*] exquisitissimi est sensus, vt indigentiam sentiat, quæ vim appetendi excitat, vt animal ad cibum potumque nouum quærendum impellatur : quod veteribus *ναρδία*, cor, quod eo affecto propter exquisitissimum sensum symptomata cardiacis similia (vnde Cardialgia) oboriantur, & animi deliquia quæ ad cordis læsionem consequi solent, consequantur, quamuis & cor condoleat, non tam propter viciniam, quam propter neruos ab eodem ramo prodeuntes : alijs os¹ ventriculi, & vulgo oricium superius, nonnunquam & stomachus¹ ob amplitudinem dicitur : & cum hoc propius ad spinam quam cartilaginem ensiformem accedat, idcirco parti posteriori & anteriori, quod vsitatum magis topica applicari possunt ; toto vero ventriculo labrante parti anteriori localia imponemus.

1 Gal. 4. vs.
part. 14.

1 Tria significat : 1. œsophagum, vt
3. Meth. 17.

ubi ait œsophago seu gula, quæ proprie stomachus vocatur, inflammato spina

dorsicae aplasma imponendum : 2. os ventriculi, vt 4. vs. part. stomachum ex insensu præritum statuit. 3. ventriculum, vt de cur. ad Glauc. in stomacho crudities fieri, & pituitam coaceruari scribit. Dicitur stomachus *ναρτ' ἐξοχλὸν, σῶμα ἐν* idem quod os : Hipp. in Coacis, metonymicis scilicet, quod sub pectore contineatur

Alt

Alterum seu dextrum [*tab. 35. f. 1. & 2. M. t. 37. f. 1. & 2. H.*] orificium ^t est, in elatissima ^u quoq; parte sursum ^x aliquantum reflexum, (quatuor fere digitorum latitudine à fundo distans) ne cibus sua gravitate recludat : huic intrinsecus præter fibras transversas, circulus, [*tab. 37. f. 4. m.*] crassior & spissior musculi orbicularis forma, y sphincterisue modo (qui aliquando scirrhum patitur) circûiicitur, quo claudii, aperiri, arctari & dilatari naturæ impulsu possit, quod obturatû manet, donec cibus perfecte sit ^z in cremorem liquidum & humidum mutatus & concoctus : quare & sinistro [*tab. 37. f. 4. l. conferatur cum m.*] angustius, quo tamen non minus dilatari potest, ut docent fructuum nuclei comesti, & alia ^a fortuito deglutita, quæ postmodû sine noxa rejiciuntur. Hoc postea in duodenum [*tab. 35. f. 1. ad M. f. 2. N. t. 37. f. 1. & 2. P.*] sensim laxius redditû & apertum, chylum suo robore, non pondere ad intestina à venis mesaraicis exsugendum, propellit, quare *συνωρίς*, ^b seu ianitor, & communiter orificium inferius dicitur. Vbi ergo à sinistris in summo ventriculus crassior est, ibi principium ipsius est : vbi vero à dextris, ibi ventriculi finis, & duodeni initium sequitur.

Quo verò in repletionē cibi potusque commode extenderetur, & ijs distributis constringeretur, & in maxima ingestorum copia admodum distentus non rumpatur, (nequaquam ergo prope oris cavitatem locari potuit) substantiâ donatur membranosa,

V 3

ner-
tione veterum plurimi, sed superiora spectat, Laurentius. y De hoc inter scriptores controuersia, alij glandulas, alij glandulosa corpora siue tubercula, siue prominentias appellant : duo tubercula glandulosa Galenus & Archangelus. z Galenus 4. usu partium 17. a Galenus de nat. facult. annulum aurum imprudenter deglutitum promptè excretum refert. Vesalius habet exemplum Hispani qui quadraginta uniones cum aurea cruce quinque gemmis instructiss. & fide deuorauit. Habeo filiolum, qui dum triennis, verticillum fusorium deglutiuit. b Galenus de diss. ven. 10. 6. adm. anat. 12.

dum *σύνθεσις* & *δένειν* & *πικρὸν* & *ἰσχυρὸν*, id est, sterni morsum & amarorem dixit pro cardio-
gmo & in Epid. *σύνθεσις* & *τοῦ περὶ τὴν πύλιναν* peccabile abundantia, id est, os ventriculi, Laur.

t A dextris situm. Gal. de diss. ven. t. u Non ut Anatomici ante Vesalium tradidēre in inferiore regione, unde nō admodum apte orificium inferius nominarunt.

x Nentiquā in declinatore regione sitū, ut aliqui pinxerunt Columb. non re-
lta deorsum

fer-
fertur, ut sen-

e Galen. 5. v. f. par. 12.
*d Galen. 4. v. f. par. 8. tunica-
 rû natura & è-
 triculo & st-
 macho simi-
 lis, d. ssimilis
 autem intesti-
 nu 6. ad an. 7.*

e Galen. 4. v. f. par. 10.
*f Externa car-
 ni siotransuer-
 sis villis pro-
 pellit Gale. 4.*

*v. f. par. 8. d. as-
 p. prias tunicas
 & ergora Celsus
 vocauit Ar-
 chang.*
*g Vesal. ridet
 eos, qui & tri-
 culi fundum im-
 p. se carnosum
 scribunt prepter
 concoctionem,
 cû superior & è-
 triculi pars
 carnosior sit,
 inferiore: &
 Columb. neu-
 triquâ in fun-
 do magis car-
 neam, quâ in
 superiore par-
 te asserit.*

h G. 3. v. f. p. 12.
*i Obliqua ad-
 eo exiles, & t.
 quandoq. ac è
 oculorû effugi-
 ant, idcirco*

neruosa, quæ vètriculo contracto & corrugato, cras-
 sa; eodem dilatato, tenuis est; & in iis, qui crapulæ de-
 diti, adeo ampliatur, tenuisque redditur, vt corruga-
 ri amplius non possit, quæ sæpe diuturnioris imbe-
 cillitatis ventriculi causa existit: quibus enim ^c cor-
 pus ventriculi gracile, ii deterius concoquunt, quam
 quibus carnosum.

Tribus ^d donatur membranis [*t. 37. f. 3.*] seu tuni-
 cis; vna communi, & duabus propriis; prima quæ ex-
 tima & communis [*t. 37. f. 3. h h h.*] à peritonæo, ^e qua
 id diaphragma ad superius orificium succingit, pro-
 nata, quæ propriis robur addit; fibris rectis donata,
 & respectu aliarum à peritonæo prodeuntium, cras-
 sissima, cum ab ea omenti superior membrana pro-
 dire debuerit. Altera ^f tota carnosâ [*t. 37. f. 3. i.*] est fi-
 bris carnosis ^g constans, vt illis contractis sponte vo-
 mitione excludat, quicquid ventriculo noxium est,
 quamuis etiam calorem augendo ad concoctionem
 faciant, cum ad cibos ^h coquendos calore vehemen-
 tiore opus sit. Hæc sequenti immediate connecti-
 tur, transuersas fibras obtinet [*t. 37. f. 3. l.*] quibus ob-
 liquæ ⁱ paucae & carnosæ subiacent, quarum aliquæ
 ab orificio superiore, vnde ortum ducunt, ad pylo-
 rum feruntur, plures vero ad fundum versus pylo-
 rum descendunt: sub his circa os sinistrum fibræ cir-
 culares carnosæ, quas orificium claudere diximus,
 luboriuntur: transuersæ vero & obliquæ, si modice
 ventriculum constringant, cibos amplexatur: si vali-
 de, cibum confectum sensim & sine sensu pilorum
 versus, cum is sursum spectet, & chylus grauis sit,
 blande propellunt.

Tertia interior & neruosa, [*t. 37. f. 3. k.*] in quam
 ipsa vasa terminantur, œsophagi tunicæ labiorum,
 & omnium quæ in ore sunt continua, quo os ni-

hil

hinc solum transuersa attribuantur, Arch. k Gal. 4. v. f. par. 8. ubi causam explicat.

II, quod ventriculo ingratum sit, recipiat, & quia
 rimæ coctionis præparatio in ore fit: hinc bilioso
 humore vel vapore eleuato; lingua amarore & flauir-
 e inquinatur, & sæpe oris ac linguæ exulcerationes
 vitia œsophago & ventriculo, horumque vitia illis
 communicantur; propter quem consensum caput
 per palatum euacuare non possumus, quin simul et
 ventriculum euacuemus.

Triplici fibrarum genere intertexta est, quo ven-
 triculum extendi possit: rectis quidem, quas plurimas
 habet, & præ cæteris conspicuas, quibus ceu^m mani-
 busⁿ cibum (inquiunt) attrahat, obliquis exteriori-
 bus retineat, & transuersis elaboratum expellat: quæ
 tam dense intextæ, vt sine distractione non appare-
 ant. Est etiam^o rugosa (in ruminantibus aspera ad-
 modum & inæqualis, quasi cellulis seu fauis distin-
 cta) beneficio crustæ carnosæ, quæ ex excrementis
 tercię concoctionis ventriculi pronata, quo tam ab-
 assumptis durioribus tueatur, ne ipsa densiore & cal-
 losa reddita, oscula venarum excæcentur, sicque nec
 chylus à ventriculo exfugi, ne ipse sanguinem pro sui
 nutritione allicere possit; ad moderatam quoque ci-
 borum retentionem aliquid conferre videtur, si qui-
 dem sua asperitate & corrugatione, ne quidpiam in-
 digestum prolabatur, prohibet: est spongiosa, meatus
 veluti p^r fibras breuissimas à superficie intima ad ex-
 teriorem habens, vt per dictæ crustæ meatus tenuior

V 4

chyl

n Interna membranosior villis rectis donata, quibus tanquam manibus trahit ci-
 bum & potum per stomachum 4. vs. part. 8. o Durior & densior, quam intestino-
 rum, quia ad patiendi difficultatem est comparata, cum duras, magnas & asperas
 moles sæpe deglutiamus, à quibus facile particule abraderentur, rarior etiam &
 mollior sit paulatim vsque ad fundum ventriculi, ita vt mollior sit, quam in ore,
 4. vs. part. c. 8. p Crusta hac fibras caret, eas tamen refert ex adhasu tunica, sicut ce-
 ra ex adhasu sigilli vestigia in cera relinquuntur: quæ perspicue cernitur, in lingua
 præsertim bubula eaque elixata, Archangelus, habet veluti fibras à centro ad
 circumferentiam, veluti in veluto, non vero rectas, transuersas, obliquas, Fallo-
 pius.

I Nouerūt an-
 tiqui, per pala-
 tum euacuari
 caput & thro-
 racē, sed quod
 & ventriculus
 & corpus totū
 per palatū eua-
 cuetur, non a-
 gnouerunt: nō
 enim possumus
 caput per pa-
 latū euacua-
 re, qñ simul e-
 uacuemus vē-
 triculū, quod
 fit propter di-
 ctam tunicā,
 Fallop. de me-
 dic. purg. c. 20.
 m Gal. & Ve-
 sal. rectas tri-
 buerūt propter
 attractionem:
 at œsophagus
 omnia quæ de-
 uorantur, ad
 illum deduci,
 quare rectas
 nō eguit: nihil
 ominus qua-
 tuor virtutib.
 naturalib. præ-
 ditus est. Col.

chyli portio penetrare, & à venis exfugi possit: hæc crusta ab ipsa membrana, in brutis, vt boue & cane, etiam in hominis semicocto ventriculo separari potest. Sed neutiquam in fundo carnosior ac crassior est, quemadmodum circa vtrumque os; & nonnulli & in sinistro fundi latere in obæsis adipem adnatum asserunt, quem copiosiore diuturniore^r inappetentiam causare volunt.

Vasa obtinet, venas quidem sex à Portæ vena progressas, quarum aliæ à trunco, aliæ à ramo vel Mesenterico, vel Splenico distribuuntur. A trunco Gastrica dextra, [tab. 37. f. 2. a.] quæ ad dextrum orificium: Gastroepiplois dextra [tab. 37. f. 1. & 2. b.] quæ ad ipsius fundi medium mittitur, à ramo Mesenterico profluit. A ramo vero splenico Gastrica minor [tab. 37. f. 2. c.] ad posteriorem eius sedem: Gastrica maior, [tab. 37. f. 1. & 2. f.] à quo Coronaria stomachica, [tab. 37. f. 1. & 2. ddd.] quæ sinistrum orificium coronæ modo cingit: Gastroepiplois sinistra, quæ in ipsius fundi alteram partem mediā disseminatur: & Vas breue [tab. 37. f. 1. & 2. g.] dictum: de quibus in Venæ portæ historia egimus. Harum munus est sanguinem pro nutritione deferre, siquidem eo modo quo in fœtu nutriatur, non autem chylo, ^r quæ ipsum quidem oblectari, quæ imperfecta est nutritio, non autem ali, concedimus. Harum aliquæ etiam, dum chylus in ventriculo conficitur, sensim aliquam portionem (pauca enim ^r sunt, respectu earum quæ ad intestina mittuntur, cum in ventriculo coctio fieri debuerit, intestina vero iam coctum cōtineant, quem quàm citissime distribui conueniebat) exfugunt, ^u & in sanguinem, sic docente Galeno,

¶ Vesalius addens nonnullos rumi-
nantium em-
sis deceptos
cellulis & si-
milibus abun-
dare falso
scripsisse.
¶ Platerus,
addens non
secus ac hu-
mor alius
dulcis illi ad
barens causa
est.

¶ Gal. 3. fac.
nat. & 4. vs
part. ventri-
culus chylo
reficitur &
nutritur. Co-
lumbo nulla
pars corporis
praterquam à
sanguine ali-
tur, quare ve-
narum copia.
Fallopio in

insit exteriores tunica nutriuntur à sanguine, interiores à chylo magis quàm à sanguine, dicant quicquid volunt alij. ¶ Gal. 4. vs. part. 18. u Hipp. de carnib

veni

eno, * antequam ad hepar perueniat, cum hoc illis naturale sit, mutant; forte vt eo ventriculi membranae nutriantur; Vel, si mauis, dicas, hasce venas hylum exsuctum, modo quo & mesaraicae, ad raphices Portae, quae per hepar disseminantur, deferre, tibi in sanguinem commutetur: hinc citissimae vium refectioes ex vino odorato, iusculis, aliisque corroborantibus assumptis; quae non tam cito sequerentur, nisi hepar per eas à ventriculo alimentum exsugeret. Vas vero breue & dictum, quod à Lienis venis in fundum ipsius communiter aliquot ramis fertur, sanguinem acidum in eius fundum, nonnunquam ad os ipsius, ad appetentiam excitandam, quae tamen proprie ab indigentia excitatur, & adstrictione z sua corroborandum desert.

Arterias habet [tab. 37. f. 1. & 2. a. b. d. f.] ab Aortae ramo Cœliaco, quae singulas venas, Gastricam minorem [tab. 37. f. 2. c.] exceptam, comitantur, vitalis roboris gratia, vt suo motu ventilando à putredine defendant, ipsius calorem innatum suo calore & vitali spiritu foueant, recreent & augeant, quo melior fiat concoctio: sed de his ramis, Cœliacae arteriae historiam Lector consulat.

Nervos insignes habet à sexto pari: ad orificia quidem [tab. 37. f. 1. & 2. T. V.] geminos, a à ramis, qui recurrētes cōstituēre & furculos pulmonibus & pericardio largiti sunt, disseminatos, qui membranis fortibus propter eorum a mollitiem, & itineris a longitudinem obducuntur, & se interfecant, vt oblique securitatis causam ferantur; & diaphragma b transeuntes vtrinque bipartito diuiduntur; horum dexter sinistram & anteriorem partem, sinister dextram & posteriorem [t. 37. f. 1. & 2. T. V. X. R.]

V 5

Nicenna, humor melancholicus naturalis facis vinacea amulus sua adstrictione os ventriculi stabilis, Archang. a Gal. 6. vs. part. 6. potissimum 9. vs. part. 11. b Nul- lum tamen diaphragmatiratum largiūtur, vt dissectionū rudibus visum. Vesal.

vena quae per ventrem & intestina ferūtur, in quibus cibi & potus coacervantur, ubi incaluerint, id quod est tenuissimum & humidissimum attrahunt, crassissimum relictum in inferioribus intestinis in stercus abit. x Gal. 4. vs. part. 12. y Gal. 4. vs. part. 15. Vesalius ait huius venam unius quod cum alijs fatebor, at timide, vt si quid lien in ventriculum eructat, vehiculum sint, & succulenti et aliquid, si auersim nunc proloqui ex ventriculo sugere videntur. Vesal. forte & chy-lum exsugunt, & ad lienem deferunt, Plat. z Gal. 5. vs. part. 4. & A-

c Galen. 5. vs.
part. 4. & 9. e.
iusd. 11. & 16.
eiusd. 3.
d Galen. 4. vs.
part. 2.
e Galen. 9. vs.
part. 11.

f Galen. 4. vs.
par. 7. 9. eiusd.
n.

g Gal. 2. tem-
per. 6.

oris ventriculi sedem cingit, quod ita inuoluunt, vt ex folis nervis compositum videatur, à quorum copia exquisitissimus^c sensus ipsi contigit, vt alimenti deficientis sensum, qui ex suctione oritur, excitent, cum ibi sit sedes appetitus, huicque soli^d sensum indigentia^e seu famis animalis natura tribuerit: eam enim partem, potissimum cum vehementer^e esurimus, contrahi sentimus; quam exsuctionis molestiam, si non persentiremus, substantia nostra perpetuo diffluente, innato calido humidum continuo pabulante sine sensu flaccescentes, fame non percepta, sensim extingueremur, cum fames naturalis singulis partibus insita tristem sensum copulatum non habeat, quæ sola assimilatione sedatur. Hi ramis deorsum missis, membranas eius, quæ alias solum membranas forent, nervosas reddunt, cum ad fundum^f vsque disseminentur: hæ vim quoque nutricem fibræ carnosæ ventriculi tribuunt. At à sinistro nervo, ramus secundum elatiorem ventriculi sedem ad pylorum deducitur, quem ubi aliquot furculis implicauit, ad hepatis cauum abit. Ventriculi vero fundum alii duo adeunt, etiam à sexto pari à propaginibus secundum costarum radices deductis: aliquando sinistro lateri nervuli offeruntur, ab iis nervis, qui Lienem accedunt, promanantes. Quare cum tot nervos obtinuerit ventriculus, mirum non est, si percusso & affecto cerebro, ventriculus quoque turbetur, & vomitiones (maxime in Hemicrania) causentur: & ventriculo affecto facultas animalis langueat, melancholica symptomata contingant, sicq; altero patiente, alterum compatiatur. Verum & ad fundum ipsius nonnunquam meatus^g à vesica biliaria fertur, bilem eo deferens, & perpetuas vomitiones causans, quemadmodum Spire familiam esse audiuius, in qua singulo triduo bilem satis copiosam vomunt.

Vfus^h cibum dentibus attritum, & potum in ore
 iteratum per œsophagum recipere: hunc tantisper
 retinere vsque dum ventriculus seipsum contrahat,
 & in ipso contenta complectatur, & orificio utroque
 ætissime clauso, natura sua & facultate ingeni-
 ta, in quoque calore meliorem partem in cremorem al-
 bum, chylum dictum, substantiam talem, quæ san-
 guini gignendo idonea sit, conuertere & concoque-
 re: cum actio ipsiusⁱ propria sit concoctio, sitque
 primæ coctionis^k instrumentum, seu chyloleos Of-
 ficina: cuius calorem ingenitum circumiacentes par-
 tes hepar,^l diaphragma, lien, omentum, colon, co-
 mosa pinguedine cœnosa circumfusum, Cauæ & A-
 rtæ truncus (maxime calor per arteriam Cœlia-
 tem effusus) & adeps Venæ vmbilicali circumie-
 ctus, ingeminant: quare tota ventriculi pars an-
 terior dextrorsum vergens, sub hepate abscondi-
 tur, & quemadmodum à dextris hepar ipsum com-
 plectitur, ita à sinistris lien ipsi adiacet, ut ab his cale-
 fiat; quem confectum laxato pyloro in duodenum
 reorsum protrudit, ut omnibus partibus alimentum
 subministratur.

Quare Aristoteles^m in ventriculum terræ propor-
 tione respondere voluit: quemadmodum enim ter-
 ra plantis, sic ventriculus partibus animalis alimen-
 tum subministrat; & quemadmodum plantarum
 radices terræ innixæ cibum ex ea alliciunt: sic venæ
 anquam radices ex ventriculo, eiusque ductibus in-
 testinis chylum rapiunt, ut eo in sanguinem mu-
 tato, omnium partium naturale ali-
 mentum fiat.

^h Arist. 1. gen.
 18. loc. excre-
 menti alimenti
 utilis.

ⁱ Galen. 5. vs.
 part. 4.
^k Galen. 4. vs.
 part. 8.

^l In hac primæ
 alimenti co-
 ctione ventri-
 culus ita se ha-
 bet ad hepar,
 quemadmodum
 lebes, in quo o-
 lea per descen-
 sum extrahū-
 tur, se habet
 ad ignem illi
 superimpositū.
 Varolus.

^m Lib. 4. part.
 anim. 4.

De

*De musculis & nervis in inferioris ventris
cavitate sitis.*

CAPVT XLVII.

a Vesalio &
Fallop. 6. Co-
lumbo 5.
b Hippocr. &
Galenus.
c Vesalio &
Fallop. 7. Co-
lumb. 6.
d Humeri &
brachij 4. Ve-
sal. Fallop.
Columbo.
e Quintū par
dorsi, Vesalio:
primum par
dorsi Colum-
bo: primū par
lumborum,
Sylvio.
f Femoris 10.
Vesal. Colum-
bo, Fallopio.
g Gal. 9. vs.
part. 11. & 16.
eiusd. 3.
h Gal. 16. vs.
part. 3.
i Gal. de ossib.
11. ossis sacri
& coccygis
paria recen-
set.

REMOTIS partibus enarratis, conspiciuntur
adhuc Musculi, Nerui, & Ossa.

Musculorum paria duo vertebri incumbencia,
quorum primū est femur mouentium sextum, ^a seu
flectentium primum, quos ^{Joal}, ^b & Lumbales vo-
cant. Alterum est femur mouentium septimum, ^c
seu flectentium secundum, seu Iliacus internus, de
quibus in historia musculorum femoris. Ad latera
vtrinque portio musculi latissimi, ^d qui brachium
retro deorsum trahit, obseruatur, cui musculus
Quadratus, ^e qui dorsi primus est, subiacet; in ipsa
vero concauitate, obturator ^f est internus, qui cir-
cumagentium femur secundus est.

Nerui 8 duplices per infimum ventrem ferun-
tur; alij quidem à sexto pari medullæ cerebri pro-
deunt, à quo ad omnia huius ventris viscera ramuli
mittuntur, de quibus sigillatim in cuiuslibet visce-
ris historia dictum fuit: ipsorum tamen productio-
nem & continuationem Thoracis historia exhibe-
bit. Alij vero à Medulla ^h spinali, quatenus in ver-
tebris est lumborum & ossis sacri: quare duplices
sunt, alij lumborum, alij ossis sacri: illorum mo-

do quinque, modo quatuor paria; horum vero
paria ⁱ quinque, de quibus in medullæ
spinalis historia sermo

erit.

De Ossi-

De ossibus inferioris ventris.

CAPVT XLVIII.

De his egit Galenus li'ello de ossibus cap. 10. 11. 12. & 20.
 sic 13. vsu partium 7. ossium vero pubis separationem 6.
 adm. anat. 14. docuit.

OSSA, quæ imum ventrem cum partibus car-
 nosis constituunt, etsi ventrem non vndique
 ambiant, quomodo cæteri duo ventres ab ossibus
 cinguntur, sunt tamen alia parte posteriore, alia
 partibus lateralibus, alia denique parte anteriore.
 Parte posteriore sunt Lumbi, os Sacrum, & os Coc-
 cygis.

Lumbi, qui tertiam spinæ partem constituunt, ^{a Gal. de os-}
 vertebrae ^{fib. 10.} a quinque; [tab. 38. f. 1. 2. b. ad c.] omnium ma-
 ximas & crassissimas habent, quæ per cartilagineas &
 ligamenta crassiora connectuntur, superne quidem
 cum vertebris [tab. 38. f. 2. a. ultimam thoracis vertebram
 proponit.] thoracis, inferne vero ossi sacro [tab. 38. f.
 1. & 2. c.] incumbentes cartilaginis ligamentosæ in-
 teruentu articulantur, ita tamen vt laxior sit lumbo-
 rum, quam dorsi motus, quo facilius ad terram in-
 clinari possimus: quarum prima νεφρίτης à renibus
 dicta; quod ei renes incumbant: vltima, quæ ali-
 quibus ἀσφαλίτης, id est, fulciens & firmans dici-
 tur.

Hæ præter foramina lateraliter transmittēdis nervis
 dicata foraminibus crebris peruiæ sunt: processus ha-
 bent ascendentes [tab. 38. f. 4. 5.] descendentes [tab.
 38. f. 4. N.] transuersos [tabula 38. f. 2. ee. f. 3. 4. & 5.
 H.] cæteris longiores & tenuiores acutos, (spinam
 vocant) [tabula 38. f. 34. & 5. C. D.] reliquis crassio-

res

TABVLA XXXVIII.

Fig. I. Osium infimi ventris anteriorem: Fig. II. posteriorem partem proponit. Fig. III. IV. V. ex quinque lumborum vertebrae vnam, III. anteriorem, IV. posteriorem, V. lateralem faciem exhibet.

FIG. I.





FIG. II.



IV



III



V



res & latiores; vt ijs & ligamenta & muscoli dorsi ne-
stantur.

b Gal. de off.
11. os latum,
vertebra ma-
gna Hip. 2. E-
pid. sect. 4. ut
vult Laur. a-
liis *καρπών-
δυλον*.

c Gal. ex tri-
bus constare
voluit, tria
prima eius of-
sa intelligens.

Os sacrum ^b, quod *ἱερόν*, quia amplum est, & o-
mnium spinæ ossium maximum, & *πλατὺ*, latum
immobile est, & dorsi basim cōstituit: ex sex ^c ossibu
[*ta. 38. fig. & 2. à c. ad d. ta. 39. fig. 6. ab A. ad F.*] tanquan
ex propriis quibusdam vertebris per cartilagines ne-
xis, compositum, quæ in adultis ita conglutinan-
tur & coalescunt, vt vnum os esse videatur, at in
pueris ossa hæc cartilagines intercedunt.

Hoc anterius cauum, læue & æquale, posteri-
us incuruum, & propter ligamenta, ac musculos dorsi
asperum. Processus habet acutos: exiguos, trans-
uersos [*ta. 39. fig. 6. & 7. K.*] obscuros & in cauita-
tem desinentes: & ascendentes primum [*ta. 39. fig.
6. & 7. S.*] os habet, quemadmodum tria superiora
in lateribus sinus [*ta. 39. fig. 7. M.*] habent, vt ipsis I-
lium os articuletur.

Spinas quoque habet [*ta. 39. fig. 7. d d d d.*] deor-
sum spectantes, quæ in quinta & sexta in duas par-
tes diuiduntur, foraminibus donatur [*tab. 39. fig. 6
& 7. ch. i. 2. 3. 4. 5. & 6. foramina pro neruis, & pro me-
dulla, fig. 7. e. f. g. h. i. k.*] & anterius & posterius,
at illa maiora sunt, cum maiores nerui pertransire
debuerint.

d Gal. de offib.
12. alius *ὀρρο-
πύγια*, ὀρρο-
δών.

Os coccygis [*tab. 38. fig. 1. & 2. d. ta. 39. fig. 8. & 9.*
huic ^d subest, quod *κόκυξ*, à figura rostri cucul-
simili dicitur, & Galenus epiphysin appellauit, vt qu-
ossis coccygis nomine, tria inferiora ossa, quæ sacræ
ossi debentur, intellexerit. Hoc tribus vel quatuor
ossibus, [*t. 39. fig. 6. & 8. à G. ad K.*] duabusq; cartilagini-
bus constat: vna vbi ossi sacro [*t. 39. fig. 6. & 7. a*] sed ne-
xu admodū laxo iūgitur, vt retrorsum cedere, quādo
maio-

maiora excrementa excernuntur, & in sessione antro-
rsum, & etiam sponte in suum situm redire pos-
sit: sed in viris introrsum magis, cum rectum intesti-
num ulterius productum sustinere debuerit: in mu-
lieribus propter cervicem vteri extrorsum curva-
tur. Altera vero cartilago ad ipsius mucronem, [t. 39.
f. 3. c. fig. 8. C.] aliquando etiam inter primū & secun-
dum eius os posita est.

Ad latera ^e alia sunt parte inferiore, alia superio-
re: parte inferiore ossa duo [t. 39. f. 12. 13. & 14.] sunt
^f coxæ dicta; vtrunque enim ob cartilagines ex-
siccatas, vnum apparet: at cum infantibus ad septi-
mum vsq; annum, vtrinq; ex tribus ossibus, quæ car-
tilagines intercedunt, composita notentur, idcirco
tria vtrunque dicuntur esse, quorum partes superio-
res, & latiores, quæ cum osse sacro [t. 39. f. 13. A. B. CC.
DD.] committuntur, ossa ^g λαγώνον, ossa Ilium [t. 38. f. 1.
mm. t. 39. f. 13. supra T. ad f.] dicuntur; horum circum-
ferentia semicircularis spina ossis [t. 38. f. 1. & 2. ii. t. 39.
13. H. L. M. N.] Ilij dicitur, quæ inæqualis, vt inde mu-
sculi producantur, vt obliquus ascendens, thoracis
quintus, ^g tibiam flectentium ^h primus, & exten-
dentium ⁱ primus: cuius pars interior, costa dicitur:
totius vero ossis pars exterior, [t. 39. f. 14. ad X.] dor-
sum Ilij, inæqualibus lineis propter femoris tres mu-
sculos, qui nates efformant, donatum. At interior
cava est & lata, vt musculis Iliacis [t. 39. f. 13. K K.] in-
ternis ^k aptam sedem præbeat, & superne propter
quadratum, seu ^l primum dorsi musculum, & infer-
ne propter decimum femoris extuberrat.

Inferiores & exteriores partes, ossa ^m Coxendicis
nominantur, [t. 38. f. 1. mm. t. 39. f. 13. infra T. & f. vsque ad
R. & P.] quibus magnus sinus, quem acetabulum [t.
39. f. 12. & 14. a. b. c.] & ⁿ pyxidem vocant, cæteras ca-
uitates amplitudine & profunditate superans, inest,

^e Gal. de of-
fib. 20.

^f Oribasio
ἀνώνυμον:

sunt qui à
maiore parte

Ilium appel-
lant. Rufo

ἰχθύν, ἢς coxo.

Gal. diss. 12.
1. à sacro

ait, ad mus-
vertebrai ossis

crurii ὀσφυ-
αννεσα, ἢ

quit Hipp.
g Vesal. Fal-

lop. 4. Colum-
bos. Sacro-

lumbus.
h Seu tibia

longissimus.
i Seu mem-

branofus, qui
6. Vesal. Co-

lumb. & Fal-
lopio.

k Vesal. &
Fallop. 7. Co-

lumbo 6.
l Quintus

dorsi, Vesal.
primus dorsi,

Columbo, pri-
mus lumborū,

Syluio
m ἰχθύν Gal.
de offib. 20.

n πρὸς ὑλῃ.

TABVLA XXXIX.

Fig. 6. sacri ossis cum coccyge anterior, fig. 7. posterior
 facies: fig. 8. coccyx viri: fig. 9. coccyx mulieris, fig. 10. &
 11. ossis sacri & coccygis simiæ anterior & posterior fa-
 cies. fig. 12. coxendicis ossis anterior, 13. interior, 14.
 exterior sedes, fig. 15. cartilago ossa pubis
 in viro, 16. in muliere in-
 tercedens.

FIG. VI.

VII.



vt ei femoris caput validissimo nexu copuletur: at ipsius cartilagineus processus [*t. 39. f. 12. & 14. e.*] supercilium dicitur: & in ipsius circumferentia sinus tres, tubera duo [*t. 39. f. 12. 13. T. V.*] processus acutus [*tab. 39. f. 13. & 14. g.*] & appendix [*tab. 39. f. 13. & 14. i.*] crassa notantur; quæ partim ligamentorum, partim musculorum gratiâ facta sunt.

Anteriores denique partes ἡένες, pubis ossa nominantur, [*tab. 38. f. 1. & 2. pp. t. 39. f. 13. & 14. quod est infra R. & Φ.*] quæ in pube media cartilagine [*tab. 39. f. 15. ad 6.*] neſtuntur, & anterius ac superius finum [*t. 39. f. 12. 13.*] habent pro vasorum cruralium descensu: & aspera sunt, propter musculorum rectorum, pyramidalium, & secundi tibiam flectentis exortum: vt anterius quoque propter quintum, & posterius propter decimum femoris musculus extuberat. Verum tenuia ^o sunt, & maximo totius corporis foramine [*tab. 38. f. 1. & 2. qq. & t. 39. f. 12. 13. & 14. q.*] (leuitatis gratiâ) perforata, quod extrinsecus externo & intrinsecus interno obturatore, seu femur circumagente musculo obturatur. Sub quo & processum [*t. 39. f. 12. 13. 14. t.*] habet, vnde penis corpora & aliqui musculi suum exortum habent.

Hæc ossa cum sacro osse iuncta, cavitatem eam, ἡῖ peluim [*t. 38. f. 1. hoc ostendit.*] vocant, efformant, quæ partem intestinorum, vesicæ & vteri continent, & quatenus femoribus imponitur, corpus sustinet.

Tandem inferior venter, superne quoq; aliquouſq; costarum notharum cartilaginibus maxime in lateribus cingitur, cum in eius dextro latere, hepâr: sinistro, lien & ventriculi pars tutelæ gratiâ reponatur. Sed de ossium natura, causis, differentijs & numero in libro nostro de partibus similaribus fuse egimus: de quolibet vero osse plenius in nostra Osteologia, Deo volente, agemus.

Differentia ventris infimi mulieris, à ventre infimo viri, quæ ratione ossium obuenit.

CAPVT XLIX.

CVM mulieris venter infimus, à viri ventre infimo etiam ratione ossium differat, idq; vteri & foetus causa, in quo discrepent, hîc ostendere conuenit. Differunt primo ratione dorſi: siquidem in muliere dorſi pars supra lumbos magis retrorsum flectatur, vt si forte grauida sit, & anterior pars pondere moleſtetur, posteriore quoq; parte moles sustentetur, quo corpus in æquilibrio sit: hinc grauidæ cū incedunt superiora corporis retrorsum inclinant. Dein os^a sacrum in fœminis magis ad exteriora curuatur, cuius connexum dum pariunt, mirabiliter in partu aperiri statuunt, quo os sacrum foràs longius excurrrens, foetui locum ampliorem det: quod ratione cartilaginis ligamentosæ, quæ parte inferna inter vltimam lumborum vertebam & os sacrum, præfertim in mulieribus paruis posita est, fieri posse censent. Tum os Coccygis (non Galeni, sed rectorum) [tab. 29. fig. 9.] per admodum laxum nexum inter se & cum osse sacro neſtitur, vt in mulieribus retrorsum & extrorsum curuetur, vt sic cauitas maior sit, & partui minus obſtet. Quarto Ilium ossa multo ampliora sunt, & ipſorum spina vtrinq; magis in latera educitur, quo grauidæ vterus hisce ossibus tanquam fulcris innitatur, & ijs veluti ephippio insideat, idcirco etiam extrorsum magis excauantur: quæ cum vicinis ossibus maxime sacro osse connectuntur, & in partu non nihil quoq; cedere videntur, quare de hac parte potissimum mulieres cōqueruntur. Quinto, coxendicum³ matrix apertione tali, cuius similem efficere non valet in alia hora, & necessarium est vt separentur quadam iunctura, & sustententur adiutorio Dei excelsi praparente vel disponente eas ad illud: deinde reuertente eas in proximo ad continuationem naturalem, & est operatio illa de fortibus operationibus naturalibus.

a Sacrum aliqui dici existimant, quod os istud fœminis dū pariunt dilatatur, & sic sacram ac magnam hæc operationem edat.

b Hipp. lib. de natu. pueri circa finem: mulieres quæ pariunt, grauissimis torquentur doloribus: hæc vero maxime qua non consueuerunt, & adhuc incipiūt: sed dolores lumbos præcipue & ilia occupant, tunc enim distrahuntur & distrahuntur ab inuicem. Auicenna lib. 3. seu. 21. tra. 1. cap. 2. & quando separatur fœtus, aperitur

dicum ossium partes infimæ in mulierib. etiam longe magis distant. Sexto ossium pubis processus inferiores & interiores extrorsum magis producuntur, quo cavitas infimi ventris, ossibus ilij, coxendicis, pubis & sacri circumscripta amplior sit: Siquidem cum intestino recto & vesica etiam vterum, & quando mulier gravida est quoq; fœtum continent: quare ne loci angustia fœtus exclusio impediatur, tota hæc cavitas pelvis dicta [*tab. 28. fig. 1. eam ostendit.*] latior esse debuit. Tandem ossium pubis connexio in mulieribus cartilagine duplo [*tab. 29. fig. 16.*] crassiore & laxiore quam in viris (haud dubie magni alicuius usus gratia talem in mulieribus natura creavit) breviorēq; connectonis linea fit: quo ob nexū hunc laxū in partu ^c ossa hæc fœtus impetui cedere possint, & in partu laxari (non dearticulari) possint. Vnde cartilago hæc in illis quæ nunquam conceperunt tenuis, sicca & exigua respectu aliarum existit: sed in ijs quæ sæpius enixæ sunt, etsi longo post tempora moriantur, cartilago crassa reperitur: at in his quæ semel aut bis tantum peperere medio modo se habet. Eo modo quo vterum se habere supra ostendimus: in his enim quæ nunquam vterō gestarūt, vteri corpus tenue est, & paruum: in ijs vero quæ pluries enixæ sunt, crassius ad extremum vitæ diem persistit: & in his quæ raro aut semel, mediocris reperitur. Hoc in modo fœtis, in quibus hæc laxatio perquirenda est, secundo conspeximus: Primo quidem Lutetiæ in præsentia omnium Chirurgorum, & Laurentij Souberti anno 1579. in muliere annos circiter viginti quatuor nata, quæ decima à partu die, ob interfe-

c *Ex cōmentarijs Zoar, Rabi, Simeonis Ben, id est, filij Iochaij in primum cap.*

Exodi, verba: haud facile quicquam aliud magis mirandum in tota rerum natura reperias, quam distractionem illam ossis pubis, quæ fit in parturientibus, magno inuamēto natura, seu potius providentia

quadam Dei, cui natura ipsa ministrat. Etenim nulla fieri posset quantumvis validissima vi & nixu, sicuti nec in cornibus cervorum quæ quotannis decidunt, & denovo renascuntur. Hæc Zoar, qui ante mille & quingentos annos vixisse fertur.

perfectum foetum laqueo vitam finiuit: Quæstione enim mota an in partu ossa pubis & ilium, hæc scilicet ab osse sacro, & illa ab inuicem distrahantur nec ne? Dubium hoc pacto solutum fuit, cadaueris alterum femur subleuatum fuit, cute adhuc integra, ibi os pubis eiusdem lateris, supra alterius lateris osse medij pollicis latitudine eminebat: & contra altero femore elato, illud quod prius eminebat, inferius conspiciebatur: quod oculis digitisque omnium verissimum esse, deprehensum fuit. Quam historiam cū Doctoribus præsentibus Seuerinus Pinæus nostri facta mentione, fuse refert. Idem obseruauimus hic Basileæ ante annos duodecim, cum nobilis matronæ Gallæ ventrem, quæ ob secundinas retentas interierat, pluribus astantibus aperiremus. Sed rationes & auctoritates^d quæ adferri possent in huius rei confirmationem, præterimus, cum Pinæus fuse hac de re in sui opusculi anatomici libro secundo egerit, cuius rationes nullus hactenus sufficiēter refutauit, quemadmodum in nostro de formatione foetus opusculo ostensuri sumus. Hæc autem cartilago ossibus pubis interiecta, non solum in muliere, sed etiam viro facillime separatur, si modo cultri dorsum eiusdem aciei crassitie respondeat

d Fernel. 6.
morb. causas
difficiles partus
referens:
uteri, ait, ceruicisq; mala
conformatio,
angustia &
ossis pubis fir-
mior compa-
ctio, compres-
sio seu coar-
ctatio ex vi-

X 4

DE

cinarum partium tumore. Syluius in isagog. anat. cap. 2 in recens foetis aut parturientibus, cartilago pubis ossa connectens, mollior est ac laxior, ut in parua secando, facile separetur. Villichius 1. anat. 23. ossa pubis per Synchondrosin adnexa, quæ in parturientibus nonnihil laxari solet. Platerus in ossibus mulier. in partu, ob nexum laxum, ossa hac foetus impetui nonnihil cedere possunt, non autem dislocari. Idem testatur Rossetus de partu Casareo, Pinaus & alij. Contra vero Columbus lib. 1. cap. 28. ossa hac in partu laxari, atque dehiscere, risu magis quam reprehensione dignum. Laurentius, ilium & pubis ossa in partu dearticulari posse non puto. Ita enim uniuntur, ut nullo impetu diuelli possint: Si aliquantulum dehiscere velis cum Hippocrate, non repugnaba.

FINIS LIBRI I

DE VENTRE, SEV
THORACE MEDIO.

LIBER II.

CVM inferiorem ventrem, qui partes naturales tam ad nutritionem, quam ad procreationem facientes, continet, diligenter libro superiori pertractauerimus; hoc libro medium ventrem seu THORACEM, qui partes vitales continet, perlustrabimus: ad quem collum etiam, tanquam graciliorem eius partem, propter sectionis methodum referemus.

De Thoracis structura eiusq; partibus egit Gal.

6. vs. part. 2. 7. eiusd. 20. & 21. 13. eiusd. 6. &

8. adm. an. 1. Cur autem pectus homini la-
tum, brutis vero arctum 14. vs. part. II. &

Arist. 4. part. animal. 12. nec non hist. anim.

7. & 12.

CAPVT I.

a Vel παρὰ
τὸ θεῶν ὁρᾶν
quod mentem
animam ani-
ma partem
secundā Sioi
eos conclu-
dat, qui τὸ

ἵνα μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ καταστῇ. b Hippocrates lib. de arte. ὥστε, quo iecur con-
cluditur. Plato in Timæo. Arist. 1. hist. 7. ea pars, qua à collo ad pectus pertingit.
sic 4. part. 10. finem thoracis faciunt partes, qua ostium excrementi tum sicci, tum
humidi continent. Egyptij, Ruffus & Pollux. c Vide 6. usu partium 2. d Ga-
lenus 3. adm. an. 1.

parts ea, quæ costis & clauiculis vndiq; circumscribi-
tur & diaphragmate ab infimo ventre separatur, vt
it vitalis facultatis & irascibilis animæ, quæ in corde
ita est, conceptaculum (cuius gratia thorax factus
est) sicque partium ^e spiritalium domicilium, vocif-
que officina: Et hoc in significato Hippocrati ^f χέ-
νης, testudo dicitur. Situs est inter superiorem & in-
feriorem ventrem, quo calorem natium, qui in cor-
de residet, æqualiter omnibus partibus largiatur. Fi-
guræ est capacissimæ, cuius magnitudo ^g ex ambitu,
qui extrinsecus conspicitur, intelligi potest, ex ro-
tunditate oblongæ ouum referentis: Anterior & po-
sterior latior ^h, quam in cæteris animantibus: ante-
rior quidem, vt iusta sit cordi ⁱ & pulmonibus pro vo-
ce & respiratione amplitudo, quo magna spirituum
habeatur copia, cum in eo sanguis spirituosus ex san-
guine & aere elaboretur, & vox ex aere formetur.
Posterior vt commodè decumbat, quemadmodum
brutis inter priores pedes, carinatum est: in pedestri-
bus quidem, propter ^k expeditiorem progressum: at
in volatilibus, propter alarum promptiorem in vo-
latu agitationem: quod si contra ^l factum fuisset, in
hominibus manuum actiones impediret: & in bru-
tis, quo minus artus anteriores rectè thoraci affirma-
rentur, qui soli ambulationi subseruiunt, obstaret.

Substantia eius neq; ^m ossea tota, vt caluaria, alias
motum penitus amisisset, neque carnea tota, vt infe-
rior venter, ne omnia concidant & misceantur, mus-
culi enim pulmoni & cordi inciderent, nemine hos
expellente. Quare vt simul spatium intus esset, & si-
mul totum instrumentum moueretur, musculi ossi-
bus alternatim fuere interpositi. Cum enim cor
princeps viscus in thorace locandum esset, tutiori
munimento indigebat, quare os circumiectum fuit:
at cum cordis calor maximus frigidus aere opus ha-

^e Πνεύματιν
ἔργον, sunt
pulmo, cur &
thorax, & ar-
teriarū genus
duplex, maxi-
ma & aspera
7. admin. an. 1.
1. & 8. eius. 1.
^f De resect.

corpor.
^g Gal. 6. vs.
part. 2. 7. eius.
21. de magni-
tudine vide 13.
vs. part. 6.

^h Arist. 2. hist.
1. idem fere 4.
part. 3. causa
explicatur 4.
part. 10. & a-
pud Gal. 14. vs.
part. 11.


ⁱ Gal. 13. vs.
part. 6.
^k Arist. 4.

part. 10.
^l Gal. 13. vs.
part. 11.
^m Gal. 7. vs.
part. 21.

TABVLÆ hæc I. *exhibet corpus, quale re-*
linquitur, vbi viscera omnia ex infimo ventre
remota sunt, quod in posteriora reclinatum, quo
Diaphragmatis situs commodius videatur: al-
teram etiam thoracis partem adhuc
tectam exhibet.

LIB. II.

TAB. I.



n Gal. de vs.
respir.

o Hipp. 7. aph.

38. τὴν ἀνω κοί-

λιαν, ventrem

superiorem vo-

cat.

p Arist. 1. hist.

12. thorax par-

te priore & po-

steriore cōstat.

q Sic commu-

niter, vt de in-

ternis affect. 2.

de morb. Hip.

& Arist 2. hi-

sto. 1. ac de ae-

re, aquis & lo-

cis τὴν στήθεα.

in Coacis aph.

272. & 274.

r Galen. 7. vs.

par 22. humor

στὴν εἰς τὴν στήθεα,

inciderit raucedo appellatur.

Hippoc. de flatibus.

Pectus inter lacertos homi-

cateris inter crura priora.

Arist. 4. part. 10.

r Hipp. de nat. oss.

Coacis aph. 2.

dorsum post pectus est.

Arist. 1. hist. 15.

u Hip. de inter. aff.

& in 2. de morb.

beat, quo tanquam flabello conseruetur, thorace mobilem esse oportuit, vt ex eius dilatatione aer pulmones attractus cor refocillet, contractione vero fuligines expellat: quare ex pluribus ossibus conformari debuit, & quo mutui obedirent, cartilaginibus coarticulari debuere. Quare thoraxⁿ musculis mouetur, & ossibus dearticulatur, recteq; & ratione situs & ratione substantiæ situs medius venter^o dicitur.

Diuiditur p in partem anteriorem, quæ ἡ στήθος ἔμπροσθεν^r pectus^f dicitur: laterales, quæ πλευραὶ laterales & posteriorem, quæ ὡστωνⁿ μετασφρενον seu dorsum nominatur: sed hæc plenius lib 1. qui est de partibus externis, cap. 10. explicauimus.

Huius partes aliæ sunt continentes, aliæ contentæ: Continentes vel sunt communes, cuticula, cutis, pinguedo, panniculus carnosus, & musculorum membrana. Vel propriæ; hæcque vel sunt molles, vel duræ. Molles, aut partes carnosæ, & quidem vel proprie, vt musculi, vel improprie, vt corpora mammarum, quæ ratione sexus differunt, aut membranosa, vt pleura & mediastinum. Duræ deniq; vel ossa, vel cartilagines: de quibus primum, dein de contentis, secundum sectionis methodum agemus.

De cute, pinguedine, panniculo carnosio & vasculis cutaneis thoracis & colli.

CAPVT II.

CVM de continentibus communibus superius dictum fuerit libro, hic solum in quo rationes partium differant, ostendemus. Cuticula & cutis

Thoracis ab infimi ventris cuticula & cute in eo differt, quod sub axillis pilosa sit, qui pili subalares & grandebalæ^a dicuntur, quorum vsus; ne partes illæ, citissime^b & maxime sudât (cum hîc cordis sint nuntioria hucque eiusdem excrementa fecernantur) à frequentioribus & valentioribus, brachij motibus atterantur. Sic in multis, pectoris anterior pars odomine pilosior est: & quemadmodum in infiore ventre vmbilicus est, sic in thorace papillæ duæ utroq; sexu perforatæ, ut in mammillis dicturi sumus, existunt.

Pinguedo non ita copiosa, ut in ventre (exceptis mammillis) reperitur, ne thoracem pondere grauior respirationem impediat.

Panniculus carnosus ad axillas progrediens carosior redditur in canibus & simiis, in anteriore ventris colli parte fibris suis musculo lato ita connascitur, ut ex eo nasci videatur, eiusq; nomine rubet, & veluti carnosus fit. Inter hunc & cutim vasa quoq; feruntur: venæ cutaneæ, aliæ per colli latera & caput à duabus iugularibus externis distribuuntur, quæ suis surculis anteriorem colli partem perreptant: aliæ à parte posteriore à ramo, quem humeraria vena sursum mittit: aliæ per thoracis anteriora, duæ scilicet ab Axillaribus prodeuntes, quarum altera Axillaris rari, altera humerariæ propago est, disseminantur: quemadmodum per dorsum ab iisdem ramis exiguae tantum feruntur. Arteriæ, quæ eo mittuntur, exigue modum sunt. Nerui denique à nervis subiectis ad musculos transmissis sursum in cutim disseminantur: duo tamen insignes circa papillas occurrunt, qui earum adeo exquisitum

sensum causant.

à Hadriano
Iunio.
b^a Αποξίωται
satur. Philes:
& quod male
oleant tres ra-
tiones, adfert,
quia locus est
ἀπὸ πύσσεως, ἀ-
κίνητος & ἀνί-
μωτος. Vide
cap. 10 lib. no-
stri de partib.
externis.

De

De mammis virorum.

CAPVT III.

*a Aristot. 4.**part. 10.**b Gal. 7. vs.**part. 22.**c De gland.**mulieres lac**habent, viri**minime.**d In maribus**ait. hist. 12. et.**iam lac fieri**posse, quibus**caro spissa, mu-**lieribus fungo-**sa & forami-**nulenta: testa-**tur quoq; Al-**berius & Au-**cenna. Carda-**nus de subtilit.**rerum asserit se**vidisse virum**34 annorū, ex**cuius māmīs**tantum lactis**profluxit, ut**infantē fere a-**lere potuisset.**Narrant, qui**nouum orbem**lustrarunt, vi-**ros pene omnes**maximā lactis**copiā habere.**e Arist. 4. part.**10. Gal. 7. vs.**part. 22.*

MAMMÆ viris in pectoris medio, quod spa-
^a laxitas permittat, & ea pars carnosā sit, p-
 mo brachij musculo, qui pectoralis nominatur, i-
 nixæ: duæ sunt, quoniam ^a partes duæ sunt, dextra
 sinistra, quæ non ^b attolluntur, vt in scēminis, cu-
 glandulas vix habeant, cum lac, etiam Hippocr-
^c momente procreare non debeant, humorem tai-
 lacti similem in iis generari non negamus (qu-
 Aristoteles lac ^d vocauit) sed ad alendum ineptu-
 dicimus, qualem in duobus copiosiore succo ref-
 tis obseruauimus. Componuntur ergo ex cute, p-
 guedine & papillis, quare imperfectæ, quas cutis cu-
 pinguedine, quæ circa papillas copiosior, quam
 bi fere in pectore, in obesis prominentes & eti-
 sparsim dependentes efficiunt. Papillæ in haru-
 medio extuberant, substantia nonnihil fungosa, c-
 etiam perforatæ, vt ex earum compressione humi-
 tas aliquando exfudet. Venas arterias & neruos
 bent, ad nutritionem vitam & sensum.

Vfus cor ^e tueri, cum operiri sedem cordis con-
 niat: vel etiam ad decus datæ sunt, ne pectus inf-
 me videatur: quemadmodum Papillarum, vt fit
 centrum, in quod neruorum & venarum fines di-
 nant, & in eo velut copulentur: ad titillatione
 quoque plurimum faciunt, vt propter conser-
 sum ex contactu papillarum in mulieri-
 bus nonnihil quoque affi-
 ciantur.

De Mammis Fœminarum.

CAPVT IV.

Mammarum situm varium, & quomodo animalia mammarum ratione inter se differant, ostendit Aristot. 2. hist. 1. & 4. part. 10. Earum substantiam 1. histor. 1. an. 12. quibus animalibus denegatae sint, 2. histor. 13. & cur aues careant 4. part. 11. exposuit. At Galen. de earum situ, causa situs, numero & partibus egit 7. vs. part. 22. & eiusdem 14. cap. 4. deniq; de consensu mammarum cum vtero 14. vs. part. 8.

MAMMÆ communiter Hippocrati ^a *μαζοι*, ^a De natura Aristoteli ^b *μαστοι*, à *μαστειν* ^c, quæro cum in hominis, de illis infantes lac quærant, vel à *μαλὸς* sono fugentium: glandulis, 6. epidem. Galeno ^d *τιτθαῖ* dicuntur. Hæ omnibus, quæ ^e animal generare nequeunt, denegatae sunt: in homine ^b *Vt 1. hist. 12. 2. eiusdem, 1. & 13. 4. part. 10. etiam Galeno.* solo ^f in anteriore thoracis sede, in pectoris medio ^c Polluci vide ^d *Vt 7. vs. par. 22. Hippoc. de mulierib. insi-* locatae sunt, quia locus omnium aptissimus est: Si enim lactis ^e causa extiterunt, ea sede locari conueniebat, vbi facillime simul & citissime lactis copia ^f *gnis mola πτ. 901.* propter cordis viciniam, cui calor infidet, perfecta ^c Aristot. 2. ^d *hist. 13. piscium* elaboratio consistere potest: Et quia eo loci copio- ^e *nulli mammarum:* simum benignum superfluum alimenti colligi potest: verum hic situs ad commodiorem quoq; lactationem facit: Cum enim infans progredi nequeat, à nutrice manibus & vlnis comprehensus mammis necessario applicatur, & Creatoris nostri consilium ^f *Arist. 2. hist. 1.* haud

at Delphin. habet. sed prope genitale. 4. par. 11. Aues māmīs carent. f. Arist. 2. hist. 1. mamma alius in pectore aut iuxta pectus bina tūis papillis in homine: ac Elephantō sub armis dua tam marī, quā fœmina exigua. Vrsā mamma quatuor. Alius māmā inter femora bina & papilla bina ut ouibus alius papilla quatuor ut vaccis: Alius nec in pectore, nec inter femora, sed in ventre, & quidem plures non tamē pares, ut suibus, canibus panthera, quatuor ventre medio: Camelus in ventre māmās duas cum papillis quatuor. Leana etiā duas in ventre. Idē 4. par. 10. Cur non habeant in thorace, causam refert Gal. 7. vs. part. 22. g Gal. 7. vs. part. 22.

haud dubie fuit, hoc mammarum situ homines à brutis discernere, cum bruta sobolem solum nutriant, postea negligant: Homines vero in sobolem ex corde quasi $\epsilon\pi\alpha\rho\eta\tau\epsilon\iota$ transfundant, dum matres ^h liberos & alunt, & amplectuntur, & osculantur, sicq; memoria retinetur, mutuusq; amor fit. At ne mamma ponderosæ deorsum nimium propendeant, cum fœmina recta incedat, pectoris parti osicæ tota basi alligatæ & connexæ sunt. Binæ sunt, cum totum corpus pene in duas partes diuidatur, vt vtero ⁱ, qui quasi bipartitus est, instar boni cuiusdam serui subseruiat: siquidem lac mammis tum accedat, quo tempore fœtus iam plane absolutus est: vtq; gemini vtero exclusi habeant, quo nutriantur: siquidem animalia ^k, quæ plures fœtus edunt, plures etiam mammæ habeant. Quod si vnica fuisset pectoris medic infixa, cum ei pectoris os continuum feret subiectū, difficulter sanguis eo peruenisset, & nō ita commode infans applicari potuisset.

Forma sunt subrotundæ: duriusculæ^l, spatio interposito determinatæ, quæ in virginibus antequam conceptui aptæ sint, imperfectæ, cum præter papillas vix quicquam appareat, at sensim, dum pubescere incipiunt, excrescunt ($\nu\alpha\mu\omicron$; ^m tunc vocant) dura fiunt, & malorum figura (vnde $\mu\eta\lambda\alpha$ Aristophani, semiglobos referunt: & cum ad duos ⁿ digitos extoluntur, tunc menstrua fluere incipiunt. Mulieribus vero, quæ nondum ^o imprægnatæ fuere, contractæ permanent, vtero gerentibus cum vtero ^p augentur dum fœtus augetur, cum autem perfecti fuerint, & pariendi tempus institerit, simul cum vtero, quantum satis est, intumescunt, siquidem inter vtrumq; ^q per vasa consensus sit, quod etiam apparet, cum fœtus in vtero vel laborat (si enim imbecillis sit

mamma

b Quare mamma cū vtero consensum habeant 14 vs part. 8. ostenditur.

^h Plutach. lib. de amore pro-
lis. Addit Colum-
bus etiam ob venustatem
in pectore mā-
mas esse.

ⁱ Gal. 14. vs
part. 4. vide
Hippoc. 5. aph.
38. Mulieri ge-
minos in vtero
gerenti, si mā-
ma altera gra-
uilescit, alterū
abortit: & si
dextra graui-
lescat, matrem,
si sinistra, fœ-
minam.

^k Gal. 7. vs.
part. 22.
^l Aristot. 4.
part. 10.
^m Ruffo, Pol-
luci, Eusta-
chius, Fabæ:
hinc Festo &
Plauto sororia
re in pueris fra-
terculare di-
cuntur.

ⁿ Arist. 1. gen.
anim. 20. & 7.
histor. an. 1.
^o Gal 6. locor.
affect. 6.

^p Gal. 14. vs.
part. 4.

nammæ ante tempus lacte implentur) vel intereat, Hippocrate ^r monente: nec mirum, cum vteri sit fœ-
 nen recipere & fœtum perficere, mammarum, quod
 am natum est educare: & cum fœtus ^r mouetur attol-
 untur, & papillæ turgescunt: & quæ maior est, ea
 parte fœtus exiit. Pinguibus autem magis turgent
 & quibusdam propter insignem molem dependent,
 aliis à parte infantulos lactantibus vastissimæ red-
 duntur, & tales permanent, donec infantem ablecta-
 rint. In vetulis aliquando oblongæ redduntur, &
 flaccescentes ppendent, ita vt in extremo senio glâ-
 dulis cum pinguedine absumptis, tantum cutis cum
 papillis remaneat, aliquando in iisdem sursum atri-
 ctæ conuoluuntur.

Partes mammas constituentes, aliæ externæ, aliæ
 internæ: extrinsecus enim cuticula & cute inuestiū-
 tur, in medio papilla est, de qua postea. Internæ sunt
 membrana seu panniculus carnosus dictus, vasa, sub-
 stantia ^v glandulosa & pinguedo.

Membrana substantiam ipsarum grandulosam ac
 pinguedinem succingit, & musculis substratis necit
 fibris per ipsarum substantiam missis: inter quâ & cu-
 tim vasa, glandulæ & pinguedo disseminantur.

Vasa [*t. 25. lib. 1. a. 2.*] venæ sunt duplices, externæ
 cutaneæ ab Axillari & humerariæ ramo pronatæ, quæ
 sæpe liuidæ apparent, potissimū in grauidis & lactan-
 tibus, quæ in cutem pectoris ad mammillas distribu-
 untur. Internæ circa radicē ipsarum, quæ non à trun-
 co cauæ ad diaphragma oriuntur, sed vbi caua prius
 sursum ad cor ascēdit, & ad clauiculas pertingit, duos
 ramos, comitibus duabus arteriis, infra per totū pe-
 ctus deducit, & binæ venæ mammillis inferūtur, quæ
 idcirco longo itinere feruntur, quo in iis sanguis sit
 plurimū percoctus: dū enim sursum fertur, per cor i-
 ter facit, & rursus descendens à motu thoracis agi-

Y tatur

*r Mulieri in v-
 tero habenti, s
 lac fluxerit ex
 mammis co-
 piosum, fœtus
 redditur imbe-
 cillus: s. aph.
 52. Mulieri in
 vtero habenti,
 si mamma gra-
 ciles sunt re-
 pente abortiet.
 s. aph 37. Ra-
 tiones vide a-
 pud Galen. 14.
 vs part. 8.
 Hippoc. de
 nat. pueri.
 Hipp. de sta-
 perfect. mulier
 nosse debet, v-
 tra mammarū
 maior sit, ea
 enim parte fœ-
 tus existit.
 u Sic nominat
 Gal 7. vs. par-
 tium.*

tatur & incallescit, quæ ad perfectam coctionē ipsi cōferunt, & hæc mammariæ venæ & arteriæ dicuntur.

Mammaria ergo descendens communiter vna vtrinq; [t. 6. EE. t. 7. LL.] à trunco Subclaviæ venæ [t. 7. II] enata, sub osse pectoris penes costarum cartilagineas defertur, & thoracem egressa sub ^x rectis musculis Abdominis circa umbilicum [t. 7. M.] cum epigastrica [t. 7. Γ.] vena (quæ originem habet ab eodē ramo, à quo & illæ, quæ ad vterum eiusq; cervicem propagantur) quæ sub rectis musculis sursum fertur aliquot furculis *συναρσινωδῶς*. At à mammaria inter quartam ^y & quintam costam, nunc altius, nunc declivius propagine exteriori emittuntur per spatia media cartilaginū, quæ costas sterni iungunt, in viris quidē ad anteriores musculos nutriendos: In fœminis vero (in quibus aliquando etiā ipsum pectoris os, sternū dictū, perforat) [t. 2. f. 8.] & ad hos, & ad mammarū glandulas, ut lactis materiā in lactantibus deferant, & ut māmillas nutriant, cū per eas infiniti venarū plexus ferantur, quibus facultas lac generandi insita est. Per hæc ergo vasa fit cōsensus vtero ^z cū mammis (& quidē tanta sympathia, ut contrectatæ libidinē excitent) cū per hæc vasa coniungi necesse fuerit, ut quādo fœtus in vtero augetur illi soli venæ cōmunes ex vtriusq; alimentū effundat: & quādo natus fuerit cessante illa attractione sanguinis, quæ à fœtu in vtero existēte fiebat, māmæ versus totus sanguis excedēs affluat, & māmæ ^a tanq̃ cucurbitulæ, quasi ab altero atrahunt & reuellunt. Nā & Hippoc. docente, ab vtero accedit ad mammæ lac, q̃ post partū infanti cessurum est in alimentum, & ubi ^b peperit mulier, principio motus iam facti, si lactauerit, lac ad mammæ fertur. Verum non solum sponte affluit, sed copiosior sanguis à mammis, quā earū nutritio requirit trahitur, quæ tractio causatur ab infantis suctu, à

^x In nonnullis mulierib. Columbus.

^y Inter tertiā & quartam, Varolius.

^z Gal. 14. vs. part. 8.

^a Lib. de gland.

^b Hippoc. de nat. pueri.

vaso-

vasorū amplitudine, à motu mammarū, à fuga vacui, cum exhaustæ venæ à suctione, vndiq; sanguinē trahant: hinc non eodem tempore recte mulieri menstrua fluere, & simul lactare potest, quare etiam lac menstruo germanum esse Hippocrates dixit. Verum non tam ratione huius consensus vasorum ad mammas sanguis fertur, quā quod cessante motu sanguis à toto corpore ad vterum, corpus totū ad mammarum glandulas sese exonerat, quare earum substantia spongiarum instar rarissima est, vt copiosorem humorem capiant.

Arteriæ quoq; sunt mammarię internæ à trunco superiore arteriæ magnæ [t. 12. f. 1. LL.] enatæ, quæ venas comitatur, & cū epigastricarū ascendentiū propaginib. [t. 12. f. 1. VV. coniunctio vero ee.] aliquot iunguntur. Nervos habet à thoracis nervis, qui partim percutim, partim ad papillam feruntur, crassior tamen nervus ex quinto thoracis nervo papillam adit, exquisitumque sensum communicat, & titillationem causat. Glandulæ (quas^d mammas seu mammillas vocant, seu rectius glandulosa corpora) quæ māmārum [t. 25. lib. 1. § §.] corpus constituunt, totius corporis maximæ sunt, candidæ, quæ non vt in plerisq; animalibus vnum corpus efficiunt, sed plures sunt & distincte, quæ spongiosæ sunt & raræ, vt^f alimentum ad se trahant, & in lac^g vertant: quarum vna maior sub papilla sita, quam reliquæ^h parvæ thoracis musculis adherentes ambiunt, quibus vasa infinita variis anfractibus donata intertexuntur, quo sanguinem prius in venis & arteriisⁱ confectū, quē māmā receperunt, in his anfractibus per glandulosa corpora in lac, quod utilis alimenti est superfluum, conuertant, Hæ in virginibus duræ: in grauidis, potissimum

Y 2

lactan-

c De arteriis
dubitat Vesalius: assunt
Columbus &
Fallopius, quā
plurimas ve-
nas & arterias
dicit Laurent.

d Hippocrat.
de glandul.
Glandula in
pecteribus
mammas vo-
cantur & at-
tolluntur &
lac faciunt:
& mulieres
lac habent,
viri minime.
e Vt sangui-
nem rubrum
in lac album
vertere facil-
lime possint
Columbo &
Platero.

f Hipp de prisca Medic. g Hippocrat de glandul. h Amygdalis à cortice li-
beratis similis Laurent. i Galen. 7. vñ partium 22.

lactantibus, cum lacte turgeant, magis tument: effœtis flaccescunt & absumuntur. Quibus pinguedo circumfunditur, vt & vasorum & glandularum calorem foueat, mammaeq; æquales reddat.

At quo in mammis genitum lac efferri possit, māmā antrorsum angustantur, & ne sponte effluat, sed infans suctione eliciat, foramina angustissima ipsis impressa, quæ cum lac exprimitur, maxime in mammarum lactantium vlceribus conspiciuntur. Quo vero infans, cum māmā apprehendere non possit, lac exfugere queat, papilla^k tanquā māmæ canalisprominet, quam labiis comprehendit, & lac per ipsius foramen emulget: & ne ex ore labatur, rugosa facta est, reliquaque cute magis aspera. Hæc *ἡ δὲ τὸ* *ῥα λείναι* Platoni^m, quod faciat *τιθιλέναι*, & papilla, quodⁿ papularum sit similis, dicitur. Substantia est fungosa ipsius penis substantiæ non nihil similis, vnde ex contactu & suctione erigi & rursus flaccescere potest. Hæc in virginibus leuiter prominet, & fragæ instar inæqualis rubet, in lactantibus ex infantis suctione magis prominet & liuet: In effœtis oblonga nigricat. Huic circulus circumiicitur, qui Areola dicitur, *ἡ δὲ* Hippocrati, qui in virginibus pallet: in grauidis & lactantibus, fuscus: in vetulis, niger est, cutisque magis rugosa est, ex vteri vero affectione croceus fit, aut etiam niger. Et Hippocrates^o ex papillarum colore, vteri affectus cognosci censuit: si enim id, quod in iis rubet, palle scat, vterum ægrotare significat.

Vfus mammarum proprius, vt cibum p suis parvulis recondant: vel vt in iis tamdiu lac generetur, quam diu infans ad sui nutritionem eo opus habet, nā cum assuetus fuerit in vtero sanguine à matre per vmbilicales venas transmissio nutriri, non ita cito ad nutrimentum solitum transire potuit, non enim

con-

^k Papillarum
diff. rētias ex-
plicat Arist.

2. hist. 1.

1 Hipp. Arist.

2 hist. 1.

m in Cratyl.

n Paulo apud

Festum.

^o Si mamma
rum papilla, et
quod in iis ru-
bet, palle scat,
morbo sum est
ἀργεῖον con-
ceptaculum. 6.

epid. sect. 5.

p Arist. 4.

part. 10.

conficere potuisset, cum recens & natus tener adhuc atque imbecillus sit, & mutationes repentinæ periculosa sint, quare nutrimento illi opus fuit, quod à natura sanguinis parum recederet, & quo facile nutritiretur, liquidum, dulce & amicum esset: tale autem lac est, quod in māmīs conficitur, quemadmodū etiā in adultis alimenta in ventriculo in cremorē seu chylum lacti similē vertuntur. Quare primus māmārum vsus ex Galeni sententia, est lactis generatio. Secundarius & rationē situs, vt cordis^r quoddā sint propugnaculum & tegumentū, vt quæ ab eo calefactæ fuerent, ipsum recalefaciant, quemadmodum tegumenta, quæ nobis ipsis iniicimus, potissimū^r in mulieribus, cū in magnam molem extuberent, in quibus etiam, cum viris frigidiores sint, subiecta ad hypochondria viscera calidiora redduntur, addunt quidam & ad ornatum, & ad viri delicias facere.^f

Hipp. lib. de gland. ut excrementitium humorem excipiant. Quod si, ait Hipp. aliquis morbus, aut alius euentus mulieribus mammas demat, vox ipsarum redditur asperior, sputa trices euadunt, & capitis dolore vexantur.

Gal. 14. v. part. 4. in aribus natura non uampullos educendi rationem excogitauit, cum iis propter corporis siccitatem humor superfluo subministrari non poterat.

Gal. 7. vs. par. 22.

De musculis mediū ventris.

CAPVT V.

MVSCULI medium ventrem occupantes, qui & thoracem parte anteriore & lateralibus, & parte posteriore dorsum integūt duplices sunt, vel enim costis accumbunt, eisq; adnascuntur, vel ipsis intertextuntur: non tamen omnes^a motus ipsius gratia creati sunt. Illi enim, quamuis à thorace ortū ducāt, attamen vel alias partes mouēt, vt brachiū, scapulas, vel dorsum, hiq; sub illis siti sunt, vel thoracē mouēt & proprii thoracis musculi dicuntur, hiq; vel exteriori, vel interiori locati sunt, qui exteriori vel anteriori, vel posteriori parti insident. Parte anteriore ytrinque tres sunt.

a Gal. 8. ad. min. an. 5.

- b Ves. Colum.* I. Pectoralis ^b seu primus brachij musculus, qui la-
et Fal. primus. tus & amplus sub mammillis situs est.
c Vel. Col. & Fal. ceruicis II. Serratus maior ^c, seu thoracis secundus, qui co-
primus, at Syl. stis instratus, iisq; digitatim insertus, potissimum la-
scapula anterior tus occupat.
sum mouet. III. Serratus minor ^d vel scapulæ primus, qui trian-
d Vel. & Fal. gularis pectorali substernitur.
scapula primus Parte posteriore vtrinq; decem sunt.
at Col. secund. J. Cucullaris ^e seu scapulæ musculi secundi pars
e Ves. Fal. sca- maior.
pula secundus, II Latissimi ^f vel tertij brachij musculi pars, cum to-
Col. primus. tam fere infimi ventris partem posteriorem occupet.
f Ves. Col. Fal. III. Rhomboides ^g vel scapulæ tertius sub cuculla-
brachij quar- ri situs.
tus. IV. Serratus posticus superior, vel thoracis ^h quar-
g Ves. Colum. tus Rhomboidi subiectus.
Fal. scapula V. Serratus posticus inferior, vel thoracis ⁱ quintus,
quartus. qui sub latissimo situs est.
h Ves. Colum. VI. Sacrolumbus seu thoracis sextus. ^k
Fal. tertius. VII. Longissimus musculus, qui dorso ^l secundus est.
i Ves. Fallop. VIII. Semispinatus, seu dorso ^m quartus musculus.
quintus, Col. IX. Splenij seu primi ⁿ capitis sub serrato posti-
quartus. co superiori locati pars inferior.
k Ves. Fallop. X. Complexi seu secundi ^o capitis pars inferior. In-
quartus, Col. terius vnus est triangularis, qui thoracis ^p sextus est,
quintus. & ipsi sterno parte inferiore subiectus, de quibus o-
l Vesal. 6. Col. mnibus suo loco. Qui vero costis intertexti sunt, in-
dorsi 2. Sylu. tercostales dicuntur, de quibus colli partibus enar-
lumborum 2. ratis dicturi sumus.
m Ves. 8. Col. 4
n Vesal. Col.
Fal. secundus.
o Ves. Col. &
Fal. primus.
p Ves. Col. &
Fallop. 6.

De Colli partibus.

CAPVT VI.

^a Lib. 1. hist.
 anim. 12.

^b ἀπὸ τῆς τρα-
 χυτῆρος τῶν
 κεισῶν ὀστέων.

COLLVM à colendo, quod hæc pars ornari con-
 sueuerit, nomen habet ἀχὺν ^a Aristoteli τραχύν-
 λος ^b ab ossium asperitate Galeno ^c dicitur, Pars est
 inter-

^c Lib. 8. vs. part. 1. ubi ostenditur, cuius gratia collum factum sit.

inter thoracem & caput media, thoracis & pulmonū
 d^a gratia creata, oblonga, propter e^c vocis modulatio-
 nem, cum nullum brutum collo carens vocem arti-
 culatam edere possit, rotūda propter corpora, quæ i-
 bi sita sunt. Diuiditur in partem anteriore, postero-
 rem, quæ ceruix p^prie, & laterales, vt plenius lib. I. qui
 de partibus externis est, exposuimus. Possumus eius
 partes dicere continentes & contentas; continentes
 communes, cuticulā, cutim, pinguedinem, pannicu-
 lum carnosum, & membranam muscutorū propriā,
 de quibus supra egimus. Proprias, musculos, & ossa,
 Musculi varij sunt collum seu ceruicem occupantes,
 qui ceruicem mouent, laryngem, os hyodis, linguam,
 eiq; articulatam caput, maxillam inferiorem & sca-
 pulas. Horum alij parte posteriore, alij parte antero-
 re siti sunt, parte posteriore, sunt sequentes, quos, vt
 sibi inuicem incumbunt, recensebimus.

I. Cucullaris seu scapulæ secundi f pars superior ab
 occipitio descendens.

II. Leuator seu scapulæ 3 quartus, qui ad latera
 magis situs est.

III. Splenius seu capitis h primus.

IV. Complexus seu capitis i secundus.

V. Recti maiores, seu capitis par k tertium.

VI. Obliqui superiores, seu capitis par l quintum.

VII. Obliqui inferiores, seu capitis par m sextum.

VIII. Recti minores seu capitis par n quartum, qui
 dorsi musculo secundo subiiciuntur.

IX. Transuersalis seu ceruicis o tertius.

X. Scalenus, qui ad latus est à prima costa ad cerui-
 cem & ceruicis p secundus est.

d Quæ epifces
 quod pulmonē
 non habeant
 colla carent,
 contra, quibus
 animalibus
 palmo est, his
 etiam collum
 adest 3. v. f. a
 part. 1.
 e Muta sunt ea
 animalia, qui-
 bus collū adest
 3. v. f. part. 1.

f Galen. qui in
 duo diuise. &
 Syl. Trapezius
 V. f. Fallop. 2.
 Columb. 1.
 g Vesal. Col.
 Fallop. 3.
 h Primus par
 muscutorum
 capitis Vesal.
 Col. Fal.
 i Secundum
 par Vesal. Col.
 Fallop.
 k Vesal. Col. Fal.
 l Quintum par
 Vesal. Fallop. 3.

Y 4

XI. Spi-

tum, Col.

m Sextum par Vesal. & Fallop. quintum, Columbo.

n Vesal. Columb. & Fallopio.

o Tertium par ceruicis Columb. tertium dorsi Vesalio.

p Secundum ceruicis Columb. 2. dorsi Vesal. thoracis 3. Fallopio.

¶ *Quantum
cervicis Col.
dorsum monē
tium 7. Vesal.*

XI. Spinatus, seu cervicis 9 quartus.

Anterius vero, non enarratis iis, qui maxillæ adnascuntur, & sub mento sunt.

¶ *Ves. Col.
Fallopio.*

I. Quadratus seu platysma myoides, primus buccis & labiis communis.

¶ *Quantū par
Sylvio 1. Ves.
Col. Fallop.*

II. Mastoides, seu capitis 1 septimus à iugulo ad capitis latera.

¶ *Secundū par
Sylvio 4. Vesal.
Fallop.*

III. Sternohyoidei, hyoidis tertium par, qui asperæ arteriæ incumbunt.

¶ *Ves. Fallop.*

IV. Coracohyoidei, hyoidis secundum 1 par ad latera situm.

¶ *Ves. Fallop.*

V. Oesophagiæ seu tertium par 11 communiū laryngis.

¶ *Ves. Fallop.*

VI. Longi duo seu cervicis 11 primi.

¶ *Ves. Fallop.*

Offa subiiciuntur, vertebræ scilicet cervicis, quæ medullam continent.

¶ *Ves. Fallop.*

Contentæ sunt, venæ iugulares externæ & internæ: Arteriæ carotides. Nervi sexti paris & recurrentes, quæ omnia vtrinque; ad latera locantur. Anterius vero, aspera arteria & oesophagus. Sed ad thoracem redeamus.

¶ *Ves. Fallop.*

¶ *Ves. Fallop.*

¶ *Ves. Fallop.*

¶ *Ves. Fallop.*

De musculis intercostalibus.

CAPVT VII.

De his egit Gal. lib. de dissect. muscul. 23. & 7. vs. part. 20.
5. adm. an. 4. & 8. eius. 3.

¶ *Μεσώπλευροι
Εξ interco-
stalia Galeno
de dissect. mus-
cul. 23. 5. ad-
min. an. 4. &
7. vs. par. 21.*

MVSCVLI, qui costis intertexuntur & ossibus alternatim interpositi, eorum interualla^a op-
plent, μεσώπλευροι^b intercostales dicuntur, qui qua-
draginta^c quatuor sunt. Cum enim costarum in-
terualla vtrinque vndecim sint, & in singulis spa-
tijs musculi sint gemini, vtrinque viginti duo erunt
quo

¶ *b Galen. 5. admin. an. 4. 8. eiusdem 2. & 3.*

¶ *c Archang dicit. Gal. de respir. v. 22. tradidisse, cum vndecim sint spatia: alia
68. cum q. 34. statuere.*

uorum alij externi, [tab. 1. yy.] qui vndecim sunt, alij interni totidem numero. Hi carnei sunt, angulati, sed pro interuallorum ratione longi, quorum fibrae ab vna costa ad aliam oblique d^a cōtrariā positio-
ne feruntur, ita vt exteriorum & interiorum fibrae, cum sibi inuicem incumbant, mutuo in modum li-
eræ X. se interfecent. Horum externi siue superio-
res à superiorum costarum partibus e inferioribus, in costarum inferiorum partes superiores feruntur:
hi namq; in parte posteriore à processu transuerso
vertebrarum, quibus costæ adnectuntur, incipiunt,
& fibris oblique antrorsum per totum costarum du-
ctum ad cartilaginum initia feruntur, vbi costæ of-
sæ finiunt, & sterni iunguntur, tendinibus ob loci
angustiam carentibus, nec per cartilaginum inter-
ualla producuntur.

Interni musculi ab inferiorum costarum parte su-
periore, ad superiorum costarum partem inferiorem
contrario, quam Exteriores ductu feruntur: qui non
à processibus vertebrarum incipiunt, sed ab ea parte,
in qua costæ curuantur, & fibris suis ascendentibus
obliquis antrorsum feruntur, & costarum spatia tam
offica^f quam cartilaginea replent, & eandem semper
fibrarū seriem seruantes, ad ipsa sterni ossa feruntur:
ita tamen vt in eo spatio, quod inter cartilagines est,
aliquantulum ad exteriorem illius spatij superficiem
eleuentur, & loca externorum musculorum, cum ij
desint, occupant. Hæc causa est, cur in spatio, quod
est inter cartilagines fibræ diuersæ appareant, ab ijs,
quæ sunt inter ossa costarum. Quod si & has fibras
inter cartilagineas adimas, sub his aliæ diuerso quoq;
situ occurrunt, cum fibræ sint musculi sexti thora-
cis, qui triangularis dicitur.

Y 5

His

musculi uniformes tantū usq; ad cartilagines, tū immutari ordinem & ductum fibra-
rum priori contra: tū fieri. Idem statuit & Vesal. sed in hoc errare ostendit Fallopy.

d Gal. de diff.
musc. 23. vs-
teres nam no-
uerunt fibras
obliquum si-
tum habere;
nec quod bi-
partite sint 7.
vs. part. 20. fi-
bra interna
contrariū ex-
ternis situm
habent. 5.
adm. an. 418.
eiusd 3.
e Galen. diff.
musc. 23. exte-
riores fibrae à
superioribus
in inferiores
procedunt. &
8 adm. an. 3.
Vesal. Colum.
Fall & Arch-
ang. exte-
riores ab inferio-
ribus partib.
costarū in su-
periores desi-
nunt. Laur. ex
superiore par-
te costa exatē
exteriōres in
inferiōre par-
te inferuntur.
f Gal. de diff.
musc. 23. fibras
dicit unifor-
mes usque ad
extremū inter
costas non ha-
at inter inte-
ductum fibra-

B Hinc An-
 tem. i. primi.
 capit. de ana-
 tom. muscul.
 thoracis, de
 capitis harum
 fibrarum mu-
 sculationem di-
 xit, in uno-
 quoque spatio
 inter costas
 integras qua-
 tuor musculos
 contineri. Ve-
 ritatem eos re-
 prehendit sta-
 tuens, tantum
 in sex vera-
 rum costarum
 intervallis,
 quatuor esse,
 in quibus co-
 stis binos du-
 axat nume-
 rari. Colum-
 bus idem sta-
 tuit, qui respi-
 rationis ratio-
 nem solum
 scilicet proprios
 si. & octo
 communes,
 qui abdomi-
 nis sunt, qui
 thoraci quoque
 famulantur:
 verarum co-
 starum sex ef-
 se intervalla,
 notharum autem
 quinque: verin-
 que: in his

His fibris non recte distinctis & nonnulli interco-
 stales musculos sexaginta octo fecerunt, cum reuer-
 quadraginta quatuor sint: alios dicentes musculos
 qui costis intertexti sint, quatenus sunt [t. 3. fig. 1. CC.
 ossæ: alios qui costis interponuntur, dum cartilagi-
 neæ [t. 3. fig. 1. DD.] sunt. Et cum costarum intervalli
 undecim sint, verarum costarum sex, quinque; autem
 notharum: in verarum intervallis singulis quatuor
 esse, duos quidem quatenus ossæ sunt, duos quate-
 nus cartilagineæ, eosque; vel internos vel externos: in
 quolibet autem notharum intervallo duos tantum
 esse, externum unum, internum alterum. Verum &
 hoc notandum, quod, quanto exteriores ulterius ac
 vertebrae oriuntur, tanto citius in anterioribus fini-
 re: sic quanto interiores tardius à flexura costæ inci-
 piunt, tanto tardius ad os pectoris pertingere: cum
 autem oblique positi sint, & se intercussatim disse-
 cent, eleganter Varolus ostendit, & ad pectoris dila-
 tationem ac constrictionem necessario requiri asse-
 rit. Cum enim distantia, quæ est inter unam & alte-
 ram costam debitæ musculorum longitudini, quæ
 ad pectoris dilatationem ac constrictionem requi-
 rebatur, non sufficeret, ideo non rectis, (quod vete-
 res monente Galeno^b non agnouerunt) sed obli-
 quis fibris inter costas dispositi fuere: hoc dilatio-
 ni inferuire illud probat, quod unumquodque long-
 magis secundum fibras obliquas, quam secundum
 rectas distrahitur. Ad constrictionem etiam condu-
 cere patet, cum musculus modo magis, modo minu-
 pro sui magnitudine aut paruitate contrahatur. Qua-
 re si fibras rectas habuissent, breues fuissent & earum
 contractio exigua: nec pectus sufficienter constrin-
 gere potuissent. Et cum omnis musculus secundum
 fibra

duos esse in quolibet intervallo, in illis quatuor. Verum inter Cartilaginei comment-
 ti sunt, cum inter costales interni, & costarum ossæ & cartilaginea spatia impleant

ibrarum ductum trahat, idcirco ne costæ motu ob-
 iquo inuicem iungerentur, musculi intercostales
 duplices (veteribus etiam ^h ignotum) facti, qui si-
 oris contrarijs se mutuo interfecent: cum duobus
 imul ad opposita oblique trahentibus, id quod tra-
 hitur, vnico motu recto moueatur.

Vfus horum musculorum, vt Anatomici pleriq;
 prodidère, thoracem ⁱ constringere & dilatare ⁱ ex-
 teriorum quidem, in expiratione costas adducere, &
 thoracem constringere: interiorum, ad inspiratio-
 nem costas ab inuicem abducere, & thoracis cauita-
 tem ampliore reddere. At cum Galenus ^k interco-
 stales diaphragmati in subsidiũ venire dixerit, qua-
 tenus thoracem intro contrahere possunt, idcirco
 propter costarum motum quidem tributos conce-
 dendum est, sed qualis is motus? Velenim costam
 costæ ^l adducet, vel costam à costa abducet, vel costas
 attollet, vel easdem deprimet. At costam costæ non
 adducit, neque costam à costa abducit, cum talis mo-
 tus ⁱ non obseruetur; nec vllus horum per se tan-
 quam instrumentum voluntarium potest locum in
 quo continetur dilatare, aut costam à costa seiunge-
 re. Nec costas attollere possunt, cum musculi costas
 attollentes extra thoracem siti sint, aliunde exortum
 habeant,

^h Gal. de diff.
 masc. 2.

ⁱ Galenus de
 caus. respirat.
 libr. de motu
 musc. exter-
 nos inspiratio-
 ni, internos
 expiratione
 præesse voluit:
 sic de diff. mu-
 scul. 23. exte-
 riores thora-
 cem dilatare,
 qui in profun-
 do sunt siti, et
 contrahere as-
 serit. Fallo-
 pius hanc po-
 steriorem sen-
 tentiam Ga-
 leni erroneam
 dicit, licet no-
 strorum tem-
 porum Ana-
 tomici in dis-
 sectione vno-

um ostendere conatur. Vesalius voluit interiores non secus ac exteriores genites
 vt costas saltem constringant. Quod Columbus reprehendit; Fallopius probat. Sic
 vit Columbus: quando masculi vel interiores vel exteriores se iunctim & soli agunt,
 dilatant, quando enim prima costa, quam immobilem putauit Vesalius, attollitur
 primo thoracis musculo, costas ordine trahit, intercostalibus exterioribus sursum
 versus extendentibus; contra deorsum interiorum adminiculo, quando vltima co-
 sta ab abdominis obliquo ascendente deorsum trahitur, dilatantur (non vt Vesa-
 lius voluit constringunt.) At cum omnes vna valide mouentur, coarctant: exte-
 riores sursum trahunt, interiores deorsum, & ita trahunt costas simul & valide
 constringunt: qua vis constringendi valida esse debuit. eo quod foras expiramus &
 vociferamur, Laurentius: Externi costas deducentes inspirando aeri dicati: inter-
 ni contrahunt thoracem, & expirationi inserviunt. ^k Lib. 5. vsq. part. 15. ^l Sic &
 Archangelus.

habeant, & proprij thoracis muscoli dicantur. Ergo costas leuiter depriment, quo æqualis sit thoracis depressio seu contractio, quemadmodum æqualis eiusdem dilatatio. Sic ergo quod Galenus voluit diaphragmati adde & sexto thoracis musculo, qui sub sternone est, in subsidium veniunt. Non tamen negamus ad dilatationem quoque facere: sed tantum per accidens, quatenus ligamēti munere funguntur ad costas inter se iungunt, tunc enim costis inferioribus à propriis thoracis musculis deorsum tractis & dilatatis: aut superioribus à propriis musculis eleuatis, reliquæ costæ, quæ mediæ sunt, necessarii sequi debent: & sic spatia media ope intercostalium (siue dicas quatenus muscoli sunt, siue velis, quatenus ligamēta sunt) in violenta inspiratione dilatantur: quod tamen, si proprii muscoli deessent, nequam præstare possent. Possunt quoque & hoc modo media spatia ab intercostalibus dilatari: si vtrinque musculus thoracis primus, Subclavius dictus, qui inter primam costam & clauiculam situs est, & similiter cum intercostalibus obliquas fibras obtinens, costam attrahat; tunc enim consecutione & reliquis sequentes aliquatenus dilatabuntur.

*m Fallopius
& Platerus.*

DE OSSIBVS ET CARTILAGINIBVS MEDIJ VENTRIS.

CAPVT XII.

De ossibus thoracis egit Gal. lib. de ossib.

Cap. 13.

Ossa medij ventris sunt parte quidem anteriore sternoni ad cuius partem superiorem clauicula locata sunt partibus lateralibus, costæ: & parte posteriore, vertebrae habentur.

DE CL.

DE CLAVICVLIS.

De his Galenus 13. vsu partium 10. & 11. egit.

CLAVICVLÆ^a quæ κλειδες^b ex eo quod vniuersum thoracem^b claudant, dicuntur, qui-
us homo simia, sciurus, mus & echinus donantur,
quæ sunt (vtrinqve vna) sub imo collo in pectoris
summo sitæ, & transfuersim. Figura sunt, non rectâ,^c
sed ad iugulum foris conuexâ [tab. 2. fig. 2. H.] intus
vero cauâ: ad scapulam contra, extrinsecus leuiter
cauâ, intus vero conuexâ [tab. 2. fig. 1. 2. 3.] quare in
nomine, cum magis sint planæ, quam in simijs, ob-
longum s. Latinum referunt: cauæ esse debuere, vbi
iugulum spectant parte anteriore, quo vasa, quæ sur-
sum feruntur, vt sunt venæ iugulares & arteriæ caro-
tides non comprimantur, & imprimis propter ner-
uorum propagines, qui à dorsali medulla axillas pe-
tunt. Duplicem autem semicirculum obtinuerunt,
roboris gratiâ: si enim semicirculares tantum fuisset,
cum intus fistulosæ sint & fungosæ, & tenui os-
seâ crustâ tectæ facile fractæ fuissent: hinc sæpe quo-
que franguntur. Et licet longæ sint, crassæ & incur-
uæ, magis tamen in viris incuruantur, quo minus
brachij motum impendant: at in mulieribus [tab. 2.
fig. 4. R.] minus incuruatae sursum eleuantur, quare
minus agiles sunt, vt cum lapides proiciant videre
est: quod in his pulchritudinis causâ factum vide-
tur, ne foueæ, vt in viris, supra pectus conspiciantur.

Verum protuberant & lineis duabus [tab. 2. fig. 1. 3.
fig. 2. 3. F. G.] donantur, vt inde Subclavius muscu-
lus, & pectoralis musculi pars oriri possit: tuberculo
donatur, & ligamentum [tab. 2. fig. 3. circa N. oritur.] ad
anteriorē scapulæ processum educat. Exasperantur
quoq; vtrinq; [t. 2. fig. 1. K. fig. 3. P.] iuxta extrema, vt
inde ligamenta prouideant, & etiam Masteides mu-
sculus,

a Gal. de off.
13. 8. adm. an.
1. alijs Ligula,
vulgo os fur-
cale, cū veluti
furca quadam
ab osse pectoris
diducendo &
sustinendo hu-
mero parata
sint, Columbo
(cui & Ingu-
la) & Arch-
angelo: alijs
furcula supe-
rior.

b Aristoteli
3. hist. 17. vbi
ingale vertic
Ga 2. & lib.
de spiritib. 7.
κλειδες Hipp.
de nat. hom.
& de nat. off.
& lib. de alim.
vbi ostendit,
clavicula fra-
cta & costis
ad alendum
20. dies dari.
c Gal. 3. vs.
part. 11.

d καὶ οἱ δύο ἀρ-
 τικυλὸς habent
 partim quidē
 in medio pe-
 ctore iuncta
 guttur, eaque
 parte articu-
 lum cōmittun-
 tur; partim
 vero ad hu-
 meros, ad sca-
 pulas reclina-
 tos, quae hu-
 meris semper
 adherescunt.
 Hipp. de loc.
 in homine.

e Quibusdam
 ἐκ πόσιον Lau-
 rent.

f Archang-
 gelo.

g Gal. 13. vs.
 part. 10.

h Gal. 13. vs.
 part. 11.

i Archang.

sculus, qui capitis septimus est: at ubi clavicula la-
 est, Delroidi musculo principium, & scapulæ securi-
 do insertionem præbet. Hæ utrinq; scapulas ^d cur-
 sterno per diarthrosin intercedente cartilagine [t. 2.
 fig. 5. S. T.] copiosiore, vinctuosq; humore p̄fusa, in-
 star clauī firmat: vnde forte rectius ^f clauiculi dice-
 rentur, & Celsus Iugula à iungendo, vel quod iugi-
 boum collo alligatis similes sint, nominauit; quæ
 cartilago κατὰ δὲ δὲ dicitur ^e clausura, illiq; non ad-
 nascitur, sed tantum ligamentis articulum ample-
 xantibus detinetur, quo in brachij & scapulæ moti-
 bus aliquantulum cedat. Et quemadmodum capi-
 tulo [t. 2. fig. 1. 2. 3. A.] cartilagine incrustato, dicta ta-
 men cartilagine intercedente iungitur: sic alteri
 oblongiusculo & lato [tab. 2. fig. 1. 2. 3. Q.] quasi ca-
 pite, scapulæ processui superiori interueniente car-
 tilagine [tab. 2. fig. 5. S.] peculiari (os paruum cartila-
 ginosum securitatis gratiâ creatum dixit Galenus
 articulatur.

Vfus est prohibere, ne scapulæ & cum humero in
 pectus cadant: sicq; multi brachij motus impedian-
 tur, quare stabilimento ^h sunt. Etsi ad Thoracis fa-
 bricam nō pertineant, cum bruta thoracem habeāt
 & pene omnia clauiculis careant: hominibus tamē
 datę propter ⁱ manus, quas, vt & brachium totū, pro-
 pter varias actiones plurimum flectere, ex vno late-
 re in aliud mouere oportebat: at ne in his flexioni-
 bus brachium in oppositū latus velut præcipitetur
 & ne brachia, nisi summa cum difficultate in pristi-
 num locum à musculis reduci fursum, & retrorsum
 moueri possint, clauiculæ flexionem inhihent: & ne
 cum volumus aliquid ad posteriora propulsare, sca-
 pula ad anteriora prolabatur: quod tum fit, quando
 humerus luxatus in costas procidit, vel scapula in sta-
 alæ ob effractam clauiculam dependet.

De stern.

De Sterno seu osse Pectoris.

CAPVT - IX.

De Sterno egit Galenus lib. de ossib. 13. 7. vs. part. 21. quomodo autem dissectandum sit, vt pleura recte conspiciatur 7. adm. an. 2. docet.

STERNVM, $\sigma\epsilon\rho\nu\nu\nu$, ^a quod in medio [tab. 2. fig. 9. g. h. ^a Hippoc. de loc. in hom. Galen. 7. vs. part. 21. 7. adm. an. 2. 8. eiusd. 10. 57. 7os Arist. 3. hist. 7. 7. ar. ipsa potius regio sicut appellari debet, Vesalio & Columbo monentibus. Sic dictum, quia ibi sit rō septem & vs. id est, mentis firmitas, quando eo loci cor est, Laurentius. ^b Aristot. 3. hist. 7. ^c Gal. de oss. 13. & os gladiale vocari ait Columb. d Galen. 8. adm an. 1. 7. ^e Peſt consistencia annos unicum est, Fallop. t Galen. 7. vs. part. 21. Gal. de oss. 13 & 8. adm. an. 1. septem essa dicit. Fallopius in catib. & canibus septem dicit esse: in simijs vero non caudari octo semper inuenit, & octauum reliquis omnibus longius, in puerulis post septimum annum ex quatuor, in adultis ex tribus constat. Vesalius: in adultis tria conspici. Columb. complurimum quatuor, minimum tria: in simijs & canibus falsum non est quod Galenus dixit. Archang. qui

Si.] costarum ^b sternatur, cum in hoc costæ copulentur: seu os pectoris, cum anteriore thoracis partem constituat, & subiecta custodiat. Hoc nonnihil onuexum, longum & latum, & quia pugionis vetum [tab. 2. fig. 6. & 7.] manubrium representat, (hominis, non canis sternon) idcirco $\xi\nu\phi\epsilon\epsilon\iota\delta\epsilon\iota$, ^c ensiformæ dicitur. Huius substantia non vt reliquorum ossium, solida est, sed fungosa, rubens, & ex ossibus & artilaginibus componitur. Non autem ex ^d vno osse nisi in senibus, sed pluribus, vt derasis ^d membranis patet, compactum; in modo natis totum cartilagineum est, primo osse excepto: mox octo obseruantur, quæ copiosa cartilagine intercedente distinguuntur, quorum septem, pro septem ^f integrarum costarum cartilaginibus recipiendis facta sunt, quemadmodum octauum pro cartilagine ensiformi, vt ei anquam fundamento adhæreat. Hæc autem septem non exacto coniungi, paucioraque fieri incipiunt, & modo quatuor obseruantur remanente primo [t. 2. fig. 6. a.] quod latius est, secundo & ultimo, reliquis medijs in vnum coalitis. At in adultis ^g tria sunt, licet transuersa distincta, semperque primum & ultimum

^a Hippoc. de loc. in hom. Galen. 7. vs. part. 21. 7. adm. an. 2. 8. eiusd. 10. 57. 7os Arist. 3. hist. 7. 7. ar. ipsa potius regio sicut appellari debet, Vesalio & Columbo monentibus. Sic dictum, quia ibi sit rō septem & vs. id est, mentis firmitas, quando eo loci cor est, Laurentius. ^b Aristot. 3. hist. 7. ^c Gal. de oss. 13. & os gladiale vocari ait Columb. d Galen. 8. adm an. 1. 7.


^e Peſt consistencia annos unicum est, Fallop. t Galen. 7. vs. part. 21. Gal. de oss. 13 & 8. adm. an. 1. septem essa dicit. Fallopius in catib. & canibus septem dicit esse: in simijs vero non caudari octo semper inuenit, & octauum reliquis omnibus longius, in puerulis post septimum annum ex quatuor, in adultis ex tribus constat. Vesalius: in adultis tria conspici. Columb. complurimum quatuor, minimum tria: in simijs & canibus falsum non est quod Galenus dixit. Archang.

TABVLA hæc II. figuris quatuor clavicu-
 lam exhibet, 1. anteriorem. 2. posteriorem. 3. inferiorem
 eius partem. 4. mulieris. 5. cartilagine binas clavicu-
 la articulis interpositas. 6. sterni partem anteriorem. 7.
 eiusdem posteriorem. 8. mulieris sternum. 9. of-
 sium thoracis anterior. 10. posterior
 pars. 11. & 12. costas con-
 fractas.

LIB. II.

TAB. II.

FIG. I.



qui Galenum
sequuntur, de-
cipiuntur, cū
quatuor dun-
taxat reperi-
antur. At Lau-
rentius: dum
Galenus septē
ossa tribuit, nō
ad transuer-
sas diuisiones
respicit, sed
ad eius sinus,
in quos costa-
rum fines car-
tiloginet inse-
runtur.

h Gal. dicit
iungi per sy-
narthrosin
qua coarticu-
lacio in cani-
bus & catis
vera, Fallo-
pius. Columbo
per symphy-
sin, cū nullum ne
obscutū qui-
dem motum
edant, Arch-
angelū per sym-
physin, & qui-
dem per har-
moniam &
synchondro-
sin.

Vesalius.

mum in pueris & adultis idem est, sed medium in
plures partes distinguitur: quare pro ratione ætatis
plura paucioraue existunt, quæ cartilaginibus inter-
iectis ligamenti instar per symphysin^h & synchondro-
sin connectuntur. Etsi enim ad thoracis motum
ope costarum eleuari & deprimi videatur, attamen
nullo motu separatim mouetur. At in canibus ex se-
ptem ossibus per synarthrosin coarticulatis constat.
Horum superius [tab. 2. fig. 6. a. b. c.] cæteris amplius
& crassius est, pugionis nodum, vel pomum latum
(quemadmodum secundum [tab. 2. fig. 6. p. q. r.] ipsius
manubrium gracile) refert planum, tamen & inæ-
quale; superiori sede lunatum [tab. 2. fig. 9. g.] foveam
exhibens, quam nonnulli superiorem furculam, alij
σφυρῶν & iugulum vocant. in medio roboris gratiā
trianguli [tab. 2. fig. 6. a.] modo extuberat, ad quod
prima costa [tab. 2. fig. 6. g.] mediante cartilagine iun-
gitur, quemadmodum secunda, vbi os primum [tab.
2. fig. 6. h.] secundo necitur. Intrinsecus in medio si-
num exsculptum [tab. 2. f. 7. d.] habet, quo asperæ ar-
teriæ descendenti cedat, & vtrinque sinus [tab. 2. f.
6. & 7. e. f.] ad claviculæ capita excipienda. Se-
cundum multos sinus [tab. 2. fig. 6. i. l. m. n.] vtrinque
in lateribus habet, non tamen partibus intervallis di-
stantes, ac si manubrium hoc digitos admitteret ad
cartilagineas costarum 3. 4. 5. & sextæ inscipiendas, &
reliquis duobus angustius est: quod quandoque in
mulieribus ad finem foramine [tab. 2. fig. 8. n.] lato
peruium est. Tertium minus est [tab. 2. fig. 6. & 7. f.]
at secundo, latius: quare Celsus os pectoris vtrin-
que lunatum dixit, in homine intelligas, non ca-
ne; & huic, vbi secundo ossi hæret, costa septimæ
cartilago iungitur: in nonnullis media linea diui-
ditur. Vtrinque leue est, superius tamen exaspera-
tur, vt inde Maltoides, seu septimus capitis muscu-
lus pro-

us prodeat. Cartilagineſ habet (præter duas ſuperiores clauicularum cum ſterno copulationem intercedentes) vnā inter primum [*tab. 2. fig. 6. 7. h.*] & ſecundum os, quæ ligamenti vicem gerit : alteram in fine oblongam, mobilem, triangulam [*tab. 2. fig. 6. & 7. t.*] quæ communiter in mucronem gladij modo exacuitur, vnde etiam *ἐνφοειδὴς* ^k enſiformis & mucronata dicitur : quæ aliquando in fine lata, nonnunquam bifida, vnde furcella quibuſdam; ſæpe rotunda, ^l aliquādo duplex, aliquando etiam propter venas mammarias, quas neruus comitatur, perforata [*tab. 2. f. 8. u.*] eſt. Quæ ſi nimium prematur, vel ^m curuetur introrſum, cum hepar & ventriculū ſubiecta lædat, atrophîa infantes pereunt : in quibus cartilago hæc quaſi oblonga ſæpe tactu deprehenditur; quem affectum mulierculæ cordis cōpreſſionem vocant. Hic & cauitas aduertitur, quæ antiquis *καρδίη*, ⁿ cor, vulgo cordis ſcrobiculus dicitur. At totum pectus etſi in viris magis ſit eleuatū, in mulieribus tamen, propter maiores mammæ, depreſſius eſt.

Vſus ſterni idem qui coſtarum : cartilaginis vero mucronatæ, ſua mollitie diaphragmati & rebus occurrentibus cedendo reſiſtere, & ſubiectas partes tueri : quæ cum intro curuetur, diaphragmatis & oris ^o ventriculi propugnaculum eſt, vt ex nauſea, quæ ex ipſius compreſſione vel fricatione ſequitur; quemadmodum etiam ex dolore, quem vomituri ibi perſentiunt, colligere eſt.

Z 2

De Co-

tem maiori incumbentem habet & Hypogloſſi folia, Laurent. ^m Platerus idem. *ο* Hinc quibuſdam clypeus oris ſtomachi. Galen. 6. vſ. part. 3. propter os ventriculi : & 7. eiſd. 21. certum etiam propugnaculum eſſe oris ventriculi, & partis ſepti, qua illic eſt, iam autem & cordis. Columbus negat tueri os ventriculi. cum id iuxta dorſum ſitum ſit, ſed ſepti, quod eo loci maxime neruoſum. Laurent. ridet aliqui hunc uſum, quia longe ab ore ventriculi diſtat : at in viuētibz non, quemadmodum in mortuis, diſtat.

k Gal. de off. 13 7. vſ. part. 21. 8. adm. an. 1 ſic 6. vſ. par. 3. offis pulvis, extremæ & ὀνδρον ἐνφοειδὴς & 7. adm. an. 2. Arabibus malum punicum ſeu granatum, quod fortasſe ad vſus balauſtij apicis imaginem accedat, Veſal. Columbus hic addit clypealem & giadialē dici: quemadmodum & Archangelus: at Laurentio enſiculata, ſcutiformis. Auicenna & Epiglottalis.

1. Minorē partem

De Costis.

CAPVT X.

De Costis egit Gal. lib. de ossib. 13. 8. admin. an. 1. Arist. 1. hist. animalium 15.

COSTÆ, quæ Græcis πλευραι, quod latera efforment, & σάθαι, quod remotum in modum collocatæ sint: cōmuniter ^a tam in viris quam in mulieribus ^b vtrinq; duodecim ^c sunt [t. 2. fig. 9. & 10. ch. à 1. ad 12.] plures sunt, quo facilius thorax à musculis moueatur: rarissime plures, ^d etsi in facinorosi cuiusdam Anatome publicâ vtrinq; tredecim, ^e primam eamque sinistram perfectam, dextram vero imperfectam obseruauerimus: adhuc rarius ^f pauciores, & illud ob materiæ copiam, hoc vero ob eiusdem inopiam fit.

Diuiduntur in ^g veras seu legitimas, & nothas ^h seu spurias: veræ septem sunt superiores [tab. 2. f. 9. à ch. 1. ad 8.] sic dictæ, quod circulum perficiant, quæ postea, ubi viri est cinctus, & inde fabricatam Euam. At Fallopius secutus Vesalii, in primo ait homine, in altero latere saltem erant undecim costæ, in altero vero 12. quia ex deficiente fabricauit Euam. ^c Hippoc. de nat. oss. Gal. 7. vs. part. 11. de oss. 13. 8. adm. an. 1. At Arist. 1. hist. 13. vtrinq; octona. (Hoc reprehendit Columbus ex aliorum relatis hos dicere ait Vesal. At Fallop. Aristotelem de costis perfectioribus & maioribus locutum esse credit, quasi imperfectas hoc nomine non sit dignatus) & in hominibus gentis Turdulorum septena dicuntur: ait Vesal. Ligures in veterum monumentis εκτεπλωρες fuisse appellatos. In serpentibus vero ex Arist. 2. hist. 17. toride quot dies mensem integrum cōplent, singulis enim tricena. ^d Hæ ita rara sunt, ut inter mille vix unū tali costarum numero inuenias, Gal. 8. adm. an. 1. ^e Archang. ait omnem antiquitatem obseruasse, si costæ naturalem numerum excedant, unam tantum altero in latere, non duas superasse: quando autem vertebrarum dorsi numerus augetur, tum non 12. sed 13. esse. Fallop. in duobus cadaueribus maribus ob adauctum numerum à duabus costulis ita paruis, ut rudimenta costarum potius, quam costæ viderentur, 13. vertebrae reperit. Columbus semel in muliere Pisis 13. obseruauit. ^f Columbus semel Patavij undecim obseruauit: Fallopius nunquā inuenit, sed bis ad summum unam superaddidit & reperit. ^g Dicuntur γνήσιαι, genuina. ^h Νόθαι πλευραι, μιλλθηραι, χορδωδεις, adulteræ & illegitimæ. Cels. ποῦς cartilagini appellari putat, & abdomini inhaerescere.

posterioribus vertebris dorſi [t.2.f.10.S.T.] per diarthroſinⁱ duplici nodo, quo validius inhæreant, altiore ad vertebræ corpus, humiliore vero ad lateralem proceſſum validis ligamentiſ iunguntur: anterieus vero ſterno [t.2.f.9.G.] in leues ipſius ſinus per ſynarthroſin cartilaginibus velut in capitulum deſinētibus articulantur; (at in canibus primæ cartilagini non articulatur, ſed proriſus adnaſcitur) harum duo ſuperiores *ἀρτίſτοτοι*, quaſi retortæ: duæ ſequentes *ſεπταί* ſolidæ; trēs vltimæ *ſεπτίς* *ἰδέε*, pectorales Pollucidicuntur. Nothæ ſunt quinq; inferiores, quæ molliores ſunt, cum pene^k ſint cartilagineæ, quo ab iniurijs^l tutiores ſint tum ipſæ, tum per eas corpora ſubiecta; (hinc partes oſſium prominentiores ex tali eſſe ſubſtantia fatius fuit cū pertuſa cartilago minime comminuatur, aut frangatur) quare quaſi mutile in exquisitam^m cartilaginem finiunt, quæ ſuſum retortæ inter ſe quaſi [tab.2.f.9.FF.] conglutinatæ duodecimā exceptâ, cohærent & verarum cartilaginibus [tab.2.fig.9.ad I.] committuntur: quæ etiam imperfectæ ſunt, quia ſolis vertebris neſtuntur, octava quidem & nona duplici articulo, non tamen valde protuberantibus articulis (quemadmodum & veræ ſeptem, cum ijs maius robur à vertebris, quam à ſterno accedere debeat) vndecima vero ac duodecima ſaltem ſuperiore articulo, quemadmodum ſæpe & prima: at decima, modo duobus, modo ſimplici articulo copulatur. Sternon non attingunt, quo inferior venter ratione ventriculi & vteriⁿ dilatari poſſit. Vndecima quandoque quemadmodum & duodecima cum diaphragmate alligatur. Duodecima quæ inter eas minima eſt, & à quibusdam coſtæ nomen nom mereri credita, cum aliquando Gal.^o vndecimam coſtam vltimam dixerit,

Z 3.

& Hip-

ex quo patet, cur venter oſſe careat. o Gal. s. adm. an. Fallopio monente.

i Galenus s. adm. anatom. 1. per diarthroſin: at 7. adm. an. 7. duplicibus articulis cum unaquaque dorſi vertebra committuntur: verum non omnes duplici modo iunguntur, quare Vesalius Galenum reprehendit. Hippocrates de locis in homine coſta ſeptem partim poſteriorius ad vertebraſ, partim anterieus in pectore inter ſe committuntur.
k Gal s. adm. an. notha appellatur, quæ ad ſternum nō pertingunt, totæ autem cartilagineæ admodum exiſtunt.
l Gal. 7. uſu part. 21.
m Gal. de oſſ. 13. s. adm. an. 1.
n Ariſt. 1. par. 9. 4. eiufd. 10.

p De rese-
ction. corp. ex
costa notha
lien initium
sumit: & de
oss. nat. in re-
nes iuxta spu-
riam costam
radicibus fir-
matur.

q De dissect.
musc. 23.

& Hippocrati $\rho\alpha\lambda\epsilon\upsilon\pi\eta\varsigma\ \nu\acute{o}\theta\eta\varsigma$, nulla ex parte vndeci-
mæ adhæret (quemadmodum & vndecima quan-
doque decimæ cartilaginem non attingit) quo am-
plior relinquatur visceribus inferioris ventris locus:
aliquando q obliquo abdominis musculo connasci-
tur, nonnunquam circumscriptionem proprii mu-
sculi ipsum detrahentis habere conspicitur. Sunt
autem costæ non solum ossæ substantiæ tamen fun-
gosæ [tab. 2. f. ii. R.] sed singulæ etiam suas habent
cartilagines, & parte posteriore, qua suis appendici-
bus vertebra articulantur; & antèr quæ sterno
[tab. 2. f. 9. A. B. costarum cum cartilaginibus coniunctio, C.
D. cartilaginum cum sterno.] committuntur: hæ autem
multo illis maiores & crassiores sunt, cum anterior
thoracis pars & distendatur, & contrahatur: sic no-
tharum cartilagines, quam verarum longiores sunt:
in veris etiam duriores sunt, cum duriori substan-
tiæ, sterno nimirum coniungendæ fuerint: in no-
this molliores, (hinc forsan priuatim $\chi\acute{o}\nu\delta\ \rho\eta\varsigma$, id est,
cartilagines, ipsas nothas costas vocarunt) tenuio-
res & angustiores, ut quæ cum cartilaginibus copu-
lentur: postremæ tamen cartilago, quemadmodum
& primæ breuissima est, illius tamen angusta & acu-
ta, huius vero lata & ampla. At costæ inferiores in
viris ad extremam senectam cartilagosæ existunt:
superiores vero in valde senibus ossescere incipiunt
(ut in simijs & canibus) osseamue ^r cartilaginem
habent: quemadmodum in virginibus post primam
mammarum auctorem in ambitu ossescunt, quo
mammarum ipsis incumbentium molem rectius su-
stineant, ne ijs depressis thoraci sint obstaculo.

Figura semicirculares sunt arcum referentes, quo
thoraci circularem figuram tribuant, ut is validior
sit, & ad plura continenda accommodatior. Lon-
gitudō ^f omnibus non eadem; superiores enim &
infe-

r In minori-
bus animalibus
cartilago,
in maioribus,
si osseam car-
tilaginem di-
xeris, nihil e-
rit peccati, 8.
adm. an. 1.
f Gal. de of-
fib. 13. 8. ad
min. anat. 1.

inferiores breuiores, mediæ longiores & latiores sunt, primâ exceptâ, quæ omnium latissima & breuissima est: Superiores curuæ magis & arctiores, inferiores minus gibbæ: omnes tamen in exortu angustiores & subrotundæ sunt, & quo magis pectus accedunt, tanto latiores fiunt, earumque latior pars *ωλάτη*, palmula, angustior ad spinam *νωπιόν* remulus dicitur: suntque parte superiore, quam inferiore crassiores, quo signo dextræ à sinistris distingui possunt. ^t Sunt quoque extrinsecus potissimum, qua vertebris alligantur, asperæ [tab. 2. f. ii. P.] & inæquales, vt inde ligamenta prodeant, quibus vertebris alligentur, vbi gemino donantur tuberculo, altero, quo [tab. 2. f. ii. L.] vertebræ sinui articuletur, altero, quo transuerso processui [tab. 2. f. ii. M.] iungatur: sic etiam exasperantur [tab. 2. f. ii. Q.] ad recipiendum sacrolumbum ^u musculum thoracis; musculorum item intercostalium exortum vel insertionem. At internæ leues, ne pleura lædatur: in ima tamen cuiusque parte [tab. 2. f. ii. K.] sinum canali similem secundum earum longitudinem ^x habent, vt tria ^x vasa venam, arteriam, & neruum, qui proximus est, suscipiant; ea tamen parte qua vertebris proximæ, quemadmodum & in medijs costis, cum hîc vasa maiora sint, sinus magis conspicui sunt.

Vfus, pectori esse ^y firmamentum ad viscerum tutelam, vtque musculi respirationi dicati implantentur & sustineantur, ne delapsi cordis & pulmonum functiones interpellent: quare vt inspirantibus & expirantibus, nobis etiam dormientibus facilius thorax constrictioni & dilatationi obsequatur, pars ipsarum aliqua cartilaginea esse debuit: quæ cartilagine viscera etiam sibi subiecta tuentur, & abdominis aliquot musculos

^t Leonis crassiores ac prorsus teretes & insignem caruitatem habent. Columb. reprehendit Aristotelem, quod leonis ossa penitus solida dixerit, nec medullam intus contineri, vt sic incredibile horû animalium robur probaret. Verum Arist. 3. hist. 7. & 2. part. 6. dixit admodum exiguum esse medullam, vt carere videantur.

^u Vesal. & Fall. quartus. Col. quintus est thoracis.

^x Gal. 8. ad. an. 3. Vesalius tribus superioribus costis sinus pro vasis denegat.

^y Aristot. 2. part. 9.

sustinent, ne intro collapsi, viscerum inferioris ventris functiones impedian.

De diaphragmate seu septo transuerso.

CAPVT XI.

Gal. 5. vs. part. 15. 7. vs. part. 21. 13. eiusd. 5. & 9. ostendit, cur talis neruorum diaphragmatis sit ortus, 5. ad an. 5. & 8. item 8. adm. an. 1. & 2. & lib. de caus. respir. & 2. de mot. muscul. 9. de ipsius motu agit. Aristoteles 3. part. 10. 1. hist. 17. consulatur.

a Gal. 5. loc.

aff. 4. hoc testatur, qui etiam ad aliorum veterum imitationem phrenas appellauit. Vesalius dicit etiam ἀνωχοιλίαν, & πνευρίδα vocari.

b Gal. 5. vs. part. 15.

c De virginum morbis: διάπνοιας in coactis, à situ.

d Lib. de princip. 1. de morb. Arist. 1. hist. 17. 3. part. 10.

e Hipp. de sacro morbo, phrenes temere ac fortuito nomen sortitum videtur, non reuera nec à natura: non enim video quam vim ad prudentiam & intelligentiam habeat, &c. Cor & septum sentiunt quidem, neutrum tamen prudentia vim habet. f Arist. 3. part. 10. ubi propter vicinitatem attraxerit humorem calidum atq; excrementitium continuo mentē sensumque plane perturbat, quare φρένες appellarunt quasi particeps sit prudentia, g Hipp. 3. de morb. & in Coac. aph. 55. Gal. 5. loc. aff. 4. de hoc egit. h Phrenes locus praeipuus & ad insaniam opportunus. Hipp. de ijs, quae ad virgines. i 3 part. animal. 10. διάζωμα ait, quod nonnulli φρένες vocant (illud Gaza septum transuersum, hoc praecordia & cinctum vertit) & 1. hist. 17. 2. eiusd. 15 & 4. part. 1. Gal. 5. loc. aff. 4. dicit Aristoteli διάζωμα succinctum dici: eidem & ἀείζωμα.

QUOD Diuinus Plato primus διαφράγμα, ἀπὸ τῆ διαφράττειν, quod est distinguere appellauit, siquidem ab ^b alimentis instrumentis spiritus instrumenta separet, dū transuersim corporis nostri truncum in duos [*tab. 1. id ostendet.*] ventres diuidat, id antiquiores, vt & Hippocrates (cui & διάφραξις) ^c φρένες ^d mentem, nominauerunt, non quod prudentia ^e & intelligentia vim habeat, sed propter eius insignem cum cerebro consensum; siquidem eo affecto continuo mens sensusque, quasi ^f particeps sit prudentia, perturbantur, vel eo inflammato mens laeditur, & φρενίτις (sed non vera) seu continuum delirium, & in virginibus quandoq; ^h infania sequitur. Aristoteles ⁱ communiter διάζωμα, id est, cinctum, & Gal.

& Gal. modo ^k diaphragma, modo ^q *σπέρης*, ^l vocarunt: Latini septum ^m transuersum & præcordia ⁿ. Musculus ^o est sexagesimus quintus ^p respirationi inferuiens, qui ab omnibus totius corporis musculis, nobilitate (cum mentem appellarint) situ ^q figura & actione differt: vnicus est & magnus ^r, vtrique lateri communis, tantusque [*tab. 1. hoc declarat*] quanta est imit thoracis capacitas. Situm ^s obtinet in corporis cavitatem transuersum & obliquum [*tab. 1. inspicere a.*] & non nihil deorsum inclinantem, totum illum extremum thoracis ambitum, quem costarum spuriarum cartilagine & sterni infima pars constituunt, qui dum nihil agit, sursum elatus manet, vt in corporib. mortuis videre est, magnamque cavitatem repræsentat vbi vero agit & contrahitur deorsum fertur.

Hic duabus productionibus ^t oblongis [*t. 1. & ta. 3. fig. 2. h. i.*] carnosus ab excarnibus lumborum vertebri, quibus robustissime & longo ductu cohærent, exoritur, cum omnis musculus capite suo alicui rei inniti debeat, & plerumq; à parte immobili oriatur, & in partem immobilem implantetur. Quæ duæ productiones ad magnæ arteriæ latera lumborum musculis [*t. 1. pp.*] adhærentes sensimque latiores redditæ ad vndecimam thoracis vertebra[m] coeuntes circulare[m] musculum constituunt, qui thoraci toti intrinsecus carnosiore ^u sua parte costarum notharum

Z 5

extre-


^r Magnus & robustus *s. v. s. part. 15.* ^s Ad spinam retro hepar, phrenes situm habet, Hipp. de resect. corp. ^t Per duo ligamenta valida imis vertebri iniectum, deorsum expanditur, quæ circiter 22. vertebra desinunt, & admin. an. 1. De huius exortu & Galen. varius & ceteri Anatomici. Alij oriri volūt à spina vertebri, vt Gal. *s. ad. an. 5.* Col. duas partes longiusculas vocat. Plater. duos membraneos processus: Laur. Alij à cartilagine entiformi, Gal. *s. v. s. par. 15. 7. eiusd. 21. & ad. an. 1.* Alij ab omnib. costarū notharum cartilaginibus, Gal. *s. ad. an. 8.* Archang. & ab his & ab vertebra. Aliis finis in medio est, Gal. *s. adm. an. 5.* Columb. Plat. Archang. Laur. Aliis apud in medio, Galen. 13. *usu partium 5.* & Vesalio At Fallopius dicit, duas carneas portiones deorsum ductas, supremis lumborum vertebri ad latera inferi. ^u Aristot. 3. partium 10.

^k Gal. *s. v. s. par. 15. 13. eiusd. s. 5. loc. aff. 4.*
^l De diff. musculi. 23. 4. *v. s. part. 14. 7. eiusd. 21. 13. eiusd. 9.*
^m Celfo.
ⁿ Plinio, quasi sanguinea ob cordis viciniam quodsc: ei prætendatur, Archang. Dissectum, Macrob. *o* In omnibus sanguine præditis est, at in minutis præternuitate non atque spectatur, 2. hist. 15. 4. *part. 1.*
^p Aliis qui inter cartilagineos agnoscunt *89* respirationis est musculi *q* Galen. 13. *usu part. 5. rotunda enim figura, solus obliquus.*

TABVLÆ huius III. *Figura 1. ventrem
medium cute & musculis resectis, sterno remoto
& costis effractis exhibet, quæ ipsius amplitudo,
membrana & pulmo conspiciantur. Fig. 2.
septum transversum exemptum
exhibet.*

LIB. II.

FIG. I.



TAB. III.

FIG. II.



*x Gal. 7. usu
part 21.*

y Hoc caput

est musculi Ga

len. 13. vs part.

1. probat, quia

in hanc parie

nerui inserun

tur, at non in

finem muscu

lorum, sed in i

pforum prin-

cipia nervos

motorios inseri

necesse est. Ve

rum non mirū

finem musculi

esse in medio,

cum musculus

temporalis suū

tendinem totū

habeat per sei

sum fufum,

Archang.

z Aristot. 3.

part. 10. neruo-

sum, ut minus

vaporis exci-

piat: ita etiam

Et ad robur Et

ad pratentum

commodius

est.

a Cum sit ner-

uosior Et ro-

busior, ideo

doloribus mi-

nus opportu

na, Hippoc. de

prisca medic.

b Gal. 13. vs. part. 5.

c Galen. 5. usu part. 15. at Vesal. Et Columbo, orbiculari

Archang. rotunda seu circularis, sed non globosa. d Vesal. Et Plat. e Carnosior

parte costis annectitur, Arist. 3. part. 10. 1. histor. 17.

extremis toti costæ duodecimæ inferiori sterni par
ti, & cartilagini mucronatæ [*tab. 1. u.*] quæ ipsi
^x propugnaculum est, annectitur, & in validissim
tendinem membranofum, neruofumue [*tab. 3. fig. 1.
b. c. d.*] ex neruis & membranis firmissimis conflatur
circa medium ^y definit. Neruofum autem ^z in me
dio esse debuit, partim obscuritatem, quo illæsus va
rios sustineat motus, & dolorib. ^a minus oportuni
sit, partim ne vena caua [*tab. 1. Et t. 3. fig. 2. m.*] & cæso
phagus [*t. 1. Et tab. 3. fig. 2. l.*] quæ per id transeunt, al
eius perpétuo motu constringantur, & sic ciborum
& sanguinis transitus impediatur: quare quomodo
cunque musculus hic agat cum carnosæ fibræ [*tab. 3.
fig. 2. f. g.*] tantum contrahantur, nunquam neruof
pars circa eos ductus constringitur, sed fibris con
tractis, neruosa pars, veluti à centro ad circumferen
tiam distrahitur, & foramina potius aperiuntur. Ve
rum, & abdominis musculis obliquo ascendenti &
transuerso vnitur, & supra pericardio ita arcte copu
latur, vt citra læsionem ab eo separari nequeat.

^b Figura est propemodum [*tab. 3. fig. 2. ostendit*] cir
culari, rotūda, ^c piscem Rhaiam referens, vel reticu
lis ^d, quibus in pilæ parvæ ludo vtimur, quam simil
imus, præsertim si circumferentia non segniter pa
rietibus affusa fuerit, reticuli processibus manubri
um exprimentibus.

Substantia ipsius partim [*tab. 3. fig. 2. f. g.*] carnos
partim neruosa [*tab. 3. fig. 2. a. b. c. d.*] quasi ex duobu
circulis latis componatur, sed vna parte in acutur
angulum [*tab. 3. f. 2. d.*] cessantes, quorum carnosu
^e thoraci vndiquaq; [*vide tab. 1.*] annexus, ipsum ner
uofum, qui in centro est, ambit: ad hunc tanquam a

cen

centrum fibræ plurimæ instar linearum à circumferentia & quasi muscoli principio excurrunt, quas vt recte conspiciere possis, peritonæum à septo separes, quod in porcis citra negotium, in homine vero & in cane non ita facile fieri potest. Membranam † duplicem habet, alteram inferiorem à peritonæo, alteram superiorem à pleura exortam, quibus ad robur succingitur, quamuis & propriam, eamq; tenuem tunicam obtineat, vt ab omnibus aliis partibus propria circumscriptione distinguatur.

† ἀμφιέσται.
 & δύο Gal. 7.
 vs part. 22. s.
 adm. an. 8.

Venas * recipit à venæ cauæ [tab. 1. m. t. 7. A.] trunco ascendente exortas, Phrenicas dictas (nonnuncquam ab Adiposa quoq; ramulos accipit) quas comitantur arteriæ ab arteria magna [t. 1. e.] quæ phrenicæ [venæ t. 1. n. t. 7. C. arteriæ t. 1. 00. t. 12. KK.] dicuntur, quarum illæ sanguinem pro nutritione, hæ spiritum vitalem cum vitali facultate deuehunt, & suo motu ventilandando calorem natium custodiunt. Nerui [t. 3. f. 1. PP.] duo^f ab infimis ceruicis vertebriis prodeuntes ex tribus furculis vtrinque conflatis per thoracis cauum delati (quod ei peculiare, cum aliarum partium, quæ sub clauiculis sunt, nullū à medulla, quæ in colli vertebriis est, recipiat) sublimes à Mediastino (ne lædantur) contorti & stabiliti ad ipsum feruntur, quos à loco s; sublimi manare erat necesse, vt in omnem partem ex æquo actionem extendant: quare per totam ipsius substantiam disseminantur, vt sensum & motum largiantur, vnde multi sensus particeps, eoque læso communiter mors sequitur.

* Arist. 1. hist. 17. veras per se perfectas habet.

f Gal. 13. vsu part. 5. nervos habet à spinæ modulla colli: de caus. resp. spir. duo inter 4. & 5. colli vertebriam, Laur. vtrinq; duo. g Gal. 13. vs. part. 5. & 9. vbi ostendit, cur non à cerebro prodierint, & de caus. respir. h Gal. 5. adm.

Foramina obtinuit^h duo: alterum à dextris [tab. 1. & t. 3. an. 8. foramina duo alterum grande, quæ vertebriis via exhibetur, oesophago & arteria magna. vbi vena simul quadam exigua & nervus duo permeant: reliquum minus, canalem venam transmittit. Vesal. tria 1. vbi arteria, azygos finis & 6. parvi nervus ranscunt. 2. pro vena caua. 3. pro oesophago & nervus. Fallop. tria, 1. pro vena caua: 2. pro oesophago: 3. pro arteria, quod potius fissura. Columb. Hipp.

o G

Et Galenum reprehendit, dum per idem oesophagum et arteriā transire voluerunt, Et Vesalium, qui tria posuit, duo tantum agnoscens, 1. pro vena ascendente. 2. pro oesophago Et nervis.

i Galen. 4. usu part. 14.

k Gal. 5. adm. an. 8.

l Primus, ac maior 5. usu part. 15. 7. eiusdē 21. quare

Gal. tanquam primo inuentor gratias esse agendas ait Auerroes.

m De causis respir. Respirationis est organum, Et 4. us. part. 14.

n Gal. 5. loc. aff. 4.

o Gal. 4. loc. aff. 8. Et eiusdem 4.

p Archang. cui voluntarius motus duplex: alter voluntarius simpliciter, ut progres-

Et t. 3. f. 2. m.] in parte nervosa media ad cavā ventris ex gibbis hepatis ad cor ascensum, alterumⁱ sinist[er] [tab. 1. Et tab. 3. fig. 2. l.] posterius non nihil & maius, ut oesophagum & duos nervos ad ventriculum trahere permittat, quibus tamen proxime & firmissime membranæ connascuntur & ^k circumhærent. At huius exortum inter ipsius productiones [tab. 1. Et 3. fig. 2. h. i.] ad vertebra diuisio [t. 1. Et t. 3. f. 2. K] est semicirculum referens, pro Arteriæ magnæ & venæ^k ἀνω descensu & nervis sexti paris costis attectis, qui sub pleura feruntur, quæ vertebra, cui Aorta instrata amplectitur.

Vsus primarius, qui à Galeno^l inuentus & expressius situ maxime dependet, est, ut sit respirationis inuiolentæ seu liberæ placidæ uenⁿ spirationis organum: quemadmodum violentæ, in qua valida est spiratio, organa sunt musculi sexaginta quatuor, qui circa thoracem sunt, eum exacte dilatantes & constringentes. Fibris namq; equaliter retractis, trahuntur omnes costæ mendosæ, versus thoracis centrum; sicq; extrema thoracis ad vertebra trahunt, & partem inferiorem constingunt: quare attollitur, tenditur & expirationi inseruit: hinc in mortuo perpetuo contractum & tensum apparet, cum expiratione vita cesset, & si thorax inter costas aut diaphragma perforetur, statim flaccidum deorsum concidit & iecur ac ventriculum, quæ prius sursum erant retracta, propendere sinit. At fibris laxatis, decumbunt mendosæ enim costæ laxantur, & infima thoracis, consequenter pulmones dilatantur & inspiratio fit: quare ipso impedito vel affecto, ^o difficilis respiratio sequitur. Hic modus secundum P aliquos ex naturalis & voluntario mixtus est: Voluntarius quidem est, sed non simpliciter, cum motum illum necessitas aliqua urgeat & requirat, ut in respiratione necesse

neces

ecessitas refrigerationis vrget, in deiectione & mitione, excrementa spincteres stimulant. Alter vsus est, hypochondria ventilare, maxime hepar, cum conuexa sui parte arteriis careat, & etiam vapores umidos in inferioris ventris capacitate contentos, & quiescentes putrescant, cuius nomine Hippocrates inferioris ventris respiratorium vocauit.

Tum, monente etiam Galeno excrementorum & fœtus exclusionem promouere, abdominis musculos, vti superiori libro ostensum fuit, adiuvando, ad quod suo situ obliquo confert: superiore enim parte tanquam manibus intestina premit, deorsum propellit, alias fæces æque per superiora ac inferiora deturbarentur. Tandem, vt secundum Platonem irascibilem animam à concupiscibili secernat: Secundum Aristotelem, vt partes naturales à vitalibus, seu ignobiliores à nobilioribus separet, ne vapores ab inferioribus elati cor edant. Plinius subtilitatem mentis tribuit, & hilaritatis sedem constituit, quod titillatio maxime ostendit: si enim cutis circa hypochondria blande tactetur, titillatio sequitur, & hanc celeriter risus: quia inquit Philosophus, motus celeriter ad eum cum peruenit propter cutis tenuitatem, & partem calefacit, & quamuis leuiter calefaciat, tamen aperit: mentem præter voluntatem mouet, quod autem

solus

num non adisset, vapores cor non offenderent, nam per oesophagum progredientur, dein volatilium corda hoc carent. At Archang. obiicit ait: affectus terti, intestinorum communicari cordi, igitur septum cor non defendere à tetrisspirationibus: Responderet Aristotelicus, communicari per venas & arterias. mira Hippocras. 5 aphorism. 39. mulierem fecundam dignosci docet ex sufficit & prudendum factu, & si odor ad os & nervos perueniat, mulierem natura suan esse infecundam. Ad os autem peruenire non potest ex utero, nisi septum petret, Ergo cadit Aristotelis utilitas. Respondet Archangelus: an septum pedis intestinorum expirationes, cum sint crassiores, non vero expirationes ex

stio, deambulatione: alter voluntarius necessitate urgente aut requirente.

q Ab officio διαπνεῖν τῆς καρτὸς καὶ ἀλγῆς: 1. de morb.

mul. 1. Instrumentum excernendi superflua 2. mot. musc 9.

1 Galen. 5. vsu part. 15. & 7. eiusdem 21.

1 Galen 5. loc. affect 4 quem postea Medici secuti sunt, & 5. adm an. 5. & 4. vsu partium 14.

u In 3. part. an. 10.

x Columbus hanc opinionem Aristotelis falsam dicit, nam licet

y In 3. par. 10.
addit, ob hac
in praelis gla-
diatorumque
spectaculis,
mortē cū risu
traiecta pra-
cordia attu-
lisse.

solus y homo titilletur, & cutis tenuitas est, & quoc
solus omnium animalium rideat, est enim titillatio
risus causa per eiusmodi partis motum, quæ aliam
implet.

De membrana Pleura.

C A P V T XII.

Consule Galenum 7. vs. part. 21. 5. adm. an. 8. & 7. eiusdem
2. 5. loc. aff. 2. & 8. eius. 10. item.

a In 7. vs. par.
21. 5. loc. affec.
2. 5. adm. an. 8.
& 7. eius. 2.
b In 7. adm.
an. 2.

PLEURA πλευρά, membrana est à costis, quæ
πλευρὰς vocant, denominata, eo quod iis subten-
datur, quare Galeno^a ὑπεζωχῶς, quod πλευρὰς ὑπέ-
ζωκεν, costas (duodecima excepta) succingat, dici-
tur: & quidem membrana^b ab essentia, tunica ab v-
su nominatur.

Membrana est thoracis cavitatem vniuersam suc-
cingens, quare figura & magnitudine internæ cavi-
tati, quæ semiovalis est respondet. Hæc ex filamentis
spermaticis, & sanguine materno parenchymatis
forma affuso, tanquam principio ex quo, enascitur
siue à menyngibus cerebri, quæ spinalem medullam
dorsi inuestiunt, producit, quæ cum nervis in tho-
racem delatæ, vtrinque eam constituunt: quare ibi
crassius est, dorsi vertebriis firmissime hærens, unde
nisi disrupta separari nequit, cum inde tanquam à
principio vbi, vel à quo, prodeat. Connectitur po-
sterius vertebriis dorsi, quare à ligamentis^c earum e-
nasci dicitur: antè sternum, lateribus membranarum
musculorum intercostalium & costarum periastris;
superius claviculis: inferius basi^d sua, diaphragmati,
& in medio pulmonibus & pericardio.

c A ligamētis
vertebrarum,
lumborū pro-
dit, Ves. Plat.
Thoracis, Fal-
lopio.
d Gal. 5. adm.
an. 8. βᾶσις
vocat.

Substantia peritonæo similis, sed robore & crassi-
tie non nihil id superans: siquidem costarum osscam
duri-

luritiem & pulmonum corpora mollissima interce-
lere debuerit, neq; mollis nimium, neque dura esse
debet: dura, vt viscera vitalia validius defendat:
latis compacta & densa: leuis ne pondere thoracis
notum impediatur: valida ^f tamen & neruosa & diui-
li contumax, quæ sæpe in nonnullis ^g thoracis mor-
bis ita excrescit, vt decuplo solito crassior fiat.

Est vbiq; ^h duplex, partim ob ossium duritiem, ne
terna, quæ adeo sensibilis est, à continuo pulmo-
nis motu lædatur, partim quo inter vtramq; Inter-
costalia vasa tutissime ferantur. Harum altera crassior
est potissimum circa dorsum, vbi à costis tota sepa-
ri potest, & durior est ob continuum pulmonis
notum, cuius superficies interior leuis & veluti hu-
nore oblita: externa inæqualis & aspera. Altera te-
nuior est, & quibusdam costas ⁱ succingens membra-
na dicitur. Inter has duas sæpe materia pleuritica
colligitur (cum vasa inter has ferantur) & non so-
lum inter pleuram & musculos. Ab hac modo in v-
tro ^k, modo in altero latere, præsertim in sinistro,
teruæ quædam fibræ prodeunt, quarum interuen-
tu pulmo pleuræ admodum validæ in homine, secus
quam in canibus, etiam in sanis necitur, & quem-
admodum in peritonæo pinguedinis non nihil con-
spicitur, sic in hac ^k licet raro, pinguedinis aliquid
iuxta dorsi vertebra, vbi vasa maiora sunt, adnasci-
tur. Verum quemadmodum & muscoli intercosta-
les aliorum musculorum instar propriam membra-
nam obtinent: sic & costæ quemadmodum & cæte-
ra ossa, periostio ^l cinguntur.

Aa

Per-

*Vesal. sic appellasse Græcos existimat, tale quid Gal. de constit. art. indicare vi-
etur, morbi lateralis species subdividens: hanc membranam circū ossalem necan-
es, quam costas orbiculatim ambire diximus: etsi Galenus externa tantum sedi
describere videatur, eumq; non unicuique costæ peculiarem: hac ille. ^k Idem ^g
^l Vesal. & Valuerda notarunt. ^l Columbus vtramq; pleuram à periostio distin-
xit. Vesal. pleuram simplicem & alteram periostium facit.*

*c Aranea mo-
do pratenuis 7.
adm. an. 2. at
s. adm. an. 8.
dicit thoracem
succingere mē-
branas natura
simplices tela
aranearū mo-
do: vocari in
costis inter-
costes: ubi re-
ta ad iugulū
perferuntur
diaphaniores
ubi pulmoni
adhaferint.
omniā partē ex-
istere.
f Galen. s. loc.
affect. 2.
g Item ^g
Plater.
h Quia mem-
branas inter-
sepientes con-
stituit, in hoc
à peritonæo dif-
ferens, quod v-
num est 7. ad.
an. 2. Ves. Gal.
reprehendendo
simplicem dicit,
quem Colum.
arguit. Laur.
non simplex,
vt veteres vo-
luerunt.*

Perforatur autem, vbi vasa intra vel extra thoracem mittit, superiore venas iugulares & axillares, arterias carotides & axillares emittit: at oesophagum, asperam arteriam & neruum sexti paris & septi transfueri intromittit, inferne, ad diaphragma pro venæ caue ascensu oesophagi descensu, quemadmodum superiore capite dictum fuit, ad latera, pro vasis intercostalibus

Vasa quæ illi nectuntur, dum ad vicinas partes abeunt ei ramulos largiuntur, quæ à vasis intercostalibus & mammariis promanant frequentes: hinc etiam frequens inflammatio, cum magna tensione & dolore punctorio contingit.

*m Gal. 7. ad-
min. an. 2.*

*n In 7. vs par.
21. & 7. adm.
an 2.*

*o Gal. 1. adm.
an. 8. ἀμφισ-
μα οἱ χιτῶν in-
uolucrum seu
tunicam lar-
gitur.*

*p Galen. 7. vs.
part. 21.*

Vfus ipsius, peritonæi ^m vtilitati similis: quemadmodum enim peritonæum omnibus infimi ventri visceribus & circumtenditur & membranam communem largitur: sic pleura toti ⁿ thoracis interno sinu subtenditur, omnibus ^o spirationis instrumentis quemadmodum, & ^p diaphragmati, & musculis intercostalibus, & vasis communem tunicam tribuit omnia contenta defendit & colligat. Vasis vehiculi quoddam ac veluti stabilimētum largitur: & qua parte costis subtenditur, pulmōni propugnaculi vicem præbet, ne dum respirante animali se dilatat, nudis ossibus incidat, eorumq; duritie offendatur: & ne in motu, pulmo costarum spatiis sese insinuet.

De Mediastino seu intersepiente Membrana.

CAPVT XIII.

De hoc egit Gal. 6. vs. part. 3. 5. adm. an. 8. & 7. eius. 2.

*a Quod thora-
cem mediat
dictum, Co-
lumbo, inter
sepimentum & dissepimentum*

Mediastinum ^a membrana duplex ^b est, dextra altera [*tab. 4. GG. dextra, HH. sinistra sedes*] altera fini

b Gal. 5. adm. an. 8.

sinistra, quæ Galeno ^c ὑμέρες διαφράττερες dicuntur, eo quod thoracis cavitatem, quam pleura succingit, in duas partes diuidant (cum intra ^d thoracem cavitatis, una non sit laxa sibi que continua, sed à dictis membranis intercipiatur) quare in thoracis medio vtrinque singulæ, quæ secundum ipsius ^e longitudinem superne deorsum ad diaphragma feruntur, & à sternum ad vertebrae pertingunt, ita ut thorax, quasi in duos circulos diuidatur, vel si maius triangulum quendam ex inæqualibus & obliquis lateribus constituunt, cum pro pectoris profunditate & longitudine conuenientem amplitudinem habeant.

Oriuntur autem hæ membranæ ^f à pleura, quæ ubi ab exortu vtrinque ad sterni latera conscendit, rursus versus spinam principium suum repit ita, ut à medio pectore ad spinam prorepat. Hæ pleura tenuiores sunt, & molliores, ut cordis motum facilius sequantur, extrinsecus qua pulmones respiciunt, & quibus nonnunquam adnascuntur, læues: & sæpe circa vasa multo adipe refertæ visuntur, ita ut omentis assimilari possint: Intrinsecus propter fibras, quibus membranæ iunguntur, & etiam pericardio, aperiæ, hisque in iugulo thymus, de quo postea, adnascitur. Hic secundum longitudinem vertebrarum dorsi, quibus mediante pleura committuntur, contiguæ sunt, & angustam cavitatem constituunt, ensimque diducuntur, & ad sternum (cui etiam à immo ad cartilaginem mucronatam vtrinque s. coarcent) à se inuicem pro sterni latitudine distant: quod ^h interuallum [tab. 4. LL.] variis filamentis fibrosis & membranis intexitur: omnium tamen maxime à se inuicem distant ad septum transversum, cui committuntur [tab. 3. fig. 1. K.] quanta est nervosa partis latitudo, ita ut hæc cavitatis, quæ laevis &

^c In d. v. p. p. 3. s. adm. anat. tom. 8. 7. eiusdem 2.


^d Gal. 1. adm. an. 8.

^e Gal. 6. v. p. partium 3.

^f Gal. 7. adm. anat. 2.

^g Nisi quantitas ea parte abscindunt & distat, qua cor situm est s. an. ad. 8. ^h V. c. efformantur a coferre pulant, ait L. A. 1. 1. 1.

TABVLA hæc IV. Ventrem medium, anterius, & ad latera cute & musculis denudatum, exhibet : sterno cum costarum cartilaginibus à mediastino liberatis, sursum-
que reflexis.



madida est, antèrius cor pericardio inuolutum, & venam cauam ascendentem contineat: posterius vero œsophagum cum neruis stomachicis, in anteriore cauitate nonnunquam materia colligitur, pleuritidem æmulatur, quam dextro perforato sternò, tuto extrahi posse, Columbus monet. In canibus cauitas hæc capacior est, nullis tamen fibris intertexta.

i Vesal. dicit à

man. mariis.

ab àzvyg & à

cauge Fall. à

mammariis.

Gal. ass. vena.

2. a phrenicis:

Ibidem dicit

constituta A

zygo, alias a

caneorum filo

rum modopra

tenues venu-

las ad media-

stinum & thy

rum mitti.

k Sic Ves. &

Plat. ceteri nò

meminere.

l Instar liga-

mentorum fir-

mitudinem in-

strumentis cò-

ferunt 6. usu

part 3.

m Prima &

maxima uti-

litas 6. usu

part 3.

Venas i habet & arterias exiguas à venis & arteriis mammariis [tab. 4. B. C. D. E.] quæ à iugulo deorsum sub sternò feruntur, à quibus in transitu surculus, [tab. 3. fig. 1. OO. à nasif M.] quemadmodum & à venâ àzvyg obtinent. Insuper in homine venam satis crassam à iugulo recipit, quæ secundum vtriusque membranæ longitudinem cum neruo [tab. 3. figur. 1. Q.] ad septum transuersum descendit, externæ earum parti adnata: nonnunquam etiam à phrenicis ramulos accipit.

Vfus, cor, quatenus pericardium iis iungitur, suspensum tenere, ne suo pondere propendens pro vario corporis situ, vel in latera, vel in pectus, vel in spinam, vel deorsum¹ concidat. Deinde ad vasorum securiorem ductum faciunt, eaq; firmant. Tum partes in thorace contentas complectuntur, ne pulmonibus in motu obsint. Et tandem thoracem in duas^m partes seu cauitates diuidunt, cuius beneficio parte vna læsa, pars altera illæsa conseruatur, vt magno vulnere in alterutram partem accepto, si eius partis respiratio propter pulmonem à motu cessantem, idque propter aerem per foramen ingredientem, altera pars incolumis dimidium saltem actionis retineat: Si enim, vtraq; fuerit perfoffa, vox

& respiratio plane pereunt.

Partes in thorace contentæ.

CAPVT XIV.

CVM in thorace vitalis facultas resideat, in eo etiam instrumenta huic inservientia contineri necesse fuit: horum autem alia vitam & vitalis facultatis actionem, respirationem scilicet & pulsum perficiunt, Cor & arteriæ alia adiuuant, vt Pulmo & Diaphragma: alia sunt, sine quibus actio perfici nequit, vt pericardium, pleura, thorax, quæ cum nutrirî debuerint & sentire. Venas & nervos recepere. At cum dictum sit de partibus continentibus tam communibus quam propriis, nunc de contentis agendum erit. Contentæ partes duplices sunt, Viscera & Vasa. Viscera sunt, cor pericardio intectum, & Pulmo. Vasa, venæ cavæ & arteriæ magnæ rami, in iugulo thymo glandoso corpore suffulti. Nerui duplices, vel à medulla, quæ in vertebriis thoracis continetur, à qua intercostales nerui prodeunt, vel à medulla cerebri in cranio contenta, à qua sextum par nervorum promanat, & ab hac costalis, stomachicus & recurrens tam dexter, quam sinister ortum ducunt. Et tandem Asperæ arteriæ & œsophagi pars.

De Thymo.

CAPVT XV.

Vide Galen. 6. usu partium 4. 7. adm. an. 6. & 9. de diff. ven. & arter. 2. & 9.

THYMVS, Galeno θυμὸν ^a corpus est glandulosum, molle, spongiosum (quare & τὸν ^a *ad δένα* ^b τὸν μέγαν, magnum glandium, imo maximum ^c & mollissimum vocavit) quod in summa thoracis parte iuxta iugulum sterno ^c subiicitur &

^a In 6. usu part. 4. at 7. ^b admin. an. 6. ^c interpres infirmus glandium reddidit: Sic lib. de diff. ven. 2. & 9. glandiū.

Aa 4

diui-

^b Galen. 7. adm. an. 9. ^c Galen. 6. usu partium 4.

d Gal. de diff.
ven. & art.

2. & 9.

c De diff. ven.

2. vult consti

tuta à ζωγία

filorem modo

tenues à cana

mitti.

diuisionibus vasorum, venæ^d cauæ & arteriæ mag
næ, & omnibus ipsorum germinibus, quæ hoc loco
plurimæ^e sunt ad brachia nimirum & scapulas, qu
primum emergunt, securitatis gratia, & ne vena cau
ab ossis attactu lædatur, substernitur: à qua venula
prætenuēs recipit. Id enim naturæ perpetuum est, v
quoties vas sublime diuidit, ibi mediam glandulan
diuisionem ipsam oppleturam interponat. Hæc e
pars est in vitulis, quæ in mensarum delitiis habetur
& à nostris lactes dicuntur.

De Pericardio, seu Cordis inuolucro.

CAPVT XVI.

De hoc Gal. 6. vs. part. 16. 7. adm. an. 3. & 6. egit: Arist. 3.
hist. anim. 13. & 3. part. anim. 11.

a Pericardiū,

siue καρδιον, siue

σπιν, siue σπιν

α, & 6. vs. par.

6. καρδιον

α, & 6. vs. par.

an. 9. Latinis

indumentum,

involucrum,

membrana,

panniculus cor

dis: camera

cordis: capsula,

capsula, ar-

cula.

b Lib. de cor-

de, cui & καρδι-

ον, tunica.

c Gal. 6. vsu

par. 16.

d Gal. 7. ad.

an. 3.

e Galen. 7. adm an. 6. pericardium non ex cordis corpore, sed ex vasis inde prode

untibus oritur. Archang. Opinantur aliqui ex cordis capite esse natum: ex pleura

fortassi

CORDIS inuolucrum^a Græcis *καρδιον*, qua
si cordi circumiectum, & vulgo capsula cordis
& Hippocrati^b *κελες*, culeus dicitur: Membrana es
ampla, totum cor cooperiens, cuius figuram [t. 5. fig. 1.
D. E. F.] pyramidalem, vel potius pineæ nuci æmulan
refert & ex basi [t. 5. fig. 1. D. E.] latiore^c in mucronem
[tab. 5. fig. 1. F.] obtusum sensim definit. Hæc in me
dio, thoracem intersepientium membranarum sita
est, & ab iis^d complexa, cum huic quasi orbiculatim
plurimis fibris adnascantur. Connectitur quoque
parte anteriore pleuræ, vbi sextæ & septimæ costæ si
nistri lateris cartilagine, sterno dehiscentibus inter
sepientibus membranis iunguntur: posterius ad spi
nam dorsi: inferius diaphragmatis [t. 5. f. 1. ab. F. ad G.
nerueo circulo, seu tendini suo mucrone [tabul. 5.
fig. 1. F.] in sinistra magis & dextri lateris [t. 5. fig. 1. G.]
portio

portione ita pertinaciter adhæret (quod homini pe-
 uliare est) vt sine disrptione separari nequeat. At
 n canibus & simiis multū à diaphragmate distat, eiq;
 non connectitur. Huius [*tab. 5. fig. 1. B. fig. 2. A.*] O-
 rigo ad basin^f ampla est, ex tunicis, quæ pleura qua-
 uor vasis cor egredientibus largitur, producta: Si-
 quidem vasa hæc, toto illo spatio, quod est inter ba-
 sin cordis & pericardium, communi hac tunica à
 pleura destituantur.

Substantiam crassitudine^f ac robore exacte con-
 nientem habet, & vt voluit Galenus, si durior,
 quam nūc est, facta fuisset pulmoni obfuisset, ipsum
 comprimendo: si mollior, ab ossibus dolore affici po-
 uisset, nam vt positione inter duo contraria, ita cor-
 oris substantiam inter duo extrema, mediam est
 depta, tanto enim osse mollior, quanto pulmone
 iurior. At pericardium pulmones non nisi medi-
 flini interuentu contingit, ne se mutuo in motu
 npediant: excipio partem anteriorem ad ster-
 on, vbi membranæ intersepientes à se inuicem
 istant. Durum admodum est inuolucrum, ob
 ontinuum motum cordis, extrinsecus fibrosum,
 intrinsecus lubricum, & læue admodum ad faci-
 orem cordis motum, vtrinque tamen omni g adi-
 e destitutum.

Hoc ad basin cordis, quæ est è regione quintæ
 ertebræ thoracis, vasis ex ea [*tab. 5. fig. 1. B. fig. 2. A.*]
 rodeuntibus (quæ suffulcit) connectitur, at cordis
 corpori connexa non est, verum tantum ab eo tam
 d basin & mucronem, quam latera [*t. 5. f. 2. BB. pericar-*
ū in latera reflexum ostendit] distat, quantum eius i di-
 tationi & humori seroso contento opus est: quare
 ndiquaq; æqualiter ab eo distat: Si enim interuallū
 uisset maius, thoracis amplitudini, & per consequēs,
 spirationi incommodasset.

*fortasse consti-
 tutum: si ex
 mediastino du-
 plicato oritur
 dicamus, forte
 non erit ita ab-
 surdum. Fall.
 à vasis enasci
 videtur. Ves.
 à tunica vaso-
 rū communi.*


*f In 6. r. su
 part. 16.*

*g Secus arbi-
 tratus Arist.
 cui membra-
 na pinguis di-
 citur, forte in-
 tersepientibus
 membranis de-
 lus, Vesal.
 h Gal. 7. adm.
 an. 3.
 i Gal. 6. v. su
 part. 16.*

TABVLÆ huius V. Figura 1. Cor pericardio inclusum, vna cum pulmone & septi portione ostendit : fig. 2. pericardium diuisum, cordis situm, eiusque partem anteriorem exhibet.



FIG II



Continua omni sui parte, præterquam in basi, ubi ad minimum quinque foraminibus peruium est, propter venæ cauæ introitum [*tab. 5. f. 1. A. f. 2. F.*] & egressum : Venæ item arteriosæ [*tab. 5. f. 2. G.*] & arteriæ magnæ [*tab. 5. f. 2. H.*] exitum.

k De diff.
ven. 2.
l A subclavia
prodire dicit
Laurentius.
m Fall. arte-
rias nullas ha-
bere dicit. Lau-
rentius arte-
riarum non me-
minit.

n In 6. vs. par.
28 solum peri-
cardium tenuiss.
nervorum pro
pagines reci-
pere videtur.
o In 6. vsu
part. 16. vide
7. adm. an. 13.
historiam pueri
perforati, cui
os pectoris ex-
cisum & peri-
cardium com-
putruerat.
p Aristot. 3.
part. 11.

Venas paruas admodum [*tab. 5. f. 1. C.*] & exiles recipit, partim ab ijs, quæ ad mediastinum mittuntur, partim à **k** phrenicis, ubi diaphragmati iungitur: sunt qui & ab axillari **l** ramulum recipere velint, capsularem nominantes: at arterias fere **m** nullas, nisi perquam tenuissimas, cum cordi ita sit contiguum, ut ab ipsius cōtactu vitales spiritus recipere possit. Nerui exigui **n** & aliquando vix apparentes à sexti paris sinistro ramo recurrente ad sensum disperguntur.

Vsus: Hoc inuolucrum tanquam **o** domicilium quoddam, aut firmum vallum cordi circumiicitur, ut id vestiatur: & cum membranarum sit **p** robustissima, prohibet ne prematur, ipsiusque motus impediat, neue in motu offat tangendo lædatur. Deir humorem serosum continet. Tum instar ligamenti, intersepientium membranarum beneficio cor in sua sede retinet.

De humore in Pericardio contento.

CAPVT XVII.

De hoc humore scripsit Hippocrates lib. de corde, & Galenus 5. loc. affect. 2.

a Aqueus hu-
mor Colum-
bo, lasolino:
tenuis aqueus
humor. Fal-
lop. aqua se-
rosi humoris modo, Vesal. humor sero & urina per similis, Laurentio. **b** In 5. lo-
co. aff. 2. **c** Lib. de corde.

IN cordis inuolucro humor **a** continetur aqueus & ut loquitur Galenus, **b** urinae speciem referens quare diuinus senex, cui *ὕδωρ* dicitur, cor quasi in vesica diuersari scriptum **c** reliquit: est tamen omni-

acrimo

crimonix & falsedinis expers. Ortum ducit^d par-
im ex humore, quem vasa, venæ, inquam, & arteriæ
ordis immittunt, quem cor, vt Hippocrates loqui-
tur, bibendo adsumens, & pulmonis potum lambēs
mingit: ob feruorem enim in corde existentem hu-
mor aqueus, quemadmodum in ligno vrente vide-
mus, exprimitur. Partim ex potus portione, cum hu-
us aliquid roris modo eo penetret, dum bibendo
eluti per parietes^e asperæ arteriæ delabitur, & in
arterias venosas inde aliquid influit.

Probatur prius curatione palpitationis cordis,
quæ ex humore copiosiore causatur; quæ sanguinis
mixture, Galeno^f docente, curatur, educto vna cū
anguine, seroso humore, qui in pericardium illabi-
tur. Posterius vero comprobatur exemplum ab Hip-
pocrate^g propositum, quod est; si porculo valde si-
cienti aquam minio mixtam exhibeas, statimque iu-
gules, fauces hoc colorato potu infectas reperiēs.
Sunt tamen qui velint^h ex vaporibus & exhalatio-
nibus humidis ab humoribus cordis foras à perpe-
tuo eius motu & insigni calore affusis, & ad pericar-
dij densitatem appulsis generari.

Reperitur humor hic non tantum inⁱ mortuis,
sed etiam viuētib; : at in mortuis copiosior est
hecticis exceptis, in quibus exiguus est & flauescēs)
um spiritus plurimi, qui circa cor sunt, mortuo &

refri-

ssistentibus in tracheam delabitur, inde in arterias, cor ad pericardium.
tionibus per trachea parietes delabentibus. la solino est portio perfectissima, selecta
mnibusq; numeris absoluta humoris serosi transmissa ab ipsa natura primogenio
nsan ortu^c Vide Platonem in Timæo, ex Hipp. de corde, Gal 7. vsu part. 17. 4.
method. 7. & 8. de plac. 9. ostendit potum exiguum in asperam arteriam deferri.
Lib. 5. loc. aff. 2. Egin. Fernel. an veteres in sanguinis exuperantiam, vel humo-
m copiosorem pericardio infixum retulere. g De corde, Gal. 8. plac. 7. h Fal-
pius, Archangelus, Laurentius. i Regā in Gal. de loc. aff. causam generationis
mortui refert ad cordis & vicinarum partium calorem, qui pingue colliquet,
in aquam versat.

d Sex opinio-
nes circa ma-
teriam propo-
nit Archang.
1. à materia
aquosa sper-
matica in pri-
ma genera-
tione, quem-
admodum à
materia fla-
tuosa sperma-
tica dicitur
auribus gena-
ratur. 2. ex
cordis adipe
agitatione in
aquam con-
uerso. 3. ex æ-
ris inspirati
crassiore por-
tione, densita-
te pericardij
in aquam con-
uersa, vt in
vasis distilla-
torijs fit. 4. ab
excrementis
aquosis tercia
concoctionis.
5. ex salina,
qua ex glan-
dulis lingua

refrigerato corpore, in aquam cōuertantur, eomodo, quo vapores à terra elati in media aeris region ab eius frigiditate in aquam commutantur. In vuentibus etiam ^k ex necessitate dari asserimus, non autem in agris tantum, qui palpitatione laborant: sed omnibus sanis, ita tamen vt in alijs copiosior, in alijs paucior reperiatur, qui tamen secundum naturam pro cordis salute moderatus esse debet, cum eius absumptione tabes, ^l & ex nimia eius copia palpitatio cordis, & inde propter impeditam dilatationem suffocatio & mors sequatur. In venis dari, testimonio Hippocratis ^m confirmari potest, dum humorem modicum vrinæ similem adesse dicit: de viuorum animalium sectione, quod singulis anni in ouis prægnantis viux sectione demonstrare assueuimus: tum vsus & necessitas huius humoris hoc ipsum comprobatur.

Vsus enim eius, cor viscus calidissimum & perpetuo agitaturne continuo motu torreatur, vrina cum suis vasis (quare adipe opus non habuit) humectare; & refrigerando sanum & florens conseruare cuius etiam beneficio pericardium continuo madet alias cordis feruentissimo calore exficari potuisset. Cordis quoque motus facilius redditur, à quo motus attritus dissipatur, & per poros sensim resoluitur a successiue euanescit; ex quo si exeundo retardetur volunt ⁿ in multis corporibus in medio pectoris directum

^k Columbus, et si Curtius dubitaret, tamen & in vuentibus & mortuis reperitur. Fallop. semper continetur. Iasolinus, nonnulli censent in vuentibus non reperiri, sed eius loco cruorem seu spiritum existere, qui interitus tempore in aquam vertitur. Vesalius, an in omnibus secundum naturam se habentibus si milis aqua habeatur, mihi non admodum perspectum est, nullum tamen omnino in vi

eis dari falsum est, quia membrana nullis partibus connata, perpetuo madida & lubrica apparent, ac oculorum, palpebrarum interior superficies, &c. in omnibus quos secui siue paulo, siue multo ante periecit, reperi, maiorem tamen copiam in mulieribus, nisi viri natura admodum humidus fuisset, aut alijs serosis succis abundassent: minus etiam in super mortuis: ad cuius exemplum eum, cui & in eo exemplum fuit Patanij. ^l Libr. 3. loc. aff. ² exemplum adducit simia sua tabida reddita ob tumorem in pericardio humorem in se continentem, reliquis partibus sanis. ^m De corde: ad istum Lauren. idem voluisse Galenum de vsu part. addit exemplum Saluatoris ex cuius latere sanguis & aqua effluerint. ⁿ Varolu.

directo cordis multos pilos produci. Tandem vtis, vt ei cor ° innatet, quo minus graue sit, quemadmodum foetus in vtero sudori innatet, ne matri ponere nimium molestus sit, & nulli parti impingat: adde quod & adipis concretioni vtilis est. Sed hac de re in prælectionibus nostris in libellum Hippocratis de corde habitis plenius egimus.

In Thoracis quoque concauitate communiter milis aqua cruore mista obseruatur, quo perpetuo madere partes thoracis ad caloris refrigerationem oblinantur.

De vena caua trunco ascendente.

C A P V T X I I X.

De huius ramis Gal. libr. de diff. ven. & art. 2. & 5. in lib.

Hipp. de vict. rat. in acut. com. 2. text. 10. & 6. de placit.

Hippocrates vero de natura oss. & 6. epidemiorum.

ETSI vena caua instar canalis per vtrumq; ventrem feratur, attamen doctrinæ causa ^a in truncum descendentem, qui per ventrem infimum distribuitur (de quo iam dictum fuit,) & truncum ascendentem, de quo in præsens, diuisimus. **VENA** ergo **CAVA** posteaquam diaphragmatis partem neruosam à dextris proprio foramine pertransiit suo trunco [tab. 6. fig. 1. ab A. ad D. t. 7. à B. ad H.] indiuiso ad regulum vsq; per thoracem ducitur, qui inferiore ^b amplior est; cum ad plures partes sanguinem deducere debuerit: & securitatis gratia partibus vicinis, diaphragmati (mediastino ^c quoq; in canibus & canijs) cordis auriculæ dextræ iungitur: & ne in iugulo

o Archang.
& Laurent.

^a Gal. de diff. ven. 2. & 6. de plac. 3.

^b In 6. plac. 3. latissima, quæ infra hepar, minus lata qua per præcordia sursum tendit: vtriusq; adhuc minor.

^c a cordi applicatur. c Laurentius vult contingere mediastinum: at Vesalius contra, addens, noluisse Galenum de diff. ven. 2. mediastino largiri cauam ramos, & tenquam ad cor perueniat.

TABVLÆ huius VI. fig. 1. *cauæ venæ in*
ingulo diuisionem exhibet, à dextris quidem in duo
truncos, vt vulgo creditur: & à sinistris tantum in v-
num, à quo & Cephalica & Basilica prodit. Fig. 2. Ve-
næ cauæ portionem à corde ad iugulum proponit ad fi-
brarum naturam (quæ rudius fig. 3. delineantur)
in venarum corpore ostendendam: Fig.
4. venæ ætios distributionem
ostendit.

FIG. I.




FIG. II.



FIG. III.




FIG. IV.



TABVLA hæc VII. *venæ caue truncum*
et ramos, prout per tres ventres dissemi-
natur, proponit.



TABVLA hac adposita propter venæ ætios d.
stributionem & huius ramorum coniunctio-
nem cum Thoracicis, quæ à dextris
ostenditur.



d Vesal. ait
non in homi-
ne, ut Gal. 7.

adm. an. vo-
luit.

e De diss.

ven. 2.

f In 7. adm.

an. 9. hunc si-
nū intelligit,
dum sinū dicit
dextrum, non
vero intelligit
ventriculū
dextrum.

g Caua suū
quendam ra-
mū cordis ap-
plicare vide-
tur 6. plac. 3.

in nobis &
quadrupedi-
bus omnibus

dextro ven-
triculo inser-
ta est caua ve-

na: in ijs au-
tem quæ eius-
modi ventri-

culum nō ha-
bent, vena per

totum animal
sparsa calore à

corde transsu-
mūt per ana-

stomosin per
arterias 4. vs.

par. 6. Colum-
bus scribit nō
intro in ven-
triculū ferri.

gulo ab ossis duritie lædatur, & tutius in ramos insi-
gnes diuidatur, corpus glandosum, Thymum dictū
ei substernitur, quemadmodum ^d in canibus & si-
mijis pulmonis lobus inter pericardium & diaphra-
gma, cum thoracis longitudine hominem superent,
ipso subiicitur. Prodeunt autem ab ipso trunco ante
diuisionem rami quatuor.

I. Phrenica [tab. 7. C.] seu diaphragmatica ^e v-
trinq; vna, quæ per diaphragma multis furculis dis-
feminatur, & ramulos ad ^e pericardium & mediasti-
num mittit: quarum dextra aliquando in thorace;
sinistra vero sub diaphragmate ex caua vena prodit,
cum qua & adiposa nonnunquam iungitur. Mox
cauæ truncus progrediens, & pericardium perfo-
rans modice sinistrorsum [tab. 7. supra B.] inclinans è
regione octauæ vertebræ thoracis, vel summitatis
nonæ; interdum medio spatio, quod est inter septi-
mam & octauam latum sinum ^f ante cor efformat,
& mutata pene substantia ac rotunditate, in dex-
tram cordis aurem [tab. 7. D.] degenerat (vel si ma-
uis vndique dextræ auriculæ adnectitur, quam su-
perficietenus complectitur) & in cordis ^g ventricu-
lum non admodum alte penetrans infigitur, vt in
eum tanquam in cisternam sanguinem profundat.
At anteriori & interiori cauæ parieti, membranā
quandam vult appositā Eustachius, quæ ad me-
dium foraminis in multiplices fibras desinat, quæ
variæ complicatæ reliquum semicirculū cōpleant,
& toti foramini sine conjunctione obducantur; quo
ab irruente materia impelli & repelli possit; quæ ta-
men aliquando contextu fibrarum destituatur, &
quasi cornutæ Lunæ speciem, quemadmodum in
Coronaria referat: quæ etiam aliquando adeo par-
ua & angusta sit, vt quasi nulla sit, prætereatur: quæ
forte ratio, vt hanc nondum obseruari.

II. Co-

II. Coronaria^h est cordis [tab. 6. f. 2. B. f. 7. E.] quæ cum venæ instar eius basin cingat & cingitur, multosque ramos per exteriorē cordis superficiem in totum eius viscus à basi ad mucronem usque deorsum mittit, potissimum vero per partem eius sinistram, cum ipsius substantia hîc sit crassissima, ideoque copiosiore alimento indigeat; & quia crassiore nutrimento suæ substantiæ simili opus habuit, idcirco ab hac vena sanguinem obtinuit, antequam ventriculum ingrederetur; vbi sanguis tenuior redditus in nutritionem pulmonum cedit. Ad huius exortum Valvula apposita est, forma dimidiatam Lunam referens, similis ei, quæ in fœtus corde primæ anastomosi præest; impediens ne sanguis cordis superficiēi semel tributus, propter cordis continuum motum in cauam refluat. Hæc aliquandoⁱ gemina est; altera in posteriore; altera ab anteriore sede emanante.

h Gal. de diff. ven. 2. mixta, venæ exigua: Vesal. reuera insignis, licet contra Galenum,

i Galenus 7. adm. an.

Hac constituta Pericardium denuo^k perforat, & caua suam teretem speciem rursus assumit, & ^l gracilior multo reddita, vertebri non amplius innixa (cum ipsis œsophagus & aspera arteria incumbant) per medias pulmones, qua pars dextra à sinistra se iungitur, sursum ad iugulum thymo inuēcta deferretur. Quo vero ad vertebra & spatia intercostalia rami distribuuntur, truncum seu venam^m insignem supraⁿ cor, quasi in medio corporis constituit.

k Perpetuo gemina: aliquando Vesalius, rarius Laurentius. De hoc gemino caua trunco 6. vs. part. 4. & 17. sic & 17. eiusd. 10.

Bb 4

III. Ve-

l Maiorem dicit 6. vsq

partium 4. in quibusdam exemplaribus rectius minor habetur. *m Erasistrato subscribens ita appellat 5. loc. aff. 3. at in Comm. hanc venam parvam esse dixit, sed locus hic variis deprauatus est.*

n Sylvius, ut Galenum tueatur dicit, Galenum semper obseruasse oriri à caua vbi primum dextrum cordis ventriculum attigit in ijs, quibus sternum septem ossibus constat: at in nostris corporibus ob thoracis breuitatem supra cor & pericardium prodire: hoc ridet Eustachius. Fernelius scribit, non in paucis sectionibus obseruatum esse, à caua derivatum antequam cor accedat; hoc pro Galeno exco-
it atque esse, scribit Eustachius.

o Gal.com.2.

III. Vena αζυγος, ° seu sine pari dicitur [tab. 6.

tex.10. de rat.

fig. 1. C. fig. 2. B. figur. 4. B.] eo quod hæc communiter

viñt. in acut.

in homine vna sit, quemadmodum & in cane, nec in

Hipp. de his e

altero latere coniugem habeat. Hæc supra P cor in-

git, quemad-

ter quartam & quintam thoracis vertebra[m] ex ve-

modū & Hipp.

næ caux^r posteriore [tab. 6. fig. 4. A.] & inferiore

2. Epid. sect. 4.

fede, dextrorsum tamen magis, quam sinistrorsum,

P Vesalius ait,

vertebras respiciente, exoritur: Et non plane recta

de ortu vena

incedit (quod sculptor [tab. 7.] non satis obserua-

huius Galerū

uit)

varium fuisse:

lib. de ratio

& lib. de ratio

viñt. in acut. com. 2. tex. 10. Ter meminisse, dicendo primo à caua proficisci antequā

ad cor pertingat: dein subiungere, in quibusdam animalibus supra cor depromi, in

homine autem ex parte, qua dextram contingit aurem, tum ait infernas costas in

homine enutrirī à vena, qua sub corde à caua exit. Respondetur ad primum Gal.

de diff. ven. 2. asserere, octo interstitia costarum, & etiam plura hæc venam nutri-

re: & lib. de viñt. rat. in acutis com. 2. tex. 10. eam utrinq; costis octo usque ad dia-

phragma distribui. Iam vero caua è regione octaua vertebra cordi iungitur, non

ergo potuit statuere hanc venam sub corde seu infra cor enasci. Sic 7. adm. an. 9. di-

cit venā hanc perpetuo quintā dorſi vertebrā conscendere, iam vero auricula dex-

tra circa octauam vertebrā posita est. Quare non credidit infra cor oriri. Sic com.

2. tex. 10. de rat. viñt. in acut. statuit, hanc venā per humiliore[m] basis cordis sedē de-

latā ad ipsam spinam flexam peruenire, quod non dixisset, si infra cor ortū ducere

credidisset. Ad alterum resp. In emendatissimis exemplaribus haberi ααεερ ποτε

ἐν τῷ αἰσπῶντι, velut aliquando in hominibus. Et sane talē exortum nō semel in ho-

mine, sed & simis etiā Eustachius observauit. Ad tertium resp. Dixisse sub corde

non infra cor. Obiicit & alium locum 7. adm. an. 9. qui habet: à dextro sinu vena

quadam ad spinam protenditur quintam dorſi vertebram conscendens, prater ea

quod eadē vena ad hunc perpetuo locum in omnibus animalibus porrigatur, ut in

animalibus, quibus exerceri voluit, non tamen in omnib. à dextera cordis auricula,

sed in quibusdā animalib. cum vena caua hanc permeans ad ingulū attollitur. Resp. 1. Gal.

dicere in quibusdā animalib. non dicere in homine vel simia, sed indistinctim in a-

nimalib. in quibus exerceri voluit, qua autē ea sint 6 adm. an. 3. docet. Sic in equo

αζυγος oritur è regione medij basis cordis in vñso è regione coniunctionis caua cum

auricula dextra: in suis & ruminantib. ut capris, bobus, in his (in quibus gemi-

na est) ab infima huius sinus parte, ut Eust. notat, arguendo Vesal. quod asserueris

inter hominē & animalia nihil interesse. Dein Gal. hoc loco primo de brutis loqui-

tur, mox subiungens de homine, dicit hanc cū vena caua παρὰ πρὸς praterire nō di-

cit permeare. q 7. Adm. an. 9. perpetuo quintam dorſi vertebram conscendit.

r Ex dextro caua latere Ves. Hippoc. 2. epid. sect. 4. eiusmodi venam veluti a-

liam iecorariam depressam, atq; humilem circa vertebrarum corpora deorsum e-

currere scribit. Ideo Gal. sub corde prodire aliquando dixit, non quod secundum

thoracis longitudinem infra cor posita sit.

uit) vt in canibus, in quibus recta deorsum ad vertebrarum latera procedit, sed super dexterum asperæ arteriæ truncum, parum dextrorsum & retrorsum versus spinam reflexa, vbi vertebrarum radices attingit extollitur, & ad medium^t earum progressa deorsum fertur; ita vt circa octauam vel nonam vertebrâ thoracis, plane in medio sit (quemadmodum in simiis eminentiori vertebrarum sedi incumbit) & sub arteria adposita deorsum vsq; ad finem thoracis, prius tamen diuisa, fertur & cum Aorta diaphragma penetrat. Verum in plerisque animalibus, in quibus iuuenes exerceri voluit Galenus, ^u à sinistro cauæ lateris originem ducit, & per sinistram thoracis cavitatem, movente^x eodem, descendit, quod hætenus in ouibus semper obseruauimus; At in ruminantibus, in quibus gemina reperitur (In homine^y rarissimum est, an forte in ambidextris) in his dextra dextri lateris, sinistra sinistri lateris costarum radices occupat, quod in capris & suibus videre est.

Sic aliquando (vt à Fallopio edocti figura [tab. 8.] exhibemus) à sinistris alia vena [tab. 8. 1.] in homine reperitur, quæ ἀζύγος munere defungitur: & tum altera à dextris iuxta radices costarum procedens medium vertebrarum non conscendit. Hæc vero sinistra à ramo Subclauio ortum ducit, & spatii aliquot ramulos largitur: & nonnunquam, cum ramo, qui è regione sextæ thoracis vertebræ à trunco ἀζύγος ad sinistram transuersim [tab. 8. ee.] mittitur, à quo etiam ramulus sursum eleuatur, ad quintam costam venit. Nonnunquam non à Subclauio, sed è trunco cauæ ante diuisionem è regione tertix vertebræ thoracis orta, ad duo prima spatia intercostalia ramulos sursum mittitur, reliquos vero ad inferiora sui lateris, ad sextam vsque vertebram, quo cum peruenit, cum prædicto transuerso ramo iungitur, in duobus.

*t Pars sine cō-
iuge positurâ
mediâ requi-
rit is. vs par. 2*

u In 6. adm.

an. 3.

*x Hipp. lib. de
off nat. & 2. e-
pid. sec. 4. ad*

sinistras partes

preſcribere ſim-

pliciter ſcribit,

non dicit in ſi-

niſtro latere o-

riri. Galen. de

diff. ven. 2 in

plurimis ani-

malibus ad ſini-

ſtras partes, at

in ſimiis in dex-

tris partibus.

Vesal ſemel in

agno à ſiniſtris

notauit. Eust.

vult pro ſini-

ſtris dextrâs

legendû eſſe.

y Syllius in

Antonio Maſ-

ſa chirurgus ob-

ſeruant. Eust.

ſtarchius vero

in duobus.

2 Gal. 5. loc. af.

3. vena à 2y

γ @ omnes co-

stas alere non

potest. Sic de

vist. rat. in a-

cu. com 2. tex.

10. quatuor su-

periores costa,

ab alio iugo

nuriuntur. 1. de

diff. ven. 2. in

omnia inter-

ualla prater-

quam in pri-

ma duo, non

numquā tria.

2 Vesalius ad

nonem.

b Hipp. de nat.

off. 2. epid. 4.

ven. 2. sine pa-

re recurrit. 2.

per medias ver-

tebras ad sum-

mas costas re-

uenat. adducit

etiam Gal. 6.

plac 9.

c Vena sectio

pleuritiorum

triplex. 1. Gra-

corū, qui eius-

dem lateris.

2. Arabū, qui

oppositi 3. Ve-

sal. qui semper

dextri lateris

venam secat,

quia ignorauit coniunctionē vasorum intercostaliū cum vasis Tho-

racis, qua ab Axillari prodiit, qua de re vide eius epistolā. Verum in principio oppo-

siti lateris reuulsionis gratia materia adhuc fluente: post principii eiusdem lateris

derivationis et euacuationis gratia, si dolor ad ingulū vergat: Si vero ad hypochondria, saphanā secamus. d Hipp. de off nat. 2. epid. sect. 4. adducit Gal. 6. de pla-

citis ultimo. c Hoc primi notarunt Fallop. & Eustachius.

à quo propagines in reliqua spatia sparguntur.

Communiter autem à venæ ἀζύγῃ trunco [tab. 6.

fig. 4. B. tab. 7. FF. tab. 8. d.] qui quasi in medio corpo-

ris situs est, ex posteriore regione tam à dextris, quā

à sinistris rami (rarius ad omnia 2 costarum intersti-

tia) ad a decem inferiorum costarum interualla [tab.

6. fig. 4.] potissimum à dextris distribuuntur, qui In-

tercostales [tab. G G.] dicuntur, & in verarum costa-

rum interstitiis vsque ad cartilagines earum abeunt,

in notharum vero interuallis vsque ad abdominis

musculos feruntur ; Ramulos etiam numerosos &

exiles œsophago distribuit : non raro etiam è regio-

ne, quartæ thoracis vertebræ enata ramum sursum

mittit [tab. 8. ad d. superius] à quo furculi ad quatuor

superiores costas b vago ductu mittuntur. Harum

autem venarum intercostalium propagines etiam

[tab. 8. xxx.] thorace excidunt, & vtrinque cum fur-

culis thoracicæ inferioris per anastomoses [tab. 8.

yyy.] aliquibus locis hinc inde vniuntur. Quo fit vt

in c pleuritide non semper dextri lateris, sed eius-

dem cubiti vena interna vtiliter incidi possit. Verum

propter hanc vnionem & reuulsio commodius &

facilius fit.

Cum vero truncus ἀζύγος ad octauam & nonam

costam (nonnunquam & decimā d Hippocrate do-

cente) peruenit, supra spinam in duos ramos e dex-

trum & sinistrum [t. 6. C. O.] diuiditur, qui ambo de-

orsum repentes sub diaphragmatis diuisione trans-

eunt. Et horum alter, qui quandoque maior est, ad si-

nistram in posteriorem caue sedem, iuxta emulgen-

tis

venam secat, quia ignorauit coniunctionē vasorum intercostaliū cum vasis Tho-

racis, qua ab Axillari prodiit, qua de re vide eius epistolā. Verum in principio oppo-

siti lateris reuulsionis gratia materia adhuc fluente: post principii eiusdem lateris

derivationis et euacuationis gratia, si dolor ad ingulū vergat: Si vero ad hypochondria, saphanā secamus. d Hipp. de off nat. 2. epid. sect. 4. adducit Gal. 6. de pla-

citis ultimo. c Hoc primi notarunt Fallop. & Eustachius.

tis principium frequenter ramo vno (nunc supra frequentius retro & infra) in emulgentis [*tab. 8.e.f.*] medium, vbi Spermaticam procreat, desinit: quandoq; in dorsi cauitate reflexa, cum ramulo ab emulgente pronato, vnitur: nonnunquam etiam sinister in duos ramos secatur, horūq; alter [*t.6.f.4.E.D.*] sursum, alter deorsum secundum costarum radices, fertur & costarum interstitiis ramos tribuit. Dexter vero cauiam accedens, aliquando supra emulgentem cauiam iungitur, rarius emulgenti, nonnunquā primæ lumbari, communiter in vltimā [*t.8.*.*] lumbarē implantatur; (nonnunquā ramulus per vertebrae oblique ductus cauitatē earum penetrat) Quare in initio Pleuritidis vena poplitis vel saphæna secari potest; hinc & ipsi per vrinas sæpe critice puris copiā minuentes expurgantur, hanc vero materiam in Empyicis etiam per arteriam venosam pulmonis in sinistrum cordis ventriculum & delatam, indeq; in Arteriam magnam in renes defluxisse, & critice expurgatam fuisse obseruatum fuit; quare hæc ἀζύρος distributio & vnio ostendit, quomodo thorax commodè per vrinas expurgari possit. Verum vertebrae quoque, secundum quas deducitur, & mediastino furculi offeruntur. Quod vero aliqui ^h huius venæ principio membranulas seu ostiola tribuant, cuiusmodi in orificiis vasorum cordis reperiuntur, quæ ingressum sanguinis ex caua in venam ἀζύρον, non autem egressum admittunt, falluntur, talia enim nec in hominibus, ne in brutis hætenus obseruare potuimus. Adde etiam: quod si Venæ sine pari inferne apertæ, sanguineque expresso, cannula indatur & infletur, non solum hæc vena, sed etiam caua intumescet. Quare cadit sententia statuentium si vena in cubito secetur, quamuis caua euacuetur, nil tamen sanguinis è vena ἀζύρω educi, ostiolis

regur-

f Finitur vbi septum à vertebra nascitur, s. loc. aff. 3. & inde exiguua portuncula exilit.

g Ex 6. loc. aff. sect. 4. exemplum habet Hollerius, alius Laurentius.

h Amatus cent. 5. cur. 52. (& cū eo Hollerius) se hoc Ferraria in 12. cadaveribus humanis, totidem brutorum vidisse asserit, addit, si vena inferne fuerit inflata, intumescere cū suis ramis, nō autem cauiam. Hacridet Eustach. Carcanus, Laurentius.

regurgitantem sanguinem in cauam egredi impedi-
dientibus.

i Gal. de rat.

v. c. acut. com.

2. lex. 10 &

diff. ven. 2.

IV. Intercoastalisⁱ superior [*tab. 6. f. 1. F. t. 7. K.*] v-
trinque vna à ramo subclauio, iuxta iugularium ve-
narum [*tab. 7. S. T.*] initia oritur (nonnunquam ta-
men dextra à trunco, sinistra à ramo) & sub brachij
arteria reflectitur, inque geminos ramos vt plurimū
præcipue in dextro latere diuiditur, qui in duo supe-
riorum costarum interualla, aliquando & tria^k di-
tribuuntur, qui cum ramis mammariis [*tab. 7. LL.*]
qui per cartilaginez repunt, iunguntur. Hæc, tum
quando à² v. c. ad omnia costarum interstitia ramos
largita est, deest. Sic ab intercoastalibus omnibus ra-
mulæ vertebrarum foramina (vbi nerui egrediun-
tur) pro earum & spinalis medullæ nutritione in-
grediuntur.

k Costa qua-
tuor venas ab
hac accipiunt.

Gal. loc. citato

non quatuor,

si obscure &

inter musculos

fiat sed duobus

& ad summū

tribus præci-

pue in dextro

latere Eust.

l Non ut pin-

gunt plera que

tabula Anato-

mica utrinq;

in duos ramos,

sed utrinq; in

unum, vt re-

cte pinxit V'a

luerda, lectio-

ne Vesal. admo-

nitus, qui etia

in fine lib. 3. a

liam habet fi-

guram, in qua

sinistrum la-

ter veram sen-

tentiam exhi-

bet.

m Axillares

vacant Col.

Truncus dein [*tab. 7. H.*] sub pectoris osse, asperā
arteriam ad iugulum, mediastino & thymo [*t. 4. F.*]
suffultus, recta ascendit, & in duos^l insignes [*tab. 7.*
II. tab. 8. cc.] ramos diuiditur, quorum alter dextram,
alter sinistram partem petit, & quamdiu in Thorace
est, Subclauius^m dicitur. Ex quolibet Subclauio ve-
næ aliæ à parte inferiore, aliæ à superiore prodeunt.
Ab inferiore, antequam diuidantur Subclauij, rami
seu venæ quatuor emanant.

I. Mammariaⁿ descendens [*t. 6. f. 11. EE. t. 7. LL. t. 8. l.*]
est, cuius varius est exortus, aliquando enim ex ante-
riore & o media bifurcationis sede, aliquando à Sub-
clauij radice, aliquando sinistra à Subclauia, dextra à
bifurcatione: quandoq; è medio cauæ trūco ante di-
uisionē vnica enascitur, quæ ad sternō vbi peruenit,
in dextrū & sinistrū scinditur. Hæc antrosum du & a
& sub osse pectoris [*t. 4. B. C.*] delata, ad cartilaginis
mucro-

& Fallop.

n De hac Gal. de diff. ven. 5. diligenter egit, & 7. vs. par. 22.

o Dextra è medio caua in iugulo, altera à sinistro caua membro, diff. ven. 5.

mucronatæ latera emergit & abdominis superiora ei furculos comunicâdo perreptat, & in descensu ad singula costarum intervalla cartilaginea (osseis enim αὐτοῖς mittit) ramulos largitur, qui cum intercostalium extremis iunguntur. Huius venæ mammarie dictæ pars extra thoracem ad superstratos musculos emergit, tum in mammas, tum in reliquum pectus furculos vbi distribuit, deorsum fertur, qui rectis abdominis musculis subnixa, suis extremis cum Epigastricæ [tab. 7. Γ] venæ ramulis superiora petentibus coeunt [tab. 7. M.] sic & aliæ sub cute ad hypochondria emergunt, quæ tum ex p commixtione ramulorum Intercostalium, & venæ mammarie factæ sunt, tum ex iis, quæ vicina intercostalia alunt, cum quibus aliæ, quæ ab inguinibus ad superiora tendunt, vniuntur.

II. Mediastina [tab. 3. Q.] quæ modo à trunco, modo à sinistro Subclauio è regione iugularis interna exoritur, modo vena vna satis crassa supra concavum pulmonis, & supra pericardiū deorsum lata per thymum & mediastinum disseminata: modo furculi duo, qui per mediastinum feruntur, horum alter venis diaphragmatis ascendentibus iungitur, alter cum diaphragmatis neruo sinistro delatus, in eius carnosam substantiam inseritur, quod in puerulis clarius, quam in adultis cernitur.

III. Cervicalis [tab. 6. OO. tab. 77. NN.] non admodum magna, sursum oblique posteriora adit, per laterales vertebrarum cervicis processus, & foramina illis insculpta transit, & musculis vertebris proxime incumbentibus, soboles largitur, quemadmodū & alios ad cervicis medullam per neruorum foramina transmittit, ibiq; absorbitur.

p Thymica
Laur. qui &
capsularē ad-
dit, quæ per
cordis inuolu-
crum feratur,
& phrenicis
ascendentibus
occurrat, ut
eandem vasa
esse videan-
tur.

q Vesal. voluit
reliquum Cer-
vicalis cū con-
iungere arteria
per peculiara

IV. Mus-

foramen in occipitio caput subire, inq; dura membrana sinū absorbi Fallop. in foraminib. ipsorum absorbi. Laurent. in cerebrum emicare dicit.

IV. Muscula inferior [*tab. 7. O.*] quæ aliquando à iugulari externa prodit, per musculos pectoris superiores, & colli inferiores distribuitur: Et hæc à subclauio ramo antequam Thoracis cauitatem excidat, prodeunt. Mox subclauius [*tab. 8. p.*] Thoracis cauitatem egressus nomen mutat & Axillaris dicitur. Ab Axillari antequam diuidatur, duæ propagantur venæ.

I. Scapularis interna [*tab. 7. Q.*] per musculos internam scapulæ partem obsidētes & eis propinquos distribuitur: vbi & ramuli apparent glandulas axillis subiectas transmeantes.

II. Scapularis externa [*tab. 7. d.*] ad partem eius gibbam & externam progreditur; cuius portio altera inter carnem & cutem fertur. Postmodum Axillaris in duos [*tab. 6. H. I. t. 7. a. m. t. 9. q. r.*] abit ramos, superiorem seu venam Cephalicam [*tab. 7. a. t. 8. q.*] & inferiorem seu [*tab. 7. m. t. 8. r.*] Basilicam: de vtraque in brachij historia dicetur. At à Basilicæ trunco venæ duæ exeunt.

I. Thoracica superior [*tab. 7. PP. t. 8.*] quæ pectus accedit, & in cutem & musculos pectus operientes distribuitur: & in mulieribus frequentibus ramis mammas accedit.

II. Thoracica inferior [*tab. 7. RR. t. 8. tt.*] totum thoracis latus perreptat, cuius rami cum ramis venæ

r Syluius, dū
super clauis e-
mersit, super
clauium vo-
cat, à quo dua
iugulares pro-
deant.

f Galen. viſſ.
tat. ac. com. 2.
text. 10.
t Gal. de diff.
venar. 7.

A parte superiore & subclauij vtrinque venæ tres emergunt: Muscula superior iugulares seu σφαγ-
τιδες[†] externæ & internæ, quæ ad colli & latera ascen-
dunt, & ad quarum orificia valvulæ binæ sunt san-

guinis

guinis relapsum impediētes, alias enim partes superiores alimento defraudarentur.

I. Muscula superior [tab. 8. O. tab. 7. bb.] iuxta iugularem externam [tab. 8. n.] promitur, & in cutem ac musculos colli partem posteriorem occupantes u De diff. ven. 9. cum exter-
nū, sit, siue
dua sint, siue
quatuor, nulla
arteria cor spi-
ciuntur.

II. Iugularis externa [tab. 6. fig. 1. LL. t. 7. TT. t. 8. n.] communiter u vtrinq; vna, aliquādo ab exortu gemina, nonnunquam in medio ductu gemina, sub cute sursum fertur, omnibus partibus externis colli, capitis & faciei sui lateris graciles furculos largiēs, vt plurimum sub auris radice bipartito in ramū exteriorem & interiorem diuiditur, vt in facie dicitur.

III. Iugularis interna x [tab. 6. f. 1. KK. t. 7. TT. t. 8. m.] (quā in homine ob cerebri copiam y maior est, at in cane externa minor est) ad asperā arteriæ latus, cui, quemadmodum & vicinis membranis exiles furculos largitur, ad fauces conscendit, & iuxta caput bipartitur.

y Interior gracilior: Exterior grandior, Vesalio: at Laurentio, interna insignior, externa minor in homine, contra in brutis.

De nervis per thoracem & collum disseminatis.

CAPVT XIX.

De his Galenus 7. vs. part. 14. & 15. lib. de dissect. neru. 7. 10. & sequentibus egit.

NERVI, qui per thoracem & collum disseminantur duplices sunt, qui omnes à cerebri medulla prodeunt, alij quidem, dum medulla adhuc in cranio est, alij dum cranio elapsa in vertebriis continetur & spinalis dicitur, suaeque duplici menynge inuestitur.


Ex me-

TABVLÆ IX. *Fig. 1. propter Nervi-
orum
sexti paris per vtrumq; ventrem distributionem
adposita est, quemadmodum fig. 2. nervos re-
currentes cum arteria magna, & arteria
aspera portione.*

FIG. I.



II



Ex medulla, dum adhuc in cranio est, sextum par
 [t. 9. f. 1. ee.] educitur, quod ad exortum ex plurib.^a fi-
 bris componitur, quæ ita vniuntur, vt vnum^b ner-
 uum cōstituere videantur, cum duo sint membrana
 eadem cōtecti, qui per foramen, quod inter occiput
 & os temporale situm est, egrediuntur. Huius nerui
 pars anterior & minor^d rectâ descendens in muscu-
 los linguæ, & maiori parte in os disseminatur, non-
 nunquam & iunculum ad linguæ radicē mittit. Alte-
 ra vero pars, quæ maior est & posterior, extior sum
 ramulos tribuit musculis [t. 9. fig. 1. f.] ceruicē occu-
 pantibus, & musculo scapulam mouentiū secundo
 introrsum vero magis tñ descendens, musculis La-
 ryngis [t. 9. fig. 1. g.] cavitatem occupantibus radice
 largitur, & aliquot tenues hyoides musculis: & cur-
 uarij neruorum furculi concurrant, rursusq; à se in-
 uicem separentur, plexū constituere videntur, ^d qu-
 aliqui chordulis conferunt, quas Cardinalium gale-
 ris appēsas cernimus: in quib. contextibus nodi qu-
 dam, quos Fallopius^f oliuaris corporis imaginē re-
 ferre voluit, qui glandulis vasorū distributioni præ-
 sectis conferri possunt, & si similitudinem habēt cur-
 extuberantijs radicum Peoniæ aut Filipendulæ: qu-
 neruorum augmenta à Galeno^f ganglijs assimilar-
 tur. Mox cum septimo pari^h colligatur, & inter ve-
 nam iugularem, arteriamq; Carotidem, (quæ simi-
 eadem membrana inuclit) ad arteriæ asperæ lati-
 descendit, quō per vtrumq; ventrem disseminetu-
 & ad omnes tam thoracis quam ventris inferior
 partes, omniaq; viscera sensum & motum defert. A
 supra iugulum, antequam thoracem subeat, vtrin-
 in duos [t. 9. f. 1. b.] diuiditur ramos exteriorcm ma-
 iorem, & interiorem minorem.

Recurrentem neruum ramus exterior vtrinque
 constituit, quorum Galenus inuentor est, qui

a Trium ner-
 uorum habet
 principia, Ga-
 len. de dissect.
 neruor. 7.

b Vnus ner-
 uus Vesalio
 duos esse ostē-
 dit Fallopius.

c De huius
 distributione
 vide de dis-
 sect. neru. 10.

d Hanc por-
 tionem cate-
 ris Anatomi-
 ci ignotā di-
 cit Fallopius.

e Præcipue in
 collo & lum-
 bis in porco-
 rum collo ad

sexti paris e-
 gressum è cal-
 naria mani-
 festius quam
 in hominis

collo spectan-
 tur. Vesal. in
 obseruat.

f Plexum sex-
 ti paris ven-
 tans.

g Lib. 10. vs.
 part.

h Cohære-
 re dicit Vesal.
 non misceri,
 Fallopius.

ἀνδρῶντες, & vocales dicuntur, quia his laxis, animalis vox deficit, cum per eas efformandæ vocis virtus deferatur: quorum vsum viui canis sectio perspicue docet: siquidem horum altero præfecto semi-vocalis redditur, utroq; vero discisso, vel laqueo intercepto, prorsus vox perit; sed causam recursus explicare lubet cum ^k Galeno.

Cum in musculorū capita nervi inferi debuerint, sintq; Laryngis aliquot muscoli, qui sua capita seu principia non superne, sed inferne habeant; inferne ijs nervi erant implantandi, qui ipsis sensum & motum suppeditarēt, & quidem vel à cerebro, vel à medulla spinali promanātes. A cerebro eo mitti nō poterant; cum enim illi rectā deorsum ferantur, ipsorū fini inferri fuissent; nec à spinali medulla, tales enim obliquum exortum habent. Quare cum neutrinque nervum accipere potuerint; idcirco natura per viam contrariam ad ipsos nervos misit. Sextum enim par per totum collum deorsum fertur ad mediam vsque thoracis partem, vnde utrinq; propago enata, rursus per eandem viam, qua prius descenderat, sursum reddit, ceu cursum reciprocans per motū assumptivum vsq; ad laryngem, quo muscoli hi deorsum trahant. Qui motus cum circūvolutione fieri debuerit, opus habuit corpore, quod velut metæ cuiusdam & rotulæ vsum præberet; & quidem forte ac leve esse debuit, quo sibi ipsi & nervo tutum supergressum præberet. Eiusmodi autem sunt vel ossa, vel vasa. Ossa, ut claves vel prima costa, quibus circumvolui non debuit, sic enim nervus sub cute prominens facile à quavis iniuria læderetur. Quare ad vasa reflecti debuit, non quidem ad ea, quæ rectam vel obliquam positionem haberent, (circa illa non poterat, circa hæc lubricam admodum & instabilem circumvolutionem habuisset) sed quæ transversam: sicque à

*i De diff. nerv.
407. 10.
k Lib. 7. vs.
part. 14. C.
15. ubi ait, se
eius, qui fabricatus est
animalia, sapientiam ac
potentiam ne
laudare qui-
dem satis pro
merito posse.*

sinistris, ad Arteriam magnam, quæ à corde emergens sese ad spinam inflectit (vbi positio est transversa, flexio levis & orbicularis; quare meta validissima ac tutissima) reducere voluit. Etsi enim iter longum fuerit, ex itineris tamen longitudine non mediocri robur adepti sunt, cum nervi à cerebro progredientes, duriores reddantur. A dextris vero circa Axillarem arteriam circumuertitur, quæ etsi non plane sit transversa, ligamentorum membranorum robore Sapientissimus Opifex correxit, arteriæ ac vicinis corporibus connectens, quo tuta fiat velut circa rotulæ orbem flexit; sed ad nervi distributionem redeamus.

Dextri nervi ramus exterior statim à diuisione [t. 9. fig. 1. h.] furculos vtrinque mittit [t. 9. fig. 1. k. k.] ad musculos à sternone & claviculis pronatos: mox vbi ad Arteriam axillarem [t. 9. fig. 2. F.] pervenit, tantum quæ circa axem [t. 9. f. 2. P.] ramulos tres (rarius ¹ tantum unum) ab interiore [t. 9. fig. 1. l.] latere transmittit, qui versus caput reflexi & uniti Recurrentem [t. 9. f. 2. Q. Q. & f. 1. m.] dextrum constituunt, qui ascendens & Asperæ arteriæ [t. 9. f. 2. I.] lateri membranz interuentu adhærens, & glandulæ ^m incumbens [t. 9. f. 2. N.] Laryngis cavitatem petit, eiq; cum sinistro inter primam & secundam cartilaginē inseritur [t. 9. fig. 1. n.] & in γλωττίδα tanquam vocis formandæ organum, & Laryngis musculos, qui capita ⁿ deorsum habent, ipsis motum tribuentes, exilibus, sed numerosis ramulis implantatur. Recurrente constituto ^o ramus prædictus sub iugulo oblique descendens, postquam in transitu extrorsum pleuræ & [tab. 9. f. 1. qq.] pulmo-

^l Reuersuum vocat Vesalius, & modo tres, modo duos, interdum unicum esse nervulum dicit Columb.

^m Qua alijs glandulis neque colore, neque substantia respondet.

ⁿ Musculi quatuor secundæ cartilagini tertiam necantes: duo, tertiam cartilaginem primæ iungentes.

^o Fallopius hic aliam producit propaginem, qua coniuncta cum nervulo à plexu prodeunte sub arteria ad cordis basin declinet, & in plexum nervorum ibi contentum desinat.

pulmonis P tunica; introrsum vero Pericardio [t. 9. f. 1. r.] & cordi q furculos largitus est.

Stomachicum ^r [t. 9. f. 1. f. t.] dextrum constituit, qui latus sinistrū, quemadmodum sinister dextrum petens, sub œsophago, cui laxè neçtitur, & aliquot furculos communicat, cum sinistro iungitur, ac diaphragma penetrans in orificium sinistrum, & proximas ventriculi sedes absumitur.

Interior vero dextri nerui ramus, costalis [t. 9. f. 1. iii.] dicitur, qui visceribus omnibus infimi ventris ramulos largitur: hic sub pleura vertebris attensus, per costarum ^r radices demittitur, & ramulos à quolibet neruo intercostali assumit: cum enim iam plures propagines de se miserit, & longe adhuc progredi debeat, ab intercostalibus vires assumit & quasi augetur: Dein cū Arteria magna diaphragma ^r penetrans deorsum ad os sacrum vsq; deducitur, & in ramos tres distribuitur: quorum primus [t. 9. fig. 1. y.] inferiorem membranam omenti petit, & in ramulos tres secatur, horumq; vnus ad colon [t. 9. fig. 1. z.] intestinum, hinc post Colicam diuturnam raucedo sequitur: Alter [t. 9. fig. 1. o.] ad intestinorum principium, qui aliquando ob exilitatem vix conspici potest: Tertius ventriculi fundo [t. 9. fig. 1. β.] parte dextra & superiori omenti membranæ furculos largitur: reliquum in Iecoris ^u tunicam [t. 9. f. 1. γ.] & vetricam biliariam absumitur. Secundus & inferior [t. 9. f. 1. δ.] renem * dextrū accedit, hinc vomitus in Nephriticis causatur. Tertius & maximus [t. 9. f. 1. ε.] me-

p Fallopius vult non tantum ad membranam externam mitti, sed etiam ad ramos aspera arteria, multas fibras distribui; quæ dictis ramis quasi innata per totos pulmones distribuuntur. Cōtradicit Vesalius in examine: & sane hoc si foret, utiq; pulmonum dolores insignes esse deberent; at contrarium observatur.

q Qui ei non solum sensum verum etiam motum attribuit, quem admodum & diaphragmati: & quatenus membranas tangendi organa decurrunt, eatenus

Cc 3

fente-

sentiens est: motor vero quatenus musculos organa mouēdi peragrat, hac Archangelus. ^r Vide de hoc etiam 6. vsu partium 6. ^r De diff. neruor. 10. ^r Distributionem inter peritonæi regionem explicauit de diff. neru. 10. ^u Ad iecur, lienem, renes, & ante hac ad totum ventrem ac omnia viscera nerui à cerebro partim à tertia coniugatione, partim à sexto pari prouenire conspiciuntur, de diff. neru. 10. ^x Fallopius ait, se nunquam potuisse conspiciere neruos à sexto pari ad renes & vterum pertingentes: at Vesalius etiam ad pinguem renum tunicam ferri voluit.

senterium & intestina adit : Reliquum rectâ ad vesicam [*t. 9. f. 1. C.*] descendit, eiusq; dextrum latus implicat, in eoq; absumitur.

Sinister sexti [*tab. 9. f. 1. e. fig. 2. o.*] paris nervus pari pacto, quo & dexter progreditur, ramulos ad eosdē musculos, ad quos & dexter, mittens, & vbi ad iugulum peruenit, in exteriorē & interiorē ramum diuiditur.

Exterior posteaquam in descensu extrorsum quidē pleurâ [*t. 9. fig. 1. q.*] pulmonisq; tunicæ ac introsum pericardio & cordi ramulos distribuit, non vt dexter^y ad arteriam [*t. 9. f. 1. E.*] axillarem cum non transfuerim, sed oblique magis sursum contendat, circa quam obuolui quidem vtrumq; potuisset, sed lubricū^z id & instabile fuisset, sed ad arteriæ magnæ truncum descendētē [*t. 9. fig. 1. C.*] qua primū ē corde emergit, & ad spinam sese inflectit extra pericardium, ramulos cōmuniter tres, nonnunquam pauciores trāsmittit; qui reflexi [*t. 9. fig. 1. R.*] & vniti nervum Recurrentē sinistrum [*t. 9. f. 1. S S.*] constituunt, qui ad Asperæ arteriæ latus sinistrū, cui adhæret, sursum mittitur, & cum dextro Laryngis cavitati inferitur. Recurrente constituto adhuc alium in sinistro tantum latere paulo inferius furculum tenuem producit, qui reflexus ad corpus venæ arteriosæ pericardium permeans ad basin cordis^a fertur, & per cordis tunicam capillorum^b modo distribuitur. Rami reliquum dextrorsum inclinans descendit.

Stomachicum sinistrum [*t. 9. fig. 1. nu.*] constituit, qui paulo sub Recurrentis exortu sub œsophago, cui adhæret, cum stomachico dextro [*tab. 9. fig. 1. ad. f.*] iungitur & ad orificium yterque nervus in multas propagines retis in morem diuiditur, & orificium amplexantur, eiq; exactissimum sensum tribuunt ita vt eo affecto cor ipsum dolere videatur : reli-

quum

y *Columbus*
an: Gal. 7. v.
part. in red-
denda causa,
cur sinister nō
conuertatur
ad arteriam
axillarem si
nistrā sibi
non satisfacere,
Et licet
veram causam
non attigerit,
sua tamen
diligentia
primum
nervus reuer-
sus ostēdisse.
z *Ex 7. v. us.*
part. 15.

a *Ad plexum*
quēdam ner-
uorum sub basi
cordis conten-
tum ferri vo-
luit Fallopius.
b *Columbus*
vult propter
huius nervi
tenuitatem,
ne in perpetuis
cordis motibus
disrumpatur,
nervum
non sub axil-
lari sinistra
recur vere, sed
sub arteria
magna.

quum secundum elatiorem vetriculi regionem fertur, pylorum adit, & in Iecoris tunicam absumitur.
[t.9.fig.1.κ.]

Interior sinistri nerui ramus etiam per Thoracem progreditur, Costalem sinistram constituit, & ab intercostalibus ramulos assumit : dein sub diaphragmate in tres ramos diuiditur : quorum primus & superior [t.9.f.1.η.] ad omentum abit, à quo ramuli duo, vnus ad [t.9.f.1.θ.] colon, & inferiorem omenti [t.9.f.1.ι.] membranam ; alter ad ventriculi fundum [t.9.f.1.λλ.] sinistram & superiorem omenti membranam petit : reliquum lienis [t.9.fig.1.κ.] inseritur. Secundus [t.9.f.1.μ. Gracum.] ad mesenterium sinistram, eiusq; loci intestina excurrit : nonnunquam ab hoc furculi prodeunt, qui vasa seminaria ad testes vsq; comitantur. Tertius [t.9.f.1.ν.] renem sinistram accedit : reliquum totius rami in vesicæ sinistram latus [t.9.f.1.ξ.] absumitur.

Ab his interioribus ramis tam dextro quam sinistro, nonnunquam ad vterum soboles mittuntur ; quamuis & vterus & vesica à Medulla spinali ossis sacri suos neruos accipiant. Haftenus de neruis à sexto pari promanantibus.

Nerui vero qui à spinali medulla Cerebri prodeunt, dum iam in vertebriis continentur, & proprie spinalis dicitur, duplices sunt, Cervicis alij, alij Thoracis.

Cervicis ^c paria sunt septem : à cuius infimis tribus neruis, vtrinque; neruus vnus diaphragmaticus vel phrenicus ex tribus furculis conflatus prodit, qui per diaphragma disperguntur.

c De loc. Gal.
de diff. nervi.
11. Et sequentibus.

Thoracis paria ^d sunt duodecim, & nerui Intercostales dicuntur, eo quod ad quodlibet costæ interstitium, & quidem proxime ad ipsum os neruus mittatur : in imo enim cuiuscunque; costæ secundum longitudi-

d De diff. nervi.
107.16.

tudinem, vbi sinus est, arteria, vena, neruus^c illâc vnâ repentes comperiuntur, quod propter sectionem Empyicorum diligenter notare conuenit, vt si per musculorum Intercoſtalium incisionem pus exhauriendum fuerit, ſectio ad ſupernam coſtæ partem adminiſtretur; obſeruatis quoq; internorum musculorum fibris, ne earum plures diſſecentur, & ſic vera conſolidatio impediatur. Sed de his Ceruicis & Thoracis neruis in ſpinalis medullæ hiſtoria dicetur.

De Corde.

CAPVT XX.

De Corde egit Hippocr. libello peculiari; Galenus 6. vſu part. 2. & 7. vſque ad 20. & 7. adm. anatom. 7. 8. 9. 10. & 11. 1. de plac. Hippoc. & Platonis. Adminiſtrationem vero in viuo animali 7. adm. ana. 12. 14. & 15. proponit Ariſtoteles 1. hiſt. 7. 3. part. 4. & 7. item lib. de reſpir. 16.

^a Gal. in art. med. non tamē pars princeps eſt, vt voluit Ariſt. qui actiones omnes in corde collocauit. ^b Hippocrati, Platoni, Ga-

COR pars princeps^a eſt, animæ irascibilis^b ſedes facultatis & ſpiritus vitalis^c fons, caloris natiui focus^d & fomes, quo ſingularum partium calor natiuus conſeruetur, eiusque influxu recreetur: arteriarum^e radix, pulſuumq; auctor. ^e Dicitur cor^f à currendo; ſiquidē propter perpetuos motus affidue currere videtur: Græcis καρδιά, quaſi & καρτία, quod leno, Stoicis ac Peripateticis omnibus: verum Zeno, Chryſippus, Poſſidonius ceteriq; Stoici & Ariſt. cum Theophr. non tantum irascibilis, ſed etiam concupiſcibilis ſedem, quam Ariſt. altricem, alij naturalem appellant. Dein Stoici cum Peripateticis rationis vim ac animæ principatum in corde collocarunt: Contra quos Galenus ex Hipp. & Plat. ſentētia diſputat in libris placitorum. ^c Vitales ſpiritus perfectiores reddere, poſtquam in pulmonibus elaborati ſint, voluit Columb. ^d Cor quaſi focus & arx corporis, 3 part. anim. 6. caloris natiui quo animal regitur quaſi fons quidam ac domicilium, 8. vſ. part. 7. & 7. adm. an 8. ^e Hipp. de alimentis. ^f Archangelo. ^g Ch. yſippo: alijs etiam καρδιά δὸν & καρδιά αἰνῶς, quod eſt vibrare, perenni enim motu cor cietur. At Archang. δὸν τῆ καρδιά πῦρ, id eſt, ab area panaria, in qua panis pinſitur, quod in corde ſanguis velut alimentarius pinſatur, & aſſidujs motibus exagitetur, vt tenuior factus commigret in ſpiritum vitalem.

quod principatum obtineat, cum non secus atque cerebrum pars princeps sit, ita tamen, vt quemadmodum cerebri maior est dignitas, ita cordis maior sit necessitas, cum huius folius visceris læsio^h hominem statim interimat: quare Philosophusⁱ corde carens nullum vnquam animal visum, cum propter^k caloris originem sit necessarium, scribit.

Situm est^l in medio Thoracis^m sinu, nobilioriⁿ loco tanquam princeps quidam, & illarum partium modo, quæ, cum vnicae sint, medium occupant, tum ob^o securitatem, tum vt corpus in æquilibrio sit: ad quintam costam à pulmonis lobis^p tanquam digitis in orbem [t. 4. N. O. P. Q. t. 5. f. 1. & 2. t. 10. f. 1. & 2.] complexum, vt æqualiter^o ex toto pulmone per arteriam renosam spiritum attrahat, & per venam arteriosam sanguinem largiatur, & per arteriam magnam vitam caloremque æqualiter in omnia extrema diffundat, capsulaque propria [t. 5. f. 1. D. E. F. fig. 2. BB.] custoditur. Ita tamen vt basis, q̄ quoad dextram & sinistram, anteriorem & posteriorem, superiorem & inferiorem partem exacte medium obtineat. At mucro [t. 5. f. 2. 3.] sinistrorsum^r magis, antrorsum tamen infra læviam papillam exporrigitur, ita vt cartilagine costæ extræ & septimæ sinistri lateris, vbi sterni articulantur, in viuente quidem rectâ^s in priora respiciat, vt

Cc 5

par-

l Situm eleganter explicauit Galenus sexto vsu partis: m 2. & 7. Columbus ait, non in medio corporis situm esse, vt placuerit Aristoteli quia centrum corporis ambilicus occupet. m Gal. 6. vs. part. 2. & 7. adm. an. 7 Hipp. de reiectione corp. ad medium ait testudinis cor situm est, rotundius ac oblongius quam in alijs animalibus. n Aristoteles 3 part. 4. cor in medio positum, natura enim rem nobilem in locis nobilioribus constituere solet, nisi quid maius impediatur. o Ex 6. vs. part. 2. & 7. adm. an. 7. p Gal 6. vs. part. 7. ubi & causam reddit. q Cor in medio quoad omnes dimensiones 6. vsu partium 2. Vesalius in quadrupedibus non bas solum, sed & cordis propemodum mucro in medio est. r Galenus 7. adm. an. 7. quare Aristoteles homini potius in partem sinistram, ceteris in medio pe-
oris 1. hist. 17. s Vt in salmone pisce cor exemptum rectâ sursum in motu eleua-
tur, neq; in latus declinat.

h Nunquam mors, inquit Gal. nisi ad immodicas cordis interperies.

i Lib. 4. gen. anim.

k In 3 part. 7.

Cor & secur

omnibus ani-

malibus ne-

cessariam, al-

terum propter

coloris origi-

nem, alterum

cibi conco-

quedi gratia:

& 3 part. 4.

Cor omnibus

sanguineis,

propter venas

qua sanguine

continent, qua-

rum cor prin-

cipium est, &

2 hist. 15.

partem anteriore, in quam mouemur, calefaciat: & quidem in latus inclinare debuit, quo diaphragmati cedat, ne ipsius motus (cum amborum perennis motus sit) impediatur, & sibi inuicem impedimento sint: non autem dextrum, sed sinistrum, quia vena caua per medium Thoracem ascendens hanc flexionem Cordis in dextram impediuit: forte etiam ut sinistra, quam Aristoteles ^t natura frigidior credidit, calefaciat; cum dextra ab Hepate à vena Caua, & à vena sine pari calidior reddatur, quo sic ambæ ^u partes robore æquales reddantur. Quare cum motus à sinistris ^u magis persentiat, propter sinistrum ventriculum, qui spiritus conceptaculum est, & arteriam magnam, idcirco vulgus & idiotæ in sinistro latere cor situm afferunt, cum in medio tanquam in loco nobiliori positum sit. Adde quod & in mortuis nonnihil grauitate sua & propter arteriæ magnæ, quæ ei affigitur, pondus ad sinistrum retractum videtur.

Connectitur beneficio pericardij, mediastino & [t. 5. f. 1. ab F. ad G.] diaphragmati, & per vasa alijs partibus nequitur, cum principia ^x inter se aliqua in re connecti & communicari debeant, aliàs liberum, quo liberius moueatur. At in canibus & simijs Cor magno interuallo à diaphragmate distat, in quibus eius situs rectus est. ^y Figura est [exprimitur tab. 5. fig. 2.] vi Hipp. ^z voluit, pyramidalis: vel potius turbinatâ & nuci pineæ quodammodo respōdens, cum breui lateq; Thorace sit homo: ab ampla ^a namq; ac orbiculari, non tamen ^b omnino rotunda, superna [t. 5. f. 2. C. D.] basi exortū, paulatim in [t. 5. f. 2. E.] conum definit; talis. n. figura suæ functioni accommodata erat cum longitudo ad tractum, rotunditas ad amplitudinem & robur faciat, non tñ vndiq; æqualiter crassum est: & in maximis dilatationibus sphericum, quod capacius sit: in ipsius contractionibus oblongum &

t In 3. part. anim. 4.

u In 6. vsu part. 2. decepti, ait, eo quod pulsus ad mammam sinistram persentiat.

x In 7. adm. anat. 9. & de plac.

y De figura 6. vs. part. 7. & causam cur talis sit refert.

z De corde. Verum in homine potius depressum, in brutis pyramidale.

a Ex 6. vsu part. 7.

b In mucronem exit, parte extrema in acumen collecta 1. hist. 17.

qua

quasi pyramidale (præsertim c in brutis) cernitur. Huius superior pars, quæ βάσις, basis, κεφαλή, caput & radix dicitur [t. s. f. 2. C. D.] latior est propter vasa, quæ eo loci egredi & ingredi debet: forte et propter cordis motum, quo sinus maiores in basi hac excauetur, quo in cordis contractione sanguis uterque locum habeat, quo confugiat, ne vehementer pulsus, locoque angusto inclusus, cordis substantiam continuam frangat. Inferior vero κορυφή, d vertex, στυθὴ, mucro, e conus, cuspis & apex: Hippocrati ἐπ' ἀγρίου, extremum [t. s. f. 2. E.] & cauda dicitur (quam cordis partem abiectionissimam, ut illam dignissimam Galenus dixit.) At antèrius cor gibbosum est, posterius simum & in lateribus prominens. Superficies ipsius lævis & polita foret, nisi adeps & vasa coronaria sanguine tumentia eam inæqualem redderent.

Magnitudo non est omnibus eadem: & in homine, quemadmodum Cerebrum & Hepar proportionè, quam in cæteris animalibus maius est: quod longitudine sex digitos transversos æquat; latitudine quatuor, quemadmodum & altitudine. At in timidis animalibus proportionè magnum est, propter calorem, qui in magno conceptaculo, Aristotele e docente exolefcit. Cordis partes aliæ sunt externæ, internæ aliæ. Externæ, pericardium, de quo dictum fuit: tunica, adeps, vasa quæ duplicia sunt, alia quæ cor cingunt, alia quæ orificijs in cordis ventriculos per-tingunt, & Auriculæ. Internæ sunt substantia car-nea, Ventriculi & Valuulæ. Tunica tenuissima f cor ipsum, cui propria est, proxime vestit, eo modo, quo muscoli membrana peculiari inuestiuntur & distin- guuntur, quod ipsius substantiam firmiorem reddat, quæ ab ipsius substantia integre diuelli nequit.

Adipis & non parua copia circa cor ceu glutinum

nullam pinguedinem nasci: Adeps, Vesalio: pinguedo seu adeps Archangelo.

c Cor simile non habent, quæ corde prædita sunt. 3. part. an. 12.

d Galen. 7. adm. an. 7. e Ex 6. vsu part. 7.

e In 3. part. 4. cor magnum proportionè, lepori, ceruo, mure, hyana, asino, panthe- ra, mustela, & reliquis ani- malibus, quæ aperte timida sunt, aut propter metum malefica.

f Vesalius as- simulat mem- brana muscu- los vestienti. g Pinguedi- nē vocat Co- lumbus, & reprehendit Aristotelem & Galenum, quod dixe- rint; circa cor

*h Quia ibi
concoctio per
ficitur eorum,
qua in corde
continentur,
non autem in
cono. Arch
ang. & alte-
rum vsum di-
cit, ut faci-
lius sit cordis
motus.*

*i In tempe-
ram.*

*k In 16. vsu
part. 2.*

*l Vesal. lib. 1.
cap. 3. notauit
in sinistro vē-
triculo glandu-
lulosa, sed
subnigrican-
tis carnis li-
bras propemo-
dū duas corde
concreto & ho-
mine ante
mortem me-
lancholico,
pulsu multis
mensibus mi-
re inaequali;
qui ex sinistri*

cumulatur potissimū ad ipsius ^h basin, vbi vasa ma-
iora locantur, & minora per cordis superficiem pro-
grediuntur, qui durior est, quam in alia parte. Adi-
pem vero voluit natura hoc loci necessario esse, non
autem pinguedinem (siquidem ne circa cor, aliam-
ue partem calidam pinguedo coalescit ex Philoso-
phi & Galeni ⁱ decreto) quia facillime à cordis calo-
re, & quidem magno incommodo, liquata fuisset.
Cuius vsus cor humectare, ne ex continuo motu ca-
lesfactum penitus exsicceetur, cum adiposa humiditas
difficilius absumatur, ipsumq; refocillare, & vasa cir-
ca cor, ne nimio calore vrgente diffiliant, velut in-
ungere. Dein cum cor fons sit caloris, qui perpetuo
gliscit, tanquam pabulum sufficiens & necessarium
quo foueatur, & in magnis inedijs nutriatur ac susti-
neatur, tribuit, ne humidum radicale citius absuma-
tur. Quare Galenus ^k eum adipi vsum tribuit, vt in
ingentibus caloribus & inedijs & frequētibus exer-
citationibus deseruiat. Sic Auicenna dixit, pingue-
dines & adipis cōgelationem supra corpus minui &
augeri secundum minorationem caloris & eius au-
gmentum : itaq; calor adipem & pinguedinem pa-
bulatur. Sæpe in dissecctis cordis ventriculis in ipso-
rum cavitare, frustula quædam, ^l si non adipis saltem
adipi simillima obseruauimus; ita vt magis mirum
sit, quomodo is ibi concreseat, quam is qui supra cor
ipsum est. Conus vero ab humore in pericardio cō-
tento humectatur.

Vasa obtinet, quæ cor in ^m orbem [t. 5. f. 2. l. & ra-
mi ab his ZZ. t. 10. f. 2. D.] cōplectuntur : Venam Coro-
nariam à ⁿ cauæ trunco [t. 7. E.] antequam in dex-
trum vētriculum inseratur (raro geminam) ortam,

quæ

*cruris gangrana interiit, cum ante annos aliquot sclopeti ictu, arteria, qua sibi-
dam petit, vitata foret. m In 6 vs. part. 18. vbi potissimum de neruo agit & 7.
adm. an 10. n Gal. 6. vs. part. 14.*

quæ coronæ instar basin cordis cingit, cui Valvula, ne sanguis in cavam refluat, apposita: ab hac rami deorsum per ipsius superficiem sparguntur, qui à sinistris plures & maiores sunt, cum densior sit & solidior dextra parte. Hæc sanguinem ab hepate tantum elaboratum pro ipsius substantia solida & densa nutrienda deuehit, vt sic alimentum rei alenda proportionē respondeat. Per hanc quoq; anima naturalis in spiritu naturali insidens in cordis substantiam cum omnibus suis facultatibus perfertur.

Arterias nōnunquam ° duas coronarias [t.12.fig.1. BB.] ab arteriæ magnæ trunco descendente prodeuntes, accipit, quæ vna cum vena per ipsius substantiam distribuuntur, quo eius calorem innatum foras eueant, spiritumque vitalem largientes eius vitam sustentant. Si enim viueret spiritu in sinistro ventriculo absoluto, & absque arteriis in eius substantiam delato, tum etiam potuisset per cordis poros efferri & dissipari.

Nervos P exiles habet à sexta 9 coniugatione [t.10. fig.1. K.] vel à 1 neruulis ad pericardium missis, qui in cordis basin [t.10. fig.2. h.] secundum venam arterio-ram, sed non admodum 1 perspicue, distribuuntur

& qui-

o *Dua arteria maioria soboles 7. ad m. an. 10. nōnunquam bina Columb. p Vide 1. de placit. 9. Col neruulus à sinistro recurrens ad membra nā cordis substantiam involuentem proficiscitur: Ves. Neruulus in cordis basin:*

Archang. nervi in cor valde exiles, ut cor sentiat & etiam moveatur. At Fallop. nerueum dicit plexum his verbis: ubi vena arterialis ad sinistram latu fl. Et incipit & ubi adest meatus arterialis in Embryone, qui venam arterialem cum arteria magna coniungit, plexus quidam est aut complicatio nervea à qua abundans copia nervosa materia totam cordis basin amplexatur, perque ipsam plures propagines nervorum parvorum inde diductæ disperguntur, per totam ipsius substantiam. Hoc Anatomici ligamentum fortasse ratum neglexerunt, hacque ratione non viderunt, quod nervi in cor ferantur. Nerueus autem iste plexus originem ducit à quinq; nervorū propaginib. quamvis aliquando quatuor tantū sint, quinq; tamen ut plurimū reperuntur. Hac ille: Laurent. dicit: nervos à sexta coniugatione exiles, quid enim cohorte nervorum Fallop. opus, cum eius motus animalis non sit, seu naturalis. q Gal de diff. ner. 10. 6. vs. par. 18. & 7. ad. an. 8. i Gal. 6. vs. par. 18. Manifeste in cor inseri in maioribus saltem animalibus cernuntur, quo tamen ipsum diuidantur modo sensu perspicue dignosci non potest, quemadmodum in hepate, renibus ac liene 6. vs. par. 18.

& quidem nonnullis volentibus tristantium duntaxat sensus gratia, non autem motus, eo quod eius motus naturalis sit, non animalis. At si, ait Archangelus, vnum, non duo mouendi principia in nobis sint constituenda, tum cerebrum quoque, quod animæ sentientis sedes est, omnium motuum principium erit (At istoteli enim opinionem, qui omnes animæ vires & facultates vni Cordi tribuit, Galenus & posteriores refutarunt.) Sicq; Nervus hic in cor non solum facultatem sensificam, sed etiam motuam deferet, & facultatem pulsificam, seu motû dilatationis & constrictionis immittet. Et hic nervus nonnunquam, tametsi raro, de repente obstruitur, vnde repentina & inopinata mors sequitur, quam subitanæam vocant, præpeditis & vitali & pulsificæ facultatibus in cor peruenire nequeuntibus. Verum cū Galeno ^t censemus vim pulsatilem ex ipsius cordis corpore oriri, non autem à nervis: his enim præcis, cordis pulsus cessaret, cor thorace exemptum moueri non posset.

t 7. Adm. anatom. 8.

*De substantia, ventriculis & Auriculis
Cordis.*

C A P V T X X I.

De substantia 6. vsu part. 8. 7. adm. an. 8. De ventriculis 6. vs. part. 9. & 16. 7. adm. anat. 11. Arist. 1. hist. 17. eiusd. 3. & 3. part. anatom. 4. De auriculis 6. vs. part. 15. 7. adm. an. 9. Galenus egit.

a Caro dura
egre patibilis
6. vs. part. 8.
b Galen. 7.
adm. an. 8.
c Aristot. 3.

SUBSTANTIA cordis est caro ^a crassa [t. 10. f. 3. hoc ostendit] rubra, cum ex crassiore sanguine ortum ducat, muscoli carne minus rubra, magis tamen ^b dura, admodum densa ^c & solida, ne spiritus ^d calidiorq;

part. 4. Cor spissum est vt principium caloris seruare possit. d Vt eadem sit coram ad contentum spiritum, que fornacis ad ignem, comparatio.

orq; e innatus, quæ in Cordē continentur & in omnes corporis partes effunduntur, exhalent, neque in validis motibus ac continua dilatatione ac contractione frangatur, quod in mucrone quam in basi spissius & solidius est, cū hīc fibræ rectæ ob earum concursum compactiores sunt, quemadmodum in musculorum vel capitibus vel tendinibus id quoq; observatur: hæc caro sedes est facultatis vitalis & primaria causa functionum cordis: quæ potissimum in sanguinis & spiritus vitalis confectione consistit. Omnis enim generis^f fibras (hoc est rectas obliquas & transuersas) robustissimas & compactissimas innicemq; commistas (idcirco nō vt in musculo conspicuas) ad motus præstandos iniuriasque ferendas obtinet. Quare ex Galeni & sententia (qui aliquando cōmuni cum reliquorum viscerum carne *καρὲν* *χρῆμα*,^h nonnunquam carnosum viscus vocat) Musculus non est, cū omnis generis fibras habeat & non motu voluntario moueatur, cū ipsius decreto Musculus sit motus voluntarij instrumentum: At motus Cordis, qui ex viscerisⁱ substantia dependet, non est voluntarius, sed naturalis, nec quoad animal vixerit, cessare potest, Musculorum vero actio subindeⁱ quiescit, ac rursus excitatur animalis arbitrio subseruiens. Hippocrates tamen musculum^k fortissimum appellauit, nec male, cū musculum definiat^l carnem in orbem circumductam, qualis est cordis caro. Quare ambo suis definitionibus innixi recte dixerunt: idcirco pro Hippocrate dixit Piccolhornius^m in nobis alium esse motum naturalem, cuius musculus est Cor: alium esse motum voluntarium, cui omnes reliqui nostri corporis muscoli inieruiunt: quemadmodum plenius in commentario nostro in libel. Hipp. de corde ostendimus.

ⁿ Motus autem Cordis, qui perennis est, ob perpetuam

^e *Mucronis pars carnosæ & spissæ 1. histor. 17. vide Galen. 6. vsu part. 7.*

^f *In 6. vsu part. 8.*

^g *De mot. musc. 3. 6. vs. par. 8. 7. adm. an. 8. & Columb. nullo pacto inter musculos connumerari possescribit.*

^h *In 1. fac. nat. 6.*

ⁱ *Ex 7. adm. an. 8.*

^k *Libr. de corde.*

^l *Libr. de arte.*

^m *Musculum definit esse instrumentum carnosum motum edens in animali.*

ⁿ *De motu cordis ratione fibrarum & ligamentorū 6. vs. part. 8.*

TABVLÆ huius X. *Figura 1. Cor in sinistrum latus. fig. 2. in dextrum latus reflexum à pericardio denudatum cū pulmonibus exhibet. fig. 3. per transversum dissectum. fig. 4. per dextrum ventriculum & cauae orificium dissectum. fig. 5. per dextrum & venarum arteriosae orificium. fig. 6. per sinistrum & arteriae venosae orificium. fig. 7. per sinistrum & arteriae magnae orificium dissectum, proponit.*

FIG. I.




FIG. II.




III.



V.




VI.



IV.

VII.



VIII.



petuam spirituum generationem, cū ijs omnes partes indigeant, duplex est, diastole & systole constans, qui à fibris perficitur: quamdiu enim animal viuit, & dilatatur & contrahitur, & inter vtrumque motum quies intercedit. Dilatatur enim quando mucro ad basin rectis fibris retrahitur, tumque breue quidem redditur, ° sed cordis latera ita distenduntur vt quasi sphæricum appareat; cuius vsus, sanguinem per cauam venam in dextrum: aerem per Arteriam venosam in sinistrum ventriculum trahere, valuulis demissis & ingressui cedentibus: & hæc cordis est, diastole, dilatatio & amplificatio. Contrahitur vero quando mucro à basi discedit, & tum cor producitur quidē, sed angustius euadit, rectis fibris laxatis & transuersis, quæ orbiculatim cor ambiunt, impense collectis & arctatis, valuulis cauæ & arteria venosæ ex parte clausis, arteriæ vero magnæ & venæ arteriosæ reclusis exitum præbentibus sanguini dextro per Venam arteriosam in pulmones, è sinistro vitali spiritui in Arteriam magnam, & portione sanguinis vitalis cum fuliginibus per Arteriam venosam: hic motus Cordis systole seu contractio & depressio dicitur. Adiuuant P autem non minimum, imo omnium maxime totam propemodum efficiunt contractionem ligamenta [tab. 10. f. 6. 2. f. HH.] robustissima, quæ in intimis ipsius Cordis ventriculis tenduntur, vt quæ dum contracta consident, etiam Cordistunicas intro simul contrahere queant. Intermediæ denique exiguæ quieti obliquæ fibræ, quæ secundum Cordis longitudinem oblique feruntur, præfunt, & quæ attracta sunt, earum ministerio in ventriculis tantisper retinentur, corde circa ea, P quæ continet, vndique affricto. Verum si in viuâ sectione alicuius animalis cordis motum studiose obserues, quatuor motus loco & tempore distin-

o Vesalius ostendit exemplo viminei circuli, cui orbiculatim plurimorum iuncorum radices connectuntur, & mucronibus simul iunctis velut pyramidem formant.

p Gal. 6. vs. part. 3. fibris omnibus agētib, & earum maxime obliquis, quies fit.

distinctos aspicias, quorum duo sunt proprii auricularum, & duo ventriculorum.

Cavitates 9 sinusve, quos Ventriculos, Hippocrates ἡσπέρη, Galenus κοιλίαι ¹ vocat, duos insignes ² habet, amplitudine & forma variantes: horum dexter [t. 10. fig. 3. GG.] qui non exakte rotundus, propriam circumscriptionem ³ superficialem, & instar crescentis Lunæ semicircularem habet, (cum septem semiorbis instar in hunc sinum extuberet) qui, vt inquit Hippocrates, caudam cordis ambit, & ad mucronis ⁴ extremum non peruenit: latior est, & multo maior altero, propter sanguinem, quam continet copiosum: quare Galeno & Rusto, sinus sanguineus ⁵ & πλεκομένη, id est, venosus dicitur: parua in dextere, molli ⁶ & pariete tenuiore [tab. 10. f. 5. GG.] paruitus, quo contenti grauitatem compen-

dd 2

q De his 6. vsu part. 9. & 16. 7. adm. anat. 11. & Gal 6. vsu part. 11. δεξιὰ μὲν vocat, vbi alij lacunam, alij cisternam vertebrae. Pollucis ἡ δὲ δεξιὰ: alij specus, diribitoria, thalamos vocant. Aristoteli tres in maioribus animalibus (contra quod Galenus 6. vsu partium 9. eandem equum fabricam habere, qui maximus est, & minimū passerulum asserens, & 7.

dm. anat. 10.) duo in minoribus, & nullum est quod sine ventriculo constet, quia conceptaculum sanguinis: 3. part. 4. maximus in dextero latere, minimus in sinistro, medius magnitudine inter dextrum & sinistrum, omnes ad pulmonem foraminibus perui, i. hist. 17 & 3. hist. 3. & Ex 7. adm. anat. 11. idq. magis in magnis animalibus vt equis, bobus, camelis: multo magis in elephantis: nonnunquam vbi in minutis etiam: nam gallum quissiam sacrificans, cor inuenit fastigiatum lobis verticibus: non erant duo, sed dexter vertex circumscriptionem peculiarem habebat. ⁴ Vesalius vult magis ad mucronem, sinistro descendere. ⁵ In 6. u. partium 7 & 12 ⁶ Galenus 6. vsu partium 16. 2. Qua aerem inspirans fauces, nares, os, his quoque pulmo & dexter cordis ventriculus: alijs omnibus neque pulmo, nec dexter ventriculus 6. vsu partium 9. & 11.

tissimum gratia hic ventriculus creatus, cum in iis animalibus tantum habeatur, quæ pulmones habent, in cæteris vero, quæ nō respirant, sed tantum transpirant, vt in piscibus dexter sinus non est: Et sic cor

a Ex 6. vsu
part. 10.

^a pulmoni, qui in ipsius gratiam aerem attraxit, alimentum opportunum conficiendo gratiam reponit.

Sinister ventriculus in medio [*tab. 10. fig. 3. H. H.*] cordis exacte exsculptus: si portionem, quæ dextrū constituit demas, conspicitur, & altero angustior est, cum minorem materie copiam contineat & orbiculari cavitare donatus ad ^b mucronem vsque ver-

b Summū ver-
ticem 7. adm.
anat. 11.

git: carne seu pariete ^c est triplo quam dexter [*ta. 10. fig. 8. P. Q.*] crassiore, tum quod minor cavititas illam

c De varia-
te substantia
ventriculorū
egit 8. vsu par-
tium 16.

crassitiem relinquat, tum quod calidum innatū custodire debeat, eaque durior & solidior, ne spiritus vitales exhalēt, & quo corpus ^c in æquilibrio sit neue cor in alterutram partem propendeat. Cum enim in hoc spiritus & sanguis vitalis tenuissimus, in illo sanguine crassior contineatur, debuit ventriculus huius crassities contenti leuitatem compensare. In hoc spiritus vitales & elaborantur, & cum sanguine arterioso continentur: Quare Galeno & Ruffo, sinus spirituosus ^d, aliis spongiosus, aerius, arteriosus ventriculus dicitur.

d In 6. vsu
part. 7. Cap. 12.

In huius enim cavitare vitalis spiritus elaboratur qui hinc per arterias in vniuersum corpus distribuitur, quo innatum singularum partium calorem foueat, sopitum suscitet, & quasi absumptum resarciat. Cuius materia duplex est, aerea & sanguinea, Galeno ^e tradente, simul mixta. Aer & per os & nares inspiratus, in pulmone præparatus per Arteriam venosam, dum cor dilatatur, in sinistrum ventriculum fertur. Sanguis vero in dextro ventriculo attenuatus & concoctus, partim in pulmones pro eorum nutritione per venam arteriosam distribuitur: partim

e Lib. 7. de
pac.

per septum à ventriculo attrahitur, & insita proprietate retinetur, qui cū aere permixtus vi cordis insita & innato spiritu ac calore & perenni motu absoluitur, vitalis spiritus formam induit, sanguis arterialis & spiritus vitalis nutriuntur: qui spirituosus sanguis in cordis contractione in Arteriam magnam pro totius corporis vita effunditur; cum vita omnis à corde sit & vitali spiritu. Vtriusque autem ventriculi superficies interior inæqualis est & aspera, ne substantiæ cor ingressæ, priusquam perfectionē adeptæ sint, inde excidant: ad quod & Valuulæ plurimum faciunt. Inæqualitas autem ista fit partim ob foueas plures, quæ in sinistro ventriculo insigniores sunt (quare^f Hippocrates magis corrosus dixit in dextro, quia insitus à natura ignis in hoc continetur: Hic diuinus ille calor est, quem Prometheum à cælo furatum fingunt, ut hominem vita donaret: in hoc sinu propter insignem calorem, mentem indidere Hippocrates existimauit) partim propter carneas portiunculas [*t. 10. fig. 5. OO. f. 6. L. f. 7. HH. f. 8. M. t. II. f. 2. ff.*] quæ circa cordis mucronem tenues & graciles occurrunt, quibus fibræ nervosæ [*tab. 10. fig. 7. GG. f. 8. L.*] Valuularum, à quibusdam & ligamenta cordis dictæ, ad crescunt.

f Lib. de corde.

Diuiduntur ventriculi Septo, & quod interstitium [*t. 10. fig. 3. II. fig. 6. HH. fig. 7. K. f. 8. R.*] seu paries dicitur, ne contenta^h commisceantur, quod à dextris gibbum & extuberans, à sinistris concavum, eiusdemque crassitie cum sinistri ventriculi latere sinistro, quasi cor sinistri ventriculi gratia creatum esset: cauernosum est & scrobiculis plenum (Aristotelis forte medius ventriculus) quo sanguis subtilior reddatur, porosumⁱ etiam potissimum dexterum, quo sanguis ex dextro in sinistrum pro vitalis spiritus generatione permeare possit, quod

g Gal. 6. vsu part. 8. & Archang.

h Vt distinguat sanguinem alimentarium à vitali, Archang.

i Ex 6 vsu part. 15.

k In 3. nat. fa
cult. 15.

l De sangui
ne ex quo fiat
vitalis spiri
tus, opiniones
plures. 1. Ga
leni, Archi
ang. Lauren.
ferri ex dex
tro sinu per
septum in si
nistru: quem
transitum et
sam Auer.
1. coll. agno
vit. Vesalius
p. 746 fate
tur se ignora
re, quomodo
per septum
propter ipsum
crassitiam ex
dextro in si
nistru vel mi
nimum quid
sanguinis as
sumi possit.

Galenus^k his verbis innuit: ex dextro sinu trahitur, quod tenuissimum est per foramina septi, quorum extremos fines vix cernere licet: tum quia in de mortuis concidunt omnia. Ferri autem per eos ductus sanguinem, hinc patet, quod natura nil temere vnquam & frustra molitur: at foueæ sunt in septo & profundi sinus quamplurimi, qui in angustum terminantur: hæc Galenus. Hæc spiracula maxime fiunt conspicua in Corde bubulo longa coctione optime elixato. At nonnulli negant hunc transitum^l volentes per Venam arteriosam ferri sanguinem ex dextro ventriculo in pulmones cuius altera portio in pulmonum nutritionem cadat, altera vero magis in pulmonibus alterata cum aere attracto & commisto per Arteriam venosam in sinistruum ventriculum pro spiritus & sanguinis vitalis & nutritione & generatione deferatur; quæ sane opinio aliàs placuit. Sed philosophantibus hæc relinquimus, cum nobis propositum sit, veram partium structuram, earumq; verum vsum, quantum Deo concedente assequi possumus, persequi.

At

2. Columbi & Plat. sanguinem in dextro attenuari, & per venam arteriosam in pulmonem deferri, & non per foramina septi transire.

3. Botall. ferri per ductum à se inuentum, qui à dextra auricula in sinistram feratur, qui in vitulis & iunioribus reperiatur, in homine & prociatoribus animalibus non ita patere (imo omnino perit ductus hic, à Galeno inuentus.)

4. Vlmi: Sanguinem arteriosum in liene percoqui, attenuari, preparari, deinde in Aorta truncum, & ab eo in sinistruum Cordis ventriculum ferri, ubi cum aere in pulmonibus preparato misceatur: (an non valvula hoc impediunt, quas ille male triulcus appellat.)

5. Varoli, qui ait, nullum vnquam demonstrasse, quomodo hic fiat transitus, & nullam realem viam extare. Arterias dicit plurima copia intestina adire, ut portionem chyli purissimam ad sanguinem arterialem generandum idoneam exsugant, & ad cor deferant; qui sanguis cum in sinistro cordis ventriculo generetur, & nullus sit transitus à dextro in sinistruum cordis sinum, dicendum, materiam ad hunc desumi ab intestinis, & per arterias rectà ad cor ferri.

Galenus 6. usu partium 15.

At Cordis basin seu caput, vtrinque appendix [t. 9. f. 2. I. K. t. 10. f. 3. B. E.] vna adnascitur, quæ non ab utilitate aut actione aliqua, sed à parua similitudine, m m Hippoc. de Auricula, ὡς ὁ ὤτος ἰσθμὸς dicitur, cum ex longa basi Corde. Galenus 6. v. s. partium 15. 7. ad. in mucronem obtusum desinant; quæ circa ventriculos ante ^l orificia vasorum, quæ materiam ⁿ Cordi inuehunt, locata sunt: dextra [tab. 5. f. 2. I. t. 10. f. 1. B. f. 3. B.] quidem venæ cauæ [tab. 10. f. 3. A.] adposita, maior est, & cum ipsa vena veluti commune corpus efficit, suoque mucrone sursum spectat. At sinistra [tab. 10. f. 2. F. f. 3. E.] ad Arteriam venosam [tab. 10. f. 3. D.] sita, multo minor est, cum huius orificium venæ cauæ orificio minus sit, & aer ipso sanguine fequacior sit. Est etiam acuminatior, magisque in latus exporrigitur, & superficie externa rugosior est, quam sit dextra, multoque durior, pauloque carnosior & crassior, cum auriculæ proportionem quadam ventriculis correspondere debeant, cum cordi ad quandam materierum præparationem famulari videantur. Cauæ ⁿ sunt, vt sinus ante Cor producantur; peculiarem ^o substantiam sortitæ sunt, qualis in nulla alia particula habetur. Sunt cuticulares, ⁿ ne attractionis impetu rumpantur, & vt prompte motum Cordis sequantur, siquidem valvularū P modo tendantur ac contrahantur; quæ oppletæ & extensæ gibbæ & æquales: cōtractæ vero rugosæ foris cernuntur: intrinsecus vero ventriculorū superficiē [t. 10. f. 5.]

D d 4

dextra

m Hippoc. de
Corde. Gale-
nus 6. v. s. par-
tium 15. 7. ad.
anat. 9. at 8.
Cordis proces-
sus vocat:
partes Cordis
Herophilus 7.
adm. an. 11.
At Hippocra-
tes ex alio-
rum senten-
tia aures vo-
cat; nam lib.
de sacro mor-
bo ridet eos,
qui aures ap-
pellant, cum
non audiant;
& Galenus 6.
usu partium
15. temere sic
nominatas
dicit.
n Galenus 7.
adm. anatom.
9. at non esse
auricularum
& cordis eun-
dem motum
volunt. Cor
enim quia di-

stenditur, impletur: at aures quia implentur, distenduntur, quod tacite indicasse Hippocr. videtur, dum ait: Cor tota sua natura agitur, at aures priuatim tum intumescent, tum concidunt, sic & in vinorum sectione auriculæ etiam deficientes cordis motu aliquando palpitant, & mouentur. Gal. 7. adm. an. 15.

o In 7. adm. an. 8. dicit Archangelus membranas appellari, videri tamen tendinosas: nam cum cor musculus sit, suum tendinem habere par fuit: vel certe sunt ligamentosa. Hipp. μελιδυρὸν καὶ σπυγγώδεια molles & caneriosa.

P Ex 6. usu partium 15.

*dextra inuersa rugosa. f. 7. sinistra inuersa. i. f. 8. N.] inæqua-
li respondent. Tenuēs sunt, P vt facilius contrahantur: molles, neruosa^a roboris causa; fortissimum P enim est, quod neruosum est. Harum vsus (cum sint Cordi P tanquam promptuaria, sanguinis & aeris, quæ repente irruunt) ne animal subito illapsu suffocetur, Corve lædatur: dein vasa, quibus adponuntur, in Cordis o motibus tuentur, cum P tunicam tenuem ac mollem habeant, quæ dum subito P repleta tēduntur, rupturæ subiecta fuissent. At Hippocrates flabelli loco cordi, id vt refrigerent, tributas voluit, quemadmodum fornacibus fabrorum folles admouentur, vt per hos spiritus apprehendantur.*

De vasis Cordis, & eorum valvulis.

CAPVT XXII.

De Vasis consule 6. vs. part. 10. & 11. 7. adm. an. 6. de Valvulis 6. vs. part. 11. 14. 7. adm. an. 9.

a Gal. 7. adm. anat. 6. Vasa: in singulis quatuor vasis duo motus contrarij sunt, quæ quatuor vasa maxima à basi cordis nascuntur, & eorum primum principium cor est.
b In 6. vs. part. 11. & 14.
c Vesal. & Vareliu.

VASA^a quatuor, totidemq; ^b orificia circa Cordis basin in eminentiore ventriculorū sede obseruantur, quorum ortum à Corde pendere nonnulli ^c volunt: Sunt autem in quolibet ^b duo quæ Hippocrates ^d humanæ naturæ fontes vocat: in dextro vena caua [t. 5. f. 2. F. t. 10. f. 1. C. f. 2. NN.] & vena [t. 5. f. 2. G.] arteriola: in sinistro Arteria [tab. 10. f. 2. G. H. non recte expressum] Venosa & Arteria [t. 5. f. 2. H. t. 10. f. 1. H. f. 2. O. P.] magna: quibus intus Valvula seu ostiola, quæ Hippocrati ^d pelliculæ cordis latitantes, Galieno ^c & quæris & membranarum epiphyses dicuntur vndecim numero, ex ipsiis ^e orificijs ortæ, adponuntur, quarum alix triculpides, alix semilunares: & ha-

run

d De Corde. e In 6. vs. part. 14. 7. adm. anat. 9.

um aliæ ^e ab exteriorē intro in Cordis ventriculos ^f Gal. 6. vii. eruntur, ad quos etiam Ligamentis ^f fortibus ad se ^{part. 8. & 19.} tum maxime versus mucronem adnectuntur, quo n dilatatione cordis ligamenta tensa trahant ad se & velut resupinent Valuulas ad cordis corpus: aliæ b interiorē situ foràs vergunt, cum primū vtrumq; as è corde prodit, vasis quidē materiam intromittentibus fortes (cum non tantum materiæ regressum impedire debeant, sed etiam g attrahendi sint nstrumenta) & magnæ: emittentibus vero imbecilliores. Omnes vero in Cordis dilatatione extenduntur, in qua trifulcæ ^h veluti fissuras inter sua filamēta interiectas efficiunt, per quas fissuras materiæ invehuntur: Sigmoides vero extrema suorum vasorum prorsus claudunt, & materias egressas remeare prohibent. At in contractione omnes contrahuntur, & tum trifulcæ spatia inania, quæ dilatatæ efficiebant, claudunt, & materierum regressum impediunt. Sigmoides vero flaccescentes fissuris committuntur, quo libere sanguis & spiritus egrediantur: & harum primus Hippocrates meminit, & tanquam mirificum naturæ arcanum extollit. Omnium autem tale artificium est, vt si tensæ simul fuerint, i In 6. vsu ^{part. 11.} teterintq; erectæ, totum orificium obstruunt. Communis vero omnium ipsarum vsus est, vt materias emigrare retro prohibeant: Proprius vero earum quæ intus ^k foràs feruntur, & materias è corde edu- ^k Ex 6. vsu ^{part. 20.} unt, ne amplius ad ipsum remeent: inducentium vero & quæ foris intro feruntur, ne amplius contrà x ipso effluant: idq; ne cor vario labore fatigetur. Verum cum horum vasorum alia sit in corde foetus a vtero contenti, alia vero hominis iam vtero exclusi constitutio, de his primo agamus.

VENA CAVA diaphragmate [tab. 10. f. 1. D. f. 2. NN. transitus venæ ostenditur.] perforata & ad cor delata, ra-

1 Galen 6. vsf.
 part. 4. altera
 pars caua in
 ipsum Cor in-
 figitur: altera
 vero & in
 ior recta sur-
 sum ad iuga-
 lum fertur.
 in Vesal pag.
 735. ad Gal
 inseri voluit
 Colūbus hinc
 exoriri negat,
 imo ne cor in-
 gredi, sed ori-
 ficio dextri
 ventriculi ad-
 harere. At
 Archangelo,
 caua de sini-
 stro pariete
 ramum emit-
 tit, quem in
 dextrum si-
 num inserit.
 n Gal 6. vsf.
 part. 14. 7.
 adm an. 9. te-
 lorum cussi-
 dib. quo Tur-
 ce vtuntur,
 Vesalio.
 o Nervulos
 suis in cauis
 continet. 1. hi-
 stor. 17. nervo-
 rum copia in
 Corde, 3. part.
 4. hic forte deceptus Arist. qui filamenta hac nervos opinatus est, Columbus.
 p Sagittarius & Sigmoeides dici vult Archangelus. q Vesalio.

mo breui à sinistris emisso, amplo patenteq; orificio
 [t. 10. f. 1. à C. ad B.] & quidem portæ orificio vel triplo
 maiore, ab auricula dextra excipitur, moxq; dextro
 ventriculo [t. 10. f. 5. CC. orificium ostendit.] inseritur,
 cui ita firmiter adhæret, vt ab eo separari non possit
 (quare inde nonnulli ^m cauam [t. 10. f. 1. C.] omnesq;
 venas exoriri voluere) & propter robur Cordis Ra-
 mus hic ligamentosus redditus est: cuius rami vsus
 est, sanguinem ab Hepate sursum delatum ad ventri-
 culum dextrum deferre, quo in eum, dum Cor dila-
 tatur, effundatur, vt in eo pro pulmonum nutritio-
 ne, quem tenuiorem exigebant, maxime vero ad fu-
 turi sanguinis & spiritus vitalis procreationem, in
 sinistro ventriculo mox gignendi magis attenuetur,
 cuius postmodum maior pars per venam arteriosam
 [tab. 10. f. 5. P.] in Cordis contractione effertur. Hu-
 ius orificio membranæ circulus [tab. 10. f. 5. HH.]
 Cordi robur præbens adnascitur, qui introrsum
 procedit, & non procul à principio in tres valvula
 seu membranas [tab. 10. f. 5. K. L. M.] ianitrices vali-
 das scinditur, quæ ex ampla basi in obtusum mucro-
 nem desinunt, & cum clauduntur, inuicemq; con-
 niuent, cuspidum ⁿ telorum eminentijs atque angu-
 lis (quos Græci *τλωχίνας* dicunt) triangularibus
 vel spiculorum fulcis similitudine respondeant *τρι-
 τλωχίνας* trifulcas & tricuspidēs ^p nominarunt, quæ
 pluribus filamentis [tab. 10. f. 5. NN.] seu fibris (qua
 Aristoteles nervos ^o vocauit) simul iunctis carnei
 explantationibus [tab. 10. f. 5. OO.] accrescunt, vt a-
 ijs tanquam ligamentis in cordis compressionibu
 tendantur, quibus tensis orificium pene clauditur
 at circulus hic apertus cum suis fibris, coronā, q qua
 lis Regibus antiquitus imponi consuetū erat, quæ
 damme

iammodo refert. Et hæc ut & Arteriæ venosæ foris intro spectant, ne sanguis in Cordis contractione in cauam regurgitare possit : quomodo ergo statui potest, sanguinem pro totius corporis nutritione in corde elaborari, cum ex ventriculo in cauam sanguis effundi non possit, sed in pulmones? quare necessarium foret ex pulmonibus dari viam in Cauam, vnde iam in totum corpus spargerentur.

De Vena arteriosa, & Arteria venosa egit Gal. 7. adm. an.

4. & 5. 6. vs. part. 10. & 11.

Alterum dextri ventriculi vas ^a VENA ARTERIOSA [tab. 5. f. 2. G. t. 10. f. 6. C. D. t. 13. f. 1. C.] φλεΐδ' ἀρτηρίας, seu vas arteriosum dicitur; vena quidē ab officio, ^b cū sanguinem venarū modo deferat: arteriosa à substantia arteriæ ^b corpori simili. Hæc orificio [t. 10. f. 6. C. D.] minore q̃ Caua [t. 10. f. 5. CCC.] ventriculo affigitur, vnde eam ^c enasci volunt, cum potius aortæ propago ^d dici possit, si ad connexionem, quæ

in fœ-

graditur, quo facilior sit aditus, idcirco membrana ibi præsertim introrsum peritur.

^a Alijs vena arterialis. Gal 7. adm. anatom. 5. quales arteria toto corpore, tale vas ex dextero cordis sinu procedens in totum pulmonem diffunditur.

^b Galenus 7. adm. anatom. 4. vena quia non pulsat: arteriosa, quia duplici tunica prædita. Archang.

^c Vesalio, Fallopio, secuti Galenum qui 6. vsu partium 11. ex corde produci ait, & arteriam venosam cordi infigi: sic & de diff. ven 2. Columbus non à corde, sed à iecore: nam dum in utero (ait) fœtus continetur, caua cum vena arteriosa continua est (hoc falsum, nam caua cum arteria venosa iungitur) igitur natus vena ab Hepate, quatenus arteriosa ex corde oritur (ergo duplex prius ortus & ab hepate, & à corde: cur ergo dixit, à corde non oriri?) Vaso vena arterialis ex Aorta & arteria venalis ex vena magna primum nascuntur: sic & Laurenus.

^d Archangelus, quia vena ex vena, & arteria ex arteria enasci debuit: prout in ea coniunctione arteria venosa simplicem tunicam habens originem trahit à caua simplici tunica constante; & vena arteriosa ab arteria magna duplicem tunicam habente.

^r Columbus dicit has ab interiore situ feràs ferri, quemadmodum & arteria venosa & sanguinis emissioni seruiant: quare ab Archangelis reprehenditur.

^s Per caua orificium sanguis ingreditur perficiendus, ad omnium partium corporis nutritionem: quare cum maior sit copia eius, quod introfertur, & minor copia

in fœtu magis conspicua est respiciamus; sed reuera vna cum alijs spermaticis partibus ex semine ortum ducit. Tunica donatur, non simplici vt vena, sed duplici, [t. 13. f. 3. B. C.] quemadmodum Arteria, idq; in vsum, vel fœtus, vel vtero exclusi. Fœtus quidem, non sanguis spiritusq; vitalis maternus, quem in pulmones transfuehit, cum in eo munere arteriæ fungatur, transpiret. At in vtero exclusis (in quibus non arteriæ, sed venæ officium præstat) crassiozem habuit duramq; tunicam, partim quia in respirationibus facile comprimi ac dilatari non debuit; quod duplici nomine vtile fuit, tum vt tota thoracis capacitas spiritus instrumentis pateat; tum ne sanguis ex eis violenter ad cor recurrat. Partim ^e cum pulmo (cuius corpus rarum est ac leue) sanguine alatur tenui ac vaporoso, non crasso, neq; turbido, tantum ^f tenuissimus elabatur, cum vnumquodq; alimento simili nutriatur. Deinde vt in hoc moram trahens tenuior adhuc efficiatur, & spumiosior sensimque in pulmones exsudans commode in ipsorum nutritionem abeat. Addamus & causam ab Hippocrate expressam, ne dexter ventriculus, qui sinistro minus calidus est, æque ac sinister refrigeretur. Cum enim asperæ arteriæ rami, qui aerem frigidiorē inspiratum hauriunt, inter Venæ arteriosæ [t. 13. f. 1. B. C. D.] & Arteriæ venosæ ramos ferantur, quo aer attractus per cæca spiracula communicetur: si venæ arteriosæ tunica ^g esset vnica, tantum aeris exciperet, quantum Arteria venosa, quæ vnicam tunicam habet, sicq; æque vterque refrigeraretur, vnde dextri tandem calor extingui posset; quare aer solum ad reficiendum dextri ventriculi spiritum intrat. Hæc insignis est, vt quantum ^h pulmonis iustæ nutritioni propter tunicarum crassitiem detrahitur, id ^h vena rum magnitudine expleatur: hæc Arteriæ magna

inni

^e Gal. 6. v. su
part. 8.

^f Ex 6. v. su
part. 10.

^g Varolus ad
robur expul-
sionis talem
tunicam ob-
tinere credit,
quemadmodū
arteria veno-
sa tenuē, qua
ad attrahen-
dum sua laxi-
tate multum
conducit.

^h Gal. 6. v. su
part. 10.

nnitens, & suo caudice sinistrorsum inclinans in
duos [t.10.f.6.C.D.t.13.f.3.E.F.] truncos diuiditur, qui
ad dextrum & sinistrum pulmonem feruntur: hiq;
in varios & innumeros ramos per pulmones [t.13.f.
3.G.G.] disseminantur. Huius vsus in Cordis contra-
ctione sanguinis maiorem portionem ex ventricu-
lo dextro (in quo tenuiorⁱ leuiorq; effectus, quo
facilius impetu feratur) excipere inq; pulmones de-
ferre; quo in eorum alimentum cedat: mutuam e-
nim^h gratiam Cor pulmoni referre videtur, cum
ipsum sanguine nutrit, idq; beneficij ipsi conferens
pro spiritu, quem ex illo accipit. Iam vero, quamuis
vena hæc crassa & dura facta fuerit, vt non dilatetur
facile, nec contrahatur, nõ tamen adeo dura est, quin
a thorace eius soboles comprimantur & contrahan-
tur, sicque in altera cordis dilatatione per eandem
viam^k sanguis in cor relaberetur, nisi

V ALVULÆ ternæ [t.10.f.6.E.F.G.] ipsius caudicis
orificio, vbi non nihil extuberat ab ipsius venæ tuni-
ca^m enatæ adponerentur, quæ intus foras spectant,
& singulæ semicirculum exacte referant, ad Græco-
rumⁿ sigma (vnde *σῖγμα* *μοειδὲς* dictæ) vel Latinorum
C. literæ similitudine; hæc si omnes tensæ ac simul^o
erectæ fuerint, speciem vnus magnæ valuulæ orifi-
cium obturantis referunt, & dum tensæ sunt Lunam
semp plenam cum relaxantur, rugosæ fiunt, Lunam
quarta tantũ parte plenam referunt. Harum vt & ar-
teriæ magnæ exterior circumferentia reliquo cor-
pore solidior est, vbi enim in vtroq; orificio se spa-
tio aliquo contingunt, ita indurantur, vt interdum
cartilaginem teretem & oblongam referant.

ARTERIA VENOSA P quæ ἀρτηρία φλεβώδης & si-
nistri ventriculi [t.10.f.2.G.H. non recte expressum t.13.f.
1.D.] vas est: Arteria dicitur ab officio, tum quod ae-
rem contineat & deuehat, tum quia pulset; pulsare
enim,

i Elaboratus
propulmone,
Vesal. in hoc
sinu attenua-
tus fit idoneũ
pabulum pul-
moni, Arch-
ang.

k Non ita ac-
curate id pra-
stat, vt nihil
prorsus in pri-
mo retractio-
nis impetu
rursus in cor
defluat. Vesa-
lius.

l De his vide

6. vs. part. 10.

m Fallopio,

qui duas tan-

tum tribuit.

n Gal. 6. vsu

part. 14. 7.

adm. an 9.

o Ex 6. vsu

part. 11.

p De hac Gal.

de diss. ven. 9.

vbi vena por-

ta assimilatur

q 7. adm. an.

4. arteria ve-

nalis Vesal.

Columb. Va-

rolo.

q Ex 7. adm.

an. 4.

r Galenum
reprehendit

Vesal. quod

6. usu part.

contrarium
voluerit.

i Gal. 6. usu

part. 11. vas

quod tunica

simplici con-

stat, in cor in-

figitur. Arch-

angelo, sin-

istro ventricu-

lo affixa.

t Vesal. &

Plat.

u De diff. ve-

nar. 9.

x Archang.

ex 6. us. par-

tium 10.

y Ex 7. usu

partium 8.

verum in 7.

adm. an. 4.

ostendit, Era-

strati secta-

tores vacuas

sanguine,

quemadmo-

dum & reli-

quas arterias

in pulmo-

nis statuisse

& in una

quaque cor-

dis elevatio-

ne spiritum per eas ex pulmone trahi asseruisse, & in huius transitu fieri pulsum.

et, qui per omnes arterias toto corpore editur proportionalem. z De diff. ven. &

arter. 1. 2 De diff. ven. 9.

enim, q licet sensu nemo euidenter deprehendere possit, quia tamen sinistro ventriculo cōtinuæ sunt, inde coniecturam aliquis fecerit: Vena ^r à substantia, quod venarum corpori respondeat. Hæc ad basin cordis ex sinistro ventriculo patenti [t. 10. f. 7. CC.] & orbiculari orificio (Arteriæ magnæ ^r orificio maiore) ^t egressa, ex cuius vētriculi molliore sede principium ducere creditur, cū potius ex caua statui possit enata, si connexionem, quæ in fœtu conspicitur, perpendamus. Tunica tenui ^u & simplici constat: in adultis quidem, quo pulmo alatur ^x sanguine ^y defœcato, tenui ac vaporoso ab ipsa manāte, qui à corde in pulmone fertur, quo plurimo egent & ratione motus perpetui illum plurimum dissipātis & ratione laxæ substantiæ: dein quo facile spiritus (seu copiosior aer) cordi trahenti obsequatur, facileq; penetrare possit, qui ex asperæ arteriæ ramis per eius cæcos meatus ad sinistri ventriculi estum & calorē con-temperandum, spiritumq; innatum alendum defer-
tur, siquidem in adultis munus arteriæ, non vt in fœtu, venæ, subeat: & rursus fuligines facilius in asperæ arteriæ ramos propelli possint. In fœtu vero, quia sanguis alimētarius à caua in hac fertur pro pulmonum nutritione, quare vnica tunica satis habebat. Vas insigne est, quod statim ab egressu è corde in duos truncos [t. 13. f. 4. BB. C. D.] diuiditur, ita vt geminum quasi orificium constituere videatur: horumq; dexter sub cordis basi in dextrum pulmonem [t. 13. f. 1. D.] sinister in sinistrum instar venæ arteriosæ disseccatur per pulmonem disseminantur & radicum ^z imaginem [t. 13. f. 4. EEEE.] ostendunt, posset & venæ portæ ^a assimilari: nam vt hæc suis extremis ceu radicibus

dicibus quibusdam cibum ex fugit: Sic arteria venosa propter usum commoditatemque spiritus attrahendi, in pulmones deriuatur. Verum ad originem huius & aortæ occurrit vtriusque vasis coniunctio, intercedente satis magna & crassa particula, quæ in foetu perforata erat, & canalē constituebat, vt postea dicetur. Huius vsus in cordis dilatatione ex pulmonibus ^b aerem attrahere pro spirituum generatione: in contractione vero, sanguinis vitalis portionem in pulmones pro eorum nutritione vitæque, vna cum fuliginibus expellere. At ne totus aer in pulmones remect ad orificiū huius vasis membraneus [t. 10. f. 7. DD.] circulus ex cordis substantia enascitur, qui introrsum ducitur, & in VALVVLAS duas [t. 10. f. 7. E. F. t. 11. f. 2. r.] foris intro ^c nutantes diuiditur, quæ & magnitudine venæ cauæ valuulas superant, sicut & robore quoque; & filamentis [t. 10. f. 7. GG.] longioribus & plurimis carneis [tab. 10. f. 7. HH. t. 11. f. 2. ff.] explantationibus accrescunt, quorum alter dextrum, alter sinistrū latus respicit, quæ iunctæ mitram Episcopalem ^d referunt.

*b Anatomici parum prudentes aerem alteratum ad pulmones ferre volunt, qui flabelli instar vtrūq; cor-
dis faciat, idq; refrigerat, nō Cerebrum, vt Aristoteli visum est: existimant fieri in corde, quod in caminis asolet, quæ se in corde viridia*

Dux ligna existat.

qua dum cremantur, fumum edunt. Credo sanguinem cum aere à pulmonibus mixtum afferri ad sinistrum ventriculum, siquidem in vivis & mortuis arteria hac sanguine referta inueniatur, quod non fieret, si ob aerem duntaxat & vapores constructa foret: hac Columbus. Vesalio aerem ex pulmone in sinistrum ventriculum deferendo purissimum famulantur. Verum sanguine tenui & spirituofo repleta pulmone, & idoneum suppeditat sanguinem, supplens id quod rigida vena arterialis pulmone denegabat. Fallopio aerem à pulmonibus ad cor refrigerandum & fuligines tanquam per caminum cor in pulmones expellit. Varolo, ingreditur ver ad generandum spiritum totius corporis: egreditur sanguis ad indigentiam pulmonis, nec non fuligo quadam excrementitia. Laurentio, inspirantibus nobis aerem haurit, & expirantibus fumidos vapores expellit. c Gal. 7. adm. an. 11. at Columb contrarium censuit. d Figuram nemo Anatomicorum curpiam rei assimilare est aggressus, & vs part. 14. Vesalius mitra assimilat, addens, quomodo cunque, omnium res singas τεχνολόχικας cum Galeno c. 7. adm. an. 9. appellare non poteris. At Gal. 6. vs. part. 14 nemo ait eas recte τεχνολόχικας nominauerit, cum ipsarum tantum dua sint: unde colligitur errorem esse in textu priori Galeni. c Galen. 6. vsu art. 14 & 15. & 3. nat. fac 13. in fin.

Dux tantum ^e sunt, quia perfecte hoc vas claudere non debuit, idq; duabus de causis: primo cū omnes partes sanguine spirituq; vitali à Corde transuecto indigeant, etiam pulmones pro vita indiguere: quare, quemadmodum sanguinem alimentarium per Venam arteriosam recipere, sic vitalem per Arteriam venosam: idcirco in Arteria venosa semper sanguis tenuissimus & arteriosus continetur; quod ut fieri posset, duæ tantum Valuulæ adpositæ, ne in Cordis cōtractione via penitus occludatur, sed tantum spatij relinquatur, quantum pro sanguinis vitalis transuectione opus fuit. Quod si vero hæ Valuulæ abessent maiori copia & impetu sanguis vitalis in contractione efflueret, eoq; Arteria magna & per consequens totius corporis partes frustrarētur. Deinde ut si quæ fuliginosa ^f excremēta ex aeris attracti immutatione ipsoque natiuo calore, qui in hoc ventriculo continetur, producantur, ab eo ad pulmonem continuum transitum habeant & per asperam arteriam exeant, cum ex his alioqui suffocationis & extinctionis caloris natiui periculum animali impedere videatur. Alterum sinistri ventriculi vas ARTERIA est magna, de qua etsi in genere libro secundum vniuersalis nostræ Anatomies, qui de Partibus similibus agit, dictum fuerit, quo Lectorem relegamus, hīc tamen pauca quædam ad propositum requisita subiiciemus.

f Gal. 6. vs. part. 14. & 15. idē voluit Vesalius, Fallopius, Archangelus, Varolius & Laurentius, Columbus ridet.

De Arterijs in genere.

CAPVT XXIII.

De Arterijs egit Galenus lib. de diff. ven. 9. 1. plac. 7. 6. eiusd. 9. de earum tunicis 7. adm. an. 5. 6. vs. part. 11. de oss. 6. vs. part. 19. 7. adm. an. 10. Arist. 3. part. 4.

a Vel ἀπὸ αἵματος, id est salire, quasi αἵματος, vel παρὰ τὸ αἶμα, quod est attollere.

ARTERIA, quæ ἀρτηρία ^a παρὰ τὸ τὸν αἶρα τηρε quod aerem siue spiritum conseruet, dicitur Hippo

Hippocratis, ^b Platonis & Aristotelis ^c tempore sic nominabatur fistula, quæ ex ore in pulmones descendit: & aerem per nares & os inspiratum defert, & per quam denuo expiramus, quæ à Galeno & posterioribus Aspera arteria vocatur. Nunc vero per Arteriam, vas, quod vitalem spiritum & sanguinem continet, intelligunt, de quo nobis sermo est. Hanc vetustissimi, vt Hippocrates ^d venam, quam micare ^e seu palpitare dixerunt. Aristoteles modo ^f venam minorem; venæ Cauæ comparans: modo venam ^g Aortam: modo simpliciter ^h Aortam, vocauit. Posteriores vt distinguerent, illam ἀρτηρίαν τραχείαν, hanc ἀρτηρίαν λεῖαν, ⁱ arteriam leuem (quæ etiam Hippocrati ^k Arteria parua) nuncuparunt: nonnulli, quo à venis sanguinem naturalem continentibus distinguerent, venas pulsatiles (quemadmodum Arabes ^l Neruos pulsatiles) vocarunt. Quare vbi apud veteres, qui ante Galenum scripsere; Arteriarum vox simpliciter occurrit, de aspera arteria; quemadmodum si apud Galenum & qui eum secuti sunt, legatur, de leui Arteria intelligere oportet. Sunt autem ternæ ^m Arteriarum, quæ cæterarum omnium radices censentur: Prima est Arteria aspera, de qua in pulmonum historia: Altera est Arteria venosa, de qua superiore capite egimus: Est & tertia, quæ Arteria magna nominatur (ad quam & Arteriarum vmbilicales referri debent) de qua nunc agimus.

Est ergo Arteria, quatenus consideratur, vt pars Organica, instrumentum corporis nostri ⁿ commune, oblongum, ^o teres, fistulæq; in modum cauitum, ex duabus ^p peculiaribus tunicis fibris, ^q inter-

Ec

textis ^m Galen. 7.

^{adm. an. 1.} duplex arteriarum genus, alterum à sinistro ventriculo propagatum, alterum quas aspiras vocant, & 7. de comp. med. secundum loca 1. At lib. de oss. ven. 9. meminit duplicis arteria ex sinistro ventriculo. ⁿ Gal. 1. sem 5. 2. vs. part. 9. 3. eiusd. 9. ^o Gal. 1. de differ. puls 3. ^p Ex 6. vs. part. 11. potissimum 7. adm. anatom. 5. ^q De inaequali intemperie.

^b Lib. de corde vbi arteriam magnam vocat.

^c Lib. de respirat. 11. 1.

^d histor. 16. 2. eiusd. 15. 3. part.

^e 3. 11. probl. 22.

^f Lib. de carnib. lib. de aer.

^g re, & quis & loc 2. epid. 1.

^h dem. 1. stat. Gal 7. plac. 9.

ⁱ nennullis Arteribus vera

^j audaces, alijs vena pulsatiles.

^k Apud Ruff. 1. de part. 34.

^l In 3. h. st. an 3.

^m In 3. part. an 7.

ⁿ Lib. 1. hist. an. 17. & 3.

^o eiusd. 3.

^p Gal 7. adm. an. 4.

^q Libro de corde.

^r Quemadmodum & φλέψς & πόδις Arist.

^s 3. hist. 4.

r Negavit E-
 rasistratus
 sanguinem in
 arterijs conti-
 neri, contra
 qu. m Gal li
 bellū scripsit,
 eiu. q. discipu-
 los 7 adm. an.
 16. irridet.
 f Galen. 8.
 plac. 8.
 t Gal 6. usu
 part. 10 Hero
 philus recte
 collegisse vi-
 detur, qui ar-
 teriam vena
 crassitudine
 sexuplam esse
 definiuit Ve-
 salio ροῦδρῶ-
 νης seu carti-
 laginea dici-
 tur.
 u Gal. 6. vf.
 part. 11. 7. ad.
 an. 5.
 x Ex 6. vf.
 part. 10.
 y Ex 6. vf.
 part. 17.
 z In 7. adm.
 an. 5. hanc a-
 liqui dicunt
 à Cordis tu-
 nica produci,
 si adsit.
 a Galenus 7.
 adm. an. 1. &
 de dissect. ve-
 nar. 9.

textis compositū, sanguinem ⁊ spiritumq; ⁊ vitalem
 in sinistro ventriculo ex sanguinis aerisque permix-
 tione elaboratum, excipiens, continens, & ad om-
 nes corporis nostri partes, vna cum calore vitæ
 gratia deferens. Substantia est 9 membranosa seu
 neruea, quo distendi comprimiq; possit, quod ipsis
 magis, quam venæ propter motum necesse fuit: dua-
 bus P peculiaribus tunicis donata: quarum exterior
 P tenuis est, rara [t. 12. f. 3. C.] ac mollis, qualis etiam
 est venæ tunica, ex multis rectis P fibris ac quibus-
 dam obliquis, transuersis nullis contexta. Interior al-
 tera [t. 12. f. 3. BB.] crassitie P fere quintupla, ⁊ densa ac
 u dura, (partim x ne sanguis arteriosus & spirituosus,
 cum tenuis sit, x purus ac vaporosus, spiritusq; vita-
 lis euanescat: partim ne ex continuo y motu diastole
 & systole, quam à corde, tāquam à principio dispen-
 sationis accipit, frangatur) in transuersas u fibras dis-
 soluta, quo per arteriarum actionem seu motum, ci-
 tissime & sanguinem & spiritum vitalem in totū cor-
 pus distribuat: has enim u solas & quidem plures in-
 terior tunica obtinet. His duabus Galenus z aliam,
 quæ tunicam metitur, addit, quæ in interna super-
 ficie telis araneorum [t. 12. f. 3. AAA.] persimilis, & in
 magnis Arterijs circa originē maxime perspicua est.
 Quamuis z etiam in imo ventre à peritonæo: in tho-
 race à pleura nanciscatur, communem & tenuem
 membranam, z quæ eam contegit, aut firmat, aut
 connectit vicinis partibus, qua tamen arteriæ illæ,
 quæ per viscus aliquod feruntur, destituuntur.

Arteria magna, quæ aliquando a μεγίστη, aliquan-
 do simpliciter a μεγάλῃ magna, quia amplissima exi-
 stit: alijs αἰχμα a crassa; alijs a ὀρθῇ, Aorta b Aristo-
 teli dicitur: quæ omnium reliquarum arteriarū ma-
 ter est (aspera, venali & vmbilicali excepta) & com-
 munis

b Vt Galenus de dissect. venar. 1. testatur.

munitis veluti ^a caudex existit, eiusq; nomine maxima
 vocat. Hæc antequã cor ^c formatũ esset genita fuit, ^d
 & principium habet aliud ^d γενέσεως, originis, semen
 ipsum, ex quo immediate fit, cum eodem tempore
 cum reliquis spermaticis genita sic : aliud διοικήσεως
 & παύσεως dispensationis & radicationis ipsum ^e cor
 & quidem ipsius sinistrum ^f ventriculum; unde pa-
 tente orificio prodit, quo ex eo, dum constringitur,
 sanguinem spiritumq; vitalem in sinistro ventricu-
 lo elaborata, cum calore in totũ corpus distribuen-
 dum recipiat. At ne in Cordis dilatatione in ventri-
 culum remeant, eius orificio [t. 10. f. 8. A.] VALVVLÆ
 [tab. 10. f. 8. B. C. D. t. 12. ch. 1. 2. 3.] tres ^g συγμοεδεῖς, in-
 tus foras vergentes, quemadmodum etiam in vena
 arteriosa adpositæ, quæ tamen maiores & validio-
 res, cum & Arteriæ magnæ corpus, ipsius venæ arte-
 riosæ durius sit : hæc etiam impediunt, ne alimen-
 tum ^h ex intestinis ab arterijs mesaraicis attractum,
 chylum nimirum, quem non principale alimentum
 Hippocrates ⁱ vocat, in cor feratur. Verum & ipsius
 orificio stabilimenti ^k causâ, substantia dura, non-
 nunquam ^l cartilaginosa [tab. 10. f. 8. SS.] in quibus-
 dam animalibus, vt ceruis, ^m exacte cartilago, non-
 nunquam in maioribus animalibus & cartilago ossea
 adposita est : rarius enim ita indurescit, vt reuera os
 sit, quale os in elephanto ⁿ dari Galenus asserit : at

E e 2

tale vasis magni-

tudinem tres ei obtigisse, quia arteriosa vena duas tantũ tribuit. ^h Varolus vult
 sanguinẽ arterialem imperfectũ eo deferri per arterias mesaraicas vt ibi perficia-
 tur: quemadmodum enim noua mesaraica preparat chylum, vt in hepate perficia-
 tur: sic arterias preparare, vt in sinistro ventriculo arteriosus sanguis fiat. ⁱ De
 Corde. ^k Arist. 3. part. 4. Gal. 6. vs. part. 19. ^l Gal. 6. vs. part. 19. 7. admin. an. 10.
 de p. 1. 2. 3. ^m Archang. ait in ceruis, dama, os tãquam basis: in corde boum
 in signe, cui cor adhaerescit, & innititur: quoniam Aristotele scribẽte, omne quod
 mouetur, mouetur super aliquo quiescente, cui innititur, dũ mouetur. At Aristote-
 lis hac sunt 3. par. 4. cor sine osse omnĩũ; praterquam equi & cuiusdam bouũ generis,
 quibus pra magnitudine quasi adminiculum subditum. ⁿ In 7. adm. an. 10. quod
 viscere in minutas partes inciso, inquirere iubet.

^c Galen. de
 form. fœtus.

^d Gal. 1. fem.

^e & 11. vide

caput 39. par-

tis 2. libri no-

stri de partib.

similaribus.

^c Ex corde p-

deunt arteria

Hipp. de cord.

de carnib. Pla-

to, Arist. 3. hi-

stor. 4. Gal. 6.

vs. part 11. &

22. i. eiusd. 16.

16. eiusd. 2. 6.

plac. 6. dis. ve-

nar. 1. an. san-

guis in ar. 2.

^f Gal. 6. vs.

part. 2. 5. &

14. 16. eiusd.

10. 1. plac. 7.

diss. ven. 9. at

Arist. 3. hist. 3.

ex medio cor-

dis sinu.

^g Ex 6. vs.

part. 14. & 15.

Fall. vult ob

tale in homine non reperitur. Arteriæ autem magnæ rami in totum corpus distribuuntur, & venæ tam Portæ [t.14.lib.1.docet.] quam Cauæ [t.12.lib.2.f.1. id ostendit.] ramos comitantur, propaginibus tamen minus frequentibus, cum cauæ propagines Arteria non semper sequatur; Venas enim, quæ ad cutim abeunt, Arteriæ nullæ comitantur, cum nullibi in cutim conspicue emittantur. Sic in substantiam musculorum raro cum venis disseminantur, sed musculorum superficiei tantum attenduntur, cum & ipsorum sanguis tenuior, & spiritus ab arterijs elapsus distantiora loca absque arteriæ adminiculo accedere possit.

Vsus arteriæ magnæ eiusq; ramorum, dupliciter cōsiderari potest, vel quatenus canales sunt, vel quatenus perpetuo pulsant & mouētur. Quatenus sunt canales, triplici de causa partibus sunt tributæ: Primo ° vt spirituosum vitalemque sanguinem contineant, & per totum corpus distribuant: partim ad perfectam singularum partium nutritionem (cum ex ijs p partes vicinæ vaporosum sanguinē licet paucum, trahant) partim ad spiritus q animalis nutritionem & q generationem. Dein vt spiritum vitalem deuehant, quo hoc affluente, spiritus vitalis partibus insitus foueatur & sustineatur. Tum vt cum eodem spiritu, calorem & facultatem vitalem in vniuersum corpus assiduo transmittant, quo calor innatus singularum partium foueatur, vitales partium functiones moderetur, atq; gubernet, earumq; vitam tueatur. Quatenus vero pulsant, triplex quoq; earum vsus est: primus, innatum partium t calorem custodire, quatenus eum ventilant, ne inuentilatus sensim languescens extinguatur. Alter sanguinem, cum arteriæ venarum sint comites, suo motu commouere, & ne quiescens putrescat impedire, aquarū stagnan-

tium

o Ex 8. plac. 8.

p Gal. 6. vsf.
part 10.

q Ex 6. vsu
part. 17.

r De vsf. puls.
3. 4. 1. de caus.
puls. 4. 8. plac.
8.

tium more, quæ facile computrescunt; siquidē sanguis ex Hippocratis decreto, aqua sit. Tum sanguinem, ut ē venis in partium substantiam excidat, sollicitare & cogere, quo promptior nutritio fiat. Hic autem arteriarum motus, ^f pulsus dicitur, cuius nominis Hippocrates ^t primus auctor fuit, qui dilatione ^t & contractione absoluitur, & ipsis arterijs insitus non est, sed à corde ^u in eas influit: quod ostendit pars arteria vinculo intercepta, ubi pars vinculo subiecta motum nō habet, ablato vero vinculo motus redit; & hæ non contra, at cor, ut Erasistratus ^x voluit, mouentur, sed simul cum corde dilatantur ac constringuntur, ut recte Herophilus, Aristoteles ^y & Galenus ^z docuere: nisi quod Cordis motus ^a maior, celerior & vehementior sit motu arteriarum: quod tali experimento ^b comprobatur, si applicetur manus dextra regioni, Cordis & sinistra manus carpo adponatur, tunc enim obseruare licebit, idemne sit, an contrarius motus: Verum & viui animalis sectio veritatem docebit. Sed hac de re plenius dictum fuit in synopsi nostra, quam de pulsibus scripsimus, sic & lib. 2. de part. simil. part. 2. cap. 40. Dum autem contrahuntur, spiritum vitalem in omne corpus validius propellunt, & ^c fuliginosa fumosaq; excrementa ex humoribus enata, quæ calorem suffocare possent, exprimendo expellunt. Dum dilatantur, spiritum à Corde tanquam nouam materiam rapiunt, quem in contractione singulis partibus communicant, ut caloris sit vehiculum, & sanguinem naturalem à vicinis venis ad sui nutritionem assumunt, ^d & id per oscula, quæ sunt inter venas & arterias, quas in toto corpore ^e *συναρτασμοὶ ἀπὸ τῆς καρδίας* dixit Galenus: cuius etiam nomine simul ^f ducitur ubiq; (nisi quid ^g

Ec 3

maius

trahitur. ^c In 5. vs. part. 2. & 6. eiusdem 10. & 17. 3. fac. natur. 15. ^f Gal. 16. vs. partium 14. ^g In 5. vs. part. 2.

^f Gal. 1. diff.

puls. 7.

^t Teste Gal.

1. diff. puls. 2.

^u Hipp. Gal.

3. presag. ex

puls. 3. de vs.

part. 6. 2. rat.

vict. 4. 2. 1. de

causis puls. 4.

3. fac. nat. 14.

1. vs. part. 16.

^x Gal. 4. diff.

puls. 6. hanc

opinionem da

minat, & He-

rophilo sub-

scribit.

^y Lib. de spi-

ritu.

^z De puls. ad

tyron. 1. lib. de

vs. puls. & 7.

adm. an. 1. ait

cordi pulsandi

modo respon-

dere.

^a Gal. 3. pra-

sag. ex puls. 3.

^b In 6. vs. partium.^c Ex 8. plac. 8.^d Gal. 6. vs. part. 21. in ar-

teriarum dia-

stole à veris

aliqua ar-

^f Gal. 16. vs. partium 14.^g In 5. vs. part. 2.

^a In 6. vsu
part. 10. accu-
sat eos, qui an-
te ipsum fue-
runt, quod in
dissectionibus
fuerint negli-
gentes, illi q;
idem accidis-
se, quod illi
qui & reli-
quos asinos,
prætermisso
eo, cui ipse in-
sidebat, nu-
merasset, suos
vicinos, quod
eum asinū ef-
sent furati,
postmodū ac-
cusabat, &c.
^b Vesal. in
suo opere hac
solum habet
pag. 696. in se-
ctione fœtus:
nisi visum sit
hic una in-
quirere, nam
in fœtu pecu-
liaris aliquis
processus à ve-
na caua ad
arteriam ve-

maius obstat) per corpus. Arteriæ quidē venis sub-
iectæ (excipere ad os sacrum, vt in libro superiore di-
ctum fuit,) nō tam tutelæ gratia, quam vt motu suo
venas ad effundendum sanguinem cogant, & vasis
sit conspiratio quædam ac materierum communio,
quo illæ his spiritum & vitam, hæ illis per meatus an-
gustissimos sanguinem subministrant: partim etiam,
vt membranæ, quibus venas protegit, ac partibus vi-
cinis alligat, protinus arterijs quoq; sint vsui: verum
etiam per poros aerem, quo calor ventiletur, allicere
volunt. Ex his quæ capitibus aliquot fuere propo-
sita, satis, cordis vtilitas patet. Et hæ sunt in perfectis
animalibus Cordis particulæ.

*De vasorum Cordis in fœtu vniōe, qua in lu-
cem editis aboletur.*

CAPVT XXIV.

*Structuram hanc expressit Galenus 6. vs. part. 20. & 21.
potissimum 15. vs. part. 6.*

CVM structura Cordis eorum, qui in lucem edi-
ti sunt, à structura fœtuum in vtero adhuc cō-
tentorum ratione vasorum (tam in brutorum gene-
re, quam in humanis fœtibus) differant, qualis ea in
his sit dicendum venit, quam Galenus manifestissi-
me & perfecte explicauit, ^a et si post Galenū pleriq;
Anatomici ^b sicco pede transierint, quam ab annis
viginti
nalem, & ab arteria magna in venam arterialem pertineat. *Columb hoc habet:*
dum in vtero matris latuit fœtus, si eius cor introspeciamus, comperiemus cauam
venam cū vena arteriosa continuam esse (hoc falsum est.) Fallopius, alterius tan-
tum meminit, meatus arterialem in Embryone vocans. Vesalius à Fallopio in ob-
seru. admonitus in sua apologia vtriusq; meminit, sed vtramq; per anastomosin fi-
ri dixit: (quod falsum est) Arantius in prima editione de fœtu vtriusq; vniōis
meminit, sed per canalem vtramq; fieri voluit, in quo errauit: quare in altera &
tertia editione Galenum secutus, alteram per anastomosin, alteram per canalem
fieri dixit. Secutus Ioh. Baptista Garcanus in pleriq; vestigia Galeni. Sic & Arch-
angelus,

viginti tribus in nostris Anatomijs publicis, maxime vero priuatis singulis annis demonstrare cōsueuimus, & de ijs ante annos tredecim scripsimus.

Quatuor esse Cordis vasa superius dictum fuit, duo quidem in dextro ventriculo, Vena nimirum caua [t. 11. f. 1. 2. 3. a. b.] & vena arteriosa [t. 11. f. 1. m.] duo vero in sinistro. Arteria scilicet magna [t. 11. f. 1. 2. & 3. d. f.] & arteria venosa: [t. 11. f. 1. 2. & 3. quæ in secunda figura aperta est.] quæ vasa in fœtu ita vniuntur, vt bina coniungantur, vena caua dextri ventriculi vas, cum Arteria venosa sinistri ventriculi vase; & vas sinistri ventriculi Arteria magna, cum vase dextri ventriculi, vena arteriosa, quæ in adultis à se inuicem sciuncta sunt. Hæ autem vniones eodem modo non fiunt: Illa enim partim propter viciniam, partim propter substantiarū similitudinē, anastamosin, id est, osculorum coniunctione perficitur; hæc vero propter interuallum, quod inter ipsa est, per canalem efficitur. Prima vnio, quæ per Anastomosin & apertionē duorum vasorum inuicem fit, est vena caua cum Arteria venosa [t. 11. f. 1. & 2. a. g.] quæ sub dextra auricula cordis, priusquam Caua in dextrum ventriculum se aperiat [t. 11. f. 2. ad h. apparet.] & prope regionem eam, quā Vena coronalis oritur, obseruatur. Cum enim se mutuo contingant, vt facile vnicum vas esse putes, foramen^d vtriq; commune [t. 11. f. 1. g. h.] quod amplum^e & patens est, oualique figura, natura pertudit, per quod sanguis à Caua in Arteriam venosam transit, & ad pulmones defertur. At ne sanguis in Cauam refluat, huius foraminis regionis, quæ Arteriæ venosæ cauitatem respicit, perfecta est operculi instar membrana [t. 11. f. 2. & 3. i.]^f tenuis,

Ee 4

dura,

angelus, qui acriter Vesaliū reprehendit, dein quædam Neoterici cum Arantij intelligēs primam editionem. De his quoque egit Laurentius Petrus, & obiter Rossetus.

c Fallopius non meminit. d Gal. 13. vñ part. 6. Aui-cenna, pulmo non nisi rubens est in tēnello fœtu, quia non respirat, & non albisicat ipsū nisi aeris inspirati permixtio: sanguine itaq; nutritur rubeo: & ideo factum est à vase in vas foramē, quod edito animali statim occluditur.

c Memoranda magnitudinis anastomosin, 6. vñ part. 20.

^f Garcanus & Archangelus reprehendunt eos, qui somnando affingant his vasis membranulas alias semilunares, alias sagittarias, alias aliter formatas: quos sensus refellit.

TABVLA hæc XI. *unionem vasorum Cor-*
dis, qualis in embryone reperitur, & paulo
post in lucem editis, aboletur,
proponit.

FIG. I.



FIG. II.





FIG. III.



g Vesal. in a
pologia sua
hunc usum
mēbrana tri-
buit, ut post
natiuitatem
prompte in-
seruiat for-
aminis ob-
scurati.

h Gal. 15. vj.
part. 6. At
Carcanus &
Archang. vo-
lunt, in fœri-
bus unū, duos,
tres quatuor-
ve menses na-
tū, horum a-
perture, ideo
& membra
na & canalis
conspicua ve-
stigia extare
(hoc de cana-
le verum est)
Laurentius,
paucis post par-
tū diebus va-
sorū praeluso
& exsiccatio.
i Vi Gal. Fall.
Arant. Garca-
nus, Archan.
& Laurent. at
Vesal. in suo
examine ob-
seru. Fallopij
per anasto-
mosin.
k Ex 15. vsu
part. 6.

dura, pellucida, foramine maior, quæ ad solam & ra-
dicem firmatur, reliquo toto corpore in ^d vasis ca-
uitate pendula; quo dum laxè in se concidit, facil-
iter ad pulmonis vas resupinetur, & sanguini à Caua im-
petu affluenti cedat quidem, at ne rursus in Cauam
refluat, impediatur. Quare Arteria venosa in fœtu pul-
moni officium Venæ, in adultis vero munere Arte-
riæ fungitur. In adultis enim, dū Cor dilatatur, san-
guis ex Caua in dextrum ventriculum effunditur,
vnde dum Cor constringitur, in Venam arteriosam
& pulmones propellitur. At in fœtu cum cor non
moueatur, pulmones tamen augeri & nutriri oportet,
viam prædictam natura fabricata est, quâ san-
guinem per Cauam sursum latum, non in Cordis
ventriculum effundit, cum nec attenuato sanguine
pulmo indigeat, nec vlla spirituum vitalium gene-
ratio fiat, sed rectè in Arteriam venosam, indeque in
pulmones. Hæc naturæ sunt opera admiranda, supe-
rat vero omnem admirationem prædicti foraminis hauc
ita multo post conglutinatio. Etenim quam pri-
mum animans in lucem est editum, cum iam respi-
ret, & cor moueatur, hoc foramine amplius opus
non habet, quare paulatim & membrana exsiccatur
coalescit, & occluditur, ita vt si aliquot septimani-
post ^h inspexeris, vel infantis vel vituli cor, neges lo-
cum hunc aliquando pertusum fuisse; verum in a-
nimantibus siccioribus citius; in humidioribus, tar-
dius exsiccatur ac coalescit.

Altera vnio est Arteriæ magnæ cum Vena arte-
riosa [t. 11. f. 1. 2. & 3. f. g.] per ⁱ canalem [t. 11. f. 1. 1.] nam
cum ^k Arteria venosa pulmoni officium venæ præ-
stet, necessum fuit Venam arteriosam in arteriam ve-
sum transmutari, quare natura ^k id quoque in ma-
gnam Arteriam pertudit. At cum duo hæc vasa a-
liquantulum inter se distarent [tab. 11. f. 1. d. m.] ali-
qua

as^k tertium exiguum, quo coniungerentur effecit, ita vt non per anastomofin, sed per canalem iungantur. Canalis [t. II. f. 1. 1.] seu vas incipit, non à caudice magnæ Arteriæ, sed ab ea trunci dorsum [t. II. f. 1. 2. & 3. f.] delati regione, vbi Nervus sinister sexti, paris recurrentem constituendo circumuoluitur. Prorecreditur autem non transuersim, sed oblique ab Arteria magna [t. II. f. 1. à d. adm.] ad venam arteriosam, ubi hæc in duos truncos diuiditur, ac si vena arteriosa in tres truncos scinderetur, quorum primus sinister, secundus dextrum pulmonem peteret, & tertius, (qui prædictis duob. paulo minor est) ipsam Arteriam magnam oblique adiret: qui à Cordis basi in fœtu duobus circiter transuersis digitis, in adultis vero quatuor distat; cuius tanta est longitudo, vt inter vtrumq; vas digitum supponere liceat; in bonis vero, vbi adoleuerint, duos vel plures. Huic canali seu vasi, nulla^m membrana adposita est quæ sanguinis ex Arteria magna in Venam arteriosam delati, regressum impediatur, cum id canalis & longitudo, & maxime obliquitas præpedire possint. Hic canalis non quemadmodum cæteræ animalis partes, augetur: sed quemadmodumⁿ natura Venam umbilicalem & Arterias umbilicales, quæ ad spinam pertinent, tandem exsiccat, & veluti funiculos quosdam inuenies efficit: ad eundemⁿ modum prædictæ vasorum quæ ad Cor pertinent, coniunctiones in animali iam nato abolentur: & canalis hic sensim^o attenuatur, ita vt tempore præcedente penitus tabescat & exsiccet. Sed in infantibus trium quatuor annorum propter tunicæ crassitiem reperitur quidem adhuc, non autem amplius pertusus existit.

Vniones

in venam arteriosam affluenti cedit, & rursus prohibere possit regurgitationem aortam; & præponi ea ratione, quæ canali bilis in duodeno & vteribus in venam præponantur. n Ex 6. vs. part. 21. o Ex 15. vs. part. 6.

l Non circa
cordis basin,
vt voluit Fal-
lop. cuius no-
mine à Car-
cano repre-
henditur.
m Vesal. per
anastomofin
iungi voluit.
huicq; aper-
tioni orbicu-
latim mem-
branam præ-
esse ait: sed v-
trumque fal-
sum est. Gar-
canus negat,
membranam
creatam, quæ
orbiculariter
orificio cana-
lis istius præ-
sit, sed dicit
veluti laxam
ad appensam
membranulam,
quæ facile san-
guini ab aor-

p Gal. lib. 15.
 solus pulmo-
 nis gratia an-
 bas anasta-
 moses constru-
 itas putat. At
 libr. 6. Cordi
 etiam ad vi-
 tales facultate
 tes munia ob-
 eunda al. quo
 modo inferui-
 re scribit. Pe-
 trus putat
 anastomose in
 opus, ad cor-
 dis potius &
 totius corpo-
 ris usum, quā
 ad pulmonis
 nutritionem
 & vitam re-
 ferendum esse.

Rossetus credidit, soli aeri deducendo dicatas esse, quem ad pulmones dirigant an-
 tequam ad cor veniat, & cum utroq; sanguine venoso & arterioso, iam in hepate
 & liene preparatis misceri.

De Arteria magna ramis per Thoracem & col- lum disseminatis.

CAPVT XXV.

De his egit Galenus lib. de diff. ven. & arter. 9. & 16. vsu
 partium 10.

a Secundum
 Medicos se-
 cundum Ari-
 stotele à me-
 dio sinu.

ARTERIA magna ad sinistrum Cordis ^a ventri-
 culum (vnde pronascitur) ^b amplissima ^c est
 [t. 12. f. 1. A.] antequam pericardio excidat supra val-
 uulas

b Hippocrati, Platoni, Aristoteli, Galeno Cor arteriarum fons & origo: Pe-
 lopi arteria cum venis & nervis à Cerebro: aliqui ab extremis corporis partibus
 oriri crediderunt. c Omnium maximum orificium 6. vs part. 14. Vesalio in ortu
 orbiculari, durior & cartilaginosis.

ulas [*t. 12. f. 3. char. 1. 2. 3.*] Arteriarum modo vnam, d
modo duas [*tab. 12. f. 1. BB.*] coronarias promit, quæ
basin cordis coronæ instar cingunt, & per eius lon-
gitudinem cum vena ramulos, & quidem sinistro la-
teri plures amplioresq; transfundunt, eius substan-
tiam viuidam reddentes. Mox aliquantulum sub ve-
næ arteriosæ caudice sursum fertur, & pericardium
permeans in duas partes ^e imparibus portionibus
diuiditur, quarum altera sursum [*t. 12. f. 1. E.*] ad caput
ascendit, & minor est, altera deorsum [*t. 12. f. 1. D.*] fer-
tur & multo maior est, quod totius animalis partes,
quæ cordi subiiciuntur, multo plures sint ac maiores
superioribus. Hic truncus caudici arboris propor-
tione respondet, ad quintam ^f Thoracis vertebra
letorquetur, & sinistrorsum paululum declinans (vt
Venæ Cauæ locum det) vertebrisq; incumbens in-
terius descendit, quem Aristoteles proprie Aor-
tam, eo quod neruosam eius partem vel in mor-
tuis conspici posse diceret, instar vaginæ fortassis
Macedonibus ἀορτῆς nuncupatæ, ἀορτὴν appellauit.
Praxagoras crassam appellare consuevit. Ab his rami
disparguntur, qui & venæ portæ & venæ cauæ ramos
in totum ^g corpus comitantur.

A trunco ergo maiore [*t. 12. f. 1. D.*] qui in Thora-
ce amplissimus & crassissimus est, prodeunt sequen-
tes rami.

Intercostales arteriæ inferiores [*tab. 12. f. 1. HHH.*]
uæ à posteriore ipsius sede ordine progressæ, v-
tinq; ad octo inferiorum costarum interualla vsq;
cartilagines mittuntur: & hæ rursus musculis dor-
si & Thoraci adnatis, & dorsali medullæ per fora-
mina neruorum gratia vertebris insculpta, furculos
modo, quo vena ἀζυγος, distribuunt: rarum enim
est venam ἀζυγοι comitē habere arteriam ab Aorta
prodeuntē, tumq; intercostalis maior dici meretur.

Phreni-

d Vesalio, duo
furculæ: Co-
lumbo in non-
nullis non v-
nica, sed dua.
Laurentio,
raro simplex,
sapius gemi-
na.


^e Ex 6. vsu
part. 5.

^f In 6. vsu
part. 5. & 6.
16. eiusdem
decimo. & in
com. Tim.

^g Gal. 6. vs.
part. 14.

TABVLA hæc XII. *Arteriæ magnæ truncus cum suis ramis per ventres tres disseminatis proponit fig. 1. ac fig. 2. portionem arteriæ posteriorem, quem admodum fig. 3. Arteriæ magnæ ex Corde prodeuntis portionem apertam, tunicas & fibras exhibet*

FIG. I.



III.



h Hoc etiam
Vesalius vel
le videtur.

Phrenica vtrinque; una [tab. 12. f. 1. KK.] quæ per diaphragma disseminatur, à quibus & ad pericardium, qua id diaphragmati adnascitur, ramuli sparguntur: nonnunquam à ^h trunco sub diaphragmate oritur. Trunci reliquum diaphragmatis [t. 12. f. 1. *.] fissuram pertransit, vertebrarum corpori adhærens, à quo multæ propagines per infimum ventrem distribuuntur, ut supra explicatum fuit.

A trunco minore & ascendente [t. 12. f. 1. E.] qui inter membranas intersepientes Cavæ substernitur, & Asperæ arteriæ innititur, omnibus partibus supra cor existentibus rami communicantur: hic primo vtrinque insignem emittit rami, qui ad sui lateris costam primam sub clavicula fertur, quare subclavia ⁱ arteria [tab. 12. f. 1. F. G.] dicitur: dein totus truncus in duas Carotides abit.

i Vesalius arteria ad latus prima costæ tendens. Columbo Axillaris. Laurentio, subclavius.

k Vesal. & Columb. vocant hanc quæ axillarem vocant, à carotide dextra in inguli regione oriri.

l Columbus duos arteria ramos mitti ad superiora costarum intervalla & vertebrae, quos Vesalius ignoravit, refert.

Subclavia ^k dextra [t. 12. f. 1. F. cuius exortus a.] ab Aorta, ubi in Carotides scinditur prodit, quæ elatior & multo amplior est, & transversim magis fertur ipsa sinistra, quæ multo humilior ubi Aorta deorsum retorquetur, enascitur, & oblique magis brachium accedit.

A subclavia qualibet, antequam Thoracis cavitatem excidat, (ubi enim extra thoracem est, non amplius Subclavia, sed Axillaris [t. 12. f. 1. PP.] dici debet) simul ac primam costam attigit, non autem ante, propagines deriuntur ab eius quidem parte inferiore intercostalis ^l superior [t. 12. f. 1. II.] quæ costarum radicibus attensa tribus quatuorve superiorum costarum sui lateris interstitijs, (sed non eodem ^m semper modo) singulos ramos communicat, à quibus furculi dorsi medullæ, musculisq; vicinis distribuuntur. A parte superiore prodeunt.

Mammaria [tab. 12. f. 1. LL.] quo reflexa sub sternocum

^m Galenus de diff. venar. 9.

rum vena comite descendit, ad mammas, ⁿ & [tab. 12.f.1.ccc.] musculos cartilaginum verarum costarum interstitia occupantes: in glandium membranasq; intersepientes, quibus adhæret, furculos spargit, & ad cartilaginis mucronatæ latus thoracē egressa subiectis infimi ventris musculis ramulos in latera spargens deferitur, & ad vmbilicum in plures [t.12.f.1.dd.] furculos diuisa Epigastricæ arteriæ fursum contenti iungitur [t.12.f.1.ee.]

Cervicalis [t.12.f.1.MM.] retro ° magis versus corpora vertebrarum prodit (nonnunquam à Carotide) quæ fursum lata vbi ad septimam cervicis vertebram peruenit, foramina transuerforū processuum ligamentorum vertebrarum, cuius nomine Natura perforavit, permeat, musculis & cervicali medullæ, vertebrisque furculos largitur, qui foramina, per quæ nervi egrediuntur, ingrediuntur, quæ medullæ membranam perforans inter primam vertebram & os occipitij [t.12.f.1.NN.] vtrinque; caluariam ingressa cum forcia opposita vnitur, & sub cerebri P basi fertur.

Muscula [t.12.f.1.OO.] quæ musculis cervici incumbentibus ad occipitium vsq; 9 aliquando etiam brachij, ramulos impertit.

Ab Axillari [t.12.f.1.PP.] (quod axillam ° pervadat sic dicta) antequam brachium accedat, prodeunt à parte inferiore.

Thoracica superior [t.12.f.1.QQ.] quæ ad musculos pectori instratos numerosis vtrinque; furculis fertur: huic proximi sunt ramuli exigui glandiolis sub illa sitis, tributuri.

Thoracica inferior [t.12.f.1.RR.] quæ totum thoracis latus deorsum perreptat, potissimum in musculum latissimum excurrens.

Scapularis [tab.12.f.1.S.] quæ ad musculos in cavæ capulæ repositos disseminatur. A parte superiore.

Ff

Hume-

ⁿ Nulla soboles ad cutim nisi forte abscurissime in māmilla corpus pertingāt. Vesalius: hoc reprehendit Fallopius, & ad mammillat admodum conspicuas esse dicit.

o Hoc in plerisque à soporarijs frequenter ab axillaribus originem ducit, Columbus.

p Vesal. cervicales arterias in sinu dura matris cū venis ferri voluit; quod Columbus reprehendit, & Laurentius, hicq; vult cervicalem cum carotidibus plexum choroidem constitutuere.

q Nullibicorem subiens. Vesal.

r Axillā patens arteria. Vesal.

Humeraria [t. 12. f. 1. TT.] quæ humeri summum conscendit & in musculos, humerum & scapulæ gibbum occupantes distribuitur. Arteriæ axillaris reliquum [t. 12. f. 1. VV.] ad brachium Axillari vena comite abít.

f Lauren. ca-
rotidem de
xtrâ subclauij
dextri quin-
tum ramū fa-
cit: cōtra Ve-
sal. Carotidis
dextra ramū
facit ipsam
subclauiam:
sinistram ve-
ro carotidem
non à subcla-
uia sed à trū-
co prodire, di-
cit Lauren-
tius.

Ascendentis trunci [t. 12. f. 1. E.] reliquum Aspe-
ræ arteriæ incumbens iuxta elatiorem sterni partem
Thymo suffultum adhuc in Thoracis cauitate, in
duos f ramos impares finditur, quos Carotides [t. 12.
f. 1. X. Y.] seu soporales vocant: quæ arteriæ sursum
rectâ tendunt, ita vt dextra quemadmodum & sini-
stra per partes colli laterales vsque ad Caluariæ basin
ferantur, asperæ arteriæ & venis iugularibus inter-
nis (externæ enim sine arterijs conspiciuntur) me-
diante membrana connexæ, caput petunt: de qui-
bus plenius in faciei historia.

De Pulmonibus.

CAPVT XXVI.

Horum historiam habet Gal. 6. vs. part. 20. 7. eiusd. 10. de
ipforum vasis egit 7. vs. part. 2. & 7. adm. an. 5. At quo-
modo spiritus a pulmone in thoracis capacitatē trans-
eat, ostenditur 8. adm. an. 10. de ipforum vsu, 7. vs. part.
8. Arist. 1. hist. an. 16. 2. eiusd. 15. 3. part. an. 6. 4. eiusd. 1.
lib. de respir. cap. 15. & 21.

a Gal. 6. vs.
part. 2. 7. e-
iusd. 1.

b δὲ τὸ πνεύ-
ματι ἀπὸ τοῦ
πνεύματος.

c Aristoteles

de respir. 10. d Aristoteles 3. part. 6. quæ respirant aere refrigerantur: pisces vero
aqua: serpentes pulmonem habent, non pisces, quia terra vtuntur: pisces brachia
vice pulmonum habent. Aristoteles 3. part. 6. 4. eiusd. 1. quæ brachia Gal. 6. vs. par.
9. crebris foraminib. intercepta, quo aer & vapor transire possit: subtiliora tamen,
quam

PULMONES qui vocis ^a simul ac respirationis in-
strumēta sunt, Græcis πνεύμονες, ^b propter πνεύ-
ματος, id est, spiritus receptionem: vel à πνεύω, spiro
dicti, siquidem inspirando aerem attrahant, exspi-
rando reddant: hi omnibus respirantibus ^d dati, &
in tho-

in thoracis^e cavitare [tab. 4. N. O. P.] siti sunt, cum ab
 ore aliquantulum distare debuerint, ne aeris appul-
 su statim refrigerentur: in viventibus, dum inspi-
 rant, vniuersum^f thoracis cauum (præter eam re-
 gionem, quam interfepientes membranas [tab. 4. L.]
 in se complecti, vna cū corde pericardio intectum,
 liximus) implentes: dum vero expirant, subsident
 quidem, sed non, vt in mortuis flaccidi concidunt,
 cum aere & sanguine semper adhuc referti sint, &
 quamuis folle per asperā arteriam indito inflari pos-
 sint, vix tamen tantum spatij, vt in viuis, opplent.
 Cum enim plurimū aeris continere debuerint, quæ
 pluribus cordis motibus sufficeret, neve & loquen-
 do, cantando & vociferando semper inspirare cogi-
 mur, eorum quantitas maxima esse debuit. Et licet
 naiori ex parte liberi sint, quo liberius moueri pos-
 sint, attamen asperæ arteriæ vasorum intermedio
 collo & dorso, ne decidant, suspensi tenentur, & me-
 liaistini interuentu [tab. 4. G. H. ad A.] antierius sterno,
 posterius vertebris quasi connectuntur: quemad-
 modum in aliquibus partibus ad thoracis latera fi-
 orosis nexibus ab ipforum membrana productis (q̃
 n^h homine peculiariter tanquam in sapientissimo
 nimali obseruatur) pleuræⁱ adnascuntur, quo pul-
 mones, qui ex sese motus omnis expertes sunt, tho-
 racis motū præterquam vacui fugâ facilius sequan-
 tur. Equidem Galeni sententia est, pulmones tho-
 racis^k motum ad vacui fugam sequi, quatenus dif-

Ff 2

tento

orp. pulmo $\chi\epsilon\lambda\omega$ implet. g Addit Laurentius, ac foetidos odores fugiamus, &
 um natamus, aut aqua immergimus, spiritum cohibeamus. h Hoc semper no-
 ui, à Vesaliò & Fallopio monitus. i Quod si maiori spatio fiat dispnciam, in
 nis aliis hominibus causat, quod fieri videmus plerumque in ijs, qui Pleuritide
 laborant. k Aristoteles 3 part. 6. putat, pulmonem sui motus principium à corde
 ccipere. Auerrhoes, propria vi moueri, non autem thoracis motum sequi vult,
 nia daretur aliquis motus violentus perpetuus. Laurentio, mouetur non à corde,

quia

quam pro mo-
 le aqua, hanc
 extra pellen-
 tes, illa pro-
 pte intermit-
 tentes. Arist.
 de respirat. 10.
 & 21. simul
 & pulmonem
 & $\beta\epsilon\gamma\chi\iota\alpha$
 habere nul-
 lum vnquam
 vium est:
 pulmo refri-
 gerationis a-
 ius gratiâ,
 qua spiritus
 fit: branchia
 vero ob eam
 refrigeratio-
 nem, qua ab
 humore pro-
 uenit, iam o-
 mnibus vna
 refrigeratio
 sufficit.

e Eandem,
 quam cor ob-
 tinet sedem,
 Aristoteles 3.
 part. 3.

f Galenus 13.
 usu partium
 6. Hippocra-
 tes de resect.

TABVLÆ huius XIII. Figura 1. pulmonis
 anteriorem partem cum suis vasis. fig. 2. posteriorem
 exhibet. At fig. 3. venam arteriosam, quemadmo-
 dum fig. 4. arteriam venosam denudatam
 à pulmonum substantia
 proponit.

LIB. II.

ICI



TAB. XIII.

FIG. II.




FIG. III.



FIG. IV.



quia perpetuus
non est illius
motus, nec à
cerebro; quia
non est volun-
tariu, nec vi
propria, sed à
thorace ad va-
cui fugam.

tento thorace & inspiratione aere impleti dilatan-
tur, eodemque contracto & expiratione euacuati
concidunt; quod vulnere thoracis ostendit. Si enim
thorax vulneretur, ita vt aer subire possit, pulmones
immobiles redduntur, thoracisq; dilatationem non
sequuntur, propter aerem vacuum spatium replen-
tem: sed integro thorace distento, pulmones neces-
sario dilatantur, ne vacuum detur, iidemque non
tamen ad vacui fugam, sed vel à thorace compressi,
vel aere exspirato, vel vtroque modo concidunt. Ve-
rum (addimus) natura necessitatem motus pulmo-
num agnoscens, ne confosso thorace aer per vulnus
ingrediens, pulmonum dilatationem, quæ vacui fu-
gâ fit, penitus impediat, eos pleuræ adnecti voluit,
vt sic pulmones necessario thoracis dilatationem se-
quantur. Cohærent quoq; cordi per venam arterio-
sam [t. 5. f. 2. G.] & Arteriam venosam.

Figuram [tab. 4. & 5. ostendunt.] pro ratione par-
tiû quibus accumbunt, obtinent, quare extrinsecus,
quo thoracis cavitati se accommodent, gibbi & ex-
tumescentes, intrinsecus caui [tab. 5. fig. 1. & 2. tab. 13.
fig. 1.] quo cordi pericardio tecto, quod suis lobis
in orbem complectuntur, cedant. Dextra tamen
pars sinistræ iuncta, vngulam bubulam [tab. 13. fig. 1.
& 2.] aut alterius bisulci animalis referunt, quem-
admodum enim vngues anteriore parte linea inui-
cem diuiduntur, ita & pulmones posteriore sede
[ta. 13. fig. 2.] propter vertebrarum corpora, impres-
sionem diuisionemq; modice obliquatam habent,
& anteriùs in medio dehiscunt.

in Gal. 7. vs.
part. 2. & 10.

Diuiduntur à mediastino [ta. 4. GG. HH.] in^m dex-
trum

Arist. 1. histor. 16. Serpentibus simplex, fibrosus, fistulosus, praelongus, longe corde
repositus, 2. histor. 17. pulmo omnium bipartitus esse expedit: at in iis, qua ani-
mal generant, distinctio non æque apparet, minimeq; in homine, est hominis pul-
mo simplicior, nec ita multifidus 2. hist. 16. idem fere 3. part. 6.

trum & sinistrum, quo parte vna læsa, altera adhuc ad vsum animalis referuetur (sæpe enim pulmone, vno in latere læso, & etiam absumpto, homo adhuc diu superuivere potest, vt Phthisicorū sectio docet) & vasorum dūtaxat beneficio [t. 13. f. 1.] quæ ab aspera arteria & corde in eos disseminatur, inuicē committuntur. Quilibet rursus linea è regione quartæ thoracis vertebræ per transversum oblique ducta [ta. 13. fig. 2.] in duos ⁿ lobos seu fibras ^o pinnae sue diuiditur, ⁿ Gal. 6 vfu
superiorē ^p nimirum & inferiorem, ita tamen, vt in ^{part. 4. at 7.}
homine membranis fibris cohæreant, sic vt potius ^{ad. an. 11. pul-}
sectionis nota quædam, quam vera diuisio sit (secus ^{monis fibra in}
quam in canibus) quorum inferior, altero longior ^{omnibus ani-}
existit: Sic autem diuiditur, & quo tuto ac celeriter ^{mantib. dua}
dilatare ac constringi possit (spiritu inspirato etiam ^{in dextris, dua}
in angustas eius partes facile permeante) & cor fir- ^{in sinistris, sed}
mius complectantur, & ne dum dorsum flectimus, ^{quinta quasi}
comprimantur. Et licet nonnunquam in tres, non- ^{loboles. Sic}
nunquam in nullos, nonnunquam in duos abs- ^{Hipp. de resect.}
que vera sectione distincti reperiantur, rarissi- ^{corp. pulmo χ-}
me tamen in homine, cum breue pectus habeat, ^{αν, implet}
quintus lobus reperitur, qui in simiis & canibus ^{quinque}
propter thoracis longitudinem, venæ cauæ caudi- ^{κερυφώσας}
ci inter diaphragma & pericardium, & quidem ^{summitates}
Ff 4 con- ^{habens, quas}
lobos vocant. ^{o Hipp. 2. de}
morbo, ἀσπρᾶ,
quibusdam per

ber metaphoram ala. ^p Cur diuidatur pulmo, vide 7. vfu. part. 10. ^q De numero
loborum agit 7 adm. an. 11. 7. vfu. partium. 2. & 10. & 6. eiusdem 4. ubi dicit,
dextrum pulmonem unitate superare in omnibus animalibus. Vesal. hominem
quinto lobo destitui certo certius, etsi Galen. 7. adm. an. Herophilum & Mari-
num reprehendens, dari voluerit. Columbus, natura vno lobo hominis pul-
monem à brutis separari voluit, quia in brutis hepar plurimum à corde distat: in
homine, quia inter cor & hepar septum tantum interiacet, quinto lobo opus non
fuit: & hinc elicere vult Galenum nunquam hominis Anatomem exercuisse.
Archangelus, quintus lobus cum nonnunquam in aliquibus non sit deprehensus,
nonnulli falso scripserunt, nemini mortalium esse concessum, Laurent. brutis plu-
res lobi, quia prona incedunt, quemadmodum & eorum hepar in lobos diuisum,
soli homini continuum.

r Galenus 7. *usu partium*
2. & 10.

f Parenchy-
ma Erasistrat-
is 7. adm. an.
s. omniū par-
tium, quæ vi-
siera appel-
lantur san-
guine refer-
tus est. Arist.
de respir. 15.
1. hist. 17 ubi
reprehendit
eos, qui san-
guine vacuū
arbitrantur,
quia in disse-
ctis animali-
bus vacuus
reperiatur,
quod fiat,
quia illico
sanguis uni-
uersus effluit.

r In iuniori-
bus densior in
florete aeta-
te rarior &
magis cauius
est. Hippo-
crates 2. de
morb.

u Pulmonū

generatio apud Hippocratem libro de carnibus habetur. x Ex 15. *usu partium* 6.
y Galenus 7. *usu partium* 8. z Varolus addit, ita ut portiones pulmonis mor-
tus semel dissecta iterum glutinentur. a Hippocrates de prisc. medicam. corpus
spongiosum & rarum. Galenus 4. *usu partium* 15. 7. eiusdem 8. fungosus & fistulis
plenus. Aristoteles de respirat. 15. libr. 1. hist. 17. Sic Hippocrates ψαφάρων, id est,
tenerum & molle dicitur lib. de inter. aff. & 3. de morb. b Galenus 7. *usu par-
tium* 2. & 10.

concauus ipsius venæ rotunditati cedens, fulcri cu-
iusdam vicem præstans subiicitur: & si adsit, tū in r
iugulo tanquam stratum venæ cauæ subiicitur.

Substantia eorum [tab. 13. f. 2.] carnosæ est (quare
παρέγχυμα & carnosum r viscus dicitur) triplici va-
forum genere [t. 13. f. 2. B. C. D.] intertextæ, membra-
naq; tenui tecta, quæ pro ratione r ætatis mollitie &
colore variat. Cum enim pulmones, (qui ex sangui-
ne à caua ad Arteriam venalem per anastomosen de-
lato, & sanguine spirituofo ab Aorta ad Venam ar-
teriosam per canalem transmissio u oriuntur, quo et-
iam augmentur nutriunturq; dum fœtus in vtero est)
in fœtu nō moueantur, vt nec cor, densissimi & cras-
sissimi sunt, substantiâ hepatis x similes: rubei, ratio-
ne alimenti, quo nutriuntur. At fœtu excluso, vbi
cor moueri cœpit, ab eius calore & motu, eorum ca-
ro cum & ipsi ad Thoracis motum moueantur, sen-
sim mollis leuisque redditur, quo thoracis motibus
prompte obediant, facile attolli collabiq; possint, &
vt instar y stœbes in vasorum diuisionibus ponatur,
quo omne id quod inter ea inane est, repleat, sitque
firmamentum ac propugnaculum ipsorum, ne quid
ex assiduo motu rumpatur, & hæc ratio cur Platoni
sit αλμα μελακόν, ad quod substantia z multo lentore
& visciditate prædita plurimum facit. Est quinetiam
rara, laxa, spongiosa & velut ex spuma sanguinis cō-
creta, quo instar folliis aerem inspiratum recipiat, &
affatim repleatur: colore ex pallido flauescente, sæpe
cinericeo notis quibusdam subobscuris, fuscis & ni-

grican-

gricantibus compuncta, vel tanquam nubium lineamentis conspersa, & in ijs, qui ex diuturno morbo interiêre, intensius nigricat.

Membranam ^c habent à ^d pleura enatam, vbi enim vasa pulmonem [t. 13. f. 1. C. D.] ingrediuntur, ibi tunica eorum communis à pleura pronata ab ipsis recedit, ac pulmonum superficiem tenuissime expanditur, quo ipsorum substantia mollis, firmior redatur, aliàs enim assiduis motionibus impulsæ, breui diuulsa, dissiparetur: hæc tenuis est, ne pondere sit molesta, & mollis, quo facile cum pulmone & dilatetur, & concidat: porosa vt si forte quid saniei in thorace colligeretur in Pleuritide & Peripneumonia, in eos, inquit, pateat aditus, quo per tussim reiiciatur: in quibus tamen affectibus & pulmones affici statuimus: sic ex Pleuriticorum anatome & remanente difficili respiratione, eiusq; lateris aliquo dolore in ijs, qui conualuere ad finem vitæ, edocti. Hæc etiam eorum superficiem reddit leuem, & veluti humore lento aspersam. In hanc Nerviuli ^d exigui, cum exiguo sensu eguerint, à sexto ^c pari disseminantur, à dextris quidem [t. 9. f. 1. r.] postquam recurrentem dextrum, à sinistris vero [t. 9. f. 1. qq.] ante recurrentis constitutionem, qui pulmonum ^f carnem non attingunt, ne ex assiduo motu doleant, & lassentur: hinc omnia pulmonis vlcera absq; dolore fiunt.

Vasa ^g tria [t. 13. f. 1. B. C. D.] varijs ramis connexa & immixta per eos disseminantur, quæ bifariam ^h primum, vt pulmones, mox in alias partes inuicem & eadem serie diuiduntur, ita vt in ramos capillares tandem ad extremam eorū superficiem abeant, quibus eorum substantia, quemadmodum venis, hepatis, caro circumfunditur. Horum vnum pulmonibus proprium Aspera arteria [t. 13. f. 1. B. & t. 14.] dicitur, quæ ramis est maioribus in medio reliquorum

^c Galenus.
adm. an. 18. 7.
eiusdem 2.

^d Ex 7. usu
part. 10. at
cap. 2. portio-
nem eorū ner-
uorum, qui
ad ventricu-
lum feruntur.

^e De diss. ner-
uor. 10.

^f Vesalio nul-
li: aut per quæ
graciles.

^g De his 6.
us. part. 20.
7. eiusdem 7.
7 adm. an. 4.
at de horum
usu 7. us. par-
tem 7.

^h Ex 7. usu
part. 21.

disseminatis, & aerem per os naresque attractum ac pulmones defert, de quo sequenti capite. Duo vero à corde recipit, de quibus supra egimus: quorum alterum Vena arteriosa [*ta. 13. fig. 1. C. fig. 3. tota vena arteriosa*] quæ ex dextro vëtriculo sanguinem alimentarium in eo attenuatum pulmonibus pro earum nutritione subministrat, cum quo & spiritus naturalis, ad spiritus naturalis innati custodiam, & anima naturalis huic spiritui insidens cum suis viribus pulmonibus communicatur. Alterum vero Arteria venosa [*ta. 13. fig. 1. D. fig. 4. arteria venosa separata*] quæ non solius spiritus instrumentum est, verum etiam purum, tenuem ac vaporosum sanguinem continet: quare aerem per Asperam arteriam attractum, in pulmonibus præparatum, ad cor defert, & ex sinistro ventriculo sanguinem vitalem cum spiritu & facultate vitali, ad pulmones defert: partim vt eo nutriantur, partim ad vitam, quo calor innatus foueatur (vita enim à spiritu vitali est, & arterioso sanguine, qui in sinistro ventriculo perficitur) per eam quoq; fuligines à corde propelluntur. Sunt autem i duo hæcce vasa longe maiora, quam pulmonum magnitudo requirere videatur (si proportio cum aliis partibus instituat) quoniam pulmones motu suo perpetuo, celeriter humores plurimum absument & dissipant: dein etiam quia non solum sanguinem naturalem & vitalem cum spiritu vitali deferunt, sed etiam suis extremitatibus ab asperæ arteriæ finibus aerem excipiunt, & in cordis ventriculos deferunt, & si horum parvus ramus ^k ruptus fuerit, pulmones purulenti redduntur.

^k Hippocras.
 tes. de mor.
 bis: ubi etiam
 habet, pul-

Iam vero nutriendi ratio pulmonibus plane contraria

monem calore ex toto corpore præsertim è capite pituitam, ad se trahere.

traria est, ac cæteris partibus, quemadmodum & eorum substantia: nulla enim pars adeo rara, lævis ac spiritiosa, neque etiam vlla quæ sanguine adeo tenui puro ac vaporoso nutriatur. Quare pulmones ¹ vasa habuere contraria iis, quæ in aliis sunt

partibus: In his enim venæ tunicam raram ac tenuē habent, quo affatim & celeriter crassus sanguis partib. circumfusis distribuatur: nutriuntur enim corpora sanguine per ipsam vasorum tunicam attracto.

Arteriæ vero crassæ ac densæ, quo paucum & subtilem spirituosumue sanguinem tantum vicinæ partes pro vita trahere possint, cum nulla etiam minima corporis particula absque vitali sanguine permanere possit. At in pulmonibus venarum tunica

[ta. 13. fig. 3. B. C.] crassâ ac densa existit, quo nihil nisi tenuissimum elabi sinant, cum vnum quodque alimento sibi simili nutriatur: pulmonū vero corpus læue ac rarum sit, idcirco sanguine puro, vaporoso ac tenui indigent. At cum pulmones copiosiore alimento, quam cæterę partes egeant, tum propter perpetuum motum, tum propter caliditatis copiam, quam partim ex cordis vicinia, partim ex motionis assiduitate assequitur, idcirco arteriis venæ tunicam

[t. 13. fig. 4. F.] tribuit, quo hæc^m copiosissimum, tenuem, ac spirituosum sanguinem abunde tribuant: ut quod venæⁿ propter sui crassitudinem ac densitatem, alimenti minus ipsi tribuere possunt, hoc omne arteriæ compensent, vt quæ præ raritate ac tenuitate ipsum continere nequeant. Tria hæc vasa

alij ad motum pulmonis, alij ad motum cordis moveri volunt: verum o sola aspera arteria dilatatur pulmone dilatato. At arteria venosa, mouetur eadem ad motum cordis, sed non eodem motu nec ad eū vi, qua arteriæ: siquidem cor in dilatatione aerē

ab arteriis recipit, & in contractione per arterias effundit. Quare arteriæ, quæ ad motum pulmonis sunt, dilatantur, & in contractione cordis, arteriæ, quæ ad motum cordis sunt, contrahuntur.

Quare arteriæ, quæ ad motum pulmonis sunt, dilatantur, & in contractione cordis, arteriæ, quæ ad motum cordis sunt, contrahuntur. Quare arteriæ, quæ ad motum pulmonis sunt, dilatantur, & in contractione cordis, arteriæ, quæ ad motum cordis sunt, contrahuntur.

Quare arteriæ, quæ ad motum pulmonis sunt, dilatantur, & in contractione cordis, arteriæ, quæ ad motum cordis sunt, contrahuntur. Quare arteriæ, quæ ad motum pulmonis sunt, dilatantur, & in contractione cordis, arteriæ, quæ ad motum cordis sunt, contrahuntur.

1 Gal. 6. usu
part. 20. pulmo
arterias habet
venosas, veno-
sas, venas an-
tem arteriosas
quo conveniē-
ti alimento a-
leretur, & vt
arteria quidē
ipsius facile
contraheren-
tur, vena ve-
ro acrius.

m Ex 7. usu
part. 8.
n In 6. vs. part.

o Gal. 7. usu
part. 9 si mor-
tuo animali
per laryngem
insufflaueris,
implebis aspe-
ras arterias, &
pulmonē distē-
di vidabis. Cū
interim arte-

la laues ac vena molem sibi ipsi retineant equabilem.

P Gal 7. v.
part. 1.

q Aristot. de
resp. 1. & 15.

causa respirā
di pulmo, &
3. part. 6. pul
mo respirandi
officio delega
tus est.

r Aristot. de
resp. 21. folli
qui in officinis
ferrarijs ha
bētur assimi
lanit. Pulmo
nes sunt vel
ut gemini
folles aerem
attrahentes:
& aspera ar
teria veluti
cāna per quā
fit attractio
aeris, Fall. de
offib. 19.

ab arteria venosa trahit: in cōtractione sanguinis vi
talis portionē pellit & fuligines; vacuatur ergo in di
latatione cordis, & impletur in eiusdē contractione.

Vfus pulmōnum: vt sint P respirationis & vocis
inſtrumenta (quæcunque q enim pulmone carent,
respirare nō solent, nec etiam vocem edere queunt)
siquidem dilatati instar folliſ, aerem ^r per asperæ ar
teriæ ramos excipiunt, eumq; cum spirituum ^r sint
officinæ, Cordi ne eum impurum & confertim ^t &
derepente irruentem assumat, sed paulatim ^f immu
tant, præparant, quo innati spiritus pabulum con
ueniens fiat (hinc aeris ^t qualitas alia quidem fami
liaris & amica spiritui innato, alia vero aliena & cor
ruptrix; hinc videmus ^t illos, qui domos incolunt
calce nuper illitas, maxime vero ex carbonum fumo
& alijs eiusdem generis, extingui) quem per arteriæ
venosæ ramos ex Asperæ arteriæ propaginibus, cum
osculis coeant, in cordis dilatatione, cor sibi allicit
pro ^u refrigerio: siquidem ^x calidum omne frigido
moderato nutriatur, foueatur & cōseruetur. Quem
admodum enim flamma ^y angusto loco coercita, &

aere
f Ex 6. v. part. 2. t Gal. 7. v. part. 8. eius spiritus, qui animali inest, fiat nu
trimentum, cuius alterationis, pulmonis caro primū est instrumentum: quemad
modum hepatis caro cibi in sanguinem mutationis auctor est. u Arist. ea potissi
mum respirant, quæ pulmōnē habent sanguineum, nam quod calidius, id uberiori
refrigeratione indiget, de resp. 1. & 15. vide & 3. part. 6. ubi Gaza male vocē ἀνα
πνοήν semper spirationē vertit: siquidem docēte Galeno in com. de sal. diat. ἀναπνοή
perspiratio sit, cum per totū corpus aer trahitur & expiratur. ἀναπνοή vero, cum
spiritus per os & nares intro & extra fertur. Archang. vult: Cor beneficio pulmo
nū perpetuo ad se trahere una cum aere calorem cœlestem, & spiritum in aere exi
stentem. x Hipp. de nat. pueri. y Gal. de v. respir. dictum Hippocratis explicat.
& attractum perpetuo in omnes corporis partes transmittere, &c. Mox pulmōnū
sex vsus proponit. 1. Aerem haustū præparare cordi, vt vētriculus chylum hepati.
2. Cordis calorem & cœlestem ingenitū & elementarium tanquam flabellum ven
tilare & conseruare. 3. Cordis calorem cœlestem simili importato, nutriendo au
gere. 4. Cordis calorem elementariū aere frigidiorē hausto refrigerare. 5. Vt cor
per pulmōnem bibat. 6. Vt vocem edere possimus. Columbus voluit, aerem in spi

aere non ventilata marcescit: ita natiuus noster calor frigido deficiente languet, (vt norunt ij, qui calidioribus sudatorijs insident) contabescit & tandem extinguitur, cū is flammæ instar continuo moueatur: quare Philosophi cordis flabellum & ventilabrum vocarunt: & Plato à pulmonibus cor temperari voluit, quando ira exæstuet. Sic cū constringuntur; expiratione (in inspirando enim & expirando vitam consistere dixit ² Philosophus) eadem via aerem residuum, vt nouo cedat, & voci, vt volunt, materiam præbeat, expellunt: qui, dum ingreditur, frigidus est, dum egreditur calidus, propter caloris in corde contenti contactum: simul quoq; spirituum excrementa fuliginosa, pulmonumque tam tenuia, quam crassa in asperæ ramis collecta, ex sufflatione validiore per tussim factâ in asperæ arteriæ canalem propellunt, nonnunquam veluti per arundinem vsque in os eiaculantur.

ratū per pulmones ferri, eos aerē cum illo sanguine, qui per venā arteriosam ex dextro ventriculo profectus est, miscere; hac mixta per arteriam venalem recipi, & ad cor ferri, quo sanguis spiritusq; vitalis in ijs paratus & pene generatus in corde magis perficiatur. Sed

quæro, quomodo feratur hic sanguis in arteriam venosam, cum vena arteriosa & arteria venosa non iungantur, sed arteria aspera intercedat? Verum Archangelus hanc Columbi opinionem nouam dicens, nouem rationibus refutat. ² De respiratione. 21.

De Aspera Arteria.

CAPVT XXVII.

De hac egit Gal. 7. vs. part. à cap. 3. vsq; ad 9. & 7. adm. an.

1. & 5. Aristoteles 1. hist. 16. 2. eiusd. 1. 53. part. 3. & lib.

de respir. 11.

TERTIVM vas pulmonibus propriū, quod Venteres^a simpliciter Arteriam, eo quod aerē contineat, vocarunt, posteriores cum Galeno ἀρτηρία πνευματική, asperam arteriam ab inæquali qua constat, substantia, & quo ab arterijs leuibus distinguerent, nominarunt: vulgo canna pulmonis appellatur.

Est au-

tem Gal. 7. adm. an. 2. arteriarum alterum genus dicit. Laetantius, spiritalis fistula.

^a Hipp. 7. 6.

ped. lib. de rat.

vidus. Arist.

1. hist. 16. 3.

par. 10 2. hist.

15. & lib. de

spir. 5. idem q

medici per ar-

teriam intelli-

git, dum dicit,

ad intestina

& venire ve-

nas & arte-


rias cōmitti.

TABVLÆ huius XIV. *Fig. 1. arteria as-
pera caput, fistulam & ramos per pulmonē dis-
seminatos partem anteriorem, quemadmodum
fig. 2. partem posteriorem pro-
ponit.*

FIG. I.



II.



b Ex 7. adm.
anat. 1.

c Arist. 1. hist.
16 sic 2.
hist 15. omnia
habēt spiran-
tia, &c. Gal.
7. v. part. 5.
d Arist. 1. hi-
stor. 16. 2. e-
iusd 17.

e Aristot. 3.
part. 3. & 1.
hist. 16. prio-
rem obtinet
suum.

f Libr. de in-
ter. aff. τῶν
συνέχων τῶν

Δξ τῶν πλῶ-
μων &c. &c.

g De locis in
homine, flu-
xio feritur

(Δξ τῆς βρόγ-
χης καὶ τῶν ἀρ-
τηριῶν) per gut-
tur & aortā,
qua pulmo-
nem & gut-
tur coniun-
gunt.

h Gal. 6. v. f.
part. 21. 7. e-
iusd. 3. & 7.
sic 7. adm. an.
1. & Larynx
& recentio-
ribus bronchi
caput.

i Ex 7. adm.
an 5.

Est autem canalis [t. 14. f. 1. & 2.] seu fistula vna^b ea-
que maxima omnibus animalibus, quæ^c pulmonem
habent, data, quæ foramina^d narium in os patentia
spectans, ante^e œsophagum [t. 13. f. 1. AA.] posita est
siquidem ex humiliore faucium sede œsophago in-
cumbens, ab ore rectā deorsum per collum, quo
ipsius gratia cōstructum videtur, in pulmones sem-
per hians fertur, & infima parte velut in multas fistu-
las ab Hipp. Syringas^f & aortas^g nominatas, diuise
frequenti ramorum serie [t. 14. f. 1. bb. ccc.] pulmone
adit: eiusque pars superior, ipsiusve caput^h Laryn-
[t. 14. f. 1. & 2. g. h.] (de quo in oris historia dicetur
reliquum vero [t. 14. f. 1. AA.] βρόγχος ἀπὸ τῆς βρέχεσθαι
quod à potu irrigetur, nominatur, & in collo cau-
diciⁱ rationem obtinet.

Connectitur suo capite, faucibus mediante inte-
riore tunica: dein tunica exteriore, anterieus quide-
& ad latera, vicinis musculis & vasis: posterius ver-
fibrosis aliquot^k nexibus œsophago connascitu-
quo tutius deorsum feratur.

Huius substantia partim membranæa, [t. 14. f. 2.]
partim cartilaginea [t. 14. f. 2. dd.] est, quæ tunicis du-
bus vestitur: altera^l exteriore à pleura enata, quæ t-
nua est, & cartilaginum membraneis vinculis peri-
nacissime connascitur, & velut indumentum quo-
dam fistulæ existit, eiusq; interuentu vicinis partib;
alligatur, & nervos recurrētes huic arteriæ propri-
iungit, & tutissime deducit. Tunicarum altera inte-
na est à tunica palatum succingente enata, quæ t-
tam fistulam succingit, quo^m cartilaginee firmi
coniungantur: densa est^m ac solida exteriore mu-
to crassior (quo eam ab iniurijs rerum acrium quæ
vel à capite defluunt, vel sreatu reiiciuntur, vt a-
quando pituita salsa, putrida, aliquando biliosa, a-

qua

k Arist. 1. hist. 16. l Ex 7. v. part. 3. m Gal. 7. v. part. 7.

quando pus acre malignum, quod tussi eiicitur: vel rerum acrium illabentium, vt sunt fumi, vapores attracti, nō nunquam cibi & potus, acri qualitate præditi, deglutiti) ita tamen, vt in ramis per pulmonem dispersus longe sit tenuior (ne aeris assumptionem & fuliginum expulsionem prohibeat) quam in larynge, in fistula vero medio modo se habet. Hæc fibris secundum longitudinem rectis intertexta, mollis & leuis est, ac velut vinctoso humore perfusa, ne arteria ab aere calidiore attracto, exeuntibusve fuliginibus acriori vi præditi, vel in magnis clamoribus ac motibus exsicceetur, quod voci & aeris transmissioni valde obesset: siquidem partibus ad fauces & asperam arteriam spectantibus vehementer exsiccatis, vt in febribus ardentibus fieri solet, voces fiunt, quas Hippocrates $\kappa\lambda\alpha\gamma\iota\omega\delta\epsilon\iota\varsigma$, id est, clangosas appellat: ex humoris vero superflui copia, vt in destillationibus ac grauedinibus vox rauca efficitur. Quamuis etiam ab humore, quem glandulæ [t. 14. f. 1. ii.] laryngis radici appositæ & aliæ accubentes (raro enim in fistula exiguæ glandulæ obseruantur) continent, & à portione P potus sensim per canalem [t. 14. f. 1. aa.] descendente, vt in laryngis historia dicetur, humectetur. Est etiam summe sensibilis, quo ea, quæ molestant, quam citissime sentiat, & pulmones ad horum excretionem sollicitet. Inter duas hæc tunicas, cartilagine carumque propriæ membranæ ligamentosæ [t. 14. f. 1. 2. ee.] consistunt.

Cartilagine enim quamplurimæ hanc constituunt, quæ annuli figuram exprimunt, sed circum [t. 14. f. 2. dd.] integrum non perficiunt, cum quarta pars, parte posteriore exsecta sit, & cum Græcorum $\iota\gamma\mu\alpha$ seu Latinorū C referant, $\sigma\iota\mu\omega\epsilon\iota\delta\epsilon\iota\varsigma$ dicuntur,

Gg

etiam

$\epsilon\iota\varsigma\ \chi\acute{o}\rho\delta\ \rho\alpha\nu\ \sigma\upsilon\nu\chi\epsilon\iota\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\ \sigma\iota\gamma\mu\epsilon\iota\delta\omega\ \tau\acute{o}\ \chi\eta\mu\acute{o}\varsigma$: ita reddit interpretes, aspera arteria ex cartilaginibus, qua litera G imaginem referunt, constructa.

n Idcirco satis pinguis interior tunica Fallopio.

o Ex Gale. no 7. vsu partium 7. quæ siccitatem obtinuit moderatā, vt vox magis esset sonora.

p Potiū meare per arteriam error est, ait Aristoteles 3. part. 3.

quem errorem cōfutat, quia nullus sit mentus à pulmone ad ventrem, sicut ex ore gulam tendere cernimus.

Recte dicit Aristoteles, si de omni potu loquatur. Hac fuit Platonis opinio, quæ dicitur & Plutarch. 7. sympos. quæst. 1.

q Gal. 7. vs. part. 3. at 7. adm. an. s. ap. Ineia ait reg-

etiam *σπόγγισ*^h Medicis Galeni tempore appellata. Hæ toto ductu æqualiter ab inuicem distant, & superiores maiores sunt, latitudineq; crassitiem superant, præsertim in medio, cum ea pars anteriore sit loco, ne^r facile arteria à vi externa lædatur: hæ quæ paulatim attenuantur ac velut in membranam abeunt, & cuiusq; cartilaginis propriæ membranæ [t.14.f.1.ee.] ceu periostij interuentu tanquam ^fligamento (in brutis quidem membranoso, in homine vero velut carnoso) connectuntur. An forte hæc ligamenta [t.14.f.1.ee.] musculos perexiguos dicemus, qui se instar muscutorum intercostalium interfecerint, & cartilaginum spatia oppleant?

Et cum cartilagines totum circulum non absoluunt, parte posteriore mediantibus membraneis processibus, ab extremis cartilaginum partibus eductis, ita iunguntur, vt cartilagines cum hisce membranis [t.14.f.2.f.] circulum perfectum, sed non exacte rotundum constituent. Tali autem ^t substantia, non aliâ constitui fuit melius: si enim ex vna tantum cartilagine solida, vel ex prorsus circularibus cartilaginibus constitisset, semper eodem modo aperta potuisset, quod inspirationi & expirationi difficultatem attulisset, siquidem cum pulmonibus attolli & concidere oportuerit. Non enim ex sola membrana confici debuit, aliâs membrana ob mollitiem concidentis cauitatem non semper apertam seruare potuisset: talis etiam ^u aliaue mollis substantia ad vocis generationem inepta fuisset, quo modo funes multo humore imbuti. Nam cum hæc fistula non solum respirationis, sed etiam ^x vocis sit instrumentum, eius substantia ^y cartilaginosa esse debuit, & fistulæ modo rigida, dumq; efformari, non solum ad liberiores aëris ingressum & egressum, sed etiam ad vocis necessitatem, cum sonus sine collisione durioris corporis cum

^r In 7. usu
part. 7.

^f Ligamentis
membranosis
& fortib. connectuntur 7.
usu part. 3.

^t Gal. 7. usu
part. 4. 5. & 11.

^u Ex 7. usu
part. 6.

^x Non solum
spirandi causa,
sed etiam
vocis, 3. part.
an. 3.

^y Gal. 7. usu
part. 4. 5. & 11.

cum spiritu exeunte fieri non possit: quod enim sonat leue ac solidum esse oportet: quo inter aerem & substantiam percussam symmetria sit & robur, quo aliquantisper aer resistat: quare soni nomine, ex sola cartilagine constare poterat. Sed cum vox absque inspiratione, & potissimum expiratione fieri non possit, & hæc dilatatione & contractione indigeant, necessario ex cartilaginibus & ligamentis membranosis (quo prædictos motus prompte obire possit) constare debuit. Quare dum inspiramus, ligamenta cartilagines colligantia, tenduntur, & tantum à se cartilagines diducuntur, quantum ipsa extenduntur: dum expiramus contra, laxantur ac duplicantur, & in seipsas concidunt, ita vt cartilagines sese contingant, q̃ in mortuo si insuffletur, conspici potest. Idcirco ^z cartilagines ipsæ vocis sunt instrumenta: ligamenta vero membranosa, quæ ipsas iungunt, respirationis: arteria enim ipsa, vocem laryngi præparat, cum larynx sit primum & principalissimum vocis instrumentum. Adde etiam si ex perfectis cartilaginibus annularibus constaret, non solum ab earum duritie ^a œsophagus, qui mollis est, læderetur, verum etiam ciborum deglutitioni impedimento fuisset, œsophagi sufficientem dilatationem impediendo, potissimum in solidorum ciborum deglutitione, quod ij experiuntur, qui famelici nimium cibos minus probe mansos deuorant: quare ne larynx qui totus est cartilagineus, œsophago impedimento esset, hoc in deglutitione deorsum tracto, larynx ^b sursum ascendit.

^z Ex 7. vsu
part 5. & 6.

^a Gal. 7. vsu
part 7.

^b In 7. vsu
part 5. & 7.

Vbi canalis [t. 14. f. 1. aa.] hic in thoracis capacitatem ad quartam eius vertebam peruenit in duos truncos [t. 14. f. 1. & 2. bb.] diuiditur, quorum dexter dextram, sinister sinistram pulmonis partem accedit, qui pulmones ingressi, vtrinq; rursus in duos alios ramos ad quem-

c Gal. 7. v. f. part. 3. nulla in re dissident aut variant soboles eius omnes, sed si militer omnes eius cartilaginee multae sigmoides membranosis ligamentis contentae usque ad extremos visceris lobos conservantur. Vel salius perinde in pulmonis substantia ac caudice sese habent. Laurentius vult tantum semicirculares, ubi aesophago iunguntur, in pulmonibus circumculum absolute: quia in ijs semper debuerit patere arteria ad aeris attractionem & expulsionem: & esse aliquando quadratae.

libet lobum diuiduntur, hiq; in alios plures [t. 14. f. 1. cccc.] quorum *c* cartilaginee nunc triangulares, nunc quadratae, nunc alio modo formatae per pulmones ad extremum disseminantur, quo pulmonis dilatationi & constrictioni melius se accommodent, ne obstruantur, liberaq; sit inspiratio & expiratio: & ut sicuti, tussi, *d* aut purulentae aut sanguineae reiectioni pateant. Huius autem rami inter arteriarum venosarum, & venarum arteriosarum ramos [tab. 13. f. 1. B. C. D.] locantur, ita ut asperae, cuius rami semper maiores sunt, in medio *e* sint: ita tamen ut posteriore parte sit vena, anteriore vero, arteria, quae mox à corde pulmones ingreditur, cum eam à corde longius produci propter tenuem tunicam tutum non fuerit. Vtrique autem propinquam *e* esse oportuit, & osculis iungi: arteria quidem leui, ut ex aspera aeri in leues liber sit ingressus ad sinistram cordis ventriculum, ut fuliginum exitus pateat, non autem sanguini & caeteris humoribus, nisi impetu & per tussim: quare si forte à naturali *e* commodatione recesserint, & aliquo tempore patula fuerint, ita ut vel *f* ruptio aliqua, vel orificiorum apertio, vel vasis erasio in pulmone accidat, tum sanguinis portio aliqua ex leuibus arterijs in asperas effunditur, qui spiritui *f* facessit negotium, eius vias occupans, sicq; repente *e* tussis consequitur, & sanguinis per os profusio: quod si id, quod sensim defluxit *d* in brachij ramis, quae angusta habent foramina, concrescat, spirandi difficultatem talem efficit, ut eam velut deficiente semper homo respirare desideret. Venae vero arteriosae, & Arteriae asperae

d Hippocrates de loc. in hom. dum resiccatur quod defluit in brachio concrescens, cum non eluitur, sed sensim influit ac detinetur, tussim inducit, & in Aetio detentum quod influit, cum haec angusta foramina habeant, angustiam spiritui exhibent, eamq; spirandi difficultatem facit, ut ea velut deficiente semper respirare desideret. e Ex 7. usu partium 8. f Galenus 7. usu partium 3. omnino vacua sanguine, quando secundum naturam se habet animal.

asperæ rami, etiam per anastomoses iunguntur, vt à vena & sanguinem pro nutritione recipiat. Sic ergo arteriæ leues ^e arterias asperas cordi iungunt, & venarum parvæ propagines asperis inferuntur, quo alantur, ^f cum sanguine omnino careant: leuibus autem ^e non inferuntur venæ, cum ipsæ sanguinē contineant. Verum & vasa ^h exilia à vicinis vasis ipsa aspera obtinuit.

Vsus, ⁱ vt pulmones tanquam gemini folles, per eam tanquam per cannam seu fistulam, in respiratione aerem per nares aut os attractū & inspiratum attrahant (dilatato enim pulmone sola ^k Aspera arteria dilatatur) cordiq; demandent, & per eandem constructam, à pulmonibus rursus aerem cordi inutilem vna cum fuliginosis excrementis seu fumidis vaporibus expirando expurgent, & per os aut nares reddant. Dein, vt vocis instrumentum sit, siquidem ad vocis generationem, quæ in larynge fit, aer, qui expiratur, & propria ^l vocis est materia, requiratur, quemadmodum in fistulis follium aere repletis sonum fieri aduertimus: quare organum spirabile & vocale ^m Hippocrates vocauit. Tum etiam vt tussi vel sreatu exsufflationeue violenta, ea quæ vel à capite delapsa, vel in pulmonibus collecta sunt, per eam reiiciantur,

g Arist. 3. par. 3. Gal. 7. vs. part. 5. 13. eiusd. 6. h Naturâ cartilaginis arteria constit & sanguinis per quâ exigui compos est, venulis complexa tenuibus. Arist. 1. hist. 16. i Vocē & habitum transmittit. 1. hist. 12. non solum spirandi causa est, sed etiam vocis. 3. part. anim. 3. vocis simul ac respirationis instrumentum est. Gal. 7. vs. part. 5. & 6. k Gal. 7. vs. part. 9. l Ex 7. vsu part. 5. m Libr. 4. de morb.

De OEsophago.

CAPVT XXIIX.

Galen. de œsophago seu stomacho egit 6. vs. part. 5. & 6. de ipsius tunicis & fibris 4. vs. part. 8. Arist. 1. hist. 12. & 16. 3. eiusd. 17. & 3. part. anim. 3.

OESOPHAGVS, qui Græcis ^a οἰσοφάγος ab οἶω & φάγωμα, id est, cibum fero, nomen habet: & ἑστ-

a Aristoteles 1. hist. 16. 2. eiusd. 7. 3.

Gg 3

μαχος part. 3. Ga-

len 6 vsu partium 5. Hippocrates solum lib. de resect. corp. alibi vero stomachum appellat.

b Hippocrates de nat. off. decarn. de cord. Aristoteles 1. hist. 12. 3. e. iusd. 17. ubi Gaza gulam vestit. Galenus 6. usu partium 6. & 13. meth. meden. 17. stomachus plura significat, interdum superiorem œsophagi partem, qua proprie gula dicitur, ut apud Homerum: interdum ipsius partem inferiorem, id est, orificium ventriculi finistrum, ut apud Galenum 13. meth. 57. interdum ventriculum, ut cū ad Glauc.

cruditates in stomacho fieri scribit. Hippocrates & os uteri vocavit. c Aristoteles 1. hist. 16. alij παρὰ τὸ σῆμα καὶ χέω, quod stomachus cibum inferiore orificio ad intestina transfundat: quidam ἀ σῆμα & ἄγχω. d Cicero de natura deorum Celsus; Lactantio, cibaria fistula. e Galenus 6. usu partium 5. sic Aristoteles qua cibus & potus derivatur, 3. part. 3. f Aristoteles 2. hist. 15. & qua collum habent, 2. part. 3. 4. hist. 3. at pisces magna ex parte carent stomacho, ut qui annexum vi ventrem habent, 2. hist. 17. g Celsus faucibus subesse scribit. h Cicero 2. de natura deorum. ac Hippocrates de resectione corporis à lingua initium sumens in ventriculum definit. i Galenus 13. meth. 17. k Ex 6. usu partium 5. & 6. l Ex 6. usu partium 6.

μαχος b quasi ξενόμαχος dicitur e τὸ μήκος καὶ τῆς ξενότητος, à longitudine & angustia dicitur; Latinis d stomachus & gula: Arabib. Meri & Vescet nominatur.

Est ciborum & potuum ab ore e in ventriculum via communis, quem omnia f spirantia habent. Hic in ima faucium g cavitata [tab. 37. lib. 1. f. 1. & 2. A. œsophagi à faucibus præfecti orificium.] ad h linguæ radicem post laryngem, cui annectitur, principium sumit, & vtraq; ex parte tonsillas [t. 37. lib. 1. f. 1. EE.] attingit & collum, thoracemque peruens inter asperam arteriam [t. 13. f. 1. & 2. A. œsophagum, B. arteriam notant.] & vertebrae ceruicis ac thoracis, quibus i insidet (non enim per medium thoracis sinum amplum elabi, sed in firma aliqua sede conquirere debuit, partim ne aliquod instrumentum spiritus offendatur, partim ut ab externa iniuria tutissimus sit) rectaq; [tab. 37. lib. 1. f. 1. & 2. ab A. ad B.] delatus ad quintam k thoracis vertebrae nonnihil se in latus dextrum [tab. 37. lib. 1. f. 1. à B. ad C.] inclinat, quo Arteriæ magnæ trunco descendenti l cedat, cum ea ex sinistro k cordis ventriculo prodiens sinistrorsum necessario vergat: mox ad nonam vertebrae membranarum beneficio l sublimè admodum eleuatus, supra Arteriam magnam, ne in crassorum l ciborum transitu eam comprimatur, sanguinisque & spiritus transitum prohibeat, rursus ad sinistram [tab. 37. lib. 1. f. 1. à C. ad D.] cum

cum eo in loco os ventriculi superius dictum [*tab. 37. lib. 1. f. 1. & 2. G.*] sit constitutum, transit: & sub vena caua delatus, neruofam diaphragmatis partem per proprium ^m foramen inferiorem ventrem subit & ventriculi orificio sinistro (non dextro, ne hepar perforare cogatur) vna cum duobus neruis [*t. 37. lib. 1. f. 1. & 2. T. V.*] implantatur, ⁿ

Connectitur exortu suo faucibus per tunicam os succingentem, & ventriculo (vbi & diaphragmati conualcitur) per corporis continuitatem: vertebrarum vero corporibus, asperæ arteriæ & vicinis partibus beneficio membranarū ex dorsi ligamentis prodeuntium.

Figura [*t. 37. lib. 1. f. 1. & 2.*] rotundus est, & quo per locum ^o minorem materia plurima feratur, & quo ab iniurijs tutior sit: oblongus, cum os à ventriculo procul distet, qui instar intestini cuiusdam prærubri distenditur, capaxque redditur, ne cibi in eo subsistentes & asperæ cauitatem nonnihil occludentes respirationem impediunt, suffocationisq; periculum inducant.

Substantia ipsius inter carnem ^p & neruum media est (quare & inflammari & conuelli potest) neruosa quidem seu membranosa vt extendi possit in ^q longum latumque, cum cibus ingeritur, rursusque concidere: carnosa, vt mollis sit & cibo descendent cedat: ne autem ob eius molliem in seipsum cibo superueniente concidat, extensus detineri debuit; quemadmodum saccus frumēto replendus, nisi manibus sursum elatis extensus teneatur, transitū non admittit: quare œsophagus vertebrarum corporibus coherens cōuenienter extensus remanet: & cum spinæ superiaceat, idcirco ipso affecto, cataplasinata

Gg 4

supra

branea, neruea & exanguis Colombo; neruea & membranosa, Varolo. q Arist. 2. hist. 16. r Gal 13. meth. 17.

m Cum Hippocr. voluit Galenus s. ad anat. eodem cum Arteria magna foramine vti. Aristoteles 1. hist. 16. per seipsum transfuersum in ventriculum finit.

n Aliqui angustiores putant quæ ventriculo continuatur, quam in ceruice, existimantes ab atrabile à liene in ventriculi os eructata, colligi, quod falsum est, Vesal.

o Gal. 7. vs. part. 7.

p Carnis speciem refert, Aristot. 1. hist. 16. ex carne & neruo, 3 part. 3. neruosa membranea ve, Vesal. mem-

q Arist.

f De his 4. v. f. supra spinam dorsi applicari debent. f. Tunicis tri-
part. 8.

t Externa car-
nosior trans-
uersos villos
habens 4. v. f. u
part. 8. crassior
mellior prop-
ter modum mus-
culorum natura
carnosum v. f. i
tur Vesal.

u Membrano
sior villos re-
ctis superne de-
orsum tenden-
tes habet, si-
quidem ven-
triculus tra-
hāt oportet ad
se ipsum per sto-
machum cibū
& potum tan-
quam manib.
rectis his vil-
lis, propellit
vero transuer-
sis 4. v. f. par. 8
neuosior, du-
rior pauloque
tenuior, Ve-
salio; nervosa
Fallop. crassior
multo exter-
na, Columbus.

supra spinam dorsi applicari debent. f. Tunicis tri-
bus donatur, vna communi & duabus propriis: pri-
ma à ligamentis vertebrarum enata: quæ duarum
propriarum inuolucrum existit. Altera quæ exter-
na dici solet, carnosior admodum crassaque ac si mus-
culus esset perforatus, à secunda cartilagine laryn-
gis, qua ceruicem spectat ortum ducit, & tantum
transuersis fibris donatur, vt his alimenta ab inte-
rioris tunicæ fibris attracta promptius in ventricu-
lum truantur, quæ & ventriculo in vomitu quip-
pam, quod illum grauat, magna cum violentia ex-
pellente auxilio sunt; quæ duo diuersa ratione fiunt:
Si enim fibræ superius contrahi incipiant, degluti-
tioni; si à ventriculi orificio, vomitui inferuiunt.

Tertia est interna & dissimilari^u substantiæ, cuius
intimæ superficiē veluti velum, quod læue & lubri-
cum est subtenditur, fibris rectis & tenuissimis do-
natum, quo alimentum ab ore susceptum attrahant:
reliqua vero substantia, à qua velum illud instar cu-
ticulæ à corio separari potest, nervosa est *, ac ipsa
externa membranosi^{or}, durior & sensibili^{or}, quo
esculentorum y & potulentorum suauitas tactu sen-
tiatur. Et hæc oritur ab ea, quæ palatum, os, labia,
faucesque vestit & vsq; ad ventriculi orificium fini-
strum fertur. Fibris obliquis pene caret, ne ab his
cibus diutius in œsophago retineatur, quod vtriusq;
arteriæ impedimento foret. Quo vero hæc recte cō-
spici possint, aliquantisper, quo nimia humiditas
absumatur, elixari debet. Ast deglutitionem, cum o-
pus sit ex animali & naturali mistum, adiuuare vidē-
tur musculi z œsophagæi dicti [tab. 28. lib. 3. fig. 7. ll.]

qui
crassior & neuosior Laurentio. x Triplici fibrarum genere donata. Fallopius.
y Aristotel. 4. partium 11. z In ore & faucibus musculos deglutitioni dica-
tes natura locauit, qui à Fallopio eleganter describuntur, quorum ante Aui-
cenna meminerat.

qui Laryngis ^a muscoli statuuntur, qui à lateribus Thyroidis cartilaginis prodeuntes œsophagum omnino amplexantur, & in mediam illius partem, linea alba discreti inferuntur.

^a Vesal. Fallop. & Aquapen. communium tertium par. Columbus unicum esse vult, & pro tertio habet.

Quo vero facilius sit deglutitio, cavitates ipsius semper humore imbuitur à glandulis adpositis: in faucibus quidem à glandulis [t. 37. lib. 1. f. 1. EE.] œsophago & Laryngi communibus salivam continentibus, quas Tonillas vocant: dein à corpore glanduloso [tab. 37. lib. 1. f. 1. & 2. FF.] quod parte posteriore & ad latera eius medio ductui adnascitur, & ut eius cavitatem semper humectet, & ut à vertebrarum duritie tueatur, neve facile œsophagus in alterutrum latus moveatur.

Venas habet paucissimas à Caua & venæ portæ ramo [tab. 37. lib. 1. f. 1. & 2. dd.] coronario: Arterias ab Arteriæ magnæ trunco descendente, & à Cœliacæ [tab. 37. lib. 1. f. 1. & 2. dd.] ramo coronario, Nervos insignes à sexto pari [t. 9. f. 1. f. t. uu. & t. 37. lib. 1. f. 1. & 2. T. V.] qui oblique ^b securitatis gratia deferuntur, (cum via obliqua multo tutior sit recta:) molles enim cum sint ac tenues, cum longo intervallo du-
pendi fuerint, & à ventriculi tum mole tum pondere extendantur, facile, si recti ducerentur, disrumpe-
rentur) & circa œsophagum prius ^b inuoluti, de-
num [tab. 37. lib. 1. f. 2. X. T.] ventriculo infiguntur.

^b Gal. 6. vs. part. 6.

Vsus ut per eum veluti ^c infundibulum cibus ^d & potus nonnihil in ore confecta, linguæ motibus retrorsum ad œsophagi initium detrusa suscipiat, & constrictis faucibus, partibus infra cibum dilatatis, supernis vero contractis, deorsum pellantur, & in ventriculum detrudantur. Notatu tamen dignum, in quibusdam solida facilius deglutiri liquidis, quæ in nares sæpe repelluntur, quod in ijs, qui diu colicâ laborarunt, frequens est: cuius rei causa in resolu-

^c Hippoc. de Corde ο σφραγος ο κειον χασις & potus copiam, & quacumq; expectimus excipit.

^d Gal. 3. nat.


tionem muscutorum faucium referenda est, vbi solida pondere suo vim quasi musculis inferunt, non autem liquida: quamuis etiam sæpe tumor seu inflammatio glandularum prædictarum obstaculo sit, vbi solida alimenta glandulas comprimantia cavitatem efficiunt.

De Musculis & Nervis in Thoracis Cavitate sitis.

CAPVT XXIX.


EXPLICATIS partibus in Thoracis cavitate contentis, iisdemq; remotis, occurrunt adhuc Musculi, Nerui, & ossa. Musculi duo cervicis seu colli longi [t. 15. A. B.] dicti, qui sub œsophago siti vertebri affixi sunt. Qui vero ad latera & posterius, caput collumque extendentes siti sint, supra cap. 6. recensuimus.

Nerui etiam duplices per thoracem feruntur, alij à sexto pari medullæ [t. 9. f. 1. ostendit.] cerebri: alij à spinali medulla, quæ vel in cervicis vel thoracis vertebri est, prodeunt, de quibus supra cap. 19. dictum fuit.



TABVLA XV. Vtriusq; ventris infimi & medij cauitatem visceribus & diaphragmate vacuam exhibet, & quinam muscoli, quæ etiam ossa, sterno remoto & visceribus exemptis, remaneant, ostendit.

- AB. *Cervicem flectentium musculus primus, seu Longus.*
 CC. *Cervicem flectentium secundus, seu Scalenus.*
 DDDD. *Intercostales musculi exteriores.*
 EEEE. *Intercostales musculi interiores.*
 F F F. *Serratus maior, seu thoracis secundus.*
 G. *Serratus minor, seu scapulæ primus, à suo exortu separatus.*
 H. *Pectoralis, seu brachij primus ab exortu separatus.*
 I. *Deltoides, seu brachij secundus.*
 K. *Humeri, seu brachij os ex carne.*
 L. *Cubiti musculus primus, seu biceps.*
 M. *Cubiti secundus, seu brachialis.*
 N. *Claucula extrorsum flexa.*
 O. *Thoracis musc. primus, seu subclavius.*
 P. *Scapulæ processus elatior.*
 Q. *Capitis musc. sextus, seu obliquus inferior.*
 R. *Capitis musc. secundus, siue complexus.*
 S. *Scapulæ musc. quartus, siue Levator.*
 TV. *Ossis Hyoidis musculi quarti ventres duo.*
 XXaa. *Dorsi musculus quintus, cuius principium aa.*
 YY. bb. cc. *Femoris musc. sextus, seu Psoæ cuius princ. cc. tendo bb.*
 ZZ. *Femoris musculus septimus.*
 d o o o. *Os sacrum d, ex cuius foraminibus nerui o o o, profiliunt, qui nimis magni ad egressum sculpti.*
 e *Femoris quinti musculi portio ab osse pubis.*
 f. *Os pubis denudatum.*
 k. *Femoris musc. nonus, seu circumagentium primus.*



De Ossibus Thoracis.

CAPVT XXX.

OSSA thoracem constituentia sunt parte quidem anteriore, os pectoris ad cuius partem superiorem Clauiculæ duæ adpositæ sunt; partibus lateralibus Costæ viginti quatuor, de quibus dictum fuit cap. 8. 9. & 10. & parte posteriore sunt vertebra & scapularum ossa, de quibus nunc agemus.

De Vertebri seu sphondylis dorsi vide Gal. lib. de oss. c. 9.
& 13. vsu partium 7. de earum productionibus 12. vsu partium 16.

a Vertebraς
σφονδύλῃς
vocant, A-
rist. 3. hist. 7.
& Galenus.

b Galen. 8.
adm. an. 1.

c Galen. de
ossib. 9.

d An plures
sint vide 12.
vsu part. 11.
& 12.

e De spina
cartilagini-
bus & liga-
mentis agi-
tur 12. vsu
part. 15. de li-
gamētis quo-
que 13. vsu
part. 8.

Thoracis seu dorsi vertebræ ^a in homine magni ex parte duodecim sunt [t. 18. f. 1. ad D.] totidem ^b numero quot costæ, singulis enim binæ costæ [t. 16. f. 3. D. p.] articulantur: quare duos sinus [t. 16. f. 1. B. C.] habent, alterum ad latera, alterum in transuerso processu, quo rectius costæ articulantur. Rarius ^c vertebra una deest; rarissime una ^e superest: plerumque tamen homines à canibus unâ thoracis vertebra si perantur: suntque plures, ^d quemadmodum & totius ^d spinæ, propter flexionem, quæ per articulos committuntur, suisque ligamentis validissimis [t. 1. f. 1. RR. t. 16. f. 6. char. 5.] connectuntur, multa tamen cartilagine [t. 16. f. 6. char. 1. 2.] singulas ^e intercedent. Harum prima λοφία veteribus dicitur, quod præ alia emineat: altera, μαχαλις ἥρ ab axillis nomen habet octo sequentes πλευεΐται, id est costales: vndecim [t. 16. f. 3.] ἀρρεπνός, quod eius spina recta sit, hæcque cui instar alias vertebra firmat: Duodecima [t. 16. f. 4.] δισζωσῆρ, præcingens nominatur.

Hæ corpora habent in medio protuberantia, rotunda, conuexa [t. 16. f. 1.] supra infraque; [t. 16. f. 1. 2. 4. A.] plana & ceruicis vertebri crassiora, minusque

foli-

solida, foraminibus exiguis referta pro vasorum num-
 erimentum deferentium transitu. Processus habent
 spinales [t.16.f.1. & 2.N. O. P.] longos, simplices & a-
 cutos, deorsumq; spectantes: dein etiam transuersos
 [t.16.f.1.2.3.4.H.I.] qui ad firmiorem costarum articu-
 lationem crassi sunt, solidi, longi, in rotundum ca-
 pitulum desinentes: tum ascendentes duos [t.16.f.1.
 V.] & duos descendentes [t.16.f.2.3.4.b.] f vndeci-
 mæ tamen ac duodecimæ transuersi [t.16.f.4.e.f.g.h.]
 processus à cæterarum processibus variant. Appen-
 dices quinque habent, duas ad ipsarum corpus supra
 [t.16.f.3.ç.] infraq; duas ad transuersos processus, &
 cuiuslibet spinæ extremitatem vnā. Harum au-
 tem foramina [t.16.f.2.3.4. G.] crassitudini medullæ
 quam continent, æqualia sunt; prout enim de-
 scendendo attenuatur, eo inferiorum
 vertebrarum foramina mi-
 nuuntur.

f Decima
 vertebra in
 cane & si-
 mia est me-
 dia vertebra-
 rum dorsi, sed
 in homine
 duodecima,
 quare Gale-
 nus decima
 id tribuit,
 quod duode-
 cima tribu-
 endum.

De Scapu-

TABVLÆ XVI. Fig. 1. thoracis vertebræ
 sextæ partem anteriorem, quemadmodum fig. 2. poste-
 riorem exhibet: at fig. 3. vertebræ 11. posteriorem, &
 fig. 4. vertebræ 12. posteriorem partem proponit: fig. 5.
 tres vertebrae medias cum costæ articulatione: fig. 6.
 connexum duarum vertebrarum. Tres sequentes:
 7. Scapulæ dextræ interiorem: 8. exteriorem,
 & 9. lateralem partem o-
 stendit:

FIG. I.



II.



III.



IV.



V.



VI.




VII.



VIII.




IX.



TABVLA XVII. *Cervicis ossa proponit : fig.*
 1. Occipitiij os à caluaria separatum : 2. partem posteriorem Vertebrarum cervicis : 3. anteriorem : 4. lateralem exhibet : at 5. ligamenta duas vertebra primas connectentia, & 6. cartilagine, quæ inter has aliquando reperiuntur.

LIB. II.


FIG. I.



11.




V




III.

TAB. XVII



IV.



VI



De Scapularum ossibus.

CAPVT XXXI.

De his vide Gal. lib. de off. cap. 14. & 13. vsu part. 10. & 12.

a Scapulum
opertum Cel-
so: spatula
barbaris.
b Hippocr. de
nat. hom. A-
rist. 1 hist. 15.
& Gal.
c Gal. 13. vs.
part. 10.
d De ossib. 14.
13. vs. part. 10.
Gal. ait non-
nullos anatoma-
ma peritos hæc
ipsam compa-
racionem acro-
mion vocasse:
& Galen. ex
quorundam
sententia sic
loquitur: pra-
ter hac duo os-
sa tertium esse
os aiunt, quod
in ipsis tan-
tummodo ho-
minibus de-
prehendatur,
quod ἡγε-
χλαΐδου & a-
cromion vo-
citant. Non ex
sua sententia
Galenus lo-

Scapulæ os ^a ὠπὸν λέγεται ^b Græcis [t. 16. f. 7. 8. 9.] vtrinque
vnum est, quod posterius summis costis instar alicuius
scuti, propugnaculi causa, ^c insidet & cum humero (cuius
articulationis ^e gratia potissimum creatum, & ut al-
eo plerique brachij musculi ortum ducant) & clauicu-
lâ articulatur & cum ^d costis, osse Hyoide & occipitio
musculorum interuentu, ^d iungitur. Figurâ triangularem
quodammodo imaginem exprimit; internæ [t. 16. f. 7.
M.] concavum, externæ [t. 16. f. 8. VV.] prominens, quæ
basis dicitur, hæcque; & angulum [t. 16. f. 7. 8. 9. angulus su-
perior] & costam habet superiorem & inferiorem, à
qua & spina [t. 16. f. 3. 9. G. H.] sursum producitur.

Progressibus tribus donatur, quorum primus bre-
uissimus, breuique; ^e ceruice [t. 16. f. 7. 8. C. D.] in acetabu-
lum seu caput [t. 16. f. 7. 8. A. B.] sinuatum desinit, quo
humeri caput excipiat, quod ^f cartilago [t. 16. f. 8. α. &
κ.] crassior cingit, sinumque; auget, ne facile humeri ca-
put excidat. Alter, qui spinæ extremum est, super hu-
meri articulum prominens; quare ^g ἀκρωμίων [t. 16. f. 7. 8.
9. K.] humeri mucro, & summus humerus dicitur, quo
processu cum clavicula iungitur. Tertius interior &
minor [t. 16. f. 7. 8. E.] qui à forma σιγμοειδὴς & à simili-
tudine cum altera anchoræ parte ^h ἀγκυροειδὴς, non-
nullis ^h κορακοειδὴς, quod instar rostri corniculæ incurue-
tur, dicitur: hicque; humeri os in sua sede continet.

Appendices quinque; obtinet: quarum tres ad latus
internum & ad basin [t. 16. f. 7. 8. 9. X. Y.] musculis non-
nullis principium tribuentes: duæ vero ex quibus liga-
menta

quitur, ut voluit Columbus. c De off. 14. ceruix / scapula 13. vs. part. 10. f Gal.
de off. 14. os scapula maiori ex parte cartilagine, sed vberius in imo contegitur. g Sic
vocari Hippocr. huius articuli superiorem partem ait Columb. & hoc fere omnia a-
nimalia carere, quæ clavicula careant. Laur. dixit Hippocr. acromion etiam ipsam
articulationem clavicula cum scapula appellare. h Gal. de ossib. 14.

menta i prodeunt, quæ humerum scapulæ capiti & claviculam ipsius acromio iungunt. Cavitas duplex altera supra, altera infra spinam interscapilium dicta.

Est quoq; scapularum in tenuitate & crassitie inæqualitas, cū in medio sint tenuissimæ, in processibus vero crassæ, medullosæ & fungosæ foramina quoq; habent, q̄ venas & arterias pro earū nutritione admittūt.

De collis seu cervicis vertebrais.

CAPVT XXXII.

De his consule Gal. lib. de off. cap. 8. de vertebris vero egit 12.

vs. part. ad finem vsq. & primis capit. lib. 13.

Cervix, quæ creata est, ut & caput fulciat, & ad eius motus conferat, ex pluribus ossibus quæ ^a σπονδυλοι seu vertebræ dicuntur, constat. quo per eas spinalis medulla à cerebro feratur, communiter septem ^b sunt [t. 17. f. 2. 3. 4.] & inter se & à cæteris spinæ vertebris differentes, quarum duæ primæ occipitio ligamentis ^c iunguntur, quo caput cum ceruice firmissime cohaereat. Harum prima [t. 18. f. 2. 3. 4. t. 17. f. 2. 3. F. F.] Atlantis nomine insignis, cæteris est tenuiore sed densiore corpore, processu superiore, seu spinâ caret: ne duo parvi capitis muscoli lædantur: sed processus ascendentes & descendentes, ut & cæteræ vertebræ, habet; qui in hac vtrinque excarati [t. 18. f. 2. 3. E. F.] sunt: superne quidem, & occipitij processus [t. 17. f. 1. B. C.] duos ad capitis motum ^d excipiat: infernæ vero ipsius secundæ [t. 18. f. 5. 6. M. N.] vertebræ: habet quoque ad latera duos transversos processus [t. 17. f. 2. 3. I. I. t. 18. 2. 3. 4. G. G.] perforatos [t. 17. f. 2. K. t. 18. f. 2. H. foramen ostendit] pro venæ & arteriæ in cerebrum ascensu. Sinum quoque [t. 18. f. 2. 3. B.] obtinent, cartilagine [t. 18. f. 3. 4. C.] incrustatum, quo sequentis vertebræ dentem [t. 18. f. 7. O.] suscipiat, & ad processus, ubi vertebræ committuntur, sinus est vtrinque in prima [t. 18. f. 4. 7.] quidem; & secunda [t. 18. f. 6. Y.]

a Aristot. 3.

hist. 7. & Ga-
lenus.

b Gal. 13. vs.
part. 6. osten-
dit, cur homi-
ni & simia ex
septem verte-
bris collum
constet.

c Interdum
prima occipi-
tio ita adha-
ret, ut caput
moueri ne-
queat, inter-
dum in cerui-
ce vertebra
nunc sex nunc
octo inueni-
untur.

d Gal. huius
articulationis
ope caput in
gyrum veris-
simè flecti po-
tuit: cui sen-
tentia aduer-
satur articu-
lationis for-


Hh 3

rimæ litionis for-

wa. Columbus qui voluit hac articulatione caput modo inclinari, modo reclinari.

TABVLÆ XVIII. Fig. 1. vertebrae omnes con-
 nexas exhibet: fig. 2. Vertebra primæ ceruicis antero-
 rem: 3. posteriorem & superiorem: 4. inferiorem & po-
 steriorem faciem proponit: sic fig. 5. secundæ vertebrae an-
 teriorem: fig. 6. posteriorem: 7. inferiorem: 8. Verte-
 bræ tertiæ anteriorem & superiorem: 9. po-
 steriorem & superiorem o-
 stendit.

FIG. I.



rimæ formam habens; in reliquis orbiculari, in thoracis vero oblongâ figurâ, per quos neruorû paria transcunt, venarum item & arteriarum rami, nutrimentum medullæ & ossibus subministrantes. Altera vero vertebra [t. 17. f. 2. 3. N. t. 18. f. 5. 6. 7.] præter corpus, processus laterales [t. 18. f. 5. 6. 7. b.] breuiores & obliquo foramine [t. 18. f. 7. 10.] donatos processum posteriorē musculorum gratia ^e bifidum [t. 18. f. 5. 6. 7. a.] & processus ascendētes leuiter extuberantes ac descendentes [t. 17. f. 2. R. t. 18. f. 6. 7. d.] leuiter sinuatos, è medio ipsius corpore appendicem (vulgo processum dicunt) rotundam ac longam [t. 17. f. 2. 3. 4. O. t. 18. f. 6. Q. f. 7. O.] emit- tit, quæ cum caninū hominis dentem referat, *ὀδὸν τοῦ τοῦ* & *ὀδὸν*, dicitur, (at Hippocrates ^f totam vertebram dentem appellauit) alijs *ὀντοειδὲς* & à vertendo, quod circa eum caput ^h circumducatur, quæ superficie non nihil est aspera, vt inde ligamentum prodeat [t. 17. f. 5. E.] quo occipiti alligetur; cui & ligamentum teres [t. 17. f. 5. K.] ac solidū circumijcitur, ne medulla comprimatur: lungitur etiam cum prima ligamento [t. 18. f. 5. F.] latissimo orbiculariter circumiecto. Tertia vero [t. 17. f. 2. 3. S. S. t. 18. fig. 8. & 9.] quæ *ἀξων* dicitur (& cum reliquis quatuor antè ⁱ nexu firmissimo constricta coalescit) cum tribus sequentibus processibus laterales bifidos [t. 17. f. 2. VV. f. 4. β.] habent propter musculorum implantationem, at septima [t. 17. f. 2. 3. 4. char. 7.] cum thoracis vertebris cōuenit, eiusq; posterior processus non semper bifidus [t. 17. f. 2. 4. X.] est, sed etiam integer, corpus vero inferne planum est, quo sequenti æqualiter iungatur. Omnes vero, primâ exceptâ appendicibus donantur, quas cartilagines crassæ ac molles, quo facilius moueantur, intercedunt.

*e Cum in si-
milis integri
sint, ignora-
uit Galenus,
ait Columb.*

*f 2. Epid ex
huius luxa-
tione angri-
nam insana-
bilem saepe fi-
ri statuit.*

*g Laurentius
hoc nomen
prima etiam
tribuit.*

*h Columbus
Galenum et-
iam in hoc re-
prehendit.*

*i Galenus de
ossib. 8.*

DE CAPIT E, SEV VENTRE TERTIO ET

S V P R E M O.

L I B E R I I I.

ABSOLUTA Historia partium Naturalium, quæ in infimo ventre cōtinentur, & vitalium, quæ in Thorace seu medio ventre sedem habent; nunc Caput seu supremum vētrem, qui partes animales continet, tanquam arcem corporis nostri, vnde cæteræ partes reguntur, perlustremus.

De Capitis nomine, situ, forma & partibus.

CAPUT I.

Cur creatum sit Caput, ostendit Galenus 8. vs. part. 2. 4. & 5. at de situ & forma egit Aristoteles 1. hist. animal. 15.

Tertius venter Caput dicitur, q̄ ab eo sensus initium^a capiant, Græcis κεφαλή, ^b ἀπὸ τῆς κεκυφῶσθαι, a Varroni ad Cic. vido lib. nost de partib. exte. quod est in a- rescere, Ap- piani interp. quia pars ea cum ossea sit, plurimū in a- ruerit. Apol- lodoro à κα- λύπτω, cum cerebri sit te- gumentum.

Hh 5

& quo-

^c Caput cauum & rotundum suprema parte positum est, Hypp. de gland. d In 8. vs. omnes fere auctores Galeno subscribunt. At Columb. cerebri potius gratia, quam ocr

lorum: potuisset, ait, caput in duos prominentes processus duntaxat ducti, quibus oculi insisterent. Sic Laur. solius cerebri gratia caput creatū: & Gal. l. c. ait propter cerebri factum fuisse caput, plurimis visum, eamq; ob causam sensus omnes in se continere, tanquam servus quidam & magni regis stipatores. e In 8. usu part. 5. f Cerebri gratia caput non factum est. 8. v. part. 4. g Orbiculari figura tornatum est. Laur. h Ar. 1. hist. an. 15. i Ar. 2. part. an. 10. k Cerebrum est principium nervorum & sensus omnis motusq; voluntarij 8. v. part. 4. & de placit.

& quorundā animalium, quæ capite destituuntur; quibus cum nullum sit caput, in quo oculi locentur, quo longius prospiciant, processus quosdā prælongos Natura^e largita est, qui capitis loco essent, & qui tunicâ testaceâ, & durissima ab earū cute prægnatâ abducantur, ita tñ, vt si rei alicuius accursum metuant, aut actione earum nō indigeant, oculis in pectus receptis, tuto quiescant; at hominis^f oculos molles, ob corporis substantiam & membranam circumnatam mollem, prælongis ceruicibus imponere periculosum erat. Quamuis etiam hic situs & auditui & olfactui utilis sit; siquidem & soni & odores in sublime ferantur; quare dum quid vel videre vel audire cupimus; si quid obstat, locum altiore*m* ijs sensibus maxime idoneum, tanquam à natura edocti, conscendere solemus. Imo cerebri gratia, ne ratio in ipso ab irrationali, quæ in corde est, cōturbetur, & quia oculi propter visum nervos molles & breues requirant, Cerebrum ab ijs separari nō debuit, ne nerui molles vlt^{er}ius producti frangantur; aut ob viæ longitudinem plus æquo indurentur. Quare^e Cerebrum propter oculos in capite locari debuit, reliqua verè sentoria, ^e cū etiam mollia sint, propter Cerebrum in capite locantur; quamuis & ea altissimam sedem, vti dictum, opportuue fortiantur.

Rotundum g est (non ad amussim circulare) instar sphaeræ compressum, & aliquatenus oblongū; notandum quidem, quia homo ad vniuersi^h orbis habitum institutus est; idcirco etiam partem istam parti sublimi vniuersi^h respondentem habet; solus enim homoⁱ animalium erectus incedit, & quia, vt voluere Platonicis, animæ domiciliū est, & anima ex cœlo rotundo nobis infusa est. Dein, quia membro nobilissimo, figura debetur nobilissima; cum enim animæ & rationis sensus^k & motus voluntarij sedes sit, & in quo spiritus animalis, ex vitali per arterias elato, ad sensum & motū per nervos in totum corpus deferendum, generetur, merito

merito membrum nobilissimum censetur. Tum, ut sit capacius ad cerebri insignem, quæ in homine est, molem continendam. Quarto, ut cum inter omnes partes primum sit, quod periculis subijcitur, iniurijs minus sit obnoxium; cum hæc figurarum sit capacissima & validissima. Et tandem, ut facilius & celerius in omnes partes circumuerti possit. Compressum vero est ad latera, sed magis antrorsum; & oblongum, quoniam à cerebro, eiusque medulla in caluaria contentis plures nervi ordine prodeunt; idcirco longitudo hæc requirebatur. Quare cerebri potissimum gratiâ caput creatum, talem magnitudinem & figuram accepit; siquidem pro caluariæ figuræ diuersitate cerebri constitutionem Phisici dijudicent. Magnitudo non omnibus eadem est, hominiqu; satis magnum, propter ampliorem cerebri molem; paruum vero semper vituperatum, & materiæ inopiam, formatricisq; imbecillitatem arguit. Magnum vero caput, proportionem ad totum corpus habita, semper laudatur.

Diuiditur caput in duas partes, alteram capillatam, glabram alteram; capillata quæ τεῖχωτός, calua, dicitur; glabra vero πρόσωπον, facies nominatur. Calua, quæ σκαφίον, P à cauitate & rotunditate dicitur, est tota superior, anterior usque ad frontem, & posterior capitis pars capillis circumscripta, huius pars anterior à fronte ad futuram coronalem, & mediam fere capitis partem. Synciput ἡ βλέμμα, ὅθεν τὸ βλέπει, irrigando, posterior, futura lambdoidea, & prima colli vertebrâ terminata. Occiput, ἡ κοτὶς, Hippocrati; ἰνίον Aristoteli; media inter has, pars gibbosa, κορυφή ἢ ἀκρόπτεω, quasi κρυφή, quod ea pars capitis crinibus tegatur, cum sit velut aruum * pilorum: Latinis vertex, quod eo loci

l Hippocratis naturalis forma causam in obstetricis reiecit videtur l. b. de aere, aquis & locis, asserens aliquos existimasse oblonga capita esse pulchra ideo in puerulis ea compressisse, &c.

m Homini quam ceteris animalibus multo maior, Laur.

n Physiognom. mi parvum caput præcepit & temerarium ingenium arguere affirmant, ob spirituum paucitatem, qui angusto loco inclusi, sine modo incallescunt, nec libere ex-

spatiantur.

o Hinc Hippoc. 6. Epid. in capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

capitis magnitudine, natura

bet: non quod oriantur ossa à capite, sed quia ossa omnia proportionem ossibus quibus articulantur, respondeant. p Arist. 1. hist. 7. & Pollux. q Iuuen. 1. & Cornuto. r Arist. Galeno. s Ausonio, Persio, occipitium Plauto. t In 2. de morb. Gall. in exeg. u Hippoc. de vuln. cap. x Gal. 12. vsq. part. 14.

y *Quintilia.*
 z. *instit.*
 z *Aristot. 1.*
hif. 11. Ruff.
Gal. introd.

capilli & aquæ instar in gyrum vertantur: Partes deniq; laterales inter oculos, aures, & ceruicem, vbi caput compressius est, *κρόταφοι* ² *καὶ τὸ κροτεῖν καὶ πλεῖστον*, quod pulsus ibi euident sit. Tempora Latinis, quasi ætatis tempus & annos sua canicie & macilentia prodant. Sed de his nominibus alijsq; consule librum nostrum de partibus externis.

a *Addit Aristot. 2. part.*
 10. *nec audiendi, qui si carnosum esset vinacius hominum genus futurum censeant, sed ut melius sentiat, carnem ademptam existimant: contra quos disputat.*

Rursum Caluæ partes aliæ sunt continentes, cõtentæ aliæ: Continentes aliæ cõmunes, aliæ propriæ. Communes sunt cuticula & cutis densissimâ capillorû syluâ referta, pinguedo, panniculus carnosus. Propriæ vel sunt externæ, vel internæ: Externæ, membranæ duæ, pericraniû, periostrium, muscoli os ossa cranij; quamuis hominis caput macilentum & ^a prope omni carne exutum sit. Internæ, duæ meninges, cranium succingentes, cerebrumq; ambientes. Contētæ sunt cerebrû & cerebellum, à quibus medulla oritur, quæ proprie cum extra craniû est, spinalis dicitur; à qua nerui, tam in cranio, q̃ extra cranium ipsum ortû ducunt. De his primum; dein de parte glabrâ, seu facie sermo erit.

De Capillis, imo pilis totius corporis.

C A P V T II.

De pilorum generatione & differentijs egit Hippocr. lib. de Natura pueri, lib. de Carnib. & lib. de Glandulis. Plat. in Timæo de capillis egit. Arist. 5. generat. anim. 10. & 11. Gal. 2. Temperam. 5. ac de ipsorum vsu 11. de vs. part. 14.

a *Consule c.*
 2. *lib. de partib. exter. lib. 2. Arist. in prob.*
 b *Aristot. 1. gen. anim. 3. & 3. hif. 10. pilos habent quæ pedestria, eademq; uinipara sunt: cor-*

CVM cuti capitis pili & lōgiores & copiosiores totâ regione, qua cerebrû continetur (frõte exceptâ, ne oculis impedimento sint) q̃ ulli aliæ corporis parti infixi sint, hic de Pilis totius corporis, cū ad eius partes cõtinentes communes referri possint, agemus.

Pili Græcis *τείχεα*, ^a *ὅσον δέ τείχεα. ὅτι δεικνύται* quod videl. demeti soleant, dicuntur; quos omnia fere, ^b quæ intra se animal generat, habent; alia vero loco pilorû aculeos, vt erinaceus & hystrix, alia pennas, vt aues (quare

(quare pili & substantia, & si accendantur, odore cum plurimis conueniunt quemadmodum ungues cum ipso calamo) alia squammas, ut pisces habent.

Sunt autem pili corpora ex superflua materia excrementosa tertiæ concoctionis, à calore natiuo adusta, genita, in ea maxime parte, qua cutis rarissima est, & temperata, & ubi moderatum humorem pro alimento habent. Ad pilorum. n. generationem & conseruationem, quatuor requiruntur. Materia ex qua generantur, calor tanquam causa efficiens, locus conueniens, in quo generantur, & alimentum conueniens, quod ipsis adponitur.

Materia alia remota est, alia proxima; remota, est superflua humiditas, quæ glandulæ, quæ partibus multâ humiditate præditis adpositæ sunt, ebibere & absumere non potuerunt, quæ ad superficiem cutis pilorum generandorum gratia protruditur; quare ubi glandula, ibi est pilus; nam & glandulas & pilos eiusdem utilitatis gratia creatos esse, Hippocrates docuit: illos quidem, ut quod influit, excipiant: pilos vero, ut ex glandulis opportunitatem nacti producantur & augeantur, quodque in extremas partes redundat & expellitur, colligunt, sic ad utramque aurium partem glandulæ, pili quoque ibidem: sub alis & glandulæ & pili sunt: inguina & pubes non secus ut alæ, glandulas & pilos habent. Quod vero in aliquibus partibus glandulæ sint; non autem pili, humoris copia in causa est: nam in humidis terræ locis semen non nascitur, neque sursum emergit. Proxima materia dicitur fuliginosus, crassus, & terreus vapor, qui in tertiæ alimentum concoctione, dum in partem alimentum conuertitur propter actionem caloris eleuatur, & poros cutis pertransit. Causa efficiens calor est natiuus moderatus, qui humorem hunc, seu fuliginosum hosce crassosque vapores exsiccat, & foras in cutis spiracula pellit. Subinde contingit, hunc vaporem fuliginosum crassumque in angustis spiraculis impactum hædere, quare hunc alius rursus ex profundo subiens

sic integuntur qua omnia sunt pe-des: squamas vero pisces habent: vide & i. hist. anim. 6.

c Humilis ipsa, Hipp. a natu pte. d Hippocr. de gland. in prim.

c Gal. 2. semper. 5.

subiens prorsum impellit; nunc rursus alter, atq; illum alius, sicq; multi vapores fuliginosi alius super alium impacti tempore complicantur & coniunguntur, vt vnum eiusmodi corpus efficiant, ^e quale est, q^d in caminis cernitur, & fuligo dicitur; nisi, quod hic vapor fuliginosus crassusque, quantum spissatus est, tantum ēt per transitus angustiam stipatus, in angustam prorsus formam reductus est. Vbi vero tale corpus totum meatum obstruxerit, deinceps à sui similibus excrementis, quibus exitus non est, violenter ictum totum propellitur, vt iam lori formam adeptum, cutim exire cogatur. Quare humorem hunc, seu fuliginosum excrementum glutinosum esse ^f oportuit; in quo tamen nihil ^f pinguis inesset; quare vbicunq; in corpore glutinosum existit, ibi pili à ^f calore gignuntur; idcirco in axillis & pube & reliquo corpore pili multi succrescūt. sane id ^e quod in meatibus seu poris cutis impactum est, radici alicuius herbæ in terra hærentis adsimilari potest; quod vero ex cute extat, velut ipsi herbæ.

Locus quoq; conueniens requiritur, cutis nimirū, quæ & maxime omnium ad eorū generationem idonea est; quæ non nimium sicca, nec humida nimium esse debet; vt n. in palustri & vliginoso loco nihil generatur; nec itē in squalidiori solo; ita in humidiori & sicciore cute pili non erumpunt. Et licet sicca & dicatur; tñ in homine humoris expers non est; quemadmodum in ijs, q̄ siliceâ testâ integuntur, vel crustatâ, vt in ostreis, locustis, cancris, vel quæ in cauernis delitescunt, vt serpentibus: vel quæ squāmata sunt, vt in piscibus, in quibus pili ^h oriri non possunt, quia horū cutes vere & in totū siccæ sunt. Nō debet esse humida & plane mollis, qualis modo concreescens caseus; in tale. n. id, quod per cutim disflatur à calido per poros, pori tñ hi non remanent; quia partes rursus inter se vniuntur. Quare requiritur cutis ^h moderate sicca, ne pilus excidat ex cauda, moderateq; dura, nō absimilis caseo & iā coacto talis

^f Hippocr. de
carnib.

^g Galen. 2.
temp. s.

^h Quæ molli
sunt cute, vt
homo, quan-
to sicciior ca-
lidiorq; cutis
fuerit, tanto
magis pilos gi-
gnere potest:
exemplo terra
declarat: &
hæc terra af-
similanda,
qualis est ab-
eunte vere,
vel ir eunte
estate. 2. tem-
p. s.

talis enim impetu exeuntium perforatur; & cum per siccitatem vniri rursus nequeat, pori seu meatus immutati remanent, qui ab ijs, quæ pertranscunt, perpetuo magis fistulantur. Sed debet quoq; esse laxa & rara; idcirco cum tota cutis porosa sit, & per totam cutim semper aliquid à calido diffletur, q̃ secum etiam interni humoris nō parum aufert, idcirco in omnibus corporis nostri partibus pili prorumpere possunt; quare cuilibet poro pilus infixus est, quo semper hæcce spiracula ad halituum euacuationem pateant. Excipere tamen oportet cutim in vola manus, & planta pedis, cuius causamⁱ in latū tendinē, qui cuti subijcitur, eo quod siccissimus & densissimus sit, referunt,^k cum tamen & lepus latum tendinē habeat; hasq; partes minime depiles. Quare depiles dicimus, tum ob vsum, vt magis sit^l sensibilis, tum ob motum. Raritatem autem cutis requiri, ostenditur cicatricum exemplo: si enim summa cute^m inusta pustulam excitaueris, eamq; persanaueris, vbi summa cutis densior euaserit, nullus ex cicatrice pilus, quia porisⁿ destituitur, exurget.

Duplices vero sunt pili; alij^o *συνγενεῖς*, congeniti; cuiusmodi sunt capitis, superciliorū & palpebrarum; qui in vtero materno existentibus innascuntur, cum p ijs generatio sit, non qualis herbis, sed qualis stirpibus primā ratione à natura conditis, nō temperamentum ex necessitate sequentibus. Alij sunt *ἐσπερὶ γενεῖς*, postgeniti; qui postquā summa cutis q̃ rara euasit, nascuntur: talis autem euadit, simul ac genitale semen oritur in puero. Et mēsis^q in virgine via patet: pubis q̃ primum, mox alarum, postremo menti (totidem namq; oca^r congenitis, quot postgenitis deputata sunt) hiq; ijs, qui ante pubertatemⁱ castrati sunt, non exeunt, quia nondum via genitura facta; & postmodum via^t genitura intercipit, idcirco summa cutis non rarefcit; & post

elatur humorem, habet. Hipp. de nat. pueri. & Arist. 3. hist. 11. f Arist. 5. gen. na
 . 4. . hist. 11. & Hippocr. de nat. pue.

i Gal 2. tem-
 per. 5. & 2. vs.
 part. 6.
 k Columb.
 non concedit
 quia planta
 & vola lepo-
 ris pilis refer-
 ia est, licet la-
 tum tendinē
 habeat: leui-
 tatis autem
 gratia lepori
 naturam de-
 disse, quod a-
 nimali adeo
 timido obfu-
 gam necessa-
 rium sit.
 l Ex 2. vsu
 part. 5. & 11.
 eiusd. 15.
 m Hippoc. de
 nat. puer. in-
 de pueri dicit.
 n Arist. 10.
 prob. 13.
 o Ar. 3. hist.
 an. 11.
 p Galen. 2.
 temp. 5.
 q Simul ac
 mensibus &
 genitura via
 patet, tū pu-
 ro ac virgini
 epidermide
 rarefcit epi-
 lus in pube
 nascitur, si-
 mulq; mode-
 ratum, neq;
 pauciorē quo

& post pubertatē^f excisis testibus, soli decidunt, præterquam^f pubis. Sic in mulieribus postgeniti parcius proueniunt, in ipsorumq; mento^t non prodeunt, q^p ipsis^t in actu venereo, non perinde ac maritis agitur humor summam cutim rarefacere queat, nisi interdum^u pauci, cum menstruus cursus subsisterit; fieri tamen potest, vt^u tam mas, quam fœmina pilis postgenitis careat, ob vitium naturæ ab ortu contractum.

Forma pilorū per accidentia quædam designari solet: Variant. n. crassitudine, x tenuitatē; duritie, y molitie; longitudine, breuitate; rectitudine, crispitudine; multitudine, paucitate; sic etiam pro cutis qualitate, & pro conditione^x partiū, quibus adhærēt: adhæc coloribus, vt albedine, nigredine, eorumq; medijs; sic & p^r ratione^y ætatis, videl. cū minora aut maiora nati sunt.

Crassitudinis tenuitatisque præcipua^y causa cutis est, quæ alijs crassa, alijs tenuis; alijs rara, alijs densa est: sic humoris^y differentia cuti subiecta; alijs enim glutinosus, alijs aquosus subest, quo euaporante atq; exhalante, pili non ex carne, sed ex cute oriuntur; quare ex crassa^y & duriores & x crassiores; ex tenui tenues producant. Et si cutis^y sit rarior & crassior, z crassi gignuntur, propter copiam portionis terrenæ & meatuum laxitatem: si spissior sit, licet crassior^y cutis existat, tenuiores exeunt propter meatuum^a angustiam. Sic si vapor aquosus fuerit, cum breui resiccet, pili magnitudinem non acquirunt; at si glutinosus fuerit, cum non facile exsiccare possit, contra euenit. Quam ob causam etiam longiores breuioreque fiunt, prout humor, b qui euaporatur, facile difficulterq; exsiccat; hoc vero fit vel ob quantitatem, vel qualitatem humoris. Si enim humor aut multus, aut glutinosus est, non facile exsiccare potest; sic plures & c longiores humidioribus & cauatiore locis.

Quare & Capitis pili longissimi sunt, quia cerebrum^b longam humoris copiam præbet; & quia multum

u Aristot. 3. hist. 11.

x Aristot. 3. hist. 10.

y Arist 5. gener. an. 3.

z Non quæ cute maxime

ita constant, magis ita ha-

bent pilum; nam licet bo-

ues, elephan-

tes & pleraq;

alia cutem crassiorē ha-

bent, quam

fues, tamen pilo tenuiore

reguntur propter meatuum raritatem. 5. gen. an. 3.

a Quare o-

uium generi

tales similes sunt pili: le-

poris vero mollem qui-

dem habent, sed minus te-

nuem, quia leporibus per

summa cutis enascitur, & quare longi-

tudine carēt. 5. gen. an. 3.

b Arist. 5. gener. an. 3.

c Arist. 3. hist. an. 10.

multum ^d glutinosi inest: & quia maius est ^e cere- ^d *κρῆσθεις*,
 brum, quam reliquæ glandulæ; crassissimi, quia cu- ^{glutinosum}
 tis ^b capitis crassissima, rara ^f tamen, & plurimum ^{Hipp. λιπα-}
 humoris contineat, qui in nutritione cerebri à calo- ^{ρὸς, pingue}
 re moderato eleuati, & per futuras ^g plurimosq; po- ^{Aristot. cras-}
 ros angustissimos in caluaria conspicuos transeun- ^{sum Galeno.}
 tes, cutim capitis perforant; in quo transitu cū eua- ^{Capillos in}
 poratio hæc ab ossis duritie remouetur, conden- ^{hunc modum}
 tur, & in capillos longissimos degenerat. Siquidem ^{ori, (ait}
 maximi ^h & plurimi nascuntur, vbi summa cutis ^{Hipp. de car-}
 rarissima est, & vbi pilus moderatū humorem, ^{nib.) ab ossi-}
 nutriatur, habet. Dicuntur autem capitis pili, Lati- ^{bis & cere-}
 nis capilli, quasi capitis pili; Græcis ⁱ κόρη ἀ κέρω, in- ^{bro eiusmodi}
 tido, etsi veteres ^k τεῖχος ἐν τῇ κεφαλῇ, pilos in capite ^{incrementum}
 nominare consueuerint; hi in viris ^l εἰς τέραι, cæsa- ^{prouenire, ab}
 ries, à frequenti cæsione; in fœminis κόμη ἀ κομέω, in ^{eo videlicet}
 curo; Latinis coma, à curiosiore cultu, qui in ipsis li- ^{glutinoso,}
 nea diuiduntur, quam separationem, λύσωμα, ⁿ dis- ^{quod circum-}
 crimen & æquamentum vocant. Sed de his in libro ^{circa existit,}
 de partibus externis plenius; quemadmodum & de ^{in quo pinguis}
 pilorum, qui alijs partibus innascuntur, diuersis no- ^{nihil inest: si}
 minibus egimus. ^{quid enim}
^{pinguis inef-}
^{fei, a calido}
^{exustum esset:}
^{hæc Hipp.}
^{e Hippoc. de}
^{gland.}

Rectus autem simplex vel crispus seu obliquus ^f *παχύτατον*
 it ^e & pro ratione exhalationis, & pro natura mea- ^g *μακρότερον*
 um. Ratione exhalationis, ^o quæ si fumosa ^o est, ^{s. gen. an. 3.}
 præ sua caliditate & siccitate, crispum pilum efficit, ^g *Gal 9. vs.*
 tum enim duplici delatione feratur, inflectitur; si- ^{part. 1. in cra-}
 quidem terrenum deorsum, calidum sursum fera- ^{nio conspicuas}
 tur, & cum præ sua imbecillitate facile inflecti possit, ^g *senfiles*
 ntortquetur, quoniam ^o parum humoris, multum ^{vias natura}
 utem portionis terrenæ inest; sicque pili resiccati ab ^{vaporesis ac}
 ambi- ^{fuliginosis ex-}
 crementis sol-

Ii

it, cum caput omnibus partibus velut tectum quoddam calida domui superposue-
 rit, hinc omnia fuliginosa ac vaporosa excrementa à partibus subiectis sursum fe-
 untur, &c. h Hipp. de nat puer. i Polluci & Æchylo. k Hipp. Arist. Gal.
 Homer. Iliad π. & ἐπειγὸς Odys. π. ab ἐπειρ. m Artemitod. vel δὲ τὸ τῷ
 μάς ob ornando, ut vult Eustachius. n Aristotelis. o Arist. s. gen. an. 3.

ambiente aere contrahuntur; inflectitur. n. ° quod rectum est si euaporetur: & cōtrahitur pilus, quemadmodum cum igni aduritur; siquidem crispitudo conuulsio ° est ob humoris inopiam ab aeris continentis calore; vel dicas P fieri ob siccitatem temperamenti; atque ita omnes Æthiopes crispi sunt. Ratione meatuum, in quibus radican- tur; cum enim exhalatio imbecillior est, quam ad rectam viam sibi moli- ri possit, pro modo, quo inflectitur, etiam meatum suum figurat. Si vero exhalatio satis valens sit; sed ob artis duritiem rectam ferri prohibeatur, tum in latus flectitur; quomodo videmus fumum & etiam flam- mam, cum sursum agi prohibetur, diuisum in obli- quum agi; quare & ob P exhalationis imbecillita- tem, & cutis duritiem obliquitus pilorum radicibus contingit: quales P autem in radice finguntur, tales perpetuo fore rationabile est; cum nullum corpus durum siccumve in rectum extendi possit, nisi prius molliatur.

Simplici vero seu recto sunt ° pilo, qui humore abundāt, & vbi per meatus rectos euaporat; & mol- les sunt, ¶ qui promissi sunt; & crispi, duriores sunt rectis.

Sic pro cutis qualitate & cōditione partium, qui- bus adhærent, & prout singularum ratio postulat, plus minusve crescunt, maxime in capite, vbi multi magnique crescunt: mox in barba, quia moderate sicca & calida est, & præcipue, quibus pili tenuiores sunt. At superciliorum & palpebrarum pili exigui sunt, ¶ & nullius pene incrementi, & vt plurimum æqualem semper magnitudinem seruant, stabilesq; permanent, cum his durum corpus instar ¶ cartilagi- nis cuiusdam subijciatur; alijs vero ¶ cutis dura car- tilaginea per supercilia connectatur. Etenim pili, qui ¶ ex moderate humidis ac mollibus partib. emer- gunt

p Galen. 2.
temp. 5.

q Ar. 3. hist.
an. 10.

r Gal. 12. v. f.
par. 14. dicit
nullius incre-
menti: & a
qualis sem-
per magni-
tudinis.

gunt plurimi sunt incrementi; cuiusmodi sunt in capite^f & barba; qui verò ex duris atque aridis, exiles sunt, & nullius fere incrementi; quare duplicem esse originem pilorum, dixit Galenus,^r aliam à conditoris prouidentia, aliam vero à loci naturâ; quæ tamen locum sic à conditore dispositum esse dicimus. Nonnullis tamen supercilia per senectutē adeo hirsuta^u redduntur, vt tondenda sint. Sic in mento nascuntur pili, vbi summa cutis rarefcit (delatâ in eam à capite humiditate, vt Hippocrates^x voluit) qui barbam constituunt, quæ non omnibus pari modo^y effunditur, sed alijs circa labia & meatum pilorum copia contingit; alijs vero^y hæc quidem pilis carent, genæ vero pilosæ cernuntur. Quamuis etiam in quibusdam^y morbis pili crescant, præcipue in tabificis, vt refert philosophus, ^y addens etiam in senectute & defunctis augeri, sed non nasci.^z

Colorem^a similiter variant, & humori prædominanti similes sunt; qualem enim humorem^b caro attraxerit, talem etiam colorem pilus induit. Galenus^c nigros fieri statuit, cum vaporosum excrementum vi caloris deustum in exactam fuliginem mutatur. Subrufus vero, quoniam id, quod in meatibus est impactum, nondū totum est nigrum. Flauos autem, cū vapor minus torretur, quippe, q̃ tum impactum est excrementum, fœculentum est, non nigræ, sed flauæ bilis. Albos ex pituita nasci, & sicut inter colores album & flauum medius datur, sic eorum generationem ex pituitæ biliosæque fœcis mediâ quadam naturâ prouenire.

Ii 2

Sic

est: qui enim albi sunt admodum, nigros habent capillos: causa est, quod homo omnium tenuissimam cutim habeat proportionem magnitudinis. s. gen. an. 3. & hist. 11. Arist. 2. gen. an. 6. Ungues, pili, cornua & similia ex cute nascuntur, quod ut ipsa colorem pariter cum cute immutent; alba enim & nigra, & vario modo diuersa pro colore cutis redduntur. b Hipp. de nat. pue. c Lib. 2. temp. 5.

f Ad lit Gal. in axillis quoque & pudenda.

In 11. vñ part. 14.

u Quod enit, quia symphysi ossum adiacent, quæ senescente ætate laxantur & inde plus humoris transmitti patiuntur: at pili palpebrarū nunquam plus iusto excrescunt. 3. hist. 11.

x Hippoc. de nat. pue.

y Aristot. 3. hist. 11.

z Imo & du- riores reddi, quod unguibus quoque eueniat. idem. vide plenius 2. gen. an. 6.

a Causa colorum in animalibus cutis est, at in homine cutis nulla cau-

d Scythia in-
cola, Ponti &
Thrace pilos
sunt promif-
so & simpli
ci, quia hu-
midum sunt, &
aer ambiens
humidus Æ-
thiopes con-
tra, qui loca
incolunt cali-
da, crispum sunt
pilo: siccum
non est cere-
brum ipsorum
& cœlū am-
biens. Ar. 5.
gen. an. 3.
e Gal. 2. tem-
per. 5.

Sic ratione regionis, ^d aerisve ambientis variant; cum ij, qui calidam & siccam regionem incolunt, nō solum duros, sed ^e nigros, exigui incrementi, siccos, crispes & fragiles pilos habent, vt Ægyptij, Arabes & Indi; contra, ^e qui humidam frigidamque regionem inhabitant, non solum molles, sed etiam modice inhabiles & graciles, si rectos & rasos obtinent, vt Illyrij, Germani, Sarmatæ, & omnis scythica plaga, inquit Galenus, ^e qui vero inter hos ^e temperatum tractum colunt, hi pilos plurimi incrementi; & robustissimos & modice nigros, si mediocriter crassos tamen nec prorsus crispes, nec omnino rectos edunt.

Variant quoque ratione ætatis, pueri enim admodum ^e parui nudi sunt pilis, eo quod illorum cutis poros nondum habeat, nec fuliginosum excrementum; incipientes pubescere, paruos & imbecillos exigūt; verum ad finem pubertatis, valentiores, & multos & magnos habent, quod & frequentes iam meatus ijs sint facti, & fuliginosis excrementis abundant. Sic in natu grandioribus duriores, ^f quia cutis durior crassiorque efficitur, senescente ætate ob frigiditatem & reficcationem. Sic viri nonnulli procedente ætate caluescunt; & id vel, quia ^e ipsorum cutis à primo ortu sicciore erat: vel ^f propter inopiam humoris calidi glutinosi, & hi tanquam cōgeniti primo defluunt; vel vt Hippocrates, ^g quia phlegmate abundāt, quod per coitum in eorum capite agitatū; & incalescens, in summam cutim illapsū pilorum radices exurat, ita vt pili effluant: quare eunuchi non caluescunt, nec ^h pueri. Calui autem fiunt parte priore ^h capitis, vel à syncipite ^e magis, quoniam illud omnium capitis partium est siccissimum; hæret enim illic cutis ossi ^e nudo, nulla; pinguedo in occipitio intercedit. Sic homines, ^h senescentes

f Ar. 5. gen.
an. 3.

g De natu.
pue.

h Nec pueri,
nec mulieres.
1. gen. an. 3.

scientes capite canescunt, i non ob ariditatem, h si-
quidem h plurimi pili illico cani reddantur, at nihil
illico aridum gigni solet, sed ob putredinem ex pro-
hibita euentatione; quare qui pileo k semper sunt
contecti, citius canescunt. At secundum Hippocra-
tem l cani ob id contingunt, quod longo tempore
permeante humido, id quod calidissimum est, se-
cernitur, & in summam cutim illabitur, ita vt attra-
ctâ candidiore humiditate, pilus, quam antea, candi-
dior euadat, ipsaque summa cutis, eo præsertim lo-
co, vbi cani sunt, quam quouis alio loco candidior
est. Quique à prima origine canos habent in capite,
illis summa cutis, vbi cani sunt, quauis aliâ candidior
existit, quod illic albissima humiditas insit. At Gale-
nus m vult, quando cutis capitis ad summam siccita-
tem non peruenit, imbecillos, albosque pilos, quos
canos appellant, fieri; imbecillos quidem, conue-
nientis alimēti penuriâ; albas vero, propterea, quod
alimentum, quo aluntur, velut situs sit pituitæ, quæ
patio computruit. Canescunt vero primo k tempo-
re, quia humidiora m sunt, quod in his muscoli ma-
gni sub cute habeantur; omnis autem musculus car-
nosus sit; caro tum osse, tum cute humidior. Dein
pars k prior capitis, pubes n nouissime, & omnium
entissimæ n palpebræ; at nemo vel temporibus, o vel
occipite o caluescit. Fiunt autem candidi à parte n
extrema, quia in vltima p ac tenuissima parte, calor
minimus habetur.

Nutriuntur pili humore; vnde Hippocrates p
plurimas nasci vult, vbi moderatum humorem, quo
nutriantur, habuerint, quem ad radices lentum ha-
bere dixit Aristoteles, q si enim recta euellantur,

Ii 3

cun-

i Cur homi-
nes canescāt,
vide s gen. an.
4. & 5. sic 3.
hyst. 11. tempo-
ra hominum
& partes pri-
mores quam
posteriores ci-
tius canitiem
sentiunt, pu-
bes nouissime
canescit.
k Ar. 3. hyst.
an. 11. s. gen.
l Denat. pue.
m In 2. tem-
per. 5.
n Ar. 3. hyst.
14.
o Ar. 5. gen.
an. 3. sic 3. hi-
stor. 11. ait
parte postero-
re neminem
caluescere. sic
5. gen. an. 3.
hominibus so-
lus animalium
euenit ut par-
te priore ca-
pitis calue-
scant, quia
parte priore
cerebrum con-
tinēt. Vocatur
3 hyst. 11. cal-
uitium in ca-
pite φαλα-
κροτης: in su-
percilij ἀνα-

βαλαντίας salitium vertit. Gaza, vbi ex suo lineam integram addit. p Ar.
gen. an. 5. q In 3. hyst. 11. quo loci mira est Gaza versio. Columb. voluit pilos à
pingue-

pinguedinem a
limetum tra-
here. Varolius,
cibus in ven-
triculo con-
tentis & su-
perimposito
secre, pingue-
do faculeata
per descensum
remouetur &
à glandulis in
omento suis
exsugitur, in-
deq; in pilos
conuertitur,
tum halitus
insensibilis ex-
pellitur.

Quare recen-
tiorum aliqui
aiunt, pilorū
radici pingue-
dinē affixam
deprehendi, si
leuiter & re-
cta euellan-
tur, exceptis
ijs in scroto.
r Gal. 11. v. f.
part. 14.

f Gal. 2. tem-
per. 5.

r Aristot. 3.
hist. 11. qui 8.
prob. 8. cur in
cute pili inha-
rescant, osten-

dit. u Ar. 10 prob. 61. causam quat cur hominū caput pilosius, quam reliquum
corpus: ceterorum autem contra. Gal. 11. v. f. part. 14. quo partim adfluentis humi-
ditatis quidpiam ebibant, ne ea partibus subiectis sit perniciosa: partim & caput
ei sum nonnihil operiant. Operimentum ac ornamentum circa pudenda prabet, ut
nates ano, præputium pudendo. Idem. x Arist. 2. part. 14. & 10. pub. 61. y Gal.
11. v. f. part. 14.

eundem secum trahit, & pilusq; in radice crassior exi-
stet. Ab hisce humoribus & halitus effluuntur, & ex
crassioribus, ac glutinosioribus eius excrementis na-
tura ad pilorum alimentum vitur; quare boni in-
crementi & modice crassi sunt, quando recte alun-
tur; hinc præcisi non ab incisura & augentur, sed ad
radicem, unde exeunt, & ita longiores euadunt: nam
adposito ad eorum radicem alimento, eo modo, quo
dentes & augentur & nutriuntur, & quidem non vi-
tiosorum humorum excrementis, sed tertiæ coctio-
nis; alias in elephantiacis, & lue venerea laboranti-
bus, in quibus excrementa humorum præter natu-
ram abundant, non diffluerent, sed augerentur.

Vsus pilorum in genere quadruplex est, ut sint
subiectis partibus & tegumenti, & propugnaculi &
ornamenti loco, & ad crassiorum fuliginosorum ex-
crementorum absorptionem. Sic pili capitis, qui
frequentissimi sunt (cum inter omnia animalia, ho-
mo maxime omnium * piloso sit capite) cerebrum
& operiunt, defendunt à nimio frigore & calore. Cū
enim cerebrū hominis proportionē * maximum &
humidissimum sit, maximam etiam tutelam deside-
rat; res namque humidissima & * referuescere & re-
frigescere maxime idonea est. Et cum cerebrum à
fonte caloris dissitum, & ossibus finitimum sit, & sub
his nulla pinguedine munitū, hi ipsum & muniunt
& calefaciunt. Hi etiam & crassiora excrementa con-
sumunt. Et cum non & per omnes ætates, nec anni
tempora, nec regiones, aut corporis constitutiones
eodem operimēto indigeamus, idcirco tempori fer-
uien-

vientes, capillos alias magnos relinquimus, alias minores facere satius est. Verum si penitus amputentur, defluxionibus occasio præbetur. At pili barbam constituentes, non modo, vt maxillas mentumque operiant (quod mulieres peplis faciunt) sed etiam decus ac y ornamento afferunt; venerabundus enim magis mas apparet: idque potissimum si ætatis progressu pili vndiq; & pulchre circumfundantur; idcirco superiorem genarum partem & nasum naturâ pilorum expertia y reliquit, alias facies tota sylvestris ac fera fuisset, animali mansueto ac politico minime conueniens. In mulieribus faciei glabrities ornamento est, nec ei formâ venerandâ opus erat; natura enim y animæ moribus corporis formam cõuenientem fecit. Verum pro ratione partium, quibus pili tributí sunt, eorum vtilitas variat; superciliorum enim vsus, humorem à capite defluentem suscipere; palpebrarum, visui dirigendo inseruire; & sic de cæteris, vt suo loco ostendimus, & plenius libro tertio, vbi de similaribus sanguineis & partibus dubijs sermo erit.

*De Cuticula, Cute, Pinguedine & membrana
carnosa Capitis.*

CAPVT III.

ETSI CVTIS hominis comparatione factâ ad cutim aliorum animalium tenuissima^a sit; attamen quæ in capite est; si cum cute thoracis, & infimi ventris conferatur, non secus, quam CVTICVLA, crassissima est, quemadmodum ea, quæ in collo est crassa, & tanto^b reliqua totius corporis cute est sic-
 Li 4 cior,
^a *Columb. reprehendit Aristotelē, quod cutim capitis tenuissimam esse dixerit. Resp. ipsum 3. hist. 11. dixisse*
cutim hominis proportionem magnitudinis λεπτότατον tenuissimam esse: non dixisse caput cutim tenuiss. esse probatur ex 5. gen. ar. 3. vbi cutim capitis ait παχύτατον
crassissimam esse. b Gal. 2. temp. 5.

c *Ar. 5. gen.*
anim. 3.

cior, quanto etiam est durior: rara ^c tamen est propter fuliginosorum excrementorū pro capillorum generatione transitum. Vasa recipit cutanea, venas quidem à iugularium externarum ramo exteriori, qui vtrinq; in frontis medio vniuntur, & in grauissimis doloribus capitis aliquando inciduntur, & hæc sub pilosa capitis cute sanguinem pro alimento suppeditant. Arterias, à Carotidum ramo externo iuxta

d Non quem-
 admodum in
 singulos m. u-
 sculos nervus
 prouenit, ita
 & cuti pro-
 prius & desti-
 nitus est ner-
 uus: sed ex
 partibus sub-
 iectis fibra
 quadam ad
 ipsum perue-
 niunt; quæ si-
 mul ipsam cū
 subiectis par-
 tibus conne-
 ctunt, simul
 etiam sensum
 ei suppediāt.
 16. vs. par. 2.

cutis radicem & tempora, quæ vitalem spiritum à corde sussum vehūt. Nervi ^d fines à prima & secunda ^e colli coniugatione sursum reflexos, recipit, quo sensu ^f illustretur: qui non ita exquisitus, vt in thorace & imo ventre, quia hīc membranæ musculosæ adhæret; in alijs vero partibus nervosæ. Huius vsus caluam circumdare, eiusq; tegumentum esse.

PINGVEDO ^g sub cute circa occipitium obseruatur, non autem in fronte; ^h cum enim in fronte cutis pro arbitrio nostro ⁱ moueatur, ipsius motui impedimento fuisset; quam hoc loco ^k cutis substantiæ musculosæ vnita est.

PANNICVLVS seu membrana carnosæ cuti subtenfa, ei circa frontem cum nulla pinguedo intercedat, adhæret, ibiq; crassissima existit; hæc quandoq; instar ^l tēdinis ^h à musculis frontis ad musculos occipitij & aurium percurrit; quare cauendum, ne hæc portio pro pericranio sumatur.

De Peri-

Platero. f *Arist. 3. hist. 11. cutim sensu carere ait, maxime in capite, quia ibi nulla interposita carne ossi adhæreat. At Galen. 16. vs. part. 2. cutim sentire ostendit. Res. an. Arist. curiculam intellexit Archangel. vult ipsum veram cutim considerare sed vt est pars similis à nervo distincta: sic. n. solos nervos sentire. g Omniaque destituitur, quia exigua vasa sub pilosa cute satis tuto collocata: dein in fœtu cum caput magnum, si adfuisset pinguedo, adauclā moles exitū impediuisset. Plater. At Vesal. l. 7. c. 18. cutim cum adipe & carnea membrana solis manibus facile à calua diuellis & Columb. cum à pene, scrotoq; discesseris in reliquis partibus pinguedo inueniri pot. h In fronte, pene & scroto nullus adeps. Vesal. p. 640. i Laur. vult in toto capite. k Gal. 11. vs. par. 15. l Fallop. in obs. monet ne pro pericranio sumatur, & pericranium pro perioftio.*

De Pericranio, Perioſtio & Muſculis circa
Caput.

CAPVT IV.

De Pericranio egit Galenus 8. vſu partium 9.

MEMBRANA panniculo carnoſo ſubiaccens
Membrana ^a dicitur, eo quod totum cranium
 extrinſecus ambiat, quæ inter panniculum & perio-
 ſtium, cum quibus vtrinque fibris quibuſdam neſti-
 tur, ſita eſt, mollis ^b & tenuis ^c acuto ſenſu prædita;
 quæ à duræ menýngis proceſſibus, tanquam tenui-
 bus ^d membranis, ſeu potius ^d ligamentiſ (cum liga-
 mentorũ munere deſuncti ſint) futuras cranij tranſ-
 euntibus, enaſcitur; ^e ſingula enim ligamenta ver-
 ſus cranij ^d partem ſibi directam, vnde enata ſunt,
 extenduntur; inde progreſſa ſibi mutuo occurrunt,
 & exacte ^d vniuntur, & ex iſſis omnibus commu-
 nem membranam procurant. Et hæc non ſolum cra-
 nium circumdat, ^f ſed etiam muſculos temporales,
 non quidem ad eorum inſertionem vſque, ſed vſque
 ad oſſa iugula ob maiorem eorum cuſtodiam, cum
 hic valde craſſa ſit & dura, veſtit, ita vt propria mu-
 ſculorum tunica dici vix poſſit, maxime cum eoſ to-
 ſos non veſtiat, & ab iſſdem prope oſ iugale recedat;
 ubi inter membranam & muſculum vtrinque pin-
 guedo aliqua reperitur. Huius vſus eſt, vt cranium
 tuto ^d vndiq; ab illo (extrinſecus tantum) tanquam
 vinculis conſtringatur & inuoluatur, & duram me-
 nýngem ^d cum cranio connectat; ſicque cerebrum
 non facile concidat, ſuſpendat. ^g

Ii 5

PERI-

ſior.

^c Densa & ſolida. Laur. ^d Gal. 8. vſ. part 9. ^e Vnde originem ſumere credi-
 tur, Plater. ^f Pars eſt pericranij, licet anatomici tunicam temporalium muſcu-
 lorum vocent. Fallop. in obſ. ^g Addit Plat. cutim capitis ſibi copulare, firmiterq;
 innectere, cum nulli caro aut pinguedo intercedat: ob quam cauſam ſola cutis
 ſpitis vulnerata: cum labia parum dehiscant, ſuturus minime indigent.

a Arabib.

Almocet. &

A'mocatin.

communiter

perioſtum di-

ci vult Laur.

& Fallop. in

inſtit. & de

oſſ. c. 19. mem-

branam vult

omnibus oſſi-

bus commu-

nem, qua cir-

ca cranium

Pericranium,

communi no-

mine Perio-

ſtium dica-

tur.

b *διότι πρὸς**διὰ πρὸς τὴν πε-**ριεργίαν ἐν τῇ**τε γράσει τῇ**obducta. Ar.*

1. hiſt. 7. & 3.

hiſt. 13. *περὶ τὸ**ὁμοῦ ἰσχυρό-**τερον & πρὸς**χύτερον ſir-**mior & craſ-**ſior.*

TABVLA I. LIB. III. *Capitis figuras exhibet : Fig. I. Naturalem inculpatam ; reliquæ quatuor, figuras deprauatas ab altero latere proponunt.*

FIG. II.



LIB. III.

TAB. I.

FIG. III.



FIG. I.



FIG. IV.



FIG. V.



h Fallop. in obs. non vult distinguendū esse pericranium à periostio: & Laur. cenſet pericranei craſſitiem form. eos decepiſſe. At Veſ. p. 808. caſtelli mucrone iubet pericranium à periostio diuidere.

i Ar 3. hiſt. 23. ambit ſingula oſſa mēbrana.

k Huius mēbrana ignoratione, multi oſſa ſentire exiſtimarunt, Columb.

l Varol. tantum dentes excipit.

PERIOSTIVM ſubiacet membrana neruea; quare firmiſſima, tenuiſſima, extrinſecus quemadmodum alijs quoque oſſibusⁱ validiſſime adhærens, quo cum ipſa ob inſignem duritiem ab obiectis mutari non poſſit; vt qualitates tangibiles cognoſcant, hac veſtiuntur, huius beneficio oſſa omnia,^k cum ſenſus exquisitiſſimi ſit, ſentiunt; cum omnia oſſa ambiat, vnde Græcis *ὀστέον*, quaſi circumoſſalis dicitur, exceptis^l dentibus, internā caluariā; ſic nec in oſſium articulationibus reperitur, ne in illorum motu dolores cauſentur.

MVS CVLI circa caput, qui cum oſſibus ipſum conſtituunt, varij ſunt, alij enim ab humiliore caluariæ fede originem ducunt, quod in collo memini- mus; alij cuti frontis ſubſtrati, illam oculorum cauſa mouentes; quare cutis frontis rugoſa eſt, lineas & tranſuerſas & rectas obtinens: nonnunquam & cuti pilofæ ſubiacent: in quibus & capilli & acres moueri poſſunt: alij denique maxillæ ſunt, de quibus ſuo loco.

De Capitis figuris, ſuturis, & cranii ſubſtantia.

CAPVT V.

De Figuris Caputum egit Hippocr. de Vulneribus capit. quemadmodum & de ſuturis; Galen. lib. de oſſib. 1. 9. vſ. part. 17. de ſuturis agit Galen. 8. vſ. part. 9. 9. eiufdem 1. 7. 17. & 18. 11. eiufdem 18. 19. & 20. libello de oſſib. an præſat. & cap. 1. Ariſtot. 3. hiſt. 7. & 2. part. animal. 7.

CRANII oſſa & futuras explicaturi, totius figuram præmittere conuenit, cum figura cranij mutata, futuras quoq; & ſitu & numero mutari Galenus^a cum Hippocrate voluerit. Quare capitis figura

a In lib. de oſſib. de vſ. part. adminiſt. A. nat. ex Hippoc. de vuln. cap. quod & Veſalius voluit; negat Columb. Fallop. Euiſtachius.

gura duplex est; alia ^b Naturalis & optima, alia Deprauata. Naturalis [*tab. 1. fig. 1.*] quæ ad ^c oblongæ sphaeræ similitudinem structa est, & paulatim vtrinque iuxta tempora comprimitur, arctiorq; fit, priorem ^d ac posteriorem partem prominentiorem habet; ita tamen, vt posterior capacior sit, quo veluti in æquilibrio collo infideat; nam cum anterior pars, licet angustior sit, ob ossa maxime superioris grauior sit, debuit posterior pars sua capacitæ æque ponderosa reddi. Deprauata dicitur, quæ à dicta variat, quam ^e Galenus ^e nominauit, & triplex ^f existit: Prima [*tab. 1. fig. 2.*] in qua anterior eminentia, à frontis elatiore sede producta abest. Posteriore, quæ in occipitio est, reseruata. Altera huic contraria, in qua [*tab. 1. fig. 3.*] posteriore eminentia, occipitis, & anteriore remanente abest. Tertia [*tab. 1. fig. 4.*] in qua ambæ capitis eminentiæ periére. Quarta addi potest ^c imaginaria, [*tab. 1. fig. 5.*] in qua caput ad vtramque aurem magis, quam antèrius vel posterius prominet, quam excogitari, non autem in rerum natura consistere posse, Galenus ^h affirmat; quia cerebri fabrica penitus euerteretur, imo iam monstrum ^h esset, nec viuere posset. Posset & quinta addi ex Hippocrate; quæ figura est acuminata, vbi optima figura a quantum permutata est, primum arte, capite ab obstetricibus in acutū compresso, & fasciâ appositâ & conseruatâ, donec in acutum procedat, quam a quoddam gentes æstimationis & generositatis

locum ^d De ossib.

^c Gal. *φoξον* caput deformatum, non vero acutum significat; nam *φoξον* caput enitius sphaericum & rotundum inter species *φoξων* recenset 9. vs. part. 17. male erro Siculus de ossib. 1. apud Galen. & Reg. 9. vs. part. 17. acutum reddidere. ^f De fib. 1. & 9. vs. part. 17. ^g Hoc non perpetuum est. Archang. ^h In 9. vs. part. 17. Virationem addit: Vesal. tamen ab Hippocrate proponi asserit, & tali figura vim esse Venetijs puerum amentem. At Fallop. negat Hippocr. meminisse. & lib. de uln. cap. tres tantum figuras deprauatas recensuisse. De puero aut Veneto, negant Fallop.

^b Gal. Hipp. & Vesal. at Columb. omnes dicunt naturales; nam licet à priore forma variant, non tamen adeo differre, vt illam naturalem, has vero non naturales appellare oporteat. Varum & Archangelus figuras præternaturam appellat.

^c Gal. 9. vs. part. 17. vide & art. Med. 11. Figuras 4. Hipp. lib. de vulnerib. cap. proposuit: sic & lib. de loc. in hom. & de aere, aq. & locis. Quid de his sentiendum, Arist. in Phys. 6. ostendit.

Fallop. & Eustach. talis figura fuisse.

Meminit Vesal. quod, mēdici Bononiensis capite

quadrato, sed paulo latiore, quam longo.

i De aer. aq. & loc. text.

33. Galen. 6. epid. com. 3. text. 1.

k Gal. de ossib. 1. 9. vsu part. 1.

l Idem 8. vs. part. 9. & 9. vs. part. 1.

m Idem 9. vs. part. 1.

n Extat os capitis continuum, quod calua dicitur;

alijs osse continuo perficitur, ut cani (hoc

recte Columbus reprehendit) alijs compa-

cto, ut homini, Aristot.

3. hist. 7.

locum obtinuisse Hippocrates ⁱ monet, & tandem Natura artem imitata, talia capita produxit. Sic videmus in plerisque Gallis & Belgis, capita oblonga ob decubitum in tempora, cum Germani caput rotundius habeant ob decubitum supinum.

Dicitur autem Caluaria siue *κράνιον*, ^k id os, quod totum cerebrum ambit, & ei veluti quædam ^l galea siue *κράνις* imponitur, quod necessario totū osseum tutissimum domicilium efformatum; nam cum in eo adeo nobiles & necessariae partes contineantur, septo ^m forti munire erat necesse. Est autem Caluaria rotunda, ut à periculis sit tutior; magna, propter cerebri, cerebelli & medullæ molem; non ex vno ⁿ osse composita, ne ex vno vulnere ^o caluaria vndiq; frangatur, sed ex ^o multis beneficio Sutararum [*t. 1.*] ^p quæ vel duarum ferrarum [*tab. 5. f. 13.*] compagem vel vestimentorum ex pluribus pannis laceris confutorum compositionem imitantur, securitatis ^q causa & ad patiendi ^q difficultatem (ne quando mota ^m vehementer deducantur ac dissiliant) commissis; raro enim caput ^r sine futuris reperitur; licet interdum coronalis sit oblitterata; aliquando vna ex reliquis; interdum etiam in senibus ^s diuturnitate & siccitate omnes appendicum more coalescunt & abolentur, & ita connascuntur, ut vix vestigia appareant, quæ in iunioribus maxime sunt conspicuæ; omniū autem postremæ ^t Temporales pereunt, quæ tamen non fuerunt ^t obseruatæ abolitæ, absque aliarum

^o Gal. 9. vs. part. 17. ^p Sutararum triplex est coniunctio, Galenus de oss. in procem. & 9. vs. part. 1. ^q Gal. 11. vs. part. 18. Quemadmodum fabri lignarij crebris claviculis plerumq; instrumenta quadam compingunt, illorum compagem solutu difficiliorem efficiētes; Galen. ^r Viri caput sine sutura visum. Aristot. 1. hist. 7. 3. eiusdem 7. & Pollux lib. 2. & Herodot. libr. 9. testatur eiusmodi capita in Perside reperiri. ^s Columb. Archang. & Fallop. tantum in senibus. ^t Fallop. de ossibus.

rum deletionem. Quod vero Hippocrates ^u eumq; secutus Galenus, voluerit futuras pro capitis figura & situm & numerum mutare, ita ut in ^u ijs, in quibus prominentia anterior desit, desit & coronalis futura; ubi posterior in occipite, desit & lambdoidea futura, semper tamen ^u sagittali futurâ remanente, & tum futurarum remanentium figuram T referre: vtriusq; vero prominentijs deletis, duas ^u lineas instar X^x calvariâ interfecare. Hoc probare non possumus, cum saepe reperiuntur capita, in quibus vel anterior, vel posterior prominentia deest, futuræ tamen omnes adfunt; sic quædam sine coronali, fronte tamen prominente; quædam sine lambdoide, occipite prominente; quædam absque sagittali; quædam sine omni futura, nullâ prominentiâ deficiente, inveniuntur; non quod hæc à primo ortu deficient, sed quia frequentur coalascunt, idcirco abolentur; siue capitis eminentiæ deperditæ sint, siue naturalem constitutionem retineant. Si enim prominentiæ causæ forent futurarum, tum deficientibus prominentijs & futuræ deficerent; at in lateribus ad aures futuræ sunt, licet nulla adsit prominentia.

Suturæ vero seu *ῥαφαί* y capitis ossa connectentes duplices sunt; aliæ ^z propriæ ipsi cranio; aliæ vero cranio cum maxilla superiore communes. Propriæ iterum ^a sunt duplices, vel veræ, tres, vel mendosæ

^u De vuln. cap. Galen. de off. i. Col. reprehendit Galenum, dicendo, se sexcenta millia capita manibus tractasse, nullum tamen occurrere figurâ non naturali, aut cui sutura coronalis aut lambdoidea deesset. Hoc & Fallopius non concedit, & Eustachius quoq; negat. ^x Et quidem ad angulos rectos, cum tamen X littera angulos internos rectos, externos obtusos habeat: tales reperiri omnes negat. Quare aut X aliter scriptum fuit, aut X littera

similitudinem potius referet. Eos. in Hipp. de vuln. cap. y Hipp. Arist. Galen. At Gazæ aliquando iuncturas vertit, ut ^z part. 7. Celsi sutura; Plinio compages; quibusnam commissura. ^z Capita alia futuras tres, alia quatuor habent; quæ tres ad omnes utriusq; & anteriores tertiam, posteriores nulla; quæ quatuor iuxta aures utraq; parte, una anteriore, altera posteriore capitis parte. Hipp. de loc. in homine. At Arist. 3. hist. 7. Calva esse compacto homini, eiusq; foemina circularis est; mari tres in verticem ascenden-tes, quæ in triangulo formam coeunt; & 1. hist. 7. mulieri una in orbem; viro tres magna ex parte in unam coeuntes. Hac omnium Peripateticorum sententia est, quam Columb. recte ridet sic 2. part. 7. futuras plurimas homo in capite habet, & mas plures quam foemina. ^a Gal. de off. i. quinq; peculiare capitis futura.

TABVLA II. *Capitis aliquot ossa & sutu-
ras Fig. VI. à latere sinistro: Fig. VII. à la-
tere dextro osse iugali remoto,
ostendit.*



VII.



*futura. Colle-
gitima, pro-
pria ac vera,
tres sunt. spu-
ria quinque.*

*Archang. se-
ptem, tres ve-
ra, corona-
lis, sagittaria
lambdoidea:
quatuor no-
tha, squam-
mata vring,
cunealis poste-
rior & ante-
rior.*

*b In capitis fi-
gura naturali
tres sunt H*

littera simi-

les. Gal. de off

1. hatres sunt

ex Hippocr. de

vuln. cap. idē

Gal. 9. vs. par.

17. explicauit.

c Anterior

Gal. de off. 1.

altera Col.

prima Plat.

d Gal. 9. vs.

part. 7. & 17.

Adore derezi

Auicē. alijs

arcualis, pup

pis.

e Gal. de off. 1.

f Fallop. de

off.

Quare in Hetruria,

ubi futuram hanc mulieres laxam habent, chyrothecam

imponunt, vbi partem illam ab aere tueantur.

g Posterior Galeno. Col. 3. Plattero.

h Gal. de off. 1. 9. vs. part. 7. & 17. Auicē. Adore lauda, alijs lambda lauda la

bdoides, Col. alijs prora futura. i Plat. secunda. k Eustachius: meminit Forsu

Hipp. de vuln. cap. cranei acuminati, in quo pro lambdoide multa erāt futura, in fi

ne occipitis & in toto cranio ima futura per mediu ab aure vna ad alterā delata.

sex. Communes autem quinque sunt. Vere sic dictæ, quod tales formā iudicentur, quibus Egyptij Medici propriā nomina indidere; quarum duæ^b transuersæ, tertiā per capitis longitudinem fertur, ita vt tres hæ futuræ figuram talem exprimant.



Prima seu^c anterior vel transuersa [t. 2. A. B. t. 4. f. 11. n. n.] & *σφαγια*^d coronalis dicitur, q coronas in ea^e parte potissimū collocarint veteres, non quales^f regū sunt, sed proprie vbi mulieres crinium strophia ad fouendas partes internas

semper gerūt. Hæc circuli transuersi speciem refert, cum per transuersum supra frontem vsq; ad squamosas agglutinationes feratur; hæcque frontis os [tab. 2. L. ab I. K.] à syncipitis ossibus separat, vel ea simul necit.

Secunda^g seu posterior [t. 2. C. D. t. 4. P. P.] in occipitio est, & ab ipsius basi ad processum mammillarum radices ad vtrāque aurem oblique ascendens ad sagittalis medium terminatur, quæ cum literam A referat, *λambdoειδης*,^h à nonnullis à litera & figura *υψιλοειδης* dicitur; & hæc occipitis os [t. 2. M. ab I. K.] à syncipitis & temporum [t. 2. N.] ossibus separat. At in quibus Caluaria posticā parte amplissima est, multiformes^k futuras obtinet; interdum vel transuersā futurā diuiditur, aliquando futurā geminā circumscribitur, ac si triangulus maior minorem, interdum triplici, quasi triangulus maior, duos minores comprehenderet, & ossicula hæc eo modo circumscripta, Triangularia quibusdam dicuntur, & in epilepsia commendantur.

Tertia

Quare in Hetruria, ubi futuram hanc mulieres laxam habent, chyrothecam imponunt, vbi partem illam ab aere tueantur. g Posterior Galeno. Col. 3. Plattero. h Gal. de off. 1. 9. vs. part. 7. & 17. Auicē. Adore lauda, alijs lambda lauda la bdoides, Col. alijs prora futura. i Plat. secunda. k Eustachius: meminit Forsu Hipp. de vuln. cap. cranei acuminati, in quo pro lambdoide multa erāt futura, in fi ne occipitis & in toto cranio ima futura per mediu ab aure vna ad alterā delata.

Tertiaⁱ inter illas media est [t.2.f.1.E.t.7.f.2.00.] & communiter (vt^l in adultis videre est) à futuræ lambdoidis medio, per mediam capitis longitudinem ad mediam coronariam ducitur: aliquādo per medium coronalis & frontis medium vsq; ad nasi summum, quod in infantibus semper conspicitur, & in aliquibus ad septimum vsque annum talis reperitur: in mulieribus^k rarius; in viris rarissime, & præsertim in ijs, qui compressam faciem habent: hæc ὀβελιαίαⁿ recta & παρὰ τοὺς ὀφθαλμούς, quod virgæ, aut sagittæ instar recta feratur, & sagittalis dicitur. Hæc duo syncipitis ossa [t.2.f.6.I.K.] nonnunquam & frontis diuidit; in aliquibus etiam occipitis ossis partem secatur. Mendosæ seu nothæ sequuntur, sic dictæ, quod prioribus minus sint euidentibus, sed rectius, quod potius commissuræ quædam sint, & ad harmoniam magis, quam ad futuram referendæ videantur. Sunt autem alijs quatuor, alijs quinque, nos sex recensebimus. Prima ad latera & ad temporum cavitates supra aures^p duæ sunt, vtrique vna [tab.2.Fig.G.H.] quæ à radice processus mammillaris sursum circulari quodam ductu fertur, & deorsum ad basin progreditur [tab.2.f.6.a.G.F.H.ad Ω.] Hæ cum non per coniunctionem, sed potius per suprapositionem ossium duorum inter se cohærentium fiant, ita vt syncipitis os^q paulatim instar squammæ attenuetur. Et ossi temporum iungatur, idcirco non simpliciter futuras, sed^r Λεπίδες^r παρὰς, siue Λεπίδες ἢ ὁποσπολλύματα, squāmosa^s Kk 2 mofa^s

Gallop. semper in ijs, qui annum non exceperunt, in alijs ad primum septennium; in aliquot infra, raro in adultioribus. Plat. in pueris semper. m Vulgus credit, hæc futura, sceminarum capitis à virorum distinguui, quod falsum; nam oppositum obseruauimus. n A vertice recta ad frontem per caput medium fertur. 9. vs. partium 7. o Galen. tertiam dicit, aliter non nominauit. A uicem. Nervialis & sagittalis, Zeudeck, Mesueo, Obeliaa. Et recta, Sylu. recta sagittalis, virgalis, Columb. Fallop. p Gal. de off. 1. dicit aquidistantes lineas, &c. Plat. futura 4. & circulans. q Idem de offib. 1. & 9. vs. part. 18. causam addit. r Sic euidentioris doctrinæ gratia se appellare asserit. Gal. de off. 1. & 9. vs. part. 18. asserit, nullum ex antiquis futuras appellasse, sed agglutinationes (& Hipp. vt mihi videtur, cum coronalis partes esse arbitraretur, earum separatim non meminit) Vesalius idem testatur Hipp. citando. At Fallop. ostendit Hippocratem de locis in homine, sutureas appellasse. Alijs κρομφίται, temporales. Anic. Corticales suture. Col. squammosæ suture.

mosas agglutinationes, alij squammiformes appellarunt. Quod autem Natura ad similitudinē squammæ iunxerit syncipitis & temporum ossa, factum idcirco, quod in partibus lateralibus ossium temporum, ossicula auditus collocare voluit; quare osse cauo opus fuit. Quod si vtrumque os crassum fuisset, cauitas abfuisset, & caput nimis graue fuisset. Quare ex magno osse temporum attenuato, cauitas pro ossiculis auditus continendis efformata, & alterum os syncipitis attenuatum, vt temporum ossi apte iungeretur: idcirco cum partes vtriusque ossis substantiā non conuenirent; nō futurā, sed squammarum modo coniungi potuēre, & cum os aliud ascendat, foris elatior, quam internā sede apparet. Hæc antea ossa temporum cum osse sphenoide [*tab. 2. f. 6. N. cum Ω.*] posterius vero & superius cum syncipitis ossibus iungunt.

Suturarum quinta vel mendosarum altera [*tab. 2. f. 6. b.*] ad latera quoque à summitate squammosæ agglutinationis oblique deorsum ducitur [*tab. 2. fig. 1. ab H. ad g.*] ad principium futuræ primæ communis [*t. 2. fig. 6. g.*] & hæc Cuneiformis dici posset; siquidem parte superiore os hoc cum syncipitis ossibus, parte inferiore cum frontis osse iungat.

Sexta [*tab. 3. fig. 9. m m. t. 4. f. 10. f.*] est ad basin capitis vtrinque, obliqua admodum & lambdoidi futuræ continua, quæ ab extremitate futuræ lambdoidis iuxta processus mammillaris radicem per lapidosorum ossium medium oblique versus interiora ad basin capitis ^f vbi primæ vertebræ iungitur, vsque ad lineam transversam ducitur, quæ cum ita exactam futuram exprimat, sed simplex linea videatur, idcirco alijs lambdoides harmonialis, alijs lambdoides inferior; Galeno ^f lambdoidis futuræ additamentum dicitur; & hæc communis est occipitij additamētum cū

tem-

^f *Dua tantū
Gal. de oss. 1.*

temporum ossis parte inferiore, auditusque organo. Hæc in pueris manifesta est, in adultioribus sensim leletur, ita ut copulatio hæc in senibus non appareat.

Septima [tab. 3. f. 9. n. n. t. 4. f. 10. t.] linea est in media basi, quæ utrinque transuersim breui ductu fertur, donec in rimam desinat communem sphenoidi cum temporum osse. Hæc communis est occipitij additamento cum sphenoide osse & lambdoidis extrema committit.

Octaua [tab. 4. f. 10. u. u.] in interna caluariæ parte magis conspicua, in anteriore caluariæ sed utrinque transuersa ducitur, ad ossis spongoidis angulos inferiores, nariumque cauitatem pertingit: hæc communis est ossi frontis cum sphenoidis ossis sede anteriore, verum & os spongoides ab osse frontis omni ex parte separat, quæ potius per harmoniam seu lineam, quam per suturam coniuncta esse videntur.

Nona [t. 4. f. 10. ab u. versus K. I. ad x. in sinistro latere.] foris sub narium ossibus fungosis fere in medio quadrata apparet, & obliquo ductu ad sphenoidis ossis formam ducitur, ita ut communis sit ossi spongoidi quatenus ad caluariam refertur, parte quidem posteriore cum sphenoide, antè vero & in lateribus cum frontis osse.


Suturæ caluariæ cum maxillæ superioris ossibus communes, quibus eminentiæ & processus ossium caluariæ parte anteriore connectuntur, quinque sunt. Prima in supercilij sede externa [tab. 2. f. 6. 7. g. g. tab. 3. f. 8. R. fig. 9. g.] à fine suturæ quintæ & secundæ communis extrorsum ducitur, veramque suturam exprimit, estque frontis ossi & maxillæ superioris ossi primo communis.

Secunda ^u in oculi sede laterali & externa, quasi gemina foramine communi oblongo distincta, apparet; superius quidem in oculi sede externa & cauis

^t A Galeno pratermissa: Vesal. 6. capituli propria, quia os spongoides capitis os dixit: Columb. 7. propria capiti: Fallopio tertia communis capiti & maxilla: Archangelus qui unam communem dixerat & quidem dimidiatum illius per quam os sphænoides superne fronti committitur, inferne maxillæ superiori: & hanc coniunctim subiungit.

^u Archangel. caluariæ propriam dicit: duplicem facit cunealem posteriorem & anteriorem nominando: Col. sexta est.

TABVLA III. Fig. 8. Calvariæ & maxillæ superioris aliquot ossa, suturas & foramina, quemadmodum Fig. 9. eiusdem basin, multa foramina & suturas proponit.



temporum ad foramen prædictum deorsum ducitur [*tab. 3. fig. 8. ab S. ad Q. & fig. 9. ad d. tab. 2. fig. 7. ad d.*] & communis fit sphænoidi cum maxillæ superioris osse primo, externum angulum formante; inferius vero ad latera palati & narium amplitudinem, rectâ à foramine dicto deorsum vsque ad dentium radices ducitur, [*tab. 3. fig. 9. à d. ad c. c.*] & communis est sphænoidi cum maxillæ superioris osse quarto & sexto.

x Galeno *structura communis, secundade ossib. cum qua & præcedentem iunxisse videtur. Columb. octava est.*

* Tertia in interna & laterali oculi fede & narium cavitare sita est, & oblique ab oculi radice vsque ad nasi summum extrorsum ducitur, [*t. 3. f. 8. R. S. T. V. X. Y. Z.*] & communis est inferius quidem breui ductu sphænoidis protuberantiæ cum maxillæ superioris osse tertio; dein reliquo ductu ossis frontis laminam externam cum ossibus maxillæ superioris 2. 3. 4. & quinto iungit.

Quarta ossis iugalis est, quæ per huius ossis medium oblique ducitur [*t. 2. f. 6. Y. tab. 3. f. 9. Y. f. 8. P.*] & temporalis ossis processum cum processu ossis primi maxillæ superioris committit.

Quinta inferius in narium amplitudine, inter processus pterygoides ex posterioribus antrorsum ducitur [*t. 3. f. 9. sub 3.*] & sphænoidi cum septo narium communis est. Verum omnes ossium capitis coniunctiones, quæ externe futuræ sunt, ut plurimum interne, potius per harmoniam seu lineam, quam per futuram coniuncta esse videntur. Contra in simiæ y caluaria vbique adeo obscuræ sunt, ut magna ex parte futuræ nomen vix mereantur. Sunt etiam in aliquibus hominibus grandiores ac laxiores; in aliquibus exiles & magis compactæ; & illi minus doloribus z capitis ab internis causis diuexantur: hi vero

y Sic & Eustachius.

z Celsi lib. 8. cap. 1. capita sine futuris firmissima, &

quæ vix doleant: hoc Archang. miratur. Fallopij partim verum, partim falsum dicit, prout de causa interna vel externa loquatur, & sic defendi posse. At Columb. & Archang. volunt Celsum tantum causas externas perpendisse.

vero ob fuliginosa excrementa retenta, quæ suâ acrimoniâ meninges vellicant, suaq; copiâ distendunt, assiduus & maximis doloribus obnoxij sunt.

Vfus ^a futurarum, primo, vt sint cerebri spiracula, quo crassiora fuliginosa excrementa ^b exhalare possint; sed non huius solius nomine, alias tenuibus foraminibus, ^c quasi cauernulis quibusdam pertundi potuisset; quare cum cauernæ sine ^c tegumento non fuerint relinquendæ, necesse fuit (quæ secunda est utilitas) datam cerebri membranam egredi & paluæ alligari; ne durior ^d membrana cerebrum comprimat, vel quo suspensa ventriculorum & subiectarum partium compressionem impediat, & traiectis ^e filamentis ex crassiore parte pericranium, è tenuiore periostrum constituat. Tum vt vasa, ^f alia intro, alia foras excidant, ad tutam illarum partium nutritionem ac vitam. Quarto, vt si quando caput ^g fractum fuerit, fractura non per totum progrediatur, sed inhibeatur, vt illic subsistat, vbi & os sauium cessat; alias in anteriore parte percussum & fractum, fissura per ossis continuationem ad partem posteriorem tenderet, nisi per futuras distingueretur. Tandem ^h cum Natura ossa capitis æqualibus partibus non formârit, cum opus fuerit alias crassiores, alias tenuiores esse, alias vnâ formâ, ne vnum os tantam varietatem haberet, potius diuersas partes fecit, quas per futuras coniunxit. Addi potest & hæc, vt medicamentâ ⁱ exterius adposita interiora subeant.

Caluariæ substantia pro ^k ratione ætatis variat: ret-

Kk 5

enim

a Galen. vsus septem agnouit, quinque 9. vs. part. 17. recēsit: quarta falsius meminit 8. vsa part. 9. habet & sex. 9. vsus part. 7. & 7. 13. Meth. 22. b Gal 9. vs. part. 1 & 17. 11. eiusdem 18. Columb. 1. est. c Galen. 9. vs part. 1. d Galen. 9. vs part. 7. & pro quarta utilitate recenset, vt & Fallop. (Archæg. non meminit) qui exempla adducit eorū, qui aulæ suspendunt, & clauis carentes rimâ quarunt cui lignū pro clauo imponant. e Gal. 5. utilitas, de qua 8. vs. par. 9. 9.

eiusdem 17. & 11. eiusd. 18. & Fallop. qui hanc præcipuam facit. Archæg. 4. utilitas at Aristot. 2. part. 4. vt caluæ capacitas sit amplior. f Gal. 9. vs. part. 1. & 17. 11. vs. part. 18. & 3. utilitas: & Fallop. qui venas has, venas puppis appellat. g Gal. 9. vs. part. 17. Col. 2. Fall. 6. Arch. 5. utilitas; patiendi quadam difficultas ac securitatem in his a. i. s. quæ ex multis constantur. 11. vs part. 16. h Fallop. 8. vsus ex primi Aræcenna. i Galen. 13. Meth. 22. at Fallop. 7. vsus. k & Plat. vide 1. 2. gen. anim. 6.

enim in nuper natis mollis adhuc, hinc inde cartilaginosa & membranæ existit, præsertim in commissuris [tab. 3. sceleti a. tab. 4. fig. 1. inter a. & b. præsertim tab. 4. fig. 2. inter a a.] & elatiore mediaque capitis partes, ita ut in aliquibus ad annos aliquot compressioni cedat: quod ^l tum ad partem faciliorem, tum capitis in infantibus augmentum necessarium fuit. In adultis vero ossæ ^l est, roboris causa, non tamen densa ^m simul ac tenuis, sic enim partes subiectæ securæ non essent à vulneribus facile intro penetrantibus: si vero crassa simul ac densa, oneri fuisset, ac si quis capitum ^m suo onus aliquod imponat, idq; perpetuo gestet: quare neq; tenuis, neque densa, sed crassa: rara ⁿ tamen & cauernosa [t. 4. fig. 11. 12. L. tab. 5. f. 14. e.] esse debuit; crassa ob securitatem & fortitudinem, rara ne oneri sit; cauernosa, ^m ob transpirationem.

Duplici squammâ [tab. 5. fig. 14. a. o.] donatur, ^o quas alij tabulata, alij laminas & diploas vocant, idq; vel ubi cavitatis insignis subest, ut frontis osse, temporum & cuneiformis, maxime ad superciliorum sedem conspicua; vel ubi cranium crassum esse debuit, ut parte superiore, ubi excarnis est, parte inferiore in basi, præsertim circa foramina & sinus, quo firmiora essent: hæ licet duræ sint, & aliquantum crassæ, harum tamen laminarum externam, lues venerea aliquando exedit. Inter utramque squammam [tab. 5. fig. 14. inter a. & o. c.] substantia ^p intermedia, quam alij punici persimilem dixere; alij ^q fungosâ fistulofam, laxam & cauernosam, non tantum ut leuiora ^p forent, sed quo in ea medulla contineatur cum in eam ^r venæ & arteriæ sanguinem cum spiritu pro caluariæ nutritione & vita effundant, ut ibi pro eorum alimento coquatur, & hanc medullam alij qui vocant. In reliquis vero partibus; licet tenuis sit dura tamen & solida est, ut circa tempora, ubi admo-

^l Galen. 9. vs. part. 2. & e-
iusdē 18. eius
substantiam
explicat.

^m Galen 9.
vs. part. 2.
ⁿ Vide 9. vs.
part. 18. dura
& densa, Ar-
chang. dura
& solida, Pla-
to crassa &
rara. Fallop.
& Aristot. 1.
hist. 7. casua
tota ossarum,
rotundum, cute
acuta obdu-
ctum.

^o Vtrinque
in leuem ac
densam ossis
squammam
desinit 9. vs.
part. 1. & Col.
qui & parie-
tes & crustas
Fall. qui ex
tremâ superfi-
ciem superio-
rem & infe-
riorem vocat.

^p Sic & Co-
lum. Fallop.
Archang.

^q Plat. ne
grauet.

^r Ex Ar-
chang.

dum tenuis est, & musculis temporalibus cedit: in oculi cavitate, vbi tamen infra supraq; duplicatur.

Superficies calvariæ externa fere tota parte superiore ^ræqualis & levis est, ne periostrum, quo circumdatur, lædat: attramen in ossis frontis marginibus, & supra oculorum cavitatem ad robur extuberat, quemadmodum ad latera temporum ossa musculorum temporalium causâ compressa sunt, & in occipitio tuberculis ad musculorum insertiones exasperatur. Inferiori vero sede, seu in ipsius basi, admodum inæqualis & aspera est, propter processus & sinus varios, extuberantiasque varias ossium, quas in ossium cuiuslibet historiâ explicaturi sumus. Interna quoq; cavitas etiam fere tota levis est, ne dura membrana, quâ succingitur, lædatur: superne, quâ galeam refert, sinus habet leues in frontis & syncipitis ossibus, quibus dura membrana innascitur, & inscriptiones pro venarum ductibus. Infernæ vero varias productiones, extuberantias & sinus, cerebri, cerebelli & instrumentorum sensuum, gratia obtinet.

Foraminibus quoque crebris, exiguis, nulloque ordine dispositis, (quæ aliquando defunt) ijsque transuersis vel obliquis, vtrinque tabulatum perforatum est, per quæ venulæ & arteriolæ ad interiorum ossium cavitatem, & ad membranam duram pertranseunt. Verum & cauernositates ^r vtriusq; tabulati, etiam ad tenuium fuliginum transpirationem facere videntur; quibus retentis vertigines, alijque morbi oriuntur: siquidem corporis ^u partibus omnibus caput velut tectum quoddam calidæ domui superpositum sit. Præter hæc habent & pleraque capitis ossa sua foramina, cavitates, sinus & processus, de quibus in cuiuslibet ossis historia sermo erit,

*f Gal. 9. vs.
part. 1. Col. &
Archangel.
levis & a-
qualis.*

*r Gal. 9. vs.
part. 1. & 2.
& 11. eiusdem
19. & Arist.
u Gal 9. vs.
part. 1.*

De Capite, seu cranii ossibus propriis.

CAPVT VI.

De his Galenus 9. vsu part. 18. vbi de ossium temporum cum syncipitis coniunctione agit: 11. vs. part. 18. 19. & 20. Hipp. de ossium natura. Arist. 1. hist. animal. 7. & 3. eiusdem 7.

a Galen. 12. vs. part 9. capituli ossa 16. prater maxillam inferiorem; at 11. vs. part. 18. capituli 7. maxilla superioris 9. inferioris. 2.

b Galen. de ossibus 1. Capitis ossa vocat & sex facit, prater cuneiforme. Hippocr. octo sunt ossa capitis & oculorum, libr. de nat. oss. Aristot 3 hist. 7. caput non 4. sed sex ossibus constat, quorum duo exigua reliquorum comparatione circa aures posita

sunt. Plat. partes vel ossa caluaria 7. propria 2. occipitis & syncipitis communia cum maxilla super frontis, temporum duo & cuneiforme. c Gal. de ossib. 1. d Galen. de ossib. 1. describitur sutura coronalis, & communi, qua à maxilla separat. At Fallop. & Archang. tribus, Columb. quatuor futuris describunt.

CAPITIS^a ossa duplicia sunt, alia ipsius cranij, alia maxillæ; & quidem vel superioris, vel inferioris cranij^b ossa in adultis communiter quatuordecim sunt; alia propria, alia communia. Propria itidem duplicia sunt, alia cranium, seu caluariæ cavitatem scutellamue constituentia, quæ vulgo sex recensentur, frontis vnum, syncipitis duo, occipitis vnum, temporum duo: alia auditui inferuentia, sex quoque in quolibet temporum osse tria, incus, malleus, stapes. Communia vero capiti cum maxilla superiore, duo sunt, cuneiforme & spongiosum. Verum in recens natis viginti duo sunt, frontis duo, syncipitis duo, occipitis quatuor, temporum duo, labyrinthi duo, auditus sex, cuneiforme vnum, spongiosum vnum, & nomine carentia duo.

Frontis os, quod ὄστυον^c κατὰ μέτωπον dicitur [t. 2. f. 6. 7. L. tab. 3. f. 8. I. I.] primum est, in anteriore sede situm, cum anteriorem caluariæ cavitatem supra infraque constituat, quemadmodum & frontem totam, & orbitæ oculorum elatiorem partem. Connectitur superius ossibus syncipitis [t. 2. fig. 6. I. K.] beneficio futura^d coronalis [t. 2. f. 6. 6. 7. A. B.] inferius partim caluariæ ossibus, utpote cuneiformi, & quidem extrinsecus ad ossa temporum per squammosam suturam

ram [t.2.f.6. & 7.A.g.] intrinsecus verò futurâ octauâ [t.4.f.10.T.U.] item spongioso ossi, quod quasi complectitur, futura nona [t.4.f.10.ab u. versus K.I.] partim cum maxillæ superioris ossibus aliquot committitur, cum primo quidem in oculi angulo exteriori, futurâ communi primâ [t.3.f.8.R.t.2.f.6. & 7.g.] dein in oculo cauo cum secundo, tertio & quarto osse [t.3.f.8.S.T.V.X.] & cum quinto in nasi summo [t.3.f.8.Y.Z.] & quidem per futuram communem tertiam. Hoc in adultis vnum est, rarissime geminum, [t.3.9ß. c.tab.4.9ß.fig.2.a.a.] quale in nuper natis e futurâ sagittali distinctum semper reperitur, aliquando etiam vsque ad septimum annum, quæ postea coalescentibus ossibus obliteratur.

Figurâ est quodammodo f circulari. Substantiâ est inter ossa syncipitis & occipitis mediâ: in infantibus eâ parte, quâ cum syncipitis ossibus committitur: h & futuræ sagittali occurrit, tenue est, cum in nuper natis [t.4.f.11.Y.] pars illa membranea sit: in adultis vero tenuius & infirmius in oculorum cauitate, & vbi cum octauo osse cõmittitur; quibusdam etiam locis duabus squammis pellucidis donatur. At crassius iuxta futuras, vt melius connectatur, & nasi summum, & supra supercilia, vbi veluti in duas partes pro sinus & foueæ constitutione, diducitur.

Sinus i enim satis ampli inter vtrumque tabulæ, supra nasum, in superciliorum regione, vt plurimum gemini [t.4.f.10. & 11.ad L.] alter à dextris, à sinistris alter occurrunt, fibris ossibus squammulisque interfecti, interdum membrana k viridi succincti & separati, quæ corpus molliusculum & l medullosum ac veluti oleosum continet. His sunt foramina in narium amplitudinem desinentia, & vnũ [t.4.

c Sic & Fallop. Plat. Archang.

f Rotunda qualis sphaera compressa portio. Columb. inaequali ac variâ, nec circulari est, nec plana Fallop. semiorbiculari, Plat. circularis, Archang.

g Ex Galeno de ossib. i Fallop.

h Ex Col. cñ Capivace.

i A Galeno, Theophylo, Orisasso praetermissos scribit Fallop. at Vesal. geminos facit. Co

fig.10.

mb. nunc binos, nunc ternos. Plat. cauitas, seu antrum. Archang. cauitates duæ. Columb. Fallop. Plat. 1 Plat. & Archang. aliquando macis, Columb.

fig. 10. supra x.] quod in caluariam definit, statim supra septum [tab. 4. f. 10. x. t. 5. f. 12. B.] ossis spongoidis quo olfactus organa distinguuntur. At hi sinus in

m Fallop. in obseru.

n Fall. ostendit exemplo: in theatri antiquis ab infimis partibus fuere meatus, in quorum fide vasa collocabantur a nea, quorum ratione vocis strepitu ad vasa aenea ascendente fieret, echo & vox augeretur.

o Odoratus conferre vult Vesal. aerem attractum continere, quo in antra ossis sphenoidis delabatur voluit Columb. ex quo forte materia ad animales spiritus gignendos cerebro subministratur. Hoc ridet Fallop. quia

in pueris etiam spiritus animales recreentur, in quibus tamen etiam ultra animales sinus non sunt Plat. leuitatis ossis frontis gratia creatos dicit, & forte odoratus conferre. p Archangel. Piccolomini.

pueris ^m etiam supra annum non reperiuntur, vt nec in ijs, qui ^m facie sunt depressâ & simâ, & in quibus frons ^m diuisa est. Facti autem sunt ob vocem ⁿ quo magis canora sit; siquidem in sinus, & qui male loquuntur, non reperiuntur; dein ad aerem, ^o qui per nares attrahitur continendum: quo is alteratus ad hos sinus primum deferatur, & inde sensim ad olfactus organa, & ad cerebrum transeat, illudque alteret: & cerebrum quoque si affectum sit, ad statum naturalem reducat (vt si cerebro nimis humido, pomum ambræ olfaciamus, musco & ambrâ aer calfactus narib. attrahatur, ad sinus hos defertur.) Quare sæpe odor naribus attractus in his sinibus permanens, per integrum diem in narium summitate persistitur. Sunt ^p qui velint, à materia contentâ, quæ veluti oleosa est, foramen, quod in oculi angulo maiore est, transeunte, oculum humectari, & lubricum reddi, quo ocyssime moueatur.

Fouea insuper ex duplici squamma composita quarum squammarum exterior superiorem orbitæ oculi partem constituit [tab. 3. fig. 8. supra E.] & planior est: interni vero vtrinque supra oculos cauitate efficit [t. 4. fig. 10. Z Z.] quæ plana non est, sed inscriptionibus cerebri anfractibus, cuius portiones et tuberantes suscipit, correspondet.

Sinus quoque per medium huius ossis intrinsecus fertur vsque ad os spongiosum, qui propter sinu tertium crassæ membranæ cerebri creatus est vt cedat, ne ab osse frontis prematur.

Fo

Foramina aliquando habet in superciliorum sede, modo bina, modo terna; at peculiaria tria obtinuit; alterum interius in commissura ossis spongiosi cum osse frontis in sinus transeunte, de quo dictum.

Duo vero exterius ad superciliorum medium, vtrinque vnum [tab. 3. fig. 8. A. A.] modo orbiculare, modo oblongum in oculi orbitam desinens, per quod ramus nervi tertiæ coniugationis ex oculi sede ad frontis musculosam cutim (forte etiam ad palpebrarum musculos) transmittitur, unde sæpe ex frictione frontis sternutatio movetur.

Processus P tandem duos emittit, alterum ad minorem, alterum ad maiorem oculi angulum, ipsius orbitæ superiorem marginem constituentes.

Sincipitis ⁹ seu verticis ossa [t. 2. f. 6. I. K.] βλέγμα-
τος ¹ ὁ δ' α̃ dicta, quia sub ipsis cerebrum humidissimum & mollissimum situm sit. Duo sunt in superiore sede locata, quæ in media capitis longitudine futurâ ¹ ipsis communi sagittali dicta [t. 2. f. 6. E.] simul iuncta superiorem calvariæ partem vna cum lateribus usque ad aures maiori ex parte constituunt. Vicinis quoque ossibus committuntur, antè quidem cū osse frontis ¹ coronali futurâ [t. 2. fig. 6. A. B.] postèrè occipitiolambdoideâ futurâ [t. 2. f. 6. D. C.] vtrinque ad latera ossibus temporum per squamiformes suturas [tab. 2. fig. 6. G. F. H.] & tandem cuneiformi portione futuræ quintæ seu cuneali superiore [tab. 2. fig. 6. & 7. H. A.]

Formæ sunt pene ^u quadrilateræ, & fere æqualiter crassa; at ubi ossibus temporum iunguntur, attenuantur.

Substan-

rationis, seu cogitationis. Volcherus. ¹ Gal de ossib. 1. tenuissimum infirmissimumque omnium ossium capitis, Arist. quod βλέγμα appellatur (Gaza occiput vertit) Arist. 1. hist. an. 16. ¹ Suturis quatuor distingui vult, Galenus 6. Epid. 3. & de ossib. 2. videt. 11. vj. part. 20. ^u Quadrilatera Galeno de ossib. 1. sed non æquilatera. Fallop. Quadrata Platero.

q Ex σὺν ante, & caput q. anterior capitis pars. Archangel.

1 Gal. de oss. 1. & 11. vj. p.

20. βλέγμα

Hipp. 5. Epidem. 27. ubi

suum fatetur

errorem de

vulnere ad

suturas lapide inflato.

Quod etiam

Celsus lib. 8.

cap. 4. monet

eleganti sententia à doctis notanda.

Arist. 2. part.

7. βλέγμα

calvariæ

Gaza vertit,

& 1. hist. 7.

calua pars

prior βλέγμα

sinciput Gaza reddidit.

Latinis nervalia, paria,

arcualia, pa-

rietalia, ossa

x Et Columb.

lib. 1. c. 5.

y Aristot. 2.

part. 7. & 7.

h st. 10. 2. gen.

anim. 5.

z Arist. hist.

7. & 2. gen.

anim. 6.

a Aristot. 7.

hist. 10. & Ph.

nius 12. hist.

37. non corro-

borantur an-

te primum

sermonis ex-

ordium.

b Arabibus

Zendech.

Fallop. bar-

baris à mado-

re & pulsu,

fons pulsati-

lus. Germano-

rum aliqui

bis, foliolum,

Volcherus.

c Rhasis in g.

ad Almanso-

rem.

d De oss. 1. c.

quintū capitis

os. Ar. 1. hist.

7. ἰν ἰσὺν ὀκκυπὺς

ex os, id est, ob,

& caput, q.

post caput, Ar

chang. 6s. ba

silare quibus-

dam. Arabū

interpretib. os

prora. os memoria, os pyxis. e Semper unum est. Platero. f Eiusmodi cranium

habemus; meminit & Eustachius. g Ex 4. s. & 6. Col. ut plurimum ex 4. Fallop

Substantiâ sunt in adultis dura & solida, aliorum tamen ossium respectu rarissima^x & infirmissima: hæc forte ratio, cur vulnera in syncephite^x læthalia esse consueverint: in infantibus vero generis^y humani, non autem aliorum animalium, horum pars anterior, vbi sagittalis cum coronali iungitur [tab. 2. f. 6. B. K.] membranosa est, & paulatim induratur; hæcque omnium ossium capitis^z ultimo concresecunt & indurantur ita, vt censuerint, pueros^a non prius vocem articulatam edere posse, quam vniuersa caluaria in os concreuerit. Et propter hanc mollitiem cum ossa nondum ita creuerint, vt totum cerebrū tegere possint, circa verticem veluti hiatus^b seu fouea [t. 4. f. 11. r. tab. 4. ossium foetus fig. 2. inter a a.] obseruatur, quā aliqui Fontanellam vocant: quo loci etiamnum hodie cauteria inuri, & à veteribus sartago^c candens applicari consuevit; quem locum in viuīs medius digitus radici palmę ad interciliū positus designat.

Cauitates superficiales, seu exiguos sinus, habent intrinsecus, quibus dura mēbrana innascitur, quemadmodum & inscriptiones [tab. 4. f. 10. & 11. S. S.] pro vasis quæ à iugularibus internis per crassam cerebri membranam feruntur. Foramina quoque nonnulla exigua reperiuntur, potissimum extrinsecus ad futura sagittalis latera, quæ hæc duo ossa à latere ad latus perforant, nutritionis gratia venulas transmittētia.

Occipitis os [tab. 2. f. 6. & 7. M. t. 3. f. 9. M. M.] quod ὀστέον τῆς ὀκκυπὺς Galeno^d dicitur, posterius situm est, & caluarię partem posteriorem & inferiorem in basim mediam constituit. Vnum est^e communiter in adultis, aliquando ex tribus^f ossibus compositum, vt in futura lambdoidea dictum fuit: in pueris^g vt plurimum

num

prora. os memoria, os pyxis. e Semper unum est. Platero. f Eiusmodi cranium habemus; meminit & Eustachius. g Ex 4. s. & 6. Col. ut plurimum ex 4. Fallop

num ex quatuor ossibus vsque ad anni finem constat: quorum vnum superius, quod maiorem capacitatem constituit, & in quibusdam etiam per medium sagittali futurâ secatur: alterum inferius sub magno foramine, quod illius additamētum vocant; duo ad latera istius foraminis, quæ tenuissima sunt, quæ per synchondrosin vniuntur; siquidem lineis cartilagine oppletis diuiduntur, ac cartilagine postmodum duriore redditâ, in os conuertitur.

Connectitur ^h superius ossibus syncipitis [t.2.f.6. I. K.] futurâ lambdoidea [t.2.f.6.C.D.] ad latera ossibus temporum lambdoideis additamentis, siue futurâ sextâ [t.3.f.9.in C.] & in medio cuneiformi [t.3.f.9.OO.] lineâ seu futurâ transversâ vel septimâ ipsi & cuneiformi communi [t.3.f.9.nn.]

Figurâ rotundâ ⁱ fere vel potius triangula, ex duabus lineis circularibus in acutum desinentibus, constans.

Substantiâ durissimum simul ac ^k densissimum, & crassissimum ad basin cranei, vbi excarne est, & vbi duæ crassæ membranæ sinus [t.4.f.10.subf.g.h.] iunguntur, osse enim frontis, cum parte sit posteriore, firmitus esse debuit; ad magni vero foraminis [tab.3.fig.9.H.t.4.fig.10.d.] latera ^l tenuissimum & cauernulis destitutum; & ne ob tenuitatem imbecillius foret, in eius medio roboris gratiâ, & quo minus ex supino casu læderetur prominentia [tab.4.f.10.ad h.] ^m oblonga exurgit.

Sinus ⁿ nouem habet, interius septem, quorum duo partim obliqui, partim transversi sunt, vtrinque

Ll

vnus stare ostendit.

ⁱ Galen. figuram non expressit: Fallop. diangulam dixit, quam figuram Euclides & Campanus laudant: duo trigona parte latiore coniuncta, Arch. ^k Galen. 8. v. part. 2. at de off. 1. densissimum firmissimumque: Col. substantia diuersa est: Fall. inaequaliter crassum. ^l Quo Arist. respexit, dum 1. hist. tenuissimum omnium ossium dixit, quod Col. reprehendit. ^m Col. Fall. at Plat. extuberantia crucis inter eminentes. ⁿ interni tres, externi duo Plat. sex Fallop.

qui 3. 5. & 7. numerum ridet: quatuor plerumque, Plat. occipitis osses. Arch. ex tribus tantum Capitis.

^h Galen. de ossib. 1. lambdoide futurâ cum suis additamentis, & linea, quæ hac ipsâ additamenta iunguntur, terminatur. Fallop. voluit secundum Galen. tantum à duabus futuris describi: Columb. reprehendit Galen. quod voluerit tribus tantum lateribus donatum esse: Vesalius Galen. explicans, quinq; lateribus con-

vnus, qui per ossa temporum oblique in posteriora conscendit [*t. 4. f. 10. a. b. versus q.*] moxque per transfuersum fertur [*t. 4. f. 10. & 11. circa h.*] si in medio occipitij conueniunt: facti, vt duos sinus crassæ membranæ excipiant, ne à caluariæ ossibus comprimantur. Tertius rectus est, qui ex prædictorum congressu rectà sursum fertur, & sub sagittali futurâ ossisque frontis medio ad os spongiosum fertur [*t. 4. fig. 9. ad h.*] qui propter tertium crassæ membranæ sinum exsculptus est. Duo alij supra transfuersos siti, lineâ rectâ distincti, vt cerebrum, quod geminum est, rectius excipiant. Duo adhuc iique maximi [*tab. 4. fig. 10. f. 8.*] in basi infra transfuersos, ° cerebelli protuberantias excipientes. Exterius quoque duo sunt semicirculares ad duos processus anteriores exsculpti [*tab. 3. fig. 9.*]

o Quare Columb. reprehendit Aristotelem, quod occiput inane esse voluerit.

p Et Fallop. at Plat. duplicia tria, & simplex unū.

q Quartum Platero.

r De ossib. i. Primum & commune Platero.

t Secundum & proprium Plat.

u Tertium & proprium Plat.

Foramina habet p quinque: primum q [*tab. 3. f. 9. tab. 4. fig. 10. d.*] in media occipitis basi, quod simplex est, & vnum, omnium internorum capitis r foraminum maximum, rotundum & nonnihil oblongum; per quod medulla cerebri in spinam labitur. Duo alia t habet [*tab. 3. f. 9. E. t. 4. f. 10. b.*] cum temporis ossibus communia, inter occipitis capitulum [*tab. 3. f. 9. inter l. & i.*] & appendicem styloidem, vtrinque vnum, insignis, oblongum, ac quasi geminum, per quod venæ iugularis internæ ramus maior & arteriæ carotidis ramus minor parte inferiore & exteriore; parte vero superiore & interiore, sextum par neruorū transit. Duo alia u [*tab. 3. fig. 9. & t. 4. f. 10. c.*] propria, primoque proxima oblique ad interiora delata, quæ orbicularia sunt, nonnunquam etiam oblonga, pro septimæ paris neruorum, quod sexto mox iungitur, transitu. Aliquando tamen venam quoque & arteriam transmittit. Aliquando u in externa sede capituli huius ossis inuenitur adhuc vnum vtrinque; [*tab. 3. f. 9. B.*] non valde

valde amplum, quod longo ductu in internam caluariam fertur; per quod venam & arteriam, quæ vertebrarum processus transuersos conscendit ferri volunt. Sæpe tamen in vno, aliquando in utroque latere deest, & tum vasa hæc per duo proxime enarrata foramina transeunt. Extrinsecus ad basin asperum & inæquale est, ad musculorum & ligamentorum tam exortum, quam insertionem.

Processus (seu capita) tandem duos^x habet [t. 3. *fig. 9. ll.*] antèrius latos^y in infantibus appendice donatos, cartilagine tectos, interius magis, quam exterius protuberantes, qui in sinus primæ vertebræ inseruntur, quo capitis articulationi & motui inferuiant. At posterius processus^z paruus assurgit, vt à prima vertebra excipiat.

Denique in canibus^a ab occipitis osse aliud os triangulare sinuatum procedit, cerebrum & cerebellum intercedens.

Temporum ossa^b siue ὀστέα χρονία [t. 2. f. 6. & 7. *N. tab. 3. f. 9. T. T.*] quæ præcipuâ sui portione circa latera ad aures sunt, & parte aliqua in basi, in adultis duo sunt, vtrinque vnum: at in pueris quodlibet cartilagine interpositâ, per meatum auditorium dirimitur, cuius diuisionis vestigia adhuc in adultis ibi, vbi meatus est principium, occurrunt.

Coniunguntur^c superius quidem cum ossib. syn-
cipitis futurâ propriâ squammiformi [t. 2. f. 6. & 7. *G. F. H.*] nonnunquam etiam cum osse frontis: inferius & interius, cum ossis occipitij additamento futurâ [t. 3. f. 9. m. n.] sic cum osse cuneiformi antèrius quidem ad latera futurâ, per quam os lapidosum cum cuneiformi committitur [*tab. 2. f. 6. ab Ω. ad H.*] in basi

Ll z

vero

saxea, parietalia, dura, arcuata, squammiformia, squamosa, mendoſa. c Gal
de ossib. i. futuris tribus distinguit.

x Col. Fall.

Archang. &

Plat. capita.

y Minus ta-

men, quam

Gal. censue-

rit, acuti, qui

eos corona as-

signauit. Co-

lumb.

z Sic & Ar-

chang.

a Vesal. &

Columb. et-

tiam memine-

re; sed quod

Vesal. Gale-

num citat, q.

in calce lib. de

ossib. scripse-

rit in cerebro

os quoddam

dari, & hunc

esse processum

in canib. Hac

de re nihil a-

pud Galen. re-

peritur.

b δύο ἐν ἑκά-

τέρῳ ὀσ-

Gal. de oss. i.

ossa lapidosa,

vero exterius vbi rima est, inuicem diuelluntur [t. 3. f. 9. ab n. ad o.] committuntur denique futurâ comuni quartâ processu suo iugali dicto, cum osse primo maxillæ superioris [t. 2. fig. 6. R.]

d Sic & Arthang. & Plater. at Galen. trium laterû voluit. Fallopius ad formâ trianguli crassioris. Vesalius & Columb. circuliâ potius; nisi circulus à mammillari processu turbaretur.

e Multifariam se habent: Galen. de ossib.

f Gal. 9. v. part. 18. causam addit in fine capitis.

g Cal. 11. v. part. 18.

h Columb. duoresert ex empla puero rum curato rum, Patavij & Roma.

i Fallop ap pendu em & recte nomina

uit. Vesal & Laur. processus 2. k Styloides, belenoides, graphoides, πλέκτρον, quia similis est calcari galli. Galen. de ossib. 1. dicunt Galenum in hoc processu meatum auditu constituisse. At Galenus intelligendus non de eo processu, sed de eodem osse, & quidem in ea parte ossis temporum, quam à petra similitudine hyoides nominari dicit.

Figurâ sunt superius quidem amplâ & rotundâ d semicirculari; inferius vero nullâ, cum rupes & asperas inæqualitates referant.

Substantiâ sunt e multiplici, ad basin crassâ & aspera rupium instar, vnde e λιθοειδὴς, petrosa dicitur quæ ascendendo paulatim f attenuantur, ita vt supra tenuissima sint & transparentia, præsertim vbi temporalibus musculis cedunt, & instar squammarum (hinc ossa squammiformia dicuntur) syncipitis ossibus quæ descendendo attenuantur, junguntur; densum enim cum raro, & aut laxum cum duro amicam societatem habere nequit: dura tamen sunt & densa respectu subiectorum, cum horum sint veluti f propugnaculum, & sine vitæ periculo vix frangi h possint: adde, quod suo pondere nimis grauarent, nisi superiora attenuarentur. Extrinsecus sunt solida, læuia & plana; intrinsecus vero propter cerebri anfractus varijs inscriptionibus extuberantia: sic in basi appendicem vnâ, processus tres, foramina octo & sinus obtinuere.

Appendix i acuta est, oblonga, gracilis, parumq; vti calcar galli incuruata [t. 2. f. 6. & 7. i. t. 3. f. 9. ii.] quæ στυλοειδὴς, à columnæ figura & rectitudine, & βελονοειδὴς, k quia acui similis est, nominatur: hæc in pueris cartilaginea est, in adultis solida, & dura: at cum admodum promineat, leui occasione abrumpitur, quare in caluarijs è terra effossis raro occurrit, & etiam

etiam inter elixandum facile amittitur: ab hac musculi ad os hyoides, linguam & inferiorem maxillam qui hæc deorsum trahunt, & ipsi os hyoides ligamenti intermedio adnascitur.

Processus primus est externus obtusus, deorsum tendens, vtrinque nimirum vnus, à papillæ vberis vaccini similitudine *μασχοειδής*, ^l mammillaris dicitur [*tab. 2. fig. 6. & 7. K. tab. 5. fig. 8. M. fig. 9. K.*] hic crassus est, intus cauernosus & nonnihil cauus [*tab. 22. fig. 2. FFFF.*] forte quod leuior sit, hicque musculorum caput flectentium insertioni inseruit; quare asper est, rupisque similitudinem refert. Alter processus ^m ab cutis meatu antrorsum fertur, ad processum ossis primi maxillæ superioris, ad os iugale dictum constitutendum, cum hi duo processus per futuram obliquam iungantur, & pontis quasi formam constituent [*t. 2. fig. 6. & 7. V. X. tab. 3. fig. 8. ad P.*] Tertius processus ⁿ est internus [*t. 4. f. 10. LL.*] ac petrosus, in longum protuberans, in quo triplex cauitas, tympanum, labyrinthus & cochlea; vbi & tria auditus ossicula sunt. quæ cum auditus gratiâ creata sint, de his in historia cutis sermo erit: hic processus in infantibus os ^o labyrinthi nominatur, quod squamiosis subijcitur, & arctissime agglutinatur, vt tandem coeant, & lapidosorum ossium processus interior appellatur.

Foramina habet p duplicia, externa sex; interna duo, quæ vel aliquid intromittunt, vel emittunt, vel præstant vtrunque. Primum ^q externum [*t. 3. f. 9. y.*] inter mammillarem processum & os iugale amplum.

Ll 3

est,

Vesal & Laurent. vt Columb & Archang. 4. processus 1. Plat. 1. Quidam hunc Galeni testimonio *βελαιοειδής* nuncuari afferit male Columb. Tertius, in quo labyrinthus, Columb. & Archang. Hicq; nomine carere dicit. Plat. processus. 4. quem os petrosum vel lapideum vocant. Laurent. cauitas interna meatum auditus constituens. o Sic & Archang. p Col quin. q Fallop & Laur. duo Plat. 7. 2. nam quin. auditus organum petunt. q Tempor. 3 & auditus 1. Plat.

l Gal. 11. vs. part 20 & de off. 1. In hoc volunt Vesal. & Columb. cauitatem esse pro auditus organis, & veluti diuersis sp. luncis excavatam. Reprehendit Fallop. cum in pueris hic processus fere nullus, nec caernas habeat. Habent autem infantes auditus organa & tres cauitates. Laurent. tum ad lauitatem, tum ad audiendi commoditatem.

m Ossis iugalis epiphysis Gal. de off. 1. processus 3.

est, quod aerem sonosque intromittit, & meatus auditorius dicitur. Secundū^r in posteriori sede iuxta & retro processum mammillarem [t.3.f.9.x.] ad futuræ lambdoidis latus transfuersum, & rotundum caluariæ cavitatem subintrat; quod modo in vno, modo in utroq; latere deest, per quod venæ iugularis externæ ramus transit. Tertium^f ad processum est petrosus [tab.3.f.9.X.] sub appendice styloide, quod magnum est, inæquale & oblique ex posterioribus introrsum in priora deferitur; per quod arteriæ carotidis maior ramus oblique ad ossis cuneiformis foramen quintum fertur; & inde ventriculos cerebri subit, & tertij paris neruorum portio permeat. Obliquum autem fuit, quo tutius à posterioribus antrorsum^t feratur. Quartum^u obliquum est, geminum & breue [tab.3.fig.9.V.] Venam iugularem intromittit, & nerui auditorij ramulum nonnunquam transmittit. Quintum^x inter mammillarem processum & appendicem styloidem [tab.3.fig.9.d.] rotundum est, & in canalem oblongum desinit. Arteriam carotida intromittit, neruumque emittit. Sextum^y inter occipitis & temporis os, magnum est & inæquale, pro neruorum sexti paris transitu & venæ iugularis internæ ad cerebrum ingressu. Septimum^z in caluaria est in processus latere posteriore [tab.4.fig.10.a.] quod oblongum ac veluti ouale sensim dilatatur, & cæco ductu (vnde cæcum dicitur) in labyrinthum fertur, in quod neruus auditorius, seu quintum par fertur. Octauum^a in processus latere anteriore [tab.4.f.10.b.] regione a esse deberet.] est angustum & instar rimulæ asperum, quod ab auditus organo arteriolam in caluariæ amplitudinem emittit.

Sinum quoq; c^e duplicē habet, exteriorē [t.3.f.9.b.] inter

^r Temporum
^z Plat.

^f Col. & Lauren.
¹ Plat.
² temporum 2.

^t Alij causam
obliquitatis
vulnerūt pro-
pter sanguinis
spirituosi mo-
ram.

^u Temporum
⁴ & auditus
² Plat.

^x Col. 4. Fal-
lop. 1. qui me-
minit & ter-
tij parui, &
veluti caci,
quod in homi-
nibus vix pa-
teat, sed in ca-
nibus & lu-
pis. Plat. tem-
porum 5. &
auditus 3.

^y Columb. 5.
^z Col. 3. Fall.
& Lauren. 2.
Plat. 6. temp.
4. auditus.

^a Plat. 7. temp. 5. auditus. ^c Cautas altera externa, cui caput maxilla infe-
ritur, altera interna, qua meatum auditorium constituit. Laurent.

inter meatum ^b auditorium & processum ossis iugalis, qui oblongus, transuersus & cartilagine incrustatus est, in quem maxillæ inferiores processus longos seu caput, inseritur & articulatur. Alter sinus est interior ad ipsum processum sede posteriore, qui oblongus est, & ossi occipitij communis est. [*tab. 4. fig. 10. a b. versus i.*]

^b Col. statuit Galenum lib. de ossib. hunc sinum non recte descripsisse.

De ossibus capiti & maxilla superiori communibus, cuneiformi & spongioso.

CAPVT VII.

De his Galenus egit, & quidem de osse cuneiformi lib. de ossib. 1. & 11. vs. part. 19. & 20. at de spongioso 5 o. 8. vs. part. 6. 7. & 9. eiusdem 3.

PRIMUM os capiti & maxillæ commune cuneiforme ^a seu σφειοειδές dicitur, vel quod figurâ cuneum, superius acutum, inferius crassum, imitetur, vel potius ^b τὸ τε σφινός, quod instar cunei ^b ossibus iam explicatis & maxilli superioris interpretatur. In media enim basi capitis sitū est; ita tamen, vt omnia fere capitis & maxillæ superioris ossa tangat: nā committitur anterieus quidem ossi frontis futurâ transuersa octaua [*t. 4. f. 10. à T. ad u.*] & ossi spongioso, interius quidem futuræ nonæ portione [*t. 4. f. 10. ad medium u.*] exterius vero in nariū amplitudine ad ipsius septum futurâ communi quintâ [*t. 3. f. 9. iuxta 3.*] posterius occipitis additamento futurâ septimâ [*tab. 3. f. 9. nn.*] ad latera temporum ossibus futura squamiformi [*t. 2. f. 7. a.*] syncipitis angulum, futurâ quintâ [*tab. 2. f. 6. & 7. ab H. ad A.*] & frontis ossibus futurâ eadem

^a Gal. de ossib. 1. capitis os septimū, quod nonnulli inter capitis, alij inter maxilla superioris ossa connumerant. At 9. vs. part. 1. palati os dicitur, & de ossib. 4. inter maxilla superioris ossa recensuit sic 11. vs. part. 19. & 20. plures Vesal. & Col. 7 est os capitis. Arch. & proprium ca-

LI 4

piti, quatenus caluam constituit, & commune dici posse asserit, quatenus suis processibus alatis palati partem posteriorem constituit, & palatum ad maxillam superiorem pertinet. Arab. interpet. os paxillare, os colatorij, os basilare, (quod non secus ac basis cerebro substernatur) & cauilla. ^b Maxilla super. & capitis ossib. instar cunei incumbit. 11. vs. part. 19. & 20.

TABVLA IV. Fig. 10. Caluariae interiorem
humilioremque partem, cum multis foraminibus præ-
sertim sphænoidis, proponit. Fig. 11. Caluariae in-
terioris elatiorem partem ab humiliori
absectam exhibet.

Fig. X.




Fig. XI.



c Fallop. de
offib. ex trib.
at in obs. ex
quatuor, quæ
septimo mense
vix distincta
apparent.

Plat. pueris
duplex in me-
dio, duos ob-
tinet latera.

Laurent. pue-
rulus nunc tri-
plex, nunc qua-
druplex.

d Vesal. Col.
Fallop. Plat.
Laurent.

c Gal. 9. vs.
part. 3. & 11.
equidem 19.
substantia den-
sa ac dura.

Vesal. repre-
hendit & vi-
sus parere, non
esse densum,
sed duas ha-
bere cavitates
amplas,
qua facile di-
gitum admit-
tunt. Idem di-
cit, in basi o-
mnium capi-
tis ossium cras-
sissimum spe-
ctari; quam-
vis non simul
densissimum &
durissimum.

dem [ab A. ad g.] sic & ossibus maxillæ superioris suis
eminentijs iungitur, vt in latere interno in oculi ca-
mera, cum osse tertio maxillæ, futurâ communi ter-
tia: in latere externo cum osse primo, quarto & sexto,
idque per futuram communem secundam [tab. 3. f. 8.
ab S. ad Q. & t. 3. f. 9. ad d. & e.]

Hoc in adultis ex osse imo constat, licet ex qua-
tuor c ossibus interpositâ cartilagine primo compo-
natur, quæ postmodum vniuntur: primum est basis
in capitis pene medio, transuersâ lineâ ab extremo
additamêto ossis lambdoidis separatum, quod glan-
dulam pituitariam continet, & à forma fellæ equinæ,
fella sphæroidis vocatur [tab. 4. f. 10. E.] Alterum no-
mine caret, & neruis opticis vnitis destinatum est
[t. 4. f. 10. d.] quod cum primo copiosa cartilagine co-
pularur, cui versus palatum clauus osseus inest, cui os
longum latumque in ortu cartilagineum affigitur,
quod cultro in aratro vomeri præeunti simile: ter-
tium & quartum sunt vtrinque processus alarum si-
miles [t. 3. fig. 9. char. 1. 2. 3. 4.] Quare cum multis pro-
cessibus tum intus tum extra exasperetur, figurâ va-
rium admodum est & ab antiquis d πολύμορφον, mul-
tiforme dictum.

Substantia c eius in basi quidem densa, partim
cū huic veluti basi caput nitatur (hinc basilare bar-
baris) partim ne ab excrementis defluentibus læda-
tur: in iunioribus solidum; in adultis vero in medio
cauum: ex solida enim materia distenta f antrum
constituitur, quod amplum est, squammâ durâ ac
densâ, nec vllis foraminib. peruiâ tectum: & quoad
internam partem, substantia est nonnihil spongiosa.

Processus g habet plures, alios internos, externos
alios.

f Quemadmodum is qui ex pauca materia vitri magnâ phialam conficit: ita
natura vt hoc os extenderet, cum nullam aliam materiam adiungere vellet, ex
hoc osse in pueris denso dilatato fecit os cauum. g De his Gal. 11. vs. part. 19. qui
de ossib. 1. cavitatem ipsis tribuit.

alios. Interius vtrinque duo, quos *λιννοειδείς* vocant, eo quod vtramque inferiorem lecticæ mensæve partem exprimant [t. 4. f. 10. αα.] horumque duo anteriores insigniores & crassi ex basi latâ in acutum mucronem desinunt: duo posteriores, cum in aliquibus non extuberent, sed parietem referant, pro vno à quibusdam habetur: quorum vsus, vt crassa meninx validius adnectatur. Exteriores duplices sunt: anteriorum quidem vtrinque vnus, iuxta septum ossium narium & palatum, parte qua cum maxilla superiore cohaeret, qui cum vespertilionum alis assimilentur *πτερυγοειδείς* & aliformes dicuntur: siquidem crassi in acutiem & tenuitatem insignem desinant [tab. 3. f. 1. e. h. 1. 2. 3. 4. & tab. 5. f. 12. H. H.] Hi sedem^h atque opimentum musculis in ore latitantibus exhibent: quare in medio ipsorum sinus profundus, oblongus, vt musculus ortum inde ducat, tutoq; muniatur. Posteriorum autem dicti processus.

Vtrinque duobus capitibus versus styloidem processum protuberat: quorum anterior obtusus, qui auctum musculo primo ortum præbet: posterior acutus: vnde quintum par musculi maxillæ inferioris prædit. Aliis denique ab extrema & media arte prodiens palatum bipartito diuidit.

Sinus quoque huic ossi insculpti, extrinsecus quidem in processibus aliformibus, vti dictum. Intrinsecus vero, anterior & superior transuersus & oblongus [tab. 4. f. 10. ad C.] neruorum opticorum connectioni sedem præbet. Posterior vero & inferior re quadratus, latus, laevisⁱ equi sellæ simillimus, qui fundibuli collum pertingit, & glandula pituitam recipiens locata est [t. 4. f. 10. E.] vnde postea in palatum ac nares defluit. Ab hoc enim sinu ad latera vtrinque canales gemini superficietenus solum caui procedunt, quorum superiores [tab. 4. f. 10. F.] antrosum

^h Gal. 11. v. part. 19. maxillam mouentium tertius. Vesal.

ⁱ Aliqui spogiosum voluit, alij negant. Hinc Vesal. nunquam in integris caluarij asperum vel foraminibus plenum occurrisset, vt aliqui contra voluerint, vt pituita expurganda viam extogitarent, quare quibusdam male os colatorij. Idem Plat.

k Sinus ob-
longi Vesal. si-
nus obsecario-
res quatuor.
Plat. sub glan-
dula duæ ca-
pacitates lati-
tant; in qui-
bus rete mira-
bile Galeni
continetur,
& ab his ca-
nales gemini
emergunt, qui
in rimas desi-
nunt. Laur.
l Arteria ca-
rotis incum-
bit. & pituita
videtur de-
fluere; qua
primario ex-
sculpta vi-
dentur. Ves.
tantum infi-
gniore hu-
ius arteria ad
caluariâ de-
ducit, non ve-
ro pituitam,
Plat. per ri-
mas tres pi-
tuita percola-
tur. Laur.
m Et Fallop.
n Vesal. &
Plat.

sum ad secundum ipsius foramen, quod in oculi se-
de est, vel ad nares, vel ad fauces fertur: per inferio-
res [tab. 4. f. 10. O.] vero pituita^k in rimam [t. 3. f. 9. N.]
quæ inter ossa petrosa syncipitis & cuneiformis sita,
& inde in palatum destillare creditur.

Cavitates habet: duas quidem ad latera prædi-
ctorum sinuum cum ossibus temporum & syncipitis
communes, intrinsecus concavæ, extrinsecus vere
conuexæ [t. 4. f. 10. S. S.] Vnam vero satis insignem in
huius ossis basi [t. 4. f. 10. sub E.] inter superficiem, quæ
cerebrum & eam quæ oris cavitationem respicit, habet;
quæ in pueris^l non reperitur, licet pars hæc annum
integrû spongiosa sit; in adultis vero caua & squam-
mosa, interdum non distincta,^m sed spongiosa &
squammis varijs composita; interdum in duasⁿ ca-
uitates [t. 5. f. 12. C. D.] distinctas [tab. 5. f. 12. E.] quæ pro
ossium incremento magna est aut parua: quæ tenuis-
sima quoque membranâ vestitur eo modo, quo cau-
itates geminæ frontis & quæ in malis sunt; & hæ ve-
vacuæ sunt (quare vocesⁿ & ossium leuitatis grati-
creata nonnullis videntur) vel in ijs viscida pituita
continetur. His tertia exigua p^p cauitas septo rursum
subijcitur [f. 12. G.] & ab illa insigni cavitate forami-
na duo ad nares abeunt [fig. 12. F.] forte vt aerë p^p ad-
mittant: alias vndique squammâ continuâ obdu-
citur, nec vsquam peruia, quam in narium amplitu-
dinē, quæ tamen squamma^q tenuis est, & stylo quo-
uis in adultis mox penetrabilis: si vero^r in quibus-
dam sinus hi non occurrunt, tam intus cauernosus
ad compactionis pumicis formam effingitur, & eius
superficie continuæ squammæ obducuntur.

Forami

o Antra vocat Vesal & Plat. at Columb. antrum vnum Laurent. sinum am-
pliss. facit. p Nihil præter aerem continet cum molli medulla, magnitudineta-
men cavitati non respondente, Vesal. medullosum quid continet, Plat. in omnib. se-
amplum & vacuū, in aliquib. spongiosa alienius substantia plenum. Col. q Ex-
guum antrum. Ves. Plat. x Crassissimum recentiorum plures volunt.

Foramina habet decem, ^f quorum alia in oculi orbitâ, alia in basi caluarie occurrunt: in oculi orbita, propria tria & communia duo cum maxilla superiori. Horum ^t primum, iuxta processus sellam constituentes, quod circulare est [tab. 4. f. 10. B. t. 3. f. 8. E. E.] pro neruorum opticorum transitu & superne in externo latere veluti angulum minutissimum habet [t. f. 10. C.] quo vna vena minima ad oculum transire possit. Secundum superiore parte effractum, rotundum non est, sed ^u veluti sinum semicircularem seu rimam vel longam amplamq; cavitatem in acutum angulum desinentem refert [tab. 3. f. 8. G. tab. 4. f. 10. G.] an Galenus ^x dum dixit, os sphæroidis cribri modo perforatum esse, hanc rimam intellexit? quasi viderit, rimam hanc esse instar cribri per quam pituita (Hillet) parte vero humilior nonnihil oblongum & orbiculare; per hoc secundum neruorum par ad oculorum musculos, qui ibi exoriuntur, permeat; dein & tertium par, seu portio minor tertij paris ad partem frontis, musculos malarum & narium, quæ partim per foramen ossis frontis supra internum oculi angulum, partim per foramen quartum transit; tum arteriæ carotidis ramus insignis; quanto etiam amius à vena temporum maiore cavitatem capitis intrintrans: quinto & humiditates aquosæ cerebri in glandula collectæ, vnde lacrymæ fiunt, ad oculi cavitatem

f Vesal.
t Laurentio
quatuor Plat.
nouem.
u Et Eallop.
Col. hic
vero superio-
ris anguli non
meminuit.
x Gal. prior
minus dicit,
quod in ho-
mine fallum
esse, Fallop.
scribit: Co-
lumb. asserit,
aliquando or-
bem efficere.
Vesal. & Col.
arguunt Ga-
lenum, quod
hoc os cribri
aut spongia
modo perfo-
ratum statu-
rit, per quod
pituita perco-
letur. Fallop.
vult, Galenū
de hac rima
intelligendum
esse; & Laur.
qui aliquan-

exigua foramina in resiccatis notauit, vult per illa, aut per ossis internam substantiam porosam, spongiosamq; sensim excrementa cerebri in sinus patentes transolari, quia dicat Galen. 11. vs. part. Satius esse transolari, quam excidere, alias continuo expuere cogere, & os apertum tenere. Syluius etiam sua experientia adducit. Dicimus Galenum recte scripsisse, densum esse & durum, ne ab excrementis ledatur, qui statuit continere foramina meatuum expurgantium, intelligens duos canales in palatum, ut explicat 8. vs. part. 6. & 9. eiusdem 11. addit præterea, hac duo foramina ampla tenuibus foraminibus quasi cauernulis donata, quod non de superficie intelligendum, sed de substantia interna, qua nonnisi spongiosa est.

cauitatem pertranseunt; & inde per foramen quartum ad quintum, indeque in narium amplitudinem profluit. Tertium sub eadem statim rima paruū est, & ad amissim rotundum, per quod quinti paris neruorum ramus minor ad musculos temporales & in ore latitantes transmittitur: nonnunquam & tertij paris graciliorem radicem, quæ cum secundo parialiquando excidit [*t.3.f.8.H.tab.4.f.10.H.*] Quartum ex cauitatis oculi latere externo versus nasum instar rimæ oblongum & maximum, quod sphœnoidi cum osse quarto maxillæ superioris commune est, quod ex oculi orbita emittit neruulos tertij & quinti paris minorem radicem in musculos, simul & pituitam, quæ omnia per secundum foramen erant ingressa. [*tab.3.fig.8.& 9.D.*] Quintum in oculi radice latitat ad prædicti foraminis finem, quod insigne amplum & oblongum est, quo pituita quæ ex caluaria per foramen secundum delapsa est, & dein oculi sedem per foramen quartum, & inde per quintum hoc in narium amplitudinem labatur [*t.2.f.7.Φ.*]

In basi quoque caluariæ quinque occurrunt. Primum in sede interiore, ad latus sinus, vbi glandula locatur, foramen orbiculare amplum & breue, quod arteriæ carotidis ramum maiorem à secundo temporū foramine in caluariam intromittit [*t.4.f.10.X.*] secundum in sede exteriori oblongum nonnihil & amplum, quod tertij & quarti paris vulgo dicti neruorū radices crassiores emittit. [*t.3.f.9.Q.t.4.f.10.Q.*] Tertium prædicto extrinsecus proximum, sed multo minus & orbiculare, pro venæ iugularis interni ramo, qui caluariam & duræ meningis substantiam subit, [*t.3.f.4.R.t.4.f.10.R.*] interdum ad sexti foraminis latus exiguum occurrit, pro dictæ venæ ramo paratum. [*t.4.f.10.M.*] Quartum est ad nares, meatus oblongus, rectà antrorsum delatus, per quod ab arteria

teriæ carotidis ramo maiore, ramus ad narium amplitudinem fertur. [t. 4. f. 10. V.] -

Quintum ad extremitatem processus alati in palato satis magnum, pene ouale, quo per id neruorum par tertium ad linguam eiusq; tunicam, dentes & labia pro sensu, & par quartum ad palati tunicam constituendam, permeare possint. [t. 3. f. 9. μ. R.]

DE OSSE SPONGIOSO.

Secundum os ^a capiti & maxillæ commune, quod capitis octauum os aliqui ^b faciunt, cum admodum sit ^c foraminulentum & cauernosum ἡ δ' μοειδ' ἦν, à cri- bri similitudine vocarunt : at cum foramina hæc non sint recta (licet nonnulla ^d eiusmodi sint) vt in cribro, sed ^d tortuosa & anfractuosa vt in spongia, rectius ^d μορσοειδ' ἐς cum Hippocrate ^e dicitur.

Situm est in anteriore caluariæ sede ante ^f meninges & fere totam narium cavitatem opplet, & frontis basis medio veluti committitur [t. 4. f. 10. K.] & à phænoide futurâ capitis nonâ, seu potius harmoniâ distinguitur [tab. 4. f. 10. supra u.] exterius vero ad secundum os maxillæ ^g superioris terminatur.

Figurâ simile est & ^h quadrato, quod alterâ parte longius, & alterâ parte latius depingitur: at huius vera imago ^f in puello vnus anni considerari debet, sum in adultis à reliquis ossibus sine ruptura auelli nequeat; & quomodo os maxillæ tertium ⁱ creditû, quod orbitæ oculi partē tenuem, sed solidam & plati- nam constituit, & spongiosum os in naribus, quod nunc venerea sæpe exeditur, & cribrosum os, vnus ossis partes sint, patebit. Sunt enim huius ossis partes quatuor : prima processus est superior in huius ossis medio

^a Sic & Fal-
lop. Archang.
Laurent. Gal.
in lib. de ossib.
huius non me-
minit.

^b Vesal. &
Columb. quod
suis partibus

mutilatū re-
censuerunt:

^c alij ad ossa
maxilla, vt
Plat. alij nasi
retulere, Gal.

^d 9 vs. part. 3.
ossa narium
appellat.

^e Gal. 8. vs.
part. 7. & 9.

eiusd. 7. σπορ-
μοειδ' ἐς, Na-

χιανzeno di-
citur ἡ δ' μο-

ειδ' ἡ pars me-
ningis; Pollu-


ci ἡ δ' μὲν, pars
nasi superior.

^d Gal. 8. vs.


art. 6. & 7. 9. eiusdem 3. ^e Attestante Galeno 8. vs. part. 3. ^f Gal. 8. vs. part. 6.
Columb. ad secundum & tertium dicit. ^l Sic & Archang. ⁱ Vesalio & Ar-
hang. quare Laurent. Vesalium hoc loco errare dicit.

TABVLA V. Fig. 12. Ossis Cuneiformis & spon-
goidis internam superficiem exhibet. Fig. 13. duas synci-
pitis partes inuicem seiunctas proponit, quo suturarum
fabrica commodius conspiciatur. Fig. 14. verti-
cis ossis portio, quo caluariae substan-
tia pateat.


FIG. XII.



XIII.



XIV.



medio oblongus, triangularis in apicem acutū desinēs, & formā cristā galli referens, aliquando tenuis & latus, aliquando crassus, qui totum os septi instar diuidit, & cerebri processus mammillares distinguit, cui etiam tertius duræ meningis sinus, qui cerebrum diuidit, valide connascitur [*t. 4. f. 10. x. t. 5. f. 12. B.*] Altera est vtrinq; ad processum, vbi caluariæ cavitatem explet, vndiq; cribri modo frequentibus & exiguis (in canibus, amplioribus) & fere obliquis foraminibus perforatur [*t. 4. f. 10. K. l. t. 5. f. 12. A. A.*] quæ membranâ tenui similiter perforata tegitur, vnde *ἡ μολοδὲς*, totum os appellatum fuit aliqui colatorium nominarunt. Tertia processus inferior, superiori oppositus, qui narium superiorē partem distinguit. Quarta spongiæ aut pumici similis & cauernulis prædita, vnde *μογλοειδὲς* totum os nominarunt, & in superiore parte narium consistit, & oculi orbitam interiorem perficit: spongiosum & obliquis foraminibus donatum est, ne aer frigidus inspiratus, vel etiam impurus viribus integris rectâ in cerebrum se insinuet, & immodice refrigeret (& hîc recte Galenus^k sapientiam opificis commendat) sed vt aliquantum retentus aleretur & immutetur. Quare multiplex hoc os est, cribrosum ad caput, spongiosum ad narium cavitatem, planum ac latum ad oculorum sedem existit: hinc ossis huius substantia patet, quod sit maiore ex parte, tenuissima, & quod crebra, exigua, & obliqua foramina obtineat: exigua quidem, ne corpus aliquod crassum in cerebrum feratur. Vfus foraminum, vt per ea aer ad animalis^l spiritus generationem imparetur: dein, vt cum aere odores in cerebrum ascendant; quare mammillares processus seu olfactus organa ad hæc foramina feruntur: hinc qui coryza laborant, ob foramina hæc pituita obstructa, odorem sentire nequeunt: sic horum vsus in cerebro

^k 8. vs. part. 7.

^l Gal. 8. vs. part. 6.

cerebro affecto, ^m vt aer medicamētis alteratus, diutius in his cauernulis retentus, magis in cerebrum agat. Est etiam in posteriori huius ossis sede vtrinque; ⁿ rima quædam semicircularis, ac si vnguibus impressa foret, quæ duram menyn gem illi adnexam, & multis foraminibus peruiam firmat [t. 4. f. 10. infra K.] ^{m Fallop. in obseru. Gal. 8. v. s. part. 6. addit vsum alium, vt si v. sua incidit, repete ac confertim excrementorum copia vacuetur. Sic Laurent. secundarium vsum dicit vt quando ventriculi copiosa pituita repleti sunt, per tubercula mammarum papillis similia in ossa cribriformia & nares stillet: At Plat. negat posse fieri, nisi prater naturam eo fluat. n Sic & Plat. & Laurent.}

De Meningibus Cerebri.

CAPVT VIII.

De his tractauit Galen. 8. v. s. part. 7. 8. & 9. q. adm. Anat.


1. & 2. de Reduplicatione vero crassæ meningis, & venis & arterijs cerebri agit 9. v. s. part. 5. 6. & 7. item 9. adm. an. 2.

QUEMADMODVM infimum ventrem, eiusque partes Peritonæum, ac medium ventrem Pleura succingit, ita & caluariae cauitati membranæ duæ subtenduntur; quas Galenus, eumque sequuti proprie ^a *μλωγξας*, Erasistratus, *διπρανίδας*, Pollux *εἰλαυδεις*, Arabes & vulgo Matres vocant; Macrobius vero Omenta dixit, inuolucra, membranæ, pelliculæ nominari possunt: harum altera exterior crassa siue dura, altera interior tenuis siue pia nominatur.

Crassa Meninx, Hippocrati ^b *παχυτέρη*, Galeno *κεληρα*, ^c siue *παχέα*, siue *δερματεύδης μλωγξ*, id est, crassa, dura & cuticularis, siue dura mater vulgo dicta, eo quod membranis reliquis totius corporis sit rassior, durior & robustior, & quod ad tenuem relationem talis sit. Hæc figura ex magnitudine ossibus cranei ^{Mm 2} respon- ^a *Μλωγξα Hippocr. lib. de carn. generalius sumit, nam venis, stomacho, faucibus ventri, intestinis & partibus cæuis tribuit.* ^b *De loc. in homine: Cerebri meningis duæ sunt; superna quidē παχυτέρη; altera qua cerebrum contingit, λεπτή, qua ubi vulnerata fuerit, coalescit. At Aristot. 3. hist. 13. maxime οἰκονομα quæ sunt circa cerebrum, quarum altera circa os finior & crassior, altera qua cerebrum ambit.* ^c *In discriminatione vultur 7. v. s. part. 6. & 9. adm. an. 1.*

TABVLA VI. Fig. 1. Cerebrum crassâ meninge
obtectum exhibet, at Fig. 11. Eâ detectum, cum eius
tertio per medium diuiso, tenui tamen me-
ninge adhuc obuolutum
proponit.

FIG. I.



II.



respondet, cum omnes eius sinus & cauitates succingat. Maior tamen est tenui meninge, ne vasa illius comprimantur, quæ distenta & nimio sanguine turgida capitis dolorē causat; imo sæpe apoplexiam, vnde videmus plurimos apoplecticos morientes sanguinem per nares & os effundere.

Connectitur basi cranei eiusque processibus acutioribus & foraminum orbibus [t. 9. f. 7. ZZ.] quæ firmissime (quare hinc oriri nonnulli censuere, cum huius, vt aliarum membranarum, principium à quo semen sit) præterquam cuneiformis ossis sinui [t. 4. f. 10. E.] vbi glandula pituitaria sita est [t. 11. f. 15. A.] & ad illius latera, vbi sinus sunt, arteriarum carotidum propaginibus cedentes; & caluariæ faciem internam totam succingit, à qua, quemadmodum & à cerebro tantum distat, quantum pericardium à corde ne ipsius eleuatio & depressio, siue diastole & systole, quæ ipsi, ^d perpetua est (vt in capitis vulneribus videri potest) impediatur. At cranio tenuibus membranisq; fibris (quæ ligamenta Galeno ^e dicuntur) ab ea enatis validissime connectitur, quæ per capitales futuras præsertim circa futuram lambdoideam foras excidunt, & singula ^e versus cranei partem sibi directam, vnde exorti sunt, extēduntur, indeq; progressa sibi mutuo occurrunt, exacte vniuntur, & ex se ipsis communem membranam, quam Pericranium appellant, procreant; sub qua tñ alia tenuis ^e membrana consistit, quæ Periostrium dicitur; à quibus membranæ reliquæ totius corporis ortum ducunt. Tenui autem membranæ & cerebro vasorum beneficio cohæret [t. 6. f. 2. DD. GG. tab. 9. fig. 8. XX.]

Duplex ^f est, quemadmodum & cæteræ corporis mem-

^d Galenum primum hoc statuisse, se vero nunquā assequi potuisse asserit. Fall. in obs. & in instit. ait, ex terior meninx cerebrū omni ex parte ambit, atque in ipsius sublationibus, continuo non mouetur, ossi occurrens, eius duritiem innoxie patitur. Plat. finis tertius arteria alicuius instar pulsant, quod cum in tenellis caluarijs, antequam penitus coalescant in vertice tacta deprehendatur, vt cerebrum moueri multi falso crederent, occasione præbuit: Columb.

^e Arch. p. er

petuo moueri, exemplo vulneratorum probant: Laur. sic. Cerebrum moueri non nisi amens, aut in re Anatomica imperitus negabit. ^c In 8. vs. part. 9. ^f Omnia autem simplicem dixerunt, cum duæ sint membrana dura meninx, quarum vna interior, altera exterior, Col. lib. 7. c. 1. duplex quidam est, sed non idcirco duæ mem-

membranæ, cuius superficies, seu pars exterior, quasi tendo quidam latus alteri expansus ac connatus videtur, durior est & aspera, partim propter fibras, quæ (caluariæ parte abstractâ) lineæ simplicis instar extuberant [tab. 6. f. 1. GGG. HH. II.] partim, & quod in vertice, ubi futura sagittalis cū coronali iungitur, tubercula subinde reperiuntur, quæ in caluaria sinus obtinent, quibus valide innascuntur [t. 6. f. 1. K.] Interior vero superficies splendida, lævis, lubrica, multoque candidior, omni adipe destituta, & aqueo humore magis, quam exterior perfusa [t. 6. f. 2. HH.] At quâ parte cerebrum spectat, magno sensu pollet: quâ vero cranium, & minori sensu prædita est, cum ossis duritiem attingere debuerit. Foraminibus multis peruia est, primum ut venis i quamplurimis transitum largiatur: dein neruorum coniugationibus: tum in medio vno foramine, eoque orbiculato profundibili transitu pertunditur [t. 10. f. 11. F.] sic ad huius latera pro arteriæ carotidis ingressu [t. 10. f. 11. C. & D.] & maximum quoque foramen habet, quo spinalis medulla descendit [t. 10. f. 9. H.] Tandem ubi ossi spongioso imponitur, instar cribri^k perforatur [t. 12. f. 18. ad F. & fig. 9. ad FF.]

Reduplicatur in capitis vertice & cerebrū in dextrum & sinistrum ad dimidium quasi centrum separat [tab. 8. f. 3. à D. ad B.] quæ reduplicatio ipsi tertio duæ membranæ sinui continua subijcitur, & cum sinu per ipsius capitis longitudinē antrorsum ad summas nares fertur, & septo instrumentorum olfactus connascitur [tab. 7. f. 3. N.] quemadmodum posterius

Mm 4

in me-

cranium, cranio exterius pro perioſtio adest, ita interna caluaria superficie i perioſtium subest membrana cerebri durior, aut saltem exterior eius pars Fallop. obseru. i Galen. 9. vs. part 6. k Galen. 8. vs. part 7. Gal 9 ad an. 1. iuxta mediam longitudinem multo se ipsa crassior. potissimum ea parte qua futurarum media habetur pari modo sub futura lambdoide crassam membranam duplici structam plexu, simul & cerebrum aliquatenus ingredientem conspicies.

ninges, quem admodū cornea in quatuor & quinque tunicas distrahitur, nemo tamen quinque carneas dixit, Laurent. quæ duplex quasi sit, maiori ex parte ignorat Anatomici, Fallop. obser. crassa meninx gemina, Archang.

g Vesal. at Fallop. ait, pericranium in duas partes separari posse, alteram quæ cuti hærent, alteram quæ ossi connascitur, utramque tamen partem unum corpus efficere, quod pericranium sit, nec distinguendum esse pericranium à perioſtio.

h Quemad-

modum peri-

1 Sic. Ves. Col.

Laurent. cui
falx dicitur.

Verum Vesa-
lij hac sunt:

processus fal-
cem referens

non duplica-
tur, eisi Gale-

nus secutus
aduenit; sed

simplex est,

quemadmo-
dum & ipsa

membrana:

licet enim si-
nus tertius

per longitudi-
nem diff. Etus

primo intuitu

membra pro-

cessum, qui in-

ter cerebrum

intercedit ge-
nuinum esse,

ac veluti du-
plicatâ mem-

branâ consta-
re ostendit, is

tamen sinus

duntaxat

occurrit.

Et

Plat. lata sunt

membrana &

in medio cum processu posteriore. Hæc reduplicatio
crassæ meningis, processus superior dicitur; falcem-
que¹ messoriam refert; siquidem parte posteriore,
quâ duræ membranæ portioni cerebellum integenti
continua est, latior est, falcisque basi correspondet
[t. 7. f. 3. ad D.] iuxta mediam^m ipsius longitudinem,
multo seipsâ crassior, dorsoque assimilari potest,
quemadmodum antierius falcis mucroni; sensim e-
nim falcis ritu arctatur: quare huius processus pars
cerebrum respiciens intro obligatur [tab. 7. f. 3. ab F. G.
ad H.] Alter vero processus posterior & breuior est,
cerebellum à cerebro magnâ ex parte distinguit [t. 9.
f. 7. 0000.] imo & cerebellum integit,ⁿ quadrupli-
catur, vel, si mauis, triplo, quam in reliqua sede cras-
sior duriorque; & canes hoc loco os habent, quod
cerebrum suffulcit, ne cerebellum premat [tab. 9. f. 7.
inter 00. & XX.]

In hac membrana canalium duplex genus reperit-
tur: vnum, per quod feruntur vasa veluti arteriæ,
quæ per membranam disseminantur: alterum, in
quod desinunt venæ, quod canalium genus loco ve-
narum est; hos posteriores sinus vocarunt, de qui-
bus nunc.

Sinus^o quatuor hîc occurrunt, quos Galenus^p
modo meningis διπλώσεις sanguinem deducentes,
modo crassæ membranæ^q ventriculos vocat, quia ex
membranæ reduplicatione oriuntur, & instar riuo-
rum^r sanguinem & spiritum vehentium existunt.

Quorum duo primi sede posteriore in occipitij basi
inter

simplicis, n. si quatenus sinus amplius illas peruadit, contra Col. Laur. volunt hanc
reduplicationem falsè corpus cōstitueret. m Gal. 9. adm. an. n Vide 9. adm. an.

1. quadruplicatur, Col. Archang. Laur. triplo fere crassior, Vesal. o Sinus decem
agnoscit Falkin obs. vtrinq; quatuor, dein nonum, qui ab anatomicis pro tertio &

decimum qui pro quarto ab alijs habetur. At in instit. sex statuit, quorum quatuor
etiam alijs sunt not. duo alijs nulli. p In 9 part. 6. at 9. adm. an. 1. διπλῶς dicitur.

q Τὰς περὶ τὰς μενinges ὑπολιπείας. 9 adm. anat. 1. r Hinc fortasse deceptus Pelops,

inter cerebrum & cerebellum, vtrinque vnus [t. 11. f. 13. M.N.] dexter & sinister dictus, ad latus foraminis spinalis medullæ principium habent, iuxta futuræ lambdoidis latera, vbi venæ & arteriæ se exonerant, qui cranio attensi, & ad futuræ lambdoidis prope medium & cerebelli apicem delati, simul coeunt in communem cavitatem desinunt, quem locum [t. 11. f. 13. O.] Herophilus ληνός, torcular nominare solebat, quod inde velut ab arce quadam riui hinc inde mittantur: alij quidem ex medio loco in totum cerebellum deriuati: alij ex parte anteriore feruntur: vnde tanquam ex torculari sanguis è venis & arterijs effusus in vniuersum cerebrum exprimatur. Ab his vtrinque; ad latera ramuli venarum instar excurrunt, nonnulli admodum graciles & solum pilum exprimentes; quidam vero ampliores [t. 11. f. 13. SS.] qui in vicinas membranas, crassam [t. 9. f. 7. 000.] & tenuem [tab. 10. fig. 9. B.D.] qua vniuersum cerebellum operit, excurrunt.

Ex horum concursu [tab. 11. f. 13. O.] duo alij sinus prodeunt, longitudine & cavitatis formâ variantes, quorum alter elatior, qui tertius sinus dicitur [t. 13. f. 3. PP.] humilior alter, siue quartus [t. 11. f. 13. R.]

Tertius sinus, qui veluti * riuus sanguinis existit, & à Galeno y interdum vena nominatur, alijs u Herophili ληνός censetur, rectè secundum y capitis longitudinem [t. 6. f. 1. & 2. CCC.] inter dextram & sinistram cerebri partem, sub elatissima futuræ lambdoidis parte & sagittali futurâ delatus in anteriora excurrent, sub frontis ossis medio in summis naribus, olfactus instrumentorum osseo septo [tab. 11. f. 13. Q.] committitur, & triangulum z referret, nisi parte superiore semicirculû imitaretur; huius enim, quem admodum & duorum priorum cavitates duas costas introrsum, tertiam vero extrorsum curuatas habent.

Mm 5

Ab

qui vasa omnia à capite ortum ducere existimauit.

f Galen. 9. v. f. part 6. 9. adm. an. 1. ληνός interpres vertit lenon à torculari similitudine.

t Gal 9. adm. anat. 1. Venas duas appellat. u Gal. 7. ad. an. 2. dubium, an cōmuniū duorum priorum sinum cōgrissum, an quartū sinuū terminum in vērīculos excurrentiū nomen debeamus, quia Galenus modo huic, modo illi parti, torcularis nomen tribuat, sed vterque sic dici potest. Vesal. x Gal. 9. v. f. part 6. & 7. y Quid aliud quam venam appellaueris eiusmodi vas, in quo sanguis continetur? 9. adm. an 1. z Sic & Col. Triangularis.

Platero. sinuū
cavitates ad
trianguli for-
mam accedit,
Vesal.

a Vel potius à
venis in sinu
positis, inquit
Columb. qui
per hos sinus
venas iugula-
res internas
excurrere cre-
didit. Et Ar-
changel. per
duos priores
sinus vena iu-
gulares inter-
na feruntur,
& in tertium
sinum se infi-
nuant, & ad
nares excur-
runt, imo &
per quartum.
b Galen. 9.
adm an. 2.

c Cal 9. v. f.
partium 6. δι-
πλόλω & πρῶ-
τος vocat.

d Dissectio-
num profes-
soras tacuisse
scribit Vesal.

e Sic & Co-
lumb.

Ab hoc sinu^a per totam^b longitudinem ab vtraque
cerebri parte, vtrinque à sinus laterib. ductus, quos
ὄχεται etiam Galenus vocat, frequentes veluti à ve-
na aliqua maiori oriuntur, quorum aliqui^b exigui
(venas reptitias vocant) existunt; & horum furculi
alij parte superiore [t. 11. f. 13. XXX.] prodeunt, & sur-
sum^c ad cranei duplicationē & pericranium ferun-
tur, cum illis commissi, qui ex verticis cute per exigua
foramina, ipsorum causā insculpta, caluariam ingre-
diuntur. Alij parte inferiore graciles [t. 7. f. 3. EE. HH.
tab. 11. fig. 13. VVV.] qui deorsum^c in eam crassæ mem-
branæ partem distribuuntur quæ Falx dicitur. Alij
ex sinus latere [tab. 11. fig. 13. TTT. tab. 6. fig. 2. DD. FF.] nu-
merosā serie in tenuem membranam diffunduntur,
& cerebri anfractibus cum tenui membrana infe-
runtur, & vbi tenuem membranā prætergressæ sunt,
ipsam cerebri substantiam ingrediuntur. His aliquan-
do dehiscētibus tantum sanguinis è naribus proflu-
uium excitatur, vt viginti quatuor libras effluxisse
obseruatū fuerit; in quali profluuiio non fronti, sed
vertici & suturæ coronali remedia adhiberi debent.

Quartus sinus^d qui nusquam vt cæteri caluariæ
vicinus brevis est, in cerebri humiliore sede, qui in-
ter cerebrum & cerebellum ad nates & glandulam
pinealem recta fertur [t. 9. f. 7. tab. 11. fig. 13. R.] ipsiusq;
cavitas triangulo trium æqualium costarum introf-
sum curvatarū correspondet; cuius principium, vel
potius omnium quatuor concursus [tab. 11. f. 13. O.]
nonnulli Torcular vocant; & hinc venæ^e quæ per
cerebri substantiam feruntur, vt eam alant, pdeunt.
Ab hoc quoq; in progressu exiguæ propagines pro-
manant, quarum alix sursum in crassæ membranæ se-
dem supra cerebellum, & etiam ad falcem aliquouf-
que excurrunt [t. 11. f. 13. II.] alix deorsum [tab. 11. f. 13.
aa.] feruntur, quæ etiam in crassam membranam,

quo

quâ cerebello incumbit, ac in tenuem tam cerebri, quam cerebelli membranam diffunduntur. Mox in ductus alios diuiditur, duos quidem, qui à superiore ipsius parte, vnū qui ab inferiore prodit; qui à superiore, duplex est, maior & minor: ^f maior [t. 11. f. 13. b.] crassæ membranæ humiliora, quâ cerebrum per totam ipsius longitudinem diuidit, perreptat; à quo & furculi [t. 11. f. 13. ccc.] sursum ad huius membranæ processum excurrunt. Minor vero, qui vel dexter vel sinister [t. 11. f. 15. d. e. tab. 3. fig. 3. II. F. G G.] & venarum modo tenui membranâ suffultus secundum cerebri longitudinem supra corpus callosum vtrinque ducitur vt tenui membranæ ramulos aliquot largiatur, & vtrinque in cerebrum distribuat.

Inferior vero ductus [tab. 11. f. 13. f.] vnus est, in tenuem membranâ cerebellum inueffientem propagatus. Hicque diuiditur in duos ramos, quorum alter antrorsum [t. 11. f. 13. g.] per cerebri anfractus, in ventriculi humiliorem sedem definit, ac cum ascendente arteria [tab. 11. f. 13. y.] iungitur, vt plexum choroidem, aiunt, constituent. Alter ramus retrorsum ad cerebellum reflectitur [tab. 11. f. 13. h.] ac in tenuem eius membranam multifariam spargitur. Tandem quartus sinus in vas & insigne, tenui membranâ inuolutum [tab. 9. fig. 7. V. tab. 11. fig. 13. i.] definit, quod iuxta testes varie diuisum & varicosum, ad glandulam pinealem fertur, & sub fornice cerebri, vsque ad ventriculi tertij sedem interiorem excurrit & bipartitur ramo dextro [t. 11. f. 13. l.] ad dextrum ventriculum sinistro [m] ad sinistrum exporrecto: & arteriæ primæ & quartæ ramis pro plexus choroidis efformatione commisceri volunt.

Hi autem sinus vel concauitates ^h venæ tunicam non habent, sed vtraque corpora similis substantiæ existunt, nam vbi primum ^h vena caluariam attingit, crassa

f Gal. 9. adm. an. 2. à sinu qui per totam longitudinem fertur, vena frequentes & exigua distribuuntur, præterquam duæ: vna quidē secundū torcular in anteriore secundum totius capitis longitudinem procedens: altera vero in medio totius cerebri inter posteriorem & anteriorem partem, qua in altum descendit, vt multifariam propagatur. vide cap. 3. h Galen. 9. adm. an. 1. i A Galeno & ceteris dissectorib. haud animaduersum, qui venarum tantum munere fungi crediderunt, Vefal.

k Venas in-
 gulares ingre-
 di; & ad ex-
 tremum usq;
 progredi vo-
 luit Columb.
 & Vesalium
 reprehendit,
 quod nō agno-
 uerit, idcirco
 sanguinem nō
 esse extra va-
 sa, quod si ef-
 fet, addit,
 quod Vesal.
 sentit, dura
 mater vena-
 rū principium
 diceretur. Re-
 spond. cū Ga-
 leno 9. adm.
 an. i. Quid al-
 iud quā ve-
 nam appella-
 ueris, vas quod
 sanguinem re-
 cipit & con-
 seruat? Vesal.
 vult, venas
 & arterias o-
 mnes præter
 duos ramos
 excipere, ipso-
 rumq; mate-
 riam suscipe-
 re: Fall. in obs.
 tantum venas
 & nullas ar-
 terias ad si-

crassa membrana ibi duplicatur, nec non interna re-
 gio fistulæ modo sinuatur, & cum hisce sinubus, tan-
 quam si venæ essent, ipsi venæ iunguntur. Horumq;
 vsus & venæ & arteriæⁱ officium præstare, quare &
 sinus hi arteriarum instar pulsant, venas & arterias^k
 excipere ipsarum materiam quam continent, in se
 recipere (sanguine enim refertæ existunt, & venoso
 crassiore & arterioso cum vitali spiritu, quem conti-
 nent, si qualem^h acceperunt, conseruant; in mor-
 tuis vero^h granum continent) & de se propagines
 venis similes producere, quæ ad meninges & cere-
 brum ferantur. Cum enim cerebrum amplum sit &
 numerosâ sanguinis copiâ semper indigeat & ve-
 narum ac arteriarum maiores trunci per cerebrum
 ferri non possint, Natura hos riuos & sinus, qui loco
 venarum & arteriarum sunt, & velut aquæductus
 totum cerebrum peruadunt, & irrigant, fabricata
 est, in quos sanguis copiosissimus semper effundi-
 tur, quem commixtum & alteratum per alios cana-
 les in cerebri anfractus eiusq; substantiam postmo-
 dum deriuat, & pro cerebri nutritione, & pro spiri-
 tus animalis in eiusdem substantia procreatione; nā
 cum continuo in sensus & motus instrumenta dif-
 fundatur, motuq; absumatur, copioso sanguine tam
 venoso, quam arterioso in hisce sinubus permixto
 opus habuit.

Vsus crassæ meningis, cerebri vniuersam substan-
 tiam exigere, & cum suis partibus^l integere (siqui-
 dem medullæ spinali, quemadmodū & nervis trans-
 euntibus velut inuolucrum quoddam obducitur) &
 veluti^l propugnaculum quoddam cranij^l impres-
 sioni-

nus peruenire voluit. Laur. vero venas inulares internas ingredi, & sanguinē ef-
 fundere: Plat tertium sinum sanguinem venarum & arteriarum vehere & per a-
 lia vasa cerebro distribuere arteriaq; instar pulsare scribit. At Archang. crassiore
 & insigniores venas & arterias. ^l Galen. 8. vs. part. 9.

tionibus opponi. Dein prohibere, quo minus^m arteriæ cerebrum circūdantes in sua diastole ab offis duritie lædantur. Tum cerebrum à cerebello, & cerebrum in partēⁿ dextram & sinistram diuidere. Tandem ligamenta per suturas ad pericranij constitutionem producere & caluariæ firmare, quo minus cerebri pondere detracta deorsum labatur, neve cerebrum deorsum concidens, ventriculos cōprimat.

m Sic & Valerius.

n Galen. 9. v. part. 7.

DE TENVI MENINGE.

CAPVT IX.

De hac egit Galenus 8. v. supartium 8. & 9.

CRASSA membranâ detractâ, Pia mater occurrit [vt ostendit Tab. 6. fig. 2. & tab. 7. fig. 3. P. P. crassam, O. O. tenuem notat] quæ ob tenuitatem, & per se, & comparatione cum alijs membranis, considerata λεπτή^a μλινξ, tenuis meninx & χοροειδής, ^b id est, secundina, siquidem χοεῖω^c foetus similis sit, cum cerebrum venas & arterias contineat, ne in motibus suo situ dimoueantur, cum sedem seu basin ^b infirmam habeant.

a Hippoc. de sacro morbo, cerebri mediū μλινξ λεπτή diuidit Gal.

9. adm. an. 2. λεπτή ὑμὴν μλινξ.

b Μλινξ χοροειδής 8. v. part. 9. siquidem similis sit χοεῖω foetus, αἰγ, animalis mensurae, 8. v. part. 8.

c Cabrolus & Laurent.

d Λεπτή καὶ μαλακή, ὑμνῶν τ. 9. adm. anat. 1.

ε 2. e Gal. 8. v. part. 9.

Membrana est, potissimum intra caluam sita, proxime cerebrum ambiens, & cerebri figuram æmulans; magnitudine cerebro eiusque partibus correspondens, in corpulentia vero summe tenuis, licet duplicem eam aliqui^e faciant. Tenuis est, quo anfractus cerebri ingrediatur & pondere suo cerebro, quæ immediate inuestit, non sit molesta, & vasa per vniuersum cerebrum deducat, [tab. 6. f. 2. E. E. E. tab. 7. fig. . O. O.] Mollis est^d & exquisiti sensus cum sensum tactus cerebro & neruis communicare debuerit, & vt Archangelus voluit, tactus ipsius instrumentum: quam Natura^e cerebro & crassæ meningi interponit, ne cerebrū ab eius vicinia & contractu^e doleat.

Quem-

Quemadmodum enim, inquit Plato, inter terram & ignem, quod naturâ multū inter se dissimilia essent, DEVS aquam & aerem interposuit; ita & Galenus^e affirmat, Naturam in medio cerebri & cranij, quia substantijs multum discrepant, ytrasque meninges posuisse. Nam si tenuem^e solam Natura fecisset, non potuisset circa noxam cum cranio consuescere; sin vero crassam, cerebrum ipsum pateretur. Vt igitur^e neq; cerebrum, neq; eius operimentum quicquam paterentur, prior quidem tenuis meninx, post ipsam autem, crassa posita est, quæ quanto ossē est mollior, tanto tenui cerebrum est mollius. Quomodo autem^f crassa plurimum à tenui distet, & quanto interuallo, scire voles, foramine paruo in crassum facto, tubæ cuiusdam exiguæ initium inde & infra & regionem & subditam aere haud modico impleri conspicias.

Hæc non modo cerebrum, cui tenacissime adhæret, immediate tanquam naturale^g eius operimentum tegit, continet ac constringit, ne ipsius substantia, quæ mollis & humida est, in perpetuis motibus diuellatur (partes enim nudatas extrorsum diffluere videmus,) verum etiam in profundum eius^h se infinuat, & ad ventriculorum^h cauitatem internam eos vndiq; succingendo, se extendit, dum ab inferiore parte, quâ infundibulum est & arteriolæ ex carotidibus per latera cuneiformis ossisⁱ ingrediuntur, ascendit, ita vt etiam in profundo^k sit coniuncta; extra cranium vero medullam spinæ, & nervos ambit & inuestit^l quomodo vero infundibulum seu peluim efformet, & glandulam pituitariam parte elatiore inuestiat, infra dicitur.

Vfus ergo cerebrum, cerebellum, spinalem medullam & nervos tegere, ^h stabilire ^h & vasa omnia per eam excurrentia, quo tutius & commodius per cerebr.

^f Gal 9. adm.
anat. 2.

^g Gal. 8. vs.
part. 9. idcirco
piam matrem
distam putat
Platerus:

^h Gal. 8. vs.
part. 8.

ⁱ A supernis
partibus vul-
gus existimat.
Laur.

^k Galen. 9.
adm. an. 2.

^l Ossa hac
quoque cingi
videntur, qua
nunc mutato
nomine perio-
stium vocita-
tur. Archæ.

cerebri corpus, eiusque omnes partes distribuuntur, ^h colligare, & vt Archangelus ^m voluit, vt sit sensus tactus exquisitum instrumentum.

*m Lib. 3. sua
Anatomia
luct. 1.*

De vasis per cerebrum disseminatis.

CAPVT X.

De his vide Galenum 9. vs. part. 6. & quando vena & arteria diuersimode quam in alijs partib. per cerebrum ferantur, 9. vs. part. 4. & 5. de venarum in cerebrum ingressu, 9. adm. an. 2.

VAS A, quæ per cerebrum ^a disseminantur, duplicia sunt, Venæ & Arteriæ. At Venæ vel venarum iugularium tam internarū, quam externarum caluariam subeuntium rami sunt: vel Sinuum quatuor duræ matris propagines existunt. Arteriæ vero, arteriarum carotidem & ceruicalis soboles existunt; at non solum per vtramque meningem vasa hæc feruntur, sed etiam ad cerebrum cerebellum spinalemq; medullam: plurimas enim venulas & arterias capillares per candidissimā cerebri substantiam disseminari à Galeno edocti, hæcenus ostendimus.

a Nulla vena aut arteria cerebri substantia intexitur, quæquomodo alijs visceribus, & plerisq; musculis, sed à cerebri membranis continentur, & cerebro accumbunt, & vix ullibi ipsius substantia adnascuntur, Vesal. substantiam illius non penetrant, aut per illam disseminantur,


Vena ^b enim iugularis interior, vbi ad caluariæ basin in parte posteriore prouenit [t. 11. f. 13. ad A.] in duos ramos diuiditur, quorum alter amplior retrorsum, alter gracilior antrorsum fertur.

^c Prima [C. inferius] secundum caluariæ basin cum arteriæ carotidis ramo minore ducitur, & vbi musculis sub œsophago latitantibus furculos largita est, per occipitis ossis foramen primum [tab. 4. fig. 10. b.]

quod duntaxat membranas ipsius perreptant, Plat. vena ac arteria cerebri substantiam ingrediuntur, quod nemini hucusq; cognitum, Columb. cui obijcimus Gal. 9. adm. an. 3. verba: *δοτοφύσας ἡ ἐγκεφάλου λεπλὰς φαίνεται ὡς περὶ πρὸς διασχειρομή- es eis τὸν ἐγκέφαλον: vide & 8. vs. part. Fallop. etiam statuit, venulas & arteriolas per substantiam cerebri ferri in suis obseru. b Vena sex, & arteria tres vique, Vesal. Vena sex & arteria quatuor, Plat. Arteria tres, Fallop. c Vena cerebri secunda Vesal. & Plat.*

TABVLA XI. Fig. XIII. Vasa cerebri ipsorumque distributionem proponit, præsertim dextri lateris. Fig. XIV. Rete mirabile Galeni exhibet. Fig. XV. glandulam pituitariam cum pelui, & arteriis carotidibus quæ reticularem plexum efformare dicuntur. Fig. XVI. glandulam pituitariam & arterias carotidis, prout in boum & ouium capitibus obseruantur, ostendit.

FIG. XIII.




XIV.



XV.



XVI.



quod sexto neruorum pari paratum est, caluariam & crassæ meningis sinum subit.

d Vena ter-
tia Vesal. &
Plat.

d Altera [F. tab. 6. f. 1. DD.] quæ carotide arteriâ re-
lietâ antrorsum fertur, postquam furculum [n] au-
ditus organo per temporum ossis foramen quartum
transmisit, caluariam per cuneiformis ossis foramen
septimum [tab. 4. fig. 10. R.] ingrediens, crassæ mem-
branæ basin & latera, cū à sinu tertio procul distent,
alimentum deferens, peruadit; à quibus tamen et-
iam tenuem membranam perreptantes furculi pro-
deunt [oo. pp.]

e Vena quar-
ta Vesal. &
Plat.

e Tertia [E] venæ iugularis externæ propago est;
hæc enim sub auris regionem in duos ramos diuiditur,
exteriolem, de quo in faciei historia: & interiolem.
Interior, ramos tres in cranium mittit, & postea-
quam partibus oris, quæ ad fauces sunt, ramos distri-
buit, caluariam accedens per temporis ossis foramen
iuxta mammillarem processum [tab. 4. fig. 10. e.] cras-
sæ membranæ sinum subit.

f Vena quin-
ta Vesal. &
Plat.

f Quarta [G. tab. 12. fig. 19. HH.] iugularis externæ ra-
mus interior est, quæ antè ex oculi sede per cu-
neiformis ossis foramen secundum [tab. 4. fig. 10. G.]
quod pro neruorum pari secundo exsculptum est
transiens, per crassam membranam versus superio-
ra disseminatur.

g Vena sexta
Vesal. & Plat.

g Quinta [H. tab. 12. fig. 19. II.] ab eodem ramo, vn-
de & quarta prodit, & antè ex narium amplitudi-
ne per cibrosi ossis foramen [tab. 4. fig. 10.] in crassam
quoque membranam distribuitur. Harum duarum
vltus anteriorem hanc partem enutrire, cum ad ear-
sinus tertius non pertingat, sed iuxta processum
mammillarium septum desinat. Hæque cum paru-
sint, sine comite arteriâ fertuntur; quamuis etiam a
arteria prima furculus huc mittatur.

h Vesal. &
Plat. At Fal-
lop. in obs. cra-
nium ingredi
negat. Laur.
in cerebrum
emicare dicit.

Præter has quinque venas, sunt h qui & aliæ (quar
pro

pro prima cerebri vena recensent) dari velint, quæ cervicalis venæ sit terminus: nam cum cervicalis ad summam ceruicem venerit, ipsius residuum vna cum coniuge Arteriâ per occipitij ossis foramen tertium priuatim illi paratum, vel eo absente per secundum, quod pro neruorum septimo pari factum, pertransire, & vtrinque in sinum crassæ membranæ desinere. Quod hæcenus, fateor, reperire nō potuimus; quo vero & alijs non desit inquirendi occasio, eam tamen figuræ addidimus [t. 11. fig. 13. litera D. notatam.] Ceruicalem enim venam partim in foraminib. vertebrarum ceruicis absumi, ita tamen, vt ne primam quidem vertebraam attingat; partim in ceruicis posteriora, ramis etiam ex aduerso ad musculos ceruicis posteriores transmissis, disseminari, à Fallopio edocti, notauimus. Quæ venæ inuicem ac simul cum quibusdam alijs colligantur, quæ ex sinubus crassæ membranæ per foramen in caluaria amplissimū extra mittuntur: multæ enim sunt venæ, quæ à dura membrana & per futuras ac per foramina propria ad exteriora capitis propagantur, quæ cum exterioribus aliquot iunguntur: quod forte huic opinioni ansam præbuit, vt recte Fallopius monuit, ita, vt existimârint, venas exteriores esse, quæ per illa foramina ad crassæ membranæ sinus ingrediuntur, cum potius sint internæ, quæ egrediuntur, & cum externis copulantur. Hæc de Venis cerebri, nunc de Arterijs.

ⁱ Arteria carotidis vtrinque secundum asperæ arteriæ latus cum vena iugulari internâ ad fauces ascendit, ibique in ramos duos diuiditur; alterum externum, de qua in Faciei historia sermo erit: alterum internum ampliorem, qui in fauces defertur, & posteaquam & linguæ & laryngi furculos largitus est, ad caluariæ basin [B] in duos ramos impares diuiditur.

Arteria iugularis interna & externa Archang.

k Arteria
 tertia Vesalio, quam in
 duos graciles,
 & duos cras-
 sos ramos di-
 uidit. Arteria
 3 Fallop. Plat.
 4. ac Columb.
 vult arterias
 carotides illud
 foramen in-
 gredi, quod
 iugulares ve-
 nas internas
 suscipit, non
 autem ut Ve-
 salius voluit
 cum his venis
 assurgere, &
 in dura ma-
 iris sinum in-
 gredi, neque
 duas arterias
 parere, ut Ve-
 salius cogita-
 uit potius,
 quam visu
 deprehende-
 rit.

Arteria ^k prima [tab. 11. fig. 13. L. fig. 15. CC. tab. 12. fig. 19. P.] quæ paulo minor est ipso trunco, ascendens & integra manens, vbi ad foramen proprium in osse temporum exsculpto peruenit, & per ipsum in caluariæ cavitatem ad ossis cuneiformis sellam peruenit, sub dura adhuc membrana latitans primum vtrinque in crassæ membranæ latus ramum dispergit [tab. 11. fig. 15. D.] dein in brutis animalibus infinitas propagines de se mittens Rete mirabile efformat, de quo Galenus egit, quod ad mentem Galeni se effuisse Vesalius dicit [fig. 14. tab. 11.] at eiusdem tab. fig. 16. prout in brutis, maxime bobus, vitulis & ouibus reperitur, ostendit. In hominibus vero hoc Rete etsi reuera detur, insigne tamen non est, sed respectu brutorum potius vmbra quædam est; & tamen arteria in has propagines non absumitur, sed semper integra remanet [tab. 11. fig. 16. B. C.] mox duram meningem perforat, & modo simplex, modo gemina, [tab. 11. fig. 15. F.] ita tamen, vt statim rursus coeat, fertur: & vbi ramum minorem [X] per cuneiformis ossis foramen secundum, extra caluariam ad oculum [tab. 11. fig. 13. H.] vt vitam ipsi & musculis præbeat, cū neruo optico repens & musculus temporalem transmisit, grandiolem ramum sursum mittit, qui ad latus glandulæ pituitariæ statim in duos ramos secatur, quorum interior cum oppositi lateris arteriâ inferiore vnitur, sicq; vnitæ in arteriolas plurimas absumitur, quæ ad initium neruorum opticorum, per tenuem membranam [tab. 11. fig. 13. e. & tab. 12. fig. 19. R.] & ipsius cerebri substantiam disseminantur. Alter reflexus [tab. 11. fig. 13. ad A. superius. fig. 15. G. & tab. 12. fig. 19. Q.] tenui membranâ inuolutas, in ventriculum priorem cerebri fertur, in varios ramulos diuisus, quorum aliquot cum arteriis illis, quæ à cervicali per basin capitis sub cerebro ad eandem hanc sedem perue-

peruenere, uniuntur: aliquot vero per tenuem meningem, & per cerebri substantiam disiuncti feruntur, qui cum alijs furculis plexum choroidem dictum constituunt, ita vt ex quatuor arterijs hic plexus componatur.

Arteria secunda [*tab. 11. fig. 13. q.*] prædictæ ramus est, qui oblique fertur, & vbi per temporis foramen secundum caluariam subiit, in ramos duos diuiditur, quorum alter extrorsum, alter introrsum fertur: exterior ^l [*tab. 11. fig. 13. f.*] per cuneiformis ossis foramen octauum in narium cavitatem [*tab. 11. fig. 15. E.*] vbi pulsus per sentitur, desinit, & vnum nasi extremo [*tab. 11. fig. 13. t.*] offert. At interior ^m bipartitur [*tab. 11. fig. 13. u. u.*] primo: dein à parte exteriori adhuc gracilem [*tab. 11. fig. 13. r.*] ramum de se mittit, ⁿ qui cum vena secunda [*F*] in crassam membranam eodem modo, & in eundem vsum distribuitur.

Arteria tertia ^o [*tab. 11. fig. 13. l.*] quæ minor est prima cum venæ iugularis interno ramo [*tab. 11. fig. 13. C.*] ad caluariæ posteriora defertur, & vbi musculis ceruicis interiora obsidentibus furculum largita est, [*Φ*] occipitis foramen primum [*tab. 4. fig. 10. b.*] & crassam membranæ ^p sinum subit.

Arteria ^q quarta propago est axillaris intra thoracem adhuc existentis, quæ cervicalis dicitur; hæc sursum delata [*in tab. Arteriarum F.*] per foramina processuum transversorum ceruicis, postquam musculis eius loci furculos tribuit, inter caput & primam ceruicis vertebra[m] crassam membranam, quæ spinalem medullam vestit, in latere perforat, cui postquam propagines tribuit, caluariæ cavitatem per amplissimum ^r ipsius foramen ingreditur: mox sub medulla cum sua coniuge oppositi lateris iungitur; sicq; vni-
æ sub cerebri media basi progrediuntur, donec ad cuneiformis ossis sellam, in qua glandula pituitaria

^l Arteria tertia ramus gracilis secundus Vesalio.

^m Arteria tertia duo grades rami Vesalio.

ⁿ Arteria tertij ramus gracilis primus Vesal.

Arteria tertia Plat.

^o Arteria secunda Vesal.

^p Sic Vesal. Plat. at Fall.

negat arteriam aliquam sinum subire.

^q Arteria prima Vesal. Fall & Plat.

^r Per occipitis ossis foramen tertium, vel secundum cum vena cervicali in sinum duræ matris, in quem iugulares tendunt, ferri voluit Vesal. & Plat. hoc Fallopius negat.

¶ In cerebro
 & eius mem-
 branis vena-
 rum & arte-
 riarum diffi-
 milis est di-
 stributio, quā
 in ceteris cor-
 poris partib.
 ubi vena ar-
 teriam perpe-
 tuo habet co-
 mitem; at in
 cerebro vena-
 rum orificia
 deorsum spe-
 ctant, arte-
 riarum sur-
 sum, quia ve-
 na irrigant
 cerebrū lau-
 dabili succo,
 arteria spiri-
 tum continet,
 qui ob tenui-
 tatem facile
 ascendit: ut
 autem vena
 orificia habe-
 rent deorsum,
 debuerunt
 prius ascende-
 re, non per ex-
 ternā cutim,
 non per ossa,

continetur, peruenit, cum in ramos duos iterum di-
 uiditur, quorum dexter ad sellæ dextrum latus, sic &
 sinister in suo latere vsque ad neruorum secundum
 par repit, vbi vtrinque in furculos infinitos diuisus;
 inter neruorum primum & secundum par dissemi-
 natur, & tenui meningi complicatur, qui plenum
 choroidem postmodum ^c constituunt.

Præter venas autem & arterias, cerebrum priua-
 tum vas habet, sinum crassæ membranæ [tab. 11. fig. 13.
 P.P.] qui sanguiductus dicitur, & arteriæ ^c instar, vi-
 ab arterijs acceptâ, pulsatur, in quem venæ tres [tab. 11.
 fig. 13. C.D.E.] & Arteriæ duæ [I. K.] materiam effun-
 dunt. Hicque sinus pro vario ipsius incesſu in qua-
 tuor sinus diuiditur, qui venis caluariam petentibus
 capaciores & neutiquam venarū modo teretes sunt,
 cum horum cavitās trianguli speciem exprimat, qui
 trib. costis longitudine paribus & instar quartæ par-
 tis circuli incuruati constat. A quibus rami seu du-
 ctus venis similes pullulant, & sanguinem tam vita-
 lem, quam naturalem in cerebri substantiam, quem-
 admodum supra ostensum fuit, distribuunt.

Venarum & Arteriarum vsum nunc subiiciamus.
 Venarum in vtramq; cerebri partem eiusq; medul-
 lam innumerabilibus propaginibus varie diffemi-
 nantur (etsi ex ijs non pauca adeo exiles sunt, ut non
 nisi acute videntibus sint conspicuæ) vsus triplex
 est; primus, ut sanguinem cerebro alimentum & qui-
 dem copiosum, cum moles ipsius ampla sit (quare
 copiosiss. in cerebro sanguis, quod cerebrum si im-
 pense

non per cerebri medullam: ergo per dura meningis duplicationes, Laur. ex Galeni
 9. vs. part. 4. & 9. adm. an. 3. ^c Vesal. accusat Galenum, quod non viderit sinus
 hos pulsare: cum illud manifeste faciant: nam sinus & membrana pulsan-
 t, qui
 arterias frequentes disseminatas per ipsius substantiam habeant; adde quod ha-
 durior membrana, aliquot in locis habet arteriolas infinitas subiectas, per tenuem
 membranam disseminatas, quarum motu agitur. Fall. obseru. subiungit: At nul-
 la arteria ad sinus huius membranæ perueniunt. Ergo.

senſe calefactum, ac ſi inflammatum ſit, oſtendit)
ubiniſtret. Alter vt per eas ſpiritus naturalis ab he-
ate transmittatur ad ſpiritus naturalis cerebro inſi-
i nutrimentum. Tertius, vt cum ſpiritu naturali a-
nima naturalis vegetatiua dicta in cerebrũ feratur:
nam cum in cerebro facultas ſit alimentum attra-
hendi, retinendi, coquendi, expellendi, &c. neceſſe
eſt, animam naturalem in eſſe aut per ſe, aut aliunde
deriuatam. At cum animæ naturalis ſedem hepar eſſe
n conſeſſo ſit, ea per venas in cerebrum deſertur.

Quartũ uſum adhuc addit Archangelus, vt tam per
venas, quam arterias ſemen fœcundum fiat, cũ Hip-
pocrates u ſcripſerit; quibus ſecundũ aures venæ ſe-
tæ ſunt, ſteriles & infœcundos eſſe (at Hippoc. tam
venas, quam arterias, venas appellauit, ij qui in le-
ctione ipſius verſati ſunt, norunt) quia uoluit pluri-
nam genituræ partem à capite iuxta aures in ſpina-
lem medullam procedere: ipſum autem tranſitum,
matrice ſectioni inductâ conſolidari, ſed hac de re
plenius in libro noſtro de partibus ſimilarib. egimus.

Sic Arteriarum Carotidum innumerabiles ſurcu-
i atque propagines per totam cerebri ſubſtantiam
parguntur, quorum uſus conſideratur, vel quatenus
anquam canales per cerebrum feruntur, vel quate-
nus perpetuo mouentur: ſi priori modo, ſic à corde
vitalis ſanguis in cerebrum mittitur, & ſpiritus vita-
lis inſluit ad ſpiritus vitalis cerebro inſiti ſuſtenta-
tionem, vna cum facultate vitali, ſuis virib. inſtructa.

Nn 4

Quate-

ergo à partibus mutatum; & ab aſſimilatione relictum, partium vires ſortitur.
Quare alimentum quod ſuperfluit, cerebro ex nutritione & aſſimilatione, materia
proxima eſt, ex qua generabitur ea ſeminis fœcundi portio, ex qua ipſius fœtus ce-
brum procreabitur. Iam cum alimentum cerebro ſuperfluens ob illarum vena-
rum amputationem in teſtes deſoluere nequeat, qui ſunt infœcundi: Eodem modo
infœcundi efficiuntur homines ſi amputetur vena, quæ à corde vel hepate in te-
ſtes dirigitur, cum trium horum præcipue viſcerum alimentum ſuperfluens, ſemi-
nalis uel materia ſeminis fœcundi ſu:uri cauſa ſit.

u Lib. de Ge-
nit. textu 3. ſic
Archangel.
materia ſemi-
nis proxima
ab omnib. par-
tibus corporis,
præcipue uero
viſcerib. prin-
cipibus exci-
dit: quæ nihil
aliud eſt, quàm
alimentum,
quod ex opti-
ma partium
nutritione ſu-
perfluit; na-
tura enim ali-
mentũ abun-
dare potius,
quàm deſicere
uoluit. Hoc

Quatenus vero perpetuo pulsant, earum usus est, calorem cerebri innatum assiduo ventilare, qui alias extabescens breui extingueretur; dein, ut sanguinē in venis exagitent, ne immotus aquarum stagnantium more facile computrescat. Tum ut sanguinem alimentarium, qui crassior est, è venis per caua spiracula in cerebri substantiam (à qua partim etiam attrahitur) ad illius nutritionem excidere sollicitent.

Partes contenta de Cerebri præstantia, situ, figura, substantia, & temperamento.

CAPVT XI.

De Cerebro egit Galenus toto lib. 8. de vsu part. dein 9. vs. part. 3. 4. 5. 7. & toto lib. 9. adm. anat. At Arist. de cerebro & eius natura tradidit 2. part. an. 7. 1. hist. an. 7. & 16. & quo ordine generetur 2. gen. an. 6. ostendit.

CEREBRI historiam explicaturus, quæ ad ipsum spectant, & sub sensum cadunt, ad classes quatuor reducere potest. Alia enim sunt circa cerebrū, ut meninges, ossa capitis, & quæ ossa tegunt, de quibus iam dictum fuit; alia in cerebro, ut substantia, figura, magnitudo, variæq; partes, quæ pro varia forma nomen obtinere; de quibus hoc & subsequen-
 a **Cerebrum** omnia sanguine prædita habent; ex cæteris nullum fere, nisi per proportionem, ut palpus: parum enim caloris omne id genus obtinet propter sanguinis priuationem. Arist. 2. part. an. 7. Omnib. in ijs est, qui
 vt palypus: parum enim caloris omne id genus obtinet propter sanguinis priuationem. Arist. 2. part. an. 7. Omnib. in ijs est, qui
 tibus capitibus acturi sumus, alia ad cerebrum, venæ & arteriæ, de quibus præcedenti capite dictum fuit; alia denique à cerebro, cuiusmodi sunt spinalis medulla. Nerui, & spiritus animalis, sed ad rem.

^a Cerebrum, ^b quod apud veteres Græcos nomen proprium non habuit, à situ ἐγκεφαλος, ^c quod ἐν τῇ κεφαλῇ ^d contineatur, nomen obtinuit. Huic inter partes
 sanguinem obtinent, & ob eam rem sanguinea appellantur, atq; etiam, qua mollia nuncupantur. 1. hist. 16. b De eius generatione vide Hipp. lib. de carnib. Quo vero ordine generetur, & quomodo caput in principio prægrande propter cerebrum, oculos vero grandes propter humorem in ipsis contentum, vide Arist. 2. gen. animal. 6. c Hipp. Arist. & Gal. d Gal. 8. vs. part. 4. adde Romanis κερεβρον dici, quo nomine ipsa rei substantia significetur.

partes corporis principatus, situ, figurâ, propugnaculis & vſu ipsius id docentibus, debetur. Situs quidem, cum in altissima corporis parte, quasi in munitissima arce, ne facile iniurijs afficiatur, sedem habeat. Figura, quæ rotunda & nobilissima omnium existit: diuinissimo enim membro figura perfectissima debetur. Propugnacula plurima: capilli, cutis crassissima, pinguedo, carnea membrana, pericranium, periostium, caluaria duplex, & duæ meninges, quibus vndiq; ab iniurijs defenditur, ita vt non nisi ab ingēti violentia lædi possit, quibus aut saltem similibus Natura neq; cor, neque aliam partem muniuit. Ratione vſus, cum enim Mens ^c humana nulli corporeo instrumento alligata sit, res extrinsecas capere nequit, nisi instrumento aliquo corporeo intercedente, in quod species rerū materialium transmitti possint; in quo postea ab intellectu apprehendantur & contemplentur: quemadmodum qui intellectica conclusus est, ea quæ foris sunt, vel fiunt, videre non potest, nisi intercedente corpore aliquo diaphano, quo imagines exteriorū primo recipiantur, & mox intus latenti repræsententur. Tale autem instrumentum est commune sensorium dictum, nihil enim est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu. Primum autem sensorium ex Platonis & Galeni sententia Cerebrum est, (Aristoteli vero cor) & recte; cum illud primum sit sensorium ipsi & Aristoteli & Galeno, quod neruorum principium est; à cerebro autem neruos oriri, Anatome docet; hinc patet Cerebrum animæ sentientis sedem esse, siquidem neruo in aliquam partem directo, eoque penitus obstructo, pars ea prruatur motu & sensu, ideoq; animâ sentiente: si principium medullæ spinalis penitus obstruatur, omnes partes capiti subiectæ motum & sensum amittunt, capite tamen motu & sensu

Varolus.

illustrato persistente; si vero quartus ventriculus obstruatur, & caput & reliquum corpus motu sensuque, & per consequens, animâ sentiente spoliatur. Quis ergo negabit Cerebrum membrum præstantissimum esse, cum animalium facultatum, imaginationis, ratiocinationis memoriæ (hinc ὁργανον τῆς φρονέουσας ^f Aphrodisæo) sedes sit, sensus motusque voluntarij principium existat, & ab eo sensus instrumenta, visus, auditus, olfactus gustusque, imo & loquelæ dependeant, ita vt non immerito Plato diuinissimum membrum appellârit. Nam quod in Mundo Cælum, id in homine cerebrum est, & illud intelligentiæ, hoc vero rationis sedes est. Hinc Homero ἔργον, quod, quemadmodum ab influxu cœlesti omnia inferiora mouentur, ita & partes corporis ab influxu è cerebro moucantur & sentiant. Quare cerebrum partem principem ^g statuimus, non secus ac Cor, non quod cum Aristotele Cor omnibus partibus nobilius dicamus, nec quod ^h cum alijs Cerebrum principem & regem omnium statuamus: sed quemadmodum Cordis propter vitam maior est necessitas, ita Cerebri maior est dignitas.

^g Principem dicit Galenus. ^h Principatū deberi, ne mini dubiū esse debet, quicquid dicat Aristoteles & philosophi, qui cordi hanc utilitatem adscribunt. Addit aut quin- tam rationem ex generatione desumptā, iecur, ait, medio & ope ve-

Dicitur communiter ἐγκεφαλός: alijs ⁱ μυελὸς ἐγκεφαλίτης, ^k medulla capitis, ad differentiam medullæ spinalis, quæ ραχίτης dicitur, & etiam ossium medullæ, à qua plurimum discrepat, cum nec igne liquefieri nec in edicæ tempore absumi possit, nec in calua contineatur, vt eam nutriat: quare Galenus ^k ossium medullam à cerebri medulla distinxit, quoc illa

na umbilicalis gigni; cur vero medio umbilicalis arteria, hacq; à vasis uteri; a nervos, qui sensus motusq; instrumenta sunt, à fœtus cerebro ori: Columb. Cerebrum subtilissimum visus, Plat. ⁱ Galen. 1. de mot. musc. ^k Gal 8. vs. part. 4. a si (subiungit) medulla esset, additamento indigeret, quia quadam spinalis medulla est, & in singulis ossib. alia, qua tamen non sunt sensus omnis ac motus principia quare multi μυελὸν ἐγκεφαλίτην, id est, cerebralem, quemadmodum & ραχίτην, spinalem: alij μυελὸν ἐγκεφαλικὴν nominant.

illa fluxilis sit & pinguedini similis, nec tunicis tegatur, nec venis & arterijs intertexta sit, nec vllam cum musculis & neruis cōmunionem habeat; contra vero cerebri medulla. Alij λευκὸν μυελὸν¹ albam medullam nominarunt, D. Platonem imitati, qui cerebri substantiam significaturus, μυελὸν¹ nominauit.

Situm est in capite, tanquam domicilio, propter plurima propugnacula, tutissimo, & tanquam loco editissimo, cum Cerebrum animæ sensitivæ sedes sit & domicilium, & quemadmodum vniuersitatis Patrens DEVS ter Opt. Maximus in Cœlo loco excelsummo confedit; ita Cerebrum animæ nostræ arcem summo corpore collocari debuit: partim propter oculos & aures, ijs enim cerebrum proxime propter neruos ipsorum molles, quos breues esse conueniebat, accumbere debuit; nam cum hi speculatorum & vigilum munere defungi debuerint, altissimum locum in corpore tanquam speculam postulabant.

Figura caluæ^m formam refert, non quod ab ea conformetur,ⁿ aliàs caluam prius conformari oportuisset; superius quidem cavitatis caluariæ formam exprimit, & in recte formato rotūdum & globosum in oblongum leuiter protensum propter ventriculos in eo exsculptos: anterius angustius, posterius verolatius, & vtrinq; ad latera leuiter depresso [t. 6. fig. 2. hoc ostendit] in fatuis haud dubie alias formas obtinebit. At in basi cum cranium varios sinus maxime ad os sphenoides [t. 12. f. 19. inter A. & B.] posterius & ossis temporum processum interiorem [t. 13. f. 20. inter H. N.] obtineat, inæquale est, & varium; potissimum vero anterius ad olfactus instrumenta extuberat, & veluti tubera duo [t. 12. f. 19. C C.] nonnullis^o mammillares processus vocata producit. At quâ parte Cerebello insidet, planum est, magisque æquale [t. 12. f. 18. A A. B B.]

¹ Apollodorus opinatur nemini veterū admissum cerebri nomen in libris, proinde Sophocles in Trachinijs λευκὸν μυελὸν dicere maluisse.

^m Galen. i. adm. an. ex figura ossium, partes figurari quibus ossa aliqua sunt destinata, Archang. n Qui à cranium cerebrum conformari aiunt, non aduertunt, cerebrum à dura meninge se iunctum esse, & quod cranium ipsa meningis continet, non autem adheret. s. v. f. part. 12. ^o Plat.

Magni-

P Homo in
ter animalia
plurimū ha
bet, *Arist. 2.*
part. anim. 7.
addit, scilicet
proportione
sui corporis,
& inter o-
mnes mares
plus quā
fœmina: *hist.*
16. plurimum
proportione
magnitudi-
nis, & humi-
dissimū. *idem*
2. gen. an. 6.
q Archang.

† Occiput ina-
ne esse dixit
Aristoteles 1.
hist. 7. pars
posterior ca-
pitis inanis &
caua omnibus
est, *1. hist. 16.*
quare Co-
lumbus Ari-
stotelem re-
prehendit, cū
ibi & cerebrū
& cerebel-
lum sit. *Ar-*

changelus excusat Aristotelem, inquit, ipsum diuississe in cerebrum & cerebel-
lum, statuisse cerebellum occupare occiput: quod si ita sit, tum posteriorem partem
carere cerebro, cum duo corpora in eodem loco eodem tempore esse nequeant. Qua-
re non esse absurdum, dicere, partem posteriorem capitis esse plenam cerebello, &
eandem carere cerebro. Et Hipp. 2. de morb. textus 8. scripsisse, cerebrum ad anterio-
rem capitis partem magis situm esse. † Libras quinque, quandoq; quinque &
semissem pendebat, Archang. † *Arist. 2. gen. anim. 6.*

Magnitudo. Homo cæterorū animalium P cōpa-
ratione, cerebri plurimū habet, ita, vt vnus hominis
cerebrum duorū boum quātitate superet, primo ob
animalium functionum varietatē & perfectionē cæ-
teris animantibus denegatam; nam cum rationis in-
strumentum esse debuerit, vt magnā spirituum co-
piam & elaboraret, & caperet, necesse fuit: at multus
spiritus non nisi à copioso sanguine generari potest;
copiosus autem sanguis in paruo corpore contine-
ri non potest. Dein, ne spiritus animales ob insignem
tenuitatem emarcescant, sed per proprios ductus in
omne corpus ducantur, magna, humida densa ac
veluti glutinosa cerebri moles requirebatur. Verum
illius magnitudo q in longitudine, latitudine & alti-
tudine tanta est, quanta est caluæ capacitas; ita vt in
longitudine q palmum æquet, in latitudine vero &
altitudine minor existit. Ipsam vero scutellam seu ca-
uitatem † antè, retro, in occipitio & à lateribus cum
suis membranis, glandulâ pituitariâ & vasis ascen-
dentibus implet [*tab. 6. fig. 1. & 2. tab. 7. fig. 3. & 4.*] spa-
tio ad ipsius naturalem motum, diastolen scilicet &
systolen tantum relicto. Tantæ molis est, vt aliquan-
do in publica Anatome ponderanti, libras quatuor
& † aliquando quinque æquare apparuerit; maio-
rum enim hominum cerebrum grandius & ponde-
rosius est, quamuis & pueri præ pondere cerebri,
quod in ipsis humidissimum est, longo tempore †
caput sustinere nequeant, quibus etiam caput præ-
grande est.

Conne-

Connectitur connexione communi venarum & arteriarum & nervorum cum alijs partibus, quamvis & spinali medullæ & nervis, cum hæc ab eo producantur, copuletur; quare minimâ corporis parte docente, cerebrum per nervos eius condolebit; reliquis vero partibus connecti opus non habuit, cum caluâ undiq; cinctum & obuallatum sit.

Substantia ipsius ex gemino principio ^u ex quo ^u *Principium* exsurgit, altero spermatico, altero sanguineo materio, ex quibus peculiare carnis genus generatur, cui in vniuerso corpore similis non reperitur, ita vt recte philosophus ^x sui generis esse dixerit: talis enim est, ^y qualis ad ingenitas cerebri functiones edendas requirebatur, substantia nimirum cum sua essentia forma peculiaris & propria; hac enim, principes animæ sentientis facultates, nempe discernendi, imaginandi, ratiocinandi, memorandi tanquam proprio instrumento, vtuntur, & ab hoc reliquorû sensuum instrumenta dependent. Alba est, mollis, & ingni humiditate perfusa. Alba ratione materiæ spermaticæ, cum ex purissima seminis & spirituum portione maiori fabricata sit, & ratione finis, vt spiritus animalis sint limpidissimi; nõ tamen tota ipsius substantia alba est: ^x quicquid enim anfractibus proximorum [tab. 7. fig. 4. tab. 8. fig. 5. E. F.] subcineritium est, & ali colore tinctum credunt, quod innumerabiles enæ per eam diffeminantur. Reliquum vero in interna substantia candidum prorsus existit [tab. 7. fig. 4. H. tab. 8. fig. 5. G. H. tab. 9. fig. 7. & 8. E. E.] At exterius in cerebrum, quam cerebellum ^y tenui meninge obuolutum, subcinericeum potius quam candidum est. Mollis ^a est (in puerulis, quibus ratio adhuc im-

perfe-
^a Gal. 8. 25.

et 6. mollius est cerebello, vt quod principium mollium nervorum ad sensus instrumenta pertinentium esset futurum: durius posterius, principium & ipsum nervi duris in corpus vniuersum diffundendis futurum.

à quo cerebrum nullum habet Archang. Praxagoras & Philotimus existimant, cerebrum superabundantiam quandam seu spinalis medullæ propaginem esse, ideoque longis flexibus atq; inuolutis constare. Galen. 8. 25. part. 12. x 2. part. animal. 7. y Vesal.

z Cineritium seu in albo liuescens, Archang pallefcit, & subcineritium est, Plat.

perfecta est, fere fluida) cum sensus omnes^a recipiat, omnesque imaginationes & intellectus complectatur; nisi enim & ab hoc & ad hoc^a alteratio, quæ in vnoquoq; fit sensorio, peruenerit, nihil amplius animal sentiet, vt Apoplecticorum exempla docent, quare cum sentire sit pati, talis substantia requirebatur, quæ alienis impressionibus foret idonea; non tamen eâ mollitie præditum esse debebat, quâ statim id, quod impressum est, aboleretur, quemadmodum in aqua & alijs fluidis corporibus contingit, sed quæ cum mollitie aliquam consistentiam haberet; quare ita cerebri mixtionem intimam sequitur, vt actione ignis minime fundatur, sicut seuum, cera, & alia quæ calore liquefunt. Neruis^a quorû principium ipsius Medulla erat futura, simillimum est cerebrum, sed mollius. Glandulæ Hippoc. assimilauit, ^b quia non secus ac glandulæ album sit & friabile, sed etiam ijsdem commodis, quibus glandulæ sunt præditæ caput ^b afficiat, humiditatem ad extremitates per fluxiones foras emittendo; capiti enim cucurbitulæ instar insidet, & partium inferiorû exhalationes haurit, quæ per cranei futuras euaporant.

Temperamentum^c ipsius frigidum & humidum ex ipsius substantia molli & humida cognoscitur, quare sedem frigidi & glutinosi Hippocrates^d dixit, tale autem requirebatur, ne spiritus animales omnium tenuissimi cito euanescent, neve pars Rationi dicata accendatur; quemadmodum Phreneticorum motus, ob calidissimum cerebrum furibundos videmus; nec etiam somnus, qui animalium facultatum quies est, placidus foret.

b ἵκελον ἀ-
δενι ἐγκέφα-
λος λευκός ὅς
ἐστι ψαφάρδος
lib. de Gland-
ulis.

c Motus per-
petuus solus
potest cere-
brum calefa-
cere, &c. vt
interim emit-
tam multitu-
dinem ac ma-
gnitudinem
venarum &
arteriarum,
qua in ipso
sunt, &c. 8.
vsu part. 2.

d De carnib.
μικτόπολον ὅς
ἐστι ψυχρὸς καὶ τῷ
κρύει ὁμοῖος.

De Cerebri substantia eiusq; partibus.

CAPVT XII.

QUEMADMODVM Cerebrum facultatū animalium principium est, sic etiam varias & diuersas partes, varioque modo efformatas obtinuit, quas Methodo Anatomicā perlustrabimus. At Cerebri nomine intelligimus, quicquid in caluariæ cauitate vtraq; meninge circumdatum continetur.

Diuiditur autem in tres partes, primum quidem à crassa meninge quadruplicata, in partem anteriorem^a & posteriorem. Anterior cum maior sit & præcipua, siquidem in ea animales spiritus præcipue elaborantur, totius nomen retinuit^b & proprie cerebri^c ἐγκέφαλος dicitur: at posterior, quæ minor est, cerebellum^d παρεγκεφαλῆς nominatur. Dein Cerebri^e mediante crassâ meninge duplicatâ, quæ fallacem messoriam refert in elatiore eius parte per totam longitudinem in partes duas^d æquales, dextram & sinistram [tab. 6. fig. 2. ab A. ad A. tab. 7. fig. 3. ab N. ad K.] usque ad humiliorem sedem ipsum callosum corpus [tab. 7. fig. 3. ad L. L.] instar alicuius septi diuiditur; ideo non^e semper eadem capitis pars dolet, sed sigillatim, interdum vero totum. Non autem penitus^f diuisum est, ita vt non aliqua parte sibi continuum sit: siquidem partes duæ cerebri, beneficio corporis callosi, cerebellum vero, licet cerebro non vniatur, spinæ medullæ tamen initio duobus locis continuatur, usque; medulla totidem principiis cerebro iungitur, cecet in varias partes, situ, magnitudine, figurâ, substantiâ & vsu inter se differentes, diuidatur. Diuisio is vsus est, & quo sinus crassæ meningis, vnde vasa

a Bipartitum omnium cerebri est, posterumque iungitur quod παρεγκεφαλῆς appellatur. Arist. 1. hist. 16.

b Astrophilus anteriorē totius nomine propter magnitudinem,

c Anteriorē parencephalida appellare consuevit. 8 vs part. 11. ἐγκέφαλον ὃν ἐνίοι παρ' ἑαυτὸν ἐγκέφαλον; anterior cerebri. 9. adm. Anat. 2.

d 8 vs part. 11. ἐγκέφαλον ὃν ἐνίοι παρ' ἑαυτὸν ἐγκέφαλον; anterior cerebri. 9. adm. Anat. 2.

e Capitis priorem situm obtinet, non modo in homine, verum etiam in cæteris animalibus, quibus ea pars data est. Arist. 1. hist. 16.

exigua cerebrum syn-

biti subditū 1 hist. 7. d 9. adm. an. 2. c Hipp. de sacro morbo. f Quidam soniauit à summo ad imum diuisum esse, Laur. g In duas partes dissectum potiss. trititionis cerebri gratia, quo tenuis membrana cum vasis se insinuet: sine hac. n. sectione & profundissimis inuolutionibus enutrirī non potuisset. Valsal. Archang.

TABVLA VI. Fig. 1. Cerebrum crassâ meninge obtectum exhibet. Fig. II. crassâ meninge detectum, tenui obuolutum, cum crassâ meningis sinu tertio aperto proponit.

LIB. III.

FIG. I.

TAB. VI.



II.



*ad faciliorem
motum, leui-
tatem & nu-
tritionem in-
terioris mè-
dulla factum,
Laurent.*

*h Variam cõ-
positionẽ ap-
pellat Gal 8.
vñ part. 13. in-
uolutiones, si-
nuiosi imple-
xus ac gyri,
qui nubibus
quasi rudēs pi-
etorum disci-
puli delineare
solent, etiam
conferri pos-
sunt. Vesal.
spira, reuolu-
tiones seu cir-
culi, qui in se-
ipsum non re-
currunt; cere-
bri sulci cir-
culares, orbi-
culares seu
fissula in or-
bes fere acta,
Archang.
i Veteres pul-
chre compa-
rarunt. Vesal.
Columb. Plat.
Laurent.
k Et Laur.*

exigua prodeunt, quæ per anfractus perreptant, tuto ferantur, quo alimentum in cerebri substantiam dispergatur. Cum enim cerebri quantitas magna sit, per quam venæ capillorum modo prætenues ad suam nutritionem disseminari oportebat, si venæ exiles à parte posteriore in priorem, à parte dextra in sinistram, vel contrà deduci debuissent, exiles illæ venæ & arteriæ in molli substantia ob viæ longitudinem ruptionis periculo expositæ fuissent: ne vero periclitentur, cerebrum in tres partes diuisum fuit, inter quas diuisiones crassæ meningis sinus quatuor feruntur; in quos venæ iugulares internæ & arteriæ carotidis à basi occipitis ascendentes sanguinem effundunt, & vtrinque à sinibus, rami in cerebellum & cerebrum emittuntur, potissimum à sinu tertio in dextram sinistramque partem distribuuntur. Dein etiam cum corpora mollia, vbi magna sunt, facile in se ipsa concidunt, idcirco cerebrum in duas partes diuisum, quo melius consistat & instrumenta illi superponenda non complicentur.

Exterior eius superficies vniuersa, quæ sub cineritia potius, quam candida, varios & complures^h anfractus seu circumuolutiones orbiculares sulcosque circulares leuiter excauatos habet, qui tenuium intestinorumⁱ anfractus omnino ablato æmulatur [t. f. 2. tab. 7. f. 3. CCC.] horumque; alij profundiores magis sunt, alij minus cerebri substantiam [t. 7. f. 4. DD.] penetrant (vnde partem hanc cerebri *νευροειδὴν*^k varcosam nominant) quos tenuis meninx inuestit (ideam eam ablatam rectius conspiciuntur) non solum extrinsecus ambiendo & continendo, sed etiam profunditatem cerebri plurimis in locis penetrando: vnde in ambitu cerebri anfractus hi causantur; quos ex necessitate, non aliquo fine productos esse, sunt qui bi persuadeant. Horum usum statuimus cum G.

leno

leno, ^l vt vasa, cum tenui meninge, quæ cerebro vi-
tam & nutrimentum deferunt, ^m tuto in hos anfra-
ctus se insinuent, quo pericula, in cerebri motibus
assiduus effugiant; nam cum tenuis meninx simplex
sit, vnica & quidem tenuissima, ita vt inter geminas
illius membranas excurrere non possint, ideo anfra-
ctus hi fuerunt excauati: Quod si cerebri superfi-
cies leuis fuisset, vasa quæ per hos anfractus ferun-
tur, si per summam cerebri circumferentiam de-
currerent, rupturæ obnoxia fuissent, præsertim in
diastole & quidem in plenilunio, in quo præ humi-
litate ita cerebrum turgescit, vt totam caluariam
impleant; præterea non suffecissent vasa, si per ipsius
tantum superficiem, cum vastissima sit cerebri mo-
es, excurrissent.

Alter vsus est ^o ad spirituum & sanguinis in illis
vasis contentorum recreationem: nisi enim anfra-
ctus hi adessent cerebri substantiæ, præsertim in ple-
nilunio, à caluaria ita arcta circumdatæ, motus im-
pediretur, & compressio spiritu suffocatio sequere-
tur, calorque quia ventilari non posset, extinguere-
tur. Erasistratus intellectus gratia p conditos vole-
bat, quod falsum & ridiculum q cum in asinorum &
aliorum brutorum cerebris quoq; reperiantur, quæ
amen intelligentiâ carere constat: & intellectus
non compositionis varietatem, sed corporis, quod
cogitat atq; intelligit bonam temperiem sequatur. ^f

Oo 2

Inter- o Archang.

Alter vsus, meminit & Laurent. p Hanc in hominibus magis perplexum, quam
in alijs animalibus dixit Erasistratus, propterea, quod hæ mente ac rationatione
cetera animantia superent: non videtur recte sentire; cum ipsi etiam asini perple-
xum cerebrum habeant; quos oportebat, si morû spectes ruditatem ac stuporem ce-
bri habere simplex. omnino Gal. 8. vs. part. 13. Vesal. ait Galen. existimasse satis
se, si res intelligentia non præesse indicarit, sed cur sint facti, non referre; quare ad
cerebri substantia enutritionem tantum procreatos esse, quo vasa ferantur, q Ar-
hang. & Laurent. quoq; vident. r 8. vs. part. 13. i Col. ob leuitatem & ob cere-
ri motum promptiorem: meminit & Laurent. Resp. Archang. quasi Natura non
potuisset ex leuiori materia illud condere, aut paulo minus, ideoq; leuius, nã & cor

Archang.
& Laurent.
m Vesic san-
guis venarum
& arteriarum,
cum cerebri
vibus non-
dum est ac-
commodus,
prius in pro-
prijs vasis pe-
nitius cerebri
substantiam
subiens, illic
innatâ vi e-
laboretur, &
ab excremen-
tis, qua in his
anfractibus
quoque colli-
guntur, repur-
getur: quo
tandem sibi
assimilato nu-
tritur, & ad
spiritus ani-
malis procrea-
tionem utra-
tur: Plat.
n Archang.
at non Lau-
rent. nec Ca-
brollo.

spiritus caret. & tamen motibus hisce duobus promptis sine cietur.

Alijs, ut mollem cerebri substantiam sustineat, & aequaliter suffulciat, cuius Vesal. meminit & Laur.

t Archang. in cerebrum & medullam separat. Cerebrum dicit, totum illud corpus cinereum, seu in albo lineatens, quod medulla proxime est circumscriptum

u Cerebrum medullam esse & originem medulla compluribus placuit auctoribus. argumento, quod dorsi medullam iun-

Interna vero superficies varias habet partes, & impressiones ob eius usus insignes, ipsiusq; substantiæ præcedenti capite explicata in ^t corticem & Medullam diuidi potest. Cortex, corpus est [tab. 7. fig. 4. tab. 8. fig. 5. E. F.] cineritium medullam proxime ambiens. Medulla ^t vero [tab. 7. fig. 4. G. H. tab. 8. fig. 5. G. H. tab. 9. fig. 7. & 8. E. E.] corpus illud candidum. quod intra corpus cineritium est reconditum & solidius est: Quare cortex ^t à medulla differt colore, quod illud cineritium, hoc album sit: dein consistentiâ, quod illud mollius, medulla paulo durior, firmior & compactior; tum situ, quod medulla in medio sit; cortex vero medullæ tantum circumfusa, lineis quibusdam obliquis varijs varias figuras referentibus, cineritium à candido distinguentibus.

Quare, ^t Medulla corpus est medium ac candidum, cuius duæ sunt partes, vna quæ in caluaria continetur, altera quæ caluariâ excidit, & oblongata, per occipitij magnum foramen in spinam dorsi definit. Possunt quoq; hæc duo ^t corpora, cortex & medulla actu separari, si detur caput hominis sani, repente interfecti & dextre & mox disseccetur; aliàs humiditate summâ vtrâq; perfunduntur, summeq; mollescunt, sicuti processibus mammillaribus contingit, qui in recetioribus capitibus facile ad medullam cerebri secernuntur, in vetustis vero minime. Iam vero si circa ipsius medium cerebrum disseces, vasa exigua ^x & iam ad ventriculos descendentes deferri conspi-

etiam cernerent cum cerebro: sed res contra se habet, cerebrum enim omnium partium frigidissimum est cum medulla calida suâ naturâ sit. &c. illud & tactu percipi & ratione intelligi potest, quod omnium, maxime humorum corporis sanguine caret; quippe quod nihil sanguinis habeat, squallorq; o situm sit, atq; humidum; nec vero excrementum est, nec inter partes continuas est numerandum; sed sui generis est, & quidem ratione optima naturam eiusmodi sortitum est. Arist. 2. part. anim. 7. x Vena multa ac tennes ex vniuerso corpore ad ipsum feruntur: duæ vero crassæ, una à iecore, altera à liene, &c. Hippoc. de sacro morbo, ut cerebrum modice

conspicies, & si substantia medullaris comprimatur, sanguinis guttæ copiosæ apparebunt.

Cerebro vtrinque; mutuo connexu leuiter y digitis diuiso, vsq; ad venam x in longum y inibi porrectū, quæ notandæ y magnitudinis est & à qua vtrinque z rami in cerebrum disperguntur, corpus se offert exacte in cerebri medio locatum [tab. 7. fig. 3. L. M.] quod non nihil a gibbosum [tab. 7. fig. 3. L.] & ventriculis b intratum, longum, arcum, læue & æquale, quod superiore candidior est, cum ex cerebri medulla siue interiore substantiâ constituitur, quâ du-rior est, calliq; y naturam quodammodo refert, hinc propter densitatem & colorem, corpus callosum τὸ καλόν y σωμα c aut τὸ ἄλλοειδές appellatur; estq; pars communis cum cerebro; quare ad eius latera vtrinque secundum ipsius longitudinem singuli d sinus [tab. 7. fig. 3. ad M.] in cerebri medulla lineæ profundioris instar & veluti canales insculpti, qui ad pituitæ ex cerebri partibus superioribus defluxū facere creduntur, e quam excipientes per callosi corporis superficiem gibbosam in anteriora profluere f sinunt. At callosi corporis vsus, g parte elatiore cerebrū illi in- idens sustinere, vt huius interuentu vtraq; h pars ce-

potiatur calo-
re. Vena ad
membranam
cerebri deue-
niunt, ex v-
trique vena,
maior, dico,
& ea, quæ
aorta voca-
tur; & ne co-
lor nimis of-
fendat, non
paucæ, sed fre-
quentes ac te-
nues vena am-
biūt, nec san-
guis copiosus,
ac crassus, sed
tenuis synce-
rusq; eodem
subit. Arist. 2.
part. an. 7. ce-
brum omni-
bus priuatum
sanguine est,
nec venam
intra se ul-
lam conti-
net; sed cir-

Oo 3

rebri

a ipsum meninx est venosa. Aristotel. 1. hist. 16. cerebri cerebelliq; substantia nun-
quam venis implicata inuenitur, etiamsi interdū rubra & veluti sanguinea pun-
ta in illorum qui phrenetide obierunt, vel suspendio perierunt, cerebri substantia
obseruaturus sis: verum eiusmodi puncta nullam vena imaginem exprimunt. Ve-
al. cerebrum ex nullo vase alimentum sumit; quam quod tenui membranā sufful-
a ipsi circumdantur Idem. y Galen. 9 adm an 3. 2 9. adm. anat. 2. a & Ve-
al in medio fere. Lauren. b Supra tertium ventriculum Columb. in corpore cal-
oso duo priores perf. ssi Archang. callosum corpus geminis ventriculis dextro & si-
istro excavatum apparet, Laur. c Nonnulli parum recte intelligētes, quod septo
superpositum est & addidēs appellari putant. 9. adm. an 4 idem monet Vesal lit.
cap. 5. d Vesal. & Plat. e Vesal humor à cerebri anfractibus undiq; defluens
d anteriora versus pituita meatum derivatur, Plat. f Venis & arteriis nulli,
na sensu dignosci queant, ut nec membranā tenui attexta, Laur. g Qui & for-
ica, ne cerebri molis ventriculum tertium obruat, Colu. h Vesal. & Laurent.


TABVLA VII. Fig. 3. Cerebrum vtraque meninge detectum, processum falcem referentem & callosum corpus exhibet. Fig. 4. Cerebrum ablatâ vtrunque portione, quo ipsius medulla & ventriculi conspiciantur, proponit.

LIB. III.
FIG. III.

TAB. VII.



FIG. IV.



rebrī coniungatur & septum [*tab. 8. fig. 5. RR. subleuat*
TY. XX. & Y. X. attollunt S. T. V. ne AAA. in fig. 6. premat H. I.
6. figuræ aut N. tab. 9. fig. 7. & 8.] duorū ventriculorum
 producat: quod etiam subleuat, & fornicem attollit,
 ne dilabens ventriculū tertium comprimat. Hic
 tumorem scirrhusum anno 1582. in illustri Barone
 Bonacurtio obseruauimus, cuius caput, postquam
 longo tempore attonitus fuisset, post mortem ape-
 ruimus.

Cerebri substantiā vsq; ad corpus callosum vtrin-
 quē auxilio nouaculæ ablatā, antequam corpus cal-
 losum subleuetur, septum ventriculorum priorum
 considerandum venit.

Septum [*t. 8. fig. 5. ad RRR. in posteriora reflexum.]* hoc
 parte supernā calloso corpori connascitur & vnitur
 (quare interiorem & inferiorem callosi superficiem
 alij ⁱ vocant) inferne vero, fornicis regioni, sicque
 inter callosum corpus & fornicem, medium quod
 priusquam extēdatur ^k laxum est & rugosum, & nec
 relucere, nec continuitatem ^k suam ostendere po-
 test, & attractum ^k eatenus vt tantum sit extensum,
 cum tenue sit, si in clara luce sectionem ^l admini-
 stras, aut in altero ⁱ tantum latere candelam admo-
 ueas, splendor ipsius ⁱ tanquam per vitrum, aut spe-
 cularem ^m lapidem in medio ipsius pellucebit; qua-
 re speculum ⁿ quibusdam, alijs septum lucidum di-
 citur: at à Galeno ^o ab usu *σφαγμα των ποσθίων*
νοσθίων, septum anteriorum ventriculorum nomina-
 tur, cum huius opē ventriculi lateribus interioribus
 distinguantur; quare non nisi vtroque ventriculo
 aperto occurrit; quod facile si ^k vehementius exten-
 datur, cum extreme tenerum sit & subtile, abrum-
 pitur.

ⁱ Vesal.

^k Galen. 9.
 adm. an. 3.

^l Gal. l. c. mo-
 dum admi-
 nistrandi do-
 cet.

^m Splendor
 ipsius pelluci-
 dus & simili-
 ter lapidib. spe-
 cularib. quos
 in tenuia se-
 cantes fene-
 stris imponūt,
 9 adm. an. 3.
 splendet tan-
 quam per vi-
 trum aut spe-

cularem lapidem; at madida hostia, quam Missa adhibere solent cōmodius, quam
 duris lapidibus cōparari potest, Vesal. n Cōl corpus specularē, & speculum, Arch
 septum lucidum, speculum lucidum, lap. specularis, Laur. o 9 adm. an. 1. 3. & 4

pitur, attamen nisi subleuetur, manifesto videre non
 licet. Hoc eiusdem est p cum cerebro substantiæ, te-
 nuiore tamen, & quoad subtilitatem, veluti mem-
 branea cerebri portiuncula, ita vt aliqui nihil aliud,
 quam tenuem meningem hoc loco duplicē esse di-
 xerint : & licet tenuis sit, simplex i tamen non est, &
 in medio tuberculum i quoddam instar lineæ [tab.8.
 fig.5.T.] obtinet, quod deorsum prominens sensim
 extenuatur, & ventriculorum septum efficitur [tab.8.
 fig.5.inferior septi pars XX. superior T. notatur.] His sub-
 stantiæ ad substantiæ plus minus medietatem, extube-
 rantia quatuor occurrunt; duæ quidem parte ante-
 riore, circa quas q ventriculi siti sunt; duæ parte po-
 steriore Fornicem constituentes.

p Galen. 9.
 adm. anat. 3.
 Vesal. at Col.
 & Archang.
 nil aliud, quā
 tenuis meninx
 hoc loco du-
 plex: Verum
 Laur. tenuis-
 sima cerebri
 portiuncula.
 q Habet in
 medio ut plu-
 rimū in omni-
 bus $\kappa\omicron\iota\lambda\omicron\nu\tau\iota$
 $\mu\iota\chi\rho\nu$, cauū
 quoddā exi-
 guum. Arist.
 1. hist. 16.

De ventriculis Cerebri Fornice, plexu choroide.

CAPVT XIII.

De Ventriculis egit Galen. 8. vs. part. 10. 11. 12. & 9. adm.
 anat. 4. libel. de diff. Neruorum. 2. At de Fornice 8. vs.
 part. 11. 9. adm. anat. 4. sic de plexu choroide 9. admin.
 anatom. 3.

ET si cavitates, quæ in cerebro habetur, continua
 sit, quia tamen pro ratione formæ cerebri & vsu
 varie formata sit, ita, vt alia pars magis sit dilatata &
 ampla, alia magis angustata, idcirco in certa loca A-
 natomici diuisere, & ampliora ventriculos, angu-
 stiora vero meatus appellarent.

Ventriculos seu cavitates, sinusve $\kappa\omicron\iota\lambda\omicron\iota\varsigma$ Galeno
 licios, veteres & a recentiorum plerique b Herophi-
 ū initati quatuor recensuerunt; in cerebro quidem

a Galenus.
 b Archang.
 Plat. Laur. at
 Arantio sex:

Oo 5

tres,

Ardo duo, ratione communis ductus, qui tenui meninge separantur, duo esse vi-
 dentur: ratione magnitudinis, figura & situs videntur quatuor; ratione duarum
 cavitatum quæ sub prioribus sunt, sex statui possunt. Archangel. ut Valuerda tres
 lum priores agnoscat, quartum ventriculum esse negat.

TABVLA VIII. Fig. 5. *Ventriculos, callosum corpus à cerebro separatum, reflexum & à septo diuulsum cum foramine exhibet.* Fig. 6. *fornicem sursum retractum, quo vasa subiecta conspiciantur, cum ventriculis proponit.*

LIB. III.
FIG.

TAB. VIII.



tres, duos anteriores dextrum & sinistrum, tertium in medio, quartum vero cerebello & spinali medulla communem fecere.

c Columbo, qui eorum voluit originem supra os sphæroides Echmoides versus; quem Archangelus reprehendit, sui priores & posteriores dicuntur. Sic & Laurent. qui non recte anteriores dici asserit.

d Gal. 8. vs. part. 10. 12. & 12. 9. adm. an. 1. & 4.

e Non in cerebro, sed medulla cum in calloso corpore sint perfolli,

Archang. in calloso corpore excavati, Laurent. at ceteris cerebri ventriculi dicuntur. *f* Quod spiritum crassum contineant, Laur. imo pituitam copiosam. *g* Quare non recte anteriores dicuntur Laurent. *h* Figuram semicirculari, Arch. secus circuli aut Luna falcata figuram referunt, ego malim auriculæ humanæ assimilare, Laurent. *i* Quare nonnulli, qui horum anfractuosum ductum non sunt persecuti exist. marunt præter hos duos, binos alios ventriculos in anteriore parte reliquos esse, cum sint primorum portio; idcirco sex ventriculos dixerunt. Columb. cum superioribus duæ alia cavitates insignes insideant, in quas animalis spiritus decurrit, quas si quis ventriculos appellare velit, tunc ventriculi senario numero constitui erunt, Arch. sub his duos sinus statuit Arantius, quos hippocampi seu bombicini vermis figuram referre vult. Ego portiones existimo esse superiorum; maiore enim sunt, quam vulgo demonstrari soleant, Laurent. *k* Et si secus omnes scribere videantur, versus olfactus organum aut optici in acutum vergere volentibus, Vesal.

Horum duo primi, qui ab alijs superiores, *c* quod alijs supereminere credantur: alijs anteriores *d* dicuntur: in cerebri medulla *e* exsculpti omnium amplissimi *f* existunt, vtrinque vnus, quorum dexter in dextra sinister in sinistra parte, situ, formâ, magnitudine, vsuque pares, secundum cerebri medullæ longitudinem in ipsius medio [tab. 7. fig. 4. tab. 8. fig. 5. L. fig. 6. D. dexter: at sinister tab. 7. fig. 4. tab. 8. fig. 5. M. fig. 6. E.] siue anteriore posterioreve partem, siue basin verticemq; spectes, locantur *g* & anteriore posterioreq; sede magis seiunguntur, minus vero in medio, vbi *g* septo tenui [tab. 8. fig. 5. X X. Y Y.] de quo diximus, solum diuiduntur: qui obliqui [tab. 7. fig. 4. ab L. ad M. & ab M. ad M. ostendit.] *h* seu semicirculares: à temporibus enim, vbi medulla incipit principio sumpto paulatim versus medullæ centrum curuantur, & iterum ad aurium regiones flectuntur, sicq; duos semicirculos conficere videntur: oblongi, anfractuosi, fatiq; ampli. Horum anterior pars obtusa *k* & rotunda est [tab. 7. fig. 4. & tab. 8. fig. 5. L. & M. inferius.] & inter-

interno latere declives ad tertium ventriculum per-
tingunt [tab. 8. fig. 5. sub S. T. V. & fig. 6. vbi H. & I. tab. 9.
fig. 7. H.] posterius quoque obtusi & rotundi [tab. 7. f.
superius L. & M.] qui deorsum sensim in cerebri
substantiam versus priora cornu modo angustata, ad
processuum mammillarium & neruorum opticorum
[tab. 9. fig. 7. & 8. F. G.] & arteriarum carotidum in-
gressum descendunt. Superficies ipsorum aqueo hu-
more oblinitur, & eo oppleti sæpe reperiuntur: ho-
rum superior pars [tab. 7. fig. 4. ab L. ad L. & N. ad N.] se-
cundum cerebri longitudinem æqualis est: inferior
vero inæqualis [tab. 8. fig. 6. R. aut S.] ob finem ad pi-
uitæ defluxum paratum, qui ex posteriore ventri-
culorum sede antrorsum ad ventriculorum cauita-
tem communem oblique perreptat: hique duo ven-
tricoli in communem cauitatem, ut mox dicemus,
effluunt. Hos tenui membranâ succinctos¹ esse,
non ita manifestum est, eiusque nomine inter se A-
tomici certant; ipsis vero plexus choroides in-
ambere in confesso est, à quibus vasa gracilia^m [t. 7.

¹ Galenus &
vereres, qui
post illū scri-
psere, trium
priorum su-
perficiem te-
nui membra-
nâ, ut cere-
brum obducere
voluere, non
vero quartū:
Contra Vesal-
ius negat, tres
ventriculos
priores sua
superficie te-
nui membra-
nâ cingi, ve-
rum quartum
fig. 4. addit, se pu-

re Galenum Herophili, Andrea aut Marini, aut alterius scripta legisse, in tres
ventriculos tenui meningis partes porrigi, non item in quartum ventriculum quâ-
tione, non indicabatur, membrana velut peritonæo, aut pleurâ succingi, sed tenuis
membrana partes vasa in ventriculos deducentes, à quibus plexus choroides effor-
tantur. Addit, si succingerentur ventriculi, obstaculo essent membrana, quo mi-
nis cerebri substantia, interstitio præpedita, materiam suis ventriculis oblatam in
animales spiritus emutaret. Ves. lib. 7. cap. 6. Tenui membrana induti, licet Vesal.
neget, ubi sensui aduersatur, & miror, Vesalium qui peluim norat esse tenuem
membranam, ignorare tamen hanc ascendente ventriculos cerebri inuestire, Co-
lab. ventriculos tenui meninx succingit, qua utrinque sursum scandens, in sum-
morum parte, facto concursu, & deorsum delapsa facta gemina, eos medios di-
uit, Archang. in Vena in ventriculum descendunt. 9. admin. anatom. 2. pro-
pata ab ea qua ad cerebrum decliuus peruenit. 9. admin. anatom. 3. vide 9. vsu
ptum 5. Et Vesalius hic venulas concedit, sed impenje grauides; quia harum
substantia durior & callosior in superficie: & Plat. venula anteriore sede affigun-
te. At Archang. tenuem meningem qua ventriculorum mediastinum est, eximij
diti sensus, qua ob multas venas in eam excurrentes, inflammationem perpeti po-
te. unde dolores in profundo cerebri pergentiuntur.

fig. 4. PP. tab. 8. fig. 5. PP. fig. 6. OO.] deducuntur, quæ ipso-
rum substantiæ partē anteriore connascuntur, simi-
lia ijs, quæ oculi tunicam adnatam percurrunt.

*n Gal. 8. vj.
part. 10. Vesal.
eum reprehē-
dit, quod di-
xerit, cere-
brum geminū
esse, ut quem-
admodum v-
no oculo vi-
tato, aut uno
teste execto,
alterū serua-
mus, ita de-
xtero ventri-
culo laeso, fini-
ster suo mune-
re fungatur:
quod inquit,
in ventricu-
lorum copia
recensenda lo-*

Duos esse præterea, ⁿ cum cerebrum, & senso-
rium omne sit geminum, quamuis prima & maxime
communis geminorum omnium instrumentorum
causa sit, vt si alterum læsum fuerit, alterum subser-
uiat, quod Galenus ⁿ docet exemplo adolescētis qui
Smyrnæ in Ionia vulnus in alterum ventriculum ex-
cepit, superstes tamen mansit, qui ne temporis qui-
dem momento viuere potuisset (vt Galenus credit)
si vulnus vtrumq; simul violasset.

Vsus horum, alijs, vt ex inspirato aere & per olfa-
ctus organa in cerebrum delato, vitalique spiritu à
corde per arterias carotidas sursum lato, spiritus ani-
malis in plexu choroide præparatus ° conficiatur; a-
lijs vero p vt sint tanquam promptuaria spiritus ani-
malis, qui è plenibus choroidibus in hos effundun-
tur. Nobis vero videntur, q excrementa, quæ in ce-
rebr

tum habet, non in enarranda cerebri diuisione, cum id supra ventriculos tan-
tum diuisum sit. o In ventriculis anterioribus spiritus animalis conficitur. 8. vj
part. 10. & 11. inspirationem & respirationem efficiunt lib. 8. cap. 10. At Vesal. in hi
attractus per inspirationem non aer vitalisq; spiritus à corde transmissus, priuat
cerebri materiei formæque vi in animale spiritum mutatur, qui postmodum p
neruos ad sensus motusq; organa distribuuntur. Laurent 1. ad spirituum anima-
lium præparationem; quare animalis spiritus inchoati ἀρσενικά dicuntur. 2. a
inspirationem & respirationem cerebri. 3. ad odores suscipiendos; at Archang. ei-
rant, qui spiritū animale in ventriculis fieri voluit, cum ab ijs nulla vis pendeat
p Hic primus est vsus Archang. cui 2. vt aer per nare; & os Ethmoides attri-
ctus in ventriculos in ijs elaboretur, conficiatur, præparetur ad spiritus animalis m-
trititionem & refectionem; sicut aer in pulmonibus ad spiritus vitalis & refrigeri-
um & recreationem præparatur. 3. vt plenum choroidem contineant, quo con-
modius in eos spiritus animales effundantur. 4. Et secundarius, vt cerebri ex-
crementa expurgentur. Quomodo autem hi ventriculi & spiritus animales contin-
re & excrementis expurgandis seruire simul possint, inquit Archang. nemini n-
tum videri debere, quandoquidem nares Natura quoq; creauit. Primario ad oc-
randum, secundario ad mucum euocandum. q Spiritum animale hic gigni
colligi credunt, cum nobilior sit sedes in cerebri substantia purissima, quam in h
excrementorum sentina, Plat.

rebrī nutritione segregantur, vt hīc præsto sint ad animæ sentientis in omne corpus transuersionem, illiusq; facultatum omnium actiones edendas, seu pituitam in cerebro genitam colligere, & per meatum ad infundibulum mittere, quo tandem ad fauces descendat.

Foramen hīc notat Archangelus, quod sub processibus mammillaribus medium sit, & biuium, cuius pars vna in dictos ventriculos exporrigatur, altera in palatum ideoq; in pulmones: quod plerisq; incognitum sit, nec conspicuum fieri, nisi in cerebris sanis, inopinato vitâ priuatis & mox dissectis; partes enim cerebri huic foramini circumiectas tempore ideo concidere atq; conuiuere, vt penitus obstruatur ac deleatur; idcirco Galenum ^r dixisse aerem inspiratum influere in cor, sed eius partem in priores ventriculos ingredi, vt ibi præparatus, fiat spiritus animalis ^r pabulum.

Tertius ventriculus sequitur, qui nihil aliud est, quam duorum concursus in posteriora exporrectus: duo enim dicti ventriculi partibus infernis sub fornice [*t. 8. f. 5. S. T. V. fig. 6. AAA.*] in vnum ^r locū cœunt, & terminantur, qui inferius vallem oblongam expriment, & acutum angulum efformant, vt meatum (seu cavitatem) constituent, qui longiusculus in posteriorem ventriculum desinat. Hic vero à Galeno & meatus & communis cavitates seu communis ^u anteriorum locus dicitur [*tab. 8. fig. 6. sub H. I. tab. 9. fig. 7. & 8. H.*] ab alijs vero, qui tertium ventriculum ^r nent, perforatio duorum ventriculorum; alij tertium quendam ventriculum, & ventriculum medium, ^x cum in medio cerebri, imo in centro mellæ cerebri sit inter duos priores & quartum. Hic primo longam rimam refert, seu cavitatem longiunculam [*tab. 9. fig. 7. & 8. H.*] dein versus posteriora amplior

^r 8. vs. part. 10.

^r Col. suum dicit inuentum: quare ab Archang. reprehenditur. ^r Gal. 8. vs. part. 11.

^u 8. vs. part. 12.

^x 9. adm. an. 4. at Lauren. quod centrum fere occupet cerebri, cum tantū ab occipite, quantum à fronte distet.

TABVLA IX. Fig. 7. Cerebri portio, quæ ventriculos superiores efformabat, & cerebello incumbbat, ablatâ, & vas quarti sinus à plexu choroide auulsum, quo tertius ventriculus & crassus meningis sinus conspiciantur. Fig. 8. Tertij ventriculi ductus, testibus diuisis, & cerebellum crassâ meninge denudatum, exhibetur.

LIB. III.

FIG. VII.

TAB. IX.



VIII.



prior est & partim Fornice versus posteriora subla-
ta, partim testibus & natibus per medium diuisus cō-
spicitur, qui rectā à prioribus ventriculis y sub for-
nice, natibus & testibus [tab. 10. fig. 10. ab I. ad K.] ad po-
steriorem tendit [t. 10. f. 10. K. finem ostendit.] figura in-
certa, alijs censetur propter varias eminentias in eo
existentes.

Meatus seu ductus z duos obtinet: alterum [tab. 9.
fig. 7. & 8. I.] amplitudine satis insigni ex media ipsius
sede prodeuntem, qui in cerebri substantia excul-
ptus, rectā deorsum versus peluim pituitā excipien-
tem ad cerebri basin fertur, per quem duorum prio-
rum ventriculorum pituita descendit. Alterum [tab.
9. fig. 7. & 8. K.] qui posterior est, & a cuius initium or-
biculare non est, si ventriculi tertij non minima par-
est, qui tunicā peculiari^b meningis essentiā tectu
creditur & sub natibus [tab. 9. fig. 7. M. N. fig. 8. N. O. P. Q.
tab. 10. fig. 10. D. E. F. G.] & testibus^b in quartum ven-
triculum supra dorsalis medullæ initium, permeat
quo spiritus animales transire possint. Ex huius
meatus angulo inferiore & anteriore, quamprimum
Testes subit, nonnunquam meatus alius^c [tab. 9. fig. 8.
iuxta K.] longe arctior educitur, qui sensim in ante-
riora per cerebri substantiam latus deorsum fertur
& in primi meatus finem [tab. 9. fig. 8. I.] terminatur
& ex ambobus orificium [tab. 13. fig. 20. D.] exsurgit
quod in peluim desinit & pituitam ex tertio ventri-
culo educit. Et cum ad foramen secundum rima qua
dam conspiciatur, eam Columbus mulieris pubi se-
vulvæ assimilavit^d Vfus tertij ventriculi statuitur
vt spiritus animalis quoq; sit receptaculum, qui in
super

y Sic Galen.
8. vs. part. 11.
Vesal. Plat.
Archangel.
Laurent. at
Columb. bre-
uiorem facit
& ad meatū
posteriorem
ad glandulam
pinealem de-
sinere. Ar-
changel. non
admodū ma-
gnus & figurā
incertā.

z Vtriusque
memini 9.
adm. anat. 4.
alterum vo-
cat foramen
sublime, seu
quoddam in-
fundibulum;
alterum mea-
tum maxi-
mum tertij
ventriculi.

a Priore am-
plior. Lau-
rentio.

b 9. admin.
anat. 5.

c Vesal. &
Plat. & hunc
à Galeno 9.
adm. an. pra

termisum vult Vesalius. d Nates & testes foueam oblongam inter illas interi-
etiam committunt, quæ cum vuluæ imaginem referat, Anatomici (scil. Columb.
vuluam nominaverunt, Archang. & Archangel. qui fornitem testes, nates, anu-
vuluam & penem ad tertium ventriculum refert.

uper tanto artificio constructus, vt illum in quarum propellere possit, statuatur.

Fornix p huic ventriculo tertio superstratus κα- f Fornix
 ιειον & ψαλλοειδές & dicitur, quod καμάρας seu ψαλ- ψαλλοειδές.
 ιδας, testudines & fornices, nominibus per trans- & Camera-
 ationem impositis, & formâ & vsu referat: Hoc vni- tum, Columb.
 um est, & in cerebri pene medio parte posteriore corpus came-
 orpori calloso^h subiectum, & vtrisque cerebri parti- ratum, came-
 us commune, eminens occurrit, & ex ventriculo- ra modo ex-
 um duorum posteriori sede [tab. 7. fig. 4. L. M. superiora tructum, &
 ab. 8. fig. 5. S. T. fig. 6. B. C.] vbi hæc in priora reflectun- tribus quasi
 ur, enascitur, & vbi cerebro contineatur, longum columnis sus-
 que ac callosum corpus, sede posteriore tamen la- fuliū, fornix
 im existit, quod statim, vbi versus anteriora proce- & testudo
 it, sensim in acutum [tab. 8. fig. 5. S. T. ad V. fig. 6. B. C. ad Laurent.
 ipremum A.] definit & anteriùs [tab. 8. fig. 6. ad P.] acu- g & ψαλίδας
 o angulo cerebri substantiæ rursus iungitur, quem ἀπὸ καμά-
 dmodum & calloso corpori; at in medio reliqua; ras, 9. a. m.
 ititudinæ liberum est [tab. 8. fig. 5. XX.] Figurâ est an. 4. cū parte
 ngulâ, i inæqualibus lateribus constante; primum posteriore im-
 nim à posteriore sede vnus ventriculi ad alterius ense orbicu-
 edem fertur & brevis est [tab. 8. fig. 5. ab S. ad T. & fig. 6, lare sit, non-
 B. ad D.] duo vero alia æqualia à posteriore parte ad nullis im-
 nteriorem producantur [tab. 8. fig. 5. ab S. ad V. à T. ad post, ut cere-
 . & fig. 6. a B. ad superius A. & à C. ad superius A.] quod bri nates à
 uobus quasi arcubus parte posteriore, anteriore veteribus ap-
 ero vno donatur & tripodis instar cerebro inniti- pellatas existi-
 ar. Substantiâ est^k ventriculorum simili, à candi- mauerini. V. c.
 iore, & callosi corporis instar, duriore, tenui mem- sal.
 ranâ nullibi^k obducta quod in humiliori sede vbi h Superioris
 ornice instar ventriculo obtenditur, à connexu li- vetriculi pars
 erum est [tab. 8. fig. 6. AAA.] & in lateribus vbi ventri- calloso corpo-
 ulos respicit [tab. 8. fig. 5. ad L. M.] cum parte poste- ri insculpta,
 riore Archang.
 Pp 2 i Gal. 8. vs.
 part. 11. trian-
 gulum, in qua-
 libus laterib.
 Vesal & Lau-
 rent. semicir-
 culari figurâ

el pontis potius, qui posteriori duobus cruribus, anteriori vero vno innititur. Col.
 Archang. triangulum efficit. Plat. k Et Vesal.

l s. v. f. part.
11.

m Vesal. Co-
lum. Archang-
gel. Laurent.

riore fulcra duo, antèrius vnum obtineat, superficie est læui & aqueo humore perfusa. Foris ad exortum gibbum [t. 8. fig. 5. S. T.] & conuexum & in ortu fere orbiculare, vt cerebri molem incumbētē sine ^l dolore ac citra molestiam sustineat, quo meatus ille cōmunis vel ventriculus tertius ^m cui instratus est, amplius seruetur & non comprimatur, cū sub ipso duorum priorum ventriculorum communio fiat: ac secundum ipsius longitudinem in medio lineę latioris instar extuberat [tab. 8. fig. 5. XX.] quā cum septo ventriculorum continuatur: intus vero cauum [tab. 8. fig. 6. AA.] & pro spirituum libero transitu, & quo vas [tab. 8. fig. 6. H. I. tab. 9. fig. 7. T. à T. natum.] à crassæ meningis sinu quarto pronatum & in duos ventriculos priores bipartitum sub ipso feratur, & à cerebri substantia incumbente non prematur.

n Per omnes
ventriculos
vasa minutis-
sima dedu-
cuntur, qua
plexum con-
stituunt. Fal-
lop. instit.
o Plexus co-
riformes quos
reticulares
appellauimus,

Plexus choroides in ventriculis prioribus ⁿ inter ipsos & fornicem sedem habent [tab. 11. fig. 13. d.] quos $\chi\omicron\rho\omega\epsilon\iota\delta\eta$ ^o $\omega\lambda\acute{\epsilon}\gamma\mu\alpha\tau\alpha$, quod $\chi\omega\epsilon\iota\omega$, id est, secundinæ seu membranæ, quæ foetum ambit, similes sint; siue vt Herophili sectatoribus $\chi\omicron\rho\omega\epsilon\iota\delta\eta$ $\sigma\upsilon\varsigma$ $\rho\acute{\epsilon}\mu\mu\alpha\tau\alpha$, cōuolutiones secundinarum modo efformatæ dicuntur. Sunt vasorum minutissimorum in cerebri ventriculis cōplicationes tenui membranâ inuolutæ [t. 7. f. 4. OO. tab. 8. fig. 5. OO. fig. 6. M. N.] Cōtexuntur Penim

ex va-

Col. plexus choroides, reticularis Plat. plexus siue contextus choroides Archangel. plexus choroides, nec mirabile appellari possit, Laurent. Galen. 9. adm. anat. 3. et venis & arterijs. p Ex arterijs ab admirabili contextu in sella ossis sphenoidis insidente sursum per cerebri interiora in ventriculos irruentibus; quibus nonnullæ etiam vena sunt intextæ. Archang. sunt venularum & arteriolarum textus labyrinthici per tenuis membrana sursum ascendenti portuiculas excurrentes. Laurent. ex arteria quarta ramo & vasis à sinu quarto prodeuntibus, eiuſq; membrana & carne quadam fusca contextitur. Vesal. & Plat. ex arterijs textum nullâ interueniente venâ efformantur, partim à soporaria, quæ rete quoq; mirabili efformat: partim ab arterijs quæ per transversos cervicis processus ascendunt, & caluariam per foramen illud per quod medulla exit, ingrediuntur, sub cerebri basi feruntur, & in venarum similes ductus degenerant, & simul in unū ramiū vnus, an-

x vasis, quæ huc mittuntur, partim ex vasis à sinu quarto crassæ meningis, partim ab arterijs: à sinus nim quarti [*tab. 11. fig. 13. R.*] extremo vas venosum [*tab. 11. fig. 13. i.*] constituitur, quod medium ventriculū perreptans in priores ventriculos fertur [*tab. 11. fig. 13. l. m.*] sic etiam à sinus quarti ramo, qui inferne antrorsum ad priores vētriculos cerebri abit [*t. 11. 13. g.*] sic ab Arteriæ quartæ cerebri ramo ventriculos subeunte [*t. 11. f. 13. A.*] Hęc autem vasa, tenuis meningis portio comitatur atq; cōplicat interueniente subrubrâ carne glandulose substantiâ, quæ huic flexui intertextitur. Fertur hic plexus à ventriculi arte humiliore, sursum ad posteriorem ventriculorū sedem & eousq; progreditur, donec illi vas venosum [*tab. 11. fig. 13. i. ab R.*] à quarto sinu per ventriculū tertium antrorsum deductum iungatur, ubi etiam ramulos per ventriculorum substantiam distribuit [*tab. 8. fig. 6. ab F. ad G. ad M. N. dein K. L. postea I. ad t. 11. fig. 13. ab A. ad S. l. i.*] in his plexibus spiritus animales & excoqui, attenuari & præparari; alij in fere mirabili inchoari, in his absolui & perfici volunt, i perficiendi à cerebro eiusq; medullâ acceptâ, unde in priores ventriculos tanquam promptuaria effundantur.

terius regionē illam, ubi rete mirabile ab illis arterijs efformatur, adeunt, & cum his unita plexum choroideum efformant, qui per omnes ventriculos fertur, & per tertium ventriculū delatus, cum ad quartum sinū dura matris pervenit, illi per ramos aliquot paruos & exiles coniungitur, Fallop. instit. q In his animales spiritus generantur, quod meum inuentum est, Columb. at

si inuentum negat Archang. & Galenum citat. r Laurent. f Archangel. egat Plat. & usum dicit, ut interior hac cerebri substantia, qua nullis anfractibus constat, proinde nec vasa alia possideat, spiritu vitali cum exigua portione sanguinis huc deducti quoque fruatur, & sic cerebro aliàs undiq; spiritu & sanguine abundante etiam hic prospiciatur.

De Glandula Pineali, natibus, testibus, & ventriculo quarto.

CAPVT XIV.

De conario seu glandula pineali agitur 9. adm. an. 3. & 8.

vs. part. 14. de natibus & testibus 8. vs. part. 14. & 9.

- Pp 3

admin.

admin. anat. 5. adde ventriculo quarto 8. v. f. part. 11. &
12. 9. admin. anat. 5.

GLANDULA [tab. 9. fig. 7. L. fig. 8. M. tab. 10. fig. 10. H.]
ad foraminis [tab. 9. fig. 7. K.] in posteriorem
ventriculum introitum adponitur & testium cere-
bri parti anteriori innititur [tab. 9. fig. 7. M. N. tab. 10. fig.
10. E. D.] vasi quoq; ^a venoso [tab. 8. fig. 6. H. I. tab. 9. fig. 7.
V. tab. 10. fig. 10. I.] ex quarto sinu prodeunte subponi-
tur, cum quo in resectione facile auellitur in homi-
nibus cum cerebro vix adhæreat; at in oue ac vitulo
cerebri substantiæ quodammodo continua videtur,
& in brutis multo maior, quam in adulto homine;
nam non solum hæc glandula, sed aliæ quoq; partes
cerebri in brutis multo maiores sunt, quare in vitu-
lorum capitibus iuuenes exercere solemus, quo ad
hominis anatomen aptiores deducantur. Figurâ ^b co-
no, vnde ei nomen impositum, seu nucleo pini ^d si-
milis, quare ^b κωνάριον & σῶμα ^c κωνοειδές, glandula
pinealis nominatur; nonnulli penis figuram perbel-
le exprimere volunt, quibus cerebri penis ^e dicitur.
Oblonga est, mucrone ^f suo sursum spectante, basi
vero cerebri substantiæ incumbit. Substantia ipsius
duriuscula, membranâ ^g tenui, cuius interuētū ^h ab-
sconditur obtecta, colore à cerebro eiusque medullæ
diuerso subluteo. ⁱ Hæc cum vasi [tab. 8. f. 6. H.] quocumque
ventriculum tertiū accedit, à quo ^k omnes fere ple-
xus, qui in ventriculis sunt, incumbat, cum vsum ha-
bet, quem & reliquæ glandulæ ^k venis adpositæ, v-
eorum diuisiones ^k firment: vbi enim vas hoc ter-
tium ventriculum ingressum est, statim in frequēte
ramos tenui membranâ contextos diuiditur, quarum
glandu-

^a Sub vase
ex quarto si-
nu prodeunte
reponitur, Ve-
sal. adponi-
tur, Plat. tor-
culari asse-
quitur, Col.

^b Gal. 8. v. f.
part. 14.

^c 9. admin.
an. 3.

^d Nucis pineæ
aut turbinatæ
similis, Vesal.
Laurent fru-
tibus semini-
busve pini si-
milis, Archang.
gel. penis bre-
uis instar,
Plat.

^e Columb. &
Archangel.
quibus etiam
glandula pi-
nealis & co-
xarium.

^f Vesal.

^g Particula est cerebri alijs similis. 9. adm. anat. 3. Cerebri substantia durior
& magis ad glandis, quam ad cerebri naturam accedens. Vesal. ^h Admin. an. 3.
ⁱ Col. & Archang. ^k 8. v. f. part. 14. & Vesal. Columb. at Archang. glandula
non est data vti sit stratum venarum illic perreptantium.

landula firmamentum^l ipsis & eorū ramus fit: dein
 de hoc vas in ingressu suo huius ventriculi meatum
 obstruat^m & sic animalis spiritus in quartum ventri-
 culum transitum prohibeat. Nonnulli, cum ad prin-
 cipium medij ventriculi sita sit, & ex hoc ventriculo
 in cerebelli ventriculum spiritus transmittat, huius
 undem vsum putant, qui est pylori ventriculi (ait
 Galenus) & custodem quendam esse volunt, & velut
 economum quantum spiritus mitti oporteat; quare
 spirituumⁿ transitui præesse autumāt: sed hoc glan-
 dulæ^k tribui non potest, cum non sit cerebri parti-
 cula, imo neque ab internis cerebri ventriculi parti-
 bus, sed extrinsecus ipsi adhæreat: imo ne meatum^o
 contingat vt ante ipsius orificium cōnuere pos-
 sit. Nam si ipsius pars esset (ait Galenus)^k liceret ipsi
 cum cerebro dilatationibus ac compressionibus
 ex suo situ dimoto, meatum vicissim aperire ac clau-
 dere, at cum ipsa ex sese moueri nequeat, id ei tri-
 bui non potest.

Glandulæ pineali à tergo, ex vtraque ventriculi
 tertij parte, & quidem sub fornice, corpuscula qua-
 tuor P eminentia, rotunda ac duriuscula contigua
 sunt [t. 9. fig. 7. M. N. fig. 8. N. O. P. Q. tab. 10. fig. 10. E. D. F. G.]
 quæ cum totius cerebri q particule sint, eandem cum
 ipso substantiam^r sortiuntur: hæc inferiore parte à
 cerebro enascuntur, superius vero & à laterib. nulli
 parti continuantur, sed tenui meninge solum obdu-
 cuntur; quæ cum inter anteriorem cerebelli regio-
 nem & tertij ventriculi posteriorem sedem locata sint,
 rectius cerebello remoto conspiciuntur. Et quia ef-
 figiem quandam duarum narium commissurarum re-

l Gal. Vesal.
 Laurent.

m Vesal. &
 Plat.

n Negant
 Gal. 9. v. su
 part. 12. &
 Vesal. hunc
 meatum præ-
 esse, & mea-
 tū hunc clau-
 dere & aperi-
 re: sic Columb.
 spiritus quā
 ventriculi clau-
 dere non est
 verisimile. At
 Archangelo,
 ut claudat

foramen in
 diastole cere-
 bri, ne spiritus
 animalis è ter-
 tio in quartū
 aggressus, ite-
 rum in tertium
 regredi possit.
 At Gal. 8. v. s.
 part. 14. ait,
 opinionem es-
 se hominum
 vermiformis
 epiphyses a-
 ctionem igno-
 rantium.

Pp 4


ferunt

p Tenuis ac praelonga cerebri eminentia, Gal. v. s. part. 14. q 9. adm. anat. 5.
 r Substantia subflava ibi substantia cerebri correspondens, qua proxime tenuis
 membrana accedit, Vesal. l. 8. v. su part. 14. & 9. adm. anat. 5. t Gal. l. c. Vesal. re-
 tes & gemelli, Col. Plat. Archang. testes: Laur. nates. Nam & Græci videntur
 temporis successu confudisse modo γλῶττις, modo διδύμους appellasse, Vesal.

TAB. X. Fig. 9. *Cerebellum supra cerebrum pro-*
tractum, quo inferior eius superficies & spin. medulla
cavitas conspiciatur. Fig. 10. spinalis medulla cum glan-
dula, testibus, natibus & quarto ventriculo. Fig. 11.
Calvae pars, per quam nervi optici, pelvis erecta
& ductus 4. pituitam à glande deferen-
tes transeunt.



.XII.



.X.



.XII.



11. *ferunt* $\gamma\lambda\epsilon\tau\iota\alpha$, id est, paruas nates vocarunt; quarum concursum (si cum spinali medulla perpendas) hominum ϵ femoribus ϵ inter sese coniunctis rectissime comparaueris; alij $\delta\iota\delta\upsilon\mu\iota\sigma$, testiculis ea assimilantes malunt $\delta\iota\delta\upsilon\mu\iota\alpha$, quam $\gamma\lambda\epsilon\tau\iota\alpha$ vocare. Nonnulli vero (cum hæc corpuscula linea [t. 10. f. 10. inter E.D. & F.G.] per transversum lata tantum, non vero in plures partes distinguatur) ea corpora, quæ glandulæ pineali [tab. 10. f. 10. N.] propinqua & superiora sunt, vocant $\delta\iota\delta\upsilon\mu\iota\alpha$, testes; quæ vero his sunt proxima & inferiora $\gamma\lambda\epsilon\tau\iota\alpha$ ^u nates, seu clunes appellant; quia in inferiore & posteriore horum parte [t. 10. f. 10. sub F. & G.] meatus ex tertio vetriculo quartum petens (cerebello remoto) conspicitur [t. 9. f. 8. K. tab. 10. fig. 10. supra K.] qui foraminis ani ^x speciem referre videtur. Harum usus γ cerebri molem sustinere, ne vetriculus tertius seu meatus [t. 9. f. 7. 8. K. tab. 10. fig. 10. I. K.] ex tertio quartum accedens comprimatur, sicq; spiritus animalis transitus prohibeatur; alijs ^z volentibus has particulas glandulam pinealem ad foramen ventriculi occludendum propellere. Hi enim eminentijs, stylo per foramen posterius indito, per medium diuisis, altera tertij ventriculi pars sub testibus sita [tertius ventriculus totus tab. 10. fig. 10. I. ad K.] in posteriorem ventriculum desinens conspicitur.

Ventriculus posterior; ^a quem quartum Anatomici vocant [t. 10. f. 9. I. fig. 10. L. M. N. O. cum tab. 13. fig. H inter cerebellum medullamq; spinalem ^b quib. communis est situs; omnium minimus & subtilissimus est, figi

^a Cerebelli ventriculum vocat. Gal 8. v. part. 12. & 14. posteriorem nominat 9. admin. anat. 4. sinus quartus Laurentio ventriculum esse neg. Valuerda. ^b Ex dorsalis medulla & cerebelli sinibus componitur, nõ secus quasi utraque manu cavitatem fingeres, Vesal. in cerebri posteriore parte, inter ipsi ad cerebellum situs, quæ spinalis medulla à cerebro initium producit, in quo totus insculptus, Fallop. instit.

est, figuram rotundam ^c sed oualem habet. Hic primum amplior est, sensim angustatur donec in acumen desinat: nam ventriculi huius cavitates inferior & ^d potior in spinali medulla est [t. 10. f. 10. à K. ad O.] cōcavitatem habens veluti sectionem; quem sinum Herophilus cavitati calami quo scribimus, assimilavit, cuius finis vtrinque in latus [tab. 10. fig. 10. N.] attollitur, calami scriptorij mucronem refert. Elatior vero pars à cerebello & tenui membranâ illi obductâ efficitur [tab. 13. fig. 21. H.] Hic namque ventriculus tenui meninge obuoluitur: antè quidem [tab. 9. fig. 7. XX. iuxta M. N.] qua cerebellum cerebro & eius natibus committit, ventriculum obuoluit: posterius vero [tab. 9. fig. 8. quasi E. ad H. committens.] ubi cerebellum spinali medullæ coniungit, ventriculi sedem destruit. Duplex non est, sed simplex, cum ex ipso, ut voluit Galenus, produci debuerit spinalis medulla, quæ simplex est, cum in vno animali ^e duas facere spinas non fuerit commodum. ^f Hic magnitudinem habet ^g sufficientem, quo spiritum animalem ex anterioribus ^h ventriculis per meatum communem siue tertium ventriculum transsumat, & nervis, qui sub capite toto corpore diffunduntur, communicet (quare hunc ventriculum principalissimum Herophilus ⁱ censuit) minor ^k tamen est anterioribus, cum rem maiorum virium ^k & facultatis, ut Galenus loquitur, contineat: & in hoc ventriculo ^l memoriæ sedem esse autumarunt.

^c Sic Vesal. Plat. at Col. spinalis medulla cavitatem vocat: & Archang. idē vult, addens hanc cavitatem quarto ventriculo subiectam esse ac continuatam & calami scriptorium nominat.
^d Gal. 8. vs. part. 11.
^e Imo non licuerit, addit Galen. l. c.
^f Commemorabilem magnitudinem Gal. l. c.
^g In anterioribus confectū Gal. l. c.
^h Gal. 8. vs. part. 11. Verum hic Vesal. l. 1. Galenus in lib. de v. part. 11. hoc & principalissimum dicitur.

Hic

in 3 de plac.

medium. Sic vero Galen. 8. vs. part. 11. qui quartum ventriculum hunc faciunt, intelligit autem eum, qui sub fornice est, quod etiam ex sequenti capite colligitur) omnium ventriculorum cerebri principalissimum esse affirmant. Herophilus vero non hunc ventriculum, sed eum, qui posteriore cerebro inest, existimare videtur principalissimum esse. ⁱ Gal. 8. vs. part. 12. non est admodum capax, Columbellus. Memoriam in cerebello confringunt Albertus, Thomas, Scotus, illiusque deffis Theologi: volunt enim in vno sensum communem habitare, in altero vim imaginandi, in tertio vim ratiocinandi, cū tamen nec animus sentiens, nec facultas animæ cavitates aliqua corporis sedes sit, sed solida partium substantia. ^l Sic & Vesal.

Hic ventriculus, quemamodum & alij inter disse-
candum, aqueum humorem continere conspiciun-
tur: at duo priores, præter hunc humorem, plexum
choroidem [tab. 7. fig. 4. O O. tab. 8. fig. 5. O O. fig. 6. M. N.]
quoq; suscipiunt; & tertius vas venosum [tab. 8. fig. 6.
H. I. tab. 9. fig. 7. V. eductum à T.] quod à crassæ meningis
finu quarto propagatur & plexum complicatum, uti
supra ostendimus, constituit. Pleriq; tamen hos qua-
tuor ventriculos spiritus animales in plexibus cho-
roidibus elaboratos continere volunt.

*De infundibulo, glandula pituitaria, rete mirabili
& cerebri usu.*

CAPVT XV.

*De infundibulo egit Galen. 9. vs. part. 3. & 9. adm. anat. 1.
& 4. de glandula 9. vsu partium 3. de rete mirabili 9.
vs. part. 4. & 8. de cerebri vsu 8. vs. part. 2. & 3. quem-
admodum de ipsius sensus & motu 8. vs. part. 2.*

*a Meatus
quidam ma-
ximus tertij
vêtriculi basi
subiacet, qui
ex priorib. su-
perfluitates
recipit, insu-
per ex parti-
culis superia-
centibus, in
ipsum excre-
menta con-
fluunt. 9.
adm. an. 4.*

AD ventriculi tertij foramen, quod parte ante-
riore & primum seu eius orificij latera [t. 9. f. 7
& 8. q.] cauitas^a profundior occurrit cerebro super-
ne coniuncta ex tenui^b meninge, cerebri basin suc-
cingente, facta. Ab hac enim meninge protensa pro-
cessus orbicularis educitur [t. 13. f. 20. C C.] initio qui
dem amplo [t. 10. f. 11. E. fig. 12. B.] sed in canalem angu-
stato, donec in angustam & oblongam fistulam fi-
niat (gracilibus, sed frequentibus venis intertexta
& per foramen [tab. 10. f. 11. F.] peculiare in crassâ me-
ninge excisum descendens ad glandulam pinealem
desinit. Hoc nonnullis^b à figura πυελος^d pelvis, ali-
ab vt


*b 9. vs. part. 3. c Cuius labrum supernum absolutus est circulus, inde semper m-
gis arctatus descendens in subiectum admirabile mittitur ampla sphaera simili
manifestamq; cauitatē habentem 9. vs. part. 3. d ἐν τῷ περὶ τῶν ἡλαμνῶν πε-
λὸν τε ἐχόντων ὅσα τέλῃα τοιοῦτά. Interpres sic habet: ad hac qua circa scyph-
nem, πύελον aut ab infundibuli similitudine χώνω. Græci vocant habentur, atq;
id genus alia. 9. adm. anat. 3.*

ab utilitate seu similitudine ^b $\chi\omicron\delta\upsilon\nu$, infundibulum ^c *Ceu quomodo infundibulum $\alpha\gamma\pi\upsilon\delta\delta\omicron\chi\eta$, etsi nullum in se sumum cerebrum habeat, quæ sublimi foramine respirare desideret θ adm.* dicitur quod superne quasi lacunæ cuiusdam utilitatem habet; inferne autem infundibulum imitatur, quod velut meatus crassa excrementa cerebri in ventriculis ^f coaceruata excipiat & ad glandulam pituitariam transmittat.

Glandula π pituitaria sequitur, quam $\alpha\delta\lambda\omega$, id est, glandulam simpliciter Galenus ^h vocat: hæc sub ipsis ^a meningibus ad finem infundibuli in sphæroidis ^h *an. 4. A scyphi seu in qua in balneo la-uamur cõcha* offis sella posita est; qui sinus in glandulæ huius *forma, quam* *superior pars* *exprimit $\pi\upsilon\epsilon\lambda\iota\upsilon$ appella-* *tur: alijs hu-* *milior pars in-* *fundibuli fi-* *stula non ab-* *similis, $\chi\omicron\delta\upsilon\nu$* *dicta videtur* *reliqua pars* *superior $\pi\upsilon\epsilon\lambda\iota\upsilon$* *latri- $\lambda\delta\varsigma$: alijs toti* *oc corpus $\pi\upsilon\epsilon\lambda\delta\varsigma$; glans autem in qua pituita destillat, $\chi\omicron\delta\upsilon\nu$, quasi forma qua-* *am esset, in quam aliquid infunditur, Vesal. peluis $\&$ infundibulum, Columb.* *Archang. $\&$ Laurent. infundibulum membranosa concavitas, Varolo. f Ex prio-* *bis ventriculis superfluitates recipit Galen. θ adm. anat. 4. $\&$ Columb. At Lau-* *rentio, cerebri pituita tanquam per Hippocratis manicam transcolatur: Archang.* *tus in cerebro genita, $\&$ per priores ventriculos in tertium delapsa, in peluim re-* *viatur, à qua in glandulam delabatur. g Nisi veteres qui pueros suos docebant,* *natomen hanc glandulam $\chi\omicron\delta\upsilon\nu$ appellarint, eam sine nomine reliquere. Vesal.* *9. vs. part. 3. aden extra crassam meningem est. i Secundum orbem non prorsus* *ocularis est, verum paulo minus tota quadrata, Vesal. k Crassa satis Columbo* *Archang. l Aut ab infundibuli termino, aut à membrana calvaria os tota il-* *l sede succingente, ubi dura membrana à calvaria ossibus abscedit, Ves. Hic locus* *e. ubi tenuis meninx assurgit, ut ventriculos induat, Columb. $\&$ addit, se mirari* *salium hoc ignorasse. m De capite fluxiones sunt per aures, per oculos, per na-* *res: alia per palatum in fauces, in gulam; alia per venas in spinalem medullam, in* *seguinem, omnes numero septem, Hipp. de gland. sic lib. de locis in Hom. fluxiones* *e. capite septem sunt, quædam in carnes, quædam in aures, quædam in oculos de-*

TABVLA XI. Fig. 13. vasa cerebri ipsorumque
 distributionem exhibet. Fig. 14. rete mirabile Galeni
 proponit. Fig. 15. glandulam pituitariam cum pelui
 arterijs carotidibus. Fig. 16. rete mirabile cum glan-
 dula, prout in vitulorum, boum, ouium
 capitibus reperitur.

FIG. XIII.



XIV.



XV.



XVI.



ambit, &c. de capitis fluxionibus vide Arist. 3. part. anim. 7.

n Adenis infundibulū exipientis usus excrementa transcolare, quod commodum Anatomicis ignotū est. 9. vs. p. 3. o Hoc quidē substantia familiaritate defluxus impetum sustinet, & os forsitan ab iniuria vindicās, pituitam admittit, & sensim citra stillicidium à lateribus suis defluere finit;

non enim cum Galeno fateri queo, basin capitis cauernosam, & p-

micis modo extructam, ut per illam veluti per spongiam pituita transcolatur, Vesal. at Laurent. dicit, per cunei foramina in palatum pedetentim ex glandula instillare. Item Vesal. ostendit nullam pituitam per octauū capitis os expurgari: contra Archang. in ventriculorum primorum historia. Glandula usus ut excrementum suscipiens, partim depascatur, partim in palatum eructet, ut illa expuantur, Arci ut pituitam cerebro superfluam excipiat, Varolus. p Beatus & mirabilis plexus reticularis, Vesal. plexus seu contextus admirabilis, & admirationis plenissimus Archang. Ego malim cum Neotericis choroidem plexum, qui in superioribus ventriculis cernitur, rete mirabile appellare, Laurent. q Maxime omnium quæ illi sunt, admirabile, toti propemodum cerebri basē plenus hic subijcitur, Gal. 9. vs. p.

lateribus non solum in palatum deiicit, sed etiam per foramina in caluariæ basi exsculpta defluere finit. Ad huius enim glandulæ latera, canales duo in osse vtrinque; cauati descendunt: vnus antè in foramen per quod secundum par neruorum deducitur, desinit: alter, in posteriora magis descendit & per asperam rimam ducitur ad latera foraminis ramum carotidis insigniorem in caluariam transmittentis, de quibus in ossium historia dictum fuit: & hæc pituita è cerebro euacuandæ subseruiunt. Nam cum cerebrum magnum sit & amplum, alimento multo indiguit; & cum plurimum sit humidum, nec admodum calidum, ex multo alimento, multa excrementa colliguntur; quæ cū duplicia sint, alia tenuia, quæ per futuras euaporant; alia vero crassa, quæ partim per nares, partim per palatū euacuantur. Quæ enim supra ventriculos & in cerebri diuisione cumulantur, per foramen antè & nares expurgantur, mucosq; nominatur. Quæ vero in ventriculis colliguntur, per suum foramen ad infundibulum deferuntur, per palatum eijciuntur, vel simplici exspuitione, vel excreatione.

Rete p mirabile *δυντυοειδὲς πλέγμα*, Galeno dictum, [t. 11. f. 14. proponitur.] id est, plexus retiformis ab artificiosa operis figura nomen habet: conflatu enim ex arterijs carotidibus [tab. 11. fig. 14. A. B.] quæ

cord

& Archang. ex soporarijs iugularibus ve; Laur. hæc tantum habi

orde sursum per thoracē ac collum ad caput feruntur, & ad basin cerebri iuxta neruorum opticorum tortum efformant. Hoc, glandulæ q [tab. 11. f. 14. E.] uam in ambitu complectitur, à lateribus sellæ ossis hæmoidis circumponitur: quod non simplex rete est, sed eiusmodi, vt si vulgaria piscatorū retia plura, alia alijs cumulata superijcies, cui hoc inest r eximium, quod alterius replicationes alterius replicationibus sint connexæ, ita vt ex ipsis seiunctim nihil minino capere queas, cum omnia serie continuâ intrinsece sint connexa.

In his ex Galeni r sententia, spiritus animalis diutissime moratur, qui materiam propriam habet spiritum vitalem per arterias sursum delatum, & in his conficitur, confectus statim cerebri ventriculis incipit. Vbi enim Natura f materiam exacte conficere vult, diuturnam ei moram in coctionis instrumentis comparat. Alij volunt in arteriis his spiritus vitales præparari; alij vero t animales inchoari, in plexu choroidæ perfectionem acquirere, vt vi à cerebro & medullâ acceptâ, vnde in ventriculos effunduntur, vt in ijs conseruentur. Nec vero u credendum est, qui in brutorum tantum capitibus reperiri vident, nam in omnium hominum capitibus hæctenus demonstrauimus; nō tamen negamus in vitulorum x bouum capitibus multo & maius & manifestius conspici. Et tres hæ particulæ, infundibulum, glandula pituitaria & rete mirabile, nō nisi cerebelli medullâ ablata, duę vero posteriores non nisi crassâ meningē dissectâ, demonstrari possunt: deniq; antequam

Qq

hæc

ad latera apophyseon clinoiden plexus apparent, quam πλέγμα δυνάμιος vocat Galenus. Vesalius negat ex his arterijs componi, nec arterias illud foramen caluarie quod Galenus tradit, ingredi, nec ita in plexum unū assumi: at Falli in instit. rete mirabile ab arterijs separatis, ad basin cerebri efformari scribit: & Col. recte mirabile dari contra Vesaliū statuit, sed ab alijs potius arterijs, quàm à carotidibus efformari, verum Columb. non Galeni rete mirabile, sed plexum cho-

idem in ventriculis intelligit. f Gal. 9. v. part. 14. hoc ostendit exemplo flexus arterijs formis ad testes, in quo sanguis & spiritus pro seminis generatione. r Angelus. u Nullus reticularis plexus sub cerebro existit, qualem Galenus describit, & nullibi non in suis libris inculcat, Vesal. x Galenum bouum cerebri dissectione delusum, non hominis cerebrum, nec ipsius vasa, sed bouis, idq; etiam partem exacte recensuisse, scribit Vesalius lib. 3. cap. 14.

hæc tria ostendantur, processus mammillares & nervorum paria spectatorum oculis subijcere oportet.

Cerebri vsus Aristoteles y quandoq; scribit, cerebrum datum esse ad salutem totius naturæ; communiter tamen, vt calorem feruoremq; cordis moderetur, eique temperiem afferat; quam opinionem tanquam satis à Galeno z refutatam missam facimus; præsertim cum cor à perpetua respiratione a refrigerari possit. Quare cerebri vsum statuimus, vt sit animæ domicilium ad functiones animales sensificas, motrices & Principes edendas. Dein, vt in eius substantia spiritus animales elaborentur, & in eo b contineantur (animalis. n. spiritus, cerebrum fontē esse; Galenus c pronunciauit) indeq; ad omnia sensuū & motuum organa ferantur. Tum vt Nerui d & spinalis medulla ab eo prodeant. Nerui enim à cerebro e tanquam principio à quo & dispensationis f principio virtutē animalem & animam sentientem, eius medullæ insidentem accipiunt, & facultatē sentiendi & mouendi in instrumenta sensus & motus, tanquam canales spiritu animali vectore, distribuunt. Idem autem est spiritus animalis & specie vnicus, qui totā animā sentientem & omnes eius facultates in quamlibet corporis partem per nervos deuehit; licet varias functiones edat, idque pro instrumentorum varietate, in quæ à cerebro effusus, incurrit: quare si ad

y 2. part. anim. 7. cum omnia momentum requirāt contrarium, quo mediocritatem ac mediū assequantur; idcirco aduersus cordis sedem & calorem cerebrum natura molita est.

Hæc Aristoteles: datum hoc animalib. ad naturā totius salutē, idem.

z 8. vs. part. 2. addens: non enim cerebrū tam longe à corde Natura locasset, sed vel omnino cordi circumdedisset, quē admodum & pulmonē, aut

in thorace saltem posuisset: simile, est, inquit, hoc dogma, ac si quis dicat, calca-neum cordis causa extitisse: Archang. quoque & Laurent. argumenta Aristotelis refutant. a Galen. 8. vs. part. 3. sic erit, & Aristoteles ad calorem cordis refrigerandum, respirationem paratam esse voluit. b In toto cerebri corpore, non in soli eius ventriculo spiritus animalis multus continetur. 8. vsu part. 13. & 9. vsu partium 4. c 12. Meth. med. 5. at 3. loc. aff. 7. epilepsia, inquit, sit in cerebro, ingrediente humore animalem spiritum, qui in ventriculis eius continetur, quo mirus exire possit. d De dissect. nervor. 1. 1. vs. partium 16 8. eiusd. 13. e 1. vsu partium 16. f De formatione fœtus 4. 7. Plat. 3. vide cap. 32 partis 2. libr. nostr. de partibus similaribus.

oculos feratur, qui instrumenta visus sunt, visus fit:

si ad aures, auditus, &c. quod Aristoteles & eleganter ^{g s. Gener.} demonstrauit exemplo mallei: sic se habet (ait) spi- ^{anim. vlt.}

ritus in rebus à Natura institutis, vt malleus in arte ^{h Hipp. lib. de} fabrili, vnum scilicet instrumentum, quod ad plures ^{vuln. cap. sic} actiones vtile est: & Actuarius radiorum solarium ^{ait cerebrum} exemplo declarat: hi licet vniufmodi sint, dissimiles ^{& citissime} tamen & variegati pro colorum varietate redduntur. ^{& maxime}

Substantia cerebri licet sensus ^h & motus anima- ^{put sentit ma-} lis (non tamen naturalis) sit expers, vtriusq; tamen ^{le (1. ab illis} & ⁱ sensus motusq; voluntarij principium & origo ^{afficitur &} est, quod ex Apoplexiæ consideratione intelligere ^{alteratur)} possumus; Apoplectici namq; etsi sensuum ^k instru- ^{qua & in car-} ^{ne & in osse} ^{fiunt: sub te-}

Qq 2

menta

nissimo enim osse, ac modicâ carne cerebrum est hac parte, & plurimum cere- ^{brum sub syncipite iacet.} Et lib. de sacro morbo causam reddit, etenim cerebrum ^{propterea primū sentit,} quia etiam morbi in ipsum irruunt acutissimi & maximi ^{ac praeipue lethales &} qui difficile in dicationem habent apud inexpertos: Gal. ^{1. de caus. symp. 8.} Cerebrum sentiens instrumentum à Natura conditū non est, sed ^{quod ea qua sentiat, sentire possit.} Hoc est cerebrum conditum non est, vt sit par- ^{siculare sentiendi instrumentum,} vt sentiat solos cōlores, vt oculi: solos sapores, vt ^{lingua, &c.} sed cerebrum sentiens instrumentum à Natura conditum est, vt sen- ^{tiant ea qua sentit,} quasi commune sentiendi instrumentum, vt sentiat & calores ^{& sapores & odores, & sonos, &} tangibiles qualitates: siue vt sentiat & percipias ^{omnia obiecta sensibilia.} Quare cerebrū vniuerse sentit, non vero aliqua sentit, ali- ^{qua non sentit,} Archang. Aristoteles tamen cerebrum sensu tactus priuauit 3. hist. ^{anim. 19. & 2. part. an. 7.} Cerebrum sentit, sed obscure & exiliter, praesertim sensu ^{tactus, quia ei non inest instrumentum tactionis.} Tactus enim instrumentū men- ^{brana est, quare ex incisione dolorem nullum percipit.} Ergo sentit obscure, quia eius ^{substantia facultas tangendi, non autem instrumentum tactionis inest,} Arch. At ^{Fern. motus omnis à cerebri medulla, sensus vero omnis à meningibus manat, quia} cerebri corpus motu agitur assiduo, nullo tangendi sensu praeditum: contra, quae ^{ipsum ambiunt membrana immobiles per se sunt, praesertim crassa.} Tactu autē va- ^{lent exquisitissimo.} Sic in delirio & lethargo, qui affectus sunt cerebri nullus dolor: ^{at si humor acris aut vapor in meningibus effertur, grauis dolor excruciat.} Atq; spi- ^{na & nervi omnes medullam habent à cerebro, eamq; meningib. vestitam, qua sin-} gula talem vim & naturam habent, qualem ab oriū acceperunt. Ergo prior cere- ^{bri pars sensus, posterior motus principium est: meningibus autē tactus sunt origo.} Qui Nervi multā medullā conferti sunt, motus instrumenta sunt. Tangendi autē ij, ^{quos maiore ex parte meningibus protulerunt.} Hanc Fernelij opinionem Laurent. re- ^{futat lib. 10. quest. 10. 1. s. v. part. 4. & 3 de plac. k s. v. part. 6.}

menta omnia illæsa habeant, nihil tamen à cerebro ad sensibilem dignotionem assequuntur. Medullæ enim spinalis principio penitus obstructo, omnes partes subiectæ motum sensumq; amittunt: sic obstructo penitus neruo alicuius partis, ea pars sensu motuque priuatur: hinc sequitur, cerebrum animæ sentientis sedem esse, & sensus motusq; fontem: sensus quidem, quia sensibilibus omnium impressionem percipit: motus vero, quia imperium omne ad noxiæ fugam, aut vtilis persecutionem largitur.

Motu^l tamen naturali moueri statuimus & reliquis partibus motum voluntarium præbere: qui motus ipsi^m proprius & peculiaris ad animalis spiritus generationem, nutritionem & expurgationem. Dilatatur enim & constringitur, quod vulnera capitis, vbi insignis caluariæ portio, vt & meningum ablata est, sensui patefaciunt: & in recens natis in syncephite cerebrum tam conspicue palpitare conspicitur, vt etiam ossa, quæ eo tempore mollissima sunt, mo-

uean-

*l An mouea-
tur cerebrum,
varia opinio-
nes. Galenus
voluit, motum
perpetuum tri-
buens. 8. vsq;
part. 2. At
Vesalius re-
prehendens
Galenum &
recentiores A-
natomicos,
rationem con-
trarium di-
ctare asserit;
Galenus argu-
menta de in-*

strument. odoratus, de vtil. respirat. & 12. vsq; part. allata non esse tanti momenti, vt persuadeant, motum in hoc viscere esse. Obstare enim totam ipsius substantiam, nec sensui assequi potuisse, neque in viuorum brutorum anatome, neq; in maximis capitis vulneribus. Fallop. in obseruat. ait: adesse audacter non negarem, sed aut ob ipsius paruitatem, aut aliam ob causam nunquam assequi potui. At in instit. continuo moueri dicit. Plat. vero sic: sinus tertius, arteria alicuius instar pulsat: quod cum in tenellis caluarijs, antequam penitus coalescant, in vertice tactu deprehendatur vt cerebrum moueri multi falso crederent, occasionem præbuit Columb. Archangel. & Laurent. perpetuo moueri, probant exemplo vulnerum capitis: addit Laurentius, Neminem, nisi amentem aut in re Anatomica omnino imperitum, negaturum. m Mouetur non animali & voluntario motu, non violento, sed naturali, eoq; tum proprio & peculiari, tum alieno, arteriarum quippe, Laurent. At in quæst. 9. lib. 10. cerebri corpus propria vi & insito matre respirare existimat. At Archangelo, cerebrum sponte & ingentia vi mouetur, non vero motu arteriarum assiduo, quia hæc exiles nimium & parua quæ superne feruntur: quæ vero intro subeunt, longe adhuc exiliores & minores, per tenuem meningem decurrentes: quæ illa quia exiles, & cerebri substantiam non attingunt: hæc vero ob paruitatem, cerebrum una secum mouere nequibunt, & subiungit, omnium motuum in hominibus fontem esse cerebrum, & cor à cerebro moueri ostendit.

ueantur. Dum dilatatur ⁿ ex sinubus (alijs ex plexu arteriarum carotidum) spiritum vitalem & è nari-
bus aerem attrahit, ad spiritus animalis restitutionē
& custodiam; dein vero se cōtrahit, ⁿ animalem spi-
ritum in cerebri substantia elaboratum per nervos
tanquam canales in sensuum & motuū organa pro-
pellit; vel ut aliqui ⁿ volunt à superioribus ventricu-
lis coarctatis in tertium & quartū, & tandem in sen-
suum & motuum organa protrudit: qui cum in par-
tes peruenit; spiritum animalem parti infixam nu-
trit. Nam spiritus animalis per nervos in omnes par-
tes influit, non solum ut sit vector animæ sentientis
& motricis, verum etiam, ut spiritui animali parti-
bus infixo nutrimenta præbeat: hicq; spiritus me-
dium est, per quod omnia sentiens, eiusq; facultates
omnes, cum incorporeæ sint, cum corpore iungun-
tur; exteriores quidem, cum instrumenta longius
remota habeant, nervis tanquam canalibus indi-
guere, per quos spiritu vitali vectore in ea ducere-
tur: Interiores vero cum instrumentum proximum
habeant, nervis non indiguere, sed per cæca spiracu-
la eodem spiritu duce in illud feruntur.

Spiritus animalis materiam ^o censemus sangui-

Qq 3

nem

tum influat; quod igitur cordi valvula, id cerebro glandulam & glutia condu-
cere. ^o De generatione spirituum animalium diuersæ sunt opiniones. I. Galeni
fuit, ex spiritu vitali per arterias carotidas delato & aere inspirato fieri: Verum
quo ad locum generationis, nunc in plexu, nunc in ventriculis generari scribit, nūc
in cerebri substantia & corpore contineri. II. Vesalii ex spiritu vitali à corde
transmisso, & aere per inspirationem attracto, in cerebri dextro sinistroq; ventri-
culo ex ipsorum cōmuni seu tertio, vi à cerebro acceptā, elaborari. III. Columbi
ex aere attracto in frontis & cunealis ossis cavitate alterato, per foramina eth-
moidis ossis ad superiores ventriculos delato, & vitali spiritu à corde per arterias
carotides sursum delato & in plexu conformi qui in ventriculis est, effuso, & ob
assiduum cerebri & huius plexus motum commissis, animalem spiritum generari,
in plexu conformi, qui in ventriculis est, suumq; inuentū esse dicit. IV. Argen-
terius unicū spiritum ir fluentem statuit, cuius argumēta sufficienter sunt à Lau-
rentio refutata. V. Varolus voluit in cerebri substantia elaborari, & spiritus,

*n Archang.
& Laur. ve-
rū addit Ar-
chang. dila-
tationis tem-
pore viam ex
tertio ventri-
culo in quar-
tum connue-
re & à glan-
dula inter glu-
tia prolapsa
intercludi, ut
nihil spiritus
possit ex quar-
to in tertium
remigrare:
contra in con-
tractione glā-
dulam subla-
tam, ipsiſque
glutijſ didu-
ctis viam pa-
tere, quā spi-
ritus ex sinu
tertio in quar-*

per quas cerebri operatio-
nes optima per
ficiuntur, in
cerebri sub-
stantia molli
residere, nec
cavitatibus
indigere: ostē-
dit hoc exem-
plo: dū unum
oculum clau-
dimus, spiri-
tus animalis
statim ad al-
terum refluit,
ita ut eius
pupillam ma-
gis dilatat ta-
men inter u-
num & alte-

nem arteriosum spiritu vitali perfusum & aerem per
nares inspiratum: cuius generationem dicimus cum
Varolo talem esse: Spirituosus tenuiorq; sanguis per
arterias carotides à corde sursum defertur ad cere-
brum, in cuius crassæ meningis sinus, dum dilatan-
tur (quemadmodum è venis sanguis) infunditur:
hinc aer, qui inspiratione per nares attractus, & per
ossis spongoidis foramina cerebrum subit, permi-
scetur, hæc permixta in ipsis vasis, dum per cerebri
anfractus feruntur, alterantur & præparantur, ab
excrementis pituitosis repurgantur, & dum cere-
brum alit, subtiliorem partionem ipsius substantiæ
infundit, quo is in cerebri substantia medullari in
spiritum animale[m] subtilissimum elaboretur, & spi-
nali medullæ ac nervis totius corporis cōmunicetur.

De Cere-

rum oculum nullus ductus reuera peruius, præter poros insensibiles in omni nervo
& cerebro existentes. Plat. communis opinio, animale[m] spiritum in plexum cho-
roide gigni & contineri: at cum hæc vasa adeo exigua sint, totq; cerebri excre-
menta per ventriculos defluant, approbare non possumus: dein etiam quid spiritus
animalis cum cerebri substantia colligatur, ut nullibi illa sine spiritu, neq; spiritus
animalis sine cerebri substantia in parte incolume consistere possit. Quare in sub-
stantia cerebri etiam elaborari voluit, eo modo, quo in textu monuimus. VI. Ar-
changelis sententia: spiritus animales ex spiritu vitali multis alterationibus & ex-
citationibus ab arterijs, qua & contextum admirabilem & contextum choro-
ide[m] componunt, immutatum, in cerebro & à cerebri substantia summū perfectio-
nis characterem acquirere, ita, ut fiat conuenienti primum anima sentientis vehi-
culum: hoc modo, ut inchoatio sit in admirabili contextu; at in plexibus choroidi-
bus omnimoda perfectio, ut tamen à cerebri medulla, cum ei tantum insita sit, ac-
cepta: hos absolutos in ventriculos (qui nil ad ipsius generationē conferant) quare
in ijs generari negat, tanquam promptuaria effundi, conseruari & in omne corpus
distribui. VII. Laurentio, spiritus animales ex spiritu vitali & aere inspirato
generantur, quorum præparatio est in plexibus arteriolarum labyrinthicis, & in
superioribus ventriculis; elaboratio maior in tertio, perfectio vero in posteriore
ventriculo fit; tandem & in nervos, & in totum cerebri corpus diffunditur. El-
reprehendit eos, qui asserunt, spiritum hunc in plexibus propriam formam & spe-
ciem consequi.

DE CEREBELLO.

CAPVT XVI.

De Cerebello egit Galen. 8. vs. part. 13. 9. Adm. anat. 4. at
de eius processibus 8. vs. part. 14. 9. adm. anat. 5.

CEREBRI totam massam in Cerebrum & Cerebellum diuidi, superius ostendimus; cuius diuisionis causam hanc Varolus censuit; cum interea quæ sensibus apprehenduntur, duo sint præcipua, inuicem plurimū distantia, & ita intellectui proxime ambo deferuientia, vt sibi mutuo subalternari possent, minime videantur, quorum vnum ad visum, alterum ad auditum spectat; & quia visio, mediante humido & aqueo perficitur, vt in oculis videmus, ideo in gratiam præcipuam specierum visibilium ea cerebri portio facta est, quæ mollior est, & adeo magna, vt fere totā caluariam repleat, quæ pars proprie Cerebrum dicitur. Quæ vero per sonum siue resonantiam apprehenduntur, cū aliquam ariditatem postulent, vt optime Hippocrætes agnouit (vbi enim sola humiditas adest, vel nulla vel exilis fit resonantia) sub cerebro in capitis parte posteriore minor & densior quædam portio, quam Cerebellum appellant, posita fuit, quæ sicut reuera Cerebro durius est, a conse-


a Durius cerebro propter
neruos duos,
at ex parte

Qq 4

quen-

posteriore mollis nervus penitus nullus producitur: ex anteriori autem duos quosdam produci fuit necesse, ex quibus sunt opinor, qui oculos sunt moturi. 8. vs. part. 6. totum cerebellum duritie multum à cerebro dissidet. 8. vs. part. 12. nullum notatum dignum discrimen cerebelli cum cerebro in duritie, cum tenui membrana liberatum est, Vesal. Minime durior eius substantia, quicquid Galenus dicat; & nullum nervorum par à cerebello exoritur, sed à cerebro solum, quicquid Galen. opinetur, qui cerebrum durius voluit, vt nervi duri & spinalis medulla inde exorirentur, Columbo: à cerebello nullus omnino, vel minimi nervuli propago oritur, Vesal. Cerebro & cerebello eadem spiræ, eadem substantia, eadem consistentia, idem motus, dotes, vires, proprietates, Archangel. Postremum iungitur cerebellum, quod formam habet diuersam, secundum tactum & visum (tactum & speciem habet Gazæ) Aristot. 1. hist. 16.

TABVLA XII. Fig. 18. *Caput à dextris non-
 nihil subleuatum, cum cerebri portione, cerebello exem-
 pto, quò olfactus organa demonstrentur. Fig. 19. Caput
 occipitio innitens, cerebri portione in posteriora de-
 pendente, quò olfactus organa, nerui optici
 & arteriæ carotidis rami conspi-
 ciantur.*



quenter etiam aridius existit. Quare cerebrum præcipue in gratiam visibilium, & cerebellū in gratiam specierum resonantium, aut rerum sono repræsentatarum constructum est. Et quia visus præstantior est auditu, plurimasque rerum differentias nobis subministrat, ideo ipsi cerebello supereminet. Sed ad rem.

b *Aristot. 1. hist. an. 16. Galen. 8. vs. part. 6. Sic enim Hero-philus appellauit, quidam vero ἐγκεφάλινον & ἐγκεφαλον. 8. vs. part. 11. ἐπεγκεφαλινόν. Erasistrato. 8. vs. part. 13. ὁπίσθον ἢ λέγουσιν ἐγκεφάλον, ἢ ἐγκεφαλινόν, ἢ παρεγκεφαλίδας voces nil refert. 9. adm. an. 2. & 4.*

c *8. vs. part. 11. 12. & 13.*

d *Sic & Vesal. & Plat. cerebellum ex multis & his admodū paruis corporib non tamen simili, quo cerebrum, modo, conflatum est, 8. vs. part. 13.*

Cerebellum παρεγκεφαλὶς ^b & ὀπίσθαν, siue posterius ^d cerebrum, veluti priuatum & paruum cerebrum dicitur; quod in posteriore & inferiore caluariæ parte sub cerebro situm est: [t. 9. f. 8. RR.] & à cerebro vtraq; meninge intectum sciungitur (in brutis rotundum & acuminatum totam fere occipitij regionem occupat) & spinali medullæ exiguo spatio, vbi ad medullam cōstituendam portionem præbet, vnitur. Continuatur vtrinque ad eius latera duabus portionibus orbicularibus [t. 9. f. 8. iuxta F. G.] ipsi vero spinali medullæ committitur mediâ sede portionem posteriore [t. 10. f. 9. E.] tenuis meningis interuentu & ne quartus ventriculus illic dehiscat, tenui meninge ad nates vsq; expansâ obuoluitur [t. 9. fig. 8. inter O. P. Q.] Separatur autem à cerebro, quod per crassam meningem vasa in profundum cerebrū tuto vehantur.

Forma latius est, quàm longum, aut profundum, & parte inferiore ac posteriore globilatoris imaginem exprimit, in cuius medio acuta impressio, ab ossis occipitij tubere prominens; antè vero versus cerebri nates, in acutum quasi fertur, & figuram loci causâ habet.

Tribus ^d ex partibus (nequaquam tamen diuisis, sed continuis) efformari videtur, dextrâ, sinistrâ & mediâ, propter occipitis ossis tuber, de quo capite de ossibus diximus; dextra & sinistra duos globos inuicem adpositos quodammodo refert [t. 10. f. 9. B. D.]

in quo-

in quorum medio, vbi globi se non contingunt, tertia pars teres, quæ à prioribus in posteriora veluti in orbem ducitur, quæ vermiformes processus constituit, reponitur; & ratione harum partium impressiones quodammodo triplices sunt, aliæ transuersæ & ordine per ipsum ductæ, aliæ deorsum protensæ vtrinq; quasi in centrum & ad cerebelli sedem colliguntur. Nam oblongas lineas paulo minus, quam superficiarias frequentibus tamen & continuâ serie deductis, & tenui meninge interceptis obtinet: superficiariæ quidem sunt, quod facile à profundioribus anfractibus cerebellum ad ventriculum vsque perforarent; frequentes autem vt leuam illam penetrationem copia suppleant. Longis vero flexibus & anfractibus, quibus cerebrum donatur, destitutum ^c est.

Substantia pene eadem est cum cerebri substantia, si cerebellum tenui meninge denudatum perpendamus, exceptâ cerebri basi; vnde spinalis medulla prodit, quæ omnibus cæteris partibus, & iam ipso cerebello durior existit: ita & spinalis medulla sensim durior euadit, & nec colore, nec duritie cerebello correspondet: cum cerebellum magis flauum, cinericcumve ^f sit, & solum in sinus superficie albicans, ipsa vero spinalis medulla albissima, quemadmodum & cerebri basis, quæ ei principium tribuit. At copia longe ipsi cerebro cedit, & alijs quadruplo, alijs decuplo minus censentibus.

Sinum habet in medio latum, non autem profundum, qui quarti ventriculi elatiorem sedem efficit, cum reliquam sedem tenuis meninx obducatur [t. 13. f. 21. H.] Intrinsecus vero nullas cavitates, vti cerebrum obtinet, cum tot excrementis non abundet, & quæ colligit, facile extrinsecus deponat.

Processus ^h duos obtinet [t. 13. f. 21. C. D.] qui cum figurâ

c In cerebro
& cerebello
eadem spiræ,
eadem substantia, &c.
Archang.

f Magis pallet. Plat.

g Decuplo aut undecuplo minus, Vesal. quadruplo minus.

Fallop. in obseruat.


h Processus quatuor in ambitu sinus prodeuntes, duo latera occupant, medulla cōtinua: duo vermiformes processus dicuntur, Plat. duplex ipsius extremum alterum in priore parte conuoluitur: alterum vero retro nec dum apparuit. Gal. g. adm. an. 5.

TABVLA XIII. Fig. 20. Caput in aurem reclinatum asseruatâ tantâ cerebri portione, quanta pro Neruorum paribus demonstrandis opus fuit. Fig. 21. cerebellum caluariâ exemptum & supinum, cum processibus vermiformibus separatis, exhibetur.



14

XXI.



i s. *vs. part.*

14.

k Ligni ca-
seive vermem
referunt, Ves-
sal.

l Vermis cor-
pusculum ob-
longum mem-
branosum est,
quod Galenus
cerebri parti-
culam esse vo-
luit, quod non
est, nec de ce-
rebri substan-
tia, quando
quidem cere-
brum medul-
losum est, ver-
mis vero mē-
branosus: ni-
hil enim aliud
est, quam te-
nuis meninx,
corrugata at-
que plicata,
quam in cere-
bri dilatatio-
ne necesse est

figurâ σκωληνί, id est, i vermi in ligno^k. canoso sint
similes, σκωληνκοειδείς ὁπιδύσεις, i vermiformes excre-
scentiæ seu processus dicuntur; quorum alter ante-
riorem, alter posteriorem sedem ventriculi, qui cere-
bello & spinali medullæ communis est, respicit. Hi
multipliciter i orbiculati sunt, cum ex multis parti-
culis, non obliquis, aut rectis, sed transuersis tenui
i membranâ^l copulatis, constent, quorum extremi-
tas i seu apex conuexa ac tenuis est (quod corpuscu-
lum^m ciceris magnitudine dicitur) & cavitatem ci-
sternam dictam, imo quartum ventriculum ingre-
ditur. Horum vnus parte anteriore [tab. 13. fig. 21. C.]
Natibus adiacens censetur à Galeno tertijⁿ dicti
ventriculi meatum in quartum apertum retinere: &
voluit i hunc processum, cū secundum totum mea-
tum extendatur, ipsum totum obstruere: retro au-
tem in orbes (cuius nomine ex particulis transuer-
sis, non vero oblongis, aut rectis, non enim retro
transuersis flexibus reuolueretur, componitur) re-
flexa, conuexis suis particulis membranam connat-
tam abstrahit & meatū totum tantum aperit, quan-
tum retrorsum cesserit: dum enim reflectitur, & in
sphæræ modum rotunda fit, & in seipsum confidet,
quantum longitudo minuitur, tantum latitudo au-
getur. Quare ait Galenus i hos processus nec cras-
siores nec tenuiores esse debuisse: à crassitie enim

meatus

extendi: in eius vero contractione plicari ac corrugari. Quoniam enim cerebra eo-
rū, quæ de viciis migrariūt, contrahuntur, conuient & in se se concidunt; hinc fit,
ut in defunctis pia mater corrugetur ea parte, crassiorq; appareat præ humiditate
in ea declinæ parte collecta, quæ plurima ibi tenuis meninx imbuitur. Itaq; vermis
ut vermis est, nullius usus est (nec datus, ut foramen intercludat) nisi is qui est
ipsius tenuis meningis, Archang. m Arantio in suis obseru. n Totum meatum
contegit, Gal 9. adm. an. s. Non scio, cur Galenus hunc processum inferiorem mea-
tus ex tertio ventriculo in quartum pertinentis orificio præfectum velit ac velut
altioris tantum processus apicis ve munus explicauerit: & haud scio anteriorem
an posteriorem iudicauit Vesal. o συνδῆσµος, quæ Anatomi τένοντες vocant;
ita vocant, qui magis in Anatome versati sunt. s. *vs. part.* 14. & 9. adm. an. s.

meatus claudi exacte nequiuisset, eò quòd partibus suis tenuissimis ad meatus angustias non peruenissent : à tenuiore autem nec exacte claudi, nec probe aperiri potuissent. Ne vero in meatus penitus dilabantur vel vagentur, Natura vtrinq; natibus tenuibus corporibus, quæ ab Anatomicis ° tendines dicuntur, illigauit, & coniunxit, quæ à tenui membrana, non tamen imbecillâ quâ tectæ sunt, prodeunt, quæ sane membrana ad posteriorē ventriculū exporrecta huius p̄cessus finis est. Hæc Galenica, quia considerationē merentur, p̄sertim si consueto modo cerebri sectio instituat, hîc recensere volumus.

Alter processus [tab. 13. fig. 21. f. D.] qui posterior est & antrorsum ex posterioribus vergit, non vt anterior prominet, sed suo mucrone in cerebelli sinus substantiam magis absumitur. Vsum prioris volunt, spirituum p̄ transitui præesse: alterius, ne quarti ventriculi ductus (quem cerebelli ventriculū Galenus q̄ vocat) à cerebello pressus, obstruatur. Verum hunc vsum vtriq; communem censemus, siquidem hic meatus nunquam occludi debeat, sed perpetuo patere, quo animalis spiritus in spinalem medullam perpetuo influat.

Ad latera duæ adhuc occurrunt portiones, quæ spinali medullæ continuantur [t. 13. f. 21. G G.]

Vsus cerebelli alijs c̄ videtur, vt inde duriores nervi prodeant: alijs eiusdem t̄ cū cerebro naturæ, cum quo eandem facultatem possideat: alijs u in hoc non minus, quàm in toto cerebri corpore spiritum animalem contineri volunt alijs, x qui cerebrum p̄cipue in gratiam visibilium constructum volunt, cerebellum in gratiam specierum resonantium factum statuunt.

De nervorum futurum erat principium, mediq; illa internalla, qua partes eas connectunt, spiritus esse vias. 8. v. part. 13. x Varolius.

p 8. v. p. 14.
q 8. v. part. 11. 12. & 14.
r Vesal. nulli motu aut officii aliud tribuit quàm reliqua cerebelli substantia. Col. utriusq; vsus ne 4. ventriculus à cerebello pressus illius substantiam obruit. Plat. processum quatuor vsus, ne quartus ventriculus comprimitur.
f Gal. 8. v. p. 6. negant Vesal. & Col. t Plat. Archangel.
u Postquam in toto cerebri corpore, non in solis eius ventriculis spiritus animalis multus continetur, existimare oportet plurimum æt in cerebro posteriore ipsius contineri, ut quod omnium qui in totum corpus distri-

DE

DE SPINALI MEDULLA.

CAPVT XVII.

De hac egit Galenus 12.vsf.part.11. & 15. sic 13.vsf.part.8.

MEDULLÆ nomen proprie quidē de ea substantia dicitur, quæ simplex, humida, pinguis, alba, sensus expers, in cauis ossium contenta, quæ ex sanguine in ipsas cauitates per venas illabēte ortum ducit : candida autem, & veluti spermatica euadit, eiusmodi mutatione ab ossibus accepta : quod intra cauitates ossium reponitur, vt ossium proprium sit nutrimentum, & ossa motibus aut alijs de causis violentis incalescentia & arefacta, reficiat; sed de hac proprie dictâ sermo nobis non est. Improperie vero dicitur & de cerebro, & de eius spinali medulla. Nam & cerebrum, ἐγκεφαλος, μυελὸς ἐγκεφαλίτης medulla cerebralis, dictum est, quod eius substantia, vt ait Plato, medullæ quædam species sit; à qua tamen plurimum differt, quod nec liquefieri, neq; absumi, vt illa, possit, & duplici meninge inuestiatur : Alij vero non ἐγκεφαλίτω, sed μυελὸν ἐγκεφάλου maluerunt appellare. Dicitur quoq; de spinali medulla, quæ propriæ substantiæ nomine, vt ait Galenus, sic dicta est: quamuis proprie dicta medulla à spinali medulla differat plurimum: Substantiâ, cū ossium medulla impense sit humida & propriæ fluxilis & adipi similis: colore, cum non ita alba sit, vt spinalis: inuolucris, cum in ossium solum cauitatibus seu porositatibus contineatur : Spinalis vero tria obtineat inuolucra, & ob id solum, quod extra vertebrae tanquam intra ossa contineatur, & ob aliqualem substantiæ similitudinem, medulla dicitur: vsu denique, cum in ossium cauernis nutriendi gratia contineatur. Quare ad differentiam alterius, ab alijs ραχίτης, ^a spinalis; ab alijs νωτιαῖος, ^b dorsalis, alijs δευχένιος, alijs φοίτης dicitur,

^a Gal. 12. vsf. part. 11.

^b Hippoc. de carnibus, medulla, quam dorsalem vocant, à cerebro ducitur, & neq; in ipsa multum pinguis, neq; glutinosi inest, non aliter, quam cerebro, eamq; ob causam neq; medulla nomine vere donatur: neque enim reliquarum ossium medulla similis est, cum sola membranas habeat, quas alia medulla non habet.

dicitur, cum per cervicem, dorsum lumbosque descendat, & totam spinam impleat.

Iã vero & spinalis medullæ acceptatio duplex est: nam latiore significato, totam cerebri medullam oblongatam significat, cuius pars altera adhuc in cranio continetur [t. 14. f. 1. à D. ad E.] altera vero priori tamen continua occipitij foramen magnum egrediens, ad spinæ extremũ descendit [t. 15. f. 1. ab A. ad H.] strictiore vero magisque propriã, eam medullæ partem, quæ extra cranium in spinæ totius vertebrais continetur, notat [t. 15. f. 1. expresse exhibet.] Quare, vt omni ambiguitate careat, rem explicemus.

Cerebrum vulgo appellatum, seu substantiam illam cranio inclusam diuisimus ^{c Archang.} in corticem & medullam, siquidem colore & consistentiã discrepent, ^{diuidit in cerebrũ & medullam: cerebrum vocat} illa quæ medullam vndiq; cingit, cinerea est: medulla vero alba sit & solidiore, firmiore & compactiore ^{partem cineritiam alba circumf. sam;} substantiã; quæ duæ partes in recentibus capitibus, ^{medullã vero cerebri partem mediam albam, &c.} lineis quibusdam obliquis varijs distinguitur, ita vt scalpello separari possit, si summa dexteritas adhibeatur, sed non sine diuulsione vtriusque substantiæ: nam, vt recte Archangelus, alba demersa est in cineritia, quemadmodum cristallinus in humore vitreo, & quemadmodum vitreus, cristallini alimentum creditur, ita cineritia substantia, albæ pabulum iudicari possit: cum cineritia idcirco talis appareat, quod innumerabiles venæ per eam diffeminentur.

Medulla vero ipsa duplex constitui potest, altera globosa, altera oblonga. Globosa, quæ cranij figuram æmulatur, magnâ mole constat, in qua ventriculi excauati sunt, & ab hac altera, continua tamen, propendet, de qua parte, ex communi Anatomicorum sententia iam dictum fuit. Medulla vero cerebri oblongata, caudicis vel baculi instar ratione situs diuidi potest, in eam partem, quæ oblongata intra

R r

cranium

TABVLA XV. Fig. 1. Spinalis medullæ proprie dictæ vera effigies cum suis membranis & Nervis ab ea prodeuntibus. Fig. 2. spinalem medullam nudam tam in cranio, quàm extra cranium existentem, prout alij proposuere, cum suis nervis exhibet.

FIG. II.

FIG. I.



d 8. v. p. 10.
Opiniones de
origine spina
lis medulla.

1. Hippocr. de
carnib. à cere-
bro & Galeno
ex posteriori
cerebri ven-
triculo.

2. Vulgaris à
cerebello.

3. Vesal à ce-
rebri basi.

4. Archang.
à cerebri me-
dulla globosa
parte media
inter cerebrū
& cerebellū:
qui enim du-
plex principū
dicunt, nihil
dicunt.

5. Plat. à ce-
rebri basi,
veluti nouū
cerebrum ob-
longum & à

cranium conclusa continetur: & in eam, quæ cra-
nio iam excidit, & propriè spinalis medulla dicitur,
quamuis nonnulli totam. cerebri medullam oblon-
gatam spinalem seu dorsalem medullam vocitent: de
hac sermo est.

Spinalis ergo medulla in lata significatione, ori-
ginem sumit ex Galeni sententia^d ex posteriore ce-
rebri ventriculo, nihil enim aliud, quàm cerebellum
oblongatū censuit (hinc alijs^e oblongatū cerebrum
appellare placuit) & solis cerebri^f partibus, quæ ad
basin pertinent, continuam fecit: at vulgus, falso ce-
rebelli processum credidit, qui per totius spinæ ver-
tebras feratur; sed reuera tam cerebri, quàm cerebel-
li productio existit: ex quibus tanquam ex radice,
caudex procedat, vt infra monebimus.

Hæc caluariæ sinum, supra magnum occipitij fo-
ramen, cerebello (cui continuatur) subiaccens, occu-
pat; & principio suo, seu parte vnâ in cranio hæret
[t. 14. fig. 1. D. ad E.] quod longitudine quatuor trans-
uersos digitos æquat: latitudinis & altitudinis g cir-
cularis & mediocris, à qua Nerui cerebri^h dicti cum
olfactus organis, in quinque sensuum organa propa-
gati producuntur.

Medulla vero spinalis propriè dicta, siue alter
pars illi tamen continua [tab. 15. fig. 1.] extra cranium

confi-
cerebello nouis viribus adaugetur. 6. Columb. nihil aliud, quàm cerebrum ob-
longum, duplex habens principium, maius à cerebro emanans, à cerebello minu-
quod à cerebro est, unicum est; quod à cerebello bifidum, & sic in dextrum & si-
nistrum diuiditur; maior ab anteriore cerebri parte, à nervorum opticorum regio-
ne parum distans, quare fateri cogor. 3. 4. 5. 6. 7. & 8. par non à cerebro, sed à spina
medulla exoriri. 7. Varolo, exeunt à cerebro & cerebello quatuor radices iun-
cum insignem constituentes, quem spinalem medullam vocant, ex qua produ-
nerui ad singulas corporis partes. Laur. à cerebri & cerebelli substantia tanquam
radice caudex profunditur. c. Medulla cerebri oblongata, Archang. in Eccl-
siaste funis argenteus dicitur: illius autem conceptaculum, fistulam sacram dicunt
f 8. v. sup. p. 12. g Mediocris ouis gallinæ latitudinem & altitudinem a que
Archangel. h Varolus, Plat. Archang. Laurent. Dominicus Leonus.

consistit : nam vbi ad magnum occipitij foramen medulla cerebri oblongata peruenit [*tab. 11. fig. 17. H.*] egreditur & per vertebrarum spinæ foramina, vsque ad extremum ossis sacri defertur. Per ossa, inquam, ne cum mollis sit & alterius cerebri instar (vt Galenusⁱ loquitur) ab incidentibusⁱ violetur, sed ipsi via^k sit & firmum^k præsidium : ideo Græci hanc spinæ partem perforatam, *ἱερὰν στήλην*, sacram fistulam appellarunt ; sacram, quia principem partem continet ; fistulam, quia est veluti fistulans, per quam huiusmodi substantia ducitur, à qua cæteri nerui omnes propagantur.

Membranis^l tribus, ^m quas *ἐλوترὰ* Hippocratesⁿ vocauit, inuestitur : quarum prima ex Galeni decreto oritur, ° à ligamento valido exacte anteriores vertebrarum partes colligante, quæ parte posteriore in tunicam desinit P neruosam ac fortem ; ne inflexione P vel extensione spinæ frangatur, vel ab ossibus lædatur, cum non, vt cerebrum, in osse immobili, sed in vertebris, quæ varie mouentur, cõtineatur : quare & nerui ipsi spinalis medullæ propriæ dictæ, ne ab ossium, per quæ transeunt, duritie lædantur, præter duas meninges, & hac tertia donari voluit. Huic humor crassus & viscosus circumfusus est, vt & omnibus articulis & partibus q quas moueri oportuit, ne exiccata dolerent, & sic actiones labefactètur. Altera à crassa, tertia à tenui meninge prodinata [*tab. 15. fig. 1. tunicas iunctas exhibet*] quæ duo non

Rr 3

vtin

i 13. vs. p. 8.
k 12. vs. p. 15.

l *Spinalis medulla mem-*
branas Gale-
nus de disse-
ctione neruo-
rum & art.
9. meninges
vocaluit.
m *Triplici*
Galeno, cui
hac tertia est,
Vesal. Col.
Archang. du-
plici membra-
nâ obuolui-
tur, Plat. &
Laurent.
n *Libr. de ar-*
te & Galen.
de dissectione
venar. & ar-
ter 9.

o *Validum membraneum q, involucreum, sed unde oriatur, non dicit, Vesal. Membrana tenuis & tunica tenuis, quam Galenus ligamentū vertebrarū existimauit, quod falsum est : nam vertebra proprio ligamento non destituuntur (sed unde sit non dicit) Columbo : ab osse occipitis nascitur, quo loco vertebris committitur, & ad imam spinam cum meningibus excurrit, Gorraus, tertia firmissima membrana vinculi robustissimi imaginem referens, Archang. p 13 vsu part. 9.*
q *Naturam imitati homines, currum axis succo humido ac viscoso, quo celerius moueantur, iungunt.*

vt in cerebro separatæ sunt : & illa medullam tegit & aduersus ossa tuetur : hæc vero vasa ipsius colligat & substantiam mollem constringit : per tenuem namq; venæ & arteriæ medullam nutrientes spiritumq; vitalem affundentes mittuntur, quas à lumbaribus & venis & arterijs produci obseruauimus, quemadmodum in infimi ventris historia libro primo cap. 20. & 21. monuimus.

2. 9. v. par.

21. 14. eiusdem 5.

Substantia ^r est cum cerebri basi vel potius medullâ globosâ, communi : quare duriuscula, compacta & alba : ita tamen, vt multo sit durior, quàm cerebri; & Galenus ^r spinalem medullam duriorum neruorum, molliorum vero anteriorem cerebri partem, principium dixit : siquidem ad ^r motionis robur, productione durior : sicut ad sensum exactiorem, productione cerebri molliore opus fuit : Et quanto magis à cerebro recedit, tanto durior & compactior redditur. Sic nec colore, nec duritie cerebello insidenti correspondet; siquidem cerebellū duntaxat in sui sinus superficie candicans est, aliàs magis flauum cinericeumve : spinalis vero medulla albissima ipsi cerebri medullæ similis, sed omnia fractu destituitur, est quòd tantum recipere, nihil amplius elaborare debuerit.

1. 13. v. par.

sim 8.

Hæc cū cerebro ^r communia habet substantiam & quòd Neruorū etiam sit principium (inquit Galenus : imò omnium) dupliciq; meninge obuoluitur. Propria vt ^r (aiunt) cum cerebrum & pulset & moueatur, etsi osse immobili contineatur, ipsa vero medulla licet à vertebra mobilibus contineatur, ipsa tamen non mouetur. At si motus ille vi ingenitâ cerebri substantiæ inest, & medulla spinæ eandem naturam & substantiam sit adepta quæ cerebrum, rationi consonū, vt etiam medulla motu assiduo, quo cerebrum moueatur, quanquam sensui non sit conspicuum;

spicuum; huic autem motum tributum censuit Archangelus, vt cum dilatatur, à quarto ventriculo spiritum animale accipiat; quando vero constringitur, illum in neruos à se prodeuntes effundat.

Figurâ oblonga est, crassa & ad exortum amplior [tab. 14. fig. 1. à D. ad E. tab. 15. fig. 2. ab A. ad D.] quæ collecta, etiam si paulo fiat angustior, non tamen, vt creditur, ^t sensim ac sensim vsq; ad extremum ossis sacri semper attenuatur: imo ad lumborum vsq; vertebrae [t. 15. fig. 1. B. C.] æqualem vero crassitiem ^t feruat: Nam in illis partibus, à quibus magni nerui p-
deunt, crassior ac plenior est, vt in ceruice, vnde magnorum illorum neruorum, qui per brachia feruntur [tab. 15. fig. 1. ad I. & K.] & lumborum maximi nerui, qui ad crura descendunt [tab. 15. fig. 1. ad B. C.] plenior & crassior medulla reperitur: ipsius tamen substantia medullaris paulatim imminuitur, vbi ad os sacrum accedit.

Cauitas ^u seu sinus mox ab exortu, huic medullæ in ipso adhuc cranio existenti, insculptus, qui calamo scriptorio similis, hinc calamus scriptorius dicitur, [tab. 10. fig. 10. K. L. N. O.] siquidem in cuspidem exacuat, & calamum scriptorium, prout in Alexandria adoptantur, refert, ^x & minor sensim reddatur, propterea, quod, inquit, nulla excrementa amplius hic redundant. Hic quarti vetriculi cerebri mediam partem constituit; alterius enim pars à cerebello efformatur [tab. 13. fig. 21. H.] quo loci cerebellum huic medullæ committitur [tab. 13. fig. 21. G G. committitur ipsi B. C. in tab. 10. fig. 10.]

Et quamuis vnica sit ^y & nullam cauitatem manifestam

Rr 4

festam

^t Galenus & Vesal. in hoc decipiuntur, existimantes, spinalis medulla substantiam neruis gignendis assumi, Col. Non sensim gracilescit, Fallop. in obs. Plat.

^u Hac cauitas quarto ventriculo subiecta est, ac continuata, in quam à quarto ventriculo spiritus influat animalis; ab hoc fit distributio: spiritus animalis, in quinque fere

organa sensuum, Archang. ^x Vide 9. admin. an. 5. ex altera parte calami scriptorii caput bubulum spectatur, cui nomen imposuit: Posthius in notis ad Columb. ^y Costa in duas partes citra dilacerationē diuidi potest, & cum in medio aliquod spatium appareat, multi illi cauitatem assignare voluerunt, cum inferius nullam cauitatem obtineat, Plat. emanatam dicimus, quæ cauitas, cum satis in fig. is sit.

non pauci de-
cepti eam bi-
fidam esse cre-
didere, Ar-
chang.

z Hominis
medulla ad
thoracis me-
dium simplex,
at indiuisa,
Vesal. in bru-
tis ad extre-
mum vsque
medullaris;
in homine ad
lumberū ini-
tiū vsq; dun-
taxat medul-
lam refert,
Columb. in
homine, non
brutis, Ar-
chang.

a Ad sextam
vel septimam
thoracis ver-
tebram, &
nonnihil in-
fra, Vesal. ad
lumberū ini-
tium, Col. se-
de infernā,
Plat. Ad dor-
si fines, Laur.

b 12. vs. part.
15. hic notetur
propria spina-
lis medulla
acceptatio.

c Simplex nulliq; associata est Gal. de ossib. 12. de dissect. nervorum 5. d Quanto
magis spinalis medulla descendit, tanto altius fibra illa nervorum, ortus sui princi-
pia ducunt, ut & dorsales & lumbares quidam nervi. si attentius inspexeris à cer-
nicali medulla oriantur. Laurent. lib. 4. & lib. 10.

festam habere videatur, mediâ tamen sede ipsa me-
dulla à tenui meninge in duas partes vsq; ad lumbo-
rum vertebra diuiditur, ita vt vtrinq; cavitatis aliqua
appareat, quod sane non solum in leuiter cocta bo-
uis medulla demonstrari potest, sed etiam paralyfis,
vbi modò vnum, modò alterum latus solum occu-
pat, declarat: & ex his nervi prodeunt.

Verum ipsa medulla in hominibus z simplex ac
indiuisa deorsum per totam cervicem & thoracem
vsque ad lumbos ^a & infra [tab. 15. fig. 1. ab A. ad C.] fer-
tur; & nervos geniculatim à se diffundit; dein non
simplex amplius, sed in multos funiculos & filamen-
ta caudam equinam fere referentem diuisa, rectâ
deorsum ad ossis sacri finē (quemadmodum. n. cum
spina cœpit, ^b ita cū ea finit) descendit, aliquando
simplex, ^c aliquando diuisa, in tres breues surculos
diffunditur. Debit enim medulla eâ parte, quâ ma-
xime spina antrorsum & retrorsum flectitur & cur-
uatur in funiculos absumi, ne à vertebra prematur.
Hinc quoque patet, cur læsio in inferiore parte spi-
nalis medullæ sit maior, quia hoc loco nervea magis
sit, cum alijs partibus medullæ sit similior.

Iam vero licet ab hac spinali medullâ prodeuntes
nervi pene infiniti sint, tamen pro ratione forami-
num vertebrarum, per quæ egrediuntur, tot coniu-
gationes esse, quot sint vertebrarum foramina Ana-
tomici voluerūt. Nam omnis nervus pluribus quasi
funiculis ^d seu fibris ex medullari substantia exortis,
sensimq; descendit, beneficio membranarum
ad foramina vertebrarum iunguntur, & nodum ef-
ficientes vertebram egrediuntur, ita vt vnus nervus
ex vna

ex vna propagine constitutus videatur [tab.15. fig.1. ad LL. hoc ostendit] quod non solum cum ijs nervis, qui ex integra medulla prodeunt, sed etiam qui ^e infra diuisionem ad partes inferiores mittuntur [tab.15. fig. ad M.M. vsu venit.]

^e A lumbo-
rum principio
ad ossis sacri
extremum, &
plures & cras-
siores sunt
surculi, Laur.
f. 12. vs. part.

Vsus spinalis medullæ proprie dictæ est, vt ab ea velut altero cerebro (ait Galenus) ^f nerui tanquam riuuli geniculatim prodeunt, qui animalem facultatem, sensum & motum, spiritumque animalem, quæ continuatione à cerebro suscipit (vnde quibusdam cerebri appendix & vicaria dicitur, quamuis cerebri maior sit dignitas) & ad partes capiti subiectas deferunt; excipe eas, ad quas à sexto pari [t.14. fig.1. & 2.e.] cerebri medullæ propagines mittuntur, & per medium infimumq; ventrem disseminantur. Nam cum à cerebri medulla in cranio (vel vt Galenus à cerebro) ad singulas partes obuiæ interuallum diduci non fuerit tutū, & partes capiti subiectas motu voluntario destitui & tristantium sensu priuari, non erat consultum: homo enim motu carens, statux potius, quàm animali similis foret: & hæcenus de vsu spinalis medullæ proprie sumptæ. Si vero latiore sumas significato, tum vsus ipsius erit, vt ab ea, quatenus in cranio inclusa est, vtrinq; neruorum coniugationes septem (ex communi sententia) imo octo, quæ cerebri vulgo dicuntur [tab.13. fig.20. B. G. H. I. K. M. N. O.] vna cum olfactus organis [tab.12. fig.19 D. E.] initium ducant; quatenus vero extra cranium in spina consistit, cæteri nerui omnes, quorum paria triginta numerantur [tab.15. fig.1.] producantur.

DE NERVIS IN GENERE.

CAPVT XIIIX.

Vide Galenum 16. de vsu partium, & libro de Dissectione neruorum, & 7. de Placitis.

Rr 5

Cum

CVM Nerviurum naturam & varias de eorũ materia, ortu & differentiis quæstiones, libro nostro secundo, qui de Similaribus agit, sufficienter & dilucide pertractauerimus, nunc solum ea, quæ ad præsens institutum necessaria, proponemus: quod si Lector plura requirat, locum prædictum consulat.

Et si Nervus ^a dicatur & de Ligamento, ^b quod *σύνδεσμον* Græci, quâ voce pleriq; post Hippocratem vsi sunt, eò quòd ligamentum ^c similiter ac nervus corpus sit album, ex sanguine & cavitatis manifestæ expers; & de Tendine, ^d parte in quam musculus definit (*τένων* Galeno) ob similitudinem, cum nervosa ^e sint corpora, tamen hîc solum de Neruo proprie dicto agemus, quem Hippocrates & ^f Galenus *νεῦρον, ὁπὸ τῆς νεύειν*, à nutando seu flectendo, & *τόνον, ὁπὸ τῆς τένειν*, & id est, tendendo ab ipsis operationibus vocarunt; siquidem Musculi nervorum potissimum ope & nutare seu flectere, & tendere partem aliquam valeant.

Est autem Nervus, quatenus consideratur vt pars organica, instrumentum corporis commune, chordam referens, albam rotundam, simulq; oblongam, nullâ cavitatē, ^h quæ sensu cognosci possit (nisi forte optici) sed ⁱ porositatē donatam; in quibusdam vnitum, in crassioribus vero nervus ex multis funiculis conflatum, quod velut canalis sensum & motum

^a Galen. i. de motu musculi. i. 1. proæm. lib. de ossib. tripl. cia facit nervorum genera, quorũ alij ex ossibus, alij ex musculis, alij è cerebro & spinali medulla derivantur, quomodo autem differant, ostendit 2. Plac. 9. & 25. vs. partium 2. nervosorum corporum tria genera, nervi ligamenta, tendines.

^b Gal. i. plac. 9. ex proæm. de ossib.

^c Gal. i. vs. part. 17.

^d Gal. proæm. de ossib.

^e Gal. 3. facult. alim. 4. & 1. vs. partium 17.

^f 1. de motu musculorum 1. g Putat Erotianus τόνος dici apud Hipp. de venis, arterijs & nervis. h Controuertitur hæc de re alijs omnibus, vt Archang. alijs nullis, alijs tantum optici meatum tribuentibus Opticis tribuit Galenus 7. de plac. 4. & 5. de dissect. nervor. 2. Volcherus opticos, quemadmodum & reliquos perforatos negat, & Eustach Vesal & Col. contra Corn. Gemma lib. 2. Artis Cyclonicæ cum Galeno statuit; reliquos Galenus porosos statuit causam tradens 7. de Pl. 4. sic com. 1. in 6. eiusd. nervos cavitatib. destitutos esse scribit, imitatus Hipp. lib. de locis in homine, qui νεῦρον dicit ἀρχιλία, sine ventre, sed qui vult consulat cap 30. lib. nostri de partib. similaribus. i An nervi sint excavati, an eorum substantia sit porosa, membranæ tenuissimæ simul ac densissimæ conuestitæ nihil interest; nam porositates canalium vicem gerunt, cum per eos ita constitutos spiritus animalis in partes omnes infuset, Archang.

tum animali spiritu vectore à cerebro eiusq; medulla ad corporis sensus motusq; capaces, desert.

Substantiâ ^k donatur albâ, medullari, medullæ cerebri à qua initium ducūt, simili (cum dorfi ^l medulla & neruorum, eadem sit cum cerebri substantia medullari) sed compactiore & magis densatâ (cerebrum enim mollius esse conueniebat, cum sensilium species omnes recipere debuerit) ita, vt quanto longius à cerebro recesserint, tanto duriores reddantur, quo iniurijs magis resistent.

Inuestiuntur membranâ duplici à cerebri meningibus productâ, quarum exterior crassior, & crassâ meninge producitur, cuius est nerui medullam tueri, & si ex pluribus funiculis constet, eos simul coniungere, quæ ubi neruos crassiores obuoluit, venulas à vicinis venis accipit: Interior vero ^m tenuior medullæ proxima à tenui meninge, sensuq; ⁿ tactus prædita; non secus enim ac ⁿ cerebrum his integebatur, ita & nerui his obuoluuntur, & inuoluti per corpus feruntur. Verum triplex hæc neruorum substantia ratione ^o potius quàm sensu distinguitur, neque alicuius nerui, opticis exceptis, durius molliusq; indumentum per anatomen indicari potest.

Iam vero per substantiam, quæ in centro est, tantum præcipuam nerui partem, actio perficitur, cum per ipsius ^p medullam ⁿ nō per tunicas facultas sensifica & motrix à cerebro ad partes, deferatur, hinc Galenus, si nerui medullam præscindas, statim pars, in quam neruus inferitur, motu sensuque priuatur; membranæ vero idem officium neruis exhibent, quod & cerebro. Nerui enim proprie non sunt instrumenta sentiendi & mouendi (motus. n. organum im-

^k Nervi triplex substantia, media & intima arborum medulla similis, externa duplex, prima à tenui, altera à crassa meningē. Gal. 7. de pla. 3. idem & Vesal. vide cap. 34. libri de similarib. ^l Galenus de form. fœtus 5. ^m Tenuis meningis partibus quibus neruus inferitur sensum communicat ex Fernelij sententia. ⁿ Gal. 7. de placitis 3. ^o Sic & Fallop. in obs. ^p At qui voluerunt animalem spiritum per arteriolas membranis neruorum adhaerentes ferri, vt Praxagoras;

Argenterius, qui animalem à vitali non distinguit, per arterias ferri asserit. Rondeletius, per vasa tunicarū implicata ferri spiritum sensus motusq; auctorem statuit, at medulla vsum, vt tomenti instar exilia vasa fulciat.

q. Spiritum
animalem cū
propria sub-
stantia à ce-
rebro plerisq;
corporib. par-
tibus ad sen-
sum & mo-
tum confe-
runt, Plat.

r. Gal. dissect.
neruor. 1. 7.

plac. 3. 7. vsf.
part. 14. 16.
eiusdem 3.

f. 1. plac. 9.

t. 7. plac. 8. de
diff. neruor. 1.

at in quas
partes nervi
non ferantur,
vide 16. vsu
part. 2.

u. 3. hist. ani-
mal.

x. Sic & Ar-
changel. &
Laurent.

y. 16. vsf. part.
3. & 5. vide
cap. 36. lib. 2.
nostri de par-
tib. simila-
ribus.

z. 7. adm. an.
8. & 16. vsf.
part. 3.

a. 1. pl. 9. & 9.
vsf. part. 14.

mediatū musculus est) sed sunt instar canalium, per quos tota anima sentiens eiusque facultates & mouendi & sentiendi (quare à Medicis sensus motusq; organa dicuntur) animali spiritu vectore à cerebro ad partes corporis deducantur vel ad sensum^r vel ad motū aliquem prout indiguerint, & quidem vel solum sensum^f vel solum motum vel vtrumq; membris, quibus inferitur communicando, cum nulla pars sensum seu motum voluntarium sine neruo habeat. ^t Neruo enim compresso, vel intercepto vel præciso^t vel penitus corrupto, eius partis, cuius nervus est, sensus motusq; subito perit. Quare nulla pars monente Aristotele^u quoq; stupore, paralyfi & conuulsione tentatur, quæ neruo caret; at stupor sensus est diminutio; paralyfis, sensus motusque priuatio; conuulsio, inuoluntarius motus.

Non tamen alios sentiētes, ^x alios motorios nervos statuere debemus, eo quod Galenus ^y motus voluntarij causâ genitos, duos; contrâ qui sensus gratiâ, molles dixerit; & molles ad sensum, duos ad motum voluntarium conferre pronunciauit: ^z imo molliores^a ad sensum tantūmodo idoneos esse, ineptos^a vero ad motum, scriptum reliquerit. Nam licet mollities & durities primo ratione substantiæ à qua prodeunt, obueniāt, vnde molliores primi, qui à cerebro oriri dicuntur; duriores, qui à spinali medulla; durissimi, qui à medulla in vertebribus lumborum & ossis sacri existente, oriuntur. Dein ratione productionis, cum ij, qui breuissimâ viâ ducuntur, vt qui in cranio sunt, molles sint; qui vero longius ducuntur, vt fere omnes qui ad musculos feruntur, duriores redduntur, quàm ad exortū fuerint; quemadmodum & ij, qui anfractuose ducuntur, vt tertij paris cerebri ramus; sic etiam qui per durum corpus transeunt, vt quinti paris neruorum furculus, qu

tempo

temporis ossis foramen cecum antiquis dictum, perrepat, à contactu ossis durior redditur, quàm ipsius principium fuerit. Quòd verò alij molliores, alij duriores sint, inquit Galenus, à Natura ob eam causam factum, quod instrumentum sensus neruo molli indigeat; neruo quidem, vt is tanquam canalis animalem spiritum sensificum deferat: molli vero, quoniam ab extrinsecus occurrente sensibili affici, & aliquid pati debeat. At cum ad patiendum molle aptius sit, ad agendum vero durum, ideo ad sensus instrumenta molles; ad partes vero, quæ moueri voluntarie debuere, duriores neruos communicari necessum fuisse (hinc apparet neruos præter vsum actionem quoque animalem habere, cum afficiantur ab obiecto, ideo molles ad sensum, duri ad motum aptiores sunt.) Probat ex eo, quod ad ea instrumenta sensus, quæ non solum sentiunt, sed etiam mouentur, duplex neruorum genus mittatur, alterum ad sensum alterum ad motum, quod videmus in oculo, ad quem primum par pro sensu, secundum par pro motu amandatur, & in lingua, quæ tertiam & quartam (vt communiter Anatomici distinguunt) coniugationem gustus gratiâ, septimam vero ad ipsius motum accepit: vt vt se res habeat, censemus, Neruos ex natura sua ad vtrumq; indifferenter se habere, ita vt vel sentientes, vel motores dicantur ab instrumentis & partibus ad quæ feruntur, & in quæ disseminantur. Si enim instrumentis motus, ipsis scilicet Musculis inferantur, dicuntur Motorij; si in instrumenta sensus, vocantur sensorij. Imo videmus, vnum & eundem neruum & motum & sensum deferre, pro ratione diuersorum instrumentorum: exemplo sit, sextum par neruorum cerebri dictum, hoc viscerum membranis, quæ in medio & infimo ventre habentur, sensum tactus largitur: ab hoc tamen vtrinque refle-

reflexo, nervus recurrens constituitur, qui in singulos laryngis musculos, ad motum furculos distribuit. Quod si iisdem occurrerent instrumenta videndi, audiendi, gustandi, iisdem sentientes & motores, fierent quoque visorij, auditorij, gustatorij nervi. Sic videmus eos, qui ad musculos mittuntur, motus voluntarij gratiâ nihilominus tamen simul quoque sensum ^b tactus tribuere musculorum membranis, in quas fibras suis desinunt. Et sic cerebrum nervorum interuētu in qualibet corporis parte reperitur, dum facultatem animalem ^c soli cerebro innatam in nervos influere permittit.

^b Ratio, quia omnes tenui meninge inuasiuntur, Plat. ^c 1. Mot. musculi.

^d Hippoc. de nat. ossiū nervi corpori flexione contrahuntur, in cessationemque praesistant.

^e 5. vs. part. 9. & ex eo Vesal. lib. 4. c. 1.

Vsus ^d ex dictis etsi facile colligatur, lubet tamen hoc aspergere, triplicē Galenum ^e fecisse: primum, ut ad sensoria instrumenta sensum deferant, ut oculis, linguæ, auribus; & propterea partibus manuum internis, atque adeo ipsius ventriculi orificio superiori, cum hæc etiam quodammodo sensoria sint: siquidem per manus ex tactu dignotio est certissima: sic orificium ventriculi, sensum habet alimenti deficientis, quæ fames dicitur.

Alterum, ^e ut motorijs partibus motum largiatur: sic ad musculos motus voluntarij instrumenta, nervi feruntur; qui quatenus ad membra corporis mouenda constituti sunt, maximos nervos recipiunt; quatenus vero, ait Galenus, è nervis omnibus sensus necessario inest, facultatem discernendorum tangibilium causa adepti sunt; nam per nervos ^f etiam sentiunt.

^f 7. vs. part. 24.

Tertium, ^e omnibus alijs partibus dati sunt, at quæ sibi dolorem adferunt, dignoscere (hic tamen vsus ad priorē referendus videtur) adeo enim, ut loquitur Hippocr. Natura (imo Deus ter Opterque Max.) sagax, iusta, artificiosa, animaliumque provida est, ut omnibus quidem partibus nervos, non

non autem eadem mensura, sed alijs quidem libera-
lius, alijs vero parcius distribuerit. Siquidem quæ in-
strumenta eiusdem inter se sunt generis, vt sensoria
cum sensorijs & musculi cum musculis; horum qui-
dem pro corporum mole, actionum dignitate, mo-
tuum intentione ac remissione: tum autem vsus as-
siduitate ac intermissione (æstimata ad vnguem cu-
iusq; dignitate) alteri parti maiorem, alteri vero mi-
norem neruum impertiuit: vnicuique vero tantum
tribuit, quantum tribui erat æquissimum.

Magnitudine enim impares sunt; crassissimi, qui
ad loca remota & in plures partes distribuuntur, vt
sunt, qui ad artus mittuntur; qui cum spirituum ma-
iorum copiâ eguerint, pluribus principijs ex spinali
medulla (quæ in ceruicis & lumborû vertebris con-
sistit) prodeuntibus donantur, quo ex medulla hac
veluti multis radicibus spiritum accipiant: quæ ta-
men simul collecta, vnum neruum, eumq; crassum
constituunt; & rursus, verum sensim, in minores ra-
mos distribuuntur. Mediocres vero sunt, qui ad sen-
soria in capite posita mittuntur: nam cum cerebro
vicini & etiam admodum molles sint, nimis parui ef-
se nequiverunt. Graciles sunt, qui in proximas par-
tes, vt faciei musculos, distribuuntur. Nunc de origi-
ne Neruorum paucis agamus.

Neruorum origo ex corde non est, vt Aristoteles
voluit, s cum inter dissecandum nullus neruus ab eo
productus excurrat, & admodum exiles^h sint, qui à
sexto pari cerebri ad cor feruntur. Nec ex crassaⁱ ce-
rebri meninge, quemadmodum ipsorum substantia
iam explicata declarat. Sed vt Hippocrates, Erasistra-
tus, Herophilus, Galenus & pleriq; Anatomici vo-
uerunt, à cerebro, à quo etiam spinalis medulla ori-
ginem ducit. A cerebro, inquam, quod non solum
ensus, dum sectio cerebri proponitur, declarat, dum
neruo-

g 3. hist. a-
nimal. 5. 6. 3.
part. anim. 4.

h Vnus im-
pense gracilis
à sinistro sexti
paris neruo,
vix summo
studio à me
inuentus Vo-
sal. lib. 4. c. 1.
i Hac fuit E-
rasistrati opi-
nio in iuuen-
tute.

neruorū riuulos plures in cerebro videmus, in corde vnum, & eosdem cum cerebro magis, quam cū corde continuatos esse: sed ipsum quoque similis cerebri & neruorum substantia medullosâ, quæ duabus membranis donatur, comprobatur; imo & affectus capitis sensum omnem & motum à cerebro manare edocent; vt in apoplexia, quæ obstructis cerebri meatibus causatur, animalis facultas statim, illæso tamen corde, intercipitur, quod corde vulnerato non accidit: sic in epilepsia, ob cerebri medullam. vnde nerui prodeunt, affectum, totum corpus conuellitur, cum corde læso, corpus non conuellatur.

k Galen. de
form. fœt. 4.
7. placit. 3.

At principium^k duplex esse diximus, aliud γενέσεως generationis, aliud διακρίσεως, dispositionis. Ratione generationis, ipsorum principium semen est, ex quo tanquam materiâ immediate fiunt; qualis vero pars feminis requiratur, fusc ex placitis veterum cap. 32. libri nostri secundi, qui de similaribus inhibetur, docuimus. Ratione vero dispensationis est ipsum Cerebrum, ¹ vt vulgo loquuntur (imo & cerebellum) quod principium est à quo, cum ab eo tanquam canales sensum ¹ & motum suscipientes in corpus distribuunt, prout hæc pars sensu tantum, illi motu voluntario, altera vtrōq; eguit.

l Chrysippus
licet cerebrum
neruorū prin-
cipium esse cō-
cederet, non
tamen id sen-
sus motusque
voluntarij
principium
statuit.

m Ex Hipp.
lib. de alim.
colligi potest.

Hos rursus duplices constituunt, alios, qui à cerebro, alios, qui à spinali medulla ab vtrisque tanquam principio ῥιζώσεως^m radicationis prodeunt. Et hoc rursus vel à spinali medullæ principio, hoc est, quatenus adhuc in cranio continetur; vel à spinali medulla, quæ in vertebrae dorsi existit: horum rursus alios ceruicis, alios thoracis, alios lumborum, alios denique ossis sacri faciunt: quibus & artuum ne uos adiungunt.

Not

Nobis ⁿ vero Nerui omnes à medulla cerebri ob- ⁿ De origine
longatâ prodeunt: alij quidem dū hæc medulla cra- ⁿ Nervorum opi-
nio adhuc inclusa est, & horum communiter septem ⁿ niones varia
sunt.

ex Ma- 1. Hippocrati

lib. de ossibus in principio, nervorum exortus ab occipitio est, usq; ad spinam, coxen-
disem, pubem, femora, brachia, humeros, pedes, tibias.

II. Arist. à corde 3 hist. anim. 5 libro de somn. & vigil. lib. de Respiratione, quia
in corde sit nervorum copia, & quia hinc motus oriuntur, qui intendendo retinen-
doq; efficiuntur, itaq; ministerio tali & robore opus esse 3 part. animal. 4. cuius sen-
tentia etiam sunt Alexander libro de Anima: Avicen. 3. de animal. & omnes Pe-
ripatetici: Auerrh. 2. coll. cor nervorum principium mediante cerebro. Aponensi, à
corde tanquam radice & formali principio oriuntur, sed cū medio à cerebro. Ali-
quis sic Aristotelem interpretantur, plures quidem in cerebro apparere, sed eorum
omnium fontem cor esse, ex cuius basi nervulus exilis ascendat, ad cerebrū, qui ibi
multiplicetur, ut cerebri maxima sit fecunditas, ut septem paria pandat, ut ut
nervorum radix in corde sit, propagatio in cerebro. Contra hoc disputat Galenus 1.
de plac. 3. & 10.

III. Praxagora, nervos nihil aliud esse, quàm arterias exiliores factas: eos enim
arterijs cōtinuos esse, quem Galenus 1 placit. 7. refutat. Casalp. lib. 2. Quæst Medic.
quæst. 10. inquit, arteriolas multas veluti fibras in egressu ex cerebro, vel spinali me-
dulla in unum velut funiculum coeuntes nervum constituere; imò arterias dextri
lateris, nervos sinistri lateris constituere & econverso.

IV. Casalp. libr. . quæst. Peripat. 1. quæst. 5. & Reusneri, nervos nihil aliud esse
quàm venas, quæ dum ad cerebrum pervenire, in nervi naturam degenerent: quæ
sententia non secus, quàm tertia omnium absurdissima est.

V. Erasistrati ex dura cerebri meninge prodire, ut docet Galenus 7. plac. 3. quia
duntaxat exteriorem nervi partem in dura meninge enatam conspexit, quam opi-
nionē in senectâ, Galeno 7. plac. 8. referente, mutavit, (imò lib. 8 cap. 3. Nervorum
originem scribit esse à cerebri basi prope tertium ventriculum, ex quibus dextri de-
xtrorsum, sinistri sinistrorsum feruntur.) Idem Gal. alios à cerebro, qui molliores
& sentientes, alios à cerebello, qui duriores & motores ortum ducere refert. Vult
nim 8. usq; part. 13. omnes nervos spinali medulla attributos, à cerebello nasci. (hanc
sententiam Galenus veram esse sentit, aliorum vero simpliciter falsam asserit
Varolus.)

VI. Galeni, qui à cerebro nervos & dorsalem medullam prodire statuit de dis-
sect. nerv. 1. & 7. plac. 8. quem secutus est Avicen. fen 1. primi. Idem Galen. voluit
à cerebro, & à dorsali medullâ prodire, de dissect. nerv. 1. & 1. plac. 9. 1. mot. musc. 1.
usq; part. 2 & 3. 7. eiusdem 14. sic & Col. qui asserit, nullos à cerebello oriri.

VII. Vesalii, alios nervos ex calvaria prodire, alios ex spina vertebris; illos aut
ib ipsâ anteriori cerebri basi enasci, aut à dorsali medulla principio, prius, quàm
vertebrarum sinus ingreditur, non autem à cerebello. hos vero ex medulla dorsali
n. vertebris existente.

II X. Fallopio in obseru. alij à cerebro vel medulla intra caluariam, quos nervos molles appellat, alij à spinali medulla.

IX. Varolo, à spinali medulla, quæ à cerebro & cerebello ortum ducit, nervi omnes prodeunt: sic & Platterus ait, oriri à cerebri parte oblongâ, quam dorsalem medullam vocitant, toto ductu à cerebri basi usque ad sacrum os: alios in capite sui intra caluariam, alios in dorso seu extra caluariam. Et Archang. Nulli à cerebro nulli à cerebello, sed omnes proxime à cerebri medulla & alij ab ea cerebri medulla oblongata, quæ intra caluam continetur: alij à medulla spinali: quæ & Laurent. xij lib. 10. cap. 12. sententia est.

ex Marini & Galeni o sententia recensentur; nonnulli vero nouem P coniugationes faciunt, cerebriq; nervi dicuntur, qui hoc disticho exprimuntur:

Optica prima, oculos mouet altera, tertia gustat,

Quartaq; quinta audit, vaga sexta, septima lingua est

quibus & olfactus organa addere oportet. Alij vero postquam medulla magnum occipitij foramen elapsa, 9. per foramina vertebrarum spinæ defertur 9 & proprie medulla spinalis nominatur, & sunt paria triginta, nempe ceruicis septem, thoracis seu dorso duodecim, lumborum quinque, & ossis sacri sex, quibus & artuum nervi oriuntur; in manū quidem ex quinta, sextâ & septimâ colli, primâ & secundâ thoracis coniugatione propagines modo quinque modo sex feruntur: in pedem vero, ex tribus inferioribus lumborū, & quatuor, nonnunquam quinque superioribus ossis sacri nervi quatuor distribuuntur & spinalis medullæ dicuntur. Prodeunt autem vtriusque eadem ferie, siquidem nullus nervus sine coniugatione producat (quare Græcis *συνυγία*, Latinis nervorum paria seu coniugia dicuntur.) Et hi semper eadem ferie alter à dextris, alter à sinistris, & eodem

profluunt

nerit. Fallopio octo paria, septem veterum & octauum quod Vesalius pro mino propagine tertij paris enumeravit. Archangelus octo dicit, addens septem vulgo recensitis nervos odoratorios, quorum ceteri nullam fecerint mentionem (intelligit processuum mammillariorum principia) Platero, viringq; septem vel potius decem q; Alij à spinali medulla, (inquit Gal. præter septem paria) qui paribus sub capite mittuntur 16. vs. part. 2. 1 In nervos octo & quinquaginta spinalis medullæ 12. vs. part. 15. triginta 7. plac. 8. 19 vs. part. 9. 1. dissect. nervor. 1 & seqq.

o Galen. de dissect. nervor.

1. Laurent.

p Vesal. (ut & Laurent.)

septem paria:

addit, quod

pro tertio pari

ab alijs recensetur. Verius

duplex, quàm

unicum: dein

iuxta quinti

paris radicem

aliud par o

mibus inco

gnitū. At Col.

novē facit pa

ria, septē com

muniter re

cenfita, quib.

duo adhuc

addit, ex qui-

bus alterum

Vesalius esse-

cerit, alter us

nemo memi-

nerit. Fallopio octo paria, septem veterum & octauum quod Vesalius pro mino propagine tertij paris enumeravit. Archangelus octo dicit, addens septem vulgo recensitis nervos odoratorios, quorum ceteri nullam fecerint mentionem (intelligit processuum mammillariorum principia) Platero, viringq; septem vel potius decem q; Alij à spinali medulla, (inquit Gal. præter septem paria) qui paribus sub capite mittuntur 16. vs. part. 2. 1 In nervos octo & quinquaginta spinalis medullæ 12. vs. part. 15. triginta 7. plac. 8. 19 vs. part. 9. 1. dissect. nervor. 1 & seqq.

prorsus modo dextri & sinistri nerui suis furculis distribuuntur, excepto solum sexto pari cerebri, cuius dexter neruus, non eo, quo sinister, modo, dissectatur; quemadmodum supra in historia Thoracis libro 2. cap. 19. ostendimus.

*De Neruis Cerebri, & primum de Olfactus
organis.*

CAPVT XIX.

De Processibus mammillaribus egit Galenus lib. de Instrumentis odoratus, at de Neruis cerebri lib. de dissectione neruorum à cap. 2. ad 11. 8. vs. part. 6. & 11. 9. vs. part. à cap. 8. ad 15. 16. vs. part. 3.

CVM sensus externi quinque, Visus, Olfactus, Auditus, Gustus & Tactus recenseantur, qui ab ipso cerebro (seu potius ipsius medullâ) per neruos tanquam canales, alij quidem sensificam solum facultatem; alij vero sensificam & motiuam simul recipiant, cum ab eo tanquam principio dispensationis & radicationis orti dicantur, vnde sensuum instrumentis animæ facultatem sentientem & mouentem deuehunt; de his sermo erit; à processibus olfactorijs initio facto.

Et si nasus olentium^a rerum sit semita, non tamen odorandi instrumentum est: nec eius^b tunica interior, sed interius in cranio processus sunt olfactui subseruientes, quos Anatomici vltimâ eorum parte duntaxat spectatâ, processus^c mammillares, alij olfacien-

Ss 2

facien-

^a Galen. de Instrumentis odoratus 1.
^b De instr. odoratus 3.
^c Odorandi instrumentum Gal. l. c. at 9.

vs. part. 3. vocat productiones ad naves: sic & alias productiones ad oculos, &c. Processus olfactus organo subseruientes, Vesal. Organa olfactiua, alijs processus mammillares, Columbo: Processus cerebri mammillares, Fallop. obseru. Olfactus organa, Plat. Nerui odoratorij, & primum neruorum par, aliquibus mammillares & papillares, Archang. Processus mammillares odoratus organa non minus dicuntur, Laurent.

d Galen. de
instr. odora-
tus. Vesal.
Columb. Plat.
Laur. at Ar-
chang. dicit
organa odo-
randi non esse,
sed nervos &
canales, orga-
no odoratus
deseruietes.
c Meminit
quoq; Vesal.
& Fallop.
f Ex cerebri
substantia Gal.
cerebri basis
medio Vesal.
ex cerebri sub-
stantia in an-
teriore cere-
bro, Columb.
ab extremis
ventriculis an-
teriorib; Fall.
obser. è cerebri
substantia pro-
funde admo-
dum, at ante-
riore dorsalis
medulla initio
faciendi organa ^d vocant. Sunt autem duo, nervis
quodammodo similes, sub cerebri basi siti, albi, ner-
uis molliores ac latiores, oblongi, tenues: qui in ho-
minibus quidem ^e valde tenues ac parui, in brutis
vero, vt bobus, capris, ouibus, imo in canibus multo
maiores sunt, vnde homo in hoc sensu reliquis ani-
malibus inferior est. Hi ex cerebri ^f substantia me-
dullari in basi ipsius [tab. 14. fig. 1. & 2. F. tab. 12. fig. 19.
D. E.] iuxta nervos opticos [tab. 14. fig. 1. & 2. G.] pro-
nati inter cerebrum, cui tenuis membranæ benefi-
cio connectuntur, os sphæroides & os frontis fe-
runtur ad ossis spongiosi sinus [tab. 12. fig. 19. FF.] qui
crassâ meninge varijs foraminibus donatâ succin-
guntur & his processibus excipiendis creati sunt. Ad
horum processuum quemlibet, è ventriculo fora-
men manifestum, Fallopio volente, ^g à quo forami-
ne meatus ad os ethmoides seu spongiosum abit, qui
in humano angustissimus est, ita vt nō nisi in recen-
tissimo cerebro conspici possit: in bouino vero ma-
gnus; per hos ^h processus ac meatus aer & vapores
per nares respiratione attracti, tanquam per canales
ad cerebrum feruntur, quo de odoribus iudicium
ferat.

Hi nervis quidem ductu, colore & vsu respon-
dent, & idcirco Nerui dici mererētur, idcirco à qui-
busdam
è media sede, ubi ventriculi cerebri in angustum terminum desinunt, & tactus or-
gana & prima coniunctio educuntur, licet profundius adhuc ipsorum initia à ce-
rebri substantia adhuc separata, inchoare, Varolus primus observauit, Plat. ex po-
steriore medulla parte, cui quartus ventriculus assistit, Archang. ^g Certo scio a
instrumentis olfactus nullum esse aditum ad ventriculos ipsos, & opinionem eo-
rum, qui credunt aerem per nares attractum ingredi ventriculorum cauitates es-
se potius probabilem, quàm anatomicam, Varolus. ^h Ad cerebri ventriculos fe-
runtur, Fallop. obseru. Nerui odoratoriij sunt canales per quos vectore spiritu ani-
mali, hausto à quarto ventriculo tota anima sentiens in duas illas crassiusculas por-
tiones vehitur, in quibus cum duo tantum ostendat organa, scilicet odorandi, quod
proprie caruit nomine & tangendi, quales sunt membrane; hanc ob causam dua
solum in eis edit actiones, nimirum odorationem & tactionem, Archang.

busdam i Nerui odoratorij & primum i neruorum par dicatur, verum cum crassam meningem & caluariæ cauitatem non ^k excedant, nec neruorum instar ^k productiones habeant, idcirco nec Herophilus, nec Marinus, nec Galenus, nec plerique recentiores Neruorum nomine donarunt. Nunc de neruis oculorum.

i 1. Archangelo; nonnulli neruorum primum par recensuerunt, Vesal. ^k 9. v. s. partium 9.

De Neruis oculorum, seu de prima & secunda coniugatione.

CAPVT XX.

De his vide Galenum de dissect. neruor. 2. 3. & 9. v. s. part.

8. & 13. 16. eiusd. 3. & 7. de placit. 4.

NERUORVM cerebri coniugatio prima est Opticorum [tab. 14. fig. 1. & 2. G.] qui omnium cerebri (seu ex cerebri medulla prodeuntium) coniugationum imo cæterorum omnium, qui ex varijs filamentis non componuntur, maximi crassissimi: crassiores, quia, vt habet Galenus ^b meatus sensibiles habent, & omnibus alijs neruis ^c molliores sunt: hi ubi cerebri basis ^d medio, vbi medulla prolongari incipit, exoriuntur, & introrsum ac antrorsum oblique deducti & paululum progressi, in media fere via supra ossis sphænoïdis sellam vniuntur [t. 14. fig. 1. H. ab. 12. fig. 19. O.] non per solam ^e intersectionem aut

a Arist. 1. hist. an. 16. hac habet: feruntur ex oculo tres pori in cerebrum, maximus quidem & mediocris in cerebellum, minimus vero in cerebrum: minimus vero est quinarius proximus est: maximus vero

Ss. 3

simplici

que distant, nec coire possunt: mediocres vero coeunt & cerebro proximiores sunt, quam magni minimi plurimum inter se distant & nunquam coeunt. ^b Gal. 6. v. s. part. 3. ^c Corporis neruorum facile mollissimum, Vesal. crassi mollesque Columb. omnium mollissimum & amplissimum, Laurent. ^d Ab utraque parte anteriorum ventriculorum: quorum finibus sunt coniuncti, de dissect. neruor. 2. & 6. v. s. part. 3. ex cerebri basis medio, Vesal. & Fallop. ab anteriori cerebri parte exortus nonnihil distat, Col. exortu profundo è cerebri substantia introrsum deducti, Plat. à suprema parte medulla posteriori, vbi quartus ventriculus excavatus est, Archang. à posteriore cerebro, qua parte sacra medulla ortum ducti, Laur. ^e Dextro neruo sinisterorsum, sinistro dextorsum protenso, Vesal. sed non in crucis motum, quem admodum multi opinati sunt, qui quod in auiibus forte viderunt hos neruos incuruari, in hominibus quoque reperiri existimarunt. Columb.

TABVLA XIV. Fig. 1. Cerebri & cerebelli à
membranis liberatorum basis, vt neruorum, qui ce-
rebri dicuntur, exortus pateat. Fig. 2. Cere-
bri, cerebelli & neruorum vnum la-
tus exprimit.

FIG. I.

TAB. XIV.




FIG. II.



f Gal. de dissect. nerv. 2.

g Non accuratè in centrum, sed nervus dextrum accedens, ad dextrum marginis laevis posterioris sedis implantatur, quemadmodum sinister a sinistro. Vesal. oculi externo latere non centro, Plat. in oculi ceterum, Laurent.

h De dissect. nervor. 2. in porcis subinde non continuos, sed è multis funiculis, ut in crurib. conflatos spectavi, ait Vesal.

i Et Vesal. paulo plus quam mediū oculi, Plat.

k Sic & Colymb.

simplicem contactum, sed per medullæ confusio-
nem, & sic corpus commune constituunt, ita tamen
ut alterum ab altero separari non possit. Mox rursus
separati (ubi infundibuli collum transit) [tab. 12. fig.
19. M. N. tab. 14. fig. 1. supra H.] vtrinque extrorsum obli-
que per foramen proprium ipsorum nomine excul-
ptum, quod sphæroidis primum est [tab. 4. fig. 10. B.]
extra calvariā, alter ad ^c dextri, alter ad sinistri ocu-
li (quasi eius foret f radix) centrum g parte poste-
riore feruntur [tab. 21. fig. 8. a. aut simul cum membrana
fig. 2. a. b. c.] in brutis vero non in centrum, sed longe
inferius, cum ad latera prospiciant, implantantur:
qui non, ut ceteri omnes in fibras ^h dissoluuntur,
sed quilibet intra oculum expanditur [tab. 21. fig. 8. e.]
Constat autem substantiā duplici, medullosā & mē-
branosā: interior enim pars mollis est; nam si ner-
vum suis membranis inuolutum comprimas, cere-
bri substantiam mollem, quam continet, exprimi vi-
debis: ex qua in oculi orbitā late expansā ^{ap. p. s. p. p.}
& poe. d. n. c., id est, rete tunica, à retis quadam imagine
dicta [tab. 21. fig. 8. e. tab. 14. fig. 1. & 2. I.] constituitur,
quæ tamen reuera nihil minus, quàm tunica est, cum
à cerebri substantia nihil ^h differat, hæc q; vitreum
humorem sphæræ in modum circuit, mediamque o-
culi i sedem ambit, quo spiritus visui per oculi ca-
uitatem diffundantur. Membranas duas habet à te-
nui & crassâ meninge: verum ab ortu vsq; ad fora-
men in oculi orbita situm, per quod transeunt, tenui
solum k meninge inuestiuntur, ac inde ad oculum
vsque & tenui & crassâ meninge obuoluuntur, qua-
rum crassâ in corneam, tenuis in vucam oculi tu-
nicam absimitur, & sic per nervi huius continua-
tionem spiritus animalis ad pupillam, quæ vucæ fo-
ramen est, momento fertur: quare oculo vno clau-
so, alterius pupillam subito dilatari conspicitur, et
spirituum

spirituum affluxum, & id ad visus perfectionē; oculorum enim altero clauso rectius & certius videmus: facit enim hic ¹ concursus proprie ad robur, ne propter mollitiem longā viā deducti flaccescant: dein etiam, ut eandem planitiem in pupilla obseruent, aliās ^m ut Galenus censuit, simplex obiectum duplex iudicaretur; quod sane concedi posset, si & reliquorum sensoriorū nerui in medio coirent, quod tamen non fit; nam ne res vna duplex æstimetur, nerui omnes coeunt, non in medio viæ cursu, sed in cerebri medulla, vnde omnes neruos prodire diximus, vbi quoque omnium sensibilibus obiecta vniuntur; & tandem, ut commode per foramen, caluariā excillant, & ad oculos rectā ferantur. Dicuntur autem hii nerui ὀπτικὰ νεῦρα, visorij seu visiui ab actione ⁿ cum

Ss 5

virtu-

^l Cur coeant
in media via
opiniones va-
riae. i. ut unus
aspectus fiat,
ne una res a-
spectabilis
dua videan-
tur, quod Ga-
lenus voluit,
negant Vesal.
& Archang.
hicq; addit,
quod & audibi-
liorij & odoratorijs & reliquorum sensuum nerui in

medio itinere coire debuissent, ne res una audibilis vel odorabilis dua existimetur. 1. Vno oculo excacato, altero sano & inuiolato cernere posset animal: at natura institutum fuit, ut ambo sani semper extarēt & firmior aspectio. 3. Ut oculo uno clauso ad alterum totus feratur spiritus visorius, ut aspectus fiat acutior: Verum in vno nervo tantum & plus spiritus, quantum in ambobus, neutiquam contineri potest: & sclopetarij arbitrantur, se acriter intueri, cum minus acriter & acute errant; cernunt quidem rectius & per angustius foramen. 4. Ut cum per angustum foramen cernere cogimur, aut per eandem lineam rectā, per quam ambo cernere nequeunt: in tali casu ex ambobus unum fieri, quo fere tam acriter errat, quā duo: sed nec hoc exprimitur intentione Natura esse, reor. 5. Ut minus ut nihil in medio viæ tractu patiantur: quā opinio probabilissima; nam quā parte coeunt, maxime periclitantur, tum propter cavitatem insigniorem in eis excavatam, quā in alijs nervis: tum propter molliorem; quia peragant cerebri partem molliorem, nimirum inferiorem; talem autem cavitatem & molliem efflagiabat cernendi facultas. Hæc Archangelus. m Neris similes gemina esse videntur, secundum Galenum, ait Vesal. qui hoc negat exemplis adductis. 1. Adolescentis, cui anno ante suspensionem oculus dexter à carnisque erutus fuit. 2. Mulieris suspensa, cui etiam dexter oculus à iuventute emarscherat; hinc dexter nervus sinistro tenrior in exortu & congressu durior & rubicundior; in illo qui nec assitit nec mollitie sinistro admodum cedebat. 3. Cuiusdam cui nerui visorij in ingressu se non contingebant, sed dexter sinisterque, sinister dexterque reflectebatur, quasi non coalitus occasione nerui congregeretur, sed ut commode per suum ramentum à calvaria prociderent: hic tamen de visu nihil conquestus, nec de visus applicatione. Vesal. n De diff. nervi. 2. 16. vs. part. 3. caudā intra, quo spiritus non ra-

cipiant: quare
fieri. m. usque
ad cerebrum cē-
triculum per-
tingunt.

o Optici pe-
nitius perfora-
ti 7. de pl. 5. m.
tus sensibilis
meatus diff.
neruor. 2. v-
trinq. mani-
feste perfora-
ti. 7. plac. 4.
p 2. de plac.
4.

q Nunquam
mihi occurrit,
quamuis ca-
num adhuc
viventium,
& aliorum
grandium a-
nimaliū hac
solā occasione
secuerim &
hominis de
collati vix
quartā hora
parte post, ac
calente aquā
sedulo fove-
rim, Vesal.
Non sunt ma-
nifesto cana-
nale perfora-
ti, Fallop. in
obseru. nullus
in illis porus

manifesto cernitur, nec in boue aut quouis grandiore animali, Columb. conspicua
cavitatem nunquam obseruauimus, Laurent. Nerus opticus minime ex solia
corpore, eoq. perforato constat, sed ex multis neruosis fibris sibi mutuo membra-
narum beneficio connatis, conflatur, Volcher. 1 7. de plac 3.

virtutem visiuam seu vidēdi sensum oculo commu-
nicent; nominantur quoque ab Herophilo *ωόπος*ⁿ
ὀπτινοί, meatus^b visorij, ⁿ quia hos solos inter re-
liquos corporis neruos, sensibilemⁿ meatum habe-
re censuit, quod & Galenus approbauit, qui vtrinq;
o manifeste perforatos esse pronuntiauit, & plerosq;
dissectionis artifices foramen quod in inferiore par-
te est, vbi oculos attingunt, perspectum habuisse.
Tria enim p obseruanda sunt (Galeno monente)
ei, qui alterum foramen, quod circa principium eo-
rum est conspiciere volet: primum, vt magnum q ha-
beatur animal: secundum, vt statim post mortē dis-
secetur: tertium, vt aer circumfusus clarus ac luci-
dus sit. Hos autem præter meatus foramine opus ha-
buisse tradit, quia p his tantum neruis competat fa-
cultatem animalem per spiritus animales, seu spirita-
lem substantiam per foramen internum deferre: re-
liquos vero porosos esse, nec foramine opus habere,
cum facultatem non per spiritus animales, sed solum
per radios deferant. Verum posteriores q Anatomi-
ci omnes foramen conspicuum habere negant, imo
cum substantiam rarā & mollem habeant, facile spi-
ritus ad oculos meare posse asserunt: etenim omnes
nerui licet meatus visibiles nullos habeant, spiriti-
bus tamen pleni sunt: siquidem cōpressionē siue ob-
structionē sensus impediatur: sic si^r neruus vincu-
lo interceptus sit, sensus aufertur, separatis enim spi-
ritib. superioris partis ab inferiori; nulla inter ipsos
fit communicatio, at ablato vinculo sensus redit. Sic
si optici obstruantur, videndi actio perit, quod in A-
rabum gutta serena accidere solet. Vtrum vero, per
inde

nde, vt in cerebro spiritus continetur, quo euacuato
 otum animal stupidum redditur, & idcirco ad sen-
 um & motum membrorum vtilis est, ita quoque in
 ingulis nervis spiritum quendam esse, existiman-
 lum sit; & vtrum spiritus is innatus insitusque ma-
 neat, & illo tanquam nuncio pulsatus excitetur; an
 nsitus minime sit, sed illo tempore quo membrum
 liquod mouere volumus de cerebro denuo influat,
 icimus cum Galeno ^f ita absolute pronuntiare non
 posse. Concludentes hos nervos non solum crassos
 aræq; texturæ esse, & ab vtraq; cerebri meninge in-
 olui, & per ipsos spiritibus transitum patere, sed ^t &
 orosos esse, quod in elixis maxime patet, cum Gale-
 o credimus, quâ de re plenius egimus in parte se-
 anda libri nostri, qui de partibus similaribus in-
 ribitur. Hos quoq; motorijs ^u principaliores cen-
 emus, cum in his visionis præcipua pars consistat:
 Et hos in caluaria vtrinq; rami ^u arteriarum caroti-
 um tangunt. Vfus opti-
 corum, vt per eos veluti ca-
 ales anima sentiens, spiritusq; visiui ex cerebri me-
 ulla in oculos deferantur. Secunda coniugatio ^x est
 eruorum oculos mouentium [tab. 14. fig. 1. & 2. K. tab.
 fig. 20. G.] quæ ab illa tantum ^y osse tenuissimo di-
 inguitur, & ex medullæ ^z cerebri basi [tab. 18. fig. 1. e.]
 rincipium ducit, gracilis & tenuis est, primæ coniu-
 gationi crassitie plurimum cedens, durior ^y quoque
 um musculis inferi debuerit: hæc sub cerebri basi
 d oculi cauitatē antrorsum fertur & longius vtrin-
 ue nervus excurrens per proprium foramen [tab.
 fig. 10. G.] quod sphæ-
 noidis secundum est (& non
 t opti-
 corum foramen rotundum, ^a sed oblongum,
 um tres nerui ^a transire debuerint, hic nimirum &
 ertia coniugatio, siue tertij paris vulgo dicti ramus
 lter, & octaua cōiugatio, seu quinti paris radix mi-
 or) in oculi ^b cauitate, caluariâ excidit: hic osse per-
 forato

^f 7. de plac. 4.
^t In coitione
 nervorum ca-
 uitas commu-
 nisq; transi-
 tus ex altero
 in alterum est
 insculpta, Ar-
 chang.
^u 9. vfu par-
 tium 8.
^x De dissect.
 nervor 3 9.
^y 2. part. 13.
^y De dissect.
 nervor 3.
^z Ea cerebri
 basis laterib.
 paulo poste-
 rius, quàm
 priores, Vesal.
 primo proxi-
 mū, Col. prope
 originem pri-
 mi, Fallop à
 dorsalis me-
 dulla parte
 mediâ ubi la-
 ta existit, pro-
 funde magis,
 quàm prima,
 vtrinq; à la-
 teribus, Plat.
 proxime sub
 odoratorijs.
 Archang. à
 posteriori ca-
 rebro, Laur.
^a 9. vfu p. 8.
^b Et per fissu-
 ram orbua,
 Columb. &
 Archang.

9. v. part.
23. quia mol-
liores, ait,
quàm moto-
rijs conveniat.

d Ad septem
oculi muscu-
los, Vesal. &
& Flat. ad
quinque mu-
sculos oculi &
duos palpebra,
Columb. &
Archang ad
quatuor tan-
tū oculi mu-
sculos & eum
qui palpebrā
attollit, Fall.
& Laur.
e Fallop. &
Laur.

f Col. & Ar-
changel sta-
tuunt: Fall.
& Laurent.
negant.
g Varol. &
Laurent.

forato & visorio attensus in ramos satis e magnos
secatur, qui ad musculos d mittuntur: primus qui-
dem visorium conscendens in musculum, qui palpe-
bram & eum qui oculum attollit, diffeminatur: al-
ter sub visorio valde conspicuus, pluribus furculis in
musculum, qui oculum ad anteriorem angulum ad-
ducit, dispergitur: tertius bifidus, plurimis fibellis in
musculum, oculum rectā diuersum trahentem inse-
ritur: quartum in sextum musculum, qui oculum ad
exteriorem angulum circumagat, ducitur. Sunt & fi-
bræ tenues, e quæ visoriū comitantes in oculi mem-
branas externas diffeminantur. In quibusdam, licet
rarius, ramuli ad musculum f temporalem mittitur,
vnde sæpe læso temporali musculo, oculus quoq; læ-
ditur, & vice versa. Horum vsus ad musculos facul-
tatem motricem, quemadmodum eorum membra-
nis facultatem tractricem tribuere. Quod vero vno
oculo in latus g moto, alter illius motum necessario
sequatur, hōc nervis ipsis, qui in suo exortu conti-
nui sunt, adscribendum est.

De tertia & quarta coniugatione Nervorum cerebri.

CAPVT XXI.

De his Galenus 9. v. part. 8. 9. 13. dissect. nervor. 4. & 5.

a Gal. 9. v. part. 8. ramo-
rū tertia con-
iugationis al-
ter qui ad
maxillam su-
periolem fer-
tur.

b Vesalio: at

Plat. tertia coniugationis nervus minor & musculorum faciei anterior coniuga-
tio, à veteribz non observata: Columbo, tertij paris ramus: Fallop. octauum par.

TERTIA coniugatio a [tab. 14. fig. 1. & 2. tab. 13. fig. 20. H.] ad faciei musculos mittitur, quæ cōmu-
niter tertij paris gracilior radix b dicitur: at cum
nusquam cum sequenti coniugatione [tab. 13. fig. 20. I. tab. 14. fig. 1. & 2. L. cum M.] nec in principio, nec in
progressu coniugatur, imo nihil commune habeat,
& cum extra ordinem aliarum omnium enascatur,

pecu-

peculiaris coniugatio dici meretur. Hæc ex basi ^c cerebri latere, ybi spinalis medulla à cerebro principium sumit [tab. 14. fig. 1. D.] oriri dicitur; sed rectius ex infima & posteriore sede medullæ cerebri, neruulo exiguo prodit, & rectà sub cerebri basi ad latera antrosum defertur & crassam meningem solus vtrinq; perforat; & secundo pari [t. 14. fig. 1. K.] attensus cum ipso per commune foramen [tab. 3. fig. 8. G.] oculi orbitam subit (si enim aliud foramen effectum fuisset, ramos inter foramina tenuius redditum læsioni magis obnoxium foret) & in quatuor ^d ramos secatur, quorum primus [tab. 14. fig. 2. N.] sursum per oculorum adipem fertur; & musculo quinto ^e in angulo interiore locato, qui cum ad trochleam circumagit, ramulum largitur: mox per foramen peculiare ossis frontis [tab. 3. fig. 8. A.] elapsus ad cutim frontis, vt ei & palpebræ superiori motum largiatur. Alter humilior ^f [tab. 14. fig. 2. O.] deorsum latus, foramen proprium, quod in quarto maxillæ offe exsculptum, transiens [tab. 3. fig. 8. B.] ad maxillæ superioris anteriorem partem in plures propagines scinditur & in musculos superius labrum, & nasi alam extrorsum nouentes, in ipsum labrum & gingiuas dentium inferiorum digeritur. Tertius ramus [tab. 14. fig. 2. P.] per foramen maxillæ superioris secundum [tab. 3. fig. 8. C.] post carunculam in oculi angulo sitam, narium auitatem adit, in ipsius tunicam absumitur [tab. 14. fig. 2. P. inferius.] & ramulū ipsius nasi musculo membraneo alam contrahenti tribuit. Quartus ramus [tab. 14. fig. 2. Q.] per fissuram, quæ est inter maxillæ superioris os & os sphænoides [t. 3. f. 8. D.] delatus, in musculi temporalis partem internam absumitur.

Quarta foramen secundum par

transmitti voluit ad musculos temporales; & de dissect. nervor. s. mansortos & omnes maxilla superiori exortos pro motu qui durioris ex via (9. v. part. 1.) longitudo effecti: item, diss. nervus ad gingiuas, dentes, labrum superius ac cutim faciei.

^c Ab infima & posteriore sede, vel basi illorum cerebri processu, qui nates dicuntur, Fall. obseru. retro magis versus laterale partem. Columbo: à latere dorsalis initij emergit, Plat. d. Vesal. Colum. Fallop. hos ramos duobus subsequenti- bus coniugationibus, quas pro vna coniugatione recensuimus, tribuit. ^e Totā hanc coniugationem in hunc musculum solum dispergi voluit Fallop. obseru. ^f Galen. 9. v. part. 8. ramum tertiam coniugationis, alterum ad maxillam superiore per foramen secundum par

g De hac Galen⁹. vfu part 8. & 13. dissect. neru. 4. & 5.

h 9. vfu part. 8. diff. neruor. 4. tertiam coniugationem faciens.

i De diff. neruor. 5.

k De diff. neruor. 4.

l Gal. de diff. neru. 4. hos molles vocat, & in radice quamplures & tenues videntur qui coniuncti, ubi crassam meningem (9 vfu p. 9.) transire, in duo (diff. neru. 5.) primum scinduntur, mox

Quarta & coniugatio linguæ^h sensificorū^{veſpa} seu gustatoriorū quia per hos gustandi sensus fit [t. 14. fig. 1. & 2. M. tab. 13. fig. 20. l.] prædictæ quidem in progressu, non vero in^k exortu adiacet & ab ijs, qui duplici^l radice (tertiū par^m ab ipsis vocatum) principium sumere statuunt, tertiæ coniugationi crassiorⁿ radix dicitur; quæ, vt Galenus censuit, non ex^o posterioribus cerebri partib. quæ duræ sunt: non ex lateribus, ^o quia via tuta non fuisset, sed ex basi^o cerebri, vbi pars anterior p^{cui} posteriori connectitur (imo ex cerebri medulla) [18. f. 1. num. 3.] tum propter securitatem, tum propter linguæ situm prodit, & rectâ deorsum per foramen sphænoidis ossis sextum [tab. 3. fig. 9. Q.] quod huic sequenti coniugationi [t. 14. fig. 2. Z.] commune est fertur; & ab hac, statim à transitu, propago vitis capreoli instar aliquoties contorta [tab. 14. fig. 2. R.] prodit, quò sic, secundum aliquos, paulatim durior recedat, vel potius quò spiritus animalis non nihil subsistat, & cum q Auditorio neruo duobus ramis [tab. 14. fig. 1. & 2. b. c.] vnitur & musculis faciei, temporali, manforio buccarū & cuti faciei furculos porigit. Propagine hac capreolari constitutâ, deorsum mag

utrinque in multas particulas diuiditur. Vesalius reprehendit Galenum, quod neruor. dissect. 4. tertium par secundo mollius tradat; dein etiam, quod 9. vfu partium 9. tertium par in duos truncos tum primum distribuat, cum duram membranam perforauit, ac si vtriusque unicum esset principium. m Tertia coniugatio Galen. Vesal. Columb. Fallop. Archang. Plat. Laurent. n Vesalio; at Plat. vidit in ramum elatiorem, medium & infimum. o 9. vfu partium 8. p 9. partium 9. Vesalio, à latere basis cerebri, antèius tamen & peritius, vbi dorsalis medulla ab ipsa initium sumit; Columbo, ab anteriore cerebri basi retro magis quàm secundum par, versus lateralem partem duplici principio: Fallop. obs. à media fere ipsius cerebri basi qui longe aliter ipsius & sequentis partis distributionem quam ceteri proponit: Plat. à medio dorsalis longitudinis à lateribus: Archang. à posteriore medullæ parte, vbi cavitatis calamo similis insculpta existit: Laurent. à posteriore cerebro, vnde sacra medulla ortum ducit. q Dissect. neruor. 5.

magis descendens, aliam propaginem de se mittit [t.

14. fig. 2. S.] quæ antrorsum gingivis dentium mola-

rium, ipsisque ^r dentibus seriatim furculos largitur.

Tum & tertia propago ^r posteriori ex parte [tab. 14.

fig. 2. T.] pullulat, quæ musculo in ore latitante inse-

ritur & maxillæ inferioris foramen interius [tab. 25.

fig. 2. F.] transiens, radicibus dentium inferiorum sui

lateralis furculos offert [tab. 14. fig. 2. XX.] horum enim

beneficio dentes, cum cætera ossa non sentiant, tri-

stantium occursum sentiunt: mox reliqua ipsius pars

[tab. 14. fig. 2. V.] iuxta mentum, foramen in antero-

re maxillæ sede [tab. 25. fig. 1. G.] elapsurum inferiori

labro, eiusque cuti ramulos complures largitur. Ve-

rum ab hac quoq; antequam maxillam ingrediatur, ner-

vuulus oriri solet validus, longus, ac gracilis, qui

sub maxilla fertur, donec ad musculum, qui os ape-

rit, peruenerit & ad eos, qui sub mento positi sunt, &

partim ossi hyoidis, partim linguæ inseritur. Deni-

que truncus ^r ipse [tab. 14. fig. 2. Y.] per musculos in

ore latentes transiens, cum alterius lateris trunco ad

linguæ latus fertur, & in linguæ tunicam ^u absuma-

tur, quò conueniens gustus, ^x saporumve digno-

scendorum organum fiat, à quo furculi exigui lin-

guæ substantiæ infigantur.

Ab hac ^y coniugatione, ea quæ communiter pro

quarta

etiam tradit radices dentium petere nervos, & Laurent. Archang. vero non me-

minit. At Plat. gingivæ & alveolis ipsorum dentium, non autem in ipsorum sub-

stantiam inseri, asserit. ^f Quartus nervus tertiae propaginis Fall. obs. ^r Quin-

tus nervus tertij paris, Fallop. obseru. ^u Plurima pars in lingua tunicam diffu-

patur, de diffect. nervor. s. Lingua tunicam efformat, Vesal. in lingua tunicam distri-

tatur, Plat. An tunica vel crusta ipsius lingua exterior ab his nervis fiat, adhuc

cognoscere non potui. Fall. obs. per superiorem tunicam distribui (subsequenti pa-

ri) quarti paris duos ramulos, Columb. ^x Col reprehendit Galenum & Vesal-

ium, quod quarti coniugij munus tertio adscripserit. Verum cum hæ duas coniuga-

tiones ex uno loco prodeant, & uno loco crassam meningem perforant, facile excu-

rari possunt. ^y De hoc Gal 9. vs. part. 9. & de diff. nervor. s. hanc inquit à tertia

An ad 22.
dices dentium
ferantur ner-
ui, dubitant
aliqui Gal de
diff. nervor. s.
dentib. à ter-
tio pari furcu-
los mitti vult,
& 16. vs. p. 3.
molles nervi
ad nasum, de-
tes & palatū,
nam hæc sen-
su exactiore
indigebant:
Vesal tradit
ab hoc ramo
ipsis dentibus
lobos seriatim
distribui:
Col. à tertio
pari, ramum
aliud ad su-
periorum den-
tium radices,
aliud ad in-
feriorum den-
tium distribui
asserit: Fall.

etiam tradit radices dentium petere nervos, & Laurent. Archang. vero non me-
minit. At Plat. gingivæ & alveolis ipsorum dentium, non autem in ipsorum sub-
stantiam inseri, asserit. ^f Quartus nervus tertiae propaginis Fall. obs. ^r Quin-
tus nervus tertij paris, Fallop. obseru. ^u Plurima pars in lingua tunicam diffu-
patur, de diffect. nervor. s. Lingua tunicam efformat, Vesal. in lingua tunicam distri-
tatur, Plat. An tunica vel crusta ipsius lingua exterior ab his nervis fiat, adhuc
cognoscere non potui. Fall. obs. per superiorem tunicam distribui (subsequenti pa-
ri) quarti paris duos ramulos, Columb. ^x Col reprehendit Galenum & Vesal-
ium, quod quarti coniugij munus tertio adscripserit. Verum cum hæ duas coniuga-
tiones ex uno loco prodeant, & uno loco crassam meningem perforant, facile excu-
rari possunt. ^y De hoc Gal 9. vs. part. 9. & de diff. nervor. s. hanc inquit à tertia
nervosa sciuntiam, & ad palatum pervenientem invenisse Marinum.

*z Gal. Vesal.
Col. Plat. &
Laur. At Fal-
lop. ab Ana-
tomicis tertia
coniugationis
crassiores ra-
dice dictam,
qui eorundem
quartum par
pro tertio pari
recenset: Ar-
chang. nervus
generationis
quarto loco
& lingua mo-
tores sexto lo-
co enumerat.*

*a De dissect.
nervor s.*

*b Sic & Gal.
9 vs. part. 9.*

*c A dorsalis
medulla prin-
cipio, Vesal.
tertio pari ita
proximum, ut
tertij portio
esse videatur,
Columb. à
medio dorsa-
lis longitudi-
nis utrinque
è lateribus,
Plat.*

*d Quare Co-
lumbo quartum
paris usus, ut
gustus organum
sit: & Laur.*

quarta *z* recensetur [*t. 14. fig. 1. & 2. Z. tab. 13. fig. 20. K.*] non videtur distinguenda, non quidem eius nomine, quòd prædictæ proxima sit, sed quòd vno ex loco [*tab. 13. fig. 20. I. K.*] furculis plurimis originem ducat, & vno tantum in loco crassam meningem perforet: nam & ea paria, quæ sexto & septimo loco communiter enumerantur, etsi ex pluribus propaginibus oriantur, tamen, quia furculi simul vniuntur, ^a & vni ti vnico foramine crassæ meningis ^a elabuntur, non pro geminis aut multiplicibus paribus recensentur: in nervorum enim paribus distinguendis, foramina caluariæ non esse considerata, cum Fallopio statui- mus. Nam si hoc obseruandum esset, cum & secun- dum par & tertium (vel Anatomicorū plerorumq; tertij paris ramus) & octauum (siue Anatomicorum quinti paris radix minor) per vnū & idem foramen transeat, pro vno pari recenseri deberent, quod ta- men hæctenus à nemine factum est. Huius origo mi- nor ^b est, (quod sculptor non obseruauit) illiq; pro- xima & paulò ^a durior; quare Galenus ^b magis à bas- cā, ^c tanquam à paulò duriore cerebri parte poste- riore emergere dixit, quæ statim post exortum ^a an- trorsum modice tensa cum tertia miscetur, & cum illa commune ^a foramen [*tab. 3. fig. 9. Q.*] perreptans ad palatū ^a in ramulos diuisa, vbi palati tunicæ [*t. 14. f. 2. inferius Z.*] infigitur, sensumq; gustus tribuit. Du- riorē paulò dixit Galenus, ^a eò quòd tunica ^b os suc- cingere durior sit linguā & alijs oris partibus, idcir- co huius respectu sensu hebetiore est: quandoq; duo ramuli iuxta tonsillas, & appendicem styloidem ad linguæ radicem descendentes, per illius ^d tunicam distribuuntur.

De Ner

portionem quandam in palatum, quandam in tunicam lingua subiectam decurri & gustui inseruit, tertia coniugatio: Vesal. & Plat. in tunicam palati dilatari u- luerunt: Galeno in tunicam os succingentem: Andernacus refert alijs quartum pa- neq; ad palatum, neq; ad linguam propagines detulisse, sed ad occiputium reflexisse.

De Neruo auditorio, seu de quinta coniugatione.

CAPVT XXII.

De hac coniugatione egit Galenus 9. vs. part. 10. & lib. de dissect. neruor. 6.

QUINTA coniugatio [tab. 14. fig. 1. & 2. a. tab. 13. fig. 20. M.] ad cerebri basis latera Galeno ^a imo ex cerebri medulla oblongatâ, vbi cerebelli portio ungitur [tab. 18. fig. 1. i.] ex furculis seu neruis à duobus, altero molliore, quo nullus visorio excepto mollior est & auditui proprius est, altero duriore eascitur, qui simul membranam egrediuntur & ad petrosum feruntur, quos pleriq; iungi voluerunt, pro vno neruo recensuere, vt qui quintum par ex parte molli & ^b parte durâ constare dixerunt, cùm tamen reuera (quod etiam Galenus ^c & Fallopius notarunt) distincti sint [t. 14. fig. 2. sub a. apparet.] Hic ergo neruus per foramen satis insigne & tortuosum, quod in ossè petroso ^d est, ipsique proprium & ossis temporum foramen quintum est, in ipsam cauitatem, quæ cuniculi formam refert, & auditus organo præparata est, ducitur. Mox portio durior per canalem proprium versus anteriora fertur (arteriam comitem habens quæ ab ea quæ per crassam meninges diffeminatur, ortum ducit) & per idem os ad posteriora oblique recurrit, & in cauitatem tympani dictam labitur, ita tamen, vt suo proprio canali seo semper incumbat: inde magis reflexus, duos arcus, alterum superne, alterum inferne educit, in singuli per proprium foramen transeunt: superior quidem [tab. 14. fig. 1. & 2. b.] transuersim fertur

^a 9. vs. part. 10. de diff. neruor. 6. ex medulla propemodum dorsalis medulla sede in cranio existens. Vesal. ad basin cerebri, & à laterali parte circa medietatē exoritur, Columb. ab ea sede, qua Anatomice explicata est, Fallop. obseru. à dorsali medulla parte mediâ profundius à processu quodam cerebri, Plat. à posteriore medulla parte cui calamus assistit, paulum progressum in audiendi

T t

per organum per-

ueniens, sic descripsit Archangelus. ^b Vide 16. vsu partium 3. ^c Quinta coniugatio licet manifeste duplex existat, una tamen propter Marinum esse concedenda de dissect. neruor. 6. ^d Alter in lapidei ossis foramen, quod veteres Anatomi acutum vocarunt, propterea quod anfractum illum per quem neruus foras postea exscidit, haud possint perfecte perforare, de dissect. neruor. 6.

c Non quòd ille ad hunc perueniat, sed quòd hunc ipsum, dum ad seipsum adueniat, ex-
pèctet: de d. ss. neruor. 6.

f Totum fere in latum musculum (quem & myodes plary, ma, i. musculorum dilatione appellamus) scinditur, qui cuti subnascens vnde for mouit de d. ss. neru. 6.
g At Laur. qui à prima conformatio-
ne furci juxta, obstraculo, exo-
luto, & r. s. fi-
gerato neruo
quinti paris,
bi pariter ob-
mutescunt.

per foramen [t. 3. fig. 9. V.] quod etiam venula ad au-
ditus organum pertransit: hicque quarti paris (seu
tertij vulgo dicti) ramo instar capreoli vitis [tab. 14.
fig. 2. R.] commiscetur. Inferior vero [tab. 14. fig. 2. c.]
foramen impenfe angustum & tortuosum [tab. 3. fig.
9. ad d.] egreditur, qui transuersim supra musculum
masseterem delatus, mox etiam tertij paris ramo ca-
preolum imitante, siue propagini nerui, qui ad lin-
guam fertur, commiscetur, & à lingua ad buccarum
musculos f & ad cutim circa auriculæ radicem de-
fertur, forte nō minus ad gustum, quàm ad auditum
conferent; quæ forte causa, quòd surdi g etiam mut
fere nascantur. Nonnunquā foramen cæcum egres-
sus, deorsum fertur, ac si sextam coniugationē [t. 14.
fig. 1. & 2. e.] comitaturus esset, & ramulos ad laryngi
musculos proprios mittit, vnde ex consensu aurium
linguæ & laryngis, quando aures profundius expur-
gamus, sicca tussicula excitatur. Aliquando etiam ra-
mulos cum quarto, quinto & sexto neruo brachij, i
totum brachium mittit: imo etiam sæpe spinalem
medullam comitatur, & ramulos suos vnà cum ner-
uis medullæ etiam in totum pedem transmittit. A
mollis huius nerui portio [tab. 14. fig. 2. a.] qui vèp
an 85. 1205, neruus auditorius reuera est, cū dura por-
tione fertur, & vbi ad extremum cavitatis h supra di-
ctæ peruenit, membranæ modo dilatatus [t. 14. f. 1. e.
2. φ.] auditus instrumentum k præcipuum fit, & in c
fed

h Fallop. voluit, vbi ad cavitatis extremum peruenit, quibusdam angustissim
foraminibus medijs in cavitates geminas labyrinthum & cochleam distribui, &
illas quodam modo sublinire neq; ulterius procedere, vllum ve neruum à se ade-
teriora dimittere: Alij per foramen ossis temporum quartum rursus elabi, & li-
gua nerui propagini quæque commisceri, scribunt. i Auditorius vnà cum du-
meninge, inde exoriente, in auditus foramen incidit, cum qua in latitudinem s
explicans meatum, leuiter deducit, de d. ss. neruor. 6. k Auditus organi n
infimam partem constituit. Vesal. neruus auditorius, Fallop. obseru. auditus org-
num, Plat. Nerui auditorij dicti, quod in audiendi organum dirigantur: auditus
enim organum est aer ingenitus membranulâ retundâ conclusus, Archang.

se de remanet, eadem forte ratione, qua & olfactus organum expansum diximus.

De Nervorum coniugationibus sexta, septima & octava.

CAPVT XXIII.

De his Galenus de diff. nervor. 8. 10. 9. vs. part. 11. & 12. & 16. eiusdem 4. 5. & 6.

SEXTA coniugatio [*t. 14. fig. 1. & 2. e. tab. 13. fig. 20. N.*] Spaulo infra ^a quinti paris seu nerui auditorij exitū, aliquot fibris ^b initium sumit, quæ statim multo unitæ neruū maximum constituere creduntur, & non ita uniuntur, quin reuera semper nerui duo liquousq; permaneant, qui vnâ membranâ continentur (quare vnus censetur) & idem foramen, quod occipitij secundum est, [*tab. 4. fig. 10. b.*] per quod venæ iugularis internæ maior ramus ascendit, egre-
diuntur; quorum alter anterior, ac minor, alter posterior ac maior existit. Minor cum ^c extra caluariam sit, rectâ ad linguæ musculos, cuius radici ramulum argitur, & eos, qui fauces occupant, descendit, & naiori ex parte in os absumitur. Maior vero neruus non procul ab egressu, ramum retrorsum mittit [*tab. 4. fig. 2. f.*] qui in musculos ceruicem occupantes, præcipue in musculi cucullarem, qui ^d scapulæ secundus est, multis furculis distribuitur. Ipse vero truncus descendens septimæ coniugationi [*tab. 14. fig. 2. H.*] arteriæ carotidi, & venæ iugulari internæ membranæ interuentu connectitur, & ad laryngis latera à septima coniugatione per ramum [*tab. 14. fig. 2. i.*] adaugetur, cum quo non ^e miscetur, sed colligatur. Mox ad laryngis musculos, potissimum, qui internam capacitatem occupant, furculos transuersim mittit [*t. 14. 2. G.*] ramulos itē aliquot tenues à dicto distinctos, muscu-

^a Sic & Vesal. ad posteriora basis cerebri retro magis quā quintum, Columb. à posteriore medulla parte, ubi calamus assistit, Archang. à posteriore dorsalis medulla parte iam angustata, Plat. ^b Truncus nervorum principia habet Galenus de diff. nervor. 8.

^c Et Fallop. obseru. qui a. serit, alijs Anatomis hæc portione ignotam esse.

^d Vide 16. vs. part 6.

^e Vnus insignis nervus constituitur, qui deorsum fertur, Plat.

musculis faucium largitur. Inde ad thoracē descendit, & per ipsius, quemadmodum & infimi ventris capacitatem fertur; & ramos plurimos ad vtriusque ventris ^f viscera distribuit, quos in historia secundi ventris § cap. 19. explicauimus; & quia per omnia fere viscera excurrit, coniugatio vaga dicitur. Admonet Fallop. membranam, quā neruus hic sextus vestitur, dum per foramen labitur, aliquando manifeste aliquot fibrellas huius nerui absumere aliquando immanifeste, & cū extra caluariam est corpus quoddam oblongum oliuaris figuræ producere, aliquando simplex, aliquando geminum in vtroque latere, quod colore carneum videatur, etsi substantiā nerueum & admodum durum sit; quod corpus oliuare in fibram quandam nerueam desinat, quæ per ceruicem declinans neruorum quibusdam propaginibus, qui à ceruicis primo & secundo pari & quarto, & quinto, sexto vel à primo, secundo, quinto, sexto & septimo copulatis, veluti reticulum quoddam efformat, quod per totam ceruicē in vnoquoque latere anteriori descendit, & in ista complicatione noua alia corpora oliuaria aliquando concrefcere, numero tamen incerto, quæ nullā aliā substantiā, quàm nerueā & quasi in callū concrefcente, consistent. Quam copulam sexti paris plexum appellat; quo plexu plures nerui ad cordis basin ferri asserit; & ab hoc eodem sæpe sapius, neruum, qui ad septum transuersum fertur in vtroque latere ortum ducere quanquam incrementum maius à quinto & quarto pari neruorum ceruicis accipiat. Ab hoc etiam plexu prodire neruum, qui per thoracem descēdens iuxta costarum radices ad mesenterij originem fertur. Hactenus Fallopius. Quod autem ad viscera ab hoc sexto pari nerui mittantur, non autem à medulla, quæ in vertebris est, causa est, quia cum motum voluntarium

f Vide Gal. 10. vs. part. 4. & 5. Verum etiam ad septum transuersum neruos à sexto hoc pari ad sensum & motum deferri, cum quibus nerui à medulla spina inter quintam & sextā ceruicis vertebra exorientes misceantur, censuit Archang. septimum duntaxat à ceruicis vertebris neruos mutuantur, Vesal. g Et Gal. de diff. neruor. 10. 16. vs. partium.

rium ^h non habeant, nervis durioribus, qui à spinali medullâ proprie dictâ prodeunt, non eguere, sed ne sensus expertia forent, solum sensificis, qui molliores sunt, & à cerebri medulla, dum adhuc in cranio est, prodeunt; præsertim cum viscerum ^h substantia etiam mollis sit, opus habuere. At cum hi longo itinere ⁱ ducendi essent, ne læderentur, membranis fortibus obuelari debuere; quare & corporibus proinquis connexi feruntur.

Septima ^k coniugatio [*tab. 14. fig. 1. h. fig. 2. H.*] linguam mouet, & est omnium in cranio prodeuntium purissima, cum ex duriore principio ortum ducat, in ostremo occipitio, vbi cerebri ^l medulla cranio elapsa est [*tab. 14. fig. 1. & 2. E.*] & spinalis medullæ proprie dictæ initium est, vnde aliquot inuicem distantibus radicibus enascitur; quibus simul coeuntibus per obliquum & proprium foramen [*tab. 14. fig. 10. c.*] in occipitio caluariam egreditur, & cum sexto paritatis ^m causa membranis fortibus iungitur, non vero ⁿ commiscetur, & ipsi portionem sui communicat [*tab. 14. fig. 2. i.*] quæ aliquando vnicâ, aliquando geminâ fibrâ constat, ipsum vero septimum suum corpus seruat, ac filo rotundo ac integre linguam deorsum fertur, & vbi ad linguæ radicem peruenit maiore ^o sui parte [*tab. 14. fig. 2. Z.*] in multis fibras ^p soluta omnibus linguæ musculis furcuss ad motum impertit: minori vero portione, ad aliquot hyoidis & laryngis ^m musculos, etiam ad motum

T t 3

tum sal. versus occiput magis

ginem habet, sed à cerebro, non à cerebello, ut Galenus voluit, Columnb. à posteriore parte medullæ, vbi cavitatis calamo scriptorio assimilis insculpta est, Archangelus, tres primas coniugationes ab altiore medullæ parte natas, spiritum animalem à quarto ventriculo haurire, reliquas quinque ab inferiore, & spiritum animalem à calamo scriptorio accipere: Laurent. fere ab occipitis & spinali medullâ, quibus (subiungit) duo paria recentiores addunt, (sed non describit.) ^m Galenus ^o vsu partium 11. ⁿ Sic & Fallopius in obseruat. ^o Maximâ sui partem in lingua musculos distribuitur, dissect. nervorum 8. ^p 9. vsu partium 13.

h 9. vsu partium 12.

i 16. vs. partium 5.

k De hac egit Galenus de dissect. nervorum. 8 9. vs. part. 11. & 12. septimam vocans, quemadmodum & ceteri Anatomeici; at Archangelus octauam facit, quia organa olfactus pro secunda coniugatione recensuit.

l Vbi cerebri desinit 9. vsu part. 12. à dorsali medulla vbi modò caluariam est egressura, Vetus sal. versus occiput magis

tum ramulos mittit; sic & furculos aliquot [*t. 14. fig. 2. l.*] ad musculos, qui ab appendice styloide principium ducunt, tribuit fibræ etiam maioris rami, cum quinti nervi fibris commisceri videntur.

¶ Quartum par nervorum à media penitus basi cerebri & quasi ab incipiente origine spinalis medullæ, Fallop. observ. hanc radicem cum sua coniuge liceret peculiaris coniugij loco recensere, ne vero Anatomicorum, ordinem qui eas radices prorsus ignorarunt, certum rem,

Octava & coniugatio [*t. 14. f. 1. & 2. d. tab. 13. fig. 20. L.*] (quam alij quinto pari adscribunt) supra auditorium nervum ex cerebri medulla prodit, auditorio nervo multò gracilior & durior, inter secundam & tertiam coniugationem; quæ sub cerebri basi sursum & antèrius, versus latera fertur, & crassa meninge inter secundam & tertiam coniugationem perforatâ, per foramen ¹ secundæ coniugationis oculi orbitam ingreditur, & pene tota in oculi musculum, qui eum ad exteriorem angulum trahit, absimitur: Cæteri tamen volunt in musculum temporalem, & eum, qui in ore latitat, distribui, quod manifeste demonstrari nequit. Hæc sane coniugatio ratione exortus sui ante quintam & sequentes recensenda erat, sed metuentes, ne in immutando Anatomicorum numero, confusionem pareremus, ultimo loco enumerare maluimus. ¹

ipso quinto pari adscribam, & minorem quinti paris radicem vocabo, Vesal. octavum par nervorum cerebri, Columb. faciei musculorum altera & posterior coniugatio à veteribus non observata, seu quinti paris nervus minor, Plat. ¹ Sic & Fallop. per foramen proprium in sphanoide locatum in temporalem, & in ore latitantem fertur, Vesal. Columb. Plat. ¹ Columb. nonum par, quod inuenerit, addit, nervorum exilium, à binis cerebri processibus, qui nates dicuntur penes testoriantur, tenues satis & exiles, faciem versus accedunt, & apud tertium & secundum par transeunt, & in tertium palpebra musculum inferuntur; ramulus tamen ad oculi musculum etiam defertur. Hac ille.

De Nervis à spinali medulla proprie dicta, profluentibus.

CAPUT XXIV.

De his consule Galenum de dissect. Nervorum à cap. 11. ad finem libelli, secundum textum Latinum; in codicib

enim Gracis impressis capita septem posteriora desiderantur. 13. vs. part. à cap. 4. ad octauum; item 16. vs. part. 6. & 7. de plac. 8.

EXPLICATIS Neruorum coniugationibus, quæ cerebri productiones, & cerebri nerui dicuntur, cū tamen ab ipsius cerebri medullâ oblongatâ, quæ adhuc intra caluam conclusa continetur, prodeant: nunc de Neruis, quæ ab eadem medulla, quatenus adhuc in vertebris spinæ cōtinetur, ortum ducunt, & idcirco spinalis medullæ (dorsalē medullam Galenus^a vocare solet) nerui nominantur; sermo erit. Ab hac enim medulla omnibus^b partibus, quæ sub facie sunt, præterquam visceribus vocisque instrumentis, nerui suggeruntur; partim, quòd horū nulla cum cerebro coniuncta esse oporteret, vt cor & hepar; siquidem omnia principia facultatum animal regentium, coniuncta esse oportuit: partim, quòd prope cerebrum sint sita, soloque sensu indigeant.

Neruorum spinalis medullæ^c coniugationes triginta^d & distinctis paribus & sedibus prodeuntes enumerantur, & quidem ex medulla, vel dum in ceruicis, vel thoracis, vel lumborum, vel ossis sacri vertebris continetur, & per foramina vertebrarum exiunt, idque vel duplici exortu per duo foramina parte anteriore & posteriore, vt in duabus primis ceruicis & quinq; ossis sacri coniugijs videre est; vel simplici exortu per vnum foramen in vtroq; vertebrarum latere, quod cum reliquis omnibus fit.

Ceruicis^e coniugationes alij septem^f alij octo^g recensent in totum caput exterius, eiusque musculos dispersas. Prima & secunda^h coniugatio, non aliorum neruorum modo exoriuntur, ita vt per vertebrarum latera egrediantur, & vnus à dextra, alter à sinistra parte prodeat: sed alter ab anteriore, alter à

^a De dissect. neruor. de ossib. & alibi.

^b 16. vs. partium 3.

^c De his Galen. de dissect. neruor ab 11. ad 15.

^d 7. plac. 8. at 12. vs. part. 15. in neruos octo & quinquaginta dorsalis medulla diuisa.

^e De his 6. vs. part. 6 & de diss. neruor. 11.

^f Septem paria Gal. Vesal. Plat. Lauren. quinque tantum Columb. g 13. vs. p. 5.

octo paria recenset, & Archangel.

^h Gal. de diss. neru. 11. & 12. vs. part. 4. &

s. Vesal. Plat. & Laurent. at Col. de secundo pari hoc refert.


TABVLA XV. & XVI. *Cum iisdem utatur characterib. coniunguntur. TAB. 15. spinae vertebrae & inde prodeuntes nervos anteriore facie exhibet.*

TAB. XV

LIB. III.



TABVLA XVI. *Spinae vertebrae & inde
prodeuntes Nervos posteriore facie
proponit.*





posteriore parte per foramina procidit, quod propter diuersam primæ & secundæ vertebræ articulationem fit, quæ propter motus securitatem talis est.

i De hac Gal.

de sect. nervi

ii quæ coniu-

gatio parua

est in his vi-

ribus, in

quibus prima

vertebra par-

ua sunt velut

in homine;

maiora vero

in quibus ma-

iora velut in

serratis den-

tibus habenti-

bis & corni-

geris, & in si-

mijis, quæ ho-

mini in pluri-

bus particu-

lis, tum in col-

lo simillima

sunt; hac con-

iugatio tan-

tum in mus-

culos, quæ in

ca capitis de-

articulatione

nem sunt, &

distribuitur

k Valsius

(qui interio-

rem non sem-

per pericranii

dicit) fiat.

& Lantano

at Columb.

Prima coniugatio inter occipitium & primam vertebram exit, quod ut facilius fiat, in occipitis osse primaque vertebra cauas quædam parua (licet in canibus, in quibus grandior est vertebra, tantum in ipsa vertebra super sit excelsioris) existit; & priusquam exeat supra spinatam medullam reflectitur: mox in duos ramos paruos diuiditur: alterum anteriorem graciliorem [tab. 15. H.] qui musculis collo insidentibus & œsophago subiacens, ceruicem flectentibus inferitur: alterum posteriorem [tab. 16. F.] furculo gemino, altero gracili qui in capitis musculos paruos in occipitio sitos disseminantur, & quidem dexter ramus in dexteri lateris musculos, sinister in sinistri absuntur: quod etiam de reliquis sequentibus nervis intelligere oportet: alter [tab. 15. G.] in principium musculi scapulæ sursum trahentis, abit: nam cum parui sunt extra musculos non procurrunt.

Secunda coniugatio principis prodit: anteriore ratione [tab. 15. N.] tamodum gracili, inter primam & secundam vertebram ad latera dentis elabitur, qui in musculos collo insidentes, quemadmodum & primæ coniugationis ramus, cum quo implicatur, distribuitur, & in euntim fere totum faciei absuntur: Posterior vero & maior [tab. 16. I.] per latus posterioris processus secundæ vertebræ educta, statim in duos ramos imparos scinditur, quorum crassior [t. 16. K.] per transversum versus spinæ medium tendit, ubi musculi cervicem occupantes congreguntur, & tertiæ coniugationis [tab. 15. D.] furculo [tab. 16. L.] ad auge

anteriora non meminit.

1 Dorsum mouentium primum par. Vals. & Plat. sin. cervicem flectentium primus seu longus Bapino. in De dissect. nervi. 12. n. A quantum musculi longi & œsophago communem, Columb.

ugetur, & ex posterioribus sursum ° capitis anteriora tendit, inq; vniuersam capitis cutim ad verticis sq; summum, imo & ad aures, propagines [tab. 15. & M.M.] dispergit: minor vero ramus [t. 16. super B.] principia musculorum tertij & sexti paris capitis distribuitur.

Tertia P [tab. 15. charact. 3.] ex communi foramine, quod 1 secundam & tertiam vertebra intercedit, rumpit, & in duos ramos secatur, quorum anterior [tab. 15. P.] in quatuor furculos diuiditur, horumque primus [tab. 15. Q.] ceruicem ⁊ flectentium par primum accedit: alter [tab. 15. & 16. R. conuascitur cum T.] deorsum fertur, & cum furculo quarti paris 1 conmixtus in musculos œsophago subtractos distribuitur: tertius [tab. 15. S. tab. 16. K. ad L.] sursum fertur, & cum secundi paris ramo 1 congregitur, & in verticis latitudo absumitur: quartus [tab. 15. & 16. T.] in musculos ceruicem in latera agentes, & eum, qui scapulam tollit; & in illum quadrangularem à carnea membrana profectum, qui labrum oblique deorsum trahit, dispergitur. Posterior [tab. 15. & 16. O.] in musculos capiti & collo cōmunes ipsum erigentes seu ⁊ faciem & semispinalem ⁊ disseminatur.

Quarta u [t. 14. char. 4.] ex cōmuni foramine tertie & quartæ vertebræ elabitur, & in duos x ramos secatur, in anteriorem & maiorem [tab. 15. & 16. X.] qui in tres soboles diuiduntur; quarum prima [tab. 15. & 16. T.] cum tertio paris ramo [tab. 15. R.] mixta, ad mus-

culos, 1 ⁊ 13. vs partium 5.

1 Dorsum mouentium primum par Vesal. & Plat. ceruicis primum par Columb. & Bauhino. 1 Dorsum mouentium 7. Vesalio, tertius Col & Bauhino: tertius laborum Syluio. 1 Dorsum mouentium octauus, Vesal quartus, Columb. & Bauhino; ad musculos maxillarum & caput retro flectentium tertium par facit Angelus. u De hac & conseqq. de diff. nervor. 14. & 15. Tertia & quarta coniugatio nervos suppeditat musculus colli & capiti communibus musculi generis & partibus quæ sunt post aures 13. vs. part. 5. x In multis furculos, quorum 13. vs. ascendunt descenduntq;, alij parte posteriore reflectuntur, Columb.

o Quomodo à cerebro multis partibus, quæ sunt sub facie nervi pars distributa est, propter usus memoratos: sic ad caput ex spinali medulla colli. nervos sursum ducere non piguit, magnus, in quibus temporalis usus maximus est. & aurium substantia magna est, facileq; ac multum mouetur; omnino enim exiguus ijs animalibus quibus horum nihil inest, ut homini & similia. 16. vs. part. 6. p De hac Galenus de diff. nervor. 13.

TABVLA XVII. *Cerebrum cum cerebello
totaque spinali medullâ & nervis totius
corporis proponit.*



y Primitū par sculos œsophago y substratos, qui ceruicem flecten-
 dorſi, *Vesal.* rium primum par conſtituunt, abit: altera [*tab. 15. a.*]
 & Platero: in musculos ceruicem ^a in latera flectentes, seu ſe-
 primum par cundum par & ſcapulæ ^b musculum ſecundū ſeu cu-
 ceruicis, Co- cullarem: tertia [*tab. 15. b.*] gracilior, cum quinti pa-
 lumb. & Bau- ris ramo [*tab. 15. c.*] & quinti cum ſexti propagine [*t.*
 hino. 15. m.] vnita iuxta mediſtinum (ramulum vtrinque
a Secundum vnum tribuens) & ſupra pericardium deſcendit, vi
 dorſi, *Vesal.* ex his ^c tribus principijs diaphragmatis neruus [*tab*
 2. ceruicis, Co- 15. & 16. n.] conſtituatur, qui in iplius neruoſum ten-
 lumb. & Bau- dinem, quem caput alij vocant, inferitur: nonnun-
 hino 8. Tho- quam hæc quarti paris ſoboles deſicit, & tunc à ſe-
 rac. Fallop. ptimo pari ſurculus accedit; præcipua tamen pars:
b 2. ſcapula quinto pari proficiſcitur. Poſterior vero & minor ra-
Vesal. Plat. mus [*tab. 15. & 16. v.*] ad tertiæ vertebræ ſpinam, mu-
 & Fallop. 1. ſculis ceruicis, ei vertebræ incumbenſibus ſurculo
 Columbo: largitur, indeque in membraneum buccarum mu-
 trapezius, ſculum abſumitur.
 Sylui. **c** A quarta
 cum quinta
 & ſexta mi- Quinta ^d [*tab. 15. charact. 5.*] ſub quinta vertebræ
 xta, Galeno, excidens ^e in duos ramos ſcinditur, anteriorem &
 13. vſ. part. 5. poſteriorem. Anterioris [*tab. 15. & 16. d.*] primus ſur-
 & 9. vide diſſ. culus [*tab. 15. à D. ad charact. 6.*] musculos ceruicem fle-
 neruor. 15. ctentes petit: alter [*tab. 15. e.*] cum quarti & ſexti ^f pa-
 duntaxat à ris propaginibus [*tab. 15. ex b. e. m.*] neruum diaphra-
 ceruicis ver- gmaticum conſtituit: tertius [*tab. 15. & 16. f.*] ad mu-
 tebris, *Vesal.* ſculum deltoidem, qui brachij ſecundus eſt, fertur.
 à ramo quarti
 & quinti pa- ſculum
 ris, & in qui- qu
 buſdam etiam
 à ſubſequentibus conſtituitur, in nonnullis à quarto pari: ſed hoc rarius; ſapi-
 vero à quinto: at carnea porſioni iplius ab infinitis thoracis neruis, & prin-
 lumborum tribuit. Columb. non ſolum à ceruicis paribus ſed etiam à ſexto ceru-
 pari deſerri voluit Archang. cum tamen Galenus de diſſect. neruor. 10. admirati-
 ue dignum dixerit, cum ne minimam omnino porſionem ex hac ſexta coniugatio-
 ſuſcipiant: à quarto, quinto, ſexto & ſeptimo pari nerui quatuor ad diaphragm-
 feruntur. Laurent. à ceruicis omnibus tribus paribus, præcipua parte à qui-
 to pari proſecto, Plat. d Eaſdem partes, quas quarta motu & ſenſu illuſtr.
 Archangel. c Minore ramo in poſticos ceruicis musculos, maiore in diaphra-
 gma, brachium & ſcapula musculos derivatur, Laurent. f 13. vſu part. 5.

quoramuli [t. 16. TT.] musculis scapulam attollenti-
 bus & cucullari & leuatori^h porriguntur. Ab eodem
 ilius nervus [tab. 15. & 16. g.] emergit, qui multis fur-
 culis, cuti deltoideam integram implicatur, alius vero
 in profundo latitans ad scapulæⁱ ceruicem in duos
 ramos scinditur, quorum anterior [tab. 15. & 16. h.] &
 ramus deltoidei, ubi à clauicula originem ducit, so-
 les tribuit; nonnunquam & cuti, aliquando ve-
 nam humerariam comitando: Posterior vero cras-
 sor [tab. 15. & 16. i.] primum furculum in secundum
 musculorū^k ossis hyoidis siue coracohyoideos;
 in venâ & arteriâ comitatus musculo super scapu-
 ri superiori, ^l tum in deltoideam qua à scapulæ spi-
 na nascitur, & tandem furculos [tab. 15. & 16. π.] ad
 extremum brachij sede externâ mittit. At posterior [tab.
 16. c.] ad spinarum apices refluxus eodem modo, quō
 posterior quarti paris ramus distribuitur.

Sexta^m [tab. 15. charact. 6.] sub quinta vertebra
 excidit in ramumⁿ anteriorem & posteriorem
 diuiditur. Anterior [tab. 15. l.] postquam propagi-
 nem [tab. 15. m.] quintæ coniugationis^o ramo ad dia-
 phragmaticum constituendum iunxit cum septima
 & p^r thoracis prima coniugatione vnitur, [tab. 15. &
 16. q.] rursusque varie diuiditur, & cum sequentibus.
 Nervos ad brachium mittendos efformat: at pecu-
 liarem furculum [tab. 16. p.] ad scapulæ^o cauum in
 musculos eam attollentes mittit. Posterior vero ra-
 mus [tab. 16. k.] in musculos caput & ceruicem mo-
 uentes, eadem serie cum cæteris dispergitur: item in
 capita musculorū^q respirationi inferuentium, qui
 à cruce thoracem adeunt, qui etiam à septima con-
 iugatione & prima thoracis nervos accipiunt.

Septima [tab. 15. char. 7.] sub sexta ceruicis vertebra
 excidit, & cum sexta ceruicis & thoracis prima [tab.

Vu

15. f.]

q. 6. v. part. 7. r. Magna sit cum utraq. propinqua commistio. 13. v. part. 5.

g Scapula 2.
 Vesal. Fallop.
 Plat. Bauhin.

1. Columb.

h Scapula 3:

Vesal. Col.

Fall Plat. 4.

Bauhino.

i Quomodo

& unde nervi

ad hunc mu-

sculum feran-

tur, vide 16.

v. part. 7.

k Quartum

par, Vesal. Co-

lumb. Fallop.

Arantio: 2.

par Syluio

& Bauhino,

digestrici,

Galeno.

l Quartus

brachij Ve-

sal. Columb.

Fall 6. Bauh.

m Primum

par nervorum

manus, Col.

cæteris sextū

par.

n Alter in

brachium, al-

ter in diaphra-

gma, Lauren.

o 13. v. super-

tium 5.

p Cum septi-

ma & octava

Vesal. qui o

ctauâ etiam

primam tho-

racis vocauit.

f Cur non ex
 cerebro, sed
 cervicis con-
 iugationibus,
 & cur non ex
 tribus primis,
 sed quartâ
 portione ara-
 neâ simili, ex
 quinta vero
 memorabi-
 bilē, ex sexta
 aliâ hac mi-
 norem, at ma-
 iorem primâ,
 diaphragmati
 nervos tribue-
 rit, sic 13. vs.
 part. 9.
 t De hac re
 vide 16. vsu
 part. 6.
 u Octavum
 addit Galenus
 13. vs part. 5.
 & Archang.
 inter septimâ
 & octavam
 vertebrae,
 cuius distri-
 butio potissi-
 mum in cubi-
 tum & ulnâ
 fiat, nec ultra
 pergat.

15. f.] securitatis gratia coniungitur, cuius præcipua
 pars^r in brachium fertur: à quinto enim, sexto & se-
 ptimo cervicis, & primo ac secundo thoracis coniu-
 gijs, brachij nervi producuntur: Interdū ab hac con-
 iugatione, & ad diaphragmaticū nervum cōstituen-
 dū ramulus procedit. Quare cum à cervicis^f medulla
 non pauci nervi ad diaphragmaticum constituen-
 dum concurrunt, mirum non est in Apoplexia dia-
 phragmatis motum aliquantis per servari; nam licet
 propter ventriculorum cerebri obstructionem, ut
 vulgo censetur, spiritus animalis ad diaphragma de-
 ferri nequeat, attamen cum spinalis medullæ cavitas
 etiam spiritus animales non nihil contineat, qui per
 nervos hosce ad diaphragma perferri possunt, &
 paruum quendam motum tribuere, vnde respiratio,
 licet admodum parva, sensumq; effugiens, remanet,
 à qua vita tantisper servatur, quàm diu spiritus ani-
 malis in cavitate medullæ spinalis fuerit: & si obstru-
 ctio ventriculorum tollatur, Apoplecticus ad se re-
 dit; sin minus, diem suum claudit. At posterior ra-
 mus [tab. 16. r.] minor, qui semper adest, ad musculos
 & cervici instratos, & musculo^t buccarum quadra-
 to soboles largitur, in quem & à quinto pari cerebri,
 & à septem cervicis, primo solū excepto, secun-
 dum fibrarum ductum exporrecti & etiam ad cutim
 furculi mittuntur; non mirum ergo, si spasmus cyni-
 cus gravis sit, cum hic musculus in hoc spasmō pri-
 mō conuellatur.^u

DE NERVIS THORACIS.

CAPUT XXV.

De his Galenus de diff. nervor. 16. 13. vs. part. 5. & 6. 16. vsu
 partium 7. pauca.

NERVI per Thoracem disseminati, non secus
 quàm per collum duplices sunt: alij enim à ce-
 rebro

rebro, seu rectius, ipsius medullâ in cranio conten-
tâ, alij ab ipsius medullâ dorsi vertebrastranseunte
originem ducunt. A cerebri quidem medulla sexta
cerebri coniugatio per ipsum fertur, de qualibro se-
cundo verba fecimus. A medulla vero spinali, quate-
nus dorsi vertebrastranseunte, coniugationes ^a duo-
decim, alijs tantum vndecim profluunt: quæ omnes
post egressum in duos ramos diuiduntur, alterum
maiolem, alterum minorem, quorum alter antro-
sum, alter versus posteriora reflexus, fertur.

Prima ^b coniugatio [tab. 15. char. 8.] inter septimam
cervicis & primam thoracis vertebrastranseunte, ab utroq; la-
tere egressa in duos ramos scinditur: horum ante-
rior maior, ubi à septima coniugatione, interdum
etiam à secunda Thoracis, portionem [t. 15. & 16. x.]
suscepit, vicinisq; coniugationibus varie commixtus
est, & aliam accedit, ex posteriore regione propa-
gines, [tab. 16. xx.] in cavam scapulæ regionem distri-
buit, & in brachium fertur, de cuius distributione in
brachium historiâ sermo erit. Præter hanc ad bra-
chium propaginem, aliam habet [tab. 15. y.] quæ an-
trorsum secundum primam costam ad pectoris ossis
summum delata, furculos primo thoracis musculo
subclauio dicto, ubi largita est, in musculos, qui à
pectoris ossis summo originem ducunt, ut sunt ma-
ioides seu capitis septimus, sternohyoides ^d & oeso-
phagei ^e absuntur. Posterior vero ramus [tab. 16. u.]
qui gracilior est, sub musculis, qui vertebrastranseunte
adnati sunt, reflectitur, & in transitu musculo cervicis se-
cundo, & ijs, qui cervicis & capitis motibus in poste-

a Thoracis
nerui unde-
cim sunt, non
12. ut Vesalio
placuit; nam
licet verte-
bra 12. sint,
tamen fora-
mina 11. tan-
tum habent
Et, totidem
sunt costarum
internalla,
Columb. duo-
decim paria
ex medulla
dorsali colli-
gantur. Et ne-
na spina, dorsi
prima est, Ar-
chang. Tho-
racis 12. paria
prima & 2.
anteriora ra-
mo in bra-
chium, poste-
riore in
thoracis mu-
sculos fertur:
reliqua decem;
anteriora par-
te ad singula
riora costarum spa-

Vu - 2

ria; posteriore ad musculos thoracis, & spinatos in vertebrastranseunte latitantes subiectos,
hac Laurentius. b Primum thoracis par seu dorsalis medulla octavum par,
Vesalio. c Anteriore ramo in brachium, posteriore in thoracis musculos fer-
tur, Laurent. d Primum par hyoidis Vesal. Col. Fall. Arant. 4. per Syll. 3. par,
Bauhino. e Tertium par commune laryngis, Vesal. Fallop. Bauhino, 5. Muscul.
Septimus. f Et Col. at Vesal. 2 par dorsi,

g. *Scapula* 2.
Vesal. Fallop.
Bauhino 1.
Columb.

h. *Scapula* 4.
Vesal. Col.
Fall. at Bauhino 3.

i. *Thoracis* 3.
Vesal. Col.
Fallop. 4.
Bauhino.

k. *De hoc Ga-*
ler. de diff.
neru. 10.

l. *De dissect.*
neruor. 16.

m. *Thoracis*
secundus, Ve-
sal. Col. Fall.
Bauhino.

n. *Scapula*
primus, Ve-
sal. Fallop.
Bauhino se-
cundus, Co-
lumbo.

o. *Brachij*
primus Ana-
tomis.

reriora præsumt, soboles impertit : vbi vero septimæ vertebræ spinam attigit, ab ea discedens, transuersim ad humiliorem sedem musculi cucullaris g & rhomboidis h & ferratum pasticū superiorem i furculos offert.

Secunda coniugatio [*tab. 16. charact. 9.*] inter primam & secundam thoracis vertebræ egressio, quemadmodum & præcedens, ramum [*tab. 16. l.*] in posteriora & mittit, & distribuit : dein portione non minima cum præcedentis ramo iungitur [*tab. 16. d.*] & in brachium fertur ; reliquum secundum costæ primæ ductum ad pectus abit, & intercostalem nerum constituit, à quo soboles in musculos thoraci incumbentes distribuuntur.

Tertia vero, & reliquæ nouem coniugationes [*t. 15. char. 10. vsq. ad 20.*] thoracis, eodem modo distribuuntur ; vbi enim è vertebrarum lateribus prodire, in ramos duos scinduntur. Anteriores rami, qui intercostales dicuntur [*tab. 15. nn.*] ipsi costali neruo ; qui sexti paris cerebri ramus dicitur, & sub pleura ad costarum radices fertur, furculum k in transitu offerunt, totoque ipsius incessu illum ramulo adaugent ; nam rami ipsi rectà secundum costarum ductum, per costarum l interualla ramo venæ sine pari & arteriæ magnæ ramo comite proprio sinu, qui costæ cuiuslibet interiore & inferiore sede, ad horum trium vasorum transitum insculptus est, in anteriora sub pleura prope musculos intercostales feruntur, ita quidem, vt intercostales verarum costarum ad os pectoris pertingant ; spuriarum vero etiam in abdominis anteriora supra peritonæum ferantur. Ab his varij rami [*tab. 15. 000. & charact. lateris sinistri*] in musculos intercostales tam internos, quàm externos & thoraci incumbentes [*tab. 15. 00. i. n. xx.*] vt ferratum maiorem m & minorem, n pectoralem, o latissimum

tissimum P [tab. 15. μμ.] & in abdominis musculum obliquum descendentem; ipsorum musculorum fibras imitantes disseminantur, thoracisq; cuti sparsim furculi offeruntur; & cum non solum hi, sed & reliqui musculorum capitibus rectè inferi debuerint, mirabiliter ad venas, arterias & ligamenta illius loci reflectuntur. Sic ab intercostalibus inferioribus, abdominis musculis furculi [tab. 15. λλ.] communicantur. Tandem ab intercostali quartum fere interualum perreptante propagines [tab. 15. ν.] in musculum pectoralem disseminantur: à quibus furculi papillarum petunt, qui ipsis sensum exactum triuant. Posteriores rami, seu minores, retrorsum ad vertebrarum spinas flectuntur, inter musculos vertebris adnatos, qui dorfi & thoracis motibus præstant, latitant, in quos toti non absumentur; nam ubi spinarum apices attingere, inter musculorum vtriusque lateris congressum excidunt, & in musculos, qui ab hisce apicibus oriuntur, ut sunt splenic. q rhomboides, r cucullaris, f latissimus t ferratus pollicis inferior u distribuuntur, aliquot in dorfi cutim distribuuntur. Verum nervorum in cutim distributio non omnibus eadem est; quare nec certo ordine, nec certo numero recenseri possunt; siquidem trunci nunc in plures, nunc in pauciores ramos per cutim dissecentur.

Dux denique x postremæ Thoracis coniugationes, furculos [tab. 15. ad latus charact. 18, 19.] capitulum baris musculi, seu femoris sexti offeruntur.

DE NERVIS LUMBORVM.

CAPVT XXVI.

De his Galenus lib. de diff. nervor. 17.

A Medulla spinali in lumborum vertebris contenta, nervorum coniugationes quinque; a ortum

Vu 3

duce-

p Brachij 4.
Ves. Gol. Fall.
at Bauhino 3.

q Capitis
musculorum
primum par
Anatomicis.

r Scapula 4.
Vesal. Col.
Fall. at Bauhino 3.

f Scapula 2.
Vesal. Col.
Bauhino 1.
Columbo.

t Brachij 4.
Vesal. Col.
Fall. 3. Bauhino.

u Thoracis 5.
Vesal Fallop.
Bauhino, 4.
Columbo.

x Apostremis
thoracis ner-
uis alij deci-
dunt, quibus
septi transuer-
si pars carnea
gaudet, Col.

a Lumborum
coniugia quinque
sunt, licet in
quinque lumbis

rum vertebra
quatuor tan-
tum forami-
na sunt; quia
inter extre-
mam thora-
cis vertebrā
& primam
lumborum
primum par
intedit, quare
inter lumbo-
rum potius
quam thora-
cis adnume-
rari debet,
praesertim cū
ventri infe-
riori non tho-
raci deser-
uiat, Columb.
Ex lumborum
vertebris
quinq; effe-
runtur, par-
tim inexter-
nos & poste-
riores muscu-
los, partim in
internos ijs
neruis impli-
cati, qui de se-
ptima coniu-
gatione cer-
uicis eodem
deriuantur.
Archangel.

ducere communis sententia est, quæ ipsis thoracis coniugationibus maiores sunt, & ex foraminibus vertebrarum lumborum profilientes in eo cum neruis thoracis conueniunt, quòd quælibet coniugatio in ramum anteriorem & posteriorem diuiditur, & quòd à posterioribus ramis [tab. 16. char. 52. 53.] propages in musculos vertebrae lumborum adnatos distribuuntur; ipsis vero commune, ^b quod in spinales musculos & abdomen & lumborum carnes disseminantur.

Prima coniugatio ^c [tab. 15. char. 20.] quemadmodum & ceteræ coniugationes, sub peritonæo, vertebrarum foramen egressa, in ramos duos finditur, anteriorem maiorem, à quo surculi in diaphragmatis carneas portiones mittuntur: alij vero ad caput musculi lumbalis, ^d alij ad musculos abdominis. Posterior minor est & reflexus in musculos lumborum vertebrae incumbentes, quemadmodum & sequentium coniugationum absimitur, ut sunt musculi, sacro-lumbus, ^e musculus longissimus, ^f sacer: g ubi verò ab ipsis spinarum apicibus prodeunt, ad latera excurrunt, & in cutem & brachij muscolum latissimum disseminantur.

Secunda coniugatio [tab. 15. char. 21.] sub sexto femoris musculo, seu lumbali, cui ramulos impertit, fertur: mox assurgens ad ossis ilij summum, ipsius propago posterior, abdomen transiens, primis femoris musculis seu narium auctoribus & tibiae extenden-

Lumborum coniugationes quinque, quarum posteriores rami in rachitæ musculos, anteriores in abdominis, femoris internos musculos ac testes feruntur. Hac Laurent. ^b Diff. neruor. 17. ^c Per foramen commune quod est inter 12. thoracis & 1. lumborum vertebram, Columb. ^d Femoris 6 Vesal. Fallop. Bauhino. 5. Columb. ^e Thoracis 4. Vesal. & Fallop. 5. Columb. 6. Bauhino. ^f Dorsæ par 6. Vesal. 2. Columb. Bauhino. 2. par lumborum Sylvio. ^g Dorsæ 7. par Vesal. 3. Columb. Bauhino. 3. lumbor. Sylua.

tendentium primo ^h seu membranoso, sensum motumq; tribuit. At ramus anterior ad musculum femoris ⁱ iliacum internum & tibiam flectentium primū ^k & ad cutim femoris distribuitur. Ab hac quoq; coniugatione ^l exiguus & oblongus neruus [tab. 15. char. 49.] prodit, qui cum vasis spermaticis sui lateris ad testem mittitur; verum etiam à sexti paris cerebri ramo costali, furculi testibus offeruntur.

Tertia coniugatio [tab. 15. char. 22.] etiam sub lumbali musculo prodit; cuius ramus anterior, prope ilium os transit, in duas propagines diuiditur, quarum altera ad genu ipsiusq; cutim abit: altera venam saphænam comitatur. At posterior ramus reflectitur, & in musculos lumbis incumbētes & cutim diffeminatur. Sic à tribus ^m priorum coniugationum ramis anterioribus soboles [tab. 15. ad latera charact. 20. 21. 22.] ad costalem neruum accedunt, eique iunguntur.

Quarta coniugatio [tab. 15. charact. 23.] quæ lumbalium maxima est, sub lumbali musculo & pubis osse delata, venam & arteriam in inguen comitatur, & propagines aliquas in scrotum & cutim penis dispersgi ⁿ alij notant; verum ab ossis sacri ^o medullæ eò mitti notauimus. Aliàs vero P ad anteriores femoris & tibiæ musculos distribuit, à quibus furculi nonnulli etiam ad genu vsq; quandoq; descendunt.

Quinta [tab. 15. charact. 24.] aliarum instar bipartitur & ramus anterior ac maior, foramen inter os coxendicis, pubis, atq; ilij transit, & propagines alias vtrique musculo femur circumagenti, aliàs ad femur flectentium septimum & octauum; aliàs ad penis ^r musculos (communiter ab ossis sacri medulla) distribuit: item rami ^s ad vesicæ & vteri collum, & à lumborum & ab ossis sacri medulla, at posterior ramus reflexus in musculos lumborū vertebrae insidentes

^h Tibia 6.
Vesal. Col. &
Fallop.

ⁱ Femoris 4.
Vesal. Fallop.
Bauhino 6.
Columb.

^k Tibia primus Anatomicus.

^l Sic Vesal.
Plat Laur.
^m Vesal. &
Plat. à 10. thoracis, & 2. lumborum.

ⁿ Columbo.
^o Sic Galen. diff. neruer.
17. & Archang.

^p In septem ramos est diuisa Columb.

^q Femoris musculus 9.
& 10 Vesal.
Col. Fallop.
Bauhino, vel obturator externus & internus.

^r Col. Plat. at Fallop. ex Galeni sententia, à medulla ossis sacri.

^s Col. ad vesicæ & nerui collū alijs vesicæ à 6. pari cerebri & ossis sacri medulla.

& cutim eius loci absumitur. Deniq; à tribus inferioribus coniugationibus non pauci rami crus accedunt, quemadmodum eo loci dicturi sumus. Præterea hæ coniugationes inter se connectuntur, prima cum secunda, secunda cum tertiâ, tertiâ cū quarta, & quarta cum quinta [tab. 15. fig. 1. ostendit.] eodem penitus modo, & quidem sicuti brachij nerui implicantur.

DE NERVIS OSSIS SACRI.

CAPVT XXVII.

Hos attigit Galenus de diff. neruor. 17. 16. vs. part. 9. libell.

de ossibus cap. 11. & 12.

EX medulla, ossis sacri vertebris inclusa coniugationes ^a sex ^b prodeunt. Prima quidem [tab. 15. charact. 25.] inter vltimam lumborum vertebram & ossis sacri primam, eo modo, quòd lumborum coniugationes producuntur, egreditur, & in ramum anteriorem & posteriorem diuiditur. Anterior ramus etsi maiore parte neruis, qui ad crus mittuntur, permisceatur, propaginem [tab. 15. charact. 53.] tamen secundum
 a Gal. lib. de oss. 11. sex: tria ossis sacri, tria coccygis. sic enim ait: Nerui qui à dorsali medulla per sacri ossis foramina prodeunt, iuxta suarum veluti vertebrarum compages, sicuti per spinam totam prosiliunt, non tamen ab utroq; latere, sed intrinsecus, non extrinsecus: hique omnes tria constituunt paria: quia tres sunt sacri ossis partes: at cap. seq. tria coccygis subiungit, intelligens per sacrum & coccygis os, quod recentiores ossis sacri nomine expresserunt: Gal. de ossib. 12. coccygis os ex tribus particulis constat, iuxta earundem compages, nerui ex parte posteriore prodeunt: homini priores ex ea parte oriuntur, qua coccyx latum os attingit: insequens qua inde oritur habet, ubi prima huius ossis pars cum secunda committitur: duo alij inde egrediuntur, qua secunda pars cum tertia iungitur & libell. de diff. neruor. 17. nerui à dorsali medulla in os coccygis terminantur: sic vero Columb. de illis coniugationibus sub coccyge, quas Galenus somniavit, cum in homine non reperiantur, nil attinet dicere (Galenus aliud per os coccygis intelligit, quàm Vesal. & Columb. vide supra lib. 1. cap. 48.) sic Vesalius ab hominis coniugatione unus neruus exit. b Vesal. Plat. Laurent. sex: at quinque Archang. (qui cervicis octo dixerat) quia in ossis sacri vertebris quinque tantum foramina sunt excavata, qui omnes in crus iter habent, at Columb. cum partis neruis miscet.

cundum ossis ilium internā sedem mittit, à qua furculi abdominis musculis & femoris septimo seu iliaco interno offeruntur. Posterior ramus cæterarum coniugationum modo fertur, & propago [t. 16. char. 54.] in musculos ab ilium osse productos, potissimum in primum femur mouentium spargitur, vnde furculi in cutim natium absumuntur.

Quinq; ^b coniugationes subsequentes [tab. 15. char. 26. ad 30.] aliā ratione producuntur, antequam enim egrediantur, vtrinque geminæ sunt; & vtrinque terius vnus in anteriora, & vtrinque vnus in posteriora exiit. Anteriorum tres superiores, quemadmodum & primæ coniugationis ad crus feruntur: duo humiliores ^c propagines in ^d ani & vesicæ musculis, forte & pudenda, in nonnullis ^e ad ceruicem ^f uteri, vesicæ & penem frequentibus furculis distribuitur: alij denique ad perinæum & scrotum deferuntur. At posteriores rami [tab. 16. char. 54. 55.] in musculos, qui ossis ilium & sacri posteriorem sedem occupant, distribuuntur, in musculum dorsum mouentium ^f longissimū, & sacrum ^g in initium membraneum muscoli latissimi ^h brachij, & thoracis sextum sacrolumbum ⁱ dictum, quatuor femur excurrentes & cutim natium. At medullæ spinalis finis [tab. 15. & 16. char. 56.] ex osse sacro procedens vnam propaginem vtrinque; ^k diffundit: nonnunquam in

^c Sexti & septimi paris propagines Vesal.

^d Gal. diff. nervorum 7. sedis, penis & vesica muscularis, ipsi etiam pudendo ex ossis sacri foraminibus nervorum exortus à dorsali medulla implantantur. & 16. vs.

Vu 5

furcu-

ert. 9. Musculi qui ad anum, vesicam & testiculum: ad hac membrana, qua illic sunt & vesica & matrix & peritonæum nervos accipiunt: idem & Archangel. Columb. addit, in nonnullis ad vesicæ musculis; in collum uteri, sphincteres uteri, vesicæ & penem, Laurent. ad vesicæ & uteri fundum plerunque ramuli à septimo paris cerebriramo costali exporriguntur, Vesal. f 6. par dors, Vesal. 2. Columb. & Bauhin. 2. par lumborum sylu. g 7. Dors, Vesal. 3. Columb. & Bauhin. 3. par lumborum Syl. h 4. Brachij Vesal. Col. Fallop. 3. Bauh. i 4. Thoracis Vesal. Fallop. 5. Columb. 6. Bauhino. k In homine cum os sacrum ex quinque tantum ossib. efformetur, à dorsali termino furculus vtrinque vnus diffunditur, qui sexti paris sacri ossis vices supplet. Vesal.

furculos complures dextros & sinistros distribuitur, qui per femoris musculum quartū & per cutim, quæ inter nates & ad anum vsq; procedit, disseminatur: etsi nerui ritu¹ distribui aliqui velint, & neruū coniuge carentem vocant. Sic in homine se habet; at in simijs & canibus tres sunt coniugationes, quarum duæ tantū inferiores, antè & postèrius educuntur: reliquæ verò coniugationes ab ossis coccygis lateribus, quemadmodum ex Thoracis & lumborum vertebris egrediuntur.

Iuxta tertiam coccygis extremitatem quod reliquū est ex dorsali medulla, simplex ac nulli associatum profilit, de oss. 12. Galen. & alij de nervo quodam loquuntur, quem inconiugatum vocant, si verū esset in externo spinalis medulla reperiretur, hunc celeberrimum

Ex hac nervorum spinalis medullæ historia colligere est, triginta esse nervorum coniugationes, septem medullæ cervicalis, duodecim medullæ dorsalis, quinque medullæ lumborum: sex medullæ ossis sacri; quod scire Medico necessarium est, ut sciat, quibus spinæ partibus vnguenta & cataplasmata applicanda sint, cum vel occiput, vel facies, vel collum, vel manus, vel thoracis partes, vel muscoli abdominis, vel uterus, vel vesica, vel podex vel penis, vel crura, aut motu aut sensu, aut utroq; priuantur.

hoc loci nunquam comperi, Columbus: & Vesal. sibi non visum asserit, Galenum, os sacrum & coccygis hominis non descripsisse voluit Vesal. & Columbus sed parcant Galeno, & videantur ea quæ de ossibus huius libro primo dicta sunt.

CEREBRI ALTERA SECTIO.

CAPVT XXIIIX.

a 10. vsq; par-
tium 10.

CORPVS nostrum tantâ rerum varietate præditum est, ut non immerito Galenus a Naturæ solertiam tantam esse dixerit, ut, licet eam tantum tam diu inquisuerint, omnem tamen nec dum inuenerint; sic nos quoque dicimus, mirum non esse si priores Anatomici, viri sane oculati primi, & nunquam satis laudati, non omnia prorsus cognouerint nec non aliquid inueniendum alijs reliquerint: qui

imò existimamus, hanc cognitionem eò nunquam peruenturam, quin nò aliquid inueniendi locus posteris remaneat, dies enim, vt dici consuevit, diem docet. Hinc factum, quòd Constantinus Varolus cerebri sectionem nouam anno 1570. inuentam, postmodum aliquot epistolis proposuerit. Qualis aut illa sit, partim ex ipsius epistolis, anno 1573. primũ editis, partim ex sectionibus nostris, subiiciemus, cùm singulis annis & quidem nunc ab annis viginti quatuor in Theatro nostro Anatomico hanc cum priore auditorib. exhibere assueuerimus: quæ sane & Medullæ spinalis & Neruorũ omnium inde prodeuntium rerum exortum, ventriculorumque structuram, ad notitiam & explicationem causarum affectuum capit adeò necessariam docebit, quæ pleraq; ex Hippocratis & Galeni scriptis comprobari possunt. Differentia autem inter vtramq; administrationem est; quòd in priori, remotis à superioribus partibus crani ossibus & meningibus, partes contentæ exhibentur: in hac vero, quæ laboriosissima & difficillima, ossa capitis vndique remouentur, & partes in cranio contentæ vtraq; meninge obuolutæ vnà cum oculis appensis, neruorũ paribus & spinali medullâ proponuntur; & cerebro inuerso ab ipsius basi sectionis principium fit. Verum pro hac sectione caput recens, minime flaccidum requiritur, aliàs frustra sectionem hanc tentaueris; quare caput humanum, quàm primũ à trunco remotum fuerit, vel etiam tituli caput recentissimum (cùm in huiusmodi non minus, quàm humano, omnia recte conspici possint) assumendum.

DE SPINALI MEDVLLA.

Primò à SPINALI MEDVLLA initium fieri debet, quam ex infima cerebri basi ad magnum occipitij

pitij foramen oriri voluerunt [t.18.fig.1.D. ad E.] Hæc intra caluariam in sede propria meningibus vestita firmatur; quare crassâ meninge remotâ, altera tenuis auferenda, quæ lucida est & robusta, mediante quâ medullæ anterior pars cerebro, & posterior cerebello annectitur: verum & spinalem medullam, ne retrò flectatur, detinet: quæ forte causa, cur Anatomici verum ipsius exortum non agnouerint: eâ enim hamulo apprehensâ, & leuiter forcipe à subiectis partibus sectione remotâ, spinaliq; medullâ versus anteriora reflexâ [tab.18.fig.2.a.b.] ipsius exortus se offert, qui non in occipitio, vel vbi prius alligata erat, sed fursum magis ascendens in anteriore cerebri parte existit. Conflatur autem ex quatuor veluti radicibus, quarum duæ maiores [tab.18.fig.2.b.c. truncus reflexus: 4.1. truncus in sua sede.] ex duabus cerebri partibus sede eâ, in qua ventriculi ab anteriore cerebri prominentiâ ad medium reflectuntur [tab.18.fig.2.f.g.] circa quam nervus opticus [tab.18.fig.2.e.d.] extra ventriculum fertur. Dein ex duobus breuibus truncis cerebelli [t.18.fig.2.char.6.] ex superiore eius parte vtrinque enatis, qui cerebri maioribus processibus iunguntur [t.18.fig.2.inter char.2. & 3.] & ex quatuor duo fiunt, [tab.18.fig.1.E.] qui postmodum spinalem medullam integram constituunt, à qua omnes totius corporis nostri nerui ^b ortum ducunt, quemadmodum diligens inspectio sufficienter probat. Verum hoc necessarium & vtile fuit, siquidem omnium rerum principia firma esse debeant: quod vero magis vnum est, procul dubio firmitus atq; solidius est:

b Gal.8. v. s. part.13. & alibi asserit, omnes nervos spinali medulla attributos à cerebello nasci: ut ut secundum ipsum spinalis medulla à ce-

rebello pendeat. Alij (ut Columb) à cerebello nullum nasci nervum Galenum increpantes, affirmant. At Varolus asserit, Galeni sententiam secundum quid veram esse, aliorum Galeno repugnantium simpliciter falsum esse: quia spinalis medulla ex duabus radicibus cerebri, unde duo nervorum paria prodeunt, & ex duabus cerebelli, quæ prædictis iunguntur, & simul spinalem medullam constituunt & sic omnes nervi spinalis medulla ex cerebello orientur.

quare Neruorū omnium principium vnum esse decebat. Nam si arteriæ & venæ omnes ad vnum principium, illæ ad cor, hæ ad hepar, reducuntur; pari pacto & nerui ab vno principio prodire debuere; cum hæc tria sint corporis organa communia, per quæ facultas animalis, vitalis, naturalis, ope spirituum cū sanguine vitali & naturali deferuntur. Quod & Hippocrates & Plato agnouisse videntur. Hippocrates quidem, qui in principio libri de ossium natura, neruorum exortum ab occipitio esse scripsit. Plato vero in Timæo, de omnibus neruis verba faciens, scripsit, Deū neruos extremæ capitis parti circūposuisse neruū spinæ dorsi similitudine quadam circumplicasse.

Debuit autem spinalis medullæ origo ex media cerebri parte esse [t. 18. fig. 2. b. c. & char. 4. hoc ostendit.] Nam per ipsam, tanquam per communem aquæ ductum in alios riuulos & ab ijs in vniuersum corpus spiritus, qui in medio cerebri perficiuntur, derivandi erant, debuit sane illorum principium in cerebri centro & prope spirituum officinam, vt inde bunde hauriant, collocari: quemadmodum arterias & cordis, venas ex iecoris fere medio prodire, Anatomie docet. Obijciunt, truncum hunc, quem spinalem medullam hîc vocamus, non esse ita nominandum, nisi quando spinæ vertebra ingressus est; quare non recte dici, opticos neruos à spinalis medullæ principio oriri. Respondemus, capite de spinali medulla hac de re actū esse; addimus tamen per instantiam, an non nerui visorij, auditorij & reliquorum insuum, nomina obtineant ab organis, ad quæ mittuntur, antequam ipsa cōtangant, & quidem in cratio adhuc existētes? ita & hæc medulla, spinalis medulla nominari potest, antequam spinam ingrediat; siquidem intra caluariam à cerebro diuisa, proprijs sibi prædita obseruetur.

TABVLA XIIIX. Fig. 1. Cerebrum ossibus & crassâ meninge nudatū & inuersum; à dextris, spinalis medullæ & neruorum cerebri originem secundū communem opinionem: at à sinistris verum exortum, proponit. Fig. 2. Cerebrum inuersum, eiusque partes in basi distractas, spinalis medullæ ex cerebro & cerebello exortum, ventriculi amplitudinem & nervi optici ex medulla originem exhibet.

FIG. I.





FIG. II.



DE CEREBELLO.

HIVXIIA

Secundo ad Cerebellum accedendum [*tab. 18. fig. 1. BB. fig. 2. char. 8. 9. 10.*] quod à meningibus denudatum est, & præter duos processus vermiformes, qui partes cerebelli sunt, & duas partes laterales, quæ duos globos inuicem appositos referunt; de quibus in priore sectione dictum fuit, adhuc processus quidam ipsius explicandus occurrit. Processus hic insignis est [*tab. 18. fig. I.K.*] qui vtrinque ex cerebello prope truncos spinalem medullam constituentes oritur, qui per transversum in anteriora & inferiora fertur, quo mediante cerebellum spinalem medullam in anteriore parte amplexatur; eo modo, quo muscoli laryngis transversales, tertium par communium constituentes, oesophagi principium (hinc oesophagei dicti) posterius complectuntur; & hic, serie fibrarum transversalium cum eminentia, à fibris rectis spinalis medullæ distinguitur. Hunc processum Varolus pontem cerebelli vocat, à similitudine quam representare videtur, quia sub hoc processu transversali spinalis medulla feratur; eo modo quo canaliculus quidam fluens sub aliquo ponte fertur. Ex hoc processu nervus auditorius pendet & nascitur [*tab. 18. fig. 1. II.*] ita ut pronunciare liceat, cerebelli usum quoque esse, ut sensus auditus primum principium sit. Et hic nervi auditorij exortus, causam docet, cur à natiuitate plures auditu capiantur, quam villo alio sensu: nam cum à cerebello prodeant, nec longe producantur, facile mucosis excrementis opplentur. Hinc fit, quod semper à natiuitate ambæ aures afficiantur, ut Cassius^d docuit, cum ex morbo plerumque vnam aurem solum affici contingat. Quatenus ergo spinalis medullæ tere dimidium, & processus pons dictus, à quo nervus auditorius nascitur, à cerebello prodeant, Galenus perperam à recentioribus reprehend

c Aliā causam refert Aristoteles 21. probl.

d Problem. 17.

endi asserit Varolus, e dum nullum neruum à cerebello originem ducere contra Galeni sententiam altribuunt.

non à cerebello, quales sunt optici: quidam à cerebello tantum, non à cerebro, quales sunt auditorij; quidam ab utroq, simul sicut sunt nervi spina: nullus autem immediate ex aliquo duorum principiorum, sed omnes ex suis principijs nascuntur, vel mediante medullâ spinali, vel mediante processu transversali dicto, Varolus.

c Nervi quidam nascuntur à cerebro tantum, &

DE NERVIS OCULORVM.

f Nervi oculorum nunc explicandi, & cum duobus variis ad oculos mittantur, optici & motorij, de illis rimò. Nervis opticis ex basi cerebri, sed parte anteriore [tab. 18. fig. 1. i.] ortum tribuunt: cum tamen secundum magnam eorum partem ulterius progredientur [tab. 18. fig. 1. p. ad b.] & latentes in spatio quodam formato inter cerebrũ & spinalis medullæ principium versus occiput feruntur, ubi ex principio truncorum priorum spinalis medullæ [tab. 18. fig. 2. b. c.] sua ventriculorum cerebri cavitatem [tab. 18. fig. 2. g.] aspiciunt, exoriuntur [tab. 8. fig. 2. * origo ipsorum.] & in posteriore eius parte versus medium reflectuntur [tab. 18. fig. 2. d. e.] Quare cum horum neruorũ in occipitio penè origo sit, hinc cauteria occipiti infixa, oculis & visioni magnum usum adferre, quotidie experimur; haud dubiè ex eo, quod opticoꝝ principio depurato, atq; confirmato, visorij spiritibus liberior excursus conceditur. Hos si demonstrare velis, tum tenuem meningem eo loci, ubi optici communiter oriri dicuntur, sine tamen nervi læsione resecare, tunc videbis cerebrum ibi tantum conti-

f Archang. lect. de Nervis inquit, omnes nervos proxime à medulla cerebri nasci, ad quod probandum nulla ratio, nulla ratiocinatio locum habet: huius itaque rei sensus ipse iudex erit, qui, quod scribo, facillime agnoscet, si nervorum Anatomie, de origine eorum exercetur, capite inverso, hoc est, cerebri basi sursum spectante, sic a parte

Xx

videbis, quos nervos sensus

in naturali cerebri situ deceptus iudicet, oriri ex cerebro, palam intus noscet, nasci à medulla cerebri. Meminit etiam Dominicus Leonus originis nervorum ex Varolii sententia, in sua praxeos lib. 1. in reliquis cerebri partibus, antiquorum opinionem intus. & Plat. Profundius in cerebro ipsorum mina à cerebri substantia adhuc servata inchoare, Varolus primum observavit.

guum esse, mox cerebrum leuiter à medulla ad exteriora distrahe, donec opticos ibi latitantes inuenias, & si specillum inter ipsos & partes, quibus inhærent, sine violentia à subiectis partibus eleuabis vsque ad eorum exortum, & simul spinalis medullæ ex cerebro origo se offert.

Nervos motorios [*tab. 18. fig. 1. char 2.*] prope opticos aliquantisper exterius principium suum habere statuunt: at si cerebri portiuncula quædam versus medium incidatur à cerebro distinctos, ad mediam capitis sedem accedere, & infra opticos intercussione factâ [*tab. 18. fig. 1. d.*] progredi conspiciuntur, & ad principij spinalis medullæ intimam partem enascuntur [*tab. 18. fig. 1. e.*] & in ortu sic vniuntur, vt in angulo se mutuò contingant; quæ forte causa, quòd ambo oculi simul ad easdem partes moueantur.

Reliqua vero neruorum paria cerebri dicta, à spinali medulla prodire, etiam Vesalius, tertio tantum excepto, & Columbus etiam tertium cū cæteris subsequentibus produci tradiderunt: verū & duo priora paria, hinc prodire, ex prædictis patet.

DE OLFACTVS INSTRUMENTIS.

g Processus
mamilla-
res narib. im-
minentes non
sunt olfactus
instrumenta,
sed tantum
opercula, ne
aer in cere-
brum cumu-
latim irruat;
Posthinc in
suis obseru. in
Columb.

Olfactus 8 instrumenta siue cerebri processus anteriores, qui inter nervos opticos ad rimas ossis spōgiosi in naribus locati progrediuntur, ex cerebri basi [*tab. 18. fig. 1. F.*] prope neruorum opticorum coniunctionem [*tab. 18. fig. 1. c.*] enasci asserunt. Verum horum instrumentorum solum dimidium hætenus ostenderunt, siquidem præter id quod ostendunt [*tab. 18. fig. 1. ab m. ad anteriora.*] tantumdem etiam progrediuntur [*tab. 18. fig. 1. ab m. ad l.*] inter anteriorem mediam cerebri prominentiam latentia: eorum enim progressus est ad posteriora, & quantò magis progrediuntur, tantò inuicem recedunt, magisq; attenuantur,

tur, vſque dum ad cerebri latera extrema [*tab. 18. fig. 1. ad n.*] in regione, quæ ſupra foramina auditus eſt, in nuchronem acutiſſimum inde principium ſumentes finiunt. ^h Hinc forte fit, quòd olfactu læſo, ſimul & auditus non nihil afficiatur. Sic videmus ſæpe, vbi rares & olfactus præ grauedine læduntur, ſimul & auditum non nihil offendi: ſic inter ſternutandum, inter emungendum, in retinèdo ſpiritu naribus occluſis, illico auditū & aures cõpati, re ipſa ſentimus: ic qui olfactum amittunt, citiſſime ſurdaſtri fiunt.

^h *An ex hac ſympathia ſolui poſſint problemata ab Ariſtotele 11. problem. 5. nec nõ à Caſſio probl. 23. propoſita, cur ſcilicet ſurdaſtri ex naribus loquatur.*

DE VENTRICVLIS CEREBRI.

His demonſtratis, oculis neruiſq; opticis in ſuum itus diſtractis, pars cerebelli, ſpinaliſq; medulla per longitudinem in duas partes ſecanda, dein cerebellum penitus remouendum & ſpinalis medullæ altera portio in ſuum latus trahenda; & cerebrum ex altera vnius extremitate tam antè, quàm poſterius ſecidendum, ad ventriculorum cerebri magnitudinem & figuram demonſtrandam, cùm in ſitu, magnitudine formâ, numero & vſu ipſorum, hæc admidiſtratio ab aliorum demonſtratione magnam veritatem oſtendat.

Ventriculos quatuor eſſe, communis eſt ſententia, licet quidam ſex eſſe velint: & hi quatuor antè, uorum ventriculos admittunt, & ſub his duos alios

ⁱ *Arantio in obſeru. anat. cap. 1. At Valerolus, inquit, quanto magis con-*

XX 2

con-

atur, tanto maiorem fieri à veritate reſeſſionem: nam duo tantum ſunt, quibus ventriculi nomen competit, niſi improprie loquendo, ut ſi cui arideat ſpatium, quater inteſtinorum circumuolutiones extra inteſtina formantur, ventriculos appellare. Addimus, eos qui ſex agnoſcunt, in eo decipi, quod totos ventriculos non reppererint: ſunt enim quintus & ſextus cum primo & ſecundo continui; de his itaq; Archang. præter quatuor ventriculos cum ſub prioribus & ſuperioribus aliæ cavitates ſatu inſignes inſideant, in quos è ſuperioribus docuerit ſpiritus animalis, quas ſi quis ventriculos appellare velit, proſectò ventriculi in medulla cerebri ex canalis penario numero conſiſtuendi erunt: attamen hæc cavitates, cum prioribus ſint continuæ a priorum ſuperiorumq; ventriculorum anfractibus quidam error a produktionibus exiſtuntur. Sic Laurentius, Arantius duos addit ſub pro-

ribus, quos ab Hippocampi figura denominat; sed existimo, has partes esse superiorū, qui ita amplē sunt ut vix tertia eorum pars in sectionibus publicis ostendatur.

^k Libro de sacro morbo.

^l 4. hist. animal. 10.

^m Aristot. 1. hist. anim. 10.

aut cerebrum plurimorum exiguam in ipso cauitatē habere; an hoc de ventriculis intellegendum?

n Cur ita figurauit? cur sphericā figurā neglectā sic ipsum in se reduxit? R. sp. Mercurialis, an sicut in lecis ubi aqua mouenda est.

aliqui anguli ex obliquo interponuntur, quibus illius impetus, fracto recto curra retardetur: sic ad retardandum spirituum motum, ne cerebri parietibus officium, modis angulos introductos sagax machinata est Natura?

constituunt, quos à forma Hippocampis similes, ab Hippocampo denominant; sed reuera tantum duo sunt. Cum enim cerebrum & hominis & aliorum animalium duplex sit, vt primus Hippocrates ^k & post eum ipsum Aristoteles ^l docuit, videtur æquum fuisse, vt vnaquæq; pars ^m ventriculum haberet. Nam duo, quos in cerebri anteriore parte reponunt, eadem ratione tam in media & posteriore, quàm anteriore cerebri parte siti sunt, quorum vix quarta pars hactenus ostensa fuit: nam magnitudo ipsorum proportionē totius cerebri magnitudini eiusq; prominentijs, quoad formam correspondent: nec dubium cauitates in viuētib; longe maiores esse, siquidem in mortuo cerebrum, quod spiritibus extētum erat ijs priuatum in se confidet, & sic cauitates minuuntur. Est autem cerebrum vtrinq; oblongum, & quodextrā & sinistrā parte se mutuò respiciunt, planum & depressum, in alijs partibus prominentias sphaericas habet, ossium concauitatibus respondentes: anterior prominentia cauitatem ab osse frontis & parte ossis spongiosi & ossis syncipitis, & osse sphænoïdis efformatam, replet: media & inferior cauitatem vtrinque excauatam ab ossis sphænoïdis parte posteriore & anteriore ossis petrosi, nec non ab osse temporali implet: posterior cerebri eminentia cauitate à superiore parte occipitij, postremā ossis sphænoïdis & ossis petrosi productā opplet. His prominentijs ventriculorum cauitas respondet: etenim ab anteriore prominentiā sinus insignis fertur vsq; ad postremā, qui sinus à cerebri superficie, tantum in posteriore parte, quantum in anteriore distat. Verum ubi ad angulū ⁿ in superiore parte ossis petrosi peruenit.

uenit, ad cerebri prominentiam mediam & inferiorem reflectitur, eademque ratione ei prominentiæ, quâ in anteriore & posteriore, insculpitur. Præterea cerebrum, quod in ambitu ventriculorum crassissimum est (si vulgo propositos ventriculos consideres: si vero hos duos tantum, longe tenuius est, quàm in reliquis partibus sit) corticis ° instar cauitates has geminas ambit; & sane vna cauitas dici posset, nisi beneficio corporis, quod callosum vocant [tab. 18. fig. 2. m. n. o.] distingueretur. Et hi tantum sunt ventriculi cerebri; quid autem sit tertius & quartus ventriculus dictus, nunc ostendamus.

Totum cerebrũ, quemadmodum & spinalis medulla in duas partes diuiditur, solumq; in media inferioriq; parte beneficio corporis callosi [tab. 18. fig. 2. m. n. o.] iungitur, quod nihil aliud est nisi cerebrum, ea in parte coniunctum. Vbi enim cerebri partes dextra & sinistra iungendæ sunt, aliquantulum extrorsum flectuntur: dein albicantes ad medium reflectuntur & simul vniuntur, quæ vnio cõuexitatem quandam habet cerebri conuexitati proportionatam, quæ suâ longitudine futuræ sagittalis longitudinẽ æquat, & quod cæteris partibus durius esse volunt, cum tamen cerebrum mollitie æquet, & quemadmodum ventriculorum partes internæ albicat; huius copulæ pars inferior, Fornix appellari consuevit.

Trunci duo à cerebro producti, vbi teretes & rotundi sunt formati, se mutuò contingentes, aliquantisper in anteriora feruntur, dein in posteriora versus foramen occipitij reuertuntur: in primo contractu cum corpora sint rotunda, leuem quandam cauitatem angulorum inter se faciunt, cui cerebri basis vnita superiacet. Vnde ex corporum prædictorum cõtractu spatium id, quod tertium ventriculum vocant, formatur, quod extra cerebrum est, & non ex

o Archang.
id quod cerebrũ commu-
niter vocatur, diuidit in cerebrum & medullam cerebri; cerebrumq; vocat id, quod ventriculos cingit, medullam vero cui ventriculi insunt, cuius callosum corpus portio est.

naturæ intento, sed ex necessitate, propter horum corporum coniunctionem formatum est. In huius autem superiore parte ad latera rimæ duæ oblongæ sunt, quæ fere per truncorum spinalis medullæ mediam circumferentiam feruntur, & ventriculos cerebri ingrediuntur, eorumq; beneficio ventriculi ad tertium dictum ventriculum exitum habent. Et quia prædicti trunci usq; ad sellam sphenoidis, ubi infundibulum est, pertingunt, idcirco tertij ventriculi meatum anteriorem ad eam partem peruenire statuunt.

Quartus vero dictus ventriculus, sinus est inter inferiorem cerebelli partem & superiores truncos spinalis medullæ, ubi spinalis medulla instar calami scriptorij excavata conspicitur. Hic vero sinus à truncis duobus à cerebello ad spinalis constitutionem enatis, formatur, & ex distantia utriusq; propaginis cerebelli, producitur. Antequam enim cum duobus maioribus truncis è cerebro natis uniantur supra hos inuicem aliquantum distantes progrediuntur, ita ut cavitatis illa necessariò fiat, & non secus, quàm tertius dictus ventriculus extra cerebrum cerebellumq; situs est.

Foramen autem tertij ventriculi posterius, quod aliqui ano simile faciunt, quartumque ventriculum ingredi asserunt, nihil aliud est, quàm spatium ex contactu truncorum quatuor spinalis medullæ efformatum, ubi trunci cerebelli deorsum flectuntur & truncis è cerebro natis adhærent.

Nates & testes, seu quatuor orbiculares promi-
nentia hæc occurrunt, quas in cerebro esse dicunt
cum tamen reuera extra cerebrum sint, quas Varo-
lus voluit esse spinalis medullæ principia; & quidem
Nates nil aliud esse, quàm portiones radicum spinalis
medullæ à cerebello prodeuntium quemadmo-
dum

dum Testes exiguas esse portiones radicum à cerebro productorum.

Quoad ventriculorum vsum communis est sententia, eos esse spiritus animalis conceptaculum; quemadmodum sinister cordis ventriculus spiritus vitalis locus est: etsi non negemus vni parti diuersas utilitates assignari posse; cuius nomine Galenus ^{p 8. v. part.} ^{7. c. 9.} ventriculos superiores & præparationi spirituum & ^{q 8. v. part.} ^{10.} superuacuum expurgationi inferuire dixit: attamen hos ventriculos humoris pituitosi in cerebro geniti receptacula esse censemus, qui per infundibulum ad pituitam defertur & expurgatur. Ad solum enim infundibulum nec ad alium locum ventriculi exitum habent. Spiritus vero animales per totius cerebri cerebelliq; substantiam disseminatos existimamus. Illud ostendimus primò Hippocratis testimonio, qui, vbi tradidisset hominem ex quatuor humoribus constare, cuiuslibet proprium locumtribuendo, sanguinis & spiritus locum in corde esse dixit, flauæ bilis in iecore, atræ in liene. Quòd si in cerebro locus sit pituitæ, necessum erit, cauitatem aliquam adesse, quæ eam contineri possit, quemadmodum in corde ventriculus, ad hepar vesica biliaria; at præter duos hos ventriculos cauitas alia in cerebro non est. Secundò probatur glandularum vfu vniuersali, qui est humiditatem superfluam absumere: iam cum in ventriculis his glandulæ reperiuntur in plexu sequitur in ipsis pituitam colligi, quæ à plexu in ventriculos destillat & colligitur (tantam enim copiam absumere non possunt) aliàs frustra vel glandulæ essent adpositæ, vel utilitas ab Hippocrate posita vana esset. Tum, omnibus notum, pituitam à cerebro per infundibulum ad palatû stillare: at infundibuli principium est in ventriculo, & ad infundibulum ex nulla cerebri parte meatus est, quàm ex dictis ventriculis.

Quartò, ex necessitate probatur, excrementum hoc pituitosum cavitatibus magnis indiguit; nisi enim in aliquo spatio secundum quandam quantitatem colligeretur, continuò expuere oporteret (eo modo quo illi, in quibus nulla fit vrinæ collectio, qui continenter mingunt) sicq; locutio aliæq; actiones nobiles impedirentur: sic videmus dormientibus multam pituitam colligi, quam breui tempore magnâ quantitate post somnum expuimus: quæ sane quantitas cum in cauernis narium colligi tota non possit, opus habuit cavitare aliquâ in cerebro, in qua colligeretur. Videmus quoque ad sensum, quòd si quispiam voluntarie expuens, superiores palati partes veluti fugat & emungat, in oris cavitare excrementi copiam colligit, eam expellit: q̃ si statim iterû expuere velit, minore copiam sputi eijciet, & si subito denudò hoc tentet, adhuc minus expuit, ita vt breui eò perueniat, vt quâuis maxima cum violentia palatum fugat, nil omnino ad expuendum colligere possit. Vbi verò aliquot tēpus interposuerit, iterû facile excrementum in cavitare oris descendet. Quod signû est euidentissimû hanc materiam prius in aliqua quâtitate colligi antequâ expellatur, quemadmodû in vrina & fecibus videmus. Concludētes dicimus has cavitates excremēta illa recipere, quia ipsos ingrediuntur plerumque, humidû importantes, & quia solû ab ipsis ductus humidum exportantes egrediuntur. Obijcit Mercurialis, quomodo fieri possit, vt in eo loco, vbi corpora purissima & subtilissima, nimirum spiritus quasi in fornace excoquantur atq; perficiuntur, ibidem humor crassus, frigidus, obscurus & spiritibus aduersissimus colligatur? imò quando fiat apoplexia, epilepsia, incubus, ab omnibus medicinæ scriptoribus causas has assignari, quòd vel pituita, vel melancholia, vel crassior flatus in ventriculis conseruetur,

quæ

quæ aut ex toto, aut magnâ ex parte eos opplentes, spiritus veluti strangulentur; quod & ænigmâ nobis secundum Galenum 3. de locis affect. significauit Hippocrates, ^r quando scripsit, fieri melancholiam, ^r 6. epidem. cum humor in mētis sedem; epilepsiam, cum in corpus cerebri labitur. Hippocratē etiam imitatus Plato in Timæo, non aliter sentit; scribens, sacrum fieri morbum, quando pituita melancholiæ permixta diuiniſsimos cerebri meatus ingreditur. Respōdet Valsolus, ad causam apoplexiæ epilepsiæ, incubi, quamuis aliquando legerim apud Hippocratem Apoplexiam ob cerebri corrosionem fieri, & ^t Epilepsiam ^t Lib. de flat. fieri ex sanguine perturbato & cōspurato in omnibus venis: pariter in lib. de morbo sacro ^u prodire ex ^u tex. 7. & 8. venarum obstructione; viderimque Galenum ^x du- ^x 3. loc. affect. 7. bium an in epilepsia obstructio fiat in ventriculis cerebri, an in spinali medulla; quare libenter concedam tales horum morborum causas assignari. Quibus suppositis, forte non inconuenit ventriculos (licet in ipsis non contineantur spiritus animales) humore quodam viscido aut flatu crassiore, quandoq; ita repleti, vt prima spinalis medullæ radix ex abundantia illa comprimatur, vnde transitus spirituum à cerebro ad ipsum cohibeatur, tollaturque sensus & motus in vniuerso corpore; ea ratione, quâ vesica in suppressionibus minæ præter modum extensa, comprimendo intestina facibus effluxionem prohibet. Quod si hoc non arrideat, Galenum l. c. imitatus, dicam, epilepsiam & reliquas similes affectiones provenire à spirituum obstructione, quæ ab humoribus principium spinalis medullæ præter naturā irrigantibus causatur. Cui sententiæ fauent dissectiones eorum, qui Apoplectici moriuntur, in quorum ventriculis cerebri non reperitur maior excrementorum copia, quàm communiter in omnibus alijs reperiri.

soleat. Dein obijciunt in epilepsiâ, apoplexiâ & incubo spiritus animales in ventriculis cerebri existentes strangulari, vel à transitu impediri. Respondet, hos morbos minime fieri, à quolibet humore aut flatu ad ventriculos quomodolibet accedente; sed ob multam copiam, insignem crassitiem & subitum ingressum. Quare quemadmodum excrementa per palatum & nares descendunt nullam noxam gustui aut olfactui inferunt, si moderate & secundum naturam organa illa permeent; eorumq; operationes vel imminuunt, vel ex toto auferunt, si in quanto aut quali modum naturæ excedant: ita de excremento ad ventriculos cerebri accedente ab eisdemq; recedente asserendum esse existimo. Posterius vero de spiritibus per substantiam dispersis, probamus Galeni & testimonio, dicentis, spiritum animale in toto cerebri corpore multâ copiâ contineri, similiter in corpore cerebelli, cui principium neruorum totius corporis tribuit: & ex hoc infert, necessarium esse, ut quàm plurimis spiritibus sit refertum. Quòd si ergo cerebellum omni cavitata destitutū, suâ substantiâ spirituum copiam continet, quæ à cerebello ad tot, & tam longe ab ipso distantes neruos fluit, cur non eodem modo magis è cerebro sine cavitatibus ad pauciores & longe proximiores neruos fluat? Cum igitur spiritus animalis absq; omni ductu sensibili possit fluere & refluere, cur non possumus cerebri substantiæ illud tribuere, quod quidam ventriculis non recte obseruatis tribuunt?

DE PLEXU CHOROIDE.

Plexus tandem quem chorocidem seu retiforme vocant, in cerebri ventriculis existens [t. 18. fig. 2. i. k.] ex toto glandulosus videtur, ita ut & substantiâ & colore glandulæ pineali assimiletur: diligenter tamen si tra

si tractentur, nil nisi membranas latiusculas & oblongas ex tenui membranâ pronatas esse pronunciare licebit: ex quarum parte alterâ secundum totam longitudinē vasculum quoddam crassiusculum humore excrementitio plexum appensum est, quod intestinum mesenterio adnexū repræsentat, per quod vasa angustissima feruntur: at in hoc, proportionē habitâ, glandulæ in maiore copia sunt, quàm in mesenterio infimi ventris; quod pulchre apparet in capitibus corū, qui cerebro sunt humido, quare multò magis naturæ rei conuenire, si plexus glandulosi, quàm retiformes appellentur, Varolus asserit; Quòd si quis dubitet, an eorum substantia talis sit, cum ad inspectionem remittimus, ^a nulla enim melior ratio probandi nunc occurrit. Huius vsus esse videtur, vt aliarum glandularum more superfluam cerebri humiditatem depascantur, in omnibus enim corporis partibus glandulas hoc præstare, & totū corpus humido superfluo à glandulis exonerari Hippocrates ^b singularum glandularum totius corporis inductione probat; imo vniuersam cerebri substantiam talem esse, idem statuit. De reliquis verò partibus hinc non propositis, statuendum est, quod in priori sectione monuimus.

Quòd si lubeat in hac sectione omnes partes demonstrare, hoc ordine progrediendum erit: Ossibus omnibus capitis, sectione per longitudinem, tam parte superiore, quàm inferiore, tã anteriore, quàm posteriore ductâ, ablatis & à crassa meninge remotis, ipsius crassæ meningis sinus demonstrandi; mox cerebro inuerso ad eius basin meninx à spinali medulla remouenda, relictis tamen portionibus meningis

a In singulis cadaueribus qua diffecantur plexus hi reperiuntur humido quodam canoso inspersi, sicuti alia glandula reperiiri solent; Varolus. Hos cõtextus choroides, nonnulli glandulas perexiguas esse, ad depascendas sordes cerebri datas censuerunt; illi, quòd cerebrum putida secarunt, in quibus illi cõtextus in se concidunt, &

in signi humiditate perfusi, turgent, speciemque mutant, ut paruarum earumque penè infinitarum glandularum formam exhibeant. Hoc Archangel. l. 3. lib. 5. Lib. de gland, text. 2.

c Sub ipsa
membrana
spinali me-
dullam inue-
niente, vaso
rum mutuo
se intersecan-
tium plexus
apparet: quod
si cuiusdam ar-
rideat, rete
mirabile vo-
care, nihil cu-
ro: Varolus.
In cauitate
caluaria &

circa neruos, ne disrumpantur, quò ipsorum origo
monstrari possit: succedit rete dictum ^c mirabile,
cum glandula pituitaria, quæ penè quadrata est, in-
fundibuli collū, quæ extra crassam meningem subsi-
stunt. Hinc ad spinalis medullæ membranam, ipsam
medullam, quâ subleuatâ, nates & testes, foramen in
quartum dictum ventriculū, quartusq; ventricu-
lus conspiciuntur, quæ extra cerebrum sunt, ipsum
cerebellum, ipsius processus, neruum auditorium,
neruos oculi motores & opticos, olfactus organa,
ventriculos cerebri duos, cum eorum foramine in
infundibulum, & ipsum corpus callosum, fornicem,
plexum choroidem, glandulamque pinealem, acce-
dendum est.

ad sellam sphenoidis arteria ascendit, ubi sub dura membrana adhuc latens in-
erutus animalibus infestas propagunculas à se dimittens rete mirabile efformat:
in hominibus vero non insigne hoc reticulum, sed ipsius potius umbram ac imagi-
nem quandam producit. Fallop. in obseru.

De Capitis altera parte quæ Facies dicitur.

CAPVT XXIX.

De Facie egit Aristoteles 1. hist. an. 16. at de maximo na-
tura studio in hominis decore & pilis in facie videt
Galenum 11. vsu part. 14.

a 1. hist. ani-
mal. 7.

b Aristot. 1.
hist. anim. 8.
in homine dū-
taxat facies.

c 3. de partib.
anim. 1.

d Vel ut Me-
latius dicitur
ἀνθρώπου τὸ πρόσω-
πον φέρειν, q
aspectum, quò
anteriora pro-
spiciat, ex ad-
uerso gestet.

CAPITIS parte capillatâ, quam ab Aristotele a
τεῖχος τὸν dici suprâ monuimus, explicatâ, nunc
alteram quæ glabra est & caluæ ^b subiecta, demon-
stremus. Dicitur hæc in homine πρόσωπον, & nomen
^c à re ipsa acceperisse videtur, monente Philosopho,
quòδ πρόσωθεν ὀπίωπε, antrorsum prospiciat: ^d vnus
enim animalium ^c homo erectus est, solus prospicit
anteuersus, vocemq; anteuersus mittit. Latinis fa-
cies, in cuius decenti conformatione hominis ele-
gantia potissimum consistit: dicitur & vultus, à vo-
luntatis indicio, quia pro voluntatis varietate mu-
tatur.

tatur. Huius partes duæ sunt, superior, quæ μέτωπος, e frons, f à ferendo, quòd animi indicia præ se ferat, proprie dicitur, cuius extrema sunt supercilia; inferior g pars est à supercilijs ad extremum mentum, & pluribus partibus donatur, de cuius partibus externis fufe egimus libro nostro primo, qui de partibus externis inscribitur cap. 3. At vtriusque partes sunt duplices, continentes & contentæ.

Continentes, communes & propriæ: communes, cuticulâ, de qua libro primo: Cutis, quæ in facie, vt & digitorû extremis, pene & scroto, tenuissima est; quæ in malis plerunq; rubet, propter affluxum sanguinis à venis iugularis externæ ramo exteriori prodeuntibus, quæ inter ipsum & membranam carnosam disseminantur. Et pilis in oculorum ambitu tutelæ causa, & oris in viris, quod & virilitatem & pulchritudinem indicat, circumdatur. Venerandus h enim magis mas apparet, idq; potissimum, si ætatis progressu pili vndiq; ei pulchre circumfundantur, quam etiam ob causam Natura malas & nasum pilorum expertia ac nuda reliquit. Perforata est varie propter oculos, aures, nares & os, partim, quò obiectis sensibilibus aditus pateat, partim aerë cibumq; intromittat, & partim excrementa emittat: quæ quidem in ijs, quorum actio semper requiritur, semper patent; vt narium, respirationis causa; aurium, cum auditus semper necessarius sit. In ijs vero, quorum functio nō semper desideratur, maxime somni tempore, ipsiq; periculum imminet, maioris tutelæ gratiâ occludi possunt, vt sunt oculorû & oris foramina.

Pinguedo pauca est, & potissimum in buccarum regione.

Membrana carnosa, quæ licet alibi fere nervosa sit, in fronte carnosa i & musculosa, cuti ad eò connexa, vt ab ea vix separari possit, & propter musculos faciei

e Aristot. 1. hist. anim. 8.

¶ 9.

i Sunt qui frontē ad faciem, alij vero qui ad caput referunt. vide de partibus externis librum nostrū.

g Sic faciem circumscribit introductorij auctor: pars tota sub fronte anterior & in laterib. obvia. Plat. pars capillos mentumq; interiens, Col.

h Gal. 11. v. f. part. 14.

i Musculosa facies cutis, μωδες πλάτυσμα, id est, musculus latus Galeni, qui equitantum caputio similis sit, si eius tantum auferas, quantum pileolo tegatur, eò quòd faciem prope totam & collum tegat, Laurent.

*k Animellas
vocant, Plat.*

faciei illi adnatos rubet. Inter quam & cutim venæ modò dictæ feruntur, & glandulæ ^k plures disseminantur, vt sub aurium radicibus, in quibus parotides fiunt; & inter maxillam inferiorem & buccarum regionem humiliorē vbi scrophulæ suboriri solent.

Contentes propriæ, Musculi sunt, ossa & cartilagine, quæ faciem ipsam quasi constituunt. Musculi, vt frontis, superciliorum, palpebrarum narium, aliquid & aurium, labiorum, maxillæ inferioris & buccarum. Ossa, vt frontis, dein oculorum sex, narium tria; oris sex vtpote maxillæ superioris duo, inferioris totidem & palati duo. Cartilagine, vt aurium & nasi, quæ cum ossibus varie iunguntur.

Contentæ in facie partes sunt, quatuor sensuum domicilia, quorum organa partim continet, eorum scilicet, quibus in caluaria locus non est, vel saltem viam ad ipsa in caluaria latitantia parant, & sunt oculi antè; aures in lateribus, nasus & os, in quo instrumentum lingua, vocisq; larynx. Quare cùm in facie sensuum organa quatuor locentur, animi imago dici consuevit: Nam vt recte Laurentius, in supercilijs superbia, in genis pudor, in mento maiestas, in fronte sapientia, in vultu pulchritudo, in genis & mento honestas inhabitant. In hac salutis & mortis indicia elucet. Quare Hippocrates in Prognosticis vult Medicum faciem primùm spectare, vtrum sui similis sit, aut plurimùm immutata in colore, figurâ & mole. Ad contentas partes, etiam vasa reduci possunt, de quibus primo.

De Vasis per faciem disseminatis.

CAPVT XXX.

VASA quæ per faciem feruntur, Venæ sunt & Arteriæ; de Venis primò. Venæ quæ ad caput feruntur

feruntur, sunt iugulares duæ, altera Interna [tab. 7. lib. 2. 88.] de cuius distributione supra cap. 10. egimus: altera Externa [tab. 7. lib. 2. T T.] quæ à subclauij trunci parte superiore exoritur & secundum colli latera vtrinque communiter vna sub cute sursum fertur & omnibus partibus colli externis, capitis & fauci sui lateris graciles furculos largitur. Verum, vt plurimum sub auri radice [tab. 7. lib. 2. V.] in ramum exteriorem [y] & interiorem [x] diuiditur. Interior, oris, faucium, & hyoidis musculos petit, vti supra ostendimus. Exterior cutim capitis & musculos perreptans, sub aure, glandulis suffulta in duas propagines scinditur, quarum altera faciei anteriora [tab. 7. lib. 2. Z.] petens, in nasum & buccas fertur, & in medio frontis cum alterius lateris ramo iungitur & venam Frontis [tab. 7. lib. 2. æ.] quæ etiam incidi solet, constituit. Altera propago per latus fertur, & partim ad tempora [tab. 7. lib. 2. æ.] partim ad occiput [tab. 7. lib. 2. *.] ramos dispergit. At huius exterioris venæ rami, in facie & in vertice varie miscentur, à quibus rami in caluariæ suturas & foraminula distribuuntur.

Arteriæ Carotides [tab. 12. lib. 1. X. Y.] vtrinque vna per colli latera venas iugulares comitantes & asperæ arteriæ adhærentes rectè caput petunt, & vbi ad fauces perueniunt, diuiduntur [tab. 12. lib. 2. ff.] in ramum exteriorem [g] & interiorem [h] de interioris distributione cap. 10. egimus; quare nunc de exteriori. Exterior, quæ gracilior est interiore, & extra fauces consistit, soboles ad buccas [l] & faciei musculos exorrigit, dein vbi ad aurium radicem peruenit [m] bipartitur: harumq; altera auris posteriora [o] petit, à qua arteriæ duæ sub aure maxillam inferiorem a

a Huius arteria Vesalius prorsus nō meminit, inquit Columb. ali-quādo in maxilla foramen Fallop. in obseru. in cavitatem dent. n. Laurent.

per

per labrum incedit. Altera verò [n] tempora frontemque perreptat, & in faciei musculos absumitur. Hæc de Vasis faciei.

De Musculis cutim Capitis mouentibus.

CAPVT XXXI.

De musculosa frontis natura, vide Galenum lib. de diff. musculor. 4. cur frons depilis sit, & cur eius cutis sola motu proprio sit prædita, II. vsu part. 14.

CVTIM capitis ex voluntate nostra moueri diximus, & quidem in aliquibus totius capitis, in plerisq; vero solum frontis & faciei; idq; ex veterum sententia ^a à musculosa & tenui substantiâ, ^a quæ cuti frontis vnitur, quemadmodum manuum internæ partes & pedum plantæ cum tendone coalescunt: at recentiores, & recte quidem singulis faciei partibus musculos peculiare tribuere, cum nulla ^a pars motu voluntario sine musculo moueatur. At horum aliqui parte anteriore in fronte, palpebris, naso; alij parte posteriore, in occipite: alij vtrinque, vt auriculis, & labijs & qui buccis dicati sunt consistunt. ^b

^c Frontis cutis, quæ suâ tensione & corrugatione animi affectus varios demonstrat, mouetur, non solum ^d membranæ carnosæ beneficio, quæ subiecta carni connata in musculosam substantiam fibris relictis donatam abeat, sed musculis ^e duobus, quod & ductus fibrarum & motus, qui in his, quemadmodum & alijs musculis apparent, quæ in membranæ carnosæ non reperiuntur. Hi in fronte siti sunt [tal. 23. fig. 1. A.] & à parte superiore, in qua capillorum finis est, aliquando etiam ad coronalem futuram oriuntur, ad musculos temporales, dexter ad dextrum, sinist

a Gal. II. vsu part. 15. Musculosa substantia actenus frontis cuti subiicitur, quare hæc sola cutis motu proprio mouetur.

b Musculos cutaneos vocat Plat.

c Frons sub synepite inter ipsum & oculos, I. hist. 8.

d Musculus est, non autem vt Vesalius voluit, panniculus carnosior redditus, & fibrarum pluribus auctus, Fall. obserua.

e Musculi frontis, Columb. Laurent. musculus frontis aut unus aut gemini, quod non magni facio, Fall. cutim capitis mouens primum par, Plat. musculi affectuum animi significatini & musculi ocularij, Archang.

nister ad sinistrum tempus, vbi membrana carnosaf
 ta firme pericranio & cranio adhæret, vt immobilis
 existat, quo frons & supercilia aliquo quiescēte mo-
 reantur, & versus futuram communem, quæ capitis
 & maxillæ superioris ossa distinguit, in cutim supra
 oculos & nasum ad supercilia, tâquam in partes mo-
 edas fibris rectis^f implantantur: (siquidem super-
 cilia mota recto & simul cutim frontis attrahant) i-
 tamen vt in medios aliquantū disiungantur, vnde
 frontis superior pars non mouetur, in summo vero
 naso, vbi etiam carnosiores sunt, ita iunguntur, vt v-
 us esse videatur. Duos esse nō solum Anatome do-
 et, sed etiam ratio & experientia: ratio, siquidem
 natura omnia membra gemina fecerit, quo corpus
 æquilibrio sit: experientia; si enim alter vel para-
 si^h afficiatur, vel trāsuersim vulneretur, illius par-
 s motus perit, non autem alterius, cuius etiam mo-
 us periret, si vnicus duntaxat musculus foret: sic
 quando commouemur, cutim in media fronte con-
 ahimus & corrugamus, ita vt supercilia sese tan-
 unt, quæ cutis contractio non fieret, si vnicus mu-
 culus esset. Horum vsus fibris suis cōtractisⁱ super-
 cilia vna cum cute frontis attollere (quibus laxatis
 i locum redeunt) propter enim oculos frons^k mo-
 ri debuit; sic enim palpebræ commodius sursum
 ahuntur, oculi magis aperiuntur, cum multa vno
 tempore conspiciere volumus: ac rursus^k dum clau-
 untur cogi & constringi ad vnguem ab omnibus
 circumiacentibus, cum alicuius incursum contra se
 retuant. Quod autem depilis sit frons, etiam^k pro-
 per oculos factum, quibus si pili incumberent, ob-
 cēnt, quare ipsam assidue tondere necessum esset:
 in vero natura^k magna cura prouidit, ne corpus
 homini subinde negotium facefferet, neue illū sibi
 iⁱ necessario seruiendo instar mancipiū semper ha-
 bret addictum.

Yy

Mu-

f Fibra recta,
 Vesali. Plat.
 Lauren. Obli-
 qua à summo
 naso tempora
 versus, nō re-
 ctâ, Col. Arch.
 g In medio
 frontis nullus
 musculus, Co-
 lum. aliquan-
 tulum disun-
 cti, Lauren. in
 medio coitio
 nem faciunt,
 Archang.
 h Col. ostendit
 exemplo Car-
 dinalis, cui cū
 sinister muscu-
 lus ob vulnus
 cōulsus esset,
 dimidiam tã-
 tum frontem
 mouebat.
 i Nec Galenū,
 nec Vesal. nec
 alios ante ipsū
 hoc cognouisse
 asserit, addens
 duobus adhuc
 propriis super-
 cilia vti, Col.
 k Gale. 11. vñ.
 par. 14. Vbi a-
 git de natura
 studio in ho-
 minis decore,
 & cur frōs de-
 pilis sit, & so-
 la motu pro-
 prio pradita.

I Musculi supercilium trahentes ab aliis negligētia praeteriri, qui à lambdoide sutura supr. m. millares processus oriūtur, triangulares sunt, & in carnosam membranam desinunt, qua frōtis etiam musculos excipit, Col. Musculi in occipitiogemini à relijs omnib. Anatomicis praetermissi, Fall. obser. secundū par cutim capillosam capitia mouens, Plat. m Fall. Plat. & Col. hic vero & supercilium simul trahere voluit, ostendit exemplo loh. Antonij Plati, qui vniuersā cutim capitis valide mouebat: & suo proprio exemplo. n Fallop. & Plat.

Musculi^l cutim capitis in posteriora trahētes duo sunt, vtrinque vnus, qui tenues admodum oriuntur ab occipitis linea transuersa, in quam musculus scapulæ secundus Cucullaris dictus [tab. 2. lib. 4. T.] desinit: à qua linea fibrę rectā sursum feruntur, qui musculos hos breues admodum, vix transuersum pollicem longitudine æquantes, sed ita latos, vt vnusquisque quasi auriculam sui lateris tangat, constituunt, [tab. 12. lib. 4. ab R. sursum.] Desinunt autem in chor-dam vnā latam ac tenuissimam, quæ ex membrana carnosā facta videtur, & totum caput occupat, & musculos aurium anteriores, & frontis quoque musculos simul copulat. Horum duorum munus est, cutim capitis^m posteriora versus abducere; quare & supercilia simul trahere creduntur. Verum, quemadmodum frontis semper reperiuntur: ita vice versa hi occipitisⁿ musculi & aurium anteriores sæpe non inueniuntur. Præterea musculum orbicularem Aquæpendens supercilijs tribuit, qui à palpebrarum circuli musculo differat, quod superciliū musculus fibracrassiores & carnosiores habent, & quod totus musculus maior sit; quare supercilium maxime deorsum ad oculum ducere, & cum anulum referat, etiam palpebram inferiorem valide trahere. Aurium, Narium & Labiorum musculi sequuntur, de quibus infra suo loco.

DE OCULO ET PARTIBVS circumpositis.

CAPVT XXXII.

Sensuum quatuor domicilia in facie contineri diximus, quintus vero sensus externus, ipse nimis tactus per totum corpus dispersus est, & in facie domicilium peculiare non habet. Caput enim aliud malum

animalium facultatum sedem, & rationis domicilium esse, supra ostendimus: quare & Sensus veluti animæ internuncii in capite locari debuere. Sensus autem externi quinque numerantur, cum simplicia corpora quinque sint, Cælum & Elementa quatuor. Quare visus Platonici elemento stellarum proportionem respondet, cuius obiectum lucens est: odoratus obiectum, igneum est: auditus; aereum: gustus, aqueum: tactus, terreum. Inter hos autem visus principatum habere videtur, qui cum auditu vitam beatiorē reddit (quamvis sine gustu homo conservari non possit, cum nutritionis gratia sit comparatus) qui eum vel natura, vel casu, vel ægritudine oculis orbatū, se infelices appellant. Nam sicut ^b sol in magno mundo, ita oculus est, ut sol in corpore animalis: non immerito ergo ab Hesychio ἡ ἐλὶς πύλας, Solis portæ dicuntur; quare de oculis ^c primo agemus, cum etiam inter nervos optici primum locum obtineant. Oculos Græcis ὀφθαλμοίς, ^e quasi ^f ὠπὸς θάλαμος, quod sit thalamus, ex quo visus emicat, & ob id oculi ab aliis φάλα dicti, quod ex ipsis φῶς seu lumen progrediatur.

Latinis oculi ^g ab occulendo vel occultando, eo quod sub palpebris tanquam teguminibus, non aliter tanquam sub testa conchæ constituti sint. Sed linuamus nomina, quæ fusissime libro de partibus externis ante annos septendecim edito, pertractavi-

a Oculi, aures, lingua, manus & pedes, ea quæ cerebrum cognoscit, administrant, Hippo. de sacro verbo.

b. Galen. 3. v. s. part. 10.

c Oculum humanum nemo ante me descripsit, sed omnes beluini magno & turpi errore, in quæ ipse, quos Vesalius incidit, in eius vniuersa pene formatione cum aliis deceptus, hac Columb.

d Oculos omnia anima-

Sunt autem Oculi facultatis visuæ organa, ^{Yy 2} qui genera habent, præter τῶν ὀφθαλμῶν, et si quid imperfectum aliud est. Aristot. 1. hist. an. 9. ubi de Talparum oculis agit. Quo autem ordine generentur, vide 2. gener. an. 6. quemadmodum de oculorum in colore & magnitudine, varietate 1. hist. anim. 10. sic de differentiis oculorum in animalibus & eorum causis, 5. in anim. 1.

Hippoc. de pris. Medic. de nat. human. in Coacis & alibi.

Oppiani Scholastes. g Varro, Lactantio.

*h Galen 8. v. f.
par. 5. de ana
tom. viii.*

quibus tanquam speculatoribus^h vtimur, non solum vt ea, quæ nocitura sunt, videamus & fugiamus, quæ vero vtilia, persequamur, qui vsus nobis cum brutis communis est; sed præcipue, vt per ea, quæ visibilia sunt, Dei inuisibilis omnipotentiam cõtemplemur. Recte ergo D. Plato pronunciauit, quod si oculis careremus, naturæ ordinem ignoraremus: ad rerum enim scientiam, vt habet Aristoteles, plurimum cõferunt, quam haud dubie ob causam Galenus diuina membra nominauit: Et cum tantæ nobilitatis & necessitatis sint, non mirum, si maximo artificio à primo Protoplaste Deo Opt. maximo creati sint, qui eius sapientiam & maiestatem declarant.

*i Galen. & A.
uicen.*

*k 10. v. f. par. 1.
ubi querit, an
nō in postero
ribus etiā par
tibus oculi ex
isterint, respō
det, quod o
mnia sensus
instrumenta
nervos molles
postulent, &
quod eiusmodi
à cerebello pro
duci non pote
rant, & quod
in utrumque
ipsorū produ
ctiones à cere
bro immitti
tur, quæ dum
per ossa trans
eunt, densan
tur, quo ab in
iuriis tutiores
sint.*

Siti sunt in capite tanquam munitissima & eminentissima corporis parte, mox sub fronte, tanquam speculatores: quemadmodum enim speculatores altioribus locis & turribus collocantur, vt insidias longius prospicere ac explorare possint: ita oculi in sublimi locari debuere, vt boni custodis munere defungantur, & singula ex alto melius prospiciant (quorū causa caput præcipueⁱ conditum est, cum cerebrum illis vicinum esse debuerit, propter nervos opticos molles) & quidem parte^k anteriore, quo rebus recta opponerentur, cum antrorsum moueamur, & quæ in lateribus sunt nō nihil intueamur: cum ad ea, quæ in tergo sunt, & corpus & caput cõuertere possimus. in antris offeisis concauis, quæ *κογχοί*, Polluci & orbitæ^l dicuntur, securitatis gratia, & forte, quo spirituum minor fiat dissipatio, reconditi.

*l Camera seu
specula, Plat
in 10. v. f. part.
8.*

Numero duo sunt, vt cætera^m sensuum instrumenta, quo præstantior sit videndi actio: qui eodem motu simul & semel mouentur, quo visio perfectior fiat: nam si altero eleuato, alter deprimeretur, obiectum simplex geminum appareret, cum visiorum conorum axes in vno eodemq; plano locari debuerint,

int, quam sane actionem neruorum motoriorū in
 ortu coniunctio promouet, quemadmodum su-
 ra ostendimus; at inter animalia in homine oculi
 minimo intervallo distant, vt Philosophusⁿ ostēdit.

Figura sunt^o in homine rotunda & sphærica [ta.
 2. fig. 3. & 4.] in cæteris vero animalibus, non sunt
 vndique orbiculares, sed vel obliqui, vel depressi [ta.
 2. fig. 5.] nec mirum, cum hominis figura tanto in-
 tervallo à reliquis animalibus distet. At si eos cum
 musculis suis posteriori parte adpositis perpendas,
 turbinatam figuram [tab. 19. fig. 4. & 9.] habent. Figu-
 ra, inquam, rotunda, & capacitatis, quo plura in se
 contineant, & roboris, vt à rebus externis minus of-
 fendantur, & celerioris motus gratia. Huius nomi-
 ne & lubrici facti sunt, & maxime mobiles, quo vi-
 su facile, quocunque volumus, conuertere possi-
 mus. Quare optici volunt propter figuram orbicu-
 rem, radios à quacunque parte obuenant ad per-
 pendiculum frangi, id est, ad pupillæ centrum dirigi.

Magnitudo eorum tanta est, quanta & corporis
 moles & vsus exposulabant.

Hic autem considerare oportet partes duplices,
 eas, quæ oculis propugnaculi causa circumponun-
 tur; alias vero, quæ ipsos oculos constituunt. Propu-
 gnaculi causa natura ossa vndique apposuit, quæ or-
 bitam constituunt, & præter hæc superius superci-
 lia, antè palpebris, eorumq; pilis quasi propriis
 obimentis obuallauit, atque etiam cute. Cilia enim
 veluti vallum per quoddam, cum suis pilis corporib.
 dignis propulsandis, ne facile apertis oculis incidât,
 primo loco constituit: dein palpebras, vt simul coe-
 rant & complicantur, oculum claudant, si forte cor-
 porum maiorum aliquod in eum incurrat. Aduer-
 sus vero maiorum adhuc incursum, superne quidem
 supercilia constituit, inferne autem genas; ad ma-

n 10. Problem.
 17.

o Figura vero
 sphærica in ho-
 mine, in quo
 nihil præterea
 sphæricū, Col.
 rotunda & an-
 gulosæ. Arch.
 Oculi cū hu-
 moris rotu-
 dus est, sed pro-
 pter musculos
 turbinatā fi-
 guram adipi-
 sciunt. Pla-
 tunda, sed ali-
 quantulū ob-
 longa, Laur.

p 8. vs. part. 3.
 10. vs. part. 6.

q 11. vs. part.
 14.

iolem angulum, nasum; ad minorem ossis iugalis productionem, & sic oculus in medio locatus nihil læditur; & cutis, tum ea, quæ supra & in fronte est, tum ea, quæ infra est ad malas, motu suo ad patiendi difficultatem, non mediocriter etiam confert: hæc enim vndique contracta, oculum intro comprimit; & in angustissimum compellit. Ea enim extensa, & tū rursus in seipsam replicata, oculos aperire & claudere potest.

† Plat. sed A
quapendēs &
os ethmoidis
addit.

Orbita oculi, quæ rotunda est [*tabul. 2. figur. 6. ad Q. tabul. 3. fig. 8. inter X. & R.*] vt in ea oculus volui possit, & oblonga, propter musculos oculum mouentes, & periostio succingitur; formatur ex ossibus capitis, & maxillæ superioris: capitis, vel frontis, vel ossis sphænoidis; vnde in oculorum antris futuræ multiplices, & etiam foramina obseruantur. Frontis quidem, cuius squamma externa læuis, superiorem huius cameræ fornicem efficit, & vbi vtraque squamma rursus iungitur, extrorsum in superciliorum regione prominet [*tabul. 3. fig. 8. A X R.*] & oculum tuetur; Sphænoides vero in oculi cauo parte posteriore, vbi foraminibus quatuor peruium est [*tabul. 3. fig. 8. iuxta D G.*] Maxillæ superioris ossa, primum, quod exteriorem illius eminentiam facit [*tabul. 3. fig. 8. T.*] secundum & tertium [*tab. 3. fig. 8. Δ Θ.*] latere interno, quæ tenuissima sunt (cum & nasi protuberantia etiam propugnaculo sit) & ossis quarti pars, vbi protuberantia in malis constituitur [*tabul. 3. fig. 8. iuxta i.*] Sutura in maxillæ ossibus tres, vna ad vtrumque angulum, tertia in cauitate inferiore: duæ à spongioso osse, ad magnum angulum; aliæ denique à sphænoidis & frontis osse: His pericranium, musculus obliquus, infernus & trochlea suspenduntur. Foramina tria maxima in his conspiciuntur, vnum retro rotundum ad nerui optici transitum: alterum in vna oculi

uli cavitare, oblonga est scissura, qua nervus motus oculi cum venis & arteriis ad oculos, eorumque musculos pertranseunt, de quibus capite de ossibus. Tertium est ad internum angulum ad nasum in eius cavitates, nares dictas, pertusum, per quod interdum pars lacrymarum effluit.

Ad hanc oculorum orbitam sinus seu circuli vtrinque duo exurgunt, quos Aristoteles superioris & inferioris palpebræ partes communes dixit, quia ex utraque palpebra vtrinque in longum protensa procreantur, qui Græcis ^τ κανθοί, ^δ ὁρὸ τῆ ἀνὴ δευδα, id est, pruritum sentiendo, dicuntur, eo, quod in ipsis uterunque ob lachrymarum effluxum, siue alterius humoris, pruritus sentiat; Latinis, anguli oculorum, in quibus lacrymæ, & quicquid oculis illabatur, colligitur: horum alter exterior ad tempora, minor & externus canthus; alter interior ad nares, maior & internus canthus [*tab. 19. fig. 1. 6. e. maior, d. minor canthus*] ^ρ κανθὸς, quasi perfusor Polluci & ^π πηγή Hefychio, quod inde lacrymæ manare soleant, appellatur; quæ tamen nomina potius cavitati, quæ eo loci apparet, tribuenda sunt.

Etenim in unoquoque angulo in tarforum extremitate utraque, superiore & inferiore. Foramina duo conspiciuntur [*tab. 19. fig. 4. 7. 8. in n.*] quæ in minore cantho etiam in viventibus vix conspicua, in cadaueribus autem sensum omnino effugiunt: at in interno & maiori angulo, maiora, quæ in viventibus, si quis inspicere voluerit, apparentia, maxime in mulieribus: in boum vero mortuorum palpebris optime demonstrari possunt [*tab. 19. fig. 4. in n. fig. 7. & 8. tantum in maio i cantho exprimuntur. n.*] Hæc puncta lacrymalia y dicuntur, quæ per ea flentibus lacrymæ stillēt, potissimū autē per angulum internum, quo tāquam

f De angulis oculorum Arist. 1. hist. ani. 9. Gale. 10. v. part. 11. t 1. hist. 9. Gal. 10. v. part. 11. & alibi.

u In unoquoque angulo, Aqua pend. in angulo intern. Fal. obser. Plat.

x In palpebris sunt λεπταί τετραί, quæ paulo sunt extra maiorem angulum, quæ ad nasum usque pertinent, tenuemque humorem dant, vicissim & accipiunt, quo interforū naturalis symmetria cōseruetur ad motuum agilitatem, Gal. 10. v. part. 11. At Fall. dicit, Anatomicos pratermisisse, intelligens eos,

Y y 4

qui post Galen scripsere. y Fall. in obser. & Plat lacrymalia, meatus hi vocantur.

decliuore natura ad lacrymarum effluxum vtitur: etsi via patentior ipsis sit per nares, cum ad angulum internum in narium summo foramina magna ossi maxillæ superioris sint insculpta: hæc enim foramina meatus habent, qui sub carūcula in communem sinum in narium cavitatem desinentem, vniuntur,

2 Fall. obseru. Aquap. canalis nerueus canalis, Plat. vi. de Galen. 10. vs. part. 11.

a 5 Proble 35. Lacryma sudor quidā est, & ambo salia pariter sentiuntur.

b Fluxiones in oculos in ruētes ex vehemēti, & cunctis humorum acrimonia palpebras exulcerāt, & quibusdā genas, subiectasque oculis partes, ad quas confluxerint, erodunt. tunc etiam pupillam ambi-

qui 2 canalem proprium in osse squammoso insculptum refert, per quem lacrymæ in nares effunduntur: & hæc cavitās proprie πηγή, fons dici meretur. Verum hoc os, quod adeo tenue est, & canali excavatum à lacrymarum (quas falsas pronunciauit, & sudori assimilauit Philosophus) a aliorumue humorum acrimonia aliquando exulceratur, b fitque illa vlceris species, quæ fistula lacrymalis dicitur: quæ sanie collecta, si sinus exprimatur, per dictos meatus in internum angulum oculi excerni manifeste conspicitur. Quo ergo hæc exulceratio præcaueatur, natura carunculam siue carnem glandulosam c ἐγκύδισσα vel ἐμπύκνισσα dictam interiori angulo apposuit (Galeno d σαρκώδες σῶμα καὶ νευρώδες σαρκίος nominatur) [tab. 19. fig. 7. 8. r.] quæ os tuetur, dein & foramini huic ossi insculpto operimento est, ne oculi excrementa in nares delata refluant, & in genas profluant, & sic nos semper lacrymare faciant. Quare qui oculorum affectus curant, d caueant, ne acris pharmacis hæc carunculam colliquant: nam per hæc foramina in multis ocularia d medicamenta ad nares delata fuere, & non multo post inunctionem emū-

cta,

entem exeant. Hipp. de prisca Medic. c Caruncula in maiori oculi angulo, quæ videtur pituitam, ne in genas defluat, præcauere, Vesal & Laurent qui addit, & angulum ne ledatur tueri. Fallop. lacrymatis caruncula, & Plat. qui dicit à lacrymarum iniuria vendicare d Corpus carneum, quod maiori angulo incubat operimentum est foramini, quod est ad nares: foraminis utilitas, ut per hoc in nares oculorum excrementa confluant: ne igitur per angulos excrementa effluant, neque assidue lacrymemus, corpora hæc carnosæ his meatibus adpēsita, quæ ad proprios meatus impellunt, 10. vs. part. 11.

sta, vel per os reiecta: sed de lacrymis pauca aspergamus.

Lacrymas Plato, Aristoteles & Theophrastus sudorem quendam, aut sudori germanum, vt & lotio censuerunt: at dicimus excrementum^e cerebri esse. Verum cum in omni coctione excrementum duplex crassum & tenue segregetur, in hac coctione excrementum crassum, vt est pituita illa viscida & crassa, quæ per palatum & os expuitur, aut per nares emungitur. Quod vero tenuius est, partim insensibiliter diffilatur, partim sensibilibus & interdum cum crassis commistum euacuatur; interdum ad linguam humectatam, ad loquelam & masticationem: interdum ad totam faciem mittitur, præcipue vero ad genas, tempora & aures, quod comprobant vulnera hisce partibus inflicta, quæ quamuis sanata videantur, solet amen per duos aut tres menses quotidie humoris quei purissimi magna copia, per foramen in vulnere relictum, quod nulla arte consolidari potuit, effluere, potissimum in muscoli temporalis vulnere, quam obseruatione D. Aquapendenti Anatom. & Chirurgo insigni debemus. Quod vero ad musculos mittitur, lacrymarum materia est, nimirum ipsum serum, quod vna cum sanguine ad cerebrum deducitur, vt *τὸ χυμὸν τῆς τροφῆς*, quo sanguis vasa minutissima cerebri substantiam dispersa permeare possit, quod dum nutriendo non sit, in ipsa nutritione cerebri, eluti à lacte serum segregatur, per tenuem ipsius substantiam percolatur. Colligitur autem in oculi intro osseo, quod tantæ capacitatis est, vt cavitatis quarta pars ab oculi musculis & nervis repleatur: hæc partim à pinguedine, partim à glandulis, cum hæc sint substantiæ, instar spongiæ combibuntur, colliguntur & detinentur, ne statim emittantur, sed reliquorum excrementorum more conuenienti tempore

^e Excrementum tertia coctionis in oculo, in humoris vitrei & crystallinei nutritione, è sanguine tãquam materia ab oculi temperamento genitum. Ab his enim excrementum duplex secer nitur, aliud crassum, aliud tenue: Crassum nigredinem illam appositam vna & choroidi adherentem, aliud tenue, utpote lacrymas, cui & serosa humiditas admisceri potest, Aquapendens.

f Si in maiori copia effundatur, oculos & musculos exsiccando laedunt: tum vero & musculos agre oculos mouere, experientia quotidie probat: sic si diutius, quā par sit, detineantur, & copiā immoderata fiat, impurum oculum efficiunt, & visionem deteriore reddunt, A-
quapend.

g Sic habet Hippoc. lib. de videndi acie, addens reliquā lacrymam calescere.

h Hippoc. 1 Epid. idem quoque Galen. 1. ad Glaucon. 41. 4. aph. 52. damnat, & 6. Epid. 1. 1. spontaneas lacrymas probat; inuoluntarias autem pessimas

detestatur. Possunt etiam sponte fluere lacryma, cum cerebrū aut caput ipsum humorum acrim vaporacionibus tentatum oculos etiam illacrymantes facit, idque ex natura consilio, nō temere, ex magna etiam humorum aut vaporum copia in cerebrum sublatorum potest animalis illa facultas relaxari, & aliquantulum labefactari: itaq; humorem illum oculis illabentem, & sua sponte fluxilem vel incitē effundere.

pore expurgentur. Detinentur vero in oculi antro osseo, ad eius musculos humectandos, qui propter continuam motum non solum nimium incallescere, sed etiam exsiccare possent, nisi humectarētur & refrigerarētur à lacrymis circum musculos ad pinguedinem positis. Hunc vsum præstant, si moderate sint; nam si *f* immoderate fuerint, & intus detineantur, musculorum motum impediunt. Quare natura sapientissima his expurgandis duas vias parauit, vnam per oculorum angulos, alteram per nares, vti modo dictum fuit. Quod si vero guttatim lacrymæ stillarēt perpetuo, tam faciem, quam natura semper nitidam seruare conatur, deformassent, quod in iis, qui fistulis lacrymalibus laborant, manifestum est. At ne indecoram faciem reddant, visionemue offendant; si sponte & continue effluant, Natura ab aliqua causa moueri voluit: quare vel expressione, vel dilatatione, & attractione eliciuntur. Expressione quidem, in oculorum perfrictione, frigore, vento, animi dolore, & fletu, vbi per foramina tarforum finibus insculpta, sudoris modo guttatim scaturiundo profunduntur, musculis faciei & partium circumiacentium sese contrahentibus, alias cum, alias sine eiulatu, gemitu, atque intercisa, ac ceu subsingultiente respiratione & voce in faucibus nonnunquam contracta, aliquādo etiam prorsus elisa. Dilatatione vero prolucuntur à calore, risu, sole, (oculus *g* enim cum splendidis resistere nequeat, lacrymam prouocat) ira & febris acuta *h* & ardens, in qua, si cætera exitialiter se non habeant, hæmorrhagiam *h* denotant. Quod Hippocr. *h* docuit,

docuit, & etiam has esse causas profusionis lacrymarum ex Aristotelisⁱ problematibus colligere possumus. Nec locum hic habet obiectio, lacrymas interdum tanta copia profundi, ut vix possibile videatur, tanta copia in oculi orbita contineri posse; nam consecutione quadam serofus hic humor, eo modo, quo pituita è cerebro defluere potest. Hactenus de lacrymis.

Glandulæ^k in super utrique angulo adpositæ sunt, interdum binæ, interdum plures, quo sua substantia rara & laxa depascant excrementum illud serofum cerebri, à quo oculi externa superficies humectatur, & lacrymarum materia existit, quæ per angulos & taros congruo tempore euacuatur. Sunt quinetiam hæ glandulæ loco puluinaris mollissimi oculorum contactum durum ad angulos præcauentis. At in brutis aliter se habet, quod ex Fallopio aspergere lubet propter tyrones, in quorum gratiam singulis annis aliquot bouinos oculos secare cōsueuimus, quo ad humani oculi sectionem paratiores, quādo cādauer humanum datur, accedant. In bouino ergo oculo glandula alia callosa ac durior in interno angulo reperitur, quæ mēbrana vngui similis est, tenuissima quidem, sed corneæ tunicæ vel cartilaginis naturam fa-

15. Probl. 13. &
35. At Aquap.
opinio expur-
gari lacrymas
à natura ab e-
ius facultate
expultrice, ad
omnem offen-
sam præcauē-
dam oculi cu-
stodia gratia,
ut oculos hu-
meēt, quo à
frigoris caloris
que cōtaētue
occurſu oculū
tueatur. Sic in
iūtu, ut ipsum
non oculus, sed
lacryma susce-
pian, aut si o-
culus, ut omni-
no per medias
& intercedē-
tes lacrymas
mitius suscipi-
at, minusque
patiat. ^k Dna quoq;

ad eves, seu glā
piens: dula in utroq;

angulo; altera partibus infernis, altera supernis, qua meatibus non obscuris humidum in oculum effundunt ad motuum facilitatem, quemadmodum glandula lingue radici adiuncta saluam in os deriuant Gal. 10. vj. par. 11. Maior Anatomicorum pars nullam ponit glandulam, quidam sunt, qui duas addunt, sed neutri placeat, quia una tantum manifesta & perpetua, & satis insignis à me reperta in oculi superiore parte prope angulum exteriorem, Fall. obser. in interno angulo glandulæ, qua depascit excrementum humidum, quod in nutritione oculi secernitur, quod si exuperet, in lacrymas secedit: sin minus oculi externam superficiem humectat, & palpebrarum motu dissipatus sensim exhalat, Varol. Glandula venarum & arteriarum diuisiones intercedunt, Vesal plura non habet. Glandula bina altera supra, altera infra est, qua oculū irrorant, & lacrymas effundūt, Col. At Laur. glandula in oculi angulis sita. humorē à cerebro excipiant, oculos irrigāt ad motū, p. has & lacryma fiūt. Glā dula in utroq; angulo interdū bina, interdū plures, Aqu.

TABVLA XIX. Fig. 1. Oculum integrum cum ossibus, palpebris & ciliis repræsentat. Fig. 2. Palpebræ excoriatæ. Fig. 3. & 4. Musculi palpebrarum. Fig. 5. Palpebræ separatæ & inuersæ. Fig. 6. & 7. Oculi integri cum musculis è caluaria extracti, & à palpebris liberi. Fig. 8. Oculi globi anterior sedes.

LIB III

TAB XIX

FIG. I.

FIG. III.

FIG. V.





FIG. VI.



FIG. II.




FIG. M IV.



FIG. IIX.



FIG. VII.



1 De hac lo-
quutus est
Arist. 2. hist.
anim. 12.

piens: ¹ quæ motu voluntario ad angulum externum mouetur, & oculum palpebris etiam apertis operit. Circa radicem enim membrana quædam validissima glandulæ callosæ hærens, forte, vt dum cutis ad oppositum angulum trahitur, glandulosum illud corpus veluti cornu arcus tendatur, statimque cute remissa recurat, atq; ipsam in angulum proprium retrahat. Ducitur autem hæc membrana ad angulum oppositum chorda duplici, altera quidē superius, altera vero inferius sub membrana adnata latente, quæ à musculo quidem in angulo exteriori collocato oritur, qui musculus à Fallop. habetur, pro parte illius musculi, qui totum oculum ad exteriora trahit.

De Superciliis & Palpebris.

CAPVT XXXIII.

De superciliis egit Aristoteles 1. hist. anim. 9. 3. eiusdem 11. 2. part. anim. 15. Gal. 11. vs. part. 14. De palpebris 1. hist. an. 9. de earum varietate in animalibus 2. part. an. 13. de ciliis 1. hist. om. 9. 2. part. anim. 14. & 15. Galenus de palpebrarum substantia scribit 10. vs. part. 6. 7. de earum motu 10. vs. part. 9. 4. loc. affect. 2. lib. de oculis 14. de palpebra inferiore, capite 10. De utilitate earum 10. vs. part. 9. 10. 11. & lib. de instrumento odoratus 5.

^a 1. hist. an. 9. ^b Hipp. de loc. in hom. Arist. & Galen. ^c Cutim durā cartilagini per
SUPERCILIA cum Aristotele ^a ad oculos referimus, sic dicta, quod supra cilium sint, ὀφρύες ^b Græcis; hirsutæ sunt frontis extremitates Russo, siue pili supra oculos enati, qui sub fronte bipartito ^a distinguuntur. Componuntur autem ex cute, carnosis fibris à musculis frontis productis, adipe & pilis. Cutis hæc crassior & durior est: crassior, vt oculos melius muniat: durior, ^c quo pili numero æquales sint, nec in immensum crescant: vt enim Galeno monente in palu-

palustri & vliginoso loco nihil generatur, nec item in squalidiori solo: ita in sicciore & humidiori pili non erumpunt. Pili hi *τυλοὶ* à Medicis, attestate Polluce, nominantur, qui quemadmodum & palpebrarum pili vna nobiscum^d nascuntur, vnde Ægyptiorum sacerdotes, cum reliquos omnes raderent, his solis abstinebant. Et licet^e æquales sint longitudine numero & densitate, non tamen recti, sed obliqui producuntur (imo arcuatim secundum oculi rotunditatem ducuntur) quo ab oculis facilius omnia reflectant. Quod si breuiiores, pauciores & rariores essent, non ita oculos tuerentur: si contra longiores & densiores, visioni impedimento forent. At in quâ plurimis^f senescentibus adeo crescunt, vt tondere oporteat; Causam Aristoteles^f refert, quod in comæ ossium posita sint, quæ & senescente ætate laxentur, & inde plus humoris transmitti patiuntur. Verum, quomodo ex hisce pilis animi indicia desumantur ex Aristotele,^h & quomodo veteres animi partem in superciliis posuerint ex Cicerone, in libro nostro de partibus externis ostendimus.

Intermedium inter supercilia spatium, quod vt plurimum depile est, *μεσόρριον* Ruffo & Polluce dicti, quo loci Straton Philosophus animi principatum collocarit, ex Plutarcho, etiam loco citato docuimus. Hæc etsi à musculis frontis fursum trahantur, in aliquibus^k tamen duo adhuc musculi in occipitio
[*tabul. 72. figur. 1. C. alter figura 2. a. a. instar panniculi inuersi supra nasum retractus est,*] siti reperiuntur, qui cutim capitis posteriora versus abducendo, & eos attrahunt, quemadmodum paulo ante ostendimus, ubi & musculus orbicularis [*tabul. 22. figura 2. c.*] supercilia deorsum trahens, propositus fuit.

Vtq; superciliorum: adiumēti gratia haberi supercilia &

d. 3. *hist. animal. 11.*

e Solos hos, non eos, qui in palpebris sunt, æqualem semper seruare magnitudinē instituit, quibus si quid addideris, aut abstuleris illarum utilitatem corrumpis, Galen.

11. *vs. part. 14.*
f *Arist. 2. par. anim. 15.*

g *Arist. 3. hist. anim. 11.*

h 1. *hist. anim. 9.*

i Oratione pro Roscio, & lib. 1. *Officior.*

k Iulius Placentinus eleganter pinxit, ex quo figurā sumpsimus.

1 2. part. ani
mal. 15.

m Gal. 11. vs.
par. 14. & Ci
cero 2. de Nat.
Deor. iis sudo
rem à capite
& fronte de
fluentem re
pelli ait.

a Gens ho
minum, auiū
quadrupedū,
tam vniipa
rum, quam o
uiparum ocu
los visus cu
stodiendi gra
tia integunt,
sed varia, qua
animal pari
unt, geminam
habent palpe
bram & con
nuere solent:
aves vero &
quadrupedes
ouipara, infe
riore palpebra
connuent: ni
stant aves ab
angulis mem
brana, qua
tenuis pupilla
obtenditur: o
nium maxi
me homo con
nuet pisces, insecta & crustata palpebram non habent. Aristot. 2. part. animal. 13.

Ex animalibus quadam palpebram habent, quibus non apertis cernere nequeunt.
quadam, nempe quibus duri sunt oculi, eisdem carent, lib. de sensu & sensilis quod
& Galen. lib. de instr. olfact. s. citat.

b Galen. de instr. olfact. s.

c Galen. 10. vs. part. 7.

lia & cilia Philosophus¹ dixit: supercilia quidem, vt
¹ delabentes humores arceant, velut imbricamētum
humoribus, qui capite emanant, paratum: imo instar
muri cuiusdam^m omnia, quæ à capite defluunt, pro
pulsant, ac primo omnia excipiunt; quare si eos plus
quam oporteat minores aut rariores effeceris, vtili
tatem vitiaueris; hi enim influere permittent, quæ
prius defendebant.

De 2 Palpebris.

Oculos vndique ossibus obuallari, & antris os
seis quasi includi, & ab iis, quæ à fronte deflu
unt, superciliorum ope defendi non satis erat; cum
anterior eorum pars multis periculis sit exposita: i
mo & ^b molles cum sint à natura facti, ad faciliorem
specierum extrinsecus occurrentium receptionem,
pluribus læsionibus obnoxii futuri erant; quare ne
ab his offendantur natura sagax membranis ceu li
gamētis & ^b propugnaculis muniuit (vnde videmus
ijs animalibus, quorum ^b oculos exterior tunica du
ra tegit, palpebras datas non esse, eo quod facile lædi
non possint) quibus antra (ossibus enim ^c connecti
oculos melius fuit) cum oculis obteguntur. Dicun
tur autem ^d Græcis βλέφαρα, quasi τὸ βλέποντος φά
ρα, id est, visus tunicæ, vnde à Poeta quodam non il
lepidè ὀμματοφύλλα, oculi folia appellantur: Pal
pebræ Ciceroni, vel quod palpitare & tremere vide
antur, propter citissimum & frequentissimum mo
tum, vel quod palpitationi frequenter sint obnoxie:
Genæ, Plinio: Cilia, Festo.

Dupli

Duplices^c constituuntur in quolibet oculo, quia per medium dissecta est, & in superiorem & inferiorem diuisa; in vtroque enim angulo manifeste continuæ sunt. Superior [*tab. 19. fig. 1.3. E.*] in homine mobilior est inferiore; hæc enim à quibusdam censetur ex se immobilis, & non nisi^f genarum motu moueri, cum tamen à musculo moueatur, sed motu lōge minore. Nam si palpebre oculis vsum præstare debuere, debuit aut superior deorsum, aut inferior sursum, aut ambæ ad mutuum occursum & contactum venire. Iam vero musculus semicircularis in inferiori, non ecus ac in superiori reperitur, & in animali viuo moueri manifesto videmus (in auiibus tantum inferior, nonente s Aristotele, mouetur.) Nec etiam ita celeriterque motus à superiori tantum palpebra fieri posset, cum motus deorsum longiore spatio indigebat, quam tantæ celeritati conueniat. Quare facilius ad nutuum contactum venient, si altera ab altera iuteur. Verum superior in homine & animalibus, quibus inferior immota manet, maior est; quia sursum trahi & demitti debuit. Contra in auiibus inferior superiore maior est. Inferior [*tab. 19. fig. 1.3. F.*] superiore multo minor est: si enim maior fuisset, in seipsam^h defluens, corrugaretur, laxa fieret, & ab oculo recederet, & quod maius^h est, in eâ lippitudo, lacryma, & eiusmodi colligerentur, quæ in excernendo^h difficultatem haberent; quare paruam^h fieri latius fuit: talis enim existens, oculo semper adstricta est atq; adpressa, & ad linguem^h circumplectitur, & sic excrementa omnia facile exprimit. ^k Quare vtramque palpebram, vt ad usum patet, moueri dicimus, superiorem deorsum,

^c Palpebra superior & inferior 10. v. s. par. 7. partes superiores & inferiores tegentes, Arist. 1. hist. 9. Galen. 10. v. s. par. 9. superiores nullius fere utilitatis (inquit) nisi motu voluntario essent prædita, & mox inferiore immobilem esse dixit, & c. 10. quem admodum & 4. loc. aff. inferiore prorsus immobilem pronuntiauit, & Vesal. inferior minor & immobilis. Col. primū musculū ducit, palpebras claudere, & valde adstringere. Fall palpebras superiores agiles admodum ac propter mobiles: Carcano, inferior immobilis: Archan. dua inferiores

Z z

stāt immutabiles seu immobiles ex se, nisi genarum motu ciantur. Sic Laur. v. ca. superior mobilis est, quid omni inferioris motu opus, cū per superioris motum inferiora claudatur, & per motum eiusdem ad superiora aperiatur oculus. At lat. inferior sursum non nihil, cū oculū claudimus, ducitur. g 2. par. an. 13. h Gal. v. s. par. 10. k addit G. quæ cū essent eiusmodi, pspiciū est, q motu et nō indigebat

inferiorem fursum, vt sibi mutuo occurrant: at eum inferior multo minor sit, exiguum & obscurum; superior vero, quia maior, magnum & euidentem motum edit.

Componuntur palpebræ ex cute, membrana carnosæ, musculis, tunica, tarsis & ciliis; quare substantia earum partim mollis, partim dura est: mollis, quatenus membranosa & musculosa: dura, quatenus cartilaginosa. Si enim tantum^l mollis ac carnosæ fuisset cum hæ periculis primo obiciantur, propugnaculum non fuissent, & facilius quam ipsa cornea membrana afficerentur: imo facillime conciderent, rugosæ fierent, & minus æqualiter omnibus oculi partibus obtenderentur. Si contra admodum^l dura & ossæ fuisset, neque facile mouerentur, neque sine dolore corneam contingeret. Quare^l ex tali substantia, quæ facile moueri, & cum cornea, sine eius noxa, versari possit, palpebras fieri consentaneum fuit. Cutis tenuissima est, si vsquam alibi, omnis pinguedinis expers, ^m ne motus impediatur. Membrana vero carnosæ dicta, ita tenuisⁿ est, vt cum musculis vix aliarum partium membranam cuti subiectam æquet, ita v. orbiculares ipsius musculi nil aliud esse videantur quam prædicta membrana carneis fibris minimis commixta: ob hæc tenuitatem Aristoteles^o palpebrarum cutim sine carne esse dixit, & propterea discissam similiter ac præputium non coalescere.

Membrana interior [*tab. 19. fig. s. e. e.*] à pericranio producta tenuissima, leuissima, imo pericranio tenuior ac leuior, perpolitæ, ne oculorum aciem lædat cum oculum contingat: quæ ubi in longitudinem tantam producta est, in quantum palpebras extendi oportebat, tum in palpebrarum cutim parte superna & inferna orbicularem facit angulum, & duplicem membranam constituit, ad quam ^p duplicationem sub-

l Galen. 10. v. f. part. 6.

*m Sub cute palpebras con-
tegente mem-
brana sunt te-
nues, quæ mu-
sculos palpe-
brarum mouen-
tes tegunt, 10.
v. f. part. 9.
n 2. part. ani.
13.*

*o Nullus a-
dipos, sed vn-
guosus dun-
taxat humor
inter cutem
membranam-
que, Vesalius.
Nullo adipe
infarcitur,
Plat.*

*p Quomodo
periossum, o-
stendat palpe-
bras, vide Ga-
len. 10. v. f. par.
7.*

Substantia quædam membrana durior & cartilaginosa attensa est, quam *ταρσόν* nominant, quæ duplicationem per hanc claudit ac comprehendit: at huius membrana pars superior interiorem faciem utriusque palpebrae succingit, & quasi subdiuidit: altera, oculi exteriorem rotunditatem, supra muscutorum tendines ad iridem per usque obducit, & tunicam oculi dnatam dictam, (ei enim continuatur) producit, *[tab. 19. fig. 7. V V.]* quæ palpebram oculo amice coniungit. Tenuitas autem hæc & leuitas propter celerissimum & velocissimum palpebrarum motum requiebat, cum ponderosa neque crebro, neque celeritate moueri possint. Iam vero motus frequentia istis, ne afficere possent, occurrit; celeritate autem omne visionis impedimentum adimit: non ergo mirum, si palpebrarum corpus læue & tenuissimum est, sic & molliissimum, quo ad motum agiliores & promptiores sint.

Palpebrarum motus sunt fursum, deorsum, qui utraque mouetur, & utriusque; circularis, quo ampe palpebrae undique adstringantur; oculos enim aperiri & claudi necesse fuit; nam si semper palpebrae clausæ, & ita clausæ fuissent, obiectorum imagines nullam susciperent: aperti vero semper, si mansissent, ab occurrentibus tuti non fuissent, & cito læderentur, ob spirituum luminisque interni maximam distractionem: quare pro necessitate, & aperiendi & claudendi erant, quem motum naturæ instinctu, non consulto fieri Aristoteles censuit, & ita contra exsecutus occurrentia atque incidentia conuiere soluit, quod Galenus reprehendit. Sed hic motus licet voluntarius sit, tamen partim liber est, partim coactus: Liber motus est, oculorum & tendendorum, & custodiendorum causa, si forte

q 10. vs par. 9.
r Spatium inter
duas perio-
sty portiones
mediū visco-
ræ, atque un-
ctuosâ occu-
parunt, cum
mēbranis qui-
busdam à mu-
sculis extēsis:
quo loci etiam
quas vocant
videllides, gi-
gni contingit,
unctuosâ his
corporib. (qua
molliēdarum
sua pinguedi-
ne palpebrarū
gratia à na-
tura) fuerunt
comparata,)
sup. modū na-
turalem ali-
quādo autis,
Ga. 10. vs p. 7.
f 2 par. an. 13.
t 10. vs par. 9.
So; hista non-
nulli, cū neque
mouentes mu-
sculos, neque
motu rationē
inuenirent, eo
impudētia sine
progressi, ut
ipsarum motū
à nostra volū-
tate pēdere ne-
garint, sed na-
turale esse,
quemadmodū

Z z 2

quid

seriis, cordi & aliis instrumentis præter voluntatem motu insunt, arbitrii esse
esse menti, quam suam ignorantiam confiteri.

u Musculi pal-
pebrarū vulgo
dicūtur: at ab
Archan. mu-
sculi ocularij;
& motum pal-
pebris oculorū
adferant. In
numero nō cō-
ueniunt; nam
Gal. & Vete-
res, Vesal. item
& Syluius du-
os quidem fa-
ciunt, orbicu-
larem quē no-
minabimus;
in duos diui-
dēs, quorum
alter attollat,
alter depri-
mat; at reue-
ra unus tan-
tū est, qui pal-
pebram clau-
dit (superiorem
ipsi Columbo.
Fall. Archan.
imo utramq;
palpebrā collig-
git, Plat. Bau-
hino, Aquap.
Hūc etsi Lau-
rentius gemi-
nū faciat, u-

quid molestiam exhibeat, vt lumen valentius, fumus,
pulueres, ictus, & quicquid extrinsecus illabi posset.
Coactus vero motus, is qui à corporea affectione ex-
citatur, vel corporis affectioni deferuit, qui celerri-
mus est, & cum Galeno creber: quare dum fit, plerū-
que non animaduertimus, & sic forte naturalem po-
tius quam volūtarium Aristoteles dixit: vt dum oculo-
s diu apertos habuimus, etsi nihil, quod offendere
possit, occurrat, cogimur oculos claudere, & quidem
celerrime & magis hyeme, quam æstate, vento spirā-
te, quam aere quieto, frigido quam calido: forsan fit,
quod oculus aeris externi contactum assiduum ferre
non potest, propter eorum tendines, qui & exquisi-
tissimo sensu præditi (quo oculus ea, quæ offendere
possunt, maxime calorem & frigus statim persentiat,
nam crystallinum aliquando cū visionis lēione, plus
æquo à frigore condensatum cōstat) & nudi fere aeri
externo expositi, cum iis nil nisi membrana tenuissi-
ma, adnata dicta, imposita sit. Quare ne oculus à vi-
dendo vnquam, neque à custodiendo, quātum opus
est, reuocetur, palpebræ motus celeritate oculum a-
periunt & claudunt. Motus autem hi^u musculis duo-
bus absoluūtur, vno recto in superiori palpebrā, qui
eam attollit, & altero orbiculari.

Musculus x rectus [tab. 19. M. tab. 20. β.] palpebram
superiorem attollens; intra ossium cavitatem in or-
bitę parte superiore situs est supra & prope illum, qui
oculum attollit, cui etiam figura similis est, & carne⁹,

sed
truncq; tamen palpebram superiorem claudere voluit. Hinc sequitur Galenū, Ve-
sal. & Syluium oculum aperiētem non agnouisse. Oculum vero aperiētem Fallop.
Plat. Bauhin Laur. & Aquapen. unum faciunt: at Col. & Archan. duos, quorum
primus admittitur: ipsorum vero secundum oculum circumagere dicimus.

x Hunc Galenus non agnouit, qui orbiculari musculo bipartito, omnes motus
palpebr. absolui credidit. (10. vs. par. 9 4. loc. aff. 2. at lib. de oculis 14. qui spurius est
quatuor palpebræ musculos tradit) quem & Vesal. neuiquam nouit, & primo à si
promulgatum, Fallop. asserit, imo ne Syluius nouit. Columb. Fallop. & Plat. secun-
dum palp. faciunt.

ed minor, & qui ab eodem principio, vnde & reliqui
oculum mouentes, posterius ad nerui optici forame
nascitur: hic rectâ ad superiorem palpebram exten
sus, tendine satis lato palpebræ extremo eiusue carti
agini inseritur, suisque fibris intro, contractis, palpe
bram sursum trahit, inferiore sponte in suum locum
subsidente, sicque oculum detegendo, aperit.

Musculus *y* semicircularis seu orbicularis [*tab. 23.*
fig. 1. C E. tab. 19 K.] inter membranam carnosam, & eâ,
quæ à pericranio producitur, situs est, qui membra
nosa est, & tenuissimus, vt qui à membrana carnosa
fibris circularibus carneis sit adauctus, semicirculus
à vtraque palpebra consistit. Hic ad nasi radicem in
angulo maiore, & interno inferioris palpebræ, vbi
iunctura communis est capiti & maxillæ superiori, acu
to principio exoritur, & per inferiorem palpebram,
eius latitudinem imitatur, progreditur: mox ad an
gulum exteriorem sursum ad superiorem partem or
bitæ reuolutus & amplificatus, perque superiorem
palpebram progressus in angulum internum & su
periore, acuto fine inseritur, & sic exactum circulū
effert, cum exteriorem circumferentiam vtriusque
palpebræ ambiat. Hic versus suum principium at
tractus, vno tempore, superiorem palpebram deor
um, & inferiorem sursum mouet, & ita vtramq; pal
pebram mutuo coniungit & adstringit, quod fibrarū
continuitas in circuitu & angulo, & motus in eodem
angulo, præsertim constrictior, qui & visu & tactu
percipitur, probant. Nihil enim constringi potest, &
mutuum contactum venire, nisi aliquæ partes

Z z 3

fur

am moueat. *Laurantius* hunc in duos diuisit, & duos palpebram claudentes vo
cat, quorum alter ab interiori angulo ortus, totum cilium circundet, alter ab eodē
angulo & nasi radice exortus in tarsum infertur. *z* Totam palpebram occupat,
claudit seu colligit vtramque palpebram, *Plat.* totum cilium circundet, *Lau*
rant. excepta parte interiore ad angulum maiorem, à quo prohibetur, ne prorsus
orbicularis fiat. *Fallop.* in *instit.*

y *Primus pal*
pebra muscu
lus, Col. Fall.
Plat. Archan.
at Vesalium &
Sylvius secuti
Galenum, di
uisere in par
superiorem &
inferiorem il
lam astollere,
hæc vero par
tem detrahe
re censuerunt;
quare Vesal.
à Col. & Fall.
in Instit. repre
henditur. Syl
uius ciliū su
pernū mouen
tes appellat.
Fall. in obs
tetur, se semp
in hac cū Ga
leno & Vesal.
opinionem fuis
se, & se primū
anno 1553. er
rorē agnouisse,
partim moriū
loco Oribasii.
libr. de dissect.
musculor. ex
Galenica ca. 29.
partim ex dis
sectione Rhoca
piscis, qui v
tramq; palpe

a 10. v. par. 9. alter in maiore angulo apud nasum obliquus ad tarsum si partem dimidiam peruenit: alter & ipse quoque obliquus, cuius caput ad supercilium ad minorem angulum extensum ad reliquam tarsus partem dimidiam sibi propinquam per rumpit: ille, quando agit, partem palpebrae sibi continuam deorsum trahit: cum vero alter, reliquam sursum trahit: si simul agant, tum oculus non magis erit apertus, quam clausus, & ea erit figura, quam Hippocrates πύλον, id est, curvum atque reflexum appellavit. Idem Galenus seq. c. fatetur,

sursum, aliquæ vero deorsum ducantur. Hic musculus ratione fibrarum, quæ continuæ sunt, vnus, ratione vero palpebrarum, duo semicirculares dici possunt, & separati semicirculum, ambo iuncti, perfectum circulum complent. Hunc Galenus agnouit, & ab eo omnes palpebrarum motus absolui voluit, eumque diuisit, & alterum ad angulum maiorem versus nasum trahere, alterum ad minorem, & dum prior trahit palpebram deprimi, si vero posterior, attolli. Sed cum fibræ huius musculi per totam palpebram sint continuæ, diuidi non potest. In inferiori vero palpebra, etsi & ipsa sursum & deorsum moueatur, nullum tamen musculum habet, qui motum rectum obeat, sed tantum orbicularem prædictum, qui ipsam sursum trahit, sed magis ad angulum internum, tanquam ad suum principium, ut quilibet in seipso tactu deprehendere potest, qui tamē motus ex quorundam sententia à genarum motu perficitur. Ergo motus palpebrarum duobus absoluitur musculis, recto qui in superiori palpebra eam attollit: orbiculari, qui in utraque palpebra, qui tensus inferiorem palpebram sursum, superiorem deorsum eodem tempore trahit & ubi maiore adstrictione & occlusionē opus est, tum musculus superciliarum orbicularis, de quo ante, suppetias fert: quemadmodum maiori apertioni frontis musculus auxilio est. Quod si hæc demonstrare velis, cultro exiguo acutissima acie prædito opus est: separando primum cutim, ita tamen, ut fibræ musculi integre seruentur, maiori diligentia in angulis adhibita: tum musculum separabis, infra ad tarsum, supra ad supercilium. ^b

Car-se maioris anguli musculum nunquam vidisse, hinc patet ipsum ex aliorum sententia locutum esse. Idem cum Galeno Vesalius sentit. At Galenus loc. affect. tres in lib. de musculis recenset, duos prædictos, quos innuit palpebram deorsum trahere, & tertium à fronte natum, qui palpebram sursum trahat. ^b Tertium musculum addunt Colum. & Archani. qui ex eodem loco, ex quo & palpebram attollēs prodeat.

Cartilaginofam quoque palpebrarum substantiam diximus, ad earum extrema respicientes, quibus cartilagine [*tab. 19. G.*] inter cutem & membranam palpebras succingentem, semicirculares corniculatam lunam referētes, teretes, parvæ, satis molles, & ab ossibus liberæ inseruntur, quos τάρσι, Græci, & at Plinius & Galeni interpretēs cilia vocant. Hæ præter utilitatem supra allatam etiam propter momentum additæ, quo æqualis fiat oculi & clausio & apertio, quatenus membranas tenues firmant, & distensas detinent, ne in motu corrugentur, & ut ^d musculus in superiore palpebra commodiorem infertionem præbeant. Volunt etiam propter pilos additos fuisse, ^e quo tanquam firmiori substantiæ infixi, recti & immoti permaneant, quod facile in oculos conderissent: quare Galen. & hanc tarsi secundam utilitatem posuit, & ipsum tenuibus quibusdam foraminibus pertusum tradit.

Pili ^h palpebrarū [*ta. 19. fig. i. b. b.*] βλεφαρίδες Hippocrati forte deceptos,

Ζζ 4

quod in orbita eorum siti sint. At hunc tertium Columbi & Archangel. dicimus esse musculum sextum ipsius oculi. ^c Ab illa pilorum serie, remorumq; in magnis avibus seu galeis similitudine vocantur, Vesal. & Laur. Gal. 10. us. par. 7 Tarsi, Vesal. Fall. Plat. Aquap. Cilia, Plinio, Archang. Laur. γορδὸν oculi cartilagineum *tip. lib. de videndi acie nominavit. Col. palpebras cartilagineas vocat. d* Musculum parvorum palpebrarum moventium dilatatorum & extenuatorum productiones tarsum recipit, & hac tertia est & maxima tarsi utilitas, 10. us. p. 9. & Vesal. & Fall. Durum corpus instar cartilaginis cuiusdam subiecit, 10. us. p. 14. f. 10. us. p. 7. 11. eiusd. 4. Hoc affirmant ceteri, ut Vesal. Fall. at Plat. negat, quia pili nullibi illis inferantur. At Arist. 2 p. ar. 15. cilia venularum finibus innituntur, nam ubi cutis finit, ibidem etiam venula desinunt: itaq; propter vaporem, qui inde crassiusculus proflit, pilos ijs locis nasci necesse est, nisi quid naturalis opificij ad alium usum impetrat: Aquapen. à tarsi cilia prodeunt. g. 10. us. p. 7. h. Cilia habent ad palpebras, ne pilos obtinent, aves & qua cortice integuntur, caræ, excepto struthione Africa quia partim avis, partem quadrupes 4. p. an. 14.) & interea, qua pilos habent, homo unus cilium in utraq; palpebra obtinet. Quadrupedum generi pili non parte sumina, sed prona potius habentur, homo contra parte magis supina, quam prona, pili non operimenti gratia adiuncti sunt animalibus. Quadrupes nulla est, qua pilos vel in palpebra inferiori habeat (nonnulli tamen sub ea nascentes habent) vel in ciliis vel in pube, ut homo &c. Arist. 2. part. an. 14.

i In Coacis a
phor. 218.

k 1. hist. anim.

9. 2. part. an.

15.

l Gal. 12. Vasa.

Columb. Plat.

Aquapend.

m 11. v. part.

14.

n 10. v. part.

7.

crati,ⁱ Aristoteli,^k palpebræ, à frequenti palpitatio-
ne, Plinio: cilia,^l alijs, quod oculos celent, ac tuean-
tur; hi mox ait & superciliorum facti sunt, & elegan-
ti ordine dispositi, æqualem magnitudinem & nu-
merum seruant, æqualem^m dixi magnitudinem; si
enim quid addideris, aut abstuleris, illorum vtilita-
tem corruperis: si enim minores fuerint, in ipsos inci-
dere permittent, quæ prius defendebantur: si vero
maiores aut densiores effeceris, non amplius vallum
aut murus oculis, sed carceri^m cuidam simile fuerit
id operimentum: pupillas enim occultabunt & ob-
scurabunt, quas tamen omnium instrumentorum
minime obscurari oportebat: Ob eam causam Con-
ditor^m nostri, æqualem semper magnitudinem ser-
uandi necessitatē ipsis imposuit, quod id ad rem per-
tinere magis videbatur. At quemadmodumⁿ super-
ciliorum pilos sibi ipsis mutuo incidere præstiterat,
ita hos rectos conseruari, cum superciliorum vsus
fit, id quod à capite defluit, priusquam oculis inci-
dat, excipere, sic eorum, qui palpebris insunt, pulue-
rem, parua animalia volitantia, aut similia, ne oculis
incidant, prohibere. Sic etiam nec rectâ sursum ad
supercilia, nec rectâ deorsum ad malas, nec intro in
oculos nutantes spectant: primi enimⁿ vsus, cuius
gratia creati, labefactassent: secundi, oculis incom-
modassent, continuitatem obiectorum spectando-
rum intercidentes. Attamen vt superioris palpebra
pili leuiter sursum inflectuntur, ita inferiores deor-
sum incuruantur: nam si recti vndique essent, oculis
vmbra inducerent, & quo minus sursum videre
possemus, impedirent. Sic & ⁿ conueniens & com-
mensuratum interuallum inter ipsos est, nam si lon-
gius à se destitissent, multa oculis incidere potuis-
sent, à quibus nunc arcentur, sin veroⁿ se se contin-
gerent, noctem quodammodo oculis offunderent,

usum, cuius gratia facti sunt, euerterent, tanta est conditoris sapientia simul ac providentia, quam in tota animalis fabricatione adhibuit. Hi nunquam o-
lus iusto excrescunt, & non nisi in P magnis partis effectibus defluunt, etsi Philosophus o-
us veneris incæptis defluere, eoque magis, quo v-
is veneris fuerit amplior, quique lentissime o-
inium canescât. His munitæ sunt palpebræ tanquā al-
lo pilorum, non modo, vt aliquibus placet, orna-
is oculorum gratia, sed vt spiritus visiuos & radios
o q interiore parte effusos, perspiciendi gratia diri-
ant; siquidem his elapsis vel retortis, nequaquam a-
imal similiter in rectum vel longum videre potest.
orundem quoque nictus creber in vigilatibus est,
vt visus recreetur, & ne quid violenter oculis in-
dat: siquidem ceu vallum r quoddam visus ea, quæ
culis patefactis incidere possent, tuentur, cum iis
inquam rete irretiantur.

Habent etiam palpebræ venas à iugularibus ar-
rias à carotidibus, & n̄ruos à secundo pari, quæ
utritionem, calorem, sensum & motum deferunt.

Quod vero superiori palpebræ impendit, κοίλον,
uum Ruffo [tab. 19. fig. 1. 2. g.] quod vero illi sub in-
erna palpebra respondet, ὑποκοίλον, subcauum dicitur
[tab. 19. fig. 1. 2. h.] & hoc in hydrope & cachexia, &
æmorrhoidum longo fluxu, & menstruorum anti-
ua purgatione, nonnunquam etiam lippitudini-
us inchoantibus intumescere consuevit; quem-
dmodum in Libro partium externarum monui-
rus.

Vfus palpebrarum subiiciamus: etsi Philosophus
earum usum dicat, vt oculos tegant, & noxia illa-

Zz 5

psura

tr, quia perpetuo in aquis degunt: animalia squamosa palpebris carent, cum eo-
um oculi durissima membrana protegantur, & sinus habeant, in quos oculos suos
recipiunt. Pennata pro palpebris pelliculam alba tela similem, eamque mox
abest.

o Arist. 3. hist.
an. 11. quomo-
do oculi pal-
pebra sint ra-
denda, vide
Hippocr. libr.
de videndi a-
cie.
p 11. vs. part.
14.
q In introduc.
Sic Columb.
visui dirigen-
do inserviunt.
Laurent. diri-
gere dicuntur.
r 10. vs. part.
7. Arist. 2. par.
anim. 15.

f 2. par. an. 13.
piscis palpe-
bris destituitur.

psura impediât; cuius nomine crassissimæ & pinguedine multa obductæ requirerentur: quod neq; infectis, neque piscibus, neque ostraceis contigit, attamen Palpebrarum vsus plures proponemus, quarum primum & præcipuum dicimus cum Varolo esse, vt corneam ab omni sorditie abstergant. Nam visio in medio diaphano maximam puritatem postulat: secus enim videre non possemus, vt patet in aqua turbida, & aere caliginosa: ideo cum cornea ob humiditatem ex glandula resudantem, nec non aeris externi contactum, facillime obtenebretur, facta est palpebra, quæ vniformiter oculum contingit, & vbi in oculi apertione attollitur, omni sorditie corneam abstergit ac depurat: Et hæc causa est, cur ita frequenter palpebram moueamus, vbi quidpiam exacte videre volumus. Dein, vt visoria^t virtus à luce auertatur, vt in somno, quo homo melius quiescat: cum in aere^u lucido nemo nisi tectis oculis dormire possit, vnde animalibus^u, quæ palpebris, carêt, vt locustæ, cancri, &c. Natura sinus quosdam dedit, quo instâte somno quasi in cubicula quædam oculos totos recipere: qui mox, cum cernendi voluntas subit, eruuntur, & vna cum ceruicibus suis in sublime extolluntur. Imo natura semper in id intenta, vt sensus in suis actionibus retineantur. Tum ad visus recreationem, ne tot spiritus vno & continuo tempore dissipentur: si enim oculi toto vigiliarum tempore paterent, fatigarentur, & multa incidendo eorum tunicas violarent. Sic si non ex toto integantur, visionem dirigunt, cum quippiam longius rectâ prospicere volumus. Quarto, vt oculi^u molles ab incurstantibus defendantur, cum satius sit, nos eo tempore non videre, & oculos sine noxa seruare.

*t M. Attilius
Regulus 2. Cō-
sul primo pu-
nico bello in
Africa ex in-
sidiis captus,
quod Roman
a Carthagi-
nensibus iura-
tus missus, in
Senatu capti-
uorum cōmu-
tationem suo
consilio impe-
diuisset: post
reditū ea pœ-
na ab illis mul-
tatus fuit, vt
abscissis pal-
pebris Soli ex-
poneretur, cu-
ius lucem non
minus oculos
quam vitam
offendentē in-
sustinere mi-
nime potuit.
u De instrum.
odoratus s.*

DE PARTIBVS OCVLVM
constituentibus, & quidem de A-
dipe.

CAPVT XXXVI.

PARTES oculum constituentes quinque sunt,
Adeps, Musculi, Vasa, Tunicæ & Humores.

Adeps copiosus [tab. 19. fig. 6. T.] oculis adponitur, ui potissimum inter inania musculorum & neruorum spatia reperitur: copiosior quidem ad musculum superiorem, cum maior sit, & motibus frequentioribus & robustioribus destinatus; sic ad orbitam inferiorem, copiosus, qui instar puluinaris, oculis, ne in ossibus illidant, subiicitur; tum inter musculos & oculi globum plurimus est, ne dum musculi agunt, oculus comprimatur: tandem ad venas & arterias, quo vasa hæc oblinantur, & eorum distensio & oculorum motu prohibeatur.

Vfus adipis, quatenus calidus, oculum natura sua aqueum & frigidum calefacere, & à frigore ambiens fouere; quare oculi nunquam rigent: quatenus humidus, musculos humectare, ne ex frequenti motu exsiccentur: quatenus mollis, ne oculi dum moventur à circumiacentibus ossibus laedantur: quatenus vinctuosus & pinguis oculi munus proprium cuncta velocitate absolvere, & faciliorem motum præbere, & musculis aliquando ex motu exsiccatis, & quasi tabidis alimentum præbere.

Adeps copiosus & albus admodum Ves. Pla. Lauren. pinguedo, Colüb. Varol. modo adeps, modo pinguedo dicitur A. quæpend.

De musculis oculorum.

CAPVT XXXV.

De his egit Galenus lib. de diff. musc. 5. 10. vs. part. 3. lib. de oculis, & 4. loc. aff. 2.

CVM oculi dati sint, vt exploratorum munere defungantur, quo vtilia prosequamur, nocitura vero fugiamus, non vero ex quauis^a positione oculi visibilia omnia cernere possint, cum neque ex obliquis ac lateribus, neque ex posterioribus, neque ex superioribus vel inferioribus, neque aliud quippiam, nisi quod pupillæ rectis lineis opponitur, cernere queant, idcirco^a minime immobiles esse debere, aliàs duntaxat id, quod ipsis ex directo positum esset, viderent (per directum enim cernimus, inquit^b Philosophus) & sic paucissima videremus. Quare ita dispositi esse debere, vt in omnem partem moueri ac circumagi plurimum possint, vt facile quocunque velint, conuertât: & quo munus proprium summa velocitate absoluant, plurimo adipe vinctuoso obuoluuntur. Sed addit Galenus, ^a cum ipsis oculis etiam collum (imo caput) ad motus habile factum esse. Nam cum oculus ad omnes loci positiones moueri debuerit, quæ sex sunt, sursum, deorsum, antrosum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum, quibus tanquam ex omnibus mixta septima, quæ in gyrum fit, adiungenda. Iam vero anterius & posterius non mouentur, partim, quia non necessarium, partim, quia impossibile fuit: antrosum enim^c moueri opus non erat, cum oculis non ipsam lucem, sed oculum lux adeat, quæ momento immensum spatium vsque ad oculum perlustrat, & intro in ipsum peruenit. Verum sapientissimus rerum Opifex motuum oculorum defectum correxit, ope motus

*a 10. vs. par. 8.
de oculis 4.*

*b 2. part. ant.
20.*

c Aquapendens.

us capitis, quod è vestigio ad ea videnda, quæ oculi ut propriis motibus, aut complete præstare nō poterāt, sese conuertit. Quo vero totum id, quod à tero est, oculis perlustrari possit, cum id sola capitis circumuolutione fieri non possit, motus hic à femoribus adiuuatur, dum totum corpus inuertitur. Sic totum oculi sursum adiuuat, capitis motus retrorsum & spinæ totius, quod experiuntur ij, qui fornem templi alicuius sublimis inspicere volunt: sic eorsum & capitis & colli motus, qui antrorsum fit. Quare cum motu^a voluntario oculos præditos esse portuerit, & omnes motus per musculos fiant, idcirco Opifex oculis musculos dedit, quibus celeriter mouentur: hinc oculus corporis nostri pars mobilissima à Philosopho^d dicitur; qui tamen voluit eculum sinistrum dextro expeditius contrahi. Iam vero, cum oculi humani motus sex^f sint, sex musculus quilibet obtinere debuit: de quibus nunc.

Musculi 8 in oculo humano, quemadmodum & in animalibus sex^h numerantur; quadrupedibus autem proteris incedentibus septimus additur, qui in duos, tres, vel quatuor diuidi potest. Sex sunt, quia oculi huma-

d 7. Problem.

8.

c 32. Problem.

25.

f Gal. 1. mot.

msc. 3.

g Galen. Ve-

sal. & Ana-

tomici alij, o-

mnes beluinos

mani oculos descri-

re, quare septimum in unoquoque posuere, ait Columb. omnes musculos oculorum male enumerant, & Vesalius septem enumerat, qui in boue reperiuntur, non item recte, ut in boue sunt collocati, qui & octauum omittit, Fallop.

Musculorum in numero non conueniunt. Octo esse auctor libelli de ocul. 14. voluit, quorum quinque oculum moueant, tres nervi fundamentum corroborant: tribus addit quatuor palpebras mouentes. Septem fecit Galenus, quorum quatuor rectis motibus præsent, duo totum oculum circumuertant, septimus oculum met. lib. de dissect. msc. 5. 10. vs. part. 8. 4. loc. affect. 2. (Archangelus dicit priori hoc loco, Galenum tantum sex posuisse) secuti sunt Galenum, Vesalius & Richsius. Sex sunt Fallop. Carcano, Plat. (hic figuram Vesalii exhibet,) Varolio, Rubino, Laurentio. Quinque non sex esse Lycus opinabatur, sed eos, qui non sex, quinque dicant, non solum in numero, sed etiam actionibus cognoscendis errasse ait Galenus 10. vs. part. 8. Sic Columbus quinque censuit, quinimum suum dicit inuentum: secuti sunt Valuerda & Archang. at quem non sextum dicimus, & palpebra tertium faciunt.

i Tres motus, unus, quo intro- & extrorsum mouetur: secundus, quo sursum & deorsum: tertius, quo obscure circumuerti- tur: quare sin- gulis motibus bini adaptan- tur. Vesal.

k Sibi ex omni parte similes, & duo circa oculos illis forma & orture spondent: at- minores ductu & insertione differētes, Ve- sal.

l Vesalius, hos ex diuersis par- tibus ortos in diuersas par- tes insertos di- cit: & addit septimum cū

Galeno, circa quem eandem patitur notam, quam sapissime Galeno imputat, dum ipsum suis simis delusum multa comminisci ait, Falli in instit. Quatuor cruris an- gulos constituere videntur, superior ab osse frontis, inferior à mala, dexter ab osse bus nasi, sinister à Zygomate, Archangelus.

m Oriuntur à membrana dura cerebri, opticum obuolvente, & è neruo secund- paris, Vesal. à sphænoida duraque matre exorti, Columb. à membrana oculi orbi- tam succingente, & membrana opticum vestiente, Plat. à pericranio, Aquapend- errant, qui ab interiore membrana eaque crassa opticum ambiente, enasci putāi. Hoc enim sensus omnino aduersatur, nec à membrana enasci debuerunt, aut po- tuerunt, non debuerunt, quia membrana exquisitissimi sensus neruum circumdat itaque musculi in motibus suis neruum comprimerent, & visioni obessent, non po- tuerunt, quia firma basi non adherent: quare ab interiore & profundiore orbita- Laurent.

mani motus i sex existant: quatuor recti, quibus qua- tuor præfunt, motui qui sursum, deorsum, dextror- sum, sinistrorsum fit: duo obliqui motus, quare & duo musculi, quorum munus est circumagere, & in- gyrum flectere: horum tamen vnus exacte obliquus, alter partim rectus, partim obliquus est. Omnes ta- men in posteriore oculi sede intra caluarię cavitatem neruum opticum comitantes, siti sunt; qui dum ad- huc in suo situ sunt, simul cum oculo figuram pyra- midalem seu turbinatam constituunt [tab. 19. fig. 6. & 7.] ex his crassiores & corpulentiores sunt recti, qui eandem structuram, originem & insertionem habēt, & per oculi longitudinem recta procedunt: obliqui vero minus carnosi k sunt. Parui sunt, quo celerius moueri possint, ad quod oculi figura rotunda pluri- mum confert, (motui enim celerrimo spherica figu- ra maxime idonea, quæ motus omnes alios mira ve- locitate præcedit, quod ex sphericitate cœli depre- hēdere licet) quod ad omnes res visibiles conspicien- das minimo tempore ferantur; ob quam etiam cau- sam caput velocissime mouetur, cum exigua sui par- te ossi quiescenti incumbat. Recti quatuor versus ra- dicem l nerui optici contigui, ab orbitæ m osseæ par- te profundiore, quam os sphænoides constituit iuxta for- a-

oramen, è quo nervus visorius prodit, acuto principio exoriuntur, toto ductu carnosus, & ventre fere tecti versus anteriora ducuntur, & paulo supra oculi medium in latissimum, tenuissimum & membranosum tēdinem desinunt, quo antèrius oculum totum ingunt, & corneæ tunicæ iuxta iridem ⁿ maiori oculi circulo pertinacissime adnascuntur, ^o hiq; tendines simul iuncti tunicam innominatam Columbi formant, & oculi candorem sublucidum constituent: horum enim musculorum tendinibus potius, uam adnatæ tunicæ, hic candor acceptus ferri debet.

^p Primus [tab. 20. fig. 1. 3. 4. D. fig. 5. A.] in superiori loco positus, carnosus, & teres, cæteris crassior, secundo maior & robustior, cum oculum ^p sursum & versus supercilia tollat, & maiore robore in attollendo, uam deprimendo opus sit: hic attollens & superbus dicitur.

^q Secundus [tab. 20. fig. 2. 3. 4. E. fig. 5. B.] huic oppositus parte inferiore situs, oculum deorsum ^q versus inferius trahit, & minor est illo, cum oculus suo quoq; pondere deorsum inclinetur, & deprimens & humilis nominatur.

^r Tertius [tab. 20. fig. 1. 2. 3. 4. G. fig. 5. C.] in maiori angulo locatus oculum introrsum versus ^r nasum ducit, & adducens & bibitorius vocatur.

^t Quartus [tab. 20. fig. 1. 2. 3. 4. F. fig. 5. D.] illi oppositus, ad externum latus repositus, oculum extrorsum dⁱ paruum angulum, seu tempora contorquet, & abducens seu indignatorius dicitur. Verum ab his quatuor, ^u si simul agant oculus intro trahitur, sistitur,

ut oculum versus suam originem mouere. Quando autem diuersis temporibus ne mora, sed successiue, tunc oculum in orbem circumferre (qua ^o Columbi sententia est) quando vero omnes eodem momento agunt, tunc sistere, firmare, & immobilem oculum reddere, quibus in subsidium quintus veniat: sine illi quatuor se-

ⁿ Membrana hac ad iridem non pertingit, Colum.

^o Vel ut Galenus, validissimus aponeurosis circum latus tēdinis in iridem ac corneam desinens, 10. vs. par. 8. & 1. mot. muscul. 3.

^p Tertius Galen. 10. vs. par. 8. Vesal.

^q Quartus Gal. & Vesal.

^r Primus Galen. & Vesal.

^s Dissert. muscul. 5.

^t Secundus Galen. & Vesal.

^u Vesal Col. Fallo. Aquap.

Verum Arch.

cui hos quatuor, quando

diuersis temporibus cū ali-

qua mora mora mouentur,

hoc est, contrahuntur versus

sum principium, tū quē-

bet oculum versus suam originem mouere.

Quando autem diuersis temporibus

ne mora, sed successiue, tunc oculum in orbem circumferre (qua ^o Columbi sententia est) quando vero omnes eodem momento agunt, tunc sistere, firmare, & immobilem oculum reddere, quibus in subsidium quintus veniat: sine illi quatuor se-

TABVLA XX. Fig. 1. Oculi musculos in sua sede, at
 Fig. 2. Eosdem sub oculo sursum reuoluto, & Fig. 3. &
 4. Musculos separatos parte anteriore & posteriore cum
 suis nervis exhibet. Fig. 5. Oculus bovis cum
 suis musculis proponi-
 tur.

TAB. XX.

FIG. I.




FIG. II.

LIB. III.

FIG. III.




FIG. V.



FIG. IV.



orsim siue si-
mul agant. At
Laur. omnib.

ex simul ope-
santib. & vil-
ros intenden-
tibus sistitur.

x Sextus Fall.
Plat. Lauren.

quintus, Ga-
leno & Vesal.

y Colum. hūc
se inuenisse &

descripsisse di-
cit, & trasuer-

sim sub qua-
tuor rectis si-

tū, oculi me-
diatatem cō-

plecti, à cor-
nea oriri, & in

eandem desi-

nere, admira-
bilem esse, qui

à latere tendi-

ne latiusculo pradi-
tus sit, quo cornea adhaereat: in cuius medium nervus insigni-

crassusq; satis ingrediatur, qui nervus, si trahatur, oculum sursum verti & circū-

agi, imo & in sua sede immotum contineri & sisti. Cuius forte usus sit, ut eius ad-

xilio cœlum intueamur: Archan. existimat nasci, aut adhaerescere trasuersim si-

periori orbita, & in utrumq; latus oculi ad corneam exporrigi, & originē eius r-

tione dextri lateris, videri sinistram, & ratione sinistri, videri dextram: cuius

sus, ut quatuor rectis in subsidium veniat, siue seorsim, siue simul agant; hic, si-

periori oculum sursum trahenti opem fert, & potius ad superioris, quam inferioris

musculi actionem concurrat: hic etiam oculum sistit, ut situs docet, cōtractus ve-

sus suam originem, & vertit in gyrum aliorum motum adiuvans, & oculum cō-

net, ne sede excidat. Dein reprehēdit eos, qui ab oculo oriri, & in eum desinere v-

lunt: nam si omne, quod mouetur, aliquo quiescēte mouetur, & in motibus musc-

tur, firmatur & continetur, quem motum tonicū
Medici vocant.

x Quintus [tab. 20. fig. 2. 3. 4. I. fig. 5. B.] latere exter-
no in cauitate inferiore positus inter oculum & ten-
dines musculorum secundi & quarti (quare aliqui
ipsum ab oculo oriri, & in eundem inferi dixerunt
oritur y ab ea rima, quæ ceu futura apparet ossis or-
bitæ inferioris, primum os maxillæ cum quarto iun-
gentis, aliquando à squamma ossea, carnosio princi-
pio: qui gracilis est, & teres & brevis, & exacte obli-
quus, qui oblique versus externum angulum ince-
dens, oculum amplexatus, tendine breui, & aliquate-
nus rotundo, qui neruosa tenuitate sua iuxta iriden
obliqua linea implantatur, prope sexti insertionem
ita, vt aliquando vtriusque vnus, & idem tēdo videri-
tur. Huius munus, vt contractis suis fibris oblique
deorsum ad angulum externum oculum in gyrum
voluat.

a Sextus [tab. 10. fig. 2. 3. 4. H. fig. 5. 1.] latere intern
super

ne latiusculo pradi-
tus sit, quo cornea adhaereat: in cuius medium nervus insigni-
crassusq; satis ingrediatur, qui nervus, si trahatur, oculum sursum verti & circū-
agi, imo & in sua sede immotum contineri & sisti. Cuius forte usus sit, ut eius ad-
xilio cœlum intueamur: Archan. existimat nasci, aut adhaerescere trasuersim si-
periori orbita, & in utrumq; latus oculi ad corneam exporrigi, & originē eius r-
tione dextri lateris, videri sinistram, & ratione sinistri, videri dextram: cuius
sus, ut quatuor rectis in subsidium veniat, siue seorsim, siue simul agant; hic, si-
periori oculum sursum trahenti opem fert, & potius ad superioris, quam inferioris
musculi actionem concurrat: hic etiam oculum sistit, ut situs docet, cōtractus ve-
sus suam originem, & vertit in gyrum aliorum motum adiuvans, & oculum cō-
net, ne sede excidat. Dein reprehēdit eos, qui ab oculo oriri, & in eum desinere v-
lunt: nam si omne, quod mouetur, aliquo quiescēte mouetur, & in motibus musc-
lorum, quiescente origine musculi mouentis, sequeretur eodem temporis articulo
culum & moueri & quiescere, hac Archan. Fall. in obser. inquit, quintum adde
Valuerdam, sed quid sibi velit, non intelligere (is Columbū imitatur) mox inquit
eum fortassis decepsse musculi huius obliquum, & fere lateralem inter alios sit
quod & Laurent. asserit. a Sextus Galeno & Vesalio: Quintus, Fall. Plat. Lau-
as Columbo & Archan. tertius palpebra musculus, verum hos obliquos inquit &

superiore parte sub rectis situs, partim rectus, partim obliquus est, & ab eodem loco oritur, unde is, qui oculum rectâ ad internum angulum trahit, iuxta latus foraminis visorii in orbitæ parte postrema, & tamen in homine, quam in brutis, ad anguli interni exteriorem fere marginem, in tendinem teretem & gracilem, & longissimum [tab. 20. fig. 1. & 2. a.] (quanto enim longior & robustior, cæteris vero gracilior est) desinit, quoad ^b cartilaginem exiguam canalis modo excavatam, quasi per trochleam Fallopio primo dictam, in maiori angulo sitam reflectitur & circumrolatur, & oblique procedens ad angulum rectum [tab. 20. fig. 1. & 2. b. at in 3. & 4. ab ossereuulsa,] versus oculi partem superiorem inter primum & quintum obliqua aliquantulum linea inferitur: at tendo ligamento ^b quodam per totum ductum, quasi vagina quadam obuoluitur. Hic dum intrô ad principium ahitur tendine suo, circulari quodam motu oculum ad angulum internum obuoluit. Hi duo circumagentes, ^c alter superior, alter inferior dicitur, circulares, amatorij: & sextum trochleæ musculum dominant.

Septimus musculus in brutis ^d datur [tab. 20. fig. 5.] sex enumeratis subiectus, qui solus figuram habet eam, quam priores sex efformare diximus: hic tenuis est, neruum ^e opticum [tab. 20. fig. 5. λ.] orbitalim, adipe tamen intercedente ambit, & in priorum porrectus dilatatur, totumq; oculi globum ad ra-

Aaa 2

dicem

quapend. nulum neque agnouisse, neq; descripsisse, quam Fallop. unde errēt illi qui obliquos oculorum motus à musculis rectis vicissim laxatis ac tēsis perfici velint. Quibus reprehendit Columbū, qui voluit, si omnes una subsequenti motu operentur, circularem motū effici, quod etiam à quatuor musculis brachialis fieri dicit: huius opinionis & Archan. fuit. Quod & Fall. sic reprehēdit, fieri inquit, ut ex refractis duob. vel pluribus motibus rectis, resultet circularis, cum in-

rectum & curuum nulla detur proportio. At Plat. sic, si duo recti utriusque lateris simul agant, obliquus quoque sit motus. ^b Cartilaginem vocant, & quidem trochleam, Fallop. Laurent. Aquapend. at Plat. dicit transuerso ligamento duro ab eo progressu continuari. ^c Circumversioni præcipue conducunt, attamen & sursum & deorsum oculum quodammodo agunt. Vesal. ^d Aquatilia, & inter ea lupiscis, sex tantum musculos habent, quorum duo obliqui decussatim se interseunt Aquapend. ^e Musculum meatum comprehendens, 4. loc. affect. 2. magnus à caradice, 10. v. part. 8.

dicem amplectitur, & circulum quoque efformat, eodem modo, quo quatuor primi ad iridem suis tendinibus circulum efficiebant, & in duram tunicam oculi carneus inseritur, qui in duos, ^f tres vel quatuor diuidi potest. Cuius usus & oculos brutorum (cum prona terram spectent) deorsum nutantes, & pondere suo propendentes, retinere, sursum trahere & firmare; & ne nervus ^h opticus mollis villo pacto in processu diuertatur, & distensione periclitetur, obuoluere. Quo musculo homo non indiguit, cum sapientissimus Opifex homini tanquam animalium diuinissimo, os sublime dederit, cœlumque videre iusserit: quod si interdum in terram inclinatus aliquid spectet, aut agat, muscoli recti omnes simul, si in officio sint, facile id præstant, cum membranæ oculi orbitam succingenti fibris connascentur.

Octauum, qui in bobus reperitur, Fallopius his addit, qui cartilaginofam illam membranam, quam Philosophus ⁱ *σέρμα ἐν τῇ καρτῇ* vocat, trahit, qua animalia bruta nictantur, cum metuunt, ne oculis aliquid incidat, & *συναρδανύττες* tunc à Philosopho dicuntur: nisi forte quis velit, partem esse illius, qui oculum ad exteriorem angulum trahit.

Quo vero muscoli hi recte conspiciantur, vbi cerebrum ablatum fuerit, orbita ad vtrumque angulum vsque ad neruum opticum, ferrâ dissecetur: cauendo tamen, ne in angulo interiore trochlea lædatur: mox pericranium ab ossē separandum, & orbitæ pars

^f Musculus circa oculi basin situs, siue quis unum dicat, siue duplicem, siue triplicem: siue etiā duos vel tres coalitos, Galen. dissect. muscul. s. 4. l. aff. 2. quibusdam Anatomicis triplex: aliis duplex, nonnullis simplex esse videtur: at una est omnium utilitas. 10. vs. p. 8. nullam in descriptione obstat, nisi fortassis una in inferiori sede: quare miror ab aliis duum: aliis trium loco enumeratum, cū hunc vix obiter descripserint. Vesal.

^g Ad firmandum oculum in motu tonico, cum pusillum aliquod corpus accurate & directe nobis inspicendum est, Galen. de dissect. muscul. s. h. Constringit ac muniat nervi illius mollis immersionem: oculum vero sursum attollens, & eleuans, ac nonnihil etiam simul connectens: facile enim rumperetur mollis ille nervus in vehementibus in caput lapsibus, violenter concussus, nisi undique stabiliretur. 10. vs. part. 8. & 4. loc. aff. 2. optico obducitur instar tegumenti, & oculum rectis motibus agit, prout has vel illas fibras contraxerit laxaueritue, Vesal. i. 2. hist. an. 12.

pars superior retrorsum trudenda, tum adeps auferenda, & muscoli, tam palpebræ, quam oculi cum vasis demonstrandi: & si voles cuiuslibet musculi proprium motum obseruare, musculis in suo situ existentibus, cuilibet non longe à tendine filum alligabis, & trahes. Potest etiam oculus integer ex sua orbita cum trochlea in interiore angulo sita, eximi & demonstrari.

DE VASIS OCVLORVM.

CAPVT XXXVII.

Quomoda venæ & arteriæ ad oculum ferantur cum retinâ, vide 10. vs. part. 2. De neruis vero egit lib. de dissectio. neru. 2. & 3. 10. vs. part. 12. vbi de modo visionis tractauit: cur optici vnum principium non habeant, & de eorum coitione, vide 10. vs. part. 14. 7. de plac. 4. & 5. lib. de oculis 3.

VAS A, quæ ad oculum mittuntur, sunt venæ^a & arteriæ, quibus nerui, cum etiam non secus, quâ la organa sint communia, adduntur. Venæ, quæ ad oculum feruntur, à iugularibus venis prodeunt, & sanguinem pro eorum nutritione deferunt.

Arteriæ vero à carotidibus pronascuntur, & ad usum caloris moderationem & vitam, vna cum neruis per musculos & adipem disperguntur, & per mēbranas^b distribuuntur [hoc ostendit tabul. 21. figur. 2. & h.]

Nerui duplices sunt optici & motorii, qui ex medulla cerebri in cranio adhuc existente, & spinâ^b constituyente prodeunt. ^c Opticus [tabula 20.

AAA 3

fig. 1.

principio, et s

ta antiquitas cum Galeno 7. Plac. 4. secus crediderit, Aquapend. c. Ad oculos λίσσα λειπ. venula tenuēs ad visionem ex cerebro per meningem tendunt: hæc venula humore purissimo de cerebro visionem alunt: in quo etiam rerum species in oculis apparent, eadem quoque vbi resiccata fuerint, visionem extinguunt, Hipp. loc. in hom. productiones à cerebro vocat Gal. 10. vs. part. 1.

fig. 1. & 3. K. fig. 5. λ. tab. 21. fig. 2. 4. 8. a.] qui ὁπλινός seu visorius vtrinque; vnus est: hi inter omnes sensorios nervos, maximi, crassissimi, mollissimi, ^d longissimi sunt raræque texturæ, vtraque meninge inuoluti [tab. 21. fig. 2. a. b. c.] Maximi & crassissimi, quo copiosissima sentiendi facultas ad oculos deferatur, & quo promptius lucē sentire, & multipliciter affici possint: mollissimi, ^e quo citissime afficiantur, cum sensorii sint nerui: sensus autem percipiendo & patiando perficiatur: imo cæteris omnibus ^f molliores, cum à luce tantum afficiantur, quam valde refractam recipiunt: longissimi, cum ab eorum exortu ad oculi orbitam via longa sit: raræ texturæ: quare perforatos Herophilus credidit, & Galenus ^g πορὺς & meatus visorios appellauit, & per hos non solum ^h facultatem sentientem, sed etiam spiritus animales, in quo facultas fundatur, transire: quo & copiosius & validius sentiant, per alios vero nervos omnes, virtutem solum vehi Galenus ^h voluit. Hi in exortu & fine distincti sunt, at vbi ad medium fere progressi sunt, supra ossis sphæroidis sellam, antequam caluaria excidant, dexter cum sinistro [tabul. 14. figur. 1. G G.] latiores redditi mutuo vniuntur, ita vt Græcorum χ. imitentur, non per adhaerentiam, aut intercussationem, vel quod alter alterum conscendat, sed per omnimodam vniionem, & medullæ confusionem ita iunguntur, vt alter ab altero separari non possit (raro enim in Anatome separati reperti fuere) [tabul. 14. fig. 1. H.] cuius coniunctionis ^k vsus partim, vt eandem planitiem pupillæ obseruet, ne ^l obiecta visibilia duplicia iuxta oculorum duplicitem appareant: partim, vt rerum visibilium ideæ vniantur, sicque facultas communis vtrinque fiat, spiritu visiuo ab vno oculo ad alterum momento ad visus certitudinem delato. Illud probat vnus oculi sursum vel deorsum compressio, vbi omnia

d 16. vs par. 3.
e 7. de Plac. 5.
f 7. de Plac. 4.
g 16. vs par. 3.
ex Herophilo
notat, hos in-
terius per v-
niversum du-
ctum perfora-
tos esse, cuius
meatus gra-
tia crassissimi
facti sint.

h 10. vs. part.
12. 7. de Plac. 5.
i Galen. 10. vs.
part. 12. 13 14.
vt illa coniū-
ctione meatus
communes fi-
ant: Aliis, vt
si vnus lada-
tur, alius sub-
ueniat: Alijs,
quia omnium
sensuum prin-
cipia ad vnū
principium re-
dire oporteat.
Sed hac ratio-
ne Natura in
auditus senso-
rio manca fu-
isset, cum talis
coniunctio ner-
uorum non
fuit.

k 10. vs part
14.

omnia gemina apparent: quare, quemadmodum oculos parallelos esse conuenit, sic & nervos, qui propter oculorum motum (præsertim, ybi vnus tantum musculus inferior aut superior mouetur, & oculus ad vnâ tantum partem voluitur) à plano declinare poterat, præsertim, cum musculi opticos cingant, illisque adhæreant: idcirco Natura merito illos coniungi voluit. Hoc vero, si manum inter oculos naso, secundum eius longitudinem, imposueris, ita ut ambobus oculis obiecta videre nequeas, oculo utroque obscurius videbis, quam si altero clauso obiectum inspexeris; nam posteriori modo facultas, quæ prius ad vtrumque mittebatur, in vnum iam commeet. Adde & tertiam coniunctionis vtilitatem, ut robustiores sint, propter viæ longitudinem, cum eos Natura membranosis nexibus non suffulciuerit. Mox rursus distincti, quilibet per proprium foramen, quod retro in oculi concavo efformatum est, caluaria excidit [*tab. 14. fig. 1. supra H.*] & dexter dextrum, sinister sinistram oculum adit, & in eum implantatur. Hi in homine in corneæ tunicæ centrum [*vide tabul. 21. fig. 2. 3. 4. 8.*] parte posteriore inseruntur, eo quod vni tantum homini rectâ prospicere datum sit; in brutis vero, velut boue & equo, quorum oculi ab invicem plurimum recedunt linea insigniter obliqua ad oculi ambitum perueniunt, & non in centrum desinunt: quo fit, ut brutorum lumina telluris latus vtrumque ad progressum tantummodo, & alimenta capienda spectare, apta creata sit. Et hi, ybi in oculos peruenere, ¹dilatantur, & instar membranæ singuli

10. v. part. 1. ubi addit, & in humorem crystallinum inferi.

humorem vitreum complectuntur. Horum vsus facultatem visiuam dignoscendi à cerebro deferre, quæ in oculis ad species visibilium contrahitur, ybi in oculi membranas nervus expanditur: si enim nervus hic obstruatur, ut in eo affectu sit, quem Gut-

tam serenam Arabes vocant, videndi actio omnino perit.

Motorius vtrinque; vnus, qui ad muscūlum quemlibet pro motu neruūlum mittit [*tabul. 20. fig. 3. & 4. hoc ostenditur*] quemadmodum musculorum principium à neruo diligenter separanti occurrunt, & in membranas diffunditur. Hi, dexter nimirum, cum sinistro in exortu, continui sunt, vnde fit, quod vno

*m Cur simul
moueantur o-
culi ambo, cū
muscūlos di-
strictos habe-
ant, quarit A-
ristot. 31. prob.
Respondet, qd,
qui vnicū mo-
tus principii
fit, & eadem
origo in opti-
corum coitu.
Verū hic coi-
tus ad motum
nihil facit, sed
solum ad sen-
sum: quare
prodest, ne v-
nū vñs du-
plex appare-
at.*

*n 10. vs. part.
13.*

oculo moto, alter simul moueatur, ^m cum ex anteriore parte spinalis medullæ simul tanquam in puncto cōiuncti prodeant, quo idem obiectum eademque lux, eodemque modo in oculum vtrinque eodem tempore ingrediatur, quo vnus fiat sensus, & vna dignotio, quod ad sensus perfectionem facit, ne quod vnum & simplex est, duplex appareat: quod fieret, si alter sursum, alter deorsum ferri posset. Hoc verum esse, facile disces, si digito alterutrum oculum vel deprimas, vel attollas: Sic enim omnia obiecta duplicia, alterum altius, alterum depressius apparebunt: Si vero oculum in latus moueas, cum pupillæ in eadem sint linea, obiectum duplex non videbitur: quare Galenus ⁿ visiorum conorum axes in vno & eodem plano locari debere, ne quod vnum est, duplex appareat, scribit: hinc in musculorum oculi paralyfi & conuulsione, sæpe obiecta gemina obuersantur, quia oculi ab vna superficie recedunt: Sic optici conuulsis vel relaxatis, cum pupilla in eadem linea non sit, res geminæ apparent; atque hanc ob causam etiam ebriis id aliquando accidit.

Ab hisce instrumentis, venis, arteriis & neruis ad oculum spiritus copiosi feruntur, naturales, vitales & animales, qui visui proprie hinc dicuntur: quare pro copia spirituum in oculis contentorum, oculorum magnitudo variat, variat & splendor; hinc iam morituris parui, languidi & obscuri apparent;

& ij,

& ij, qui Veneri nimium indulgent, minores habent.

Sic videmus oculos viuentis tenfos & plenos, mortui vero, minores, laxos, & rugosos: spirituum enim presentia & absentia oculum viuentem a mortuo distinguit, & pro varia eius dispositione, varias animi affectiones solo aspectu diiudicamus: quo sane argumento etiam spiritus in corpore esse, ad sensum probare possumus: quemadmodum & hoc argumento, quod oculo altero clauso, si alterius oculi pupilla (vt Galenus^o docet) inspiciatur, momento dilatari conspicietur, quia spiritus copiosior per tunicam, reticularem dictam, in vucam illabitur, ipsiusque foramen, pupillam dictam dilatat; & denique, quod oculi interdum obscuri & languidi, interdum splendidi & alacres conspiciuntur. At ne spiritus sua tenuitate penetrando exhalent, membrana crassa, densa, & maxime robusta, Cornea dicta impedit.

o 10. vs. part.

DE MEMBRANIS^a OCULORUM.

CAPVT XXXVIII.

De his Hippoc. lib. de carnibus, & de locis in homine; Galen. 10. vs. part. 2. 3. 4. 6. lib. de oculis, lib. de Anat. viutor. cap. de oculis.

^a Alij membranas, alij tunicas vocant, Cicero pellisculas, Hippoc. δερματεις, X^{ta} τῶν αὐτῶν libr. de carn. μὲν βιν, αὐτῶν libr. de locis vocat.

OCULORVM musculis & vasis explicatis & re-
motis, nunc occurrit oculus, globi modo rotundus [tabul. 20. figur. 3. & 4. tabul. 21. figur. 2. & 3.]
qui & mundo & ouo conferri potest, & quoad figuram, & quoad constructionem: Ouo quidem, um membranis, putamine, quoad membrana in-
lurata est, & tenui membrana subiecta, ac humo-
ibus albo & luteo constet: Sic & oculi globus

Aaa 5 & mem-

& membranis & humoribus donatur: membranis quidem, cum naturæ sit aqueæ, vt sua sede contineatur, & humores ambiant, debuit corpore aliquo solidiore constare: quamuis etiam & visionem non parum iuuent: humores vero visus gratia obtinuit.

b *Duas tantum Hippocratem numerasse, araneam & retinam omissa, introduct. auctor refert. Tres agnouit Hippocrat. de locis in homine, crassiorem supernam, mediam tenuiorem, & tertiam tenuem, quæ humorem conseruat. At libro de carnibus, multa sunt, ait, tunica, quæ oculi pellucido prætenduntur.*

Quatuor Graecis, vt pluri-

um, vt Ruffo, cornea Rhagoides, aranea, seu vitrea, & crystallina. Quinq; Sylluio, Fallop. cornea, adnata, vnea, retiformis, aranea. Archangel. adnata, innominata, cornea, vnea, aranea. Sex Vesal. aranea, retina, vnea, ciliaris, dura, adhærens: Columb. adnata, innominata, cornea, vnea, retina, aranea: Plat. adnata ex muscutorum tenuitatibus, cornea, vnea, crystalloides, hyaloides, retina. Laurentio, coniunctiua, cornea, vnea, aranea, reticularis vitrea. Septem Galeno 10. vs. partium 7. Arabibus: Sic Fuchsius & Aquapendenti, cornea, sclerotica, coniunctiua, vnea, choroides, retina, aranea. c Galeno septima, 10. vs. part. 2. Senta, Vesal. tertia Aquapendenti, prima Columbo, Plat. Archang Laurentio.

d Galen. 4. comp. medic. secund. loca 2.

e 10. vs. part. 2. f Aperiostio Galen. 10. vs. part. 2. at Aquapend. à periostio & tendinibus muscutorum oculi enascitur.

Membranarum ^b numerus apud Auctores varius est: at duplices facimus, alias toti oculo communes, alias humoribus proprias: communes, corneam & vneam: proprias, crystallinam & vitream. Verum cum communiter septem recenseantur, Adnata, Cornea, Dura, Vnea, Choroides, Aranea & Retina; aliis adhuc innominatam, & Vitream addētibus, has omnes Anatomico ordine recensebimus.

Prima est Adnata, ^c quasi circa oculum nata, ^{ὀφθαλμοειδὲς} ^d dicta, quod aliis membranis oculum constituentibus foris adhæreat; quare & adhærens, quasi ascititia. Hæc extima est, & cum corneæ parte pellucida ante dissectionem ^e primo se offert, ipsius corneæ parti albæ incumbens, quæ à pericranio ^f enascitur, ossi semper proxima, præterquam, vbi palpebram producit: ad eam enim, vbi peruenit, veluti angulum faciens duplicatur, & altera pars palpebram succingit: altera [*tabul. 19. fig. 6. 7. 8. V.*] hanc adnatam constituit, & anteriore tantum parte, vbi oculi album apparet, & tenuior reddita est, ipsum tegit, in

maio-

maiores circulum definit, & cum cornea continuatur [*tab. 19. fig. 7. & 8. V. & tab. 21. fig. 1. d.*] Alba dicitur à colore, quem & possidet, qui talis apparet, quia musculorum tendines subiecti, eam albedinem representant. Et Hippocrates ^h λευκός, album oculi vocavit; lævis est. Huius interuentu oculus orbitæ, & interioribus ossibus adhærescit, & veluti ligamentum ad circumposita ossa existit: hinc vulgo coniunctiua, à coniungēdo, dicta, quod omnes oculi membranas simul iungat, quo oculus firmior reddatur; vel potius, ⁱ quia ad iridem cæteris membranis iungatur: Sic & oculum palpebris & capiti iungit, ^k & vt summam dicam, oculum, ne ossium duritie lædatur, tuetur, cum ossibus, cum palpebris, cum cæteris tunicis coniungit & stabilit, ita vt oculus in sua orbita detineatur, ne in violentis motibus excidat, & libere moueatur, & simul musculos ^c oculum mouētes operit, & propriis sedibus firmat. Sed cum ligamenti munere defungatur magis, quam membrana, verius ligamentum esse arbitramur. Hæc venulis *tab. 19. fig. 6. 7. 8. e.* & arterioliis quamplurimis confecta, quæ communiter in recte habentibus non apparent, nonnunquam admodum rubent, & cum copiosiore sanguine turgent, maxime conspicuæ fiunt, vt in ophthalmia, nam, vt habet Hippocrates ^f ali- quando album hoc rubescit, aut liuescit, aut nigris venis refertum est, & nihil probi præ se fert. Hæc sensum tactus oculo communicat, cum nec extrinsecus nec intrinsecus sentiat, & palpebrarum dolor tantum huius tunicae causa illum molestat.

Secunda ^l est innominata dicta quibusdam, quasi hæcenus fuerit incognita, cum tamē ^m Galeno fue-

rit no-

^g Vesal. Col. quamuis non ita remota, vt apparet, alba sit, Aquapen. ^h In Coacus. pran. aph. 218.

ⁱ Theophyl. li. bro 4. cap. 10. at Galen. de oculis 2. & 4. quia alias tunicas intra se iungat.

^k Alexan. Benedicte funda dicitur, vel quod nō in totum orbiculata sit, instar funda, qua lapides inciduntur, vel quod venulis & arterioliis constans funda similitudinem præ se ferat, Laurent.

^l Galeno sexta Columb Plat. Archang. secunda.

^m 10. vs part. 8. musculi, ait,

acervati suis aponeurosisbus circulum unum efficiunt lati tendinis in iridem desinentis, & 10. vs part. 2. ad circulum sexta quadam tunica extrinsecus prope accedit, in duram tunicam inserta, in qua musculorum oculos mouentur sunt & πρὸς τὸν

rit nota, quæ à musculorum nerueis tendinibus enascitur, & propè iridem sub adnatâ terminatur: hique illius candorem impensius augere videntur, cum lucido quodam candore præditi sint: at cum nihil aliud sit, quam musculorum *δορυεὺς*, membrana neutiquam dicenda videtur, sed musculorum pars, quæ cum iis quoque demonstranda venit: si quis tamen membranam velit, huius vsum dicemus esse, vt huius interuentu, musculorum in corneâ commoda insertio fiat [tab. 20. fig. 5. apparet.]

n Hipp. prima
superna *πρὸς*
τιπν, crassior,
lib. de locis in
homine: pri-
ma, qua cor-
nea Fallop. 2.
Lauren. 3. Co-
lum. Archan.
at Plat. tertia
pars cornea di-
sta, 5. Galg. 6.
& dura Vesal.
dura & ner-
uosa tunica 1.
mot. musc. 3.
exterioris tu-
nica pars an-
terior cornea,
Fallop. adnata
& à colore al-
ba, qua ad me-
diū oculi cor-
nea redditur,
Varolo. At
Fuchsius pars
anterior cor-

Tertiaⁿ cornea dicta, quæ & ratione substantiæ, & ratione exortus crassa & dura dicitur, quod à dura cerebri meninge, visorium neruum inuestiente producat. Hic admiranda est, Opificis sapientia, ° qui cum nusquam alibi à quouis neruo, meninges, quæ cum eis producuntur, separasset, sed vt nutrirentur, simul & operirentur, cum eis deduxisset, hic duntaxat, vbi neruum in oculum inseruit, ytrasque ab ipso seiungens, crassas ac duras, imo duriores, quam quæ cerebrum complectuntur, effecit. Vbi enim oculo parte posteriore applantatur [tab. 21. fig. 3. c.] dilatatur, & orbicularem membranam constituit [tab. 21. fig. 2. & 3 ostendit] quæ totum oculum ambit, quamuis nō passim sibi similis sit, neque simplici nomine donetur: pars enim anterior diaphanes est, pars vero posterior opaca. Quare sunt, qui Arabes imitati, ex hac duas fecere. Nam cum visio transparentia indigeat, membrana hæc, vbi ad oculi medium antèius accessit, è directo crystallini humoris adeo cōdensatur, vt in corneam substantiam degeneret, quæ pars anterior [tab. 21. fig. 1. c m.] *κερατοειδής*, P cornicularis, seu

cor-

nea pro 5. & posterior pro sexta recensetur, & Aquapend pro prima & secunda. ° 10. v. part. 2. p Græcorum pleriq, uniuersam tunicam sic videntur appellasse, Vesal. at Fall. in obser sibi persuadere non potest, hanc durioris partem esse, cum nō solum substantiâ, sed etiam crassitie & figurâ à dura meninge differat, quia hac per
so so-

corniformis dicitur, quod in medio usque ad iridem cornu laternarum attenuato denso & expolito sit similis, non solum pelluciditate, quo lumen recipiat, sed etiam substantia, cum in plures laminas diuidi, radique possit, estque tam intus, quam foris ab omni connexu libera. Rotunda est, circularis, dura, densa, tenuis, tensa, diaphanes, splendens, perpolita & leuis. Rotunda quidem & circularis in homine, (in bobus & oualis potius figuræ) in oculi medio protuberans, non solum, ut lesioni minus sit obnoxia, sed eam maxime ob causam, ut oculus maiora se videat, hoc est, rerum maximarum ideas & species, & quidem integeras percipiat, & lux ingrediens impensius vniatur, angustior & tenuior reddatur, & per pupillam ad crystallinum ferantur. Hoc rotunditatis & extuberantiæ beneficio fieri, speculo demonstratur, nam speculorum fragmenta oblonga insipientes faciem, integram non videmus, quia figura plana est, & in plano lucis radii perpendiculares non vniuntur, in rotundo vero in vnum punctum concurrunt; Per pyramidem enim fieri visionem, docuit Galen. quare in quouis minimo speculi tuberculo totam faciem conspiciamus: Hinc liquet, quod si hæc pars alterius figuræ, quam circularis esset, quod rerum maximarum simulacra ad oculum vno aspectu peruenire non possent. Dura, ^f quo tum seipsam, tum humorem crystallinum tueatur, ne externis ^t iniuriis obnoxia sit, neue leuissimis occursibus cedat. Densa, non solum ut duritiei ad resistendum auxilio sit, sed etiam ad humoris, tam aquei, quam vitrei conseruationem, ne oras exsudent; & ne spiritus sua tenuitate penetrando, exhalent: quare in viuente animali ex spirituum bundantia plurimum tenditur, parte potissimum anteriore, ac nitet; in mortuo vero, spiritu extincto, lico flaccescit & corrugatur; quare visio spiritibus

se sola, quasi sphericam aliam cavitatem constituit, extra dura superficiem. & veluti nonum tuberculum, ita ut ob humorem albugineum tantum facta videatur. ^q Ab vno angulo ad alterum latior est, non tamen exacte oualis: in piscibus vero cornu amulatur, Aquapen.

t 10. vsp. 12.

^f In gamma-
ris & piscibus,
& in, qui pal-
petra carent,
ita duri, ut ex
acte cornu la-
ternarum, ri-
giditate quoque
pra se ferat.
Aquapen.

t 10. vsp. 6.

extra

TABVLA XXI. Fig. 1. Oculi membranas & humores ad veri oculi imitationem per lineas ductas exprimit: fig. 2. Corneam tunicam cum nerui optici portione: fig. 3. Eandem sectione transuersa diuisam: fig. 4. Vueam cum portione nerui optici: fig. 5. Vueam humani ostendit: fig. 6. Corneam, vueam & choroidem: fig. 7. Vueæ interiorẽ superficiem: fig. 8. Corneæ posteriorem partẽ, cum retina dicta ab oculo separatam. fig. 9. Hyaloidem tunicam: fig. 10. Humores tres simul iunctos proponit: fig. 11. ChrySTALLINI humoris anteriorem sedem: fig. 12. Eundem sua tunica tectum: fig. 13. Eundem nudum à latere positum: fig. 14. Crystallinam humanam: fig. 15. Eius tunicam: fig. 16. Aqueum, crystallino superfusam: fig. 17. Ciliares processus per hyaloidis tunice anteriora radiatim sparsos: fig. 18. Vitrei humoris anteriorem sedem: fig. 19. Aquei humoris sedem fig. 20. Vitreum crystallinum continentem adumbrat.



extra oculum fluentibus fieri non potest: cum oculi viuentis tensio non aliunde proueniat, quam à spiritu multa copia incluso. Et licet prima P sit omnium oculi partium, quæ iniuriis omnibus exposita sit, frigoris & æstus & incidentium & contudentium incurfus excipiat, munita tamen est palpebris, ciliis, ossibus atque cute. Idcirco etiam non simplex est, sed quasi ex pluribus corticib. seu quatuor laminis composita (hinc Auicenna quadruplicem fecit) quibus

u Lib. 1. cap. 5.

x Hanc una

eū reliqua se-

necta serpētes

quotannis ab-

iciunt. & tūc

putarunt an-

ziqui, serpētes

eo tempore de-

terius videre,

sed Aristot. re-

prehendit, at

probabile esse

duco. Aquap.

y 10. v. par. 3.

Ruffus u vult, epidermida x superincumbere, quæ cæteris laminis longe tenuior sit, vt si forte vna erodatur, cæteræ ad crystallini tutelam adsint. Tenuissima, (crassior enim existēs propugnaculum y quidem esse poterat, at tenebras perpetuas offunderet, lucisque transitum impediret) vt splendores, & lucem libere y ac sine mora transmittat, quo humor crystallinus sensibilia propria sentiat: quare & diaphana, clara & splendoris, y quia talis ad splendorem transmittendum oportuna erat, non secus ac cornua accuratissime derafa & extenuata. Tensa etiam esse debuit; Corrugata enim inæqualisque reddita debitam extuberantiam & æqualitatem & diaphanum amitteret, sicque visus labefactaretur, quod in senibus videmus: in quibus interdum adeo rugosa fit, vt alii nihil prorsus, alii vero male, aut vix adhuc videant; incidentibus enim z aliis super alios rugis, & tunica ob eam causam duplicata, & crassitiem acquisititiam asfumentē, quod ob imbecillitatem senectæ fit, & ob spiritus ad pupillam affluētis inopiam, vbi etiam pupilla angustatur. Diaphana, vt visibilibus formis peruiā sit, & lucem immittat; sed hæc membrana luciditas à luciditate aeris diuersa est, vt inde lucis refractione sequatur: quomodo autem lux progrediatur, & ipsius fiat refractione, cum ad opticos potius, quam Anatomicos, pertineat, qui volet, Opticos scriptores potissi-

z Aquapend.

potissimum Vitellium & Alharen consulat, & etiam Aquapendentem Anatomicum, qui eleganter hæc libr. de oculo tractauit. Perpolita & leuis, vt in eâ species rerum refulgeant, & omnimode recipiantur, & species externis confimiles crystallino repræsententur. Aspera enim, si foret, & eminentias & cavitates haberet, lux non æqualiter offerretur: vbi enim cavitates facilius & clarius, vbi eminētia difficilior & obscurius species permeant; & hæc asperitas palpebræ molesta esset, vt fieri solet, quando inter vtramque aliquid incidit. At cum densa sit, dura ac tenuis, in se ipsam nec venas. imo nec arterias, nec neruos recipere potuit, nec debuit; hæc enim visioni obessent, & aduersus externas offensiones crystallinū tueri quidem potuisset: Eandem tamen sua duritie nihilominus molestasset: & tertio visoriam facultatem oculis superne immissam, imo splendorem discuteret. Nam à splendida & vehementi luce oculos offendi, quilibet in se experiri potest, quod & Xenophontis a milites testantur, quorum oculi, cum per multam niuem iter fecissent, valde læsi fuere. Sic qui ophthalmiā laborant, luce quidem offenduntur, fusca vero ac cærulea sine dolore intuentur. Hinc fit, quod qui luce clara à longinquo quippiam percipere volunt, aut manus supra oculos ad ipsa supercilia obtēdunt, aut aliud quippiam, quod manibus tum maius, tum densius est. b Sic constat aliquos, qui fixis oculis Solem ipsum propter ecclipses imprudentes intuiti sunt, prorsus fuisse occæcatos. Fit hoc eo modo, quod ellychnium vel candela ardens, sub Sole luculento constituta, quæ protinus extinguitur: Sic, si cādelam accensam prope flammam magnam posueris, repente extinguetur: quia minor lux à maiore vincitur & dissipatur. Sic ergo in oculo c non solus crystallini splendor, sed cum eo etiam vitrei dissipatur. Quare

a Dionys. Sicilia tyrannus domum suā p. carcerem cōstruxit clarissimā ac longa splendidissimā calce illitam: in quam domum postquā diutissime carcerem infuso fuissent conclusi, vinētis sursum educebat, qui ex multā ac profundā caligine in splendidam lucem egressi, lucem quidem erant cupide intuituri, intuiti vero occæcabantur, lucis splendida occursum repetitum ac confertum non ferentes.

b In magnis Solu ecclipsib. stella ob eandē causam nobis apparēt: quod ēt suis temporib. accidisse Thucydides refert: sed ex parte non profunda stella tur sed conspicuntur, similiter potissimū, quā de Sol non est in meridie. ne aug.

Bbb

his c 10. v. par. 3. vide Sic.

x. 71. f. 2

his prudentissimus Opifex ^c providens choroidem tunicam interposuit, quæ multis partibus tum nigra, tum fusca, in bobus etiam cærulea effecta est, quæ corneam sibi vicinam, quâ parte eam contingit, alit, & ne humori crystallino incidat, prohibet (quamvis illud sua rotunditate & extuberantia etiam præstare possit) & ratione sui coloris nigri, & in bobus cærulei, visui affecto spectaculum ^c medicamentosum est: & hæc causa est, quod omnes Naturâ duce cum lucis splendore offendimur, palpebras repente claudimus, ad remedium naturale properantes. Ostendi hoc potest exemplo Pictorum, qui cum in albis coriis pingunt, eorum visus facile offenditur, si remedio destituantur; quare colores cæruleos ac fuscis apponunt, in quos subinde intuentes, oculos recreant ac reficiunt. Latior etiam est cornea, ipsa vicia, quo ex longinquo etiam res maximas videamus, quamvis indistincta hæc visio sit, quo noxia fugere queamus.

*d Sexta Fuch-
sio; exterioris
tunica pars po-
sterior, Fallop.
secunda Aqua-
pend. qui sclero-
ticiâ nomi-
nat: tertia
pars dura di-
cta, Plat.*

Posterior ^d vero huius tunica pars, oculi posteriori-
rem sedem, & totam anteriorem vsque ad circulum
[tab. 19. fig. 7. & 8. f.] constituens, dura est, crassa, opaca
(sicuti album oui coctum à crudo, ita ab hac corneâ
colore differt) dura est & tesa ratione exortus, quam-
vis neque nervi tunicam exteriorem tenuitate, aut
crassam cerebri membranam, à qua illa oritur, crassi-
tie æmuletur, cum quadruplo fere crassior sit; nam,
ubi oculi tunicam efformat, incrassatur & obdura-
tur, cum summe dura & crassissima esse ^c debuerit,
firmitatis & roboris gratia, eum totius oculi globum
& cauitatem pro humoribus continendis efformare
debuerit (huiusque beneficio oculi figura rotunda
& efficitur & conseruatur; integra etiam facta; so-
la enim totum oculum cingit, ne quid ex eo effluat,) & muscutorum omnium insertiones excipere, eo-
run-

*e In lucio pisce
cartilagineâ
substantiam
æmulatur, cū
palpebris ca-
reat, Aquap.*

rundem, vt & adipis pondus sustinere, quo humorum contentorum naturalis figura conseruetur, & venarum & arteriarum [tab. 21. fig. 3. hh.] quasi basis sit, quæ prope neruum post vitreum humorem huic membranæ applicantur; postea antèrius porriguntur, donec per choroidem distribuuntur. Horum vasorum f'ope, quemadmodum & exiguis nexibus, veluti ligamenti membrana hæc choroidi ita adhæret, vt sibi inuicem alligentur [tab. 11. fig. 3. hi.] cuius connexus utilitas, ne forte hæc tunica sola aliis oculi partibus immotis moueatur: quemadmodum & videmus linteum pilæ perpolitæ obuolutum moueri. Crassa & opaca, quo species receptæ multo clarius e-luceant; vt in speculo fieri videmus, si corpus densius à parte posteriore sit adpositum, imagines intuentes videmus, non autem, si corpus densius seu plû-bum remoueatur. Hanc partem cãdidam^h cum parte anteriore, neque naturâ, neque colore similem asserunt, quare recentiorum aliquiⁱ à priore distinxerunt, & hanc corneæ suis terminis continuari asserunt, quæ sub adnatâ, & tendinibus musculorum sita est, & à durâ membranâ neruum cingente, generatur; cum ea enim cõtinua est (vt patebit ei, qui acutissimo cultro nerui tunicam per longitudinem separarit, vsque dum ad hanc membranam peruenerit) quare σκληρότης καὶ σκληριότης dicitur, Ruffo candida, etsi communiter candidæ seu albæ nomen Adnatæ tribuatur. Huius beneficio oculus sistitur & sequens membrana, quæ ad subiectam quidem tunicam satis virium habeat, non vero seipsam, defenditur, & humores secundum debitam dispositionem continentur, ipseque crystallinus ab ambientis aeris frigore & æstu conseruatur.

f Vesal. & Aquap. at Plas. fibræ multis, quas venulas esse putarunt, cum tamē vena nulla oculum iubeant.
g Sic & Aquap. penâ.

h Fallop. obser. vident.
i Fuchsius & Aquap. cum Arabibus.

DE MEMBRANA VVEA, SEV
Choroide, Pupilla, Iride & Ligamen-
to ciliari.

CAPVT XXXIX.

De hac egit Galenus 10. vs. part. 2. 3. 4. & 6.

à Hac secunda
est Hippoc. &
media λεπτο-
τέρη, tenuior:
sertia Vesal.
Fall. Lauren.
quarta Gale.
10. vs. part. 2.
Col. Plat. Ar-
chan. Aqua-
pend.

b 1. mot. mu-
scul. 3. 10. vs. p.
4. & 5. unifor-
mem verte-
runt.

c Theophil. li-
bro 4. cap. 19.
vua acino co-
lore assimila-
uit Herophyl,
acinalis & v-
nealis Ruffo
lib. 2. ca. 3. vel
quod ita per-
forata sit, uti
vua acinus,
vbi pediculus
seu capulus ad-
emptus fuerit,
Vesal. Col. A-
quapen.

d Vesal. Fall.

Laurent. at Plat. cornea conuascitur, reliqua vero sede tantum fibris coharat, quas
venulas esse putarunt.

VVEA, ^a membranarum quarta est, quæ ἡγε-
μένη ^b & ῥαχή Græcis dicitur, quod vuae acini co-
rio colore similis sit: vel ῥαχὶ σαφουλής, acino vuae, ^c cū
quo externâ leuitate, & internâ asperitate confertur:
nam exterius, qua corneam respicit leuis, interius ve-
ro, qua crystallinum spectat, aspera seu potius inæ-
qualis, propter venarum & arteriarū furculos à cor-
nea in hanc pertingentes [tabul. 21. fig. 3. & 4. 11.] vel
quod ratione nigredinis acino assimiletur, cum co-
lore ^c atro sit, imo rectius, si vuae acino comparemus,
à quo pedunculus auulsus sit, cum humorem albu-
gineum, quemadmodum vuae acinus succum simi-
lem, contineat.

Membrana est inter corneam & retinam dictam
sita, quæ huic posteriore parte solum accumbit, an-
terius vero inter corneam & araneam, & humorem
aqueum [tab. 21. fig. 1. c.] complectitur. Connectitur,
posterius quidem neruo optico, retinæ; corneæ ve-
ro venarum ^d & arteriarum furculis [tab. 21. fig. 3.] &
ad iridem fibrosis nexibus, sed non admodum vali-
dis, adhæret: anterius vero vndiq; libera est, quo con-
trahi & dilatari possit. Figura, non vt prior, exactum
globum refert (cum non totum oculum cingat) sed
anteriore parte [tab. 21. fig. 4. m. m. fig. 7. ad n.] intror-
sum non nihil comprimitur, vbi foramine rotundo
peruia est.

Ortum

Ortum ducit à tenui^e meninge [*tab. 21. fig. 1. f. fig. 4. & 5.*] nam vbi tenuis meninx neruum opticum inuestiit [*tab. 21. fig. 2. b.*] mox sub cornea dilatatur, vt hanc membranam cōstituat, anteriora petit, totumque oculum, anteriore parte exceptâ, cingit, vbi ad oculi circulum maiorem, seu iridem, corneæ continuatur, & versus posteriorem partem reflexa replicatur, in^f medio perforatur, quod foramen vueæ, & etiam Pupilla dicitur. Differt autem à tenui meninge, crassitie, quod ea lōge sit crassior, potissimum parte anteriore, vbi duplo posteriore crassior est: de in colore, cum nerui tunica alba sit, hæc vero oculum cingens, vtraque facie nigra est; & cum à tenui meninge producat^r etiam ἡ χοροειδὴς dicitur: maxime vero, quia per hanc vasa plurima sparguntur, & quod instar χορίε quamplurima vasa inter se velut colliget; quod in bobus optime conspicitur, in quibus per oculi longitudinem conuenienti interuallo discurrunt, à quibus veluti, filamenta totam choroidem intertextunt, quo modo per tenuem meningem etiam in cerebro distribuuntur; & ab hac in retinam dictam ramusculi producantur, quod tum, quando Vuea ab ea separatur, conspicuum fit.

Hæc venosa^h est, mollis, nigra ac pertusa: Venosa, quo corneam nutriat; mollis, ne contactu suo crystallinum lædat, & ad pupillæ motum apta sit, ad quæ rigida inepta fuisset; nigra, vel potius fusca, vt splendorem colligat, atque ad pupillam transmittat; pertusa^h è directo humoris crystallini, quo species visibilium corneam & aqueum humorem permeantes, tandem ad crystallinum perueniant. Et licet humida sit, ac mollisⁱ & crystallino vicina, ipsa tamē innoxia, extrinsecus vero dēsa est: quemadmodum enim crystalli-

Bbb 3

stalli-

c 10. vs. par. 2.
Vesal. Colum.
Fall. Plat. Archang. Laur. à
choroide nascitur à chry-
stallini circū-
ferentiâ, ad an-
teriores partes
proratâ cho-
roide, estq; du-
plo choroide
crassior, Aqu.
f Sic & Col.
retrosum in
illius rotundi-
tatem pressa,
Plat.
g 10. vs. par. 2.
& ex eo Aqua
pen. venarum
& arteriarum
surculi plures
in vueâ, Ve-
sal. Venas &
arterias oculi
sustinet, Fal-
lop. vasa fere
omnia tuni-
carum sufful-
cit, Lauren. fi-
bra multe,
quas venulas
esse putarunt,
cum tamē ve-
na nullibi o-
culum subeât,
Plat. venis &
arteriis pluri-
mis scatet v-
uea, Archang-
gel.

^h 10. vs. part. 6. ut quem splendorem transmisit, foras emittat. ⁱ Instar spongia dicit Galenus.

k Nulla alia
 tunica est in-
 ter corneam
 & crystallinū
 media, Galen.
 10. vs part. 4.
 l ὕψον χερσὶν
 οἷον ἐν τοῖς
 ὀφθαλμοῖς Gal.
 10. vs part. 4.
 m 10. vs part.

stallinus ab hac offendi non debet, sic nec ipsa à cor-
 nea affici; inter corneæ enim partem diaphanam &
 crystallinum ponitur, neutram tamen partem attingit.
 Sic, ne cristallinus à cornea per foramen hoc v-
 ueæ tangatur^k & lædatur, cum veluti per tenue ad-
 modum & album cornu, splendor internus cum ex-
 terno communicet ac cōmisceatur, non solum hanc
 corneæ portionem foras longius abduxit, sed etiam
 humorem quendam tenuem ac syncerum, qualis in
 ouis reperitur, crystallino circumfudit, ac tertio spi-
 ritu aereo & splendido omnem pupillæ locum op-
 pleuit. Quod autem locus hic humiditatem^m tenu-
 em contineat, & spiritu plenus sit, ex eo probatur,
 quod in viuus oculum vehementer tensum, & vndi-
 que plenum videmus, & nullam corneæ partem la-
 xam & corrugatam: at si mortui inspexeris, etiam an-
 te dissectionem rugosam comperies; & vbi corneam
 dissecueris, statim humor tenuis occurrit, qui etiam
 in compunctionibus per vulnus effluere solet: & sta-
 tim totus oculus rugosus contractus ac latus fit: & si
 tunicas à crystallino deductas distenderis, interual-
 lum maximum vacuum apparebit; hinc patet ani-
 mali viuenti tunicas distētas fuisse, aut à spiritu quo-
 dam, aut humore, aut vtroque. Imo si oculorum al-
 ter claudatur, alterius aperte pupilla amplificata ac
 dilatata, & veluti inflata conspicitur. Pupillam autem
 spiritu impletam amplificari, aperto vero contrahi
 docet Galenus, quo etiam argumento spiritum ani-
 malem dari, probare vult. Hoc autem fieri, quod to-
 tus spiritus ad oculum apertum feratur, qui alias, v-
 troque aperto, in vtrumque diuideretur. Sed disse-
 ctione quoque probat Galenus, si inquit, Vucam ab
 internis inflaris, foramen diduci cernes. Quare spa-
 tium^m omne quod est ante humorem crystallinum
 spiritu & humore tenui simul repletur, & quidem in
 cate-

ceteris partibus humore, in ipsa vero pupilla spiritu plurimo.

Pupilla Græcis κορη ⁿ visio [tab. 21. figur. 4. 5. 6. 7. n.] ⁿ Hippocrat. de carnibus, Galen 10. vs. part. 4. οὐκ ἔστιν αὐτῇ, pupillam in oculo interdū minime rotundam apparet: sic, inquit, ipsius visus humor purū, cruentus aliquis humor incidit huic pupilla intus in oculo minime rotunda ob eam causam apparet, quod in cruentum illud visionem non recipit: hincque quod cernitur, rotundum esse desinit. Aristoteli 1 hist. anim. 9. humor oculi interior, quo videmus pupilla κορη est

Est autem pupilla in homine p & aliis quibusdam animalibus, vt canibus q rotunda: in nonnullis brutis, vt bobus, ouibus, capris oblongæ rimæ speciem, & quasi circulum in medio compressum refert, & ferè ovalis est: & ratione motus, qui vel ab animali spiritu, vel à luce prodit, dilatatur & contrahitur, ita vt modo figuram rotundam seruet, modo aliam suscipiat, vt in cato, q in quo rimam angustatam contrahit.

Dilatationem & coarctationem pupillæ, spiritui animali Galenus adscripsit; at Aquæpenden-

Bbb 4

tis

(intelligit crystallinum) quod eam ambit, nigrum dicitur, quod nigrum circumdat candidum.

o Licet nigra appareat, tamen nec ipsa, nec quicquam quod ei subest, atrum est, sed pellucens atque perspicuum, Colum. quia oculi camera intrinsecus nigra, qua hic tantum videtur, & eiusmodi colorem repræsentat, Plat.

p Aristot. 3. hist. anim. 18. pupillas omnibus animantibus easdem esse voluit; & Plin. lib. 7. cap. 2. meminit pupilla duplicis in singulis oculis.

q Configuram in lucio pisce refert, Aquæpend.

tis sententia vueæ foramen pro lucis vehementis aut debilis accessu ac recessu dilatari aut constringi; in maiore luce eam contrahi ad crySTALLINI tutelam, cum is sæpenumero à luce valde offendatur: in minori, dilatari ad meliorem visionem, ad pleraque visilia videnda, quæ alioqui non apparerent (quod notandum iis, qui eos inspicere volunt, qui de oculorum affectu & diminuta visione conquerruntur, vt id loco potius obscuro, quam lucido faciant) sic nec valentior offendit, cum copia minor ad crySTALLINUM feratur: nec debilior eum mouet, cum maiori copiâ intus recepta sit. Huius motus causam efficientem negat spiritum animale esse, cum à vehementi luce spiritus attenuetur, diffundatur, & copiosior reddatur, & sic foramen ampliari debebat: sicuti à debili densari & minui, sicque foramen angustari, cum tamen contrariū eueniat. Quare ab vueæ tunicæ facultate propria proficisci censet, quæ tamen à luce externa oculum ingrediente excitetur. At videmus in suffusionibus pupillam dilatari ac constringi, cum tamen lux vehemens (cum ægre ingrediatur) ijs obesse non possit, tamen oculo altero clauso foramen contrahitur, quod sane non nisi à spiritu fieri potest.

Foraminis huius vsus, simulacris acceptis trans-
itum præbere ad crySTALLINUM, cuius pars per hoc de-
tegitur: nisi enim perforata¹ hic esset vuea, omnes o-
culi partes frustra create essent, cum crySTALLINUS cum
suis obiectis nullam communionem habeat, quam
per hoc vueæ foramen. Et hac dilatata vel coarctata
rectius deteriusue cernimus. Hinc recte Galenus²
statuit, pupillæ dilatationem, siue primo talis fuerit,
siue post accesserit, semper visui obesse: at coarctatio-
nem à natiuitate, acutissimi visus causam esse: in illa
enim spiritus animalis influens totum spatium ante
crySTALLINUM replere non potest; sicut contra in mi-
nore

1 10. vs. par. 4.

2 1. Symp.
caus. 2.

nore pupilla colligitur & constringitur. Adde quod ad perfectam visionem requiratur, vt species visibiles per lineam rectam fluant, & quidem modo conuali ad oculum & ad crystallini centrum angulo acuto, quo ei imprimantur: quare pupillæ foramen adeo angustum est, quo ab ipsius lateribus productæ lineæ tanquam à basi centrum crystallini in angulo acuto contingant. Quod si vero pupilla adeo dilatetur, vt lineæ ab ea productæ in crystallini centro angulum vel rectum vel obtusum faciant, statim visio aboletur. Hinc patet pupillæ naturalem latitudinem, aut angustiam plurimum facere ad visionem, præsertim ad debitam distantiam inter obiectum visibile & sensorium visus.

Membrana hæc pro ratione partium, diuerfos colores obtinet; foris enim, quæ corneam duramq; attingit, nigra est: interius vero, ^t qua aqueum & crystallinum respicit, nigra vel fusca. At vbi iridem constituit, nunc ^u cærulea, nunc cæsia, nunc nigra, posterior denique, vbi primo pronascitur, subalba est, & mox viridis, dein cærulea, vt in bobus eleganter cõpicitur. Niger hic color (vt recte Galenus, ^x qui de cæruleo loquitur) admiratione dignus est, cum in corpore vniuerso color similis non reperiatur: Hic licet in aliis oculis secundum magis & minus differat, in omnibus tamen niger, vel fuscus est, vt eo crystallinus humor, cum aliis pellucidis corporibus, ad splendoris collectionem obducatur. Quemadmodum enim lumen quodlibet etiam paruum in loco obscuro, & in tenebris, magis quam in loco claro cõpicitur, & obiecta circumstantia perspicua reddit; adeo, quo splendores oculo conclusi efficaciores essent, & visibilium species crystallino melius apparent, totus oculi ambitus interior obscura & nigra hac membrana vestitur, ^y cuius opacitate & colore

*Internasup-
ficies diuersis,
sed interim o-
mnibus homi-
nibus iisdẽ co-
loribus inter-
stringitur: in
posteriore sede
vbi enascitur
subalba, mox
viridis, dein
cærulea, ante-
rius impen-
nigra, Vesali-
dem Laurent.*

*In homine ni-
grum, punice-
um, cæruleū,
rubrum, Col.
in vno magis
nigricat, alte-
ro magis albe-
scit, in aliis ca-
ruleum, aliis
viridem, in a-
liis alios refert
Archan.*

*u Pro diuersa
cerebricocula-
lorum tempe-
rie, Lauren.*

*x 10. vs. par. 3.
y Ea ratione
fungi, squam-
ma pisciū, no-
tiluca, catio-
culi in tene-
bris lucent, in-
terdiu nequa-
quam, Aqua-
pend.*

crystallinus quasi obductus vndique obscuratur, & lux nigritiem & opacitatem refugiens in crystallino vnitur; sicque, vt recte Aquapendens, lux debilis in crystallino magis apparet: imo ad spiritus collectionem facere dicimus: vbi enim à vehementi luce crystallinus affectus est, palpebris clausis ad fuscus illos colores se conuertens, reficitur, spiritibus visionis ad hos colores conuersis, quemadmodum plenius in Corneæ historiâ ostendimus. Quare circa pupillam quoque crassior est, cum parte anteriore, quâ luci accessus patet, crystallino tenebras offundere debuerit: parte enim posteriore corneâ crassissimâ & densissimâ obuoluitur. Et hâc ob causam inter corneam & crystallinum, membrana hæc nigra est. Hæc autem nigredo parti internæ, quâ humores respicit, innata esse videtur: quâ vero corneam posterius respicit, cū tangentium digitos tingat & inficiet, ascititia est, & si abluatur, fere omnis aufertur, & membrana alba red-ditur. Illa vero non inficit, aliàs corpora pellucida, quæ respicit & cingit, aliquando à nigritie conspurcata, puritatem amitterent. Hanc nigredinem excrementum crassum esse, quod in crystallini nutritione segregetur, quemadmodum & aqueus humor ipsius sit excrementum tenue, sunt qui velint. Quemadmodum autem nigredo hæc exterius in omnibus perpetuo est, sic interius potissimum, quâ vitreum respicit, etiam fusca est membrana, in nonnullis cærulea, (hinc cærulea tunica Galen^b dicta) & viridis, vt in bobus: vbi vero antè comprimatur, perforatur, & corneæ pellucidam partē respicit, in hominibus concolor non est, sed diuersicolor apparet: ita tamen, vt semper colorem eum exprimat, qui in iride oculi sanis occurrit; cuius etiam gratia oculos^c nigros, aut fuluos, aut cæcios, aut caprinos (qui morum optimorum indicium Philosopho) ^c aut splēdidos dicimus:

quare

^a Aristot. 31. probl. 2. quærit, cur visus ex diuturnâ inspectione defatigetur, & deterior reddatur, ad virides vero & herbascentes, ut olera, catæraque recreatur? an, quia alba & nigra videndi viribus officiant, colores vero illi medium obtineant.

^a Gal. de A. nat. visus. ca. de oculis.

^b χρυσὴ χιτῶνος 10. vs. part. 4.

^c Rufus lib. 1. cap. 5. Arist. 1. hist. an. 10 & 3 gener. animal.

quare solum hominem inter omnia animalia numero solum oculorum varietate notari, Philosophus descripsit, cum cæteris in suo genere color idem sit, equis exceptis, qui oculis cæsis interdum proueniunt. Quare locus hic inter pupillam & album.

Iris, ἵρις & dicitur, nomine à cœlestis iridis similitudine translato, cum circulus hic oculi maior [tab. 21. figur. 2. 3. f. tabul. 19. figura 7. 8. f.] coloribus variis, qui per corneam etiam translucent, distinctus sit: nonnullis & epārn, corona. Hanc colorum & varietatem ad hum-

d s. gen. an. s. Plin. lib. 11. ca. 37. c 10. vs par. 2. idē statuit in iride, circulos septem esse similes infidetes, crassitie & men ac colore dissidentes ex membranis prouidentes, quos, si probe hac

difficentur, & nihil confundatur, demonstrare liceat. f Opinioniones varia sunt. I. Empedoclis (ab Arist. s. gen. an. 1. allata) qui oculum ex igne & aqua componebat, asium colorem ex ignis prae dominio fieri; nigros autem plus aqua, quam ignis habere. II. Aristotelis l. c. qui ad humorum copiam & paucitatem retulit, & aeris & aqua exemplo ostendit: nam si profundiorē aquam, aut multum aerem inspiramus, utrumq; nigrum & obscurum videbitur si alterutrum paucum, casius & splendens color apparebit. Col. reprehendit Aristotelem ratione nullā additā. III. Galeni libro Artis Medic. 27. qui humoris crystallini & aquei copiam, splendorem & situm causam censuit: casius, inquit, fit vel propter copiam, vel splendorem crystallini, aut situm prominentem, nec non aquei humoris paucitatem ac puritatem: niger ob crystallini paruitatem, aut situm profundiorē, vel quia splendidus exuiste non est, aut quia aqueus copiosior est, nec satis purus. Vesalius: & Aristot. & Galenum reprehendit his verbis: Hic color non ex humorum oculi copiam, aut defectu aut tenuitate, aut pupilla collectione vel dilatatione, aut tenuitate consurgit.

V. Auicenna, qui ad vneā colorem retulit, quæ ut varie colorata est, ita colores varios in oculis profert, si carulea, caruleos, si nigra, nigros causat, quem Vesal. semutus est. V. Auerrhoi, albedinem oculi à frigiditate, nigredinem à caliditate fieri putauit. VI. Varoli qui in spirituum & aquei humoris inaequalem copiam, ut prout in diuersis eius loci partibus intercedit, diuersos colores representare voluit: color, ait, qui ab vneā, à corneā recedente resultat, solet ob quandam apparentem varietatem iridis appellari: apparentem dicit, quia reuera eo in loco non adest vera colorum diuersitas, sed apparet, quia cornea vneā inaequaliter superstat, sicq; inaequalis spirituum & humoris copia intercedit. VII. Archægeli, qui colores variis in iride vult causari ab imparitate venarum in vneā existentium (quæ etiā ranea communicantur) sanguinem varie preparatum in se continentium propter varietatem partium alendarum ab aliis multum dissimilium; idcirco etiam vneā hominibus non esse concolorem, quo oculi defessi potissimum ex viridi plurimum crecentur: idcirco etiam non saepe oculos claudere, quo spiritus disperdidi recreentur. IIX Laurentij, qui ad humores aqueum & crystallinum, tunicam vneam ariegatam & spiritus refert, cuius opinionem approbamus.

ad humores aqueum & crySTALLINUM, ad membranā vueam, & ad spiritus referri posse, censemus. Cæsi enim coloris causa, ratione crySTALLINI, est ipsius copia, splendor & situs prominens: ratione albuginei, splendor & paucitas; paucus enim crySTALLINI fulgorem minus impedit: nigredinis, contrariæ sunt causæ, crySTALLINI paucitas, impuritas & profundior situs, & aquei impuritas & copia: intermedii colores à causis intermediis pendent. Ratione vueæ, cum sola variegata sit, variegatum oculum profert: quare & in iride varii colores sunt, cum ibi vuea varie colorata sit. Ratione spirituum, ad cæsi coloris tenues, puri, splendidi, copiosi conferunt: contra crassi, impuri, caliginosi, pauci, nigredinis causæ esse possunt.

Vfus huius varietatis colorum, qui in iride sunt, aliqui ad pulcritudinem referunt, cum nulla pars visui obiecta impolita relicta sit. An forte hac colorum diuersitate rerum externarum colores varii, melius illic expressi, crySTALLINO offeruntur? At in ijs animalibus, quæ noctu vident, cum iris tantum locus splendidus sit, huius forte gratia animalia noctu videre Aquapendens suspicatur, in quibus iris & fulgida est, quod si homini similem habere contingat, similiter noctu videbit, quod de Tyberio Cæsare Suetonius prodidit.

Tandem membranam hanc recentiorum aliqui Arabes^h imitati, in partes duas diuisere, & partem anteriorem vueam, posteriorem choroidem siue secundinam nominant.

Ex ipsius vueæ tunicæⁱ circumferentia [tab. 21. fig.

17.]

g In lacio pisce huiusmodi croceus color, quasi exacta flammabiliter refert, qua etiā à tunica separata inuenitur. Aquap.
h Fuchsius, q. 3. & 4. fecit. Aquapendens, cui 4. & 5. est. i Gal. 10. v. sp. 2. tunica palpebr. pilis assimilata ad interstitium vel septum inter vitreū & aqueum. Vela. membranæ in star ciliorum Velsalium somniasse Columb. (qui lineas appellat, sed unde producantur, non dicit) asserit. Ciliarem tunicam hic comminiscuntur, cum circulus & copula tunicarum sit, Aquap. Vitreum humorem anteriore parte tunicam habere ab vuea processibus efformatam, quæ velut interstitium sit, &c. asserit Fallop. in Instit. at in obs. ait tunicam non esse, sed potius nexum aut ligamentum: processus ciliares, & filamenta ciliaria Plat. modo interstitium ciliare, modo ciliarem tunicam vocat Laurentius.

17.] tenuia quædam filamenta rectâ feruntur, quæ lineas nigras referunt, palpebrarum pilis similes, quæ ad crystallini humoris margines pertingunt, & licet in araneâ collocentur, crystallinum tamen orbiculatim cingunt: horum ope vnea extremâ [tab. 21. fig. 7. c.c.] membranæ crystallinæ iungitur, & ipse crystallinus vicinis partibus annectitur: quare cum vniculi munere fungantur, non membrana, sed ligamētum ciliare, à formâ Fallopius nominauit: alii vero insititium ciliare, quia aqueum humorem à vitreo cernit.

k Vinculū simul sunt, simul etiam alimentum adferunt, 10. vs. part. 2.

DE MEMBRANA ARANEA seu Crystalloide, vitrea & retina.

CAPVT XL.

ARANEA, ^a quæ ἀραχνοειδής, ^b araneiformis adicitur, & à Ruffo φακκοειδής, lenticularis à figurâ, at rectius chrystalloides, ab humore, cuius tunica propria est: imo ipsius superficies appellatur. Alijs speculum, quod speculi instar pellucida sit. Hanc alij tenui ^c meninge, alij à retina ^d oriri volunt; quam à prima conformatione ex semine cum crystallino, qui ex purissima & lucidissima seminis portione cōlatur, genitam censemus. Tenuissima ^b est, densissima, leuissima, alba, pellucida exacte & splendens, quod lucem admittat, & ab ea immutetur (hæc enim sola lucis affectiones & suscipit & sentit) & ne crassitie visioni obsit, substantiâ nō modo ceparum à pelliculis similis est, verum etiam aranearum ^a telis te-

a De hac Galen. 10. vs. par. 6.

b Hippocrati de locis in homine λεπτή τε νύκτις & λεπτότης tenuissima, qua humorem cōferuat. 1. Est Vesalio, 2. Fuchσιο, 3. Hippocr. 4. Galeno & Laurentio, 5. Syluio Fuchσιο, Fallo. Ar-nui-ebang. 6. Co-

vivo, 7. Aquapen. Ruffus diuisit in anteriore partem, & laterales ciliis similem. Columb. d Vbi vnea in crystallini maximum circulum inseritur, & retina naturam amittit atq; immutat, at viro à nerui substantiâ seu retinâ exoritur, lucis affectiones sentit, & actio seu visio consequitur, Aquapen. d. at Archan. ex optico eruo tenuissime fuso & dilatato. c Colorem nigrum gerit, natum ex ventis & ar-ritis, quibus plurimis illa confersa est, quibus etiam vnea scatet, Archan.

F Non totum
vestit humo-
rem, sed tan-
tum, quā v-
neam tangit,
& extra pro-
minet, tenui
ac lucidā hac
tunicā indui-
tur; at quā vi-
treo inuehitur
tunica expers,
quia humores
inter se coniū-
gi praestiterat.
Galen. 10. vs.
part. 6. Ruffus
rotum obuol-
uere vult, at
dimidiam ad
vnea foramen
prominere, di-
midiam ad reti-
nam commit-
ti: Colum. sta-

nuitate (non autem densitate) quare ἀραχνοειδὴς
Græcis dicta fuit. Hæc crystallinum humorem parte
tam anteriore, ^f quam posteriore tegit, immediate
ambit & stabilit: nam vt vniuersus ad sentiendum a-
ptus fiat, ab hac crystallinus in orbem obuolui de-
buit, quæ antèrius crassior, densior & validior est.
Nam cum visio antèrius fiat, idcirco sentiendi vis i-
bi magis vigere debuit, cum ibi lux ob crystallini ro-
tunditatem & aquei refractionem impensius vni-
atur; quare & visio & pupilla, hæc pars à Ruffo appel-
latur: & cum in hac velut in speculo (cum tamis sit,
& super omnia specula fulgens) pupillæ εἰδωλον
consistat, idcirco idolum ac simulacrum visionis Ga-
lenus ^a appellauit: quin & externis iniuriis & vuez
contactui densitate suā erat oportunior: contra po-
sterior pars laxior, rarior ac tenuior est. Hac ablata
crystallini figura destruitur, non amplius humor læ-
uis, æqualis & politus, nec in seipso constans, sed ad
latera procidens conspicitur. In summa humor hic
non

tuit, humorem vitreum & crystallinum obuoluere (sic & Archan.) & Vesalius
reprehendit, quod hanc diuidat & ignoret, vitreum etiam circumdari, & Gale-
num: Archangelus, araneam cum retinā, (cuius non meminit) confundit, undiq;
ac circumcirca vneam succingit, Archangel. aranea crystallinum humorem parte
antere tegit, Vesal. & Fallop. Instit. quibusdam non tunica, sed membranosa
quadam congelatio dicta fuit, Ruffo auctore, & hic aliquomodo, vt lib. 1. cap. 23.
araneam cum retinā confundit, volens eandem tunicam, quæ vitreum obuoluit,
dici & arachnoidem ab antiquis & ab Herophilo, retinam, ab aliis hyaloidem ab
incluso humore nominari, & lib. 2. ca. 3. ait vocari ab humoris concretionem hyaloi-
dem, à tenuitate arachnoidem, à vasorum contextu amphiblistroidem: quæ vero
crystallinum inuestiat, antiquitus nomine caruisse. Hippocrates de carnibus de
crystallino agens, & de hac membranā, oculi pellucido ὁφθαλμοῦ τῆς ὀφθαλμοῦ
multas tunicas præendi dicit, & in hoc pellucido lumen & splendida contenta lu-
cem reflectunt. Per hanc igitur, in quo lumen reflectitur, visio fit: mox subiungit:
ἡ τῆς τῆς, tunicam vero appellamus, id quod velut pellicula; δὲ τῆς τῆς, quæ neu-
quam ad aspectum nigra est, sed alba & pellucida, & oculi humidum gla-
tinosam. Aristoteles 5. gener. animal. secutus Hippocratem sub nomine cu-
tis araneam proposuit, quæ humoris obtendi, & transiucidam esse vo-
luit.

non modo sentiendi vim, & substantię suæ tum molem, tum formam, sed & efficaciam huic suæ membranæ debet. Venas nullas habet, sed à ciliari nutriri videtur.

Vitrea ἡ ἀλοειδὴς, quam primus Ruffus hic nominasse videtur, humoris vitrei tunica est, quam h aliqui cum araneâ eandem fecerunt, à quâ tamē substantiâ differt, cum tenuissima sit, & vitreum humorem vndiquaque cingat, quo eum retineat, ne is vel effluat, vel aqueo humori confundatur: alii eam ratermiserunt, quia ab araneâ vtrumque humorem inuolui voluerunt: in huius medio ligamentum liare, apparet.

i Retina [*tab. 21. fig. 3.*] seu retiformis & reticulata, ἀμφιβληστροειδὴς, ¹ quod figurâ ἀμφιβληστροῦ, id est, reti sit similis paruo, scilicet piscatorum reticulo profundo, quod in orbem ad pisces capiendos iacitur, aut baculo appenso in aquam mergitur. Hæc ex cerebri i portione superne per neruum opticum dependente, seu nerui medulla, vbi primum neruus oculum attingit, oritur, & ex ipsius nerui radice pendet: inde ad oculi dimidium progreditur, & intra vitæ cavitatem, cui immediate accumbit, non autem efficitur, amplificatur ^k vitreumque humorem, citra men connexum, reticuli instar ambit. Mollis est, bescens, ¹ mucos similis, non vt cerebri substantia solida & crassa.

Idcirco nec i substantia, nec i colore membrana, nec

g Fallop. Plat. Laurent. 6.

h Colum. cum araneâ & Arachangel. confundunt; arachnoidē vitreum humorem continere vult Fallop.

Instituit. at in obser reprehendit eos, qui volunt crystallini tunicam eandem esse cā humoris vitrei tunicā, & hanc vitrei tunicam, illam crystallinam, ab Anatomis arachnoidem dictam, nominat.

i Galen. 10. vs. part. 2. de hac egit: vel δὲ τῇ ἀμφιβλήσει, hoc est, à circumiicienti-

o At Herophilus, referente Ruffo lib. 1. cap. 23. reti contracto assimilauit dimidio putamini aliqui assimilauerunt, 1. est Fuchsio, 2. Vesal. 4. Sylu. Fallop 5. Columb. Laurentio, 6. Aquapendenti.

k In maximum crystallini humoris circulum inseritur, cuius beneficio crystallini in vitreo medio vehitur, quasi ligneam pilam in aqua innatare videas, Aq. pend.

l Liba Columb. & Laurent. Hic ex Vesalio addit, cerebri substantiam aquâ dilatam referre: nonnihil subtrubra, Plat.

m Gal. 10. vs.
 par. 2. at 8. vs.
 part. & lib. de
 Plac. tunicam
 vocant. Ve-
 scius, nomen
 apertius indinō
 potest, quā tu-
 nica; contra
 Col. & Plat.
 male tunicam
 dici scribunt.
 n Aliquot ve-
 nis & arteriis
 extreme gra-
 cilibus & ob-
 scuris intertex-
 ta. Vesal. At
 Pla. nullā va-
 sa possidet.
 o Vitreo ali-
 mentum ad-
 ferunt, Colub.
 Aquap.
 p Ve cum cry-
 stallinus alte-
 ratur id fiat,
 Ga. 10. vs. p. 2.
 At Aquapen.
 contra, retinā
 lucis altera-
 tiones sentire
 non debere as-
 seris: et si inge-
 nere sentiendi
 facultate sit
 pradiā: sic e-
 nim sensus nō
 magis in cry-
 stallino, quam
 in vitreo hu-
 more perfice-
 retur.
 q Sic & Laur.

nec membranę seu tunicę nomen^m meretur, nam f
 ab utroque humore separatam exemeris & seposue-
 ris, & in vnum acervum [tab. 21. fig. 8. e.] conieccheris, vi-
 debitur tibi^m cerebri portio quādam exempta & di-
 latata, quare Galeno^m corpus ἀμφιβληστροειδὲς dici-
 tur. i Venas & arteriasⁿ plures & conspicuas, & mul-
 to crebriores licet exiles, quam suę moli conueniat
 nam cū nerui omnes tenuis meningis portione ob-
 ducantur, venam & arteriam secum adfert, quō nor
 solum neruis, verum etiam oculorum humoribus a-
 limentum natura prouideat ac præparet. In his ergo
 sanguis continetur, neque crassus, neque sæculen-
 tus, sed tenuis & fluidus, quo alimentum^o fiat vitrec
 & crystallino humori, qui ceu purissima corpora san-
 guine purissimo indigebant. Opaca est, & corpulen-
 ta, non diaphana, quo à luce non afficiatur, nec im-
 mutetur. Vfus primus & maximus, P vt sentiendi fa-
 cultatem superne ad crystallinū deferat, cum à neru
 substantiā oriatur. Dein, vt spiritus visui per crys-
 tallinum & vniuersum oculum diffundantur, & crys-
 tallini q alterationes percipiat, & rerum visibilibus idea
 ad cerebrum tanquam iudicem deferat. Tum, qua-
 tenus vueam & vitreum humorem intercedit, impe-
 dit, ne vitrei substantia purissima ab vueę nigritie
 conspurcata vitietur.

DE HUMORIBVS.

CAPVT XLI.

De his egit Galenus 10. vs. part. 1. 4. 5. 6. & 7. de plac. item
 lib. de oculis, cap. 2. & 3.

HVMORES oculorum partes nobilissimę intra
 oculorum tunicas continentur, qui tres sunt
 figurę atque consistentiā varii, lucidi tamen omnes
 ac per-

ac perspicui, sedibusque distincti, oculi tamen cauitatem implentes, & visionis actionem adiuuantes, Aqueus, CrySTALLINUS & vitreus, inter quos crySTALLINI maior & dignitas & vtilitas, quare anima oculi, & centrum oculi, & specillum interius dicitur.

^a Aqueus [tab. 21. fig. 10. & 16. γ. & 19.] Galeno ὑγρὸς της λεπτι, aut ὑγρὸν λεπτὸν κατὰ τὴν φύσιν; humor tenuis aliorum respectu dicitur: aliis ὑδατοειδὴς ob luxibilitatem aquæ ^b similem, & quod aquæ modo pellucidus sit: hanc forte ob causam Aristoteles oculum aqueum aduersus Platonem, qui igneum voluit, latuit. Albugineus à substantiâ & colore, quia albo oui humori assimilarunt; vnde εὐοειδὲς ὑγρὸν Aetio, & ὑγρὸν λεπτὸν οἶον ἐν τοῖς ὡσὶς ὄσιν, humor tenuis, qualis in ouis reperitur Galeno. ^d Humorū est extimus, niuersum spatium, quod inter anteriorem crySTALLINI sedem, vneam tunicam eo loci duplicem & corneam habetur, vna cum spiritu aereo ac splendido implens, vtrinque pupillæ assistit, stabilis, neque mouetur, cum illi lentor aliquis auxilio sit; qui paucus & modum est, ita vt vix decimam oculi circumferentiam expleat: in hoc ὑποχύματα suffusiones fiunt, quas vulgo cataractas vocant: cuius insignem vnam esse, infra patebit; quod sane mouit, vt dubitemus, anne esset pars ex semine cum reliquis oculi humoribus genita: an verò ^f excrementum, quod in crySTALLINI nutritione segregatur, cuius nomine Auienna glacialis excrementum vocauit: auxit dubitationem, quod ex anatome sciamus, mediante tunica crySTALLOIDE crySTALLINUM ab aqueo humore distinctum. Verum, cum partes spermaticæ ablatae non rege-

^a De humoris aquei & spiritus in oculis vtilitate, vide Gal. 10. v. s. par. 5. & 6. Auienna glacialis excrementum, sed male, Lauren.

^b Aqua modo tenuis & fluidus, quem admodum secantibus & suffusiones curantibus occurrit, Vesal. ob similitudinem aqua purissima; aqueus arpellatur, Varol. li. quidam aqua per omnia refert. Plat.

Nō puto Graecos ei assimilasse, cum non ita crassus sit, & multū accedat humori, quem ex recentibus & inte-

Ccc

neren-

is ouis igni adpositis resudare cernimus, Vesal. Tenuitate & paritate ouis candidum refert, Laur. ab aqua vel oui candido nomen habet, Arch. humor, qui in ouis cernitur persimilis, Aquapend. d. 10. v. s. part. 4. e. Tantum humoris aquei, quantum vitrei male Vesal. credidit, Colum. f. Excrementum in crySTALLINI nutritione, Gal. de Anatomia viuorum, cap. de oculis, Col. Varolo, Aquapend.

nerentur; aequum autem humorem in vulneribus oculorum etiam totum effusum regenerari constat,

g Idem testatur Colum-
bus, qui bis
prorsum effu-
sum vidit, &
tenatum, ut
eodem oculo
cernere denuo
potuerint, &
Varolus ob-
seruasse scri-
bit: quiambo
excrementum
faciunt; in
morbis abso-
luti, monet
Plat. At Lau-
rent. pars est
oculi viuens
& spermati-
ta, non excre-
mentum, nam
easdem dotes
perpetuo ser-
uat figura, pu-
ritatis, quan-
tatis: est cry-

g quid statuendum sit, adhuc ambigimus. h Cry-
stallinus [tab. 21. fig. 11. 13. & 14.] huic subiacet, qui κρυσ-
ταλλοειδής: quod ita splendeat, ut non consistentiā
& duritie, sed lumine & perspicuitate, purissimo cry-
stallo similis sit; quare Θεοφάνης τῷ ὀφθαλμῷ Hippo-
crates i appellauit. Κόρη, pupilla Aristoteli dicitur. k
Hic ex purissimā & lucidissimā seminis portione &
sanguinis materni syncerissimā portione, tanquam
pars corporis, & quidem similis conflat: partem
enim esse & Galeni auctoritas, & ratio suadent: quia
ipsi partis definitio, tam generalis, quam specialis
competit: nam cum cæteris partibus in vtero gene-
ratur, circumscriptionem propriam habet, viuit, nu-
trit, & actionem edit; quare & Galenus inter par-
tes similes, & crystallinum & vitreum recensuit.
Hic in hominibus m antè situs est, [tabul. 21. fig. 1.
a.] membrana siquidem ipsum continens, oculum
in duas inæquales portiones secatur, quarum anteri-
or quadruplo minor est posteriore: præterea magis
ad internum angulum, quam ad externum non-
nihil accedit: & id siquidem aliā corpora ante
ipsum,

stallini propugnaculum, & instar ocularium simulacra ad crystallinum defert: si
effluerit, reartiri vix potest, & visionem omnino extinguit, & inter hos duos ru-
nica intercedit. h De hoc id. vs. part. 1. & 6. 7. de Plac. 5. lib. de oculis 2.

i De Carnibus. k 1. hist. 9. & 5. gener. animal. 1. Ruffo interdum à figura gutta
humoris, Auicenna gutta & grando. l Inter partes recenset Galenus 1. Meth. 6.
& 1. de caus. sympt. m Medium locum obtinet, non modo, ut tanquam princeps
oculi pars, quo ab iniuriis externis sit remotissimus, sed & c. de Anatom. viuorum,
cap. de oculis, & lib. de oculis cap. 2. Vesal. exquisito in centro situm putat: quare
à Columbo reprehenditur: in situ anteriore non medio, Varol. sede media magis
quam in centro, Plat. in medio locatus, Archangel. in anteriorem partem magis
propendet, Aquapend. fere in medio oculi, veluti in centro, ut utrumque lumen
& internum & externum facile admittat, neque virique consuescat, nimum
Laurent.

ipsum, aliâ post ipsum ponenda erant, quô aliâ ipsi inferuiant; aliâ ipsum defendant, aliâ ipsum adiuuent: at in bobus, oculi parti inferiori vicinior est.

Hunc tunica crystalloides, quam speculum vocant, vndiqueⁿ cingit, quæ antè densa & perposita, posterius vero laxa est: hac ablata substantia crystallini se offert, quæ aquea est, non tamen fluida; sed condensata instar aquæ, quæ mediocriter in glaciem concreuit, & vbi membrana, quâ compactâ contineretur, ablata est, ad latera concidens, aliquâ dilabitur, hinc glacialis dicitur, & nonnullis quando.

Hic antè aquo humore perfunditur [tab. 21. figura 10. & 16.] posterius humori vitreo infidet, veluti innatat, ac si globus aquæ innataret [tab. 21. figura 10. & 12.]

Est autem omnis coloris expers: si enim ruber et flauus existeret, omnia, quæ videntur, & rubra & flaua apparerent; vt in Ictericis aliquando fit; ideo ergo colorum omnium species, quos primo apprehendit, citissime suscipiat, coloris alieni expers est, clarus, splenditus, ° perspicuus, vt à luce crederetur & immutetur: Hac enim solâ ratione per coloribus immutatur; imo solus à coloribus alteratur, & rerum visibilium species recipit; qui tamen non eo plane modo, quo aqueus perspicuus est, modo in eo noua lucis reductio fiat: quare densior est, vt in eius superficie lux ad perpendicularum refringatur: Sic enim lux impensius vnitur & rotatur; mediocriter durus, vt in eo simulacra fri possint, 9 & crassus, ita tamen, vt sit diaphanus, quo luci transitum concedat, superficiali, & insigniter lubrica; Verum, cum

n Nulla inter crystall. & vitreum membrana interiacet: antea tamen ab araneâ tegitur, Col. à vitreo nullâ tunica diremptus, Archan.

o In oculo laminosus est Galeno, quod falsum dicit Aquapen. p 10. vs. par. 1.

q De sympto. causis.

r In piscib. ex
acte rotundus,
Aquapen.

f Ad lentis si
militudinem
Ruffo, Vesal.
Col. Plat.

t Rotunditas
hac Galeno i-
gnota, secun-
dum Aquapē.
Gal. 10. v. p. 6.
nō, inq̃t, spha-
ra absoluta
est, & vndiq̃
aquabilis, q̃a

non erat tutū,
neq̃ enim in-
cumbētes cir-
culos ac coale-
scentes, qui in
spatio sunt iri-
dis, nunquam
quo modo nūc
admisisse; de-
in in vehemē-
ti motū, aut
plagā oculi, pe-
riculum fuisset,
ne ex vitreo
exturbaretur, cum se-

des in rotundis fallaciores sint, quam in planis: & 10. v. p. ult. ut maioris
parte cum obiectu communicaret. At Lauren. quā pupillam spectat, pressior; quā
vitreo immergitur, planior apparet, antequam magis, quam postea depressus, Va-
rolus & Archang. u Varolus hoc aranea tribuit, quā suo ambitu oculorum cavi-
tate interna connectitur. x Albugineus Ruffo lib. 2. cap. 3. y 10. v. p. 1. & tan-
tum albus, quantum, si intellexeris, exiguum nigrum multo albo per totum admi-
stum esse. & albedinis perfectionem adulteratam esse, quod Gale. voluit, vitreum
humorem albedine tantum à crystallino superari, quantum ipse sanguinem supe-
rat; ita ut auctor libri de Anat. viuior. vitrei colorem inter album & rubrum po-
suerit.

mollitie lentorem obtinet, ita vt digitis comprimēt
glutinis modo adhæreat. Magnitudine lupino & qua-
lis; figurâ r quodammodo ad lentis i maioris simili-
tudinem accedit, vnde φακοειδής, lenticularis, Actio
anterius ferè planus, lenticulæ extuberantiam refe-
rens (hinc nonnullis δισκοειδής à disci similitudine
vt splendorem commodius suscipiat; posterius (sphæ-
ricus, t quo vitreo humori melius insideat: secundū
latera magis protuberans. Ne vero è propriâ sede
oculorum motu declinet, & veluti suspensus in oculi
li camerâ retineatur, per ligamentum u ciliare vuc-
iungitur, sed tantum in circuitu & maximâ crystalli-
ni circumferentiâ; anteriore vero & posteriore part
liber est, ne corporum diaphanorum continuitatem
intercipiat.

x Vitreus [tab. 21. fig. 1. b. fig. 18. 20.] ὑαλοειδής & vitri-
formis, quod consistentiâ seu crassitie vitro y fuso
colore vero & luciditate vitro iam densato & refri-
gerato respondeat: hic posteriore sede locatus est, li-
cet & anterioris non exiguam portionem occupet
ita, vt ex quatuor oculi partibus concavis, tres re-
pleat, [tab. 21. fig. 10. & 20. x.] & quadruplo crystalloi-
dem superat, quo spiritum visiuum; ne subito diffi-
petur, aliquantum contineat. Substantiâ ipsius con-
sistentiam aliquam habet, quæ tamen crystallino lō-
ge mollior, & tenuior, quo ipsi sedem aptam paret, a-
queo tamen minus fluidus; & non minus quam cry-

stalli

allinus & splendidus. Figura, dum adhuc in oculo fuerit. *Hoe fal-*
 st, plus quam dimidiatum globum refert [*tab. 21. fig. sum dicit A-*
 & 20.] Cuius superficies posterior rotunda seu cō- *quap. Nam si*
 exa; anterior plana quidem, quæ tamen in medio *inter se confe-*
 num habet [*tab. 21. fig. 9. r. & 18. β.*] quo crySTALLINUM *ras, vitreum*
 etius amplectatur: qui licet à retiformi dictâ tuni- *crystallino, iū*
 a cingatur, à qua beneficio venarum per eam disse- *albidiorē, iū*
 minatarum nutritur, propriâ tamen tunicâ, vitreâ *magis splendi-*
 ominatâ donatur, quâ ruptâ in aquam liquefcere *dum conspi-*
 fundi statim videtur. *cies.*
 z Splendidiſſi-

DE HUMORVM OCULI VTI-

litate & visione.

CAPVT XLII.

De oculo & visione Galenus omnium diligentissime scri-
 psit, vt qui de visione libros tres scripserit, & de eâ toto
 fere lib. 7. de Plac. egerit. De oculi vero partibus & vsu,
 integro 10. de vs. part. libro, & libro de oculis, modo Ga-
 leni sit, tractauit, nec mirum cum 10. vs. part. 12. fatea-
 tur, se somnio perpulsum, vt quæ de oculis sciret, nullo
 modo reticeret.

¶ Vm admirandam sapientiam, prouidentiam &
 & bonitatem Dei Opt. Max. in diuinissimorum
 membrorum, oculorum nimirum conformatione
 posuerimus, & de eorum vsu, in cuiuslibet partis
 explicatione, non pauca dixerimus, nonnulla adhuc
 proposito minime aliena, qua ad humorum vsum
 facient, aspergemus, quæ si cum iam dictis prius iun-
 guntur, verum & oculi vsu, & verum visionis mo-
 dum, à Philosopho potius, quam Anatomico pro-
 ponendum, exponent.

Oculos visionis instrumenta esse, quo res omnes
 visibiles tam proprias, quam communes percipiant
 videant, nemo nescit: proprius, vt colores omnes;

Vesalio: ambo
exquisitissimâ
puritate, pel-
luciditate, cla-
ritate perspi-
cui, Aquapen.

a De visionis
modo, qui vo-
let, consulat
Philosophos,
maxime Ari-
stotelem, lib.
de Anima, de
sensu & sensi-
li, & Alexan-
dri comment.
Ga. 7. de Plac.
10. vs. part. 12.
& 13. Opticos
Albareti. Vi-
tellium, & in-
ter recentiores
Aquapenden-
tem; opiniones
enim diuersa

communes, rei figuram, magnitudinem, numerum,
motum & situm: quæ qualitates sunt sensibiles, o-
mnibus sensibus communes: ita vt recte dicatur, o-
culum hominem non videre, sed res visibiles in ho-
mine, vt colores, & partium eius situm, figuram ma-
gnitudinem, numerum & motum; ex quibus postea
mens rem illam hominem esse colligit, & sic de cæ-
teris. At oculus ex pluribus partibus iam explicatis
constat, quæ omnes in visionis vsum creatæ sunt.
Verum, cum in quolibet instrumento, ^a quod ex
pluribus partibus componitur pars, vna habeatur si-
milaris, cui actio potissimum accepta referenda sit.
talis in oculo quoque erit, quam dicimus; esse cry-
stallinum humorem, qui actionis ^b auctorem, cum
in eo

sunt. I. Emissione fieri, & quidem vel per luminis emissionem ad obiectum, cuius
reflexio fiat ad oculum, ac pila ad parietem impulsæ ad manum reditus, vt Pytha-
goras voluit. Vel emissionem radiorum & luminis simul, vt Empedocles, Hippar-
chus, Niceus, vel radiorum emissionem ad obiecta figura pyramidis, cuius conus si
in oculo, basis in obiecto visibili, vt optici voluerunt. Vel spiritum à corde ad pu-
pillam ferri, qui ad visibilia extendatur, vt Chrysippus & Stoici autumant.
II. Receptione fieri, & quidem vel à corpore, quod videtur, ad nostros oculos ali-
quid corporeum mitti, vt Epicurus, Democritus & Leucippus. vel beneficio medi-
æ aeris lucidæ à coloribus rerum visibilium alterati, vt statuere Aristoteles, Alexan-
der, Themisthius, Auerrhoes, & ceteri Peripatetici, & ex recentioribus Lauren-
& Aquapend. III. Emissione & receptione: Plato in Timæo voluit, ignem seu li-
men in oculis contentum, extra oculum manare, & cum diurno lumine iungi, &
ex illâ coniunctione & concursu passionem quandam resultare, quæ ad animam
euolet, & ipsam protinus intus moueat, & sic videndi actionem perfici, in quâ sen-
tentiam Galenus descendit, vt videre est 7. de Plac. 6. sic 10. vs. part. 12. lumen
culi internum cum externo commisceri dixit: verum, quod ab oculis exit, inqu-
Aphrodiseus, aut corporeum est, aut incorporeum: non incorporeum, quia nec exi-
re, nec locum mutare, nec in oculo esse, vt in loco, possunt incorporea: non corporeum
quia unico die oculus destrueretur, nec momento ad æthera vsque ferretur, cum
nullum corpus in instante moueatur: adde, quod si aerem huic corpusculo exeunti cedere vellet
daretur corporum penetratio: quod si aerem huic corpusculo exeunti cedere vellet
nunquam visio fiet, quia non fiet radij continuatio cum oculo. ^b Galen. 1. de cau-
sympt. 10. vs. part. de instrum. odoratus 3. & 2. Meth. 8. his argumentis. I. Quia
oculo sit, cui in toto corpore similis non reperiatur. II. Quia hic solus à coloribus
alti

in eo rerum visibilibus species suscipiantur & dignoscantur: quædam vero sunt, sine quibus actio fieri non potest, ut est nervus opticus, qui videndi facultatem defert: quædam, per quas melius fit actio, ut membranæ & muscoli: quædam ad horum omnium conseruationem constitutæ sunt, ut sunt palpebræ & circumiectæ partes.

Cum ergo per nervos opticos facultas à cerebro ipsis oculis accedat, qui rerum extrinsecus appellentium exploratores sunt, quo rerum externarum cognitionem adipiscantur, sensibile neruum tangat, oportet, cum omnis actio, Philosopho monente, per contactum fiat; hinc autem fit per medium, cum sensus sua sensilia medio quoque percipiant; siquidem omnis sensus tactus sit, & tangendo sentiat. Quare cum nervus ab obiecto visibili separatus sit, necessum est, quo visio fiat, ut contactus fiat; vel nervi id sensibile, vel sensibilis ad neruum; vel, ut ad aliquam usque partem, utrumque ad alterum moueatur.

At cum duobus prioribus modis fieri non posse, sensu probari possit, sequetur, tertio modo fieri debere: Si tertio modo, tum vel à nervo, ad obiecta visibilia aliquid prodit: vel contra, ab obiectis ad neruum quippiam mittitur: vel utrumque sit: hoc est, visio fiet, vel per emissionem spirituum, vel per receptionem radiorum, vel emissionem & receptionem simul.

At spiritus ad rem videndam à nervo non fertur, alias solus nervus, à quo facultas profluit, actionem hanc absolvere posset, & extra oculum dignotio fieret. Neque à corpore, quod videtur, id nostros oculos aliquid corporeum mittitur: si enim corpora obiecta continuâ diffusionem diminerentur. Nec tertio modo fit, ut spiritus, vel

alteratur. III. Quia solus sit luminosus. Respondent ad I. idem de aqueo & vitreo humore, & oculorum tunicis dici posse, cum similes in corpore non sint: ad II. & reliquos humores & corneam tunicam, quatenus diaphana sunt, à coloribus alterari posse, ad III. & reliquos duos humores à luce externa lucidos fieri. c 3. de Anima.

radius, vel lumen ad rem videndam aliquousq; progrediatur, & obiecti quippiam ad spiritum vsq; moueatur, ita, vt in medio contactus fiat; aliàs huic actioni neruus suffecisset, & dignotio extra oculum fieret.

Quare cum Philosopho censemus beneficio medii fieri, ita, vt qualitas quædam medium & interiectum aerem perspicuum colore afficiens & immutans, à rebus ipsis species visibiles per vnicam lineam rectam ab obiecto ad oculos, imo ad crystallini humoris centrum, transeat. Sic aer, qui medius est inter oculum & obiectum huius dignotionem defert & primo colorem: aer enim à coloribus alteratur, & colorem illum tactu percipit: quemadmodum Sol lucis suæ splendore aerem contingens eum illustrat; ita & colores aerem contingentes immutant: aer autem colorum capax est, vbi serenus est, luminosus & Solis fulgore collustratus.

Visio ergo per visibilibus ^e specierum receptionem fit, quando lux visibilium formis affecta per diaphana oculorum corpora suis radiis rectis primum, mox vario modo refractis oculum ingreditur, & colore crystallinum ^f afficit, qui tanquam primarium visionis instrumentum species rerum visibilibus in instanti recipit, quorum refractione in membranis fit, perfectio in opticorum coitu, perceptio denique in cerebro. Lux enim propriū est visus obiectum, quod visum mouet & afficit, lux inquam colorum formis affecta, & quidem lux externa. In sitam enim lucem in oculo homo non habet, aliàs noctu & etiam videret,

^e Democritus & Leucippus corpora recipi existimarunt: Epicurus obiecti visibilia radios. Alexander imaginem rei, non tantum in subiecto, sed velut in speculo. Aristot. tantum species, quæ in corporea indiuidue, quæ in medio & organo produciuntur, ac multiplicatur per simplicem emanationem, vt è Sole lumen, ex corpore umbra prodit.

^f Locus receptionis: Ari-

stoteles in pupillâ; sic enim crystallinum vocat: Galenus nunc in crystallino, nunc in eius tunica. Auicenna in opticorum neruorum coitu, ideo obiectum vnicum apparere. Sunt, qui in cerebri substantiâ recipi velint, quia sensus omnis à cerebro fit. Laurentius vult neruum opticum visibiles spiritus ad crystallinum deferre, & species ab eo ad cerebrum tanquam censorem & indicem traicere. ^g Vt Tiberius Casar, Suetonio referre, & Cardanus, ac Io. Bapt. Porta Neapolit. ipsi de se affirmant.

ret, lumine extra misso; quemadmodum animalia illa, quæ noctu alimentum quærunt, quæ interdiu deterius vident. Sic & homo, si lucem insitam haberet, interdiu deterius videret, vt prædicta animalia docent. Iam vero lux visibilium rerum simulacris affecta, cum per radiorum refractionem fieri debeat, diuersa corpora diaphana requirit, & primo per aerem progressa, mox per aquam ad refractionem in oculo faciendam progredi debuit. Visionis enim instrumentum aqueum^h est, quemadmodum Anatome & tota oculi compositio docent (vnde forte Hippocrat.ⁱ visum à cerebro humido ali dixit) aquæ autem proprium est recipere. Quo vero visilium species in oculo retineantur, diaphano & denso copore opus fuit.

Quare oculus non solum aqueus factus, vt refractione fiat, sed vt talis existens varie crassescat, & varia diaphana corpora creet; vnde lucis varia fiat in oculis refractione. Et licet aqueus humor diaphanus sit, ac lucem admittat; diuersum tamen diaphanum, à corneâ habet, quo in aqueo, noua refractione fiat: hæc autem refractione à perpendiculari fit. Prima fit ab aere, in corneam densius diaphanum; altera à corneâ in aqueum, tenuius diaphanum, vbi lux in aqueo vnita & fortior reddita, ad crystallinum pertingit, in quo tanquam densiori lux adhuc impensius vnitur. Verum, quemadmodum in oculo naturaliter refractiones quatuor fiunt, ad corneam, aqueum, crystallinũ, & vitreum humorem; sic in perspicillis sex fiunt, quæ

^h Platoni, qui luminis emissionis visũ fieri voluit, natura ignea est: ignis autem illius, qui non urit, sed illuminando inuehit, cui triplex ignis est, lucēs, non urens, lucens & urens, urens non lucens, Gale. 10. vñ. part. 12. 7. de Plac. 6. Oculum appellat organũ lucidum & solarem animalis particulã. Democrito, Aristoteli & Peripateticis oculus aqueus est, quare, quæ Platonicos lib. de sensu & sensibili scripsit.

Ccc 5

duo

Carpentarius Platonem & Aristotelem conciliaturus, duo, ait, in oculo esse, quæ visionem efficiunt, spiritum visilem lucidissimum, à cerebro per nervos influentem & crystallinum humorem: ratione spiritus ac luminis interni, nec non obiecti luminosi, igneum esse oculum: aqueum vero ratione crystallini. At sic omne sensorium igneum esset, quia omnia sensuum organa suos spiritus animales eiusdem naturæ leuitatis, & fulgoris habent, vt recte Laurentius refert. i De locis in homine.

duo præstant, visilia clariora & maiora reddendo. Quia primo lux ab aere rariore diaphano, intrat in specilla, quæ crassiore sunt diaphano; inde rursus in aerem rarius diaphanum, à quo in corneam densius, & à corneâ in rarius aqueum; ab hoc in densius diaphanum crystallinum, & tandem in vitreum, ita, vt ex tenuiore diaphano, in crassius alternatim procedat. Alter aquei humoris vsus, spatium vacuum implere, & corneam tensam conferuare & humectare, ne arefcens corrugetur, sicque crassior euadat, & rerum visibilium receptionem impediât. Tum corneæ, vueæ & crystallini siccitatem^k prohibere, vt sic eorum natura diaphana, sine qua visio fieri non potest, suo madore semper irrogando, conferuetur. Hoc enim in compunctionibus effuso vel exsiccato, cornea concidit, rugosa & opaca redditur.

Quarto, vt crystallini propugnaculum sit, ne cornea crystallinum per pupillæ foramen tangens, duritie suâ lædat.

^l Vt externi luminis splendor affatim occurrēs infringat, & cum interno lumine consuescat externum; est n. veluti medium quoddā delationis imaginū, Lauren. Humor oculi interior pupilla, Arist. 1. hist. an. 9. 5. gen. an. 1.

Quinto, vt exteriorum colorum^l impetuosiores ad crystallinum occursum impediât. Tandem, vt rerum visibilium ideas ocularium seu perspicillorum instar (vnde Aristoteli imaginum delator dicitur) eleuet, vt eæ plenius multo & rectius percipiantur: cum enim rerum externarum imagines ad angustum pupillæ foramen peruenēre, humoris aquei ratione quasi attolluntur, vt tum visio rectius pficiatur; nam cum visio perspicuitatē requirat, ob id humor limpidissimus, ante crystallinum visionis primum instrumentum, collocatus est.

Crystallini vero vsus, vt sit primum & præcipuum visionis instrumentum, in quo visio perficitur, quare idolum & simulacrum visionis nonnulli appellarunt: imo & pupillam Aristoteles nominauit, quia in anteriore parte potissimum visio fiat. Præcipuum enim

nim

nim visionis instrumentum omni colore secundum se carere debuit: siquidem omne recipiens, vt inquit Philosophi, à natura recepti denudatum esse debuit, eò quod idem in seipsum agere non potest, nec à seipso pati. Aliquid autem omni colore carere cognoscimus, quando diuersis coloribus oppositum, res repræsentat, talia sunt aer, aqua, crySTALLUS & huiusmodi. Quare visionis instrumentum oportebat esse velaereum, vel aqueum, vel crySTALLinum. Non debuit esse aereum, quia tunc instrumentum obiectum cognoscit, quando ita ab eo patitur, vt illud fiat: colores vero, qui in aere recipiuntur, per ipsum fluunt, nullâ factâ in eo mutatione. Non debuit esse aqueum: nam licet species colorum magis in aqua, quam aere imprimantur, non tamen in eâ colores ita imprimuntur, vt spectantibus in ipsa esse appareant, sed per ipsum, quemadmodum per oculum fluunt. CrySTALLINUS ergo præcipuum visionis instrumentum erit, res visibiles recipiens, quod probatur autopsiâ. Si enim crySTALLI portionem crassiusculam & rotundam corporibus coloratis opponamus, tunc colores, ex quacunque parte inspicias, ita in eo conspiciuntur, vt eiusdem proprii, non aliunde fluentes esse videantur; quare in crySTALLO, non solû colores recipiuntur, sed etiam ita retinêtur, vt eius potentia in colorê, quem recipit, mutetur. Causa huius est, q̃a in crySTALLO non solû humidû aqueum, sed et glutinosum adest, q̃ colorû idola suo lentore retinet. Idcirco et natura intra oculû humorê locauit subrotundû, glutinosum, crySTALLI imaginê referentê, in quẽ tâquam peculiare visionis instrumentû colorû simulacrâ recipiuntur, qui crySTALLIN⁹ humor dicit; quẽ si oculo exẽptû inspicias colore omni prorsus destitutû, & colores circûpositos tâquã p̃prios representare videbis, & si dissecueris, ex humido glutinos. cõpositû inuenies. Et q̃a s̃c̃atio rece-

receptio quædam est, idcirco hanc formam obtinuit: cuius actio, mediante suâ membranâ crystalloide, quam araneam vocant, pellucidâ & sensificâ adaugetur. Si enim exemptus characteribus vitri instar applicetur, ad hunc membranâ intectus, specillorum modo, quæ ex crystallo & vitro fiunt, maiores longe videbuntur, quam si humor adponatur, vnde forte specillorum inuentio prodiit: cum humor hic nervi visorii perspicillum sit, qui species illabentes colligit, & perspicilli modo retiformi res maiores præsentat. Absoluitur autem visio & alteratione & dignotione. Quo vero in hoc alteratio fiat, pellucidus factus, aliter tamen quam aqueus, quo à luce alteretur & immutetur. Et cum in hoc lux imprimi & firmari debuerit, aqueo densior est, vt in eius superficie lux ad perpendiculum refringatur: Sic enim lux impensius vnitur & corroboratur, radiis magis obliquatis, & propter refractionē in vnum concurrentibus. Quare crystallinus, cæteris in oculo diaphanis, vtpote, corneâ, humoribus aqueo & vitreo, crassius est, quia non, vt cætera solum luces & colores reddere, & iis viam tantum præbere debuit, sed eadem detinere, pati & visilia sentire debuit, quare crassitie suâ formarum trāsitum prohibet, quæ in eius superficie & corpore figuntur, vt ea sentiat: sensus autem non fit, nisi patiatur: pati autem non potest, nisi actio agentis in eodem recipiatur. At quo in eo species imprimantur, mollis est, instar ceræ, & vt magis adhæreant, viscidus est: hinc fit, quod luce validâ, vt Solis ad crystallinum delatâ, cum lucis simulacra, in eo aliquantum remaneant; is & doleat & labefactetur. At visibilibus rerum simulacra, naturaliter in eo diutius non detinentur; quam ad ea percipienda opus sit, sed recedunt, aliàs imperfectus visus redderetur, cum non nisi prioribus recedentibus alias species admittere possit,

possit, & post recessum, alteratio in eo non remanet. Sic crystallini conformatio ad meliorem visionem facit: quare politus est, ut species externis consimiles ei offerantur; rotundus est, ut in eo lux, eiusque perpendiculares radii uniantur, & lux robustissima in eius superficie, ubi sentiens facultas viget, colligatur, & ideæ rerum etiam maximarum integræ ad eum perveniant; antè tamen rotunditas depressa est, ad meliorem formarum receptionem: posterius rotundus est, ut lux ad crystallinum delata, in seipso uniat, & longius non progrediatur, sed in vitreo subsistat. Antè & posterius liber est, quia oportebat lucem, quæ recta semper fertur, per continua diaphana oculorum corpora liberum transitum habere, quo cuncta, quæ inter crystallinum & rem visam, continuitate diaphani continuentur. At non undique solutus esse debuit, aliàs quolibet motu, oculi constructio labefactata fuisset; quare in circuitu alligari debuit, & in medio positus, ut à circumstantibus ministerium capiat.

Vitreus post crystallinum locatur, ne lux transiecta, statim ab opacis & coloratis membranis, retina & vicia foedata ad crystallinum reuertatur, & sic colores internos tanquam propinquiores sentiat: & ut in eo tanquam diaphano, ^m diuerso tamen à crystallini diaphano, fiat noua lucis refraction, & quasi debilitatio, & quia vitrei substantia rarior est, in eo lux dispergitur, euanesceat, & tandem suâ copiâ omnino obumbrat, retinæ molliæ difficile refluxum permitte. Dein ipsius usus est, monente Galeno, ut crystallinum per diadosin seu transumptionem nutriat: censuit enim, crystallinum ex sanguine nutrirî nō posse; sed hîc limitatione opus est: cum enim omnes partes sanguine nutrantur, & crystallinus humor pars sit, & is sanguine nutrietur; verum non imme-

m Vitreus diaphanus Opticis, quo lux transire possit, & ubi crystallinum permeauit, vltèrius fundatur, & nerui optici cōcauum petat, ubi demū visionem perfici volunt.

diatē

diatē, sed mediatē; nām cum neque crystallino, neq; vitreo venæ insint, quantum quidem inspectione probari possit, ad ipsos sanguis deferri non potuit; imo nō debuit, ne crystallinum, qui colorum expers esse debuit, suo colore inficiat, sicque visionem corrumpat: Alimentum ergo postulabat iam præparatum, & quod mediatē ad ipsum deferretur: quare sanguis ex venis per vucam membranā excurrentibus, in quibus adhuc crassus est, & nigricans, in minores ramos per retinā excurrentes effusus, & utrinque alteratus, in his floridus est, tenuis & rubedine clarā donatus, qui à vitreo assumitur, & in eo magis adhuc præparatus, in alimentum & ipsius & crystallini cedit: Hinc Galenus inquit, vitreum ad crystallinum se habere, quemadmodum se habeat ventriculus ad hepar. At ⁿ cum in omni alimenti mutatione excrementa duo, tenue & crassum segregetur; tenue hīc volunt, esse ipsum aqueum ^o humorem: crassum vero humorem illum atrum ^p & opacum, qui in vucā reperitur, & à quā, ut in vucā monuimus,

ⁿ De oculis 3.
^o Colum. Va
 vol. Aquapen.
^p Aquapend.
 De nutritione
 crystallini opi-
 niones. Ga. 10.
 vs. p. 1. voluit;

crystallinum à vitreo, vitreum à corpore ipsum ambiente, (id est, retinā) per diadosin nutriri, quia humori crystallino, qui albus est, clarus ac splendens ex sanguine nutriri non licebat, ut qui multum qualitatibus ab eo diffideat, sed alimentum quoddam familiarius postulabat: quare illi à naturā contigit alimentum accommodatum humor vitreus, qui quanto crassior est sanguine, & albus magis, tanto à crystallino humore, humiditate atque albedine relinquitur: hic enim albus est planissime ac mediocriter durus. Hac ille. Sic & Varolus ad hanc opinionem accedens, inquit: Cum unumquodq; ex determinato proxime nutriatur, ideo crystallino posterius vitreus adpositus, qui consistentiā crystallino mollior est, & tenuior; & ne parti, tam nobili & spirituum abundantia dissolubili, alimentum unquam deesset, tanta vitrei quantitas est, in quā nutritione crystallinus, vitrei partes crassiores, cum eo longe crassior & densior sit, in naturam propriam vertit; Tenuior vero pars vitrei, tanquam excrementum inutile à crystallino seceruit, & humorem aqueum dictum constituit, Varolus. Verum Archangelus, qui vult crystallinum vitreo nutriri, ut os medullā nutriatur, inquit, si crystallinus & vitreus partes sunt corporis, tunc pars una alteram nutrit: R. Natura effecit, ut à nutritione vitrei multum superflueret, quod crystallini pabulum est idoneum. Quomodo dicit

mus, ablutione auferri potest, cuius tamen vtriusque excrementi insignis utilitas est, vt suo loco diximus. Tum, vt spiritus visuos ad chrySTALLINI illustrationem retineat. Tandem, vt eum, à membranarum duritie conseruet, eique sedem suppeditet.

Galenus, in vitreo nullam esse venam? R. Nullam exstare conspicuam, at multas inesse, quæ

pra exilitate oculorum obtutum effugiant: Ideo vitreum non esse ita candidum; vt sit crystallinus, quia cæcis venis plurimis sit conpersus: sic in adnatâ membranâ nullas venas apparere, at in inflammatione latentes conspicuas reddi: in cerebri substantia, cum scinditur, nullas venas apparere, at cum inflammatione obsidetur, innumerabiles per ipsius substantiam conspici: hac ille: Laurentius vult, vitreum ali sanguine, & venulâ à ciliari interstitio accipere: ipsum crystallino sanguinem præparare, quem immutet, ne colore rubro, & venulis glacialis inficiatur, non tamen vitrei humoris substantiam in crystallinum transire, eique assimilari; non tamen albugineum ipsius excrementum esse. Aquapendent. sententia: à sanguine nutriri, & quemadmodum ossa, & membrana, quæ albuginea sunt, & à naturâ sanguinis distant, ex temperamenti proprietate sanguinem in os transmutat: ita & crystallino vsueneri, sanguinem è venis vtea in retinam delato, & quo in horum corporum substantiam nitidam conuertere possit, deputari, crassum in choroideam deponi, & in vtea colligi; tenue vero humorem aqueum existere. Non vero posse crystallinum à vitreo per diadosin nutriri, quia intercedat aranea tunica inter vtrumque humorem, quod Galenus ignorauit, quòd tantum anteriorem crystallini partem integri censuit, & hinc in errorem hunc lapsus esse.

DE AVRIBVS.

CAPVT XLIII.

SENSORIO visus expedito, nunc disciplinæ sensum a seu auditus organon, cum is ad artes & sci-

entias excipiendas creatus sit. Aurium, inquam, *a Adea, quæ vita necessaria sunt magis, vel per se*

visus conducit, ad oculum ingenij capeffendum per accidens auditus: Per accidens enim magnum aufert adiunctum ad acquirendam sapientiam, prudentiamque: Nam sermo, cum sit audibilis; disciplina causa non per se, sed per accidens existit, Aristoteles de sensu & sensibili, cap. i.

fabricam, non minore artificio creatam & formatam explicare aggrediamur: quæ visu apprimè iucunda, sed explicatu & ostensu admodum difficilis est, cum in auribus multæ sint particulæ, eæque exiguæ aspectumque prope effugientes, & in angustis spatio inter ossa reconditæ delitescant. Dicturi autem sumus ea, quæ partim ex dissectionibus didicimus, partim ex scriptis doctissimis, potissimum Fallopij, Eustachij, Volcheri, Arantii, Aquapendentij & Placentini hausimus: ad quod præstandum Deo opem imploramus, ut is mentis aciem clementer largiatur, quo eius miracula, diuinam atque infinitam sapientiam ac bonitatem explicare possimus, & ut ea quæ succinctè dicturi sumus, etiam perspicue proponere queamus.

^b Lactatius & Virgilio.

^c Aristoteles *de aures, ἀ-
κὼν auditum
vocat, 1. hist.
an. 15.*

^d Aures, partem modo externam, modo internam significare apud Hippo. colligitur ex *Coacis aphor. 192.*
& seq.

Aures ab hauriendis ^b vocibus dictæ, Græcis ὠτὶς & ἄρα, à voce accipiendâ ἀροαὶ nominantur. Cuius instrumenti partes plures sunt, quæ omnes ad soni in aurem receptionem & intensiorem faciunt, quarum aliæ sunt, sine quibus auditio & soni receptio fieri non potest; aliæ, ad meliorem receptionem & auditionem necessariæ: alię denique, ad omnium conseruationem creatæ sunt. Diuidimus cum ^d Hippocrate, in aurem externam, & aurem internam: de externâ primo.

DE AVRE EXTERNA SIVE Auricula.

CAPVT XLIV.

De hac Aristoteles 1. hist. anim. 11. & 2. part. anim. 10. 11. & 5. gener. anim. 2. Galen. 11. vs. par. 12.

^a 1. hist. an. 11. eorumq; sen-

AVRES capitis partes sunt, quibus auditus Philosopho ^a monente, quare aures, quasi

des, ab audito dictæ; quæ auditus quidem instrumenta^b sunt, sed non principalissima, cum auribus etiam ad radicem penitus abscectis, auditus fiat: quemadmodum naso abscecto, olfactus fit, licet imperfecte: quia principalissimum auditus, quemadmodum & olfactus instrumentum in cranio latitat: quare partes sunt adiuuantes, & quæ dum integræ sunt, aures quidem, ad auditionem perfectam, quemadmodum nares, ad olfactum perfectum, plurimum conferunt: externæ ergo, quæ cuiuslibet conspectui in hominibus & quadrupedibus, non vero^c aëribus & piscibus occurrunt, & proprie Auriculæ dicuntur, in cavitatibus (non secus, quam aures internæ) & eadem ferè nec ac oculi locatæ sunt: non tam eius nomine, quod oculos, qui naturâ suâ^d in sublime feruntur, cum in ere consistant, rectius recipiant: quam propter nervos molles in cranio existentes, qui spiritum animam per cerebelli substantiam dispersum auditus sensorio communicare debuerunt. Aliàs enim, cum soni omni aëri ambiendi communicentur, sicque in omnem partem diffundantur, hac ratione aures in qualibet animalis parte collocari potuissent. Antequam enim locari non potuere, cum oculis & aliorum sensuum instrumentis cedere debuerint: oculis qui-

D d d

dem,

sum audiendi obtinent: aliis auriculae sunt, aliis desunt, meatu^q præterea ipsi audiendi, ut ita, qui pennâ aut corne, squamâ aut integumentis: at ea, quæ animal generant, omnia auriculas habent, excepto vitulo marino ac delphino, Aristoteli. l. c. & 2. part. an. 15. aures meatuum tantum auditorios habent: quod enim cutis earum durior sit, nec pilis, sed pennis integantur, ideo materia carent, ex qua auricula cre-

atur: quadrupedes etiam animal parientes (Gaza mali ὠτόρα ouipara pro ζωο-
να legit, quod ex 1. hist. anim. 15. probatur) & cuticula eodem modo se habent.
vitulus marinus inter ea, quæ alias pariunt cavernas, tantum habent ad audien-
dum, ut pote quia manca sit quadrupes: & 5. gen. an. 2. quia quadrupes ζωοτόρον
Gaza ore purum vertit) aures non habet, sed tantum meatus, quia vitam in hu-
ore traducit. Pisces, quâ parte audiant, à nemine penitus exploratum est; an e-
m foramina ante oculos posita ad audiendum, an ad odorandum data sint, am-
gitur. Verum quæ oculis carent, carent & auribus, ut mytili, ostrea, & omnia
ira testa intecta, in piscibus respirantibus, & pulmonem habentibus, ut balenis,
delphinis, vitulis marinis, aures haud latitant, quamvis meatus exterior inuesti-
gari difficilis sit, Placent. b Gal. de instrum. odorat. 2. c Aures, si haberent au-
ricularum cavitatem aer perpetuo incidens volatum remoraretur quemadmodum
ventus aduersus, veli concavum tangens, navim retardatur. d Cicero 2. de nat. deor.

t Arist. 2. par. anima. 10. voluit sensum quo quo versum diffundi: aures, ait, orbem capitis aquis portionibus se cant, tenentque medium: auditur non modo per directum, sed undique. At Galen. 10. v. part. 8. non ex omni parte audibilia audiendi censuit.

f Auditus eius sensorium & aures (notat in Græco & ἀνθρώπων αὐτίς, ἡ τοῦ ὠτοῦ, vertit Galen. eiusque partem sensoriam, id est, aures) à latere quidem eodem in orbe, quo oculos Aristot. 1. hist. 15. quadrupedum non aures posita posterius sunt, 1. hist. 11.

dem, quibus hic locari par erat: siquidem per directum videamus: at non modo ^e per directum, sed etiam undique auditur. Ori vero, quia hic locus, si competebat, partim ut in eos, quibus cum loquimur non solum oculos, sed etiam os conuertamus: partim ob faciliorem cibi potusque assumptionem, quo manibus rectâ ori ea offeramus. Naso, quo odor ciborum & potus rectâ ad ipsum pertingat, quo odorem exquisitius percipiamus, & an bonus, malusne sit, prompte & optime diiudicare queamus. Non in occipite locatæ, cum in eam partem nervi non ferantur. Nec in capitis vertice, ne cum caput pileo tegere oporteat, simul & aures tegantur, sicque sonorum ingressus impediatur. Sed ^f à lateribus capitis, vel faciei, tempora è regione oculorum occupant, & quidem in homine immobiles; at in quadrupedibus in summo capite, cum ferè semper capite sint ad terram inclinato, victum quærentes, & mobiles sita sunt.

Figuræ sunt rotundæ seu semicirculares, [tabul. 22. fig. 1. F. tab. 23. fig. 1. tab. 24. fig. 1. b b.] quia rotundum ab iniuriis omnium est remotissimum, & quo essent capacissimæ: extrinsecus conuexæ, intrinsecus antri in modum cavæ, quibus cavitatibus conuexitates respondent, ne, quid ex inopinato intro irruat, neque aures facile afficiantur.

Ab his enim anfractibus, tanquam corporibus concauis, non solum aeris irruentis sonus prompte exacteque hauritur, & intensissime excipitur, sed etiam

Simia aures mediam positionem inter bruta & homines obtrinuere, cum animal sit medium inter hominis figuram erectam, & quadrupedi pronam: cui etiam non omnino immobiles, ut homini, neque mobiles, ut brutis, sed exiguo motu prædita, & paulo altius, quam in homine posita. Aquapendens & Placentinus.

g Supra rotunda, & infra in pinnam desinit, Columb.

tam refrangitur, ac pilæ instar recurrit: ex qua circulari refractione harmonia ad tympanum citra molliam pertingit, & acutius, fortius ac distinctius ac-
 ti interno imprimitur, & diutius quoque sonat, quemadmodum in conchylis^h auribus ad motus fieri experimur, & nervo auditorio exactius offer-
 ur.

Hoc ostenditur, primo eo, quod soni in concavis lurisque corporibus exactissime recipiantur. Deinde etiam, quod iis, quibus hæc pars abscissa est, ob-
 use, confusa ratione, & murmure soni, articulatae voces fluentis aquæ, aut resonantis cicadæⁱ in mo-
 um offeruntur: imo & alterius auris non abscissæ audiendi facultas perturbatur, nisi auris abscissæ fo-
 rumen occludatur, Arantio monente. Sic & surda-
 ri, quo accuratius audiant, manus cauas à postero-
 bus ad anteriora spectantes, obtendunt: cum & au-
 um ciuitates antrorsum spectent; quò animal ad
 onum accipiendum occurrat: quod^k Hadrianum
 nperatorem fecisse legimus. Quamuis & hæc aeris
 rfractio utilis sit, ne aer frigidior, vel immensi soni
 ibito irruentes offendant.

Magnitudine variant: in aliis enim maiores, in aliis minores sunt: magnitudini sui corporis proportionem respondentem; quamuis etiam à calore vitali
 eherentiore se inuicem superent: hic enim insi-
 nis, quandoque magnas ac insignes aures efficit: at-
 amen aliorum animalium respectu parua, tum ad
 rnatum, tum quia caput pileo, galeis^l aut aliis tegu-
 mentis tegendum fuit: quare si magnitudo ea, quæ
 in brutis est, etiam in homine fuisset, plurimum ob-
 uisset; tam magnæ tamen sunt, ut adsoriare, & me-
 um operire possint.

Geminæ factæ sunt, non tam, ut vna læsa, al-
 era frui possimus, (quamuis hæc magna sit com-
 modi-

^h Referunt,
 Scribitur propter
 frigoris aures
 commoti, &c.

sic quam plu-
 rimis auditu
 la diquinare, ut
 melius audiant,
 cochleæ
 testam auri-
 bus.

admovent, ut
 in concavitate
 facile con-
 clusus aer sus-
 cipiatur, A-
 quap.

ⁱ Arantius,
 Lauren.

^k Arián. Ro-
 manorum co-
 sul testis est lo-
 cupletissimus.

Ga. 11. vs. par.
 12. in latino
 habetur Ha-
 drianus.

^l Galen. 11. vs.
 part. 12.

moditas) quam ob sensus necessitatem, eiusque perfectionem.

*m Vesal. in-
xamin. vanni
instar expan-
sa. Plat. &
Placent.*

*n Sub audito
rio meatu par-
ticula pinguis
ab aure suspē-
sa, fibra est seu
auricula: su-
perior pinna.*

*o. i. hist. an. ii.
ὦτος δὲ μέγας,
τὸ μὲν ἀνώτε-
ρον: τὸ δὲ, λο-
βος.*

*qua ver-
ba ita vertit
Gaza, auris
pars exterior,
cui nomen au-
ricula, parte*

*cōstat superio-
re, pinna, in-
feriore, fibra.*

*p Introdūct.
& Ruffo.*

*q Ciceroni ad
Q fratrem, li-
bro 2. cui &
ansa auricu-
la, qua pars in-
verecūdia ru-
bere solet;*

Laur.

& Ruffo.

Diuiditur tota auris, quæ vannum^m refert, ad i-
mitationemⁿ auctoris introductorii, in partem su-
periolem & inferiorem: superior, quæ dura & erecta
est, quam sine nomine Aristoteles^o reliquit: eius ve-
ro interpres, auris externæ, quam auriculam nomi-
nat, partem superiorem pinnam vocat, [*tabul. 22. fig.
III. tab. 24. b b.*] tam propter formam, quam vsum:
propter formam, quia si conchæ generi, quæ pinna
dicitur, similis est: propter vtrunq; vero, nam quem-
admodum pisces pinnis innatant, & earum ope in-
natando remorum loco vtuntur: sic & hæ capiti à la-
tere adhærent, quo sonos & voces detineant, ne ad
caput appulsi, priusquam aerem internum moueant,
aberrant; Eandem ob causam etiam ab aliis περιύω-
μα Pala, dicitur, latior est, quo ab eâ maxime parte
soni excipiantur, qui dein deorsum per helicen, quæ
ad aeris circumuolutiones adaptata in concham, in-
deque in meatum auditorium excurrant. Inferior ab
illa propendens & mollis [*tab. 22. fig. 1. E. fig. 2. K. tab. 24.
fig. 1. a.*] λοβός, ὅπου τὴν λαμβάνειν, quod eam partem ap-
prehendamus, cum quempiam admonemus, & hæc
forte ratio, cur auris memoriæ consecrata sit: Lati-
nis fibra, lobus & auricula^q infima: quâ in humano
corpore nil mollius est, aut flexibilius, cum nec esse
rigeat, nec cartilagine durescat, neque nervis inten-
datur: quare sine magnâ molestiâ perforatur, & or-
namētis appensis ornari solet: cuius vsus, excremen-
ta, quæ ex auribus fluunt, deorsum deriuare.

Quod totam auris circumferentiam externam
ambit, à tortuositate ἑλῖξ, capreolus, quod capreo-
lum seu clauiculam vitium referat [*tab. 22. fig. 1. FF. ta-
bul. 24. fig. 1. b b.*] interior ambitus priori, quasi oppo-
situs, in cuius medio cavitās [*tab. 24. fig. 1. c c.*] ἀνθέλιξ

f dici-

ſ dicitur: quibusdam ^τ à similitudine, ſcapha. Cavitas ^{ſ Polluci σκά}
 magna, quæ ab illâ ferè circumſcribitur [^φ *tab. 24. fig. 1.* ^Φ
^α *κόνχη*, concha, quod conchæ inſtar anfractuosa
 fit, nominatur: Hæc auris externæ pars præcipua eſt,
 & magna, cum ſonum vniuerſum, qui vagus per he-
 licen ferebatur, colligere debuerit; hæc verſus mea-
 tum auditorium exacuitur, quo ſonus ei ſubito offe-
 ratur. At cavitas iuxta meatum auditorium, in qua
 velut in alueo ſordes ſubflauæ, amariffimæ colligun-
 tur, imo aliquando adhærent ^τ *κυψέλλη*, ſ aluëarium ^{τ Idem cum}
 nominatur, & ſordes *κυψέλλίδα* Aphrodiſæus ap- ^{meatu audi-}
 pellauit. Conchæ oppoſita & adnata eminentia [^{torio eſſe vult}
^{Placent.} *tab. 2. fig. 2. L. tabul. 24. figura 1. e.*] verſus tempora, quæ te-
 ti modo ſupra meatum auditorium elata eſt ^u *πρά-*
^{u Ruſſo &}
^{Polluc.} *γος*, hircus, quia in hac parte pili creſcant, qui in ali-
 quibus rigidi & denſi hirci barbulam imitantur: pars
 iuic oppoſita, cui auricula infima appendet, & quo-
 que piloſa eſt [*tabul. 24. figura 1. f.*] *ἀντίπρασγος*, vtriuf-
 que uſus, concham efformare, & ne ſordes à tempo-
 ribus in meatum illabantur, impedire: Inter hæc
 luo, quaſi ſulcus excauatus eſt, & quaſi dimidiatus
 orbis efficitur, qui *Ζυςῆρ* Herophilo, & *ἐχινίχος* Pol-
 uci dicitur, per quem tanquam riuulum vel ſulcum
 lecliuiorè aurium excrementa, ſiue pus, & alia quæ-
 is fluxilis materia, in conchâ collecta expurgetur,
 ed plura de partibus externis cupienti librum no-
 trum de partibus externis, conſulat.

Vſus totius auris ^x externæ, quæ vanni inſtar ex- ^{x Nam ut la-}
 canſa eſt (non enim ſolum ornatus gratia, ſed etiam ^{pi in mediam}
 ut clæ cauſa creata) ſoni ſpecies per aerem vagantes ^{aquam putei}
 um acre intercipere, & tanquam in ſinu colligere, & ^{quieſcentē de-}
 iectus, hunc

Ddd 3 in in orbes ſibi
 ſuccedentes ſpecialiter maiores euadentes: ita res vocem ſonumq; colentes, aerem
 nouent in orbes ſibi ſuccedentes, ita ut qui rei ſonum edenti, ſunt vicini, ſint par-
 ti, reliqui proxime ſuccedentes proportionē ſpecialiter maiores euadūt, quoad per-
 veniant ad aures, in quas impingentes intro in meatū auditorium ſubeunt: alioqui
 rater lapſi, laberentur atq; errarent, nec auditio fieret, aut certe male fieret, Arch.

infundibuli latioris instar excipere: (quare varii canaliculi ad foramen desinentes impressi, quo sonos circulariter motos intercipient) per anfractus ad auris meatus ducant & ipsius impetum, ne cum violentiâ subiens, tympani membranulam lædat, viæ obliquitate exsoluere: & si forte meatum ^u auditorium præterlapsus sit, à parte posteriore repulsus, antrorsum versus cavitatem feratur. Nam cum meatus à lateribus sit collocatus, facile sonus ipsam præteriret: & cum is à parte posteriore antrorsum vergat, & nos antrorsum moueamur; si nihil à parte posteriore obflaret, difficulter audirem⁹, appulsæ enim voces meatum præterlaberentur: (hinc bruta animantia naturæ instinctu aures ad sonos vocesque circumagunt) & quo his vsibus commodius inseruiat natura eas ex cartilagineâ substantiâ efformare voluit, quo semper promineret: & nisi obstetricû & nutricum ligaturis, nec non longo decubitu super latera, aures deprimerentur; exterius magis prominerent, & sic sonos melius interciperent, quare exactiore auditu præditi essemus.

DE PARTIBVS AVREM EX-
ternam constituentibus.

CAPVT XLV.

AVREM externam duplices partes, communes & propriæ constituunt: communes, cuticula, cutis, membrana neruea, caro, & pinguedinis aliquid in lobo: propriæ, muscoli, venæ, arteriæ, nerui & cartilago.

Cuticula libro primo explicata fuit, quemadmodum & cæteræ partes communes, quæ hîc etiam non nisi ab humorum acrimoniâ, aut igne, pabulâ abortâ, à cute diuelli potest: quæ cutim inuestit, vt eam le-

uissi-

uissimam ac maxime politam reddat, eamque cum sensus exquisitissimi sit, ab iniuriis externis tueatur.

Cutis tenuissima est, in auris tantum gibbo latere crassior, in conuexo, & quo auditus foramini vicinior est, tenuior existit: hac & foris & intus vndique aures inuestiuntur, quæ carni paucissimæ, & cartilagini validissimæ & firmissimæ adhæret, quo auris superficies, interior potissimum, perpolita sit, ne corrugari aut inæqualis reddi (quod ad decorum quoque facit) possit, ne soni receptio impediatur, cum ad soni receptionem & resonantiam leuitatem facere a Aristoteles testetur: quare & meatus auditorius, cutis lenis, dura, tenui, ac perpolitâ, quæ valide admodum adhærescit, quemadmodum & membrana neruea, quæ cum totum corpus inuestiat, & auriculam ambiat, sed cuti, quemadmodum in volâ manus validè connexa. Quæ vero auriculam inferiorem pendulam succingit, cum membranâ & carne adeo commixta est, ut ab iis recte separari non possit; quare cariosa, & etiam subpinguis ac fungosa existit.

Vasa obtinent: Venas quidem à iugulari externa amulos tunc inde dispersos [tab. 22. fig. 1. D D D.] deinde à iugularis internæ caluariæ basin ingressæ, ramo graciliore per ossis temporum foramen quartum, quamuis etiam ramulus ad auditus organum, & in cavitatem primam mittatur [tab. 11. fig. 13. n.] quæ sanguinem pro nutritione partium contètarum, & foris aures quoque congeniti, deuehunt. Venas enim in hanc cavitatem, & ad membranulam ferri, probatur dissectione eorum, quæ ex inflammatione cerebri & aurium interiøre: meatu enim auditorio dextere aperto, venulæ in membranulam conspiciuntur, quæ in non inflammatis non apparent, eo modo, quo in oculis fieri monuimus. Arterias à carotidis ramo anteriore; arteria nimirum secundo, & exteriori ver-

a 18. Probl. 7. *quærit, ut domus nuper illita magis resonet: id refert in leuitatem, quæ à densitate prouenit.*

b De aurium venis, Hipp. 1. de nat. hom.

TABVLA XXII. Fig. 1. Cutim capitis cum pin-
 guedine, glandulis auribus subiectis & musculis occi-
 pitis & auris exhibet. Fig. II. Musculos aurium,
 superciliarum & maxillæ aliquot
 proponit.

FIG. I.




FIG. II.



fus auris posteriorem regionem [*tab. 12. lib. 2. o.*] que
 partes illæ, imo & aer congenitus vita fruuntur. Ner-
 e 16. vs. par. 6. uos^c duos minimos à posterioribus, duos à laterib
 ex spinali me- à secundâ medullæ ceruicis coniugatione, qui tamer
 dulla colli, ner omnes exigui sunt, p cutim ad sensum tactus & mu
 uos sursum du sculos, quando adsunt, ad motum disseminatos.
 cere ipsam non

piguit, magnos quidem in ceteris animantibus, quibus & temporalis musculus el
 maximus, atque aurium substantia magna est, facileque ac multum mouetur: o
 mnino autem exiguos iis animalibus, quibus nihil horû inest, ut homini & simia
 nam & musculus temporalis iis est exiguus, & aurium substantia fere immobilis
 quod ipsorum quibusdam ea sit minima, hac Galenus.

DE MUSCULIS AVRIS

externæ.

CAPUT XLVI.

Galen. 11. vs. part. 12. & 16. vs. part. 6.

a Aures ra-
 tione muscu-
 lorum mouen-
 tur 7. Plac. 8.
 Vesalius uni
 us meminit
 tantum, primi
 buccarum &
 labiorum, qui
 in quibusdam

AVRES etsi homini ferè semper immobiles
 sint, ita ut in paucis motus sensu deprehenda-
 tur, attamen vim motricem hominum auriculis in-
 fluere, & musculi, quorum actio est motus, & nervi,
 qui circa aures communiter obseruantur, compro-
 bant. Quod vero motus hic rarus, & sensibus minus
 sit perspicuus, causa triplex est, vel quia aurium mu-
 sculi
 hominibus & simiis in auris radicem inseritur. At Columb musculi aurium raro,
 imo quam rarissime inveniuntur duo; alter à buccis, alter à mamillari processu,
 qui in brutis semper conspiciuntur. Musculi auricularum tres Fallop obseru. Plat.
 (qui & quartum addit) Laurentio: Pauci Anatomici, quot & qualibus muscu-
 lis moveantur, scriptum reliquere, & à nullo omnium mentio facta. Pleriq; Ana-
 tomici nullam mentionem fecere, quod eorum oculos subterfugerint: alij quidem,
 quod ex tenuissimâ membranâ carneâ fibrarum musculosarum conspersione con-
 gementati sint, & sic facile exsiccentur; interdum pinguedine obliti, sub hac tâquam
 inuolucro latitant: alij, quod sub auricula ligamêto occultati sint: hac causa quod
 à nemine, me sciente, qui anatomica scribere, cogniti sint. Mihi nunquam hominis
 caput contigit, cui omnes defuerint. Obseruauimus pauciores quam sex, semel sex, plu-
 res nunquam, quorum unus communis, reliqui proprij in ijs animalibus, que au-

rich-

sculi exigui sunt (ita vt Galenus^b delineamenta que-
dam musculorum appellârit) & neruorum filamenta
exigua habent, sic vt spiritus motorii copia sufficiens
non influat; vel quia, si mouerentur, auditio depra-
uata fieret, præsertim cum parua sint: quare capitis
notu velocissimo ad sonum recipiendum, quoquo-
uersum moueri possunt, cum in^c quadrupedibus, cū
maiores habeant, & non ita expedito capitis motu
int, mobiles existunt, quo omni ex parte^d sonos re-
cipiant: licet ijs & muscas abigant, quas homo mani-
us abigere potest; vel quia nimis breues sunt, & au-
es cartilaginosa, quo minus muscoli, & neruorum
muli expandi possunt. Quare nunc musculos auri-
cularum in homine explicemus, quorum inuentio
allopio debetur. Sunt autem duplices, communes
& proprii, in ijs, in quibus aures manifeste mouen-
tur, recte conspiciui.

Primus^e communis est auriculæ, & vtrique labro,
est portiuncula illius, qui primus inter genas, & fa-
ciei cutim mouentes numerantur, qui πλάτυσμα
ὠνδὲς, [tab. 26. fig. 1. T.] & quadratus dicitur: hic ali-
uando carnosus redditur, & suis fibris ascendens in
iris radicem [tab. 26. fig. 1. O.] sub fibrâ inferitur, &
eorsum in hoc vel illud latus trahit: latus est, tenuis
& figuræ quadrilateræ.

Alter^f qui proprius est [tab. 26. fig. 1. iuxta B. tab. 22.
fig. 1. erat, quod nos

misset, si mobiles ac versatiles essent. c Aristoteles dicit. equos, asinos, canes, & re-
qua animalia omnia, quæ magnas aures habent, eas semper circumagere, ac ver-
re ad sonos ac voces, vsum partium à natura edocta; at hominibus magnitudo
inta incommoda esset, Gal. 11. vs. part. 12. d Sic enim melius vndiq; strepitus cir-
emacta excipiunt, Arist. 2. part. anim. 11. e Quibusdam hominibus, ut & simis
uus beneficio aures mouentur, Vesalio: primus musculus à buccis in auris pinnam
olumb. musculus tertius aurium, Fallop Laurent. Musculus communis inferior
urem mouens, Plat. Musculus auricula communis, Placept. f Musculus 1. auris,
allop. Laurent. musculus priuatus aurium anteriore, Plat. quem videtur in duos
iuisse, alter à parte musculum priuatum, alterum musculum communem supe-
orem faciendo: Muscula propriorum primus, Placent.

riculâ carent,
cutis meatum
auditoriū am-
biens, & auri-
cula vicē ge-
rens, musculos
habet, vt an-
ser, gallus in-
dicus, Placen.
Musculi aures
mouentes ha-
ctenus mihi
nō sunt obser-
uati in homi-
ne, sed canibus
& caudatis
simis, Vesal.
in examine.
b 16. vs. par. 6.
& 11. vs. part.
12. aut nihil
omnino mo-
uetur in ho-
minibus, aut
exiguū quen-
dam atq; ob-
scurū habent
motum: cum
enim parua
sint, parum o-
mnino, aut
prorsus nihil
erat, quod nos

g suo fine in e-
am partē, qua
fibra opponi-
tur, & princi-
pium eius, qua
susne auricu-
la vocata est,
inseritur, Fal-
lop. obser.

h Musculus se-
cundus à mām-
millari proces-
su, Col. Musc.
z. sed nō à mām-
millari proces-
su, ut aliqui o-
pinati sunt,
Fallop. musc. z.
Lauren. Plac.
Musculus pri-
uatus posteri-
or supra mām-
millarem pro-
cessum, Plat.

i Hi saepe nō re-
periuntur: quo-
tiescunq; autē
ij, qui in occi-
pitio siti sunt,
reperiuntur: si-
mul & hi ipsi
us auris mani-
feste reperiun-
tur, Fall. obser.
Præter hos se-
mel unum tām-
rū, semel præ-
ter hūc adhuc
duos, sub auri-
cula vinculo
latitantes re-
peri, Placen.

fig. 1. B. B. fig. 2. A.] in anteriore parte situs, musculo tē-
porali superponitur, & à frontis muscoli fine supe-
riore, & extremo, quō temporali contiguus est, ori-
tur, qui versus aurem descendens angustior reddi-
tur, & tendinosus in auris superiorem & partem infe-
ritur: hic tenuis est, cum ex carnēa membrana carne-
is fibris conspersa, ut & cæteri aurium muscoli pro-
ducatur, & temporali multo minor, & ex rotundita-
te oblongatus est. Huius vsus aurem ad superiora &
anteriora trahere.

h Tertius [tab. 26. fig. 1. iuxta O.] ab occipitio, & mu-
sculorum occipitii inuolucris, supra mammillarem
processum oritur, ubi muscoli caput, & scapulā mo-
uentes desinunt: hic principio angusto exortus de-
orsum per transversum fertur, & paulo latior reddi-
tur, ac si in duos vel tres digitos diuideretur, auri po-
sterius implatur, ut illam ad posteriora, & aliquan-
tum altiora trahat. i

Quartus, nonnunquam sub ligamento cartilagi-
nis auris, substantiā quadam latā, carnosa & fibrosa à
mammillari processu prodiens, in progressu angu-
statur, donec in tendinem abeat; qui in totam radi-
cem cartilaginis auris [tabul. 22. fig. 2. H.] infigitur, &
quidem portione vnā supernè, alterā mediā, & tertiā
infernè. Hinc Placentinus laboriosissimus Anato-
micus, ex hac massa tres fecit [tab. 22. fig. 2. B C D E F G.]
ratione insertionis musculos, quos tamen ex vno lo-
co, & quidem confusos, prodire asserit.

DE CARTILAGINE AV- riculæ.

CAPVT XLVII.

De hac Galen. 11. vs. part. 12.

A Vriculæ substantia [anterior auricula facies exco-
riata, tab. 23. fig. 1.] nec ossea, nec carnea, sed in-
ter hæc

ter hæc media esse debuit: si enim ossea fuisset, vel ex osse tenui, vel crasso constaret: si tenui, tum leui de causa, & facile^a frangeretur; si ex crasso & solido, capiti oneri fuisset, & rebus foris ingruentibus non cederet, & earundem vim exsoluere non posset. Si vero mollis esset, vt caro, in seipsam concidens ad formandas cavitates inepta foret, nec fornicis vel conchæ, aut cavitatis figuram seruaret, nec sonum recepisset, (cum sonus ad durum firmitur) sicque aeris ingressus prohiberetur, & facile contunderetur. Quare ex substantiâ mediocriter molli, mediocriter dura constare debuit; quo ob mollitiem mediocrem, in omnes modos flecti, & corporum incurrentium occursum cedere possit, quo minus cõtusioni & rptioni subiiciatur: ob duritiem vero mediocrem expansi, erecta manere, & semper patere potest & debet, quo aerem cum sonis colligat, cum sensus^b is etiam formientibus necessarius sit, vt à somno excitentur; Dein, quo in eâ cavitates & anfractus creentur, ne dictæ voces labantur: nam, dum sonus per^c cavitates excurrit, vires acquirit: & sic ex ipsa refractione, harmonia & inodulatione adepta, ad membranam citra tristem sensum pertingat. Et quia mediocriter dura, idcirco sonora, sicque sonus melius recitatur & formatur, nec echo excitatur, nec idem, quod cum cochleæ testâ auribus admotâ fieri solet, contingit, vbi exiguus sibilus, ac velut æquæ decurrentis sonus in auribus auditionem turbans, excitatur. Quare cartilagine constat [tab. 22. fig. 1.] vnica, aque flexibili, cute tenui eaque pertinaciter obdura, quæ veluti è temporibus educitur, à quibus plus minusue recedit. Enascitur enim ex orbiculo^d [tab. fig. 9. 7.] forâ minis meatus auditorij, quod in osse temporum celatum est, & in circumferentiâ exaspetum, quo promptius educatur, estque^e ad exortum

^a Arist. 2. par. an. 9.

^b Hoc sensu semper egemus. Cicero 2. de Nat. deorum. ^c Arist. de audibilibus.

^d In brutis duobus pluribusue circulis membrana nervu inuicem copulatis è foraminis auditus orbiculo prodignata est, Placent. ^e Vesal. Col. Placent.

tum crassior & durior : crassior , quo radice firmiore nitatur : durior quoque ab ossis temporis, vnde procedit, vicinitatem, & quo longius à capitis osse recedit, eo mollior & tenuior euadit.

Ligamento quoque valido hæc cartilago ossi petroso alligatur [*tab. 23. fig. 2. CCC.*] quod à pericranio, vbi versus processum mammillarem tendit, aliquot propaginibus exoritur ; quæ vbi ad aurem peruenere, in vnum ligamentum coeunt, superiori ac gibbæ auris parti se inferit, quo cartilaginem erectam & suspensam teneat. Cartilago hæc auditus meatui opponitur, quo ipsius ope foramen longius extendatur, ac latius pateat, ad sonos promptius percipientes.

DE AVRE INTERNA.

CAPUT XLIIX.

AVRIS internæ partes plures sunt, foramina seu ductus quinque, cauernulæ tres, ossicula tria, membranula tympani, musculi duo, nervus à quarto & quinto pari, vena, arteria & aer congenitus, quæ omnia Os vnum, petrosum dictum, continet.

Est autem os^a petrosum [*tabul. 3. figur. 9. f. a.*] processus tertius, & interior ossis temporum, quod ab auris meatu inter processum mammillarem, & processum ossis iugalis, oblique antrorsum ducitur, & in caluariæ interiore basi [*tabul. 24. figur. 2. ab a. F. versus C. & ultra*] inter os sphænoides & occipitis protuberat, ita vt in caluariâ interiore magis conspicuus sit. Processus hic quoquo modo^b rotundus est, quo aeris congeniti maiorem copiam cõtineat, oblongus, iugis in modum extensus, propter nervum auditorium, qui cum post opticum molliissimus sit, absque

sustent-

*a Os prærupta
rupi simile,
Ves. temporii
ossa ad basin
anfractuosa
sunt & aspe-
ra, rupes imi-
tantia, vnde
Λιδεσθι, Col.
processus petro-
sus, & interi-
or ossis tempo-
rum, Fallop. os
petrosum, Pla.
Processus quar-
tus ossis tem-
por. Placen. os
lapidosum vel
petrosum lon-
go ductu quasi
ptenebratum,
in cuius extre-
mo corpus ae-
reum princi-
paliss. auditus instrumentum locatum est, Arch. b Forma in simia prope ad hu-
manam acced, in aliis brutis, quam longissime distat, Volscher.*

sustentaculo longe à cerebro sine rupturæ periculo
 ferri non potuit; quare hoc os introrsum produ-
 ctum est, quo statim neruum extra cerebelli substan-
 tiam productum tuto excipere possit: dein hæc pro-
 ductio prolongata est, vt canalem accommodatum
 consequatur, per quem vel venæ iugularis ramus,
 vel arteriæ carotidis ad cerebrum deferatur. At, vbi
 à temporum osse prodit, latior & crassior est, quo il-
 li anfractus & cavitates imprimi queant; sensim pro-
 cedens in acutum desinit, vbi vena vel arteria cere-
 brum ingreditur; & sic totus processus pyramidis ^b
 figuram refert [*tabul. 24. figura 3.0.*] Hic insigniter
 durus est auditus organi causa, cum quouis osse du-
 rissimo durior sit, quare os *λιθωειδές*, petrosum seu
 lapidosum ^c dicitur: nonnullis, qui temporum ossa
 lapidosa nominant, lapidosorum ossium processus
 interior appellatur. In infantibus os labyrinthi no-
 minari, supra, capite sexto ostendimus, in quibus ab
 osse temporum separatus ^d existit, & ductu meatum
 auditorium in adultis efformante, mediâ ex parte
 caret, cum meatus hic in infantib. totus adhuc carti-
 lagineus, ab osse petroso distinctus reperiatur. Qua-
 re cum eo ductu caret, in infantibus sine ossis fra-
 ctione, tympanum & eius membranula, & circulus
 osseus membranulæ affixus statim in conspectum se
 offerunt: at vbi corporibus augeſcentibus exſiccantur,
 ossea fit, quemadmodum & meatus auditorius,
 & os petrosum, ossis temporum parti squammosæ,
 cui subſternitur, arctissime coalescit, vt illud huius
 processus esse videatur. Huius consideramus par-
 tem externam & internam: externam, quatenus vel
 intra cranium, vel extra cranium conspicitur. Exter-
 na pars intra caluariæ cavitatem, crustâ densissimâ &
 durissimâ, dentium substantiæ duritiæ omnino simi-
 li, obducitur; superficie est, nō vt extrinsecus, asperâ,
 sed

^c *Auditus sa-*
dem, quia au-
ditui inferuit,
appellabimus,
vocatur & au-
ris, & propter
obliquum du-
ctum σκολιός
πρόσ τῆς α-
κοῆς, meatus
obliquus, Vol-
cher.

^d *In brutis ossi*
temporum ita
affidet, vt non
solum in iuue-
nis, verum et-
iam in proue-
ctiorib. facilli-
me separari;
& in duos par-
tes diuidi pos-
sit, Volcher.

e Perforatum quoque est, quo aer sonorum speciebus informatus subire possit. Siquidem ad ea sentiendi organa, quae in tr. caluam continentur, necessarii ductus, atque canales requiruntur, quemadmodum etiam in olfactu, quo aer rerum odorabilem & audibilem simul lacra gerens, ad instrumentum principalissimum, & olfactus & auditus penetrare possit: quare ut nares propter odoratum, sic os petrosum perforatum propter auditum creatum fuit, Archang. f Ductus secundus organi auditus, Plac. g Sextum temporum, quartum auditus, Plat. h Fallop.

sed leui, eaque inæquali, cum in ipsius longitudine medio extuberet, propter ossicula auditus, quæ e loci continentur [tab. 24. fig. 2. inter n. & E. humilium] (etiam superne, linea acuta & aspera per ipsius longitudinem ducitur, quâ in duo latera diuiditur, & anteriùs in acutiem asperam definit [tabul. 24. fig. 2. à versus d.]

e Foramina duplicia habet, alia intra, alia extra caluariam: intra caluariam duo: quorum ^f alterum in processus facie posteriora respiciente [tab. 4. fig. 10. tab. 24. fig. 2. à d. ad e.] quod oblique extrorsum ad processus sedem ferè mediam procedit: amplum est sat ac patens, leue ac subrotundum in ingressu, ac velut in sedes duas sensim dilatatum, in quod neruus auditorius implantatur, & pro temporum foramine septimo recensuimus.

At sinus hic in puerulorum ^h ossibus breuior est & antri cuiusdam sinuati, vel etiam porticus speciem habet: in adultis vero osse aucto, formâ priore relicta, meatus seu cuniculi formam recipit: cum paulo post ingressum (quod etiam citra dissectionem ossis in cranio occurrit) in profundo foramina duo conspiciantur, quæ in sinus seu canales duos, superiorem & inferiorem abeunt [tab. 24. fig. 2. ef.] in quos neruus diuisus fertur: Alterum foramen elatius est, & manifestius versus meatus auditorii sedem superiorem, & oblique extrorsum ad processus mediam ferè sedem in canalem, qui Aquæductus dicitur, fertur: [tab. 23. fig. 3. H.] & à secundâ & terciâ cavitare, squamâ tenui tantum dirimitur, & nerui maiorem portionem deducit [tab. 24. figur. 2. e.] de quo in cavitare primâ acturi sumus. Alterum foramen humilius est, exilius, modo simplex, modo geminû in meatus sede interiore & nerui propaggines exiguas in cavitatem secundam & tertiam deducit [tab. 24. fig. 2. f.]

Foramen ⁱ alterum [*tab. 24. fig. 2. 7.*] in processu atere anteriore angustum admodum, & rimulæ modo asperum, per quod arteriola ab auditus organo ad caluariam fertur; & hoc pro octavo ⁱ enumeravi-
nus.

Foramina extr. caluariam tria habet: ^k primum, quod pro temporum primo recensuimus) in me-
um auditorium [*tab. 3. fig. 9. 7. tab. 24. fig. 2. 22.*] qui *πρό-
σθεν* ^l dicitur, ab it. Meatus hic propter cartila-
inem ad initium extensam & ampliata, amplum
uoque orificium nactus est, quod cauernulam re-
ert, & inter processum mammillarem & ossis iugalis
artem fertur: in puerulis ^m quidem totus, quasi car-
laginosus, in adultis media ex parte cartilaginosus,
artilagine ab auris cartilagine enatâ, & media ex
arte osseus, nam ex osseo circulo ossis temporis e-
ascitur: siquidem in primâ formatione instar annu-
ossei, à temporum osse, cartilagine intermediâ [*tab.
fig. 5. & 7. f.*] propter membranæ tympani exor-
um, distinctus est, quemadmodum caluariis ⁿ pue-
orum ad septimum ferè mensem coctione seiungi
otest: in cæteris vero exsiccat, & crustâ oblitera-
ur, ita ut per symphasin committatur, & annulus seu
rculus osseus, de quo capite sequenti, à meatu præ-
icto non amplius distinguatur, sed reliquo ossi vni-
is, parumque angustatus tubulum [*tab. 24. fig. 2. 11.*]
u canalem oblongum, & aliquantulum rotundum,
uo plus aeris excipiat, & sono aditus maior pateat,
um iam angustior redditus sit, & osseum constituit:
ui intro ad membranulam tympani vsque [*tab. 24.*

Eee

fig: in fine sic ait,

vi meatus auditorius dicitur, non solum vsque ad cerebri duram meningem per-
at, sed etiam nervum contingit, qui in ipsam à cerebro descendit: his verbis vult
rchang. huius meatus longitudinem ostendi. in Volcher. n Fallop. Volch. quod
embranula, qua in prima cavitate est, in formatione principium mollius habe-
at, unde teneretur, Fallop. obser. de in membrana meningis mollior ex cartilagine,
ex osse adipiscitur principium, Volcher.

ⁱ Septimum
temporum, &
quintum au-
ditus, Plat.

^k Primus mea-
tus in processu
petroso, Volch.
temporum 3.

^l & auditus 1.
Plat. 1. cui &
meatus seu an-
trū angustissi-
mum, hinc a-

liqui pro ca-
uernâ primâ
recēsuere; pri-
mus ductus or-
gani auditus.

Placent mea-
tus auditori-
us conchion
appellatus in
cauernam os-

sis lapidei fini-
tur, Eustach.
Primus auris
meatus (4. e-
nim auri in-
terna meatus

tribuit) & ca-
uitas prima;
Laur.

^l De hoc Gal-
lenus in intro-
duct. 10. & 12.
at 6. meth. 6.

fig. 2. ab e. ad c.] fertur, & quidem oblique fursum; & si mauis, ab interioribus aliquantulum declius, & posteriore antrorsum oblique nonnihil in aurem externam (vbi paulo amplior redditur) fertur. Du

Quia species soni per aerem circulariter fertur, quem admodum aqua stagnans (superficies calculo in ipsum proiecto, Val.

ctus obliquus est, & nonnihil flexuosus, quo aer frigidioris confertim irruentis vires exsoluantur, membranulæ & nerui auditorii harmoniâ dissoluantur; dein, quo sonus vehementior appulsus, antequam membranulam afficiat, aeris interno & neruo communicetur, infringatur, & placide contangendo, sonus vehemens infringatur: cum ictus obliquus minus quam is, qui rectâ fertur, offendat; ex ingentie nim bombardarum sono, campanarum maximâ pulsatione & frigore intolerabili aures dolore affici, quandoque membranulam rumpi, vnde surditas sequatur, experientiâ constat. Fertur autem obliquus

p Galenus ii. v. s. part. 12. sic ait. Superest auditui instru mentum, in quo & ipso primû quidem meatus, qui est in osse lapidoso, inuolucrum effecit, ne quid eorum, quæ extrinsecus in cident, ipsi nocerent, de quo flexu abunde ante tractauimus: hac

p à posteriore parte antrorsum fursum, ne facile quicquam contrarium aurem ingrediatur: Et si forte quid extraneum ingressum sit, facilius excidat: Sensum angustatur, & quo aer percussus, in angustum colligatur, quo tanto distinctius audire queamus: dein, quod animalculorum ingressus prohibeatur, & exiguum corporum impetus longe propulsetur; cuius nomine etiam humor biliosus, viscidus, amarus & ceteri loci est, quo tanquam visco capiantur: quare & pili trago & antitrigo infixi sunt. Solidus quoque est & durus, sic enim sonus in transitu ad huius meatum seu canalis parietes osseos & duros vehementius impulsus magis intenditur, quam si membraneus vel mollis esset.

Cute

Galenus. Sunt, qui putant, Galenum hoc loco per inuolucrum membranam tympani intellexisse, sed falluntur: primo, quia ait, se de hoc flexu ante egisse; dein, in Græco habetur ἰλινξ, id est flexum, non στέφανος vel στεγανός, quibus nominibus membranam Galenus 8. v. s. part. 6. donauit: sed interpretes ipsum decipit.

q 32 Problem. 4.

i Cicero 2. de Natur. deorum.

Cute etiam inuestitur, partim, vt sonus obtundatur, qui in nudum os impingens vehementius resonaret, partim, ne ab aere tactus corrumpatur: quare dura est, densa, perpolita & ossi valide connexa. Hic denique meatus in principio & fine, quasi circulum habet, quorum exterior asper est [*tab. 24. figur. 2. b.*] propter cartilaginem auris, quæ ei adnascitur: interiori vero membranulâ tympani adnectitur [*tab. 24. figur. 2. c.*] Vfus huius meatus primarius, vt per eum aer sonum alteratus, ad aurem delatus, in eius conuuium à parte posteriore antrorsum oblique ad tympani membranam deferatur; cum per canales angustos, concavos, læuigatos & duros soni non solum facile, sed etiam exquisitè ferantur. Hoc patebit ei, qui tubulum, quo ad aqueductus vtimur, ad alterum orificium digito percusserit ita leuiter, vt etiam adians nō exaudiat; alius vero alteri orificio aurem adpoueatur, optime percipiet: quia in tubo tanquam loci angusto, aere densato, sonus quoq; vnitur & exauditur. Secundario quoque Natura hoc meatu vtitur, ad bilis cerebri (rarius pituitæ, cum crassior sit) purgationem, quæ per venas ad membranulâ tympani pertingit, & per eam in auris meatum transfluit. In hoc meatu musculus reperitur, de quo in-
a.

Foramen alterum, quod pro temporum ^t quarto censuimus [*tab. 3. figur. 9. V.*] hoc antè iuxta sphaeroidis ossis primum situm est, & priori longe angustius: obliquum est, breue & geminum: venæ iugalis: bolem intromittit, & nonnunquam nerui ^u auditorii ramulum emittit.

Ecc 2

DE Aquapendēs.

Quibusdam huius meatus angustia ad soni intensiōem, & exactiorem eius definitionem facere videtur; at contrarium est, nam licet fistularum angustia exacuat, & intendat sonum, qui in ipsis primum excitatur, attamen, qui à foris per ipsas iungitur, non exacuitur, sed labefactatur & debilitatur, Placentinus.

Temporū 4. & auditus 2. Plat. u Si modo hic elabatur, Plat.

Si aër percussus transierit per locum amplum, diffunditur, dissipatur, & de vi suâ multū amittit: at per angustū transiens, in unū colligitur, & ex illā collectione maiorem vim acquirit, Volck. Idem vult &

DE CANALI QUI EX AURE
in os fertur.

CAPVT XLIX.

Aristoteles 1. hist. anim. 11. & in problematibus.

a Hic meatus
cauerna ossis
lapidei alter
est, inuētu fa-
cilis, à ceteris
tamē aut pla-
ne contemni-
tur, aut negli-
genter prater
mittitur, Eu-
stach. foramē
temporum 4.
Col. 1. Fallop.
temporum 5.
& auditus 3.
Plat. canali-
culus ab aure
ad palatum,
Laur. tertius
ductus organi
auditus, Pla-
cent.

OS S I S petrosi foramen externū tertium, ^a quod
supra temporum quintum esse diximus [*tab. 3*
fig. 9. d.] inter processum mammillarem & appendi-
cem styloidem situm est, & definit in meatum, seu ca-
nalem, qui ab aure in os fertur, cuius Aristoteles me-
minit: primus autem Eustachius, & post eum Volch.
elegantè descripsit. Hic ductus seu meatus canalicu-
lo rotundo per similes est, & calami tenuioris instar
in principio amplius, qui oblique ad capitis basis la-
tus antè interiusque procedens, in foraminum
quatuor medio, totum os penetrat, & perfodit (sunt
autem foramina quatuor, primum sede posteriore,
ubi arteria carotis caluariam ingreditur; secundum
est anteriori sede, per quod quartum par neruorum
vulgo dictum, cranio excidit: tertium, ad extremum
latus, arteriæ in cerebri meningem crassam distribu-
endæ aditum patefaciens; quartum ad latus internū,
fissura, quæ à sphænoide & petrosi ossis partibus ex-
tremis, oblique infra & ante ductis, fit, quo cum per-
uenit, substantiā partim cartilaginea, partim mem-
branosa adaugetur: nam ad fissuram, quæ ossi sphæ-
noidi & temporum communis est, substantiā est car-
tilagineā, & admodum crassā. Parte vero oppositæ ex-
acte cartilago non est, sed veluti membranosa, tenui-
orque reddita. Canalis hic alterius generis substantiā
auctus, inter duos faucium, seu gulæ musculos secū-
dum prædictæ fissuræ ductum procedens, iuxta apo-
physis pterygoeidis radicem, & quidem parte inter-
nā, in narium cavitatem alteram terminatur, & in
palati

palati tunicam crassam prope radicem vuulæ inferiur. At huius meatus extremitas interna, quâ narium cavitatem mediâ respicit, cartilago robusta est, plurimum extuberans, & narium tunicâ mucosâ obducta, & meatûs fini, quasi ianitor præfecta esse videtur. Figura teres non est, sed aliquantulum depressa, angulos duos efficiens; cavitatem latitudine calamû, quo scribimus, ferè adæquat, ita tamen, vt in fine, dulolator sit, quam in principio, & similiter tunicâ mucosa, sed tenui induitur. Cartilaginosus fuit, quo semper pateret via, & ne duritie suâ partes vicinas læderet, sed facile absque fracturæ periculo cederet; deinde tunicâ mucosa^b valuulæ instar obductus, ne semper hic meatus in ore patente sit orificio, sed pro necessitate pateat, aliàs quasi concidat, ne facile mali vapores ex ore in aures transeant. Desinit autem vtrinque in terminum, qui naribus, palato, & huic canali communis est, quo hoc modo os excrementorum crebri commodum receptaculum sit; & quo meatus hic pro necessitate aperiatur, desinit vtrinque, vbi vnus faucium musculus consistit; quare dum fauces dilatantur, siue aperiuntur ab his musculis ad deglutitionem, etiam meatus hic reſeratur.

Vſus huius præcipuus,^c expurgationi inferuire, & aure in os excrementa à capite delabentia deducere, & aerem implantatum expurgare; plurima enim excrementa hîc colligi necesse est, cum cerebrum excrementis abundans impositum sit: & ex his, quæ foras in aure per transudationem congregantur, ad aures multa excrementa ferri, colligere possumus. Si enim tot sunt ea, quæ per densam membranam transudant, quæ tenuissima fuerunt, quanto plura erunt, cæ intus latitant, quæ præ crassitie transudare non poterunt. Quare testatur Aquapendens se sæpius, at præsertim in pueris, cavitates crasso humore, veluti

b Ductus hic cartilagineus est, & quando habet pelliculâ valuula instar, vt ab auro in os excrementis expurgandis pateat aditus, nō autem recurrat, in aurem eadem illius,

Laur.

c Eustachius hunc usum forum tribuit, & masticatorium usum præbat: primus usus, Volentia.

muco, & quidem multo, refertas comperisse, qui per hunc canalem expurgari debet: vel si intus subsistat, vel aurem penitus obturat, vel à calore innato resoluitur, inflatus conuertitur, vnde tinnitus aurium, susurrus, auditus deprauatio & amissio, nisi per canalem hunc expurgetur, quem tamen symptomatice expurgari, curatio docet, quando masticatoriis vitimur. Hinc Medicos notare conuenit in aurium af-

*d Tertia uti-
litas, Placent.*

fectibus internis, masticatoria^d præstantissima esse, cum ab auribus non angustis foraminibus, sed amplissimâ via, materiæ etiam crassæ vel à Naturâ expelli, vel medicamentis, masticatoriorum ope, commo-

e Hipp. 3. aph.

17. Ventus A-

quilo sine ag-

lonaris consti-

tutio, ppter ea

quod sicca est,

& humidita-

tes corporis cō-

sumit, ideo cor-

pora bene mo-

bilia, & me-

lius audientia

facit: austrina

contra auditū

obtundit.

f Primus usus

ac precipuus,

Placent. alter

usus, Aquap.

ad aeris ver-

naculi expur-

gationem nō-

strā cōstruxit.

g 1. histor. 11.

quartam uti-

litatem Alc-

maorum ad-

ieciisse scribit,

Placent.

de expurgari possint: & sic meatus siccissimus ad soni exceptionem conseruatur; cum sicca^e ad sonum recipiendum aptissima sint. Alter vsus ad aeris con-

geniti primum expurgationem, quo clarus, siccus ac tenuis sit: nam & meatus & aer congenitus necessa-

riò sicca conseruari debent: Dein ad eiusdem^f refectionem & absumpti restaurationem, nouus per hūc meatum ex ore suppeditetur; nam cum is à calore in-

terno perpetuo absumatur, per alterius noui regenerationem conseruari debuit: ab aere autem exter-

no hoc fit, quia congenitus ab externo primo constitutus fuit. At aerem ex ore in aures peruenire, &

Aristoteles^g & experientia docet, quod inter oscitandum fit (cum ore valde patulo fiat) cuius indicium, quod in auribus strepitus excitetur; sic dum

nares emungimus, dum spiritum vi cohibemus, aerem aures ingredi semper percipimus, sed cum quadam aeris implantati perturbatione, quia pulsu intrò fertur; quando vero vltrò & vi suâ in aurem se

insinuat pro refectione, tum aer motu placido ingreditur & communicatur, & à nobis non percipitur; & cum per longum ductum feratur, ideo nullo modo ipsum offendit, sed nutrit & reficit. Hunc for-

te ob

ob meatum, Alcmeon, cuius Aristoteles & meminit, arbitratus est capras, non modo ore ac naribus, verum etiam auribus spirare.

Tertius^h vsus, vt si forte sonus per meatum auditorium ad neruum recte deuehi nō possit, os ingressing per hanc viam aliquo modo aurium intima petat, & ita furdastis subueniatur, quos hiant ore voces & sonos excipere videmus; & hoc musicis instrumentis probatur: nam si aure vtraque obturatā, baculo dentibus apprehenso ea contingas, exquisitius ulsari audies: sic cupienti scire noctu, an aliquis adueniat, si baculi aut ensis alterum extremum terræ figat, alterum vero dentibus apprehendat, è longinquo magis audiet, præsertim, si via saxosa sit.

Quartusⁱ vsus, vt in vehementissimo strepitu, vt i Tertijs bombardarum, tonitru, aliove impetuoso sono, membrana non rumpatur; quod fieret, si aeri congenitus nullus pateret exitus, qui commotus membranam extro, aer vero externus eam intropelleret: at cum aer congenitus exitum habeat, membranæ cecidendi locum concedit. Hic meatus facile reperitur, si exsiccatæ caluariis seta porcina meatui auditorio datur, ea ad palati seu faucium regionem exibat: in recenti vero capite huius foramina ad palatum coniciuntur.

Altera huius processus lapidosi pars & superficies exterior extra cranium consistens, tuberibus, sinus, porositatibus & lineis exasperatur, & inæqualis additur, ita, vt veteres recte rupi præruptæ assimilarent: Cuius inæqualitatis vsus est, vt muscoli rectius conascantur, vel inserantur.

Donatur quoque processu & appendice: processu quidem crassiore, qui cum papillis mammarum similis sit, *maççendins*, mammillaris dicitur [tabula 3.

k *vsitate os
calaminum,
os styloide, os
sagittale, os
clauale, os a
cuale, & cal
car capitis,
Voleher,*

fig. 8. M. fig. 9. K.] qui in infantibus nondum adest, sed postmodum exoritur. Appendice vero tenui, oblongâ, acutâ, quæ à columnæ rectitudine *στυλοειδής*, k styloides, & *πλήκτρον*, à calcaris effigie dicitur [*tab. 3. fig. 9. 11.*] quæ in nuper natis cartilaginea est, & vbi ossa augescunt, & cartilagine exsiccantur, ossæ fit, ple- runque tamen vestigio cartilaginis, quemadmodum in appendicibus fieri solet, remanente. Sed de his plenius in historiâ ossium capitis. Et hæc est superficies externa processus petrosi, tam intra, quam extra cal- uariam existentis.

Intrinfecus vero hoc os petrosum solidum nõ est, ne pondere nimium grauet, sed totum cauernis, du- ctibus & foraminibus innumeris, & pene infinitis pertusum est [*tab. 14. fig. a. g. 3. 2. m. n. E. i.*] & maiori ex parte spongiosum, quo in iis aer implantatus elabo- retur & excoquatur. At in mediâ sede cauitates tres insigniores auditus gratiâ efformatæ notantur: Ve- rum laminæ eas efformantes, etsi tenuissimæ sint ad ossis leuitatem, densissimæ tamen existunt. Verum, cum meatum auditorium & cauitatem primam, mē- branula tympani distinguat, de hac primo dicen- dum erit.

DE MEMBRANULA CONCHÆ seu tympani & de chorda.

CAPUT L.

De hac egit Hippoc. lib. de carnib. *δέρμα* vocans. Aristot. de animâ textu 83. *μυῖν* ξ: vide & 5. gen. an. 2. Galen. 8. vs. par. 6. secundo de eâ verba fecit, modo *σκέπασμα*, o- perimentum, modo *ἐγχασμα*, tegumentum nerui au- ditus nominans.

MEMBRANULA^a conchæ seu tympani, cuius Hippocr.^b primus δέρματος πρὸς τῇ ἀκοῇ, pelliculæ in meatu auditorio, nomine meminit. Aristoteli^c μῶνιγξ, nōnullis membrana simpliciter: d Galeno^e σιέπασμα, operimentum & σίγασμα tegumentum dicitur: alijs tympanum, vel quod cavitati primæ obtendatur; eo modo, quo membrana tympano bellico: vel quia, veluti membrana bellici tympani ligno, ita hæc aere sonora fiat: rectius tympani membranula vocabitur, eo quod, cum tensa sit, & aer externus cum sonis ad eam appellit, membranæ tympani bellici modo sonora sit [tabul. 24. fig. 3. & 4. p. tab. 25. d.] Sita est^f inter meatum auditorium, cuius fini intrinsecus apposita est & cavitatem primam, quam tympanum vocamus; quæ anteriorem & superiorem regionem inclinans oblique & extenditur, non secus hæc si calamus scriptorium, eâ parte, quâ densus est & attemperatus, tensa membrana obducamus: ratio situs, quo cavitatis primam rectè magis respiciat, quæ meatu auditorio elatior est; dein, ne aer impetuosus, aut aqua, aut quid aliud meatum ingressurum, quid

Eec 5

audi-

recentioribus *Anatomicis* quidam præclarissimi viri contendunt, à Galeno nullā factam mentionem, quin imo negatam: cum tamen Galeno cognita fuerit (8. vs. part. 6. & 11. eiusdem 12.) & non semel eius meminerit, Placent. b De carnibus τὸ δέρμα πρὸς τῇ ἀκοῇ πρὸς τῷ ὀφθαλμῷ καὶ τῇ σελήνῃ, λεπτὸν ἐπὶ ὅσῃς ἀρχαῖς, & ἡ ἐξ αὐτῶν δέρματ' &c. c 2. de animâ; textu 83. d Archang. quam vesicula comparat. e 8. vs. par. 6. f Membrana cavitatis sedem succingens, Vesal. qui duarum meminit; alterius, cui incudis exterius crus innascitur: alterius membranula tenuissima, & prorsus pellucida, cui malleus transuersim innascitur, eo modo, quo in tympani fidem unam atque alteram crassio rem membrana obtendi conspiciuntur, hæc Vesal. In imo anfractu membrana, μῶνιγξ vocata: Benedict. in mediâ ferè sinu regione membrana, qua ibi obducitur, & cauernulas in eo sinu existentes implet, cui malleus & incus adhaeret, Columb. Membranula tympani, qua myringa auris Barbaris, Fallop. myrinx, Volcher. Tympanum, Arantio, Plat. Laurent. tympanum, myrinx, myringa & membrana, Placent.

g Non transuersim, Fallop. Volcher. Plat. h Fallop. Observat. Volcher. eo modo obteggit foramen cavitatis, quod aurem spectat, quo vas fundo obstruitur. Vesal. i.

a Galen. nullā prorsus mentionem fecit, imo negavit, tamen aliquod ad meatum auditoriū, quod aerem motū, qui cum sono fertur in aurē ingredi impedit. Sed Galenum absolute hanc membranā negasse, non patere, inquit, cum tamen libro de instrumentis odoratus s. omnem membranam prorsus negarit.

Vide & vs. p. 6. & 11. eiusdem 12. hæc Aquapen. Ex

auditui noxium rectà membranulam petat & laxat.

Figurâ est orbiculari [*tab. 24. fig. 6. n. l. tabul. 25. d.*] quæ in medio aliquantulum intro curuatur, eo modo, quo folium cotyledonis seu umbilici Veneris, quo sonum extrinsecus aduenientem suscipiat, quia à concavis sonus plenius ac perfectius percipitur.

i Panniculus
subtilis cōtex-
tus ex villis
neruorum au-
ditus, Mund.
secundum ali-
quos à nervo,
secundum a-
lios à pia ma-
tre, qua cum
nervo in cavi-
tatem transit,
Carpus, mem-
brana subtilis
dura, ad quâ

Substantia ex ipsius ortu colligi potest, de quo controuertitur. Alijs à perioestio ossis subiecti, alijs ex crassa, alijs ex tenui meninge, alijs à quinti paris neruorum ramo produci statuentibus. Sane cum hanc membranulam substantiæ proprietate à cæteris membranis diuersam animaduertemus, eam ex semine in primâ conformatione generari censuimus; quo modo crySTALLINI humoris membranam, à semine ortum duxisse supra monuimus: nisi lubeat, eam à perioestio producere. Nam si infantis caput inspicias, hanc membranulam cum perioestio [*tabul. 25. kk.*]

qua

trâsit nervus, Massea: hac membrana à cerebro est, cuius connexionem lingua annectitur, quare verba ediscuntur, qua prius audiuntur, deinde ore pronunciantur; qualis enim motus per sensorium subierit, talis ab unâ & eadem effigie motus per vocem agitur, vel quod audiens, idem referas, Alexand. Bened. à dura meningis portione ortum ducit, cuius naturam omnino refert Laurent. à perioestio, quod sub cute meatum auditorium inuestit, Volch. membrana producit à tenui meninge nervos auditorios inuolvente, illic amplificata, & veluti vesiculam constituyente, qua audiendi instrumentum, corpus aereum comprehendit & amplexatur, & mox, ait, unum anfractum crassior meninx succingit & obducit: nervus autem auditorius in eam membranam fusus explicatur, qua foramini est obiecta, qua cōclusum tenet aereum corpus &c. Arch. Semini eius originem acceptam ferre rationi minime dissentaneum, Aquapen à Pericranio; nam cum siccissima sit, quomodo à cerebro humidissimo producat; nec ab eius inuolueris, quia meningis semper actum sunt humida ad sonum efficiendum vel recipiendum ineptissima: nec à neruulis, cū neruuli molliores sent, quam ut ex illa membrana sicciss. generatio fiat, adde, quod substantia cerebri plurimum habet, nihil autem tympanum habere constat, Plac. à tenui meninge oriri credidè, quod falsum est; Quare ut informatione mollius principium haberet, unde texeretur, Natura cartilaginem inter os temporum, & anulum osseum in infantibus interposuit, Fallo. obser. membrana myrinx mollius ex cartilagine & osse adipiscitur principiū, Volch. expansi nervi speciem refert, Arā.


qua os squammofum & vicina obducit, coherere videbis, & ad meatum auditorium perioftium dilatatum, vbi paruus processus oblique rotundus ex offe petroso erumpit, calamo fcriptorio, cui prima obliqua incifio facta eft, fimilis: qui processus factus eft, quo membranula cum offe petroso connectatur.

Annulus^k vel circulus offeus, hic processus dicitur [*tab. 24. fig. 3. * tab. 25. e.*] ex cuius circumferentiâ meatus auditorius educitur: duplici eft principio [*tab. 25. n.*] & quidem inferiore tuberculum referente, quâ ex offe squammoso enafcitur, & cauitatis primæ offiolo parum oblique introcedens, apponitur: hîc intrinsecus fulcum orbiculatim impreffum habet, feu in medio circumcirca leuiter excauatus eft, marginibus offeis vtrinque eminentibus: quo membranula huic fulco fecundum circumferentiam firmitissime attendatur & innafcatur, ne violentis motibus agitata lædatur, & quidem vel ab aeris externi introrsum, vel aeris interni extrorsum impulfu, vt oscitatione, fpiritus cohibitione magnâ & narium emunctione: quare membranulæ tympani subiicitur [*tab. 24. fig. 3. 4. q. tab. 25. d.*] quemadmodum etiam in militari tympano, circulus, vt eius membranam tendat, subiici videmus. Et hic in infantibus ab offe temporum separatu facilis eft: in adultioribus ab vnâ parte cum offe petroso, ab alterâ cum meatu auditorio arctissime coit, ita vt separata aliquando fuiſſe neget (fulco tamen remanente) & ab eo integer separari non poteſt, & ſic membranula tympani in circuitu à pericranio ſecerni videtur.

Quare Galen. inquirens ſubſtantiam huius membranulæ, comparatione factâ inter tegumentum neruorum opticorum, & auditoriorum primo; dein ſuius olfactus, oſtendit, neruos nudos penitus non fuiſſe

k Circulus offe- ſeu linea mo- do in cauitate extuberâs Veſal. Processus paruus leuiter excauatus du os habēs mar- gines offeos e- minētes, Vol- cher. circum- ferentia emi- nentior offeis temporum, Arant.

TABVLA XLIV. *Aures & aurium partes internas diuersas exhibet: Fig. 1. aurem externam integram cum ossis temporum parte: Fig. 2. temporis os sinistrum per medium diuisum: Fig. 3. & 4. circulum osseum, & membranulam tympani: Fig. 5. os temporum prope auditorium foramen diuisum, quo nerui, ossicula & membranae Vesalij sententiâ pateant. Fig. 6. auditus organi vasa membrana, ossicula & foramina delineantur: Fig. 7. & 8. ossicula auditus humana & vituli, & coniuncta & separata exhibet: Fig. 9. muscolum externum Aquapend. proponit.*



fuisse relinquēdos, ne omnibus iniuriis externis expositi sint: quare operimento indigebant, aut crasso & denso, vt oculi: aut admodum raro & poroso, aut denique mediocri: sed densum & crassum fieri non debuit, quia impediuiſſet, quod minus aer motus accederet; præſertim, ſi paruus eſſet motus, qualis vocibus exiguis ineſt: Nec rarum ac tenue faciendum erat, vt aeri eſſet peruium ac penetrabile: ſic enim & nerui facile læderentur, & cerebrum ipſum refrigeraretur: Quare Natura munimentum conſtruxit, vt inſtrumēti ſecuritatem adiuuaret, quod mediocre habet conſiſtentiam. Sic ergo concludit: Quod Natura cum proſpexiſſet, conſtructionem cum forti propugnaculo ad patiēdi difficultatem fore quidem accommodum, vt ſenſorium ipſum ſurdum effecturam: ſi vero conſtructio nullum haberet munimentum, eam iniuriis aptiſſimam futuram: tertium autem, ſi modo mediocre aliquod ad ſecuritatem adpta eſſet amplius adiuuētum ſatis ipſam habituram, hæc Galenus. Idem de olfactus operimento agens, inquit, requiri *σέλασμα*, quod rarius ſit ipſo auditus operimento, quod denſius eſt, cum craſſius ſit obiectum, quod olfactui ſubiicitur vaporofa ſubſtantia odores deferens: tenuius obiectum auditus, quod eſt aer ſono informatus. Hæc probant, Galeno hanc membranulam cognitam fuiſſe, & pro Galeni deſenſione adducta fuere.

*Iudicium ex-
quiſitum dif-
ferentiarū ſo-
ni, tum odoris
ſynceritate ſen-
ſorij, ſummaq;
membra poſi-
tum eſſe, dicit
Ariſtoteles. 5. gen.
an. 2.
In Sonum, æ-
remq; ſubtile,
Volch.*

Eſt ergo huius membranæ ſubſtantia tenuis, denſa, ſicca, pellucida & ſenſus exquiſiti: tenuis, ita vt aranearum telæ Hippocrates aſſimilarit, vt ſonum^m ſubtilem transmittere poſſit, cum neceſſum ſit, ſonum cum aere ingenito communicari (licet aeris externi ſubſtantia cum interni aeris communicari nequeat) & pulſationem ad auditum neceſſariam perferre. Quare oſſea eſſe non debuit, alias ſurdum

ⁿ ſen-

ensorium foret. Sic enim congenitus aer, aeris externi alterationem & sonum non admitteret: quod si admodum attenuatum foret, ad aeris violenti incursum frangeretur. Nec carneū esse debuit, quia aerum excipiens ad sonum transmittendum ineptum foret, & quia molle, & multa humiditate imbutum, multa admitteret, quæ membranosa substantia pro-
 uulsare potest. Quare septum hoc membraneum est, & quidem tenue. Nam si membrana hæc à prima cō-
 formatione crassior & densior producatur, surdita-
 tem ° incurabilem profert. Sic videmus interdū an-
 te membranulam hanc exterius tunicam quandam
 crassiorem præter naturam adnasci, cuius Aegineta
 meminit; qui etiam curandi modum docet, & cum
 deest, præsertim à natiuitate, surdos facit, & conse-
 quenter muti sæpe à natiuitate fiunt, quod ignotas
 & auditasque voces, nec animo concipere, nec voce
 pronunciare sciunt: & quemadmodum hæc exterius
 opposita auditum tollit, ita quoque fit, si eidem inte-
 rius mucus opponatur, vel humoris affluxu ° per-
 undatur, grauis ac difficilis auditus sequitur & sur-
 ditas curatu difficilis; si vero tenui humore mada-
 t, aurium tinnitus, sibilationes & murmura afferre
 solet.

Densa quoque est, nullis poris conspicuis, & ner-
 uosa & robusta, quo iniuriis externis resistat, aeris
 violentos incursum propellat. Siccissima est, ut sonos
 prompte excipiendo, rectius personet: Soni enim si-
 mulacrum sine materia in hac membranula recipi,
 eo modo, quo colorum imagines in cornea suscipi-
 untur, suspicamur.

Siccissima enim ad sonum concipiendum maxime
 facere solet.

*n Soni marum
 etiam trans-
 re possunt. At
 Arist. 11 pro-
 blem. 49 qua-
 rit, quare lux,
 qua tenuior
 est, velocior
 & deductior
 corpora densa
 & solida pe-
 netrare non
 possit. R. quod
 lux directio i-
 tinere fera-
 tur, itaque si
 quid recta op-
 ponatur, lucis
 progressus im-
 peditur: at
 strepitus, quia
 spiritus est,
 quoquo ver-
 sum fertur, o-
 mnia perre-
 ptat, penetrat,
 & translapsus
 undiq; audi-
 ri potest, quia
 meatus ali-
 qua in parte
 inuenit.*

*o Arantius,
 Laurent.*

*p Libr. 2. cap.
 23. Aquapen-
 dens affirmat
 se bis obseruas-*

*Corpus nervosum est modicè densitate pradi-
 tum, non peruium, sed sum-
 ma sua tenuitate, & siccitate ratione transsonorum est, Placent.*

facere dixit Hippocrates, & cum plurimum resonatum maxime auditur; quod etiam experiētia in bracteis ex orichalco tenuissimis, densissimis & siccissimis commonstrat. Et quoque pellucida instar cuiusdam speculi perpolita, intus forisque læuigata, nisi quod interius malleoli processus superne ad ipsius medium, quemadmodum neruus tympano militari transuersim attenditur.

Septum cauitatem primam à secundam discerniculi vice discriminans, Lauuens.
 Vfus membranulæ meatum auditorium in orbem claudere, & instar septi^r (hinc quibusdam septum membraneum & mediastinum) à cauitate primâ distinguere, partes externas ab internis dirimere: potissimum vero aerem congenitum, cuius munus est sonos excipere, ab aere externo separare, ne ob permixtionem & confusionem cum externo cōturbetur, & aere nebuloso vel fumoso, crassior & caliginosior reddatur, & sic ad auditum ineptior fiat; quamuis & hoc septo cohibeatur, ne sponte diffluat, aut vehementibus fragoribus dissipetur: neue aer externus frigidior & calidior influens, neruos & cerebrum offendat: dein partes internas ab externis iniuriis tueri, vt si forte sub aqua simus, aqua non influat, vel animalcula minima, vel pulueres ad interiora non irrepant, & sic auditum corrumpant.

At ne ab assiduīs his incurſionibus & violenti aeris impulsu, & ob sui tenuitatem membranula periclitetur, sensorijque facultas tollatur, Natura adhuc tutelæ causa, interne officula tria, chordam & musculos duos addidit (de quibus nunc sermo erit) quorum beneficio aeris fluctuantis impetum probe sustineat.

De officulis organi auditus.

CAPVT LI.

a Galeno in.

At de his Galenus a egit in libro de motibus obscuris, qui perijt.

perijt? & vtrum in fine lib. de ossibus hac innuit, dum cognita, & à quadam ossicula se consulto pratermississe dicit? forte recentioribus quod eorum vsus non assequeretur, cum & recentioribus inuenta esse, rum aliqui horum vsus & officia incertâ coniecturâ recentiores omnes statuunt: nos assequi asserant; imo inter se de eorum vsu discrepent. inter hos Placentinus asserit, Galenum

A V D I T V S organi ossicula tria ante seculum incognita fuisse videntur, & à posteris primum inuenta: duorum, incudis & malleoli inuentio Anatomes restauratori Ioh. Carpi Bononiensi debetur, scilicet his ceteris, per lustras Tertii vero inuentorem se esse Iohan. Philippus Ingrassias asserit: Columbus vero sibi, & Eustachius sibi quoque inuentionem adscribit, sed ad rem.

Sita sunt hæc ossicula^b in cauitate prima, quam Fff tym-

hac sunt in sua Isagoge: Panniculo intra cauitatem adiacent duo ossicula parua apta moueri ab aere ibidem proximo mole, qua in suo motu se inuicem percutiunt: à quibus secundum aliquos causantur omnes species soni plus & minus secundum aerem extrinsecus motum: hac Carpius, nec plura habet. At Massa hac: supra membranam intus sunt duo ossicula ad modum malleolorum tympani, & ideo malleolos vocat; & sunt mobilia, & adhaerentia, & mouentur ad motum membrana: Syluius hac: Ossicula duo meatui auditorio haerentia, sed mobilia, & membranam tenuem, desam, seu tympanum percutientia ad sonum & auditum facere putantur, Nicolao Massa Veneto. Vesal. in suo opere incudem & malleum nominat, sed inuentoris non meminit, at in examine Obseru. Fallopij, à Fallopio monitus & stapedis meminit. Ingrassia inuentionem tribuens. Colum. ait, Carpum duos primum, se vero tertium stapeda inuenisse. Ioh. Philip. Ingrassias, anno 1546. Neapoli tertium ossiculum non inuenimus, sed reperimus, quia minime quarebamus, & Stapha nomen imposuimus, &c. Fall. in obser. duo primus in lucem produxit lac. Carpensius primus quoque procul omni dubio Anatomica artis restaurator: sed Vesalius primus malleolum, & in eadem à similitudine appellauit: tertium Ingrassias inuenit, quod ego anno 1548. Pisfis ostendi; hac Fallop. At Eustachius, posteriores duo parua ossicula in lapidei ossis cauernâ se reperisse profitentur, quarum alterum quadrata incudi, aut molari denti appositissimè, alterum malleo aut femori, sed parum apte compararunt, qua duo, quantum scio, primi indicarunt Alexander Achillinus, Bononiensis Philosophus, & Iacobus Carpensius Chirurgus &c. neuter tamen inuentionis palmam sibi vendicat: tertium ego primus noui. Volcher. tria ossiculi pisces incognita, duo à lac. Carpensi, unum ab Ingrassiâ inuentum. Archæan. veteribus penitus incognita: iunioribus aliis unum, aliis duo, aliis tria innotuerunt. Plat. Varolo, Laurent. tria ossicula. b In processu ossis temporum cauerna instar labyrinthi, in quo sinus cau-

tula, quæ
membrana
inuestit, cuius
prope mediâ
regione astant
officula suis
membranis
adnexa, Co-
lumb. in exte-
riore concha
regione sita
sunt, Plac.

c Incus à figu-
ra; malleus ab
usu & formâ,
stapes à for-
ma, Volchero:
à forma poti-
us quam ab
officio & usu
nomina sorti-
untur, Laur.

tympanum, ab usu, vocabimus, quæ diuersâ figurâ
prædita, & à rerum externarum e similitudine nomi-
na consecuta sunt, Malleus, Incus & Stapes nominâ-
tur [tab. 24. fig. 6. 7. & 8.]

Malleus [tabul. 24. figur. 4. r. fig. 5. C. fig. 8. q. tab. 25. c. l.]
in primæ cavitatis principio [tab. 24. fig. 2. iuxta e.] ad
meatus auditorii finem situs est: quod officulum
malleo d non tam figurâ, quam quod instar mallei
incudi incumbat, simile: alij ossi femoris e assimila-
runt; ei nimirum parti, cui femoris inferiora capita
refecta sunt, & pars inferior exquisitè exacuta: incur-
uum est longiusculum, quod capitulum, ceruicem &
caudam habet. Capitulum siue tuberculum, pars est
superior crassiuscula, extuberans & oblonga: capitu-
lum enim hoc perfectè rotundum nō est, cum sum-
mitati eius externæ sinulus oblongus insculptus sit,
quo Incudis capitulum fuscipiat, eique committa-
tur: & hoc sursum anteriora versus ad meatus audi-
torij

d Ab usu potius, quam à forma dici existimant, quod dum membrana mouetur,
& malleus moueatur: vel quod instar mallei fabrilis membranam percutiat, Vol-
cherus. e Quemadmodum femur iuxta ceruicem duos assiscit processus, sic &
hoc officulum eadem sede processulos sibi vendicat: quo membranula sua firmius
innascatur: Dein, ut femoris ceruix oblique ad coxendicis sinum vergens in ca-
put rotundum cessat: sic hoc à membranâ introrsum vadens in rotundum caput,
leue, minime asperum desinens, alterius ossis superiori parti membrana interuen-
tu committitur: ac si malleus incudi laxè alligaretur: hac Vesalius, qui pro secun-
do recensuit. Idem ferè habet Volcherus. Contra Eustachius & Placentinus fe-
mori compararunt parum apte, cum extrema pars femoris duabus apophysibus
terminetur, eiusque caput superius & collum, pro sua magnitudine paruum est,
sed officuli finis tenuius & acutius; caput vero ita magnum, ut potior ipsius pars
& crassior putanda sit. Quare Columbus sic: primum femoris figura simillimum,
parte infernâ mucronis ritu in acutum tendit, parte alterâ capite est oblongo &
rotundo: duobus donatur processibus, similibus ijs, quos rotatores in femore voca-
mus: parte acutâ ac tenui membranula inseritur, qua intenditur ipsi, ac illi,
quod succedit, ad quam pariter extenditur & adheret, veluti ad eam stratum;
parte alterâ crassiore & capite insignitâ, membranam tympani modò qua-
rit: quare ab usu potius, quam à formâ malleum dixere, quemadmodum alterum
incudi simili voluere, quod ictus mallei percutientis excipiat.

torii latus tollit. Cervice est angusta, quæ parte posteriore processus duos exiguos, tenues & acutos emittit, quorum elatiori ligamentum seu chorda adheret: humiliori vero membranulæ incumbit, ne plus iusto intro pellatur & frangatur; cuiusidem vultus videtur, qui funiculorum, quos inferiori tympani bellici membranæ, ars Naturæ æmula, prætendere consuevit, ne scilicet interiore in tympano inclusi, & toties percussi aeris impetu diuelleretur. Inter hos sinulus est, & ex opposito tuberculum, cui musculi tendo alter, alter vero cervici implantatur.

Cauda vero ^f siue pediculus tenuis est, in summo atiusculus, qui etiam in apophysi exiguam desinit, qui musculi insertionem seu tendinem ^g excipit: mox versus posteriora & inferiora delatus sensim in processulum tenuem & acutum, & non nihil asperisculum instar caudæ reflexæ, imo in apicem incurvum quasi vncum finit, quo membranulæ ^h tympani, non extremitate suâ, sed secundum sui longitudinem ultra mediam membranæ latitudinem quam pertinacissime adheret [tabul. 24. figur. 4. r. ad p.] par-
tim, quo ipsum contra impetum internum teneatur, ne ultra præfinitum terminum ⁱ extra pulsus lace-
etur (ad quod etiam chorda, de qua infra, non pa-
um confert) partim, quo eam deorsum & intro tra-
hendo, cum suo vncō ad interiora reclinet, sicque
membranulam interius convexam, exterius concavam reddit, & in tali figura conseruat, quo aer exterius meatum auditorium ingressus, ad membranulæ centrum, ubi malleus appendet, à membranæ lateribus ad centrum perveniat, & ad soni interiorum communicationem uniatur, & infra intenda-
tur.

^f Cauda vel pediculus, Fallop. Processus, cauda, pediculus. Volcher. Processus velut caudæ reflexa, Arant. processum & tuber malleo-
lo tribuit, Laurent.

^g In acutum illius processum nervulus desinit à quinto parti, à quo nem nervulus tortuosus in labyrinthum inseritur, Columb.

^h Alterum of-
ficulum (id est malleus) alteri membrana

Fff 2

Ve- innascitur, se-

indum longitudinem longo & tenui processu, Vesalius. i Fulcrum chorda, ne in
recessione à suo loco dimoveatur, Volcherus.

Verum;quemadmodum membranulæ [*tabul. 24. fig. 6. x.*] suo processu inferiore, & pediculi latere inferiore, & meatus auditorii orbite, beneficio ligamenti (quod transuersim ab vno meatus tuberculo in alterius lateris tuberculum fertur) adnascitur, ita vt à

k *Volcherus.*

l *Articuli specie, qua lubricis & lauib. superficieb. fit, Volch. & Plater. per ginglymum, Placen.*

l *Non enim in viuis, quemadmodum in mortuis coherere suspicamur, Arant. Viriusque ossis coniunctio valde adstricta, Aquapend. m Minus incude, Aquapend. longius, Plat.*

n *Sic primus Vesal. nominauit, & primo loco recensuit, à ceteris secundo loco, & Col. incus: Fall. incus vel dens: incus & molaris dens, Arant. Plac. ceteris incus.*

membranâ ^k nullibi solutus sit, imo valide compactus: sic capitulo sui Incudi, cui incumbit per eam articulationis speciem, quæ ginglymos dicitur, cartilagine illita articulatur [*tab. 24. fig. 6. 7. & 8.*] cum & in Malleo & Incude vtrumque sit, & cavitatis & caput; & malleus supra incudem mouetur. At Malleus & Incus ita arcte mutuo articulantur in mortuis, an vere in ^l viuentibus ambigitur, ita vt natura his tanquam vno & continuo, & tanquam duobus seu interceptis vtatur; duobus quidem ad membranæ tutelam; continuo vero ad soni delationem: quare licet hæc articulatione per ginglymum fieri dicatur, cum se mutuo suscipiant & suscipiantur, propter tamē adeo arctam copulationem potius per synarthroses coarticulati dici deberent, vt nonnulli volunt. Hoc Incude ^m longius, sed tenuius est, quia supra Incudem moueri debuit, & id quod gestat, maius esse debet, eo quod gestatur: ambo tamen, vbi articulantur, maiora sunt, aliorum ossium more, cum crassiore parte mutuo respiciant.

ⁿ Incus [*tab. 24. fig. 4. f. fig. 5. l. fig. 7. & 8. 6. tab. 25. m.*] ossiculum secundum est, quod in cavitatis primæ latere posteriore situm est, & malleo adiacet, cui oppositur, & partem ^o membranulæ à malleo non tectat integit; ita tamen, vt ^o crassiore sui portione aures spectet, cruribus tympanum: huic aliqui ab actione nomen tribui volunt, eo quod incudis modo, malleoli permoti, Pac percutientis ictus excipiat; aliis similitudine, quam cum incude fabрили habet, non c

maic

o *Sic & Volcher. p Columbus & Archangel.*

maiores, sed minores, qui partim planus, partim rotundus effingi solet. Quare & cum planities non adfit, vt incudi maiori, sed eius loco cauitas inæqualis, cuiusmodi in dentibus molaribus conspicitur, denti molarum, duas tantum radices, alteram longiorē ac tenuiorem, alteram crassiorem & breuiorem habēti, rectius comparatur, & à nonnullis Dens dicitur. Hoc breuius est & crassius ^s malleo, & capitulum, cruraq; duo obtinet; nam superiore extremo crassius est, & extuberans & leui cauitate malleoli tuberculum excipit: ei enim ^t sinubus exsculptus, in cuius medio linea extuberat, quemadmodum in osse cubiti, vbi cum brachio articulatur; vt vere ginglymos hīc sit, quo articulatio ad motum fiat. Et quemadmodum capitulo suo articulatur cum malleo, sic suis processibus adnascitur & meatus auditorii orbitæ & stapedis vertici. Alterum enim eius extremum inferius & tenuius, duos exiguos tenues & acutos processus (quos crura vocant ^u) inuicem distantes emittit: altero elatiore, breuiore, crassiore, latiusculo, & nonnihil intorto, ossi temporum squamoso innititur, & ligamento transfuerso orbitæ, parieti ipsius tympani hæret, eā parte, quā Aqueductus labitur: hacq; ratione malleo firmitus nectitur, ne in membranulæ vehementi percussione à se mutuo separentur: Longiore vero processu, graciliore, decliuo, & nonnihil quoq; intorto sursum ex membranulâ eminet, & stapedis vertici ligamentali nexu alligatur, & ^x per arthrodiam affigitur, & partem eam membranulæ occupat, in quā malleus non est, quo eius partis ^h pulsationem percipiat, & sonum stapedi communicet, vnde per foramina ^y paria ad neruum auditorium deferatur.

Fff 3

Sta-

nunus chordam in sua sede conseruare, ne ea sursum tendat. ^x Membrana magis, quam exterius crus innascitur. & extremo quasi in vinculum cessat, quo membrana implicetur, & firmitus connectatur. Vesal. ^y Sic & Volcherus ^z sursum incudis vultu Varolus, vt stapeda in loco naturali firmiter maneat.

^q Incus parte posteriore crassiusculam planam partē refert, & in duos acutos processus instar crurū desinit: quorum alterum in tertium ossiculum immititur, & in membranula assistente detinetur, Colum. ^r Vesal Col. aptissime ait. Eustach. Volcher. Plat. Aquapen. ^s Incus malleo duplo maior, Aquap. crassius & breuius, Volch. breuius, Plat. ^t Cauitas inæqualis, Aquapend. ^u Fallop. Placen. Laur. crura duo tribuit. Volch. præter caput & crura gemina, ad huc processum minorem adscribit, pedem vocatū, cuius

a Stapedis in-
uentionem sic
proposuit In-
grassias lib. de
offib. an. 1546.
Neapoli terti-
um officulum
nō inuenimus,

Stapes a [tab. 24. fig. 4. f. fig. 8. T. tab. 25. f.] officulum
tertiū est, cui primi inuentores à similitudine staphæ
vel stapedis nomen imposuere: hoc in cauitatis b pri-
mæ parte, quasi mediâ ad ipsius fenestellam oualem
situm est, & in brutis trianguli, & Græcorum c Δ. fi-
guram

sed reperimus, quia minime querebamus: scilicet pro & malleo auris ossa percutientes,
ut internas cauernulas, & in ipsis contentas substantias Scholaribus ostēderemus,
ubi duo prima officula demonstraueram, tertium officulum, nescio quomodo in ta-
bula plano casu potius inspeximus & c. Statim igitur hominum diuersa capita dissecare
aggressi, inuenimus: unde ad humani capitis dissectionem reuersi, illud vel clausis
oculis inuenimus, & stapha primum nomen imposuimus, nonnulli tamen stape-
dem appellantes, inuentoris tam rei, quam nominis titulum sibi vendicantes, & c.
(intelligit Columbū.) Sic Eustachius: Ego scio, me neq. edoctum, neq. monitum
ab aliquo multo antequam ipsi scribant (intelligit Fallop.) id officulum nouisse,
Romaque non paucis ostendisse, atque in eas incidendum curasse, & c. b Latitat in
cauernulâ quadam ferè rotundâ, intra sinum auditorium exculptâ, cauū & per-
foratum egregie & stapha naturam imitatur, capitulum quoddam rotundum ha-
bet, quo ad incudis processum accedit, Columb. c Figura triangula stapha, seu sta-
peda, Eustach. delta Græca litera maiuscula formam habet, unde os deltoides ali-
quādo nominauimus, & stapham, cum qua maiorem similitudinem habet, quam
alia duo cum malleo & incude: nonnulli stapedem, alij stapedam Grammaticè po-
tius, quam Latine vocāt. Verum non assimilauimus: ferrea nostri temporis stapha,
in quâ equorum sellis insidentes pedes sistunt, sed lignea cuidam stapha, quâ in Sici-
liâ utimur, Vicerégiâ quadam Pragmaticâ olim phibiti ne ferreis utamur, quo-
ties mulis, quæ stipendio quodam locari solent, superinsedemus; triangulares enim
absq. ullo interim distincto foramine per quod coriariū lorū staphile à nostris vo-
catum transmitteretur: sed per idem amplum foramen, eiuq. superiorem angulum
acutum cannabinos funes mularum domini traducunt. Quauquam & antiquis-
simas veterum stapedas ferreas, vel rubigine semierosas uidimus; quin imo, & in
veterrimis picturis eiusdē forma fuisse obseruauimus: hac Ingrassias. Stapedis aut
stapha nostrorum patrum cffigiem gestat, quia illorum Stapedes erant veluti triā-
gulares orbes sine alio distincto foramine, quod postea nostris additum, ut lorū tra-
duceretur, Fall. Obser. vide & Col. Stapedem vel Δ. Græcorum pulchrè representat;
quemadmodum diligenter primus descripsi, Plat. Officulum triangulare inane, q
stapedam vocant, quod pupillam auditus (ab usu) libenter appellarem, Varolus.
Stapha equestri simile est tertium, pluribus non describit. Archan. Stapedis vel tri-
anguli imaginem refert, Arant. Stapedem antiquorum refert, triangularis est, fi-
guram Δ. representans, Laur. Tribus lateribus atq. angulis tanquam triangulus,
Aqua. stapedem, & antiquitus fuere, nimirum triangulari formâ siue foramine,
per quod lorū, ut in nostris stapedibus transmittitur: Est enim triangulare, repræ-
sen-

guram exprimit [tab. 24. figura 8. brutorum proponit] in *sentans quodammodo Gra-*
 homine vero ex duobus ductibus efformatum [fig. *corum Δ. vel*
 7. ostendit] dici potest, altero superiore arcus instar *formam tri-*
 conuexo, cuius crura duo minutissima nonnihil si- *gularem, qui*
 nuata, & angustiora reddita basi transuersæ inserun- *annulis ali-*
 tur: vertex ipsius acutus non est, sed capitulo minu- *quot obitus*
 to, plano & rotundo, quo incudis longiusculam apo- *mendicū can-*
 phylin arcus instar sustinet; vel si maius huic apo- *tilenis apud*
 phyli ligamenti beneficio stapes ^d appendet; crura *multas natio-*
 vero exigua à se inuicem parum recedentia, foramen *nes accommo-*
 longiusculum efformant: at basis, quæ altera ipsius *datum vocet.*
 pars est, transuersa est, latiuscula, & in marginibus *Stapedem non*
 crassescens, ipsaque crura vtrinque excedens, quâ of- *antiquorum,*
 fert: at in bru- *sed nostrū re-*
 si ad fenestellam oualem præponitur & articulatur, *tis antiquorū*
 firmiterque membranulæ foramen illud claudenti *stapedi simile,*
 apponitur, idque beneficio ligamenti à capituli late- *neq. ullo pa-*
 re, quod cavitatem *γλωσσίδω* habet, exorto: & sic *sto triangulo,*
 stapham seu stapedem equestrem exactissime refert. *neque Graco-*
 Hoc cæteris multo minus est: Si enim maius esset & *rum Δ. assimi-*
 ponderosius, tum ynà cum duobus alijs motum, *le. stapes, staf-*
 membranulam deorsum traheret: in medio inane, *sa & stapeda,*
 seu stapedis modo pertusum est, quo leuius sit, & quo *Placent.*
 aer innatus sese insinuet & agitur, quo sonum, quæ *d Incus crura*
 ab incude communicatum excepit, non solum ad *longiore stape-*
 cavitatis primæ profundum deferat, sed vterius quo- *di obligatur:*
 que alteri cavitati ad meliorem auditionem com- *stapes basi la-*
 municet, & per fenestellam ^e oualem ad labyrinthum *tiuscula fene-*
 deferat: quare sine ^g stapede soni delatio in totam ca- *stra ouali im-*
 uitatem ferri nō posset. Exempli gratia, quemadmo- *mersus sum-*
 dū species visibilis intra corneam recepta, prius pu- *mo & acuta*
 pillæ foramen angustum permeat, quâ ad crystallinū *apice incudis*
 pueniat: ita species soni membranulæ cōcauū ingressa, *minimum tu-*
berculum ex-
cipit, Lauren-
tius.
c Cacumine

Fff 4

fora-
perforatum e-
gregiè, Col fo-

ramen triangulare, Plat. foramen oblong. Aquapen. foramen ouale, Ingrass in me-
 dio perforatum multis foraminibus instar spengia oppletum: in superficie aequalis
 planum: inferiore sede tenuius & asperum, Volch. f Volch. g Aquapend.

foramen exiguum velut per pupillam (vnde stapes, pupilla auditus dicitur, Varolo) ad auditus organum præcipuum permeare debuit: quare per stapedis inane transit, in cavitates ossi petroso insculptas ad aurem congenitum, qui crystallino comparari potest, vt quemadmodum crystallinus præcipuum visionis instrumentum ratione receptionis, sic & aer hic receptionis, non diiudicationis, existit.

h Col. Fallop.

Volch. Plat. at

Aquapen. non

vt cætera ossa

ad articula-

tionem molli

cartilagine

incrassatur.

i Ossicula in

alijs animalis

bus tria exi-

gua, in alijs

duo, vt anse-

re, malleus &

stapes, in alijs,

vt simijs, nul-

lum, Plac.

k Tria ossicu-

la mobilia sũt:

nam concussa

myringa, mal-

leolus moue-

tur & in uis &

stapes; aut a-

perto sinu acu-

quadam vno

ex his ossiculis

agitato, reli-

qua duo simul

etiam consen-

tiũt, Fall obs.

ossicula hæc

mobilia sunt, vno n. attracto, reliqua duo etiã mouentur, Plat. vnũ ossiculũ malleũ

moueri vult Arãt. sequitur Laur. mobiliũ mēbranis alligãtur, quo mobilia fiãt, Vol.

Et ne ossicula hæc tria vacillãdo, membranulam, cui firmissime appensa sunt, nimium trahendo lædant, ligamento quodam tenuissimo, seu chordã ad stapedis verticem pertingente transuersim à lateribus ossi alligatur. Imo inter se membranulis tenuissimis & mollibus, quæ ligamenti vicem gerunt, connectuntur, & quidem articulis duobus, qui in extremitate cartilagine^h eo modo, quo & reliqua ossa incrassantur, & sic ipsorum syntaxis à natura cæterarum articulationum non discrepat.

Tria autemⁱ creata sunt ob motum & dearticulationem ad membranulæ custodiam, ne ab aeris motu aliquo violento frangatur: nam si vnicum esset, vel membranula impulsæ, cum propter ossis rigiditatem & duritiem cedere non posset, rumperetur, vel processus ossis fracturæ periculũ subiret: quare tympani membranula mallei pediculo innititur, ne plus iusto intro pulsam frangatur, & ipsi pediculus tenacissime adheret, ne nimium extra pellatur. At quo totius vtrique motui resistat (quod cum aliqua cessione tutius fit) non vnum tantum os creatum, sed propter inflexionem ossicula duo alia, & musculi duo additi fuere, quo dum malleus cum membranulã, vel introrsum vel extrorsum pellitur, motum cohibeant: nam ossiculum hoc malleo assimilatum^k dupli-

plici

plici motu, vt eleganter Arantius, quasi fluxu & refluxu impellitur & recurrit: introrsum primum ad motum membranulæ, cui connexum est: quæ ab aeris irruentis impulsu agitata, intro & sursum pellitur, & intus gibba tantisper existit, donec aer congenitus à sonis & vocibus afficiatur, qui per cochleæ ambitus & circumuolutiones & cuniculos oberrans efficit, vt à nerui quinti paris propaginibus sonorum species suscipiantur, ac temporis momento cerebro subministrentur. At ne membranula intro nimium pellatur, malleus ei oppugnaculo est: huius vero terminus est Incudis sinulus, cui mallei capitulum ad articulationem quandam iungitur: quare incudis ostabile & firmum existens, membranulæ intro cessionem sistit, non aliter quam in horologiis¹ ferreæ illæ *Arant. Plac.* eminentiæ temporis in césura, ne vltius circumuolatur, fines constituunt. Et sicut incus malleo motum definies ei famulatur; quare duo crura obtinuit, quibus ossi petroso & stapedi firmatur, ita & stapes basi stabili petrosi ossis cauitati prope cochleam insists, incudis alteram apophysin longiusculam suo vertice arcus in modum sinuato, eleganter sustinet. Motus vero alter, qui extrorsum fit, vbi in pristinum statum tympani membranula cum malleo redit, partim à motu naturali aeris irruentis impulsa desinens malleus sponte suâ, membranula vero interuentu mallei, in priorem statum redit; partim à motus arbitrarij instrumento, ipso musculo absoluitur, dum ad ium principium contrahitur, & simul mallei capitulum ab incudis articulatione segregat, & propter mallei recuruatum processum membranula extrorsum pellitur. Verum præter hæc duo officula etiam musculi auris internæ, alter quidem contra internũ, alter contra externum impulsu membranulæ auxilio est.

m Solida dixit, quia soliditas ad auditum confert, *Vesal. Plat. Placen. at Col. hum. reprehendit Vesal. cum in ijs cauernula quamuis exigua reperiuntur: quare intus spongiosa esse, & medullam p magnitudinis portione continere, praesertim duo priora, tertium enim propter nimiam tenuitatem solidum esse crediderim, hac Col. Non tamen soliditas hac tanta est, ut foraminibus paruis priuata sint: in quibusdam medulla*

pro portione inesse, duo maiora ossa praecipue foraminibus scaten tertium ob sui tenuitatem minime, Volch solidissima sunt, ut resonent, Laurent. n Aquapend. Placent. o Plat Varolus, Aquapend. in infantibus recens natus & adultis aequalia, Volcher. Arantius, Laurentius, Placentinus.

p In infantibus media parte cartilaginosa, intus mucro repleta: in adultis caua s. pissime reperi, *Placent. q* Addit Aquapend tertiam differentiam, quod à membranula hac ossicula veluti suspensa & soluta pendent, quo aer externus una cum sono perueniens statim per malleum & incudem aeri complantato communicetur sonum enim magis communicari corporibus duris, quia alteri extremo appensi sunt, altero vero soluta, ut si ferrum fune suspensum percutias, sonus manifestus editur, quam si non sit suspensum. At Placentini hac sunt: Nuga sunt, stapeda a. incude, & hanc una cum malleo à membranula veluti suspensa pendere ac librari ut facilius ac melius sonum recipiant & deferant, quia optima soni transiecti quietem mediam expetit.

Substantia horum *m* dura est, densa & perpolitura, quo ad auditum faciant, & etiam membranam firment: densa & perpolitura, ad soni receptionem & delationem. Et licet à cæteris ossibus specie & figura distincta sint, in duobus tamen potissimum differunt; primo, quod *n* periossio non cingantur, ne soni receptione inepta fiat: talia enim inepta esse experieris, si corpus aliquod durum panno molli inueneris, quod percussum non eum sonum edit, quem cum denudatum esset, edebat: dein, quod hæc incens natis iam perfecta *o* sunt, & eandem, quam adultis magnitudinem habent, partim, quia homini omni ætate auditu opus habet, imo in principio otus nostri plurimum indigemus, tum ad idiomatum ad disciplinas capeffendas: partim, quia membranula in quavis ætate periculum impendebat. N tamen ita dura, ut in adultis, cum in infantibus *p* humilitas abundet; unde etiam infantes obtusius auditis audiunt; cum ad exactiorem auditum instrumeti siccitas potissimum requiratur.

Sunt etiam *q* caua, quo leuiora sint, & medullas pro nutritione contineant, quamuis etiam ad soni delationem faciant.

VF

Vfus: etſi hæc tria offacula quantitate quidem mi-
nima ſint, vſu tamen maxima eſſe ex iam dictis pa-
tere poteſt, & vt ſummatim dicam, horum vſus mē-
branulam tympani ſtabilire & defendere, ne dum
aer vel internus vel externus, vt ex tonitru, vehe-
mentius in eam irruit, diuellatur: Dein, vt ali-
quo modo auditui conferant, quatenus eorū au-
dilio ſonus ad neruum auditorium ſucceſſione
qua-

*De vſu horū
officulorū cō-
munis opinio,
aerem, qui diū
ſonus editur,
tanquam un-
da fluctuat,
membranam
meatus audi-
torio obductā
pulſare, ab illā*

conſecutione quadam offacula moueri. Reſpondit Euſtachius, ad hunc rudem mo-
um obeundum, quid oportebat ſapientiſſimum animantium opificem tantum
audium adhibere. Nam aer irruens membrana, ſine tali organorum apparatu
percuti, aut officulo, aut aliquo ſolidiore corpore nullā arte elaborato poterat. Ve-
lio, num offacula hæc officio fungantur, quemadmodum formam referunt, & le-
ſſimo afflatu ſecundum officulum (id eſt malleum) cui membrana innasctur,
ter diſſecandum mouetur primo officulo quodammodo quieſcente, haud aſſer-
um velim, cum auditus rationem non ſatis percipiam: Colum. ex aeris motu au-
torio ſit, ietus aeris in meatum ad hæc offacula deſertur, ſitque ibi quadam re-
reſſio, ad eum ciendum ſonitum, qui ſentitur: nam cedente membranā, hæc of-
acula moueri, & inuicem conſrictari neceſſum eſt. primum enim aeris ietus percuſ-
m, in alterum impingit & ferit. Obijcit Volcher. credidiſſe Columbum, baculo-
um more, quibus tympanum pulſatur, membranā à malleo quati, at malleum
in ſibi membranā ſolutum eſſe, imo validam compactionem in membranā exiſto-
: addit, ſi ex mutua conſrictione officulorum hic ſonus fieri deberet, tum inuti-
foret chondrodes copulatio, qua illum attritum impedit: quare vſum & officia
certa coniecturā nos aſſequi. Sunt, qui volunt, horum officulorum vſum eſſe, ſo-
um recipere, & aeri implantato communicare. ſed male, Placentin. Sic vero Ar-
angel. Stapha ita locata eſt, vt quaſi penſilem teneat veſiculam illam, in qua
ncluſum eſt acreum audiendi instrumentum: cui veſicula, cum incus adhære-
at, malleus percutiens incudem, commotus ab acre ſonoro foris intrò appellente,
ceſſe eſt instrumentum auditus eodem penitus motu cieri, quo exterior aer, id-
que eam omnino ſoni ſpeciem, & ſimilitudinem audiendi facultatem mouere,
calis ab aere illac geritur: Sic audiendi instrumentum mouetur à rebus audibi-
bus, ſitque ipſa auditio.

Non ita neceſſaria & utilis hiſtoria, vt inueſtigatione ob reconditum in ijs ar-
ficiū digna eſt, eo quod vſus officiaque incertā coniecturā aſſequamur, Vol-
cherus.

Hic tertius vſus eſt Volchero, quem verus vſus, vt ipſe ſcribit, latet.

Primus vſus Volchero. ſic autem probat: inuenias tibi trabem, vel ferrum, quā
tes, longiſſimum, colloceſ aliquem ab altero ſine, tu vero ſteſ ab altero, ferias di-
corum conuulo partem unam ita leniter, vt ietus vix à te percipiatur, alter

vero ex altero
fine trabis col-
locatus, si au-
tem propius ad
trabe admo-
uerit, quam
longissime à re
diffusus, exq̃si-
tus tamen i-
ctus percipiet,
atque tu, sed
aliquo post tē-
pore, si quidem
per lignum so-
nus nō ita ci-
to, atque per
aerē permeare
potest; idem
attestantur
musica instru-
menta.

a Ramulum
nerui quarti
paris Eustach.
per mediam
hanc cavitā-
tem filum vel
chordā qua-
dam tenuissi-
ma percurrit,
vel articulo,
quo stapes cū
incudis crure
altero copula-

quadam defertur, & ex horum commotione chorda
pulsetur aer implantatus ad sonum percipiendum
commoueatur, cum chorda à membranā non ita ve-
hementer pulsari possit, ac ab ossibus, & sic ossicula
hæc cum chorda aeris externi appulsu vibrata ad so-
norum distinctionem conferunt, quemadmodum
dentes ad vocis explanationem.

CHORDA^a etiam membranulæ subiecta est te-
nuissima, nervosa tamen, quæ non ex toto membra-
nulam succingit, sed ipsius medium percurrrens, illi
articulo, quo stapes cum incudis crure altero copu-
latur, attenditur; & si extrahatur triplo, aut quadru-
plo longior est: hæc à quibusdam filum appellatur &
aliis arteriola, alijs neruulus, aliis ligamentum, alijs
tendo^b censetur. Verum vel ex ligamēto, vel ex ner-
uo, vel ex vtrisque iunctis constare debet: at ligamēta
duriora sunt, quam vt paruo ictu cedant: nervus ve-
ro ita robustus est, vt quamuis vehementer impella-
tur, difficulter frangi possit; ita mollis, vt ex commo-
tione facile moueatur, quod ad sonum excipiendum
requiritur. Quare ramulum nerui quarti dicti paris
cerebri esse Eustachius asserit. Huius vsus^c ad pulsa-
tionem: quemadmodum enim in tympano bellico
ex chordæ per corium expansę repercussione sonus
fit: sic in aure hæc chorda ex exceptione verberatio-
nis à tribus ossiculis factæ, aerem congenitum per-
cutit, etiam Volchero monente.

D E

tur, attenditur, quidam neruulum opinati, ego quid sit, ignoro; aliquando arterio-
sa, aliquando nervus videtur, pro nervo impostum iudicaco Fall. obser. idem sord
Volch. filum seu chordula, Ingrass. Aquap. funiculus ligamentalis tenuissimus per
diametrum ductus, Aran. chorda thori mēbrana perinde, vt nervus militari tym-
pano, attenditur, tam exilis est, vt quid sit, dubitetur Laur. chorda tympano neque
annexa, & vix eius tertia parti subtensa, corpus nervosum, malleū colligans, Plac.
b Quod si horū nullū sit, corpus sui generis sit, necesse est, Aquap. c Hæc connexio-
nem illā, quā cū tympano malleus habet, firmitus colligat: docetur à nonnullis ipsū
ex exceptione verberationis à tribus ossiculis facta aerem internū percutere: at hoc
dogma inde confutatur, quod motus receptionem impediat, Volcherus.

DE MUSCULIS : AVRIS INTERNA.

CAPUT XLVI.

a Cum auditus organa arbitrio voluntatis moveri Natura instituisse, articulationem quoque ac musculum, sine quibus motus is fieri nequit, tribuere illis voluit: quem musculum nemo quod sciam, adhuc inuenit, Eustachius: minimus quidam musculus mallei in incudem cōcussioni foret, Ingrass. musculus, v. n. ex Eustachij sententia, duos ex aliorum refert, (illum ex Eustachio describit, alterum velch. ro non)

CUM Malleolus ad incudem dearticuletur, & quidem eā articulationis specie, quæ ginglymos dicitur: idcirco horum motus exiguus & obscurus est: mouentur autem vna cum membranulâ, cui malleus appensus est, sursum & deorsum, musculo altero intra membranulam, altero extra eam constituto.

Musculus internus [tab. 25. i.] ab Eustachio primo^b descriptus, in osse petroso situs, exiguus est, cum eo, in toto corpore minor non sit; elegantia tamen & constructionis artificio nulli cédens: hic in ossis sphenoidis basi eā sede, quâ cum radice processus petrosi, & additamento ossis occipitis effractum foramen constituit, enascitur: à substantiâ ligamento simili, mox carneus euadens, sensim ad medium vsque latior aliquanto redditur; dein rursus angustior factus, duos^c tendines gracillimos producit [tab. 25. fig. i. infra i.] & alterum elatiori mallei apophysi, alterum^d ius ceruici infigit. At in canibus, parum ante insertionem, carneam & rotundam^d glandulam aliquantulum

Musculus minimus intra organum auditus, aliâ à mereiectus, Varolus: ad sunt ad pulsationem musculi ista exiles, ut ferè sensum effugiant: hac solum habet Lauren. musculi duo internus & exterior. Aquap. musculi in alijs animalibus duo exiles ossiculis alligati: in alijs unus, in alijs nullus: at duos tum in hominibus, tum in equis, cane & porco obseruaui, qui in hominibus longe aliam figuram, ac ortum, quam in brutis habent, Placen. b Hoc asserunt Volch. Arant. & Plac. eum quoque Aquap. descripsit. c Eustachius unum tendinem tribuit, qui maiori & superiori apophysi inferatur, Volch. & Aquap. Eustachium sequuntur: at Placent. duos tribuit. Arant. apophysi à ceruicis basem extuberante inferi tendinem scribit. d Sinus nervosum & fibrosum instar rotundæ & oblongæ glandulæ, cum integrum est organum, insistit, Vesal. in examine: musculus unus, vel ut Vesal. rotundæ & oblongæ glandulæ, Volch. sinus primus glandulosus quid continet in pecoribus, an in homi-

TABVLA XXV. Musculos, membranulam
tympani, circulum osseum, & cavitatem
tem proponit.

FIG. I.



FIG. II.



III



IV




V



VI



VII



IX



IX



ne inueniatur, ignoro, forte musculus est quorundam, Plat. In equo, porco, cane, duo reperiuntur musculi in ipsa cavitate conchæ dictâ, sinubus proprijs insistentes, rotundi instar glandula cuiusdâ,

tulum depressam habet, membranæ non appenditur, ne hæc, si sola trahatur, ob sui tenuitatē, ruptio- nis periculo subiiciatur. Hic, ut præcedenti capite dictum fuit, dum agit, mallei caput oblique antrorsum & ad interiora trahit, ab Incude deducit, & malleoli processu recurvato membranulam ad exteriora pellit. Vsum hunc esse probat Arantius experimento, hoc pacto: si quis musculum hunc (in capite recenti, & particulis probe administratis) specillo acuminato ad suam originem traxerit, duplicem vsum deprehendet, alterum, quod malleoli capitulum ab incu-

exiles, unus tantum altero maior & oblongior: minor à tenui & longiusculo filo, quasi ligamentali ortus, tendine, subbreui & tenuissimo, stapedis capitulo alligatur. Maior tendine tenuissimo ac breui alterius mallei apophysi affixo donatus, e osse immediate prodit. Horum magnitudo in equo & cane penè equalis est: nec recens natis minor, quam in adultis. An in aliis animantibus etiam sint hi musculi, ignoro: Verum descriptis non dissimilem sapius in eis vidi, Placent.

c Mallei in incudem concussioni fauet minimus quidam musculus, tempore videlicet, quo attentius erectis iam auribus audire conamur, & voluntas nonnihil concurrat, Ingrass. Musculus hic, in quem vsum sit, non liquet, cum auditus prorsus in nostra non sit voluntate, aut musculi non sunt, quos musculos appellant: aut musculi sunt, alij vsui quam auditui inservire existimandum est: Sunt, qui dicunt, cum ex industria illas partes ad audiendum excitare studeat, vel sese quidam aure moueri, vel audiendi vim intendi persentiscere. Equidem id non ita auditui proprio atque communiter motui, atque omnibus sensibus attribuire queo: nam ad alicuius animalis operationis intensiorem excitandam omnes alij sensus concurrere videntur, Volch. De musculi ab Eustachio obseruati vsu neminem scripsisse noui, quæ qui negant, vel nō reperiūt, aut negligētes, aut hebeti visu præditi sunt, qui vero dissimulant, aliena laudis inuidi censendi: cuius actio caput mallei oblique, antrorsum & ad interiora vellere, ab incude diducere, & recuruatâ processu mallei apophysi tympani ad exteriora petere, ut aer denuo influens in illum, ingere, insitumque aerem afficere possit: nam si semel impulsus usque ad ossiculorum contactum è tympano, musculi operâ rursus non seiungantur, connato aere vix a seculo, imperfecta admodum actio redderetur. Quare rationi conueniens videtur, toties extra quam intro cedere tympanum, ad interiora quidem à strepitu aere impellente. Ad exteriora vero, cum à naturali motu, tum à motu arbitrarij instrumenti: hac Arant. in obseruat. Anatom. Arantij opinionem hic refutat Plac. quod si, ait, ita esset, malleo nihil assisteret, quod eius motum ad interiora moderaretur, & sic tympanum, et si ei à circumferentiâ ad sui medietatem usque mallei protensus sit, à periculo non esset vindicatum.

incudis contactu recedet & attolletur; alterum qui consequitur, quod membranula ad externam regionem impelletur. Motus autem hic, qui in auribus fit, & voluntarius esse videtur, cum à musculo motus voluntarii instrumento perficiatur, non facile animaduertitur, imo vel inuiti etiam audimus: ratio, quia exiguus valde est: nec desunt exempla musculorum, quorum actiones tam in dormientibus, quam vigilantibus perspectas habemus, quas tamen non obseruamus, & quasi præter voluntatem fieri videntur; ut in musculis respirationi, oculis, palpebris, vesicæ & ano famulantibus: In nonnullis tamen euidentem esse, & ab ijs vel crebriorum, vel tardiorum effici posse, sic probat Aquapendens: quia motus sensibilis est, & cum strepitu quodam est, perinde ac si quis tria fila nodico intervallo distantia tendat, & plectro percutiat, ut in fidibus etiam fieri consuevit: aut si quis vnuque tabulam per transversum linearum scalpat, vel centillam ignis excussam audiat: præcipue enim cum incitare incipimus, percipitur, quem tamen motum in principio sonus obscurior ab aere commoto præcedit, similis ei sono, qui fit à baculo aerem percutiente. At hic motus & strepitus^f in aure à multis non obseruatur, nec usum habere videtur, nec ad auditum confert: Nam si sonus exterius fiat, & eodem tempore quis hunc motum molietur, deterius sonus externus audietur: quare vel ex necessitate materiæ contingere videtur, & musculorum motum necessario consequi ad malleoli ad incudem attritum, vel excutiendorum vaporum gratia factum: nam in ferribus, ubi maior ad caput euaporatio fit, frequenter hic strepitus persentitur, ut vapores etiam aurium cavitatem opplentes, per huiusmodi motum excutiantur, tum tamen motus non omnino liber fit. Sic quando aures in os per canalem explicatum;

^f Etis musculis tribuitur concussio & attritio ossiculorum, quæ perpetuus in aurib. strepitus sequatur; quem tamen non omnes persentiant: verum de hac doctrina non plus quàm de magicis & fabulis estimandum esse, requisita soni producendi, & medijs interni conditiones, perspicue enunciant. Plac. g Aut asperiorum contactum, cum non, ut cetera ossa ad dearticulationem molli cartilagine incutiantur.

Ggg

expur-

expurgantur, titillationem in oris parte internâ ad
 vuulæ radicem in meipso sentire soleo, & tunc sapi-
 us saliuam deglutiendo, motum illum in auribus
 frequentem fieri ex strepitu colligo & titillationem
 ex materiâ citius in os expurgatâ sedari sentio. Fit
 autem eodem tempore in aurē vtraque, quemad-
 modum & vno oculo moto, & alterum moueri ostē-
 dimus. At ne quis arbitretur in maioribus animali-
 bus melius, quam in homine hunc musculum con-
 spici: quamuis enim hoc destituta non sint, is tamen
 in plerisque longe minor quam in homine occurrit,
 & difficilius cernitur. Hunc si lubeat inquirere, o-
 portet processum petrosum secundum longitudinē,
 vbi linea minime altè insculpta est, leuiter incidere
 (principio tamen ad os sphæroides factō) cum is se-
 cundum longitudinem feratur, & in tympani mem-
 branam excurrat.

Musculus alter [*tabul. 25. figur. 1. a. cuius insertio b.*] in
 meatus auditorij superiore regione circa medium
 extra membranulam tympani consistit: de cuius in-
 uentione duo præstantissimi Patauina Scholæ hoc
 tempore Anatomici certant. Etenim Hieronymus
 Fabricius ab Aquapendente se anno 1599. inuenisse
 asserit. At Iulius Casserius Placentinus scribit, se an.
 1593. 7. Martij primo obseruasse. Sed quisquis horum
 inuentor sit, laudem diligentia vterque meretur, &
 vt constet, nos vtrumque magnifacere, vtriusq; de-
 scriptionem subiiciemus, à seniore principio factō:
 Etenim neutri quicquam derogatum volumus, cum
 vtrumque & amemus & obseruemus: illo etenim an.
 1577. 1578. & 1579. præceptore vfi sumus; hunc vero
 anno 1579. amicū & studiorum collegā habuimus,
 & hætenus amicitiam mutuis literis sactam tectam
 conseruauimus, & vt non dubito, porro, quam diu
 Deus volet, tuebimur. Sic ergo Aquapend.

Præterea hoc an. 1599. musculus inuenire visus
 sum in meatu auditorio, qui *πρὸς ἀκροῦς* dicitur,
 [*tabul. 24. fig. 9.*] qui extra membranam est, exiguus,
 carneus, non expers tendinis, qui à medietate ipsius
 ductus seu meatus rectà fertur, vsque quo in mem-
 branam exterius ad eius ferme centrum inseratur, eâ
 scilicet parte, quâ malleus intus membranæ annecti-
 tur: quam exterius vnà cum malleo trahit. Inuenies
 nunc nouum musculum, si in recenti cadauere cor-
 ticè ossis meatus auditorij hinc inde aut ex ima parte
 malleo cultrum pertundente incidas, & dextrè hu-
 usmodi os ad latera reuoluas: Sic enim tibi appare-
 bit musculus, quem sane in omnibus postea non re-
 peri, quamuis existimem, ipsum esse necessarium. Sic
 ero Placentinus.

In homine musculus alter; in superiori meatus
 auditorij, regione [*tabul. 25. figura 1. a. b.*] consistit, cir-
 a cuius medium cutis & membrana, quæ implicatæ
 inuicem meatum auditorium inuestiunt, euidenter
 hunc musculum efformandum, degenerant in
 corpus carneum, sed pene membranofum, fibris di-
 inctum, tendinis haud expers, rotundum, in pro-
 cessu sensim constrictum, & rectà ad tympanum
 elatum ac insertum, non in membranam exterius
 eius ferme centrum, sed suo tendine, quem supra
 ter tympanum, & eam ossis temporis partem, à
 quo osseus annulus prodit, duabus inuicem distan-
 bus extremitatibus in concham transmittit, inte-
 rius in mallei tuberculum siue caput inter humilio-
 rem & elatiorem apophysin. Si mihi primam hu-
 us musculi inuentionem attribuam, sua laude ve-
 rim non fraudabo inuentorem; quem ego anno
 93. 7. Martij in præsentia, &c. obseruavi: hæc Pla-
 centinus.

Vsum tam interni quam externi Aquapendēs sic

*h Est qui tra-
dit hunc mu-
sculum malle-
um & conne-
xū ei tympa-
nū, introrsum
vellere, cū im-
petu aeris in-
terni extrorsū
commouētur.
Alterum ve-
ro contrario
motui seruire.
Verum huius
doctrinā, ipsa
Anatome cō-
futat, prefer-
tim in illo prio-
ri musculo. Et
enim, cum hic
musculus cer-
uici mallei ad-
natus sit, ver-
sus principium
suum trahens,
malleū quoad
caput intror-
sum: ratione
vero cauda,
quā membra-
na copulatus
ipsum cū tym-
pano extrorsū
mouet, Plac.*

*i Porro fuit il-
lud munus cohibendi motum mallei, musculis & voluntariis instrumentis con-
missum: ut sicuti varia sunt aeris ad membranam impulsiones: sic cohibitio, ac
fistitia motus mallei varia fieret. Ad hanc sane functionem, non ligamēta, eode-
tenore semper agentia, sed musculi voluntarij motus organa, & quæ cum quada-
analogiā & mensurā operantur, & plus minusue, prout opus est, contrahendo fa-
& laxando, aeris variis impulsionibus, quarum quidem varietas, in maioris
norisue ratione consistit, vario motu resistere poterunt, Placent.*

expressit; Vfus horum musculorum est ad membra-
næ custodiam; quæ cum è duobus locis rumpi labe-
factarique periclitaretur: exterius & interius^h ex v.
traque parte parauit Natura præsidium. Exterius e-
nim introrsum trudendo; interius autem extrorsum
membranam euertendo, aer violenter motus rum-
pere poterat: & exterius quidem externus aer, qui ve-
hementius vnà cum sono fertur: Interius autem spi-
ritus interclusus, & ex ore in auditum ingrediens
impetum membranæ intus extra faciens, vt in osci-
tatione, narium emunctione, spiritus cohibitione
magnis conatibus, magna voce, fæcum excretionē,
& similibus violare membranam poterat: ideoque
externus musculus cum membranā introrsum adi-
gitur, extrorsum ipsam trahit. Internus autem, cum
extra euertitur, intrò retrahit: Suntque musculi hi
duabus deseruiētes necessitatibus ad membranæ cu-
stodiam ne rumpatur. Fuitque hocⁱ munus custodi-
endi membranam musculis & voluntarijs instrumē-
tis commissum, quando si aliud quoduis vinculum
custos fuisset, tunc vno tenore semper tensum, ne
quaquam membranam custodisset. Vnde prout va-
riæ sunt aeris ad membranam impulsiones, sic vario
effici motus, qui in maioris ac minoris ratione con-
sistant, par erat: atq; hi nequaquam à ligamento eo-
dem tenore semper agente, sed musculis, qui cū qua-
dam analogiā & mensurā operantur, committendū
erant; qui cōtrahendo sese & laxando plus minusue
prout opus est, aeris varijs impulsionibus, motu va-
rio

io, qui in maioris minorisque ratione consistit, cunctodiam agunt: atque ita ictus membranam suscipere permittunt; vt neque ipsos prorsus euertere, neque ipsi prorsus euerti membranā patiantur: In summanā partim cedendo, partim etiam obluendo hini musculi id præstant, vt membranā à ruptione tuerentur: hæc ille.

At sic Placentinus: musculorum internæ auris, alter malleo contra internum impulsus, alter contra externum famulatur; qui à me inuentus, ac in concham tendinem transmittit maiori mallei processu adnectens, hic partem mallei intus inclinantem retrorsum trahendo, ac compressionem eius, in indidem factam, sic moderando ipsi contra internum propugnaculo existit. Qui ab osse cuneiformi pronatus, in concham ad ceruicem mallei delatus, eiusque insertus est, ipsi contra alterum impulsus opem præstat, eius introcessionem definiens. Etenim cum tympanum, aeris externi irruptione cum malleo indò agitur, hic musculus eorum sistit motum, ne vltra præfinitam metam, tympanum cum malleo indopulsus rumpatur: hæc Placentinus.

Quamuis sonus etiam inuitis auditum moueat, tamē volūtaria quā animaduersione in nobis existit, quam ad libitū in omni sensu exeremus, volentes rectum iudicium habere de quolibet sensibili: quare sicut median- tibus oculi musculis, nos voluntarie dirigimus ceterum crystallini ad aliquod obiectum diligenter spectandū:

intra organum auditus quidam minimus musculus locatur, qui ab anteriore de natus in articulationem trianguli cum incude inseritur, quo musculo contra triangulus seu stapeda cedente interim articulo incudis cum malleo ad antera aliquātiſper trahitur, & ad centrum tympani magis è directo appropinquatur, tuncque optimus cum animaduersione & iudicio fit auditus: non secus ac cōngit, quando minimum visibile intuemur per lineam cornea, pupilla & crystallini concentricam: non ergo officula à musculo mota faciant intra organum auditus, tot actam varios sonos, vt opinati sunt, Varolus.

DE CAVITATIBVS OSSIS

petrosi.

CAPVT LVII.

¶ **T** Si Os petrosum, vt supra ostēdimus, intrinse- a Cavitatem
cus totum cauernosum & spongiosum sit, & ve- vnā veteres
Ggg 3 teres agnouerūt, vt

Carpus, Ar- teres vnius solum cauernæ meminerint, tres tamen
chan. cavitat præcipuas & magni momenti recensēbimus, quas
rotunda, quā- antra & cauernas etiam recentiores nomināunt:
titatis vnius quæ in ossis huius sede mediâ, quâ maxime extube-
ungula, Mas- rat, formata sunt, quo auditus organa, vtpote mem-
sa. Cauernam branulam, ossicula tria, musculum internum, chor-
habet intus in dam, neruum auditorium & aerem congenitum, seu
star labyrin- medium internum contineāt: quæ in pueris, ^b quam
thi, & quin- adultis facilius integræ & distinctæ demonstrari pos-
tus nervus fo- sunt: quibus singulis nomina propria à rebus exter-
ramen cacum nis mutuata, indita fuere, sunt ^c autem Concha seu
& labyrinthū tympanum, Labyrinthus & Cochlea.

Prima ^d [tabul. 24. figur. 2. h. à c. ad E. tabul. 25. q. r.] ca-
Colum Cavi- uitas, membranulæ tympani ablata conspicitur: quæ
tates quadam Concha ^e à conchiliorum similitudine dicitur: vel
plana sunt & tympanum, ^f siquidem cavitās hæc suâ membranula
laues, quadam laxiores pumi-

lis & spōgia modo cauernosa, & admodum varia. & præcipuam quinti nerui por-
tio tanquam membranulâ inuoluit, Vesal. b Vt in auiibus ferè, Placent. ^c In ossi
petroso meatus sunt quatuor, meatus auditorius, tympanum, labyrinthus & coch-
lea. Volch. & Laurent. d Aristoteles multorum Philosophorum sententia, coch-
leam vocat, sed qui hoc dicunt, Aristotelem non recte intellexerunt, cum nullam
similitudinem nec in homine, nec brutis cum cochleâ habeat: dein ex verbis Ari-
stotelis i. hist. ii. id elici non potest, ait: pars interior formâ anfractui cochleæ similis
desinit in os, quod auriculam plane imitatur, in quod quasi nouissimum vasculum
streptus deuenit. Vult Volcher. Aristotelem hic intellexisse tertiam cum secundo:
nam in tertio cochleæ forma conspicitur, & non in secundo, quod si vocasset con-
cham à conchiliorum similitudine, iam aurium brutorum meatui secundo asscri-
bi posset: Et quod dicat, Aristoteles desinere in os auricula simile, in brutis, non in
homine verum est, Volch Cochleam nominare error est, Aquap. Aristotelem coch-
leam appellare quorundam opinio sic & Eustachium appellare Voicherus censuit
at in nullius scriptis hoc manifeste apparet; verum aut omnes tres simul sum-
ptas, quia sic cochleam in brutis animantibus representant: aut non hanc, sed alio-
rum alteram illi significarunt, Placent. Secundus auris meatus vel cavitās, Volch
Secundus meatus, cochlea Aristoteli, Laurent. c Aquapend. Placent. & Arant.
interna cavitās, conchion dicta. f Fallop. Plat. quod reprehendit Volcherus, qui
intus fenestras foramina & anfractus habet, ita vt tympano nulla ratione con-
ferri possit: at in brutis, & præcipue ruminantibus tympanum refert, cum meatus
instar media conchæ, vel tympani Turcici formatum habeat: homines vero tot

lâ tecta, tympanum militare referat, nam membra-
nula percussa resonat: quemadmodum^f tympani mi-
litaris membrana pulsa ob aerem contentum, sonum
edit: quare in homine ab usu, in brutis vero ex usu &
figurâ cum tympani Turcici^f instar, in ruminanti-
bus formatum sit, nomen obtinuit: dicitur & peluis
& antrum. Hæc ossis petrosi principio insculpta est,
inter mammillaris processus radices & sedem illam,
cui maxillæ caput ad articulum inseritur, & parte ex-
ternâ meatum auditorium respicit, à quo solâ mem-
branulâ separatur [*tab. 24. fig. 2. ab h. versus c.*] hinc au-
ris regione intimâ inflammata vel exulcerata, ex ma-
xillæ inferioris motu, in aure dolor excitatur: Inter-
næ vero à foramine arteriæ carotidis squammâ te-
nui distinguitur [*tabul. 24. figura 2. ab h. ad L.*] Am-
plior est multo reliquis duabus cavitatibus, cum
quibus per successuum ingressum iungitur, quo ae-
rem congenitum copiosum contineat & plures so-
nos, qui passim eodem tempore fiunt, & ex varijs lo-
cis mittuntur, suscipiat: dein cum aer internus ab ex-
terno primum moueri, motusque soni imaginem ad
neruum auditorium deferre debuerit, & quo purus
remaneret, expurgari debuit: idcirco in cavitatem hac
instrumenta^h pulsationi, traiectioni & expurgationi
dicata, indita fuere: pulsationi ossicula tria, chorda &
musculi: delationi, fenestellæ duæ: expurgationi, du-
ctus in palatum vergens inseruit: quæ sane cavitatem
non minimam requirebant: quare & subrotunda &
oblôga,ⁱ quo capacissima sit. Est quinetiam vna, quo
plures soni eodem tempore facti, vno tempore reci-
piuntur: Si enim hæc cavitatis prima in plures^k distincta
foret, son^o nec eodẽ tẽpore, nec eod. modo reciperetur,
g Volch. Pla-
cent.

^h Vesalius in examin. quod in modum peluis excavata sit.

ⁱ Volcherus & Laurentius.

^k Plat. orbicularis & plana, Vesal.

1. Sic cum soni
qui ad aures
perueniunt, ali-
j inter se dis-
tincti, alij mu-
tuo permisti
sint; haud du-
bie plurimū so-
norum conue-
tus nō unīfor-
miter & eodē
tempore à fa-
cultate digno-
scentur, si scia-
tim ad plures
cavitates per-
ueniret: in di-
uersas n. pue-
nies, ut diuer-
so modo reci-
peretur, ita &
digrosceretur,

Aquap.

m Volcherus.

Placent.

n Volcher.

tur. 1 Superficies ipsius interior inæqualis, cum alibi
depressiones & foramina, alibi tubera ostendet: imo
statim post membranulam fursum versus anteriora
m fertur & angustatur: dein se dilatans ad superiora
retrorsum tendit, & quasi alia cavitates ad inferiora de-
orsum producit, quæ pars in homine n vesicæ for-
mam [tab. 25. fig. 8. & 9.] in vitulo marsupio auriga-
rum, in hædis & agnis peris mercatricum assimilari
potest. Est etiam aspera & spongiosa; aspera, quia so-
nos recipere, non autem reflectere & duplicare de-
buit: nam si æqualis & læuigata foret, quemadmodū
templorum fornices sunt, echo excitaretur: spōgio-
sa, vt si forte sonus vehementior ingressus sit, qui au-
ditum ledere posset, cauernularum beneficio vis eius
retundatur: imo etiam, vt ibi aer congenitus elabo-
retur, & ad perfectionem perducatur. Substantiā ta-
men est durissimā & lapideā, quo ex aere vehemen-
ter impulsio sonus optime fiat.

Membranā etiam secundum quasdam partes à
pericranio productā oblitur: vbi enim pericraniū
tympani membranulam constituit, duplicatur, in
plures partes diuisa aliquas huius cavitatis partes in-
uestit.

Meatus inter-
nus & propria
sedes auditus,
aeri implāta-
to destinatus
est, vt in eo fi-
at sonus, tin-
nitus & susur-
rus, Volch. ae-
rem quandam

At cum cavitates hæc aeri implantato destinata sit,
qui aerem externum à sono alteratum excipere de-
bet, vt percutiatur, necessum est: at cum beneficio
membranulæ à meatu externo distinguatur, aeris ex-
terni alterationem absque aliis mediis excipere ne-
quit; quare pulsatione opus fuit, quæ officulis chor-
dā & musculis absoluitur: at quo aer internus pulsa-
tio-

puriorem, connatū vel insitum continere summi Philosophi professi sunt, hunc pul-
sato à vocib. tympano affici: vnde in cochlea & alios cacos anfractus, ac quāti so-
boles nervorum agere consueuerūt; vt quadam in inuisis labyrinthis refractione ac
modulatione acquisitā ad communem sensum soni species perueniant, Arant. aer
vernaculus in hac continetur, Laur. in hac sensus audiendi celebratur, Aquap. est
proprium medij interni ac complantati domicilium, Placen.

tionē alteratus ad sonum conferat, canales facti sunt, qui tanquam huius aeris latores ad neruum auditorium deferant, nimirum fenestellæ duæ, cum meatu in labyrinthum: verum aerem congenitum opus fuit purum conferuari: & aere per os attracto foueri & sustentari: quare canalīs in palatum ex hac cavitatē vergens à Naturâ creatus, per quem & expurgatur, & aer nouus ad ingeniti nutritionem succedit: de ijs, quæ ad pulsationem & expurgationem faciunt, cum electum fuerit, nunc de ijs, quæ delationi soni inferiunt, sermo erit.

DE DVABVS FENESTELLIS ET

Aquæductu in cavitatē primā.

CAPVT LVIII.

FORAMINA^a duo in cavitatē hac reperiuntur, a *Ab hac cavitatē in alias*
 Exigua tamen, quæ aliquibus^b Fenestræ vel Fenestellæ dicuntur, quæ meatus auditorij orbem vel *cavernula infinita prope-*
 ex superiore sede spectent; quorum alterum ante *modum, quibus vnuer-*
 us & elatius versus faciem spectans [*tab. 23. fig. 4. & F. tab. 24. f. 2. k.*] in cavitatis quasi medio, figurâ est *sum auditorij instru-*
 uali: (quare fenestella^c oualis dici meretur) oblon- *mentum re-*
 gulari, à lateribus compressâ, & sedē posteriore in coch- *fertum est, ab-*
 leam^d insigni amplitudine se aperit, & cum cochleæ *eunt, Aqua-*
 anteriore sedē ita commune efficitur, vt non aliter *pend.*

Fenestella oualis in foramen cochleæ, quam huius *b Foramina,*
 foramen in fenestellam pertinere, quis asserere pos- *Vesalio, Fene-*
 t: hoc etiam foramini posteriori se coniungit, & in *stra, Fallop.*
 teriora progrediens, dilatatur, forumq; quodam *Volcher. Pla-*
 modo, aut fodinæ alicuius metallicæ præcipuam se- *cent.*

em constituit, à quâ^e multæ plateæ, aut viæ, aut cu- *c Fenestra o-*
 nicu- *ualis Fallop.*
 Ggg 5 *& Plat. fene-*

illa oualis, Laurent. antè foramen, Vesal. d In labyrinthum via est, mo-
 nte Fallopio, ait Aquapendens; in cochleam sese aperit, Placent. In buccinosum
 item se aperit, Volcherus.

^e Sic & Vesal. in exam & Volcher.

f Stapedis ba-
sis claudit, &
semper clausa
manet, Fallo.

Volcher. Plat.
magna ex par-
te claudit, A-
quap. in coch-
leam se aperit;
attamē mem-
brana, cui sta-
pedis basis ap-
posita est, clau-
sum existit,
Placen.

g Posterius fo-
ramen, Vesal.
h Volcher. &
Placent.

i Vesal. Vol-
cher. Plat.
Placen.

k Volcher. po-
nit hic me-
tum tertium
communem
parti antero-
ri & postero-
ri foramini,
vel utraque
fenestra, ubi
termini fene-
strarum con-
grediuntur,
& unde laby-
rinthus &
cochlea prode-

unt. l Sic Fallop. & Placent. cui & cæcus meatus, quartus meatus processus pe-
trofi, osseus canalis, qui à quibusdam cæcus meatus & cochlearis meatus, capreo-
laris meatus, & à Fallopio, Aquaductus, Volcher.

m Τυφλὸς Galeno & Vesalio, non sine errore cæcum meatum appellant, quod no-
men tertia cavitati potius debetur, Fallop.

n Cæcum etiam dici potest, quod tenuis & circumducti vertiginosique intestini
loco per pulchre censetur, Volcher.

niculi excurrunt. Huic stapedis basis incumbit, &
magna ex f parte claudit. Alterum g foramen poste-
rius est & humilior [tab. 23. fig. 3. & 4. G. tab. 24. fig. 2. l.]
quod rotundum est priore minus, & paulo angusti-
us, in homine, at in vitulo h & oue paulò amplius &
nonnihil extuberans, semper patens, & ad cavitatis
posteriora declinans: & cum priori in cavitare, quæ
per os penetrans in canalem geminum scinditur, de
quo mox dicturi sumus. Inter vtramque [tab. 24. fig.
2. k. & l.] fenestellam (supra humilior foramen) tu-
berculum intercedit, quod cum foramine rotundo
& tuberculo extuberante subdito superiori sedi, par-
uæ conchæ conferri potuit, quæ in frenorum i orna-
menta adhibetur: in tuberculo vero camera tertiæ
cavitatis siue cochlea latitat. Munus est, sonum acri
implantato communicatum per pulsationem exci-
pere, & ad cavitates sequentes transmittere.

In canalem geminum foramē humilior finditur,
qui sibi mutuo accumbunt [tab. 24. fig. 2. ii.] & squam-
ma ossea tenuissima diuiduntur, & altero eum fene-
stella ovali cochleam petit, altero in labyrinthū fer-
tur. k Horum anterior venæ iugularis sobolem in-
tromittit, & ramulum quinti paris emittit.

Aquæ ductus l posterior canalis [tab. 23. fig. 3. H. ta-
bul. 24. fig. 2. g.] assimilatur, ob similitudinem, quam
cum aquæ canalibus per cuniculos impositis, & hinc
inde vario modo diductis habet, & à quibusdā coch-
learis canalis, à veteribus & Galeno m cæcus meatus,
alijs tortuosus vel capreolaris, non quod cæcus n sit,
sed

sed ex eo, quod seta porcina immissa difficulter perquiri possit: imo in aridâ caluariâ bouis hoc foramē, setam nullâ ferè ratione transmittit. Hic tortuose antrorsum primum, mox retrorsum & oblique supra foramen cavitatis primæ fertur: inde deorsum delatus in foramen auditus quintum [tab. 24. fig. 2. a. β. γ. α.] desinit. Foraminibus peruius est, in principio [α.] quod illi cum meatus auditorii nerui sede elatiore commune est: dein in ductu medio, & quidem externæ in huius canalis anteriore sede [α.] foramen auditus quintum constituit, & arteriam à se dimittit: sic & sede internâ [γ.] ad cavitatis secundæ initium se aperit, in fine quoque foramen habet [β.] quod in auditus os tertium desinit. Per hunc canalem nerui auditorij maior portio & arteria variè deducitur & dilatatur: postquam enim nerui quinti paris ramus indurescere debuit, debuit etiam per ossis durissimum & siccissimum anfractuosum foramen deduci, maxime cum illi per locum alium via non pateat.

DE LABYRINTHO ET COCHLEA,
sive cavitare secunda & tertia ossis
petrosi.

CAPVT LIX.

CAVITAS^a altera à variis anfractibus & cuniculis labyrinthus^b & fodina^c dicitur: quæ in petrosi ossis sede posteriore & anteriore, seu huius processus, radici insculpta est, & à nerui auditorij meatu squamma tantum distinguitur [tabul. 24. fig. 2. inter m. & e.] rotunda est & priore minor; quæ ubi sub tuberculo & post fenestellam oualem sese cavitati sequenti iungit, interiora subiens dilatatur, & sonum

a Cautas ter-
tia, quam la-
byrinthū vo-
cant, Volcher.
(cui & mea-
tus tertius se-
dis auditus)
Laur. Cautas
secūda Fallop.
Plat. Placent.

quo- b Fall. Volch.

Placent. c Antrum fodinarum, Vesal. ex am. labyrinthus vel fodina, Plat.

quodammodo, aut fodinæ alicuius (vt ante monuimus) metallicæ præcipuam sedem constituit, à quâ multæ viæ excurrunt, quæ per ossis substantiam duram, veluti in circulum excauati procedentes in amplam cameram rursus reuertuntur. Has vias cunicu-

d Fallo. Vesal. in exam. Volcher. Plat. e Sis & Plac. los^d vocamus, seu semicirculos^e ossæos [*tab. 23. fig. 4. & 5. N N N. tab. 24. fig. 2. m. 1. 2. 3. & distinctim m. cum ch. 1. 2. 3. fig. 6. V.*] & tres constituimus, quæ ita feruntur, vt duo angulis, quasi rectis sese bis intersecant: manifestior autem intersectio supra cavitatis tertiæ apicem perficitur, vbi foramen quinti paris neruum excipiens finit. Oriuntur autem principio satis amplo, & sensim angustiores redduntur, cum per canalem latum sonum ferri commodum non fuerit, & hi per ossis substantiam delati, & circulares reflexi ad suum principium recurrunt, ita tamen, vt toto processu

f Fall. Volch. at sic Plat. & Placen. transferim ab interioribus extrorsum: rectâ ab anteriorib. retrorsum: oblique à posteriorib. extrorsum. nunquam in se inuicem manifeste pateant. Horum^f vnus inferior ab anteriore parte cavitatis diuertens exterius (in eadem tamen cavitare) fertur; dein reflexus per angulum posteriorem recurrit: alter^f ab eodem angulo anteriori prodit, qui sursum latus semicirculo factò per angulum posteriorem regreditur: tertius^f oritur & finit in cavitatis angulo posteriore; nam inde ortus perforatoque osse canali quodam circulari exteriora versus, illuc iterum reuertitur. Et hi in infantibus integri à cavitare & crustâ, quâ os obducitur, separari possunt, qui temporis successu lapidescunt & vniuntur. Hi canaliculi in longum produci non potuere, propter ossis petrosi breuitatem, licet vtile foret, cum longitudo ad sonorum aciem utilis sit: Quare natura horum breuitatem circumuolutione recompensauit: quamuis & hæ spiræ & circumuolutiones auditui inseruiant, quatenus per has, quasi per diuersos gradus voces sensim elaboratæ, & quodammodo fractæ in cerebrum

brum ascendât. Canaliculi quoq; hi in superficie inferiore membranulâ quadam mollissimâ ac tenuissimâ vestiuntur.

Foramina habet, siquidem cuniculi suo egressu & recurso in hanc cavitatem foramina sex faciunt: in hanc etiam à prima cavitata & foramina duo deficiunt: Sic etiam minutissima quædam à nervi auditorij meatu humiliore & à canali communi [tab. 24. fig. 2. 7.]

Horum anfractuum usus, ut soni per adeo angustâ loca delati, acutiores fiant, nec dissipentur, quod ex artificialibus instrumentis, præcipue musicis satis liquet; utpote ex fistulis manualibus & organis: hæ enim quanto angustiores longioresque sunt, tanto acutiores sonum reddunt: primo enim aer quietus & tranquillius in canalibus contentus soni alterationem facilius excipit, quam aer ex agitatione conturbatus: dein aer angusto loco conclusus, non dissipatur; sed unitus permanens, sonum maiorem ac effectivorem, quam dispersus, edit.

Cavitasⁱ tertia, Cochlea^k à meatus flexuosâ obliquitate, quæ cochleæ gyrum elegantissime imitatur [tab. 23. fig. 4. & 5. O. tab. 24. fig. 2. sub n.] siue^l quod testæ cochleari exteriori superficie rotundâ datactâ, & parte anteriore, quæ in spiras contorquetur, referuatâ,

g A prima cavitata in alias aliasque itur propemodum infinitas cavernulas, quibus auditorij organum univsum ita refertum est, ut assequi ac dinumerare possibile non sit à primo tamen foramine ex cochleâ, ut vult Fallo. in labyrinthum itur, secundum ducit in cochleam: tertium in alias ducit cavitates, quæ tam innumera sunt, inuicemq; intricata, ut merito

labyrinthus dicantur, & admirari quidem eos liceat; dinumerare autem, seu ad ordinem quandam redigere aut dirigere, non est, ut quispiam tentet. Vanus enim, ut puto, omnis erit susceptus labor. Deprehendes hac certissima esse si sine ullo delectu ex omni ferme parte huiusmodi osseum organum incidas, videre enim videberis, unâ exceptâ externâ crustâ, reliquum ossis cavernosum, foraminulentum, perusum & spongiosum totum apparere, Aquap. h. Non innumeri, neq; inuicem admodum intricati, ut dinumerari, seu ad ordinem quandam redigi non possint, Placent.

Cavitas quarta, Volch. (cui & meatus quartus sedis auditus) Lanr. de qua hæc solum postrema cavitas Fallop. cochlea dicitur, quod testæ cochleæ similis sit: sunt qui foramen cacum vocitent. k Cochlea vel cochlearis cavitas vel caca Fallop. intrum buccinosum Vesal. in exam. cochleata vel buccinata à forma, Volch. (qui

& ca-

& *cacam ca-* uatâ, similis sit, dicitur. A¹ Vesalio^m buccinosum
uitatem dici antrum vocatur, à buccina cornu recuruo ac con-
monet.) & torto, quo pastores pecus conuocare solebant; vel
Plat. cochlea potius à buccinâ conchilij specie, à quibusdam fo-
 & *cochleatū* ramen cæcum & cauitas cæca nominatur; quia exi-
antrum, caca tum non habere, nonnullis visum fuit: verum etsi
cauitas aliis, spirarum modo conuoluatur, tamen exitu non ca-
quia putârūt, ret, cum in medio, parte eâ, cui spiræ innituntur à
eam secundum principio ad finem vsq; meatu angusto & recto per-
torum ductū uia sit: nam si cauitas hæc cæca esset, aer p̄cussus ner-
spirarum per- uo occurrere non posset. Hęc duabus prioribus lon-
zsum non es- ge minor est, in anteriore sede processus sub tuber-
se, Placent. culo cauitatis primæ sita, quo sono, qui à postero
1 Eustachius, re parte antrorsum vergit, occurrat: & à canali aquæ-
Volcher. ductui simili, qui in medio processu petroso situs est,
m Volch. Pla- osse tenui ponticulum referente distinguitur [*tabul.*
cent. 24. fig. 2. inter n. & f.] oblonga est, sed incurua, gyros
n Tribus spi- tresⁿ nonnunquam & quatuor, se se mutuo excipi-
ris, Eustach. entes, cochleæ in modum habens, quibus introrsum
tribus quatu- nonnihil & deorsum intorquetur: At spirarumⁿ e-
orne glyris, latior, superiorem sedem obtinet, & neruum susci-
Volch. pit; angustior inferiorem & ossis cauo terminatur,
 o Si quis hanc & exitum^o consequitur. In hanc cauitatis primæ fo-
cauitatem ca- ramen p̄ seu fenestella oualis [*tab. 24. fig. 2. l.*] definit,
cum meatum & quidem in huius ossis spiram maiorem. Hoc os
appellarit, cū cochleæ, ex spirarum q̄ duplici genere constat, qua-
nullum veluti rum alterum ab ossẽ substantiâ admodum tenui &
cochlearū te- siccâ, & quæ facile teritur, creatur, & vndiquaq; ser-
sta exitū ha- penti in spiras conuoluti similis. Alterum ab Eusta-
beat, non ma- chio
le fecerit,
Fallop. Mea-
tum, in quem
neruus audi-
torius inferi-
tur, permeare
aliqui negant:
aliqui in medio cui spiræ innituntur, peruiam esse aiunt: desinit in cochleam me-
mediate interpositâ ossẽ laminâ prætenui in meatum nervi auditorij, Placent.
 p Foramen humilius, Plater. elatius Placentin.
 q Eustachius & Volcherus, duplici constat helice, alterâ ossẽ latiore, qua à la-
 byrintho est continua, altera membranosa & molli, quem ea format membra-
 na, qua duplex hec antrum vestiens, utramque oberrat fenestram, Placenti-
 us.

ethio primum propositum, quod ex materia fit, molli, mucosa, firma tamen, & quæ nescio, quid & arenosi permixtum habet: oritur ex medio spatio spirarum primarum, tanquam ex ampliori basi, sensimque extenuatum in acumen definit, sed non tam altè conscendit, ut ossis ambitum, qui spiras priores terminat, attingat. Hanc miram Opificis nostri industriam, primus Empedocles innuisse videtur, cum & auditum spiritus impulsione fieri docuit, qui cochleæ simile intra aurem tintinnabuli instar suspensum percutit, ac pulsatur: cui etiam Aristoteles & assentire videtur, asserens auris interiorem partem formâ anfractui cochleæ similem, in os desinere, quod auriculam danè imitatur. Hæc, ut & secunda cavitates, & eius cuniculi, eo modo, quo etiam dentium cavitates naturales membranula quadam & mollissimâ ac tenuissimâ vestiuntur. In hanc cavitatem non secus, quam præcedentem à canali, per quem neruum auditum ferri diximus, tria, aut quatuor foramina minima, & adeo exilia, ut vix capillum aliquando admittant, feruntur, per quæ neruuli à quinto pari, aut osorum facultas membranulæ dictæ communicantur. Et licet in prima cavitatem maxime auditus fieri credatur, non tamen negari potest, quin & in aliis fiat, cum in eas, uti dictum, neruorum propaggines erantur, & ab his quoque spiritus animalis & aer congeneritus contineatur: nihilominus tamen posteriores duæ cavitates videntur potius echo, seu soni ad primam cavitatem reflexum, prohibere.

r Galeno in libro de historia philosophica teste.

f. l. hist. animal. II.

t Quinti parvis nervus insigniore sua portione, cavitatem temporis ossi incisam, membranula ritu succingit & oblinat, non quidem uniuersam, sed nonnullas ipsius sedes, ac si insignior nervi portio in plures membranas diducere-tur, qua ali-

Quod

not eius regionis cavitates obducent. Vesal. an sit nervus expansus, an aliud non refert. Fallopius, membranulis à nervorum sibi libellus diductis succingi putantur, Plater.

Fallopius qui addit, verisimile à dictis propaginibus membranulam ortum accere: idem & Volcherus. Eustachius vult 3. vel 4. foramina minima reperiri, una à canali in 2. & 3. cavitatem pertingunt.

x Vsum huius
cauitatis do-
cet ac confir-
mat buccino-
sa testa multis
gyris circūuo-
luta; nā si talē
testā forami-
nesuo quis au-
ri admonerit,
miros quis au-
diēt sibilos ac
tinnitus, su-
furrosq; exci-
tari, quod si
quis apici aut
cano perfora-
to inflārit, tu-
ba in modum
sonus edetur,
Volch.

Quod vero x cauitates hæ foramina habeant, va-
riæ magnitudinis, longitudinis & figuræ, id propter
sonorum differentiam factum: grauis enim sonus &
aer copiosus amplum foramen, contra acutus, angu-
stius requirit: longitudo vero, soni reflexionem &
echo prohibet: quare sonus maior, longiores, minor
breuiiores cauernulas postulat, quo sonus in ijs velu-
ti contabescat, & echo impediatur: figuræ varietas,
vel ad soni & aeris naturalem delationem facit, quæ
per circulationes & gyros, vt plurimum fit: vel vt in
ijs sonus quiescat, qui citius quiescit, si circumgyre-
tur, quam si rectā feratur.

DE NERVO, QVI AD AV- res fertur.

CAPVT LX.

De hoc Galen. 8. vs. part. 6. de diff. neruor. 6.

a Ab auribus
meatus in oc-
ciput penetrat
2. part. an. 10.
ab interiore
auris parte
meatus ad ce-
rebrum nullus
est. 1. hist. an.
11. quinta cō-
iugatio poste-
rius oritur è ce-
rebello proxi-
me sub nervis
gustatoris (Archang.) pluribus surculis procedens, inuicem mox connexis, indeq;
in duas diuisa inæquales propaggines, vnā alterā grāciliorē, vtraque per secundum
ductum auris ad concham & labyrinthum fertur, Placen. b Mollities & duritie
neruorum à tribus pendet: vel ab exortu, sic qui à cerebro molliores, qui à cerebelli
& spinali medulla duriores: vel à distātia: quia longius à principio distāt, vel ppi-
us sunt: sic optici mollissimi, manū & pedū durissimi sunt, vel à contactu durior
corporū, vt ossiū, cartilaginū & membranarū mollitiē & duritiē comparant. Pla-

rem: durior est altera, non secundū totam longitudinem, sed solum partem eam, quā alterā longior est. Gracilior ramus per prædicti meatus foramen superius canalem osseum occultum, quem Aqueductum vocauimus, subintrat, versus capitis anteriora serpit: dein reflexus cavitatem primam ingressus proprio hoc canali deorsum, & versus posteriora ad pinnæ auris radicem foras ex osse elabitur, & in tres præcipuos ramulos scinditur: quorum maior & elatior in turiculæ radicem anteriorem & posteriorem, eiusq; ibram excurrit: alter inferior per maxillam latus, in nasseterem & buccas mouentem primum distribuitur: tertius medius & capillaris in partes glandulosas & membranosas ad auriculæ radicem disseminatur: reliqui capillares in laryngis & ossis hyoidis musculos absumentur; & hæc causa est consensus aurium; lingua & laryngis: hinc propter obstructionem nervi auditorij à prima conformatione, qui surdi nascuntur, pariter & muti generantur.

Altera vero & crassior ^c nerui portio, quæ mollis est, & proprie neruus auditorius existit, cum solum d audiendum faciat, per prædicti meatus foramen inferius fertur, & etiam in huius ossis cauernas discurrit: ^d potiores tamen rami in prima, tanquam posteriore & maiore cavitare terminantur, & instar membranae dilatantur, & auditus præcipuum instrumentum fit. Quare in hac cavitare potissimum auditum celebrari volunt, cum ad eam spiritus animalis à nervo in-

^c Maior propago secundum longitudinem instar semicirculi eleganter excavatur, minoreq; quod alios fugit, amice suscipitur, & amplectitur, eaq; modo amba simul

H h h

uo in-

uncta, oblique in anteriorem & anteriorem partem usque ad extremum sinus in se petreo sinuli earum gratia exsculpi procedunt: ubi minor propago à maiore, ecedens, paruum foramen sibi paratum inuenit & ingreditur, miroq; admodum lexuoso incessu extra caluariam elabitur. Maior autem propago, videtur in tres portiones parum inuicem distantes terminari: ex quibus præcipua exiguo foramine in cochleatum os peruiso obducitur. Eustach. Idem refert Volch. quem admodum hæc, qua habet Fall. & Vesal. in suo exam. in obs. Fallopij, & Fallopij sententiam approbat. d Hic congestit, nec ulterius subit, ibidemq; esset lamina, qua semitam nerui auditorij à concha & labyrintho dirimit, impingitur, & adnectitur, Placen.

uo influat, qui aeri congenito commisceatur, & ita sensum sensibilis ipsum aerem consequi aliqui putant. Ab eadem in alias cauitates geminas per foraminula angustissima dicti canalıs, fibellæ feruntur, & membranæ, quæ cauitatem secundam & tertiam succingit, communicantur.

e 8. *aus. part 6*
f 2. *Collect. hic*
sonorū omniū
imagines ad
sensum com-
mune tan-
quam iudi-
cem & censo-
rem vehit,
Laurent.
g *Eustachius,*
Volcherus, &
Placen.

Vfus huius nerui ex Galeni ^e & Auerrois ^f sententiā, vt auditus sit organum & sensibile extrorsum occurrēs excipiat, & sonorum imagines ad cerebrum tanquam iudicem deferat.

Verum s à quarti paris neruorum cerebri ramo, exilis propago itinere reflexo iuxta canalem osseum, qui in palatum abit, aurium cauitatem permeans ingreditur, & oblique tympano, ac dein malleo supra musculi insertionem adhærescit, & vltius procedens, os petrosum, in posteriore sede meatus auditorij perforat: mox deorsum, reflexa parum, repit, & tandem cum graciliori duriori; ramo quinti paris iungitur & coit. Hunc neruum voluit Eustachius, filum seu chordam tenuissimam alios vocare, quam per membranæ tympani medium currere asserant; sed vnde oriatur, & qua incidat, & num neruus, an arteriola sit, ipsos ignorare.

DE AERE AVRIBVS IM- plantato.

CAPVT LXI.

a 7. *de Plac. at*
libr. de oculis,
visus, igneum;
auditus aere-
um; gustus a-
quosum; ta-
ctus, terreum;
& olfactus,
fumosum esse
scribitur.
b *Cum Gale-*
no de instrum.
odoratus 2.

GALENVS ^a de sensuum instrumentis verba faciens, visus instrumentum lucidum; auditus, aereum; olfactus, vaporosum; gustus, humidum; tactus, terreum esse pronunciauit. Quare, cum auditus instrumentum ^b aereum, vel aeri simile dicimus, volumus esse partem corporis humani (partis nomine in latiore significato sumpto) quæ aeris naturam & con-

conditionem imitatur. Aer autem hic, cuius primus Plato inter Philosophos meminit, à primo orta in vtero materno; auribus inditus ē fuit, quamprimum spatia vacua in ossē excauata fuere, quæ omnia hoc iterereplentur: quare veteribus Philosophis & Medicis, imo ab Aristotele *συνπνεύς*, infitus appellatus uir: alijs congenitus, implantatus, complantatus & nãdificatus. Conflatur autem ex seminis substantiã ereã, eaque purissimã, cui sanguinis materni substantia aerea purissima affunditur, vt proprium quasi corpus sortiatur.

Hic in aurium ē cavitatibus continetur, & hoc

Hhh 2

ex grossis exitus

ateret: at ore & naribus oclusis, spiritu cohibito, & buccu inflatu, aer ab ore in aurem impellitur, & auditus organa percutit: aer vero impulsus ex transglutitionis conformatione regreditur. 2. Sape flatus siue halitus crassus tinnitum exicans, masticatione educitur. 3. Via manifesta est, & satis ampla à secundã cavitatem os, per quam cauitas illa masticatorijs alijsue expurgatur. Quare opinandum, aerem implantatum non esse in secundã cavitatem inclusum. A cerebro per nervos transfundi, ut maior pars opinatur, vix potest, cum nullus nervus in aurem terminetur. Est quidem via aperta ab ore & naribus, per quam aer externus in secundam cavitatem immitti potest: sed num hic aer ad audiendum aptus sit, non ita quet: ceterum, cum hic spiritus nihil prater aeris in sono mutationem pati debet, conijciendum est, per os & nares aerem externum immitti in secundam cavitatem, indeq. generari, vel saltem foueri aerem implantatum. Imo et si aliunde, quam à externo prodiret aere, tamen sine dubio non erit sincerus, purus, & impermixtus. Aer hic qualiscumque sit, est primum & precipuum audiendi instrumentum, vis scilicet anima: Secundaria autem instrumenta sunt ea omnes partes, quæ ad audiendum aliquid adiumentum præbent, Volcherus. d 2 de animã, cap. 8. textu 3. quo capite de sono, voce, & auditu agit: sensorium audiendi aer est 2. part. anim. 10.

Aer vernaculus in secundo auris meatu (intelligit cavitatem primam) continetur, quem inãdificatum & immobilem vocat Aristoteles Laurent. Audiendi instrumentum, seu corpus aereum, in extremo eo antro seu ductu, qui exsculptus est in lapidoso ossibus, cum auris assistit, situm est: figuram globosam imitari probabile est, cum hanc naturam, quoad fieri potest, partibus omnibus pertiat, magnitudine maxime exiguum est, cum minimum quid satis sit ad capiendes sonos, adstringitur membranula tenuissima, à quã undique circumsepitur, quã mediante committitur tribus ossiculis: geminum est dextrum & sinisterum principium, à quo exorsitur, non agnoui, quum pars sit à ceteris distincta,

peem-

peculiarē substantiā & corpulentiam sortita: at principium, ex quo ei attribuitur:

ex eo probari potest, quod omnes cauernæ, prima excepta, in quâ officulâ, musculus & chorda, vacuæ sunt, cum tamen vacuum in natura non detur: quare & Aristoteles alijque veteres aere plenas esse asseruerunt.

fit. n. ex aereâ seminis substantiâ, cui of funditur aerea substantia sanguinis materni, ut illius moles ac corpulentia aerea perficiatur, & sic consurgit corporis humani pars aerea, quæ pars est similis, principalissimum auctendi instrumentum: alia vero partes addita ad feliciorem auditionem exercendam, Archan. f. 11. Problem. 17. Cur voces nostræ grauiorē sint hyberno tempore, quærit.

Est autem tenuis, purus, omnis soni expers, immobilis, multus & copiosus, & ab externo separatus; tenuis & purus, quo promptius & perfectius sonum externum admittat: nam per crassum & nebulosum aerem, sonus infirme vehitur, & difficulter auditur: unde & voces nostræ hyberno tempore, quam æstiuo grauiorē sunt: quia, ut Philosophus^f voluit, aer tam interior, quam exterior hyeme crassior est: crassior autem cum sit, tardius mouetur. Omnis soni expers; quare noctu res melius audiri possunt; quia nullus strepitus est, ut Philosophus^g monuit: accedit, & quod aer interdum densus, quia luce radijsq; refractus, noctu vero rarior, quod ex eo ignis & radij decesserunt. Idcirco aer externus, qui à sonis alteratus, & vndæ instar fluctuans ad aures defertur, aurem internam ingredi non debuit, neque aerem conge nitum tangere: nam, si ingrederetur, & auditus imperfectus redderetur, & auditus instrumentum citissime labefactaretur; quod oscitatione ex Aristotele^h probatur: inter oscitandum enim minus audire possumus, eo quod multum spiritus effluentis, aures etiam intrinsecus subit, ut motio vel sensu percipi possit: sic dum interior, exteriori occurrenti renititur, strepitus in auribus nascitur, spirituque circumacto, minus audimus.

g. 11. Problem. 33. Cur nox ad audiendum a prior sit, quam dies quærit: Vtrum, ut Anaxogoras ait, quod aer interdum stridet, à Sole concalfactus & obstrepat, noctu requiescit, utpote cum omnis calor ab fuerit.

h. 5. Gen. anim. 2. 11. problem. 29. qua de causa oscitantes minus audire possumus, quærit.

audiendum, vt omnes soni differentias ⁱ exacte susci-
piat: quietum enim aerem interiorem requiri, au-
rium tinnitus & sonitus & aer ventorum agitatione
commotus, ostendunt. Mobilis tamen est, non quod
sponte semper moueatur, sed quod ad leuem impul-
sum ab aere externo moueatur, & motu locali agite-
tur, quatenus membranulam tympani pulsans, simul
aerem internum mouet, quo soni speciem consi-
milem induat.

Copiosus & multus; talis enim ad soni ^k plenam
receptionem conducit.

Ab externo separatus est intercedente membra-
ulâ tympani, ne auditus instrumentum labefacte-
ar: ab aere enim externo ingrediente modo frigi-
diore, modo calidiore, nerui auditorij, & propter cō-
iunitatem cerebellum & cerebrum læderetur. Imo,
aer externus ipsi congenito proxime iungeretur
& commisceretur, cum externus in motu perpetuo
est, & satis crassus & impurus, sæpe etiam fumosus, in-
terdum animalculis paruis refertus, auditus procul-
ubio periret: nam & congenitus crassus, caligino-
sus, puluerulentus ac fumosus redderetur, & animal-
culis repleretur. Sæpe etiam propter aeris externi
violentum motum, congenitus, & cum eo spiritus
animalis è propria sede pelleretur, & auditorius me-
as furdus penitus euaderet; huius etiam membra-
ulæ beneficio, sub aqua existentibus, aquæ ingres-
sus & auditus priuatio impeditur: sicuti piscatoribus
& ijs euenit, qui in aquam frequenter demerguntur:
is enim aures rumpi, & auditu priuari, testis est Ari-
stoteles in Problematibus.

Hic eiusdem naturæ cum aere externo non est,
sed cum eo similitudinem quandam habet, quod ex
his Galeni verbis elici posse videtur: non autem à
quouis sensibili omne sensorium immutatur, sed

*i Aer, qui in
auribus ex-
tinguitur;
sive intus con-
ditus est, vt
sit immobilis,
quo exacte scē-
tiat oēs diffe-
rentias motus
Arist. 2. de A-
nimâ 8. alij
immobilē di-
cunt, quia non
moueatur ab
alio, sed idem
in aurib. sem-
per maneat: a-
lij, quia natu-
ralem nullum
habet sonū, sed
potest omnes
sonorum diffe-
rentias susce-
re, Lauren.
^k Alij, vt plu-
res sonos, qui
passim eodem
tempore sunt,
recipere vale-
at: cōtra Pla-
cent, non enim
ob partiū mul-
tiplicitatē so-
nos plures ex-
cipit, cum à
qualibet eius
parte recipia-
tur, quicunq;
in aurem illa-
bitur.*

1 *Simplicius*
aerē hunc im-
planatum, a-
nimatum esse
scripsit.

m Aerē hos
corpus sangui-
ne p venas de-
lato nutritur.
Et id quidem
p diadosin seu
transsumptio-
nem: quemad-
modū crystal-
linus vitreo
nutritur per
diadosin, ex
hoc veluti ex-
surgens, quan-
tū ad sui nu-
tritionem sa-

splendidum quidem & luminosum à coloribus: ae-
reum à sonis; vaporosum ab odoribus, & vt in sum-
mā dicam, simile simili notum atque familiare. Qua-
re huius aeris naturam ¹ eandem esse cum animal
spiritu, quem aereum esse constat, censemus: & vtri-
usque eadem & conseruationis & refectionis ratio
hic successiue generatur & dissipatur, quemadmo-
dum spiritus animalis quotidie dissipatur, & quoti-
die nouus regeneratur; sic aer auribus inclusus ex
parte & generatur & dissipatur: nam si omnino peri-
ret, simul etiam audiendi potentia periret. Reficitur
autem & nouus restituitur ^m ex aere per nares & per
os inspirato, maxime vero per os, qui per viam am-
plam & patentem ad aures per canalem, per quem
etiam repurgatur, transluit.

ⁿ Vfus: hoc audiendi facultas vtitur, tanquam me-
dic

tis est, sicuti vitreus ex membranā araneā alimentum sibi accommodum trans-
sumit. Et quidem hac ratione: in aranea vena sunt. Et sanguine nutritur, quod pos-
huius nutritionem superfluum est, à vitreo transsumitur, quo cum fuerit nutritur
quod ex vitrei nutritione superfluum est. à crystallino, vt idoneum alimentū trans-
sumitur, Et ita crystallinus nutritur alimento à vitreo preparato, Et vitreus ali-
tur alimento ab araneā preparato, vtrique superfluente. Idem in aereo audiendi in-
strumento viuunt. Nam membrana illud insu-
stiens venas accipit, Et sanguine
nutritur, quod ex eius nutritione superfluum est, Et à sanguinis natura iam pluri-
mum distat, ab aereo illo corpore in propriam passionem transsumitur Et attrahi-
tur. Verum quæ Et vi: à si uatur hoc audiendi instrumentum, omnesq; partes ei in-
strantes, arterie in organi audiendi structuram confluunt, Archang. n Aer senso-
rium audiendi est, Arist. 2 part an. 10. 5. gen. an 2 Veteris enim hunc aerem prin-
ceps Et primum auditus organum esse existimarunt, Et huius aeris ratione au-
ditus naturam aeream esse docuit Arist. Spiritus auditilis in concavitate ossis pe-
trofi, instrumentum est auditus, Mundino aer implantatus suscipit species auditus,
Carpe: Spiritus aeris: inclusus propriū auditus organum est, Varolo: Aer hic pri-
mum Et precipuum audiendi instrumentum est, pars scilicet anima, Volch. Audi-
tus principalissimum instrumentum est, quo audiendi facultas in vocibus Et sonis
percipiendis Et diiudicandis utitur, Archang. huius munus sonos externos suscipe-
re, Et sic auditus precipuus auctor est, Aquap est materia soni recipiendi, medium
transuect ex li: receptum enim sonum non cognoscit, vel iudicat, cum inanimatus
sit: hic aer: anima autem actio aliqua, ab eo quod anima experta est, ediri non potest.

dio interno, ad sonos & voces suscipiendos & transuehendos ad neruum auditorium, quo cognoscantur, & quemadmodum in omni alio sensus instrumento ad sensus externos perficiendos, medium & internum & externum requiritur: internum quidē, ut in visu, humor aqueus; in gustu, saliuā; in odoratu, ossa spongiosa; in tactu, cutis ° medium internum censetur, in quibus formæ à rebus denudantur, & ita denudatæ ad princeps sensorium traiciuntur. Sic in auditu aer hic congenitus est, qui ad soni receptionem ac delationem auribus implantari debuit. At rursus, quemadmodum in omni sensus instrumento medium internum datur, à parte principali distinctum, & cui tanquam præcipuo instrumento organæ actio debetur, sicut in visus organo, albugineus humor medium internum censetur; pars vero principalis crystallinus humor, recipiens, non vero diuiduās: Sic in auditu medium hic aer est, pars vero principalis, neruus auditorius ad cerebellum deferens.

Placēt ad auditum maxime necessarius, sine quo auditum vix fieri puto, sed princeps esse auditus organum, nūquam mihi persuaserim, &c. maxima cum anima expers sit, sed potius medium internum, Laurent.

o Cuticula, Laurent.

AUDITVS QVOMODO FIAT

& de soni natura.

CAPVT LXII.

Consule Aristotelem 2. de Anim. cap. 8. 5. gen. anim. 2. libellum, cui titulum de ijs, quæ sub auditum cadunt, siue de audibilibus: & sect. 11. Problem.

CV M Philosophi naturalis sit, non Anatomici, audiendi modum explicare, paucis ratione structuræ auris, quæ veteribus maiori ex parte incognita fuit, modum exponemus: Auris audiendi sensorium est, & auris actio, sensus est auditus: ad quem sensum tria requiruntur; obiectum, medium, & instrumentum. Obiectum res sunt audibiles, hoc est, soni. Sonus ^a qualitas est prodiens ex ^b aere à duris solidis.

*a Sonus qualitas est ex aeris fractione orta, qua corporibus duris solidisq; collisissit, Laurent.
b Ex aqua vel aere, Volcher.*

disque corporibus, ijsque læuibus, concauis & amplis, affatim magnoque impetu inuicem collisis & concurrentibus, percusso; quam definitionē sequentia explicabunt. Medium aliud externum est, aliud internum. Externum, secundum Philosophum, aer

*c Sono mediū
aer est, audi-
tur in aere, &
in aqua, sed
minus, 2. de a-
nim. ca. 8. tex-
tu 76.*

c est, & aqua; sed in aqua vel nullus, vel leuis admodū sonus fit, qui ab homine sub aqua latitante exaudiat; à piscibus tamē optime exaudiri, ij qui mugilum piscationi nocturnæ interfuere, norunt. Et quāuis aqua descendens in aquam, sonum edat, hoc ab aqua quidem fit, sed in aere eiusque interuentu. Internum medium aer est congenitus, aurium cauernis inclusus. Instrumentum licet dici possit tota auris interius, suis cauitatibus, alijsque particulis supra explicatis donata, & communiter à Philosophis & Medicis aer congenitus præcipuum & proprium auditus organum statuatur, eo quod, sicut in oculo crystallinus, obiectum videlicet lucem suscipiat, sic aer congenitus sonos: nobis tamen neruus auditorius id esse videtur. Cum Galeno enim statuimus, non solam alterationem seu receptionem, quæ per aerem congenitum fit, sensum esse, sed alterationis dignotionem; quare per aerem hunc, soni & voces ad neruum, tanquam ad substantiam sentientem, & inde ad sensum communem, quo dijudicentur, transferuntur. Nam si dignosci debent, substantiam sentientem tangere

*d 2. de anim.
text. 79. oportet solidorum corporum percussione fieri ad inuicem & aerem: hoc a. fit, cum pma net percussus aer, & nō dissipatur.*

debeant, cum omnis actio per contactum fiat. At facultas sentiens cum extra corpus non feratur, necessum est, sonum ad aurem ferri; qui cum à duris corporibus^d se mutuo percutientibus, tanquam è causis efficientibus generetur; (molliora namque^d facile cedunt, & vi impellentis non resistunt) & in aere tanquam materiā recipiatur: aer sonum comitatur, & etiam longius vehit; ad aeris enim motionem sonos quoque deferri, campanæ distantis sonus declarat,

quan-

quando ventus versus nos flat: sic etiam, quando duo corpora dura simul percutiuntur, percussione[m] videmus, antequam sonum audiamus: sonum enim tunc primum audimus, quando aer motus sonum detulit; siquidem motus huiusmodi momento non fiat, sed in tempore: qui longius plus minusve vehitur, prout vehementior & celerior duorum corporum renitentium percussio (quod Philosophus in sono requirit) fuerit, & consequenter ipsius aeris ictus & repulsus; quod in tympanis videmus: in quibus si coelum ipsorum humidum laxumque fuerit, sonus obusus vel nullus redditur; sic & in omnibus musicis instrumentis fidibus obductis, contingit. Aer soni qualitate affectus aerem proximum impellit & alterat, & successione vicinior commoveatur, donec ad aures externas perveniat: idque eo modo, quo lapillus in aquam iniectus, circulos vndosos excitat,

c Volch. Lanren. Aquapen. f Quomodo auditus fiat, opinioniones variae: antiquitas n. Anatomes ignara aliter sensit, quā nūc fiat. I. Empedocles, qui putavit, auditum fieri, quod aer aurium internam partem impellat, cum n. ea in cochlea morem convoluta sit, ac tanquam tinabulum edis-

Hhh 5

quo to in loco ap-

ensa, omnes aeris appulsus percipit. II. Alcmeonis, qui ideo nos audire credidit, quod aures intus sint vacuae; vacua enim omnia, cum in ipsa vox incidit, resonant, quae de re Aristot. 2. de anim. 3. III. Diogenis in capite aerem esse, qui vocibus excutitur & commoveatur; contra quem Hippoc. lib. de carnibus. Sunt quidam, qui putant, qui de natura scribentes; cerebrum sonum edere prodiderunt: hoc autem falsum non potest; nam cerebrum ipsum humidum est, & nullum humidum resonat, sed uia sicca sunt. Quae vero resonant, auditionem faciunt. IV. Hippo. de locis in homine, primum perforata est, quā parte audimus: etenim vacua circa aures loca, nil aliud praeter strepitum & clamorem inaudiunt: quicquid vero per meningem in cerebrum pervenerit, id plane hac parte auditur, ubi unicum foramen per membranam circumvoluentem penetrat. Et lib. de carnib. Hanc vero ob causam auditio fit, aurium foramina ad os durum & siccum lapidi simile perveniunt, cui canina fistulosa addita est. Soni autem in durum impingunt, & os cavum per ipsum durum resonat. Pellicula vero in ipso meatu auditorio, iuxta os durum tenuis est, ad instar ele aranei, pra reliquis pelliculis siccissima: quod autem siccissimum est, id ad sonum incipiendum maxime facere, multis argumentis comprobari potest. Cum ergo plurimum resonat, tum maxime audimus. V. Platonis, aer auribus insidens pulsatur, pulsus in principem animi sedem mittitur, sicque auditus fit. Aristoteli auditus fit, ubi aer movetur, à duobus corporibus solidis, quorum id, quod verberatur plenum est, quo aer inde resiliat. Hac autem inter se vi, & vehementer percuti debet, quo aer percussus non diffundatur, & percutientis motus aeris dissipationem praevineat.

ueniat : nam quorum alter alterum impellit; quoad aqua ad ripam
 id sonum effi- impellat, vel in latis aquis sponte soluantur: ita ex ae-
 cit, quo conti- ris percussione, velut circuli in aere generantur, do-
 nuatione aeris nec successione ad auditus organum peruentum sit,
 unum usque & hanc
 ad auditum

mouet. Inest autem auditui quidam insitus aer: atq; cum auditus in aere sit, cum
 aer externus mouetur, & ab eo internus mouetur & agitur, qui alias per se im-
 mobilis, ut differentias motus omnes exacte sentiat. VI. Galeni 8. vs. p. 6. ad au-
 res descendere propaginem quandam à cerebro erat necessum sensibile extrinsecus
 occurrurum exceptura, sed quoniam sonus & vox idipsum erant: siue aer percus-
 sus, siue aeris quadam percussio: nihil enim interest, modo unum hoc constet, mo-
 tum, qui percussione sit, quasi procellam ac fluctum progredi oportere, atque ad ce-
 rebrum ascendere. VII. Vesalii, & eius asseclarum, neruum quinti parii per me-
 tum quandam tortuosum procedere, & in membranam aurium foramini obdu-
 ctam se explicare: quacum tenuis, sicca & valde tensa sit, ab aere pulsata, accen-
 dente ossium duritie, qua antrum cochleae amulatur, sonum efficere, sine alio
 Natura artificio. Sic Columbus, quinti parii nerui ad miniculo audimus: qui ad
 labyrinthi dimidium crassior redditur, & tantum non membranam constituit.

II X. Massa, ex motu malleolorum causatur sonus siue consonantia, unde fit au-
 ditus. IX. Volcheri aer externus soni qualitate affectus in membranam my-
 ringam incurrit; hac pulsata, ossicula ei colligata commouet: Ossicula vero ner-
 uum membrana per transversum expansum percutiunt. Idem neruus in membra-
 nam repercutitur: unde aer inclusus alterationem & sonos excipit: Soni per au-
 rium tortuosos & fluxuosos anfractus circa vllam turbam ferantur ad neruum
 auditorium: hoc exploratore & ministro, strepitus imago ad sentiendi principium
 transmittitur. Idem fere Laurentius, aer externus à duris solidisque corporibus
 percussus, & soni qualitate affectus, vicinum aerem alterat; hic proximum affi-
 cit, donec continuatione quadam ad aurem peruentum fuerit, qui per meatum
 auditorium primum membrana alliditur: hac pulsata, ossicula tria mouet, eiusque
 characterem mentis imprimi: hinc sonum vernaculus aer statim excipit, quem
 per fenestellas in tortuosos anfractus & labyrinthum, mox in cochleam defert, ab
 hac in neruum auditorium traiecit, & ab eo ad communem sensum, tanquam
 censorem & iudicem. X. Archangelo sic fit auditio: res sonum edens, soni speciem
 aeri imprimi, huncque mouet & propellit, usque audiendi instrumentum, quod
 cum aereum sit, quo sonorum species recipiat, moueri quodam modo debuit: proin-
 st. pha, quasi pensilem tensus vesiculam illam, (id est, membranulam tympani)
 cui aereum audiendi instrumentum conclusum est, & cum huic incus adhærescat,
 malleus percutiens in eadem communis ab aere sonoro foris intro appellente, ne-
 cesse est, instrumentum auditui eodem motu cieri, quo exterior aer, ideoque eam
 omnino soni speciem & similitudinem audiendi facultatem mouere, qualis ab ae-
 re illuc geritur. Veram: nerui auditorij in hoc aereum audiendi instrumentum

& hanc aeris percussi continuationem, vndam vocalem, Auicenna & veteres Anatomici nominarunt.

Quod si papillus siue gleba aliudue magnum sit, atque magna vi iniiciatur, ita, vt suos gyros vehementer in ripas fluminum vel stagnorum impulerit, circuli repelluntur, & geminatim ad primum gyrum recurrunt. Simili ratione fit, si aduersus loca concamerata, & testudinibus obducta, syluas atque montes loquamur, vel clamemus; nam in ijs vox duplicatur, ac echo excitatur. Verum non omnis aer æqualiter sonum excipit: nam purus & tenuis, & clarius, vehementer & celeriter motus à corporibus duris, & superficie lata, (acus enim acum feriens, sonum, vt loquitur Philosophus, non efficit) percussus citius ac clarius sonum suscipit, quam aere & corporibus contrario modo se habentibus. At aer, qui loco concauo continetur, omnium perfectissime sonorum species suscipit; quia per reflexionem complures primum efficiunt ictus: ad sonum enim aeris reuerberatio desideratur, quod antra, specus, syluæ, montes cauernosi, putei, locaque caua atque angusta attestantur, quæ non tantum sonos, verum etiam voces articulatas exceptas reddunt. Hæc de Naturâ & generatione soni; nunc de communicatione aeris percussi cum aere interno & partibus internis.

Aer externus, tâquam medium externum, à duorum corporum duriorum mutuâ percussione impulsus & commotus, & soni qualitate affectus, sonum, qui inde exsurgit, ad aurem defert, qui per meatum auditorium semper apertum, ad membrulam tympani impellens eam commouet, quâ comota aer cogenitus quo-

terminantur: cum horum neruorum membrana amplificata, corpus illud aereum amplexetur, sicut nerui optici ad humorem crystallinum perueniunt: & ut hi à sede sensus communis spiritui animali vectore facultatem audiendi in principalissimum audiendi instrumentum, vt verum audibilem perceptio fiat, vehunt: sicque auditus cum rerum audibilem sonum apprehendit, ad mentem defert, tum queratio mensurae sensitiva aut intellectiva colligit

& cognoscit illud, quod sonum edit, vel campanum, vel tympanum, vel quid aliud esse.

quoque mouetur, sonosque vel eius characteres recipit, quos ex cauitate prima per stapedis foramen, & fenestellam oualem ad sequentes cauitates labyrinthum & cochleam transfert: hinc ad neruum auditorium & ipsius principium cerebellum, & ad communem sensum, ^f tanquam iudicem, quo sonorum differentias diiudicet, defert. Et quia nerui auditus in ponte cerebelli, vnde prodeunt, coniunguntur, sonus sub ratione vnus, non duorum, apprehenditur. At ne plus iusto membranula intro pellatur, Natura ossiculis tribus & musculis, vti sup. dictum fuit, prospexit.

^f *Alentus sensoriorum omnium redunt ad cor, aut ad cordis proportionale, si corde caret: itaq; meatus audiendi, quoniam hoc sensorium aeris est, quā spiritus natus in alio pulsus, in aliis spirationem fecit, hac definit 5. gen.*

Vtilitas autem sensus auditus secundum Aristotelem est, ad & adquirendam sapientiam, & prudentiam: nam sermo, cum sit audibilis, disciplinæ causa existit: dein ^h vt significetur aliquid ipsi, quemadmodum vocis & linguæ utilitas est, vt significetur aliquid alteri.

anim. 2. Sunt, qui cum viderent, neruum auditorium ad primam cauitatem, vbi aer congenitus plurimus est, dixerunt, ibi sonum tantum recipi, tum substantiam sentientem tangere, & ita sensum seu lignationem soni contingere, quod verum non est, Aquapend. g De sensu & sensili 1. h 3. De anim. textu 68. seu in fine libri.

GLANDULÆ AD AVRES.

CAPVT LXIII.

^a *Glandula sunt ad verā que aurium partem circa venas iugulares colli, Hipp. de gland.*

SVB aurium ^a radice corpora sunt glandulosa & solida, siue glandulæ insignes & crassæ [tab. 22. fig. 1. G.] quas Parotides aliqui vocant, cum harum tumor *παρωτις* dicatur. Quarum vsus præcipuus partes circumiectas humectare: nam ob validos & frequentes incidendi, confringendi, alimenta comminuendi, ac tandem loquendi motus, articulatio his destituta, facile exsiccari, & motui inepta reddi potuisset: quamuis etiam musculorum temporalium tendi-

tendinibus maxillę processibus infixis, propugnaculi loco sint: Dein vasorum diuisiones muniunt ac tumentur. Tum, vt aliquando cerebri excrementa suscipiant, quare cerebri emunctoria quibusdam dicuntur: & earum tumor à Galeno ^b παρωτιδ. dicitur, qui causatur à materia in eas vel à capite decumbente, & ibi postea impacta: vel à toto corpore confluyente, quod aliquando per crises in febribus vsuuenire solet.

Sunt & alię numerosę glandulę, sub maxilla inferiore, toto spacio à maxilla circumscripto [*tab. 26. fig. 2. inter μ. O. Γ.*] sub musculis ossis hyoidis & linguę: quę glādulis ijs, quę sub axillis & in inguinibus sunt, correspondent, & peculiari nomine carent: licet vulgus in animalibus, quibus vescimur, & potissimum in porcis syluestribus in delicijs habent, ^c Animellas & Lacticinia nuncupent. Harum qui & superiorum vsus: in quibus etiam variū affectus, præcipue vero Scrophulę, contingunt.

^b 3. *Compositio-
tionum loca.*

^c *Sic refert
Vesal. qui has
omnes glandulas pro ter-
tio genere glā-
dularum in
faucibus exi-
stentium, re-
censet.*

DE NASO OLFACTVS INSTRUMENTO.

CAPVT LXIV.

De Naso egit Aristoteles 1. *hist. anim.* 11. & 2. *part. anim.* 10. & 16. Nasī constitutionem eiusque partes examinavit Galenus lib. de instrument. odorat. 2. & 11. *vs. part.* 17. vbi de eius quoque tunica egit: de ossibus vero lib. de ossib. 4. & 11. *vs. part.* 19. de musculis, lib. de dissect. musc. 3. & 11. *vs. part.* 17. & 4. *ad. anat.* 4. de foraminum narium vsu 8. *vs. part.* 6.

CVM ea, quę ad sensum auditus pertinent, expediuerimus, nunc de sensu olfactus sermo erit: & quemadmodum Aurem aliam externam, aliam internam diximus: sic & Nasum alium externum, alium

*a Naso inest
venustas, &
quid regium,
quasi speculati-
vus quadam im-
perandi dex-
teritas in eo e-
niteat. Aegy-
ptij in suis
Hieroglyphi-
cis, sagaces ho-
mines nota-
bant naso, &
Festus sagaces
nasutos vo-
cat; Lauren-
tius.*

*b Aues & ser-
pentes, & qua
ex quadrupe-
dibus sangui-
nea & ouipa-
ra πῶς τῶν
πυκνότερον;
foramina na-
rium ante os
habent, sed
non ita expla-
nata, ut na-
res appellari
possint, nisi
spirandi offi-
cio, quia suoro
stro continet:
animalia ve-
ro, quae non
spirant nari-*

lium internum facimus. Nasus^a externus, quo ho-
mo & animalia quadrupedia & viuipara, non vero
^b aues, & serpentes (quæ foramina tantum habent)
donantur, ^c dicitur, à ^d *ἐν*, quod per eum sordes &
capitis superfluitates defluant; alijs *μυκτήρ*^d à mu-
core, excremento pituitoso per illum destillante: Est
autem ^e faciei pars protuberans; spiritui ^f meatum
præbens, siquidem aerem eâ parte reddamus & acci-
piamus: alijs instrumentorum olfactus propugna-
culum, cum tamen ea non contineat, nec caluariâ
excident, ipsis tamen ministrare, negari non potest,
cum naso absente, minus recte olfaciamus.

Situs est inter oculos, siquidem pars spirandi me-
dium^e tenere, & antè posita esse debuit: quare in ^e
medio trium sensoriorum, visus, auditus, gustus, na-
tura constituit; quasi per lineam fabrilem directam,
ad respirationis agitationem. Quare & sursum est,
quia, ut ait ^g Cicero, omnis odor ad superiora fera-
tur (quem sic cōmodius recipit) & quod cibi & po-
tionis iudicium magnum sit, non sine causâ oris vi-
cinitatem secutus est, & in homine tantum loco al-
tiore, propter venustatem collocatus est. Hic ex basi
latâ sensim in acutiem obtusam desinit: vel potius ab
ⁱ oculorum angulis internis acuto mucrone incipi-
ens ad labri ferè principium desinit.

Diuiditur in partem superiorem immobilem,
quæ ossea est, & partem inferiorem, quæ mobilis^k &
cartilaginea est: totius autem nasi pars superior, dor-
sum dicitur, eiusque pars acuminata *πίλος ῥάχις*ⁱ na-
si spi-

*bus carent, & alia branchiis, alia fistula, alia praeincta, ut insecta odores senti-
unt, 2. part. anim. 16. c Aristoteles 1. hist. 11 2. part. 16 Galen. de instrument. ol-
factus 3. & in Introduct. d 1. hist. 11 Galen. instrument. olfactus 3.
c 2. part. anim. 10. f 1. hist. animal 11.*

g 2. de natura Deorum. i Sic & Laurent.

k Mobilis nasus est, & non sicut auris immobilis secundum naturam 1. hist. 11.

l Polluci.

ī spina vocatur. Inferior vero pars, vbi in nares se
 undit, ἀκρορῖνιον^l imum nasi dicitur; quemadmo-
 dum & extrema rotunditas σφαίριον^m ob rotundita-
 tem, nasi orbiculus & globulus nominatur. At in-
 trinsecus septi beneficio in duos sinus diuidit, quos
 ῖνιες, nares nominant, quod per eos odor vel spiri-
 us in nare non desinat; alijs μυκτῆρες,ⁿ & τῶν ῖνῶν
 ῖνοι^o dicuntur.

Diuisionis vsus, quo olfaciendi actio præstantior
 at: nam in sentiendi partibus excepto tactu (in quo
 incertum est) sensus bipartitus est, propter duplicem
 corporis partem dextram & sinistram; sic & μυκτῆ-
 ρον, ait Philosophus,ⁿ vis bipartita est, quæ si aliter
 ta distractaque esset, vt aures, suo officio fungi
 non posset; cum olfactus in nares habentibus, per
 spirationem fiat. Prodest quoque hæc diuisio, quo
 nā obstructā, altera pateat, quo & inspirare & ex-
 spirare queamus, hinc vtraque obstructā, os i-
 sum apertum, narium vsus, ne homo suffocetur,
 ræstat. Notandum insuper & vtrumque foramen,
 quod in singulis narib. vnum est, circa nasi medium
 in duas P partes quasi diuisum esse: quarū altera pars
 supra palatum fertur, in oris intimā & fauces: vnde
 t, vt aliquādo potus per nares effluat: altera sursum
 in os spongioides ascendit; hinc ea, quæ naribus in-
 ciuntur, naso clauso in os delabi solēt. Narium ex-
 teriores partes foramina ambientes πλερύγια αλὰ &
 ἰννα dicuntur.

Constat autem nasus, cuticula, cute, musculis, os-
 bus, cartilaginibus & tunicā internā.

Cutis, quā integitur, tenuis est: pinguedine, ne i-
 fflus moles adaugeatur, quod deforme esset, destitu-
 at sub septo, in nariū medio, vbi pars carnosā pro-
 unens labioque vicina, quæ κίωι,^r columna dicitur,
 in aliquibus propendet, crassa & fungosa est, ita,
 vt car-

m Ruffo &
Polluci.

n Aristot. 2.
part. 10.

o Galen. instr.
olfact. 3 τὸ ὀ-
χεπευόμενον
meatum vero
inanē vocant,
1. hist. an. 11.

p Gale. instr.
olfact. 2.

q Introduc.
αὐτῶν.

r Polluci &
Ruffo.

f Paulo a Pauli
Festum.

vt cartilaginem, à quâ tamen distingui debet, æmul-
letur, & in ambitu pilis cingitur, qui Vibrissi dicun-
tur, quod ijs dum vieuellûtur, caput vibretur: quo-
rum vfus, ne animalcula nares intrare possint, vel et-
iam inspiratione attrahi.

τ 11. vs. p. 17.
Musculorum
numerus va-
rius; Gal. diff.
muscul. 3. duo
vsquequaque
exigui à malis
incipientes v-
tring, unus in
sibi respondē-
tem nasi alam
ipsam aperiē-
tes, inseruntur:
ε 11. vs. p. 17.
Subtus malas
iuxta princi-
pia musculorū
ad labia de-
scendentium
enascuntur,
cum quibus

Verum cum in ^t inspirationibus paulo maioribus
& subitis, & efflationibus, alarum nasi motus non
parum conferat, idcirco eas mobiles esse oportuit: &
cum ex animalis voluntate moueantur, idcirco eis
musculos ^t inferi necesse fuit. Et si enim dilatio & cō-
strictio alarum, à labiorum musculis, quatenus et-
iam narium alas tangunt, perfici videatur, quemad-
modum etiam primus buccarum ^u musculus, quia
membranâ carnosa constituitur [tab. 25. fig. 1. r.] in
nasi radicem inseritur: attamen musculos naso pecu-
liares duplices in nasutis facimus, alios dilatationi
inferuientes, alios constrictioni: illi nares claudunt
(quamuis & in inspiratione ^x alæ intrò ducantur) hi
referant: qui tamē exigui sunt, vt partium ab eis mo-
uendarum ratio postulabat.

Musculi nares dilatantes quatuor sunt, duo ^y exi-
gui

quadantenus conscindi semper magis, magisque obliqui ad nasum feruntur: hos solos
etiam Varolus agnoscit. Vesalio quatuor, duo externi dilatantes, duo interni con-
stringentes: Columbo duo tantum dilatantes, ab illis tamen diuersi, claudentes ni
agnoscit: à musculis enim labro opem ferentibus, non à propriis fieri statuit: quan-
do enim naribus aliquid attrahere volumus, superius labrum cōstringere cogimur
Fallopio sunt octo, quatuor à Vesalio propositi, duo à Columbo, quibus duos adhu
addit: Platero sex, quatuor Vesalij, duo Fallopij; duos vero Columbi pratermittit
Archangel. duos dilatantes Columbi enumerat; addens nares adstringi à muscoli
labij superioris; quemadmodum ε nari cutis à musculis maxilla superioris ceru
getur. Laurentio, quatuor per exigui, quorum duo dilatant à fronte acuto carnoso
que principio, duo constringunt, labiorum musculis continui. ^u Primus buccarum
labiorum ε nasi, Vesal. primus musculus faciei Fallo. ^x In vehementioribus in-
spirationibus, ala spiritus impetum sequuntur. Galen. diff. muscul. 8. ^y s. par bucca-
rum Vesa. quod à malâ iuxta labij superioris musculum proprium tenuis ε mem-
braneus enascitur, qui in ipso modice versus priora desconsu in duas partes diuidi-
tur, unam nasi ala radici, alteram superioris labri parti, quam mustacem vocat

qui ab osse malarum iuxta labiorum musculum terminum: & canale osseo, qui circa nares est, vtrinque unus oritur, carnosus magis, quam nervosus, & supra dorsum nasi delatus, partim in pinnam anteriorem, partim in labij superioris partem, quam phyltrum vocant, inferitur; ipsam simul cum alâ nasi extrorsum, sursumque trahendo, nares nonnihil referat [tab. 25. fig. 1. F.] Nam cum olfactus tractu perficiatur, extrorsum alâ nasi simul accedunt, & foramina aliquantum obstruuntur, quare in olfactu foramina narium ab his aperiuntur, & aperta conferuantur.

Duo alij à futura frontis, ubi musculorum frontis fini permiscuntur, ad medium supercilium & spina narium acuto, & carnosio principio exoriuntur, trianguli formam penè referentes, qui deorsum oblique supra nasi ossa delati, latioresque redditi, in pinnas implantantur, quasi fibris suis rectis sursum trahunt, naresque dilatant.

Nares b constringunt quatuor: quorum duo c circa radicem pinnae narium exoriuntur carnosae, sed parui: qui supra alam transuersim lati eam amplexantes ad angulum narium inferuntur, qui ad principium contracti, alâ depressâ nares nonnihil occludunt, [tab. 25. fig. 2. iuxta K.]

Duo alij d in narium amplitudine sub tunica succin-

III

cin-

iri esse, qui narium pinnae adhaereant, quâ aliqui nasum dilatare velint, & sic quatuor fore musculos nasum dilatantes. z Varolus. a Columb. horum inuentionem sibi tribuit, quos solus recenset; addendo eos, quas alij descripserint, portiones musculorum, qui in superiore labro siti sunt. At Fallop. pro sextis paris parte alterâ non obser. descripsit; addens, posse pro pari musculorum recenseri, vel alterius partis partem asserere. Laurent. duos dilatantes vocat. b A nullo musculo nasus contrahitur sed cum musculi duo aperiunt ab actione cessant, mediam tunc se acquirit constitutionem; deorsum trahitur nasus, quod labra per appersionem consequantur, Gal. dissect. musc. 3. c Fallop. in obser. septimum par. 1. In Instit. vero octauum par, quod à Vesalio praetermissum scribit. Platero narium secundus musculus, qui addit, Vesaliû frontis musculû ad pertingere existimasse. d Vesalio sextum par. huc catum:

inferitur, illâ extrorsum & sursum mouendo, hunc vero sursum vellent. Fallopio, in Instit. s. par. faciei, at in obseruat. 6. par. quod non membranæ, sed carneum videtur, nec à malorum ossæ tantum oritur, sed etiâ à laiâ cauitate, vel canale osseo, q. circa nares est: Platero tertius nasi musculus; Varolo à superiore maxillâ exorti, in anteriorem alarum partem inferuntur; & de his Galen. egit. Verû Columb. asserit, portionem musculorum la-

cauuntur & par faciei Fallop. in Instit. Galenus & alij duorum musculorum cingente reconditi, tenuissimi sunt, membranei, nasi ossis extremitate exorti alis inferuntur, vt ei introducendo constringant, qui in nasutis, quem admodum & cæteri reperiuntur, [tabul. 25. figura. sub K.]

nasum dilatantium meminerunt, quos cum labij superioris musculis confudere præter hos Vesalius duos alios nasum claudentes describit: quos imaginatione tantum intuitus est, cum nusquam sint. Columbus: at Fallop. in obseru. hos aliquando adesse vidi, aliquando non, & Columbus figmentum esse asserit; ego non audeo aperte id negare, quia in aliquot nasutis cadaueribus mihi visus sum vidisse: ostium par est, quod Vesalius sextum facit: Plat. primus narium, qui in histéria nait, formatum nasum nullos ferè musculos constituere, sed obiter latera tangere, hos qui labia mouent: nisi is addit, qui in naribus inueniri putabantur. Laurenti in profunda narium cauitate muscoli non reperiuntur.

DE OSSIBVS, CARTILAGINIBUS, VASIS, TUNICA & VSU NASI.

CAPVT LXV.

OSSA Narium cauitatem constituentia duplicia sunt; alia, quæ naribus propria dici possunt licet maxillæ superioris ossa sint: alia communia. Propria tria sunt, externa duo, & tertium internum quæ ad nasi medium tantum feruntur, reliquâ partem cartilagineâ existente; duo quidem, quæ nasi parter eminentiorem osseam constituunt, vtrinque vnus paruum, quadrangulum, sed alterâ parte longius, tenuis admodum & solidum, exiguis & communibus foraminibus præditum, quod ossis quinti maxillæ superioris [tabul. 3. figura 8. E.] portio, quæ superius cum osse frontis inter supercilia, futurâ communem tertiâ, breui ductu, committitur. [tabul. 3. fig. 8. Z. T.] Ad latera vero cum osse quarto^b maxillæ [tab. 3. figura 8. B. fig. 9. S. A.] quod narium latera & foraminum inferio

^a Malarum ossa crassissima sunt, nasi tenuissima, reliqua vero durissima: Si enim nasi ossa lala fuerint, minimam animal adferunt noxam, quo fit, vt multum à principalioribus duritie ac crassitie vincantur. 21. v. part. 19.

^b Vesal. Plat. at 3. Columb.

riorem sedem, eorumque amplitudinem magnâ
x parte constituit, futurâ c propriâ secundum nasi
tus delatâ [tab. 3. fig. 8. ab e. versus I.] vniuntur; Infe-
tus vero cartilaginibus vniuntur: quare ad finem a-
pera sunt, & inæqualia, quo ossibus melius hæreant.
intrinsecus vero aliâ lineâ communi iunguntur, &
fibrosi ossis septo adhærent.

Tertium intrinsecus, in nariû amplitudine, quod
tum est, in radice tenue, anteriore & superiore se-
e crassum, quod sursum ad olfactus foramina, tum
orsum ad palatum tendit: hoc duo priora interce-
t, & processui ossis d cribrosi seu capitis octauî d ad-
eret [tab. 24. fig. 10. sub x.] & vnitur, quod septum di-
tur, & narium cauitatem distinguit [tabul. 3. fig. 8. O.
9.] Et hic duobus prioribus, seu ossi quinto ma-
lle, futurâ internâ primâ [tab. 3. fig. 8. sub f.] iungitur:
terius vero in cartilaginem mediam terminatur,
cum eâ vnitur. At hoc os intra nasi fauces ad os
hænoïdes, vbi ab eo dirimitur, secundum totam
ngitudinem rimulâ latâ c diuiditur, & per nasum
rtur, & basi latiore & crassiore bifurcatû ossi sphæ-
oidi incumbit, & formâ aratri vomer refert [tabul.
fig. 9. e. 3.] & acie sinuosa & inæquali existit; quarto
iam & sexto ossi maxillæ intrinsecus, futurâ inter-
â secundâ [tab. 3. fig. 8. g.] committitur.

Communia præter hæc ad naî summam radicem
itus os fixum hæret, quod ab Hippocrate & Gale-
o f *σπογγώδες* dici, supra monuimus, ob partem
ongiosam in narium cauitate contentam. Quare
interno naso ad hoc os, duo g adhuc alia fungosa
spongiosa obseruantur, narium cauitatem super-
im opplentia, vocis odorisque causa exstructa, quæ

Iii 2

varia

diaphragma narium: & à similitudine, quam cum vomere obtinet, vomer à
nullis dicitur. f 8. vs. part. 6. & 7. 9. eiusdem 3.
12. & 13. os maxilla superioris Colum. fungosa narium ossa Plat. non propriè ma-
lla ossa, sed ossis spongiosi seu ethmoidis partes, Fallop.

c Cum maxil-
lâ superiore
harmoniâ co-
pulantur, Ar-
chang.

d Processum
hunc in naret
descendere. &
septum consti-
tuere volunt,
Vesal. Colum.
d cribrosi ossis
longitudinis
medio enasci-
tur, Plat. ad
ethmoide ex-
ortum, Lau-
rent.

c Duo fecerunt
Col. & Falla.
undecimum
os maxilla,
quod vomeris
figurâ constat,
vocantes: at
Volcherus (se-
cutus est Pla-
ter.) vnum os
maxilla, quod
narium caui-
tates diuidit,
unde septum

varia sunt, & squammas mutuo connatas nonnihil referunt: vniuntur autem cum osse cribroso, à cuius lateribus externis prodeunt, ita, vt ab illo oriri, & ipsius partes esse crediderim, quamuis cum septo non concrecant; dein ossi frontis in lateribus spatio interni vniuntur, sic & maxillæ tertio intrinsecus ita iunguntur, vt Fallopius hos os maxillæ ad cribrosi ossis additamenta non male retulerit. In his aer cum odoribus inspiratus alteratur: hæc inæqualia sunt, aspera, ne mucus assiduo destillet, & hæc in lue venere facile eroduntur. Sic interne ad palatum cum ^h quarto ⁱ sexto ⁱ maxillæ os [*tab. 3. fig. 9. A.*] cum suo pari amplitudinis narium, quæ in fauces pertinent, non minimam portionem constituunt.

^h Quartum
& quintum,
Plat.
ⁱ Sextum, Vesal. & Colum.
quartum.

Quare hæc tota narium cauitas ossea, ab ossibus efformatur & extrinsecus & intrinsecus: Extrinsecus vel antè vel ad latera. Extrinsecus & antè superne quidem maxillæ osse quarto [*tab. 3. fig. 8. B.*] quinto [*Ξ*] quibus cartilagines iunguntur; inferius vero ad palatum quinto [*tab. 3. fig. 9. A.*] & sexto [*Π*] Intrinsecus vero ossi spongoidi capitis [*tabul. 4. fig. K.*] & duobus narium ossibus spongiosis septoque narium [*Ο.*] ad latera vero secundum [*tab. 3. fig. 8. Δ.*] tertium [*Θ.*] & quartum [*Χ. ad B.*] maxillæ superioris os.

^k Cartilagines
s. quatuor globulum
constituunt, quinta
septi munere
fungitur, Vesal.
sal quinque,
elatiores duæ,
humiliores
tres, Plat. &
Lauren quinque
duæ latiores,
tertia ab osse
ethmoide, cuius
extremitati duæ
alia parua appo-
sita, Arch.
^l Vesal. ligamenti
ossibus
nexa, Plat.

Cartilagines ^k narium quinque sunt, quarum tres antè ossium circumferentijs connectuntur, duæ vero alas constituunt. Harum duæ superiores latiores sunt, & nasi ossibus [*tab. 3. fig. 8. abf. ade.*] vbi latiora & aspera sunt, adhærent, indeque propendent, vna cum ossibus narium cauitatem anteriorem inferiorem regionem efformant: hæc deorsum latius inuicem connexæ ad nasi apicem vergunt, & quod longius deferuntur, eo molliores redduntur, & ad nasi extremo ^l veluti in cartilagineum ligamentum

deg

generant: tertia inter illas media septum est, cartilaginofum osseo^m septo connatum, quod antrorsum procedens cartilaginibus prædictis regione interna secundum longitudinem adnascitur. Hoc mediante Nasus ex facie planus exporrectus in nares dividitur, ubi & osseum septum supra palati regionem, & foramina discernit, ubi à naso ad fauces ducuntur. ⁿ Cartilaginibus his tribus aliæ duæ apponuntur, alas seu pinnas constituentes [*tab. 25. fig. 2. L.*] sic actæ, quod alarum modo nares occludant & recludant, quæ membranosis ligamentis cæteris cartilaginibus, lateribus internis, aliarum extrema integēte, colligantur: harum singulæ orbiculatim nasi foramen constituunt, & ligamenti naturam sapiunt: le sole motu voluntario præditæ sunt, sursum & deorsum, introrsum & extrorsum proprijs musculis muntur, & in inspiratione magnâ aliquantum emulantur, & in expiratione rursus subsident. Sitæ sunt parte inferiore, cum pars superior ossea sit, quod inferioris fundamentum existat: nasi enim partem inferiorem cartilagineam esse oportuit; partim, quod cuitates illæ ab ossibus efformatæ, semper aperte reteantur, & spiritus in pulmones & cerebrum commodius attrahantur; partim, ut molles sint, quo nares occludendo foetores arceamus: partim etiam, quod nares commodius emungamus, & quo propter flexionem iniurijs melius cedere possit, cum ictibus & casibus expositus sit. Quod si vero abscondatur, ex parte ex brachio traductâ restitui potest, ut Taliaco in libro peculiari docuit.

Vasa nasus habet: Venas à iugularibus, quæ sanguinem pro nutritione aduehunt, & quas inter duas interdum secare solent: Arterias, à carotidibus, quæ sanguinem vitalem cum calore & vitâ adferunt, & cruos P à tertio pari medullæ cerebri utrinque v-

m Pars nasum distinguens, cartilago est, 1. hist. an. 11 o. etani ossis capitis pars inde enata, Vesal à septo ossis cribrosi pducta, Plat. ab osse ethmoide nascentis, Archan. n Cuius extremitati dua alia cartilagine parvissima membrana nares succingentis interueniunt appensa, ut non solum nasi pars inferiore externa, verum etiam interna mobilis euaderet, Archan.

o Cartilagineosa fuerunt, quod ea substantia rō facile contūdantur, nec rumpantur 11. vs.

par. 17. p Nervi à cerebro exiles

distribuantur, de instr. off. 2. a nervis, qui p maxillâ superiorē feruntur, pro-

pagines qua-
dam exigua
ad musculos
deriuantur,
11. v. par. 17.

q Galen. de
instrumen. ol-
fact. 1. modo
membranam,
mod. tunicam
vocat: de qua
cap. 2. exan-
guis tunica
crassior quam
membrana,
tunica oris,
Et c. continua:
tunica Vesal.
Et Columb.
membrana os
succingens,
Plater. mem-
brana, Arch.

Et Laur.
Et Propago mi-
noris tertij pa-
ris radice in
narium tuni-
cam degene-
rat, Vesal. du-
ra matris por-
tio, Colum.
f De instrum.
odoratus 2.
Et 3.
Et 1. hist. anim.
11.

u Duplex v-
sus: prior, cu-
inmodi est illius tunica, qua laryngem Et asperam arteriam totam inuis succin-
git: posterior, ut instrumentum omne sensus sit particeps. Galen. 11. v. par. 17.

x Archangelus Et Laurentius.

y Meatum prabet spiritui: aerem enim ea parte reddimus Et accipimus, ut i
ser

num, qui per foramina, quæ cum oculis nasus com-
munia habet, ad maiorem angulum in tunicam, quæ
nasi meatus sublinet, ramulis plurimis & ad muscu-
los diffeminatur, & ad palatum progreditur.

Tunica 9 narium amplitudinem succingens
crassa ⁊ meninge oritur, & tunica oris, palati, lin-
guæ, laryngis, œsophagi & ventriculi communis est
quæ licet totam oris circumferentiam, & partes in
faucibus contentas ambiat, vna & continua sit, & e-
andem substantiæ speciem habere cernatur, non ta-
men f æqualem crassitudinem habet, sed in naribus
tenuior est: ea vero parte, quâ ossibus spongiosis
substernitur crassior minutis foraminibus f traie-
ctâ, per quæ crassiora cerebri excrementa transmit-
tuntur, quæ dum deorsum feruntur ad nares, par-
teorum in os per ea foramina, quæ à naribus in i-
psum transeunt, interdum delabuntur; pars verò
per nares excernitur, imo & scretu ex via narium at-
trahitur.

Exquisito sensu tactus donata est hæc tunica, ita
ut irritata sternutatio fiat, propter tunicæ huius cun-
thorace, cui se insinuat, consensum. Est autem ster-
nutatio secundum Philosophum, ⁊ flatus vniuersi e-
ruptio; signum augurale, & vnum ex omnium spi-
rituum generibus sanctum & sacrum. Hac nares do-
nantur, u quo perpetuo x pateant (adiuuantibus ta-
men & cartilaginibus) ne caro in naribus excrescen-
eas angustiores reddat, quod in polypo fieri solet: de
in, ut x lubricæ sint ad faciliorem mucoris delapsum
tum ut sensus particeps sit.

Vsus y nasi externi: primus, ut respirationi inser-
uiat
uiat

at, quo per eum, tanquam canalem aer intromit-
tur, qui inspiratione in narium cavitatem attra-
hitur, partim sursum cerebro pro spiritus animalis re-
creatione, partim deorsum pulmonibus ac cordi,
per ipsius refrigerio communicetur.

Hic primus & præcipuus usus est: nam licet ore
etiam respiremus, non tamen propter respirationem
creatum est: nam, si foraminibus ossis spongiosi
narium obstructis, & ore aperto dormientes re-
spicimus, lingua arida fit, os exsiccatur (aliquando
etiam amarefcit) ut etiam salivæ deglutitio impedia-
tur: quare & foramina in palatum desinētia, per quæ
dormientes & ore clauso aerem attrahimus & reddi-
mus, operculi instar nasus tegit.

Secundus, & ut odorandi facultati inferuiat, qui
ores cum aere rerum odorabilium speciebus in-
formatus per ossis ethmoidis foramina ad processus
millares, tanquam prima olfactus organa, in-
terque ad cerebrum deferat: quibus enim nasus ad
olfares usque dissectus est, vel non olfaciunt, vel sal-
tem male olfaciunt.

Tertius, ut excrementa^a cerebri, quæ in amplitu-
dinem narium sensim destillant, per eas efflatu ve-
l menti^b emungantur; quemadmodum ex ore per
creatum excernitur. Tandem & vocis formationi
inferuit, faciemque ornare creditur,

Iii 4

DE humidos ca-
piunt, & in op

invenient soli animalium 1. hist. anim. 11. idem 2. part. anim. 16 addens, arbores
tam compicendo euellere. 2. Olfacit cerebrum humidum existens aridorum
orem una cum aere per corpora cartilaginosa ipsum trahens. Hippocrates de
vribus. a Intus foras per narium meatus excrementa feruntur: foris autem
ro facultatis olfaciendi sensibilia: duabus his utilitatibus instrumentum uni-
m subservit, alteri quidem ad vitam necessaria, alteri vero ad vitam commo-
orem, Galen. 8. vj. part. 6. Cloaca alicuius instar, qua adibus extrinsecus offixa
est, duoque sedilia habet, è facie aliquosque educitur, Plat. b Galen. de instrum-
ent. odorat. 2.

sternutatione
tum etiam
spiritum tra-
hi in pectus,
& inde reddi
necessè est,
quod fieri non
potest, nisi na-
ribus spire-
mus; olfactus
namque, id
est, sensus o-
doris hac ea-
dem parte ad-
ministratur,
Aristoteles 1.
hist. anim. 11.

Nasus facul-
tati & odo-
randi & re-
spirandi sub-
servit 1. de
caus. sympt.
4. Elephan-
tis prolixa,
validaque
naris auge-
tur, eiusque
usus idem,
qui manus,
ea namque
cibos, tam
siccs, quam
humidos ca-
piunt, & in op

DE NASI INTERNO, ET OL- faciendi^a modo.

CAPVT LXVI.

Vide Aristotelem de modo olfaciendi 2. de anim. 9. de sensu
& sensili 4. & 5. sic 5. gen. anim. 2. item 12. & 13. Pro-
blemat. Galenum libro de olfact. instrument. & 8. vsu
par. 6.

a Odorādi fa-
cultas, unde
& ubi fiat, sic
docuit Hippo.
cerebrum odo-
rādi faculta-
tem habet, cū
humidum ex-
sistat, aridorū
odorem cū ae-
re per cartila-
ginosa corpo-
ra, qua sicca
sunt, attrahēs.
Cerebrum n.
ad nasi caui-
tatem progre-
ditur, hacque
parte nullum
os ei obrendi-
tur, sed molli-
cartilago spō-
gia instar, quā
neq; carnem,
neq; os appel-
lare queas; &
cum quidē na-
rium caua sic-
ca fuerint, i-
psū p se ex-
quisitē magis
verum siccarū
odorem perci-
pit. N. q; enim
aquam olfa-

NASVM odoratus esse instrumentum in cōfē-
so est, sed cū ex variis partibus constituatur, cui
parti tanquam principi odorādi actio tribuenda sit,
ambigitur? & cum partes, quas nasum externum cō-
stituere diximus, examinauerimus nunc Nasi inter-
ni partes perpendamus. Nasus internus partib. dua-
bus constat, osse nimirum ethmoide, seu rectius,
spongioso, quod partim in narium summitate, par-
tim in cranio locatum est: quod processuum mam-
millarium^b operimentum est foraminulentum si-
mul & rarum, vt ad cerebrum aerem quidem respi-
rationis causa celeriter deducat, vaporem autem di-
gnotionis odorum: tum etiam excrementorum co-
piam vacuet. Altera pars nasi interni, processus sunt
mammillares à cerebro prodeuntes, qui intra cra-
nium supra sinus ossis ethmoidis sedem habent. At
de osse, supra capite septimo, & de processibus mam-
millaribus, capite de nervis cerebri egimus. Quare
eò lēctorem remittētes, ad olfaciendi modum nunc
veniamus.

Ad
cit, cum cerebro sit humidior, nisi computruerit. At cum p̄ves seu nares humidae
fuerint olfacere nequit, cum ad se cerebrum aerem non attrahat. Hippocr. de car-
nib. Ad nares foramen quidem non tendit, sed laxum quiddam, veluti spongia, e-
amq; ob causam per longius intervallum audit, quam olfactu: longe enim ab olfa-
ctū odor dissipatur. Hippoc. de loc. in hom. b Gal. 8. vs. p. 6. c Cerebrū germina duo
oblonga & cōcava ex anteriorib. cerebri ventriculū ortū habētia, ad calvaria par-
tē, unde nasus oritur demittit, ubi ossa ethmoidea posita sunt. Gal. de inst. olfac. 2.

Adquemlibet sensum tria requiri, supra ex Philosopho ostendimus; obiectum, medium & instrumentum. Obiectum odores sunt (seu vapores naturæ ignei:) quid autem odor sit, non ita patet, quemadmodum quid sonus, vel lumen, vel color: idcirco hunc sensum pluribus animalibus inferiorem habemus, &^d omnium sensuum, qui in nobis est stupidissimus, quemadmodum tactum omnium exactissimum habemus. Imo sensus olfactus medius^e esse videtur, cum sensus numero impari concludantur. Et numerus impar medium obtineat: medius, inquam, esse videtur, inter eos, qui tāgendo munere suo funguntur; quales sunt tactus & gustus, & eos, qui intercedente aliquo sentiunt, cuiusmodi sunt visus & auditus. Quare homo & remisse olfacit, & nihil odorabilem absq; dolore vel voluptate percipit, propterea, quod sensus instrumentum perfectum non est. Et cum odores^f non sint manifesti, vt saporēs; ideo odororum nomina per similitudinem rerum à saporibus deducta sunt, ita, vt alius dicatur dulcis, vt croci & mellis; alius acer, vt thymi, ac eiusmodi rerum: sic & acerbus^e & odor & acutus & pinguis est. Quare Gælenus^g odores gustatum mouere, vt saporēs docuit: nam si quæ edulia boni odoris putrilagine corrupta, odore suo nos offendant, proutinus ea obiiicimus, ne aud gustare dignati, fereque in omnibus odoratus & gustus mutuo consentiunt; diximus ferè, quia in his, quæ odore sunt suauissima, veluti rosa, plurimum odoratus & gustatus dissident: siquidem odore rosæ odoratus delectatur, rosæ vero sapore gustus perturbatur. Verum, sicut auditus^f audibilis est, & inaudibilis; & visus, visibilis atque inuisibilis; sic & odoratus est, odorabilis atque inodorabilis: inodorabile, vel id, quod omnino odore caret, nec vnquam odorem habere potest: vel id, quod exiguum habet, vel

d De sensu & sensibili 4.

e Ibid cap. 5.

f 2. de anima 9.

g 4. simplic. 22.

etiam, quod malum tetrumque odorem habet.

Medium autem ^{cf} per quod olfactus fit, aer est, aut aqua: animalia enim, quæ in aquis degunt, siue sanguinem habeant, siue non habeant, odorem sentiunt, quemadmodum & ea, quæ in aere versantur, cum horum nonnulla, piscium & animalium testaceorum & insectorum alimēti odorem eminus percipiant, & ad id pergant, tanquam ad cibum sibi peculiarem, & propter alimentariam odoris speciem, *la Gale. de instrum. olfact.* vt mel, apes, &c. At homo, cum solum ^f respirans ^h (quod ei proprium est) olfaciat, spirans autem spiritumue detinens, neque eminus, neque cominus, etiam si rem olentem naribus indiderit, olfaciat; quia instrumentum odoratus non in summa superficie tunicæ narium, sed multo interius locatum sit, sic, vt foramina quædam ad ipsum pertinentia habeat; dein, quia inspiratione ^h ipsa instrumenta dilatantur, quæ nisi dilatentur, aer poros subire non poterit, qui cum aere pleni sint, nec ad cerebri processus eiusque ventriculos feretur. Ipsa vero animalia, etiam ea, quæ sanguine carent; licet non respirent, olfaciunt, cum odorem percipiant: Percipere autem ex eo constat, quod & ipsa ab odoribus vehementibus corrumpuntur, à quibus & homo corrumpitur: *i De sensu & sensib.* quemadmodum enim homines ⁱ prunarum halitu grauedinem capitis contrahunt, & plerunque suffocantur, ita & illa vi sulphuris, bituminosarumque rerum fugantur, quod male his afficiantur, & interdum exstingui soleant. Hinc sequitur ex Philosophi decreto, huius sensus instrumentum in homine à talium animalium instrumento differre, quemadmodum & hominis oculi differunt, ab eorum animalium oculis, quæ oculos duros habent.

Animalia enim, quæ oculos molles habent, palpebras veluti tegumentum obtinent, quas, nisi mouerint

uerint & aperuerint, non vident, at ea, quæ sunt duris oculis, nihil tale habent, sed illico res eas, quæ in perspicuo sunt, vident. Sic, inquit Philosophus, in animalibus, quæ non respirant, τὸ ὁσφραντὶνὸν αἰσθητήριον, seu olfactus sensorium, velut eorum oculus, velamine caret. Quæ vero aerem suscipiunt, velamen habent; quod cum respirant venis meatibusque distentis, detegitur, vel spiritus id quod (ὡς περ πῦρ ἀπὸ τῆς) instar operculi cuiusdam, superpositum auferit, vnde fit, vt quando non respirant, nullum odorem sentiant: non respirantibus autem natura hoc denegauit. Idcirco, quæ respirant, in aquâ non olfaciunt; necessum enim, vt olfacientes respirent: hoc vero in aquâ fieri non potest. Verum hanc de operculis foraminum nasi sententiam à Philosopho positam^k Galenus refutauit, rem pronuntians esse, & incertam & demonstratione carentem, & quam nulla euidēs fides testificetur, imo nullius utilitatis causa extitisse: sed demus, in profundis naribus operculum esse, quod inspiratione aperiatur, vt aeri & vaporibus ingressus pateat, & quod inspiratione cessante claudatur: huius operculi motus, Galeno^l mōnente, aut animalis, aut naturalis, aut violentus erit.

^k Aristoteles non tentauit quare locū, in quo prima odoris sensus positus sit, Galen. de instrum. olfact.

^l De instr. olfact. s. ex eo Laurent.

Voluntarium esse, nemo dixerit, quia ad animalem motum operculo seu valvula opus non est, & animalis motus voluntati nostræ obsequitur: at hoc operculum nunquam aperitur, nisi aerem ducamus. Dein motus voluntarij instrumentum musculus est; at in summitate narium internâ nulli musculi sunt. nec naturalis erit hic motus, vt valvularum cordis, quia perpetuus est cordis motus, & non voluntate nostra perficitur.

Violentum esse dicere non possumus; nam, vt i-

dem

dem Galenus monet ab aeris irruentis impetu etiam sine spiritus attractione opercula aperiuntur. Hoc autem non fieri experimur, si in cubiculo odore vehementi repleto aeris motum moliamur, aut nares vento obiciamus, aut instrumenta caua seu fistulas admouemus, per quæ aliquis insufflet: aer licet his impellatur (à quo, si opercula adestent, foramina reserari possent) nullus tamen odoris sensus excitatur, nisi spiritum attrahamus. Sed qui plura volet, Galeni caput diligenter perlegat.

^m Instrumentum olfactus nunc inquiramus (quale enim

*in Cernendi
instrumentum
Natura luci-
dissimum fe-
cit, ut, quod
lucē & splen-
dore sentire
debebat: quod
autem ad au-*

*ditum attinet, aeris similem constituit: siquidem ad sonos, qui vehuntur, aere recipiendos dicauerat: sic & quod sapores dignoscit, quod linguam appellamus, ea humidiori corporis substantiâ molita est: aliquid vero, quod inter naturam aeris & humoris est, in odorandi sensum cadit: quod neq; ita tenue est, ut aer, neq; ita crassum, ut humor. Id enim, quod à rerum corporibus exhalat, odorû substantia est. q. ex rosâ maxime, similibusque, quæ sic tenera sunt, cognoscere licet, &c. Galen. instrum. olfact. 2. & 3. odoratus instrumentum quod sit, omni antiquitati incomper-
tum videtur, Archang. Olfactus instrumentum quod sit, opinioniones varia. I. Hippocrates de carnib. Cerebrum, ait, odorandi facultatem habet, aridorum odorem cum aere attrahens: vide in principio huius capituli in margine a. II. Arist. 2. par. anim. 10. Nasus τῆς ὀσφρητικῆς instrumentum est: efficit enim sensum olfaciendi per spirationem in nares habentibus, cui in animalibus, quæ respirant (2. de anim. 9. de sensu & sensili 5.) quid operculi instar adpositum est, quod in respirantibus spiritus aufert. Contra quam de operculis sententiam, Gal. de instr. olfact. 5. disputat. At libro de sensu & sensili cap. 5. olfactibilis sensorium in capite dicit, & 2. part. anim. 16. ὀσφρητικῆς αἰσθητικῆς in animalibus quadrupedib. & viuis parvis nō multum variare scribit. At iudicium exquisitum differentiarum tum soni, tum odorû in sinceritate sensorij summâq; membrana positum est, 5. gen. an. 2. & quæ ante sua sensoria partes productiores habent, hac procul sentire possunt: quare, quorum nares longius porrectæ sunt, ut catellorum Laconicorum, olfactu valēt. Idem. III. Galeni 1. de sympt. caus. 4. ventriculi anteriores cerebri odoratus sensorium non cerebrum, quod commune est sensorium, seu instrumentum omnium sensuum, & 8. 1. part. 6. Olfactus sensorium in ipsis cerebri anterioribus ventriculis, qui etiam vaporosum quendam spiritum continent; quod libro de instrumento odoratus 4. docet, historia de nigella in nares attracta, & cerebri ventriculis vellicatis, recitatur eodem loco odoratus proprium instrumentum vaporis quodammodo simile esse oportet. IV. Processus mammillares vulgo à Medicis statuuntur. Quare sic Varol. duo duobus nervi à mediâ cerebri magnitudinē, & in substantiâ eius, vel-*

enim Philosophus censuerit esse, iam dictum est.) Quemadmodum visus instrumentum oculus est, auditus auris, quæ ex multis partibus componuntur: sic & olfactus instrumentum nasus est; sed eum in quolibet sensu pars aliqua principalissima sit, quodnam præcipuum hic sit instrumentum, per quod facultas propria sensibilia dignoscit, controuertitur. Alij quidem nasum esse credidêre, eo quod, si spiritum naribus occlusis ore attrahamus, odorem nullum sentiamus: si vero apertis naribus attrahamus, odor sensum protinus mouet. Sed cum sint, qui etiam sine naso olfaciant, sequitur nasum præcipuum instrumentum non esse, sed perfectiorem olfactum adiuuare, & in subsidium præcipui organi datum esse. Alia ergo quærenda est pars in naso. Os esse non potest; cum os nullo modo sentiat, ergo nec odores sentiet. Non est nasi tunica, quæ odores dignoscit; nam si nares odoratis rebus repleas, odorem non perceperis, antequam spiritum attrahas: dein tunica hæc membranæ capitis partem extimam inuoluenti similis est, quæ cum non sentiat, neque hæc sentiet. Non est palati tunica, vel faucium, vel asperæ arteriæ; nam si obstructis naribus, aut digito compressis, spiritum ore adducas, nullius odoris sensus mouebitur, nec circa palatum, nec fauces, nec asperam arteriam.

uti insculpti
proficiscimur,
q ad antero-
ra producti in
superiora na-
rium partem
desinunt, &
sensorium ol-
factus consti-
tuunt, & ubi
exhalationes
odoratae ad per-
ueniunt, sen-
soriū percipit,
speciem odoris
sine materiâ,
in eamq; mu-
tatur. Illa au-
tem exhalati-
o per ampli-
tudinem cere-
bri expanditur.
Processus mâ-
millares, aut
duæ crassiuscu-
la partes his
processib. (quos
nervos odora-
tus vocat) ap-
posita, Arch.
princeps odo-
ratus organū.

Laurent. At Auerrhoes contradicit: si ait, processus hi odoratus organa essent, obstructis naribus, eorum, quæ ore comminuuntur, odor perciperetur, cum ab ore & palato ad eos processus aëris aditus manifestus pateat. Dein ciborum in ventriculo contentorum, odor persentiretur, vaporibus ad cerebrum exspirantibus. Tum animalia, quæ his processibus carent, non olfacerent. Respondet Laurentius ad 1. Odores primo naribus offerri debere, ibique præparari: ad 2. Odores ille humore nimis ventriculi & oris persusus, se exercere non potest: Ad 3. De perfectis animalibus loquitur, non de imperfectis, quæ, ut sine processibus stant, sine pulmonibus viuunt, ita sine naribus & his processibus respirare & olfacere nihil prohibet. n Galen. de instrument. olfact. 1. O Galen. instrument. olfact. 3. ostendit, nec os nasi, nec interiorem tunicam, nec palati tunicam, nec fauces, nec asperam arteriam odoratus instrumentum esse.

p De instrum.
olfact. i.

q Tenuis me-
ningis inter-
uentu cerebro
iunguntur, Ar-
chan. menin-
ge utraq. non
velati, Lau-
rent.

r Quia nervo-
rum naturam
redolent, qua-
litatem perce-
ptam interno-
scent, Lauren.
Processus hi
magnitudine
paruum ver-
mem holose-
ricū referunt:
principiū ha-
bere videntur
à nervis odo-
ratoriis, qui
in hos proces-
sus degenera-
re videntur.

Nervi enim

odoratorij visorij subiecti à medulla cerebri parte posteriore, ubi quartus ventri-
culus est, oriuntur, & antèrui progressi inter cerebrum & os sphæroides in proces-
sus mammillares intraduntur: qui dati, ut sint canales, per quos odorandi facultas
in spiritu animali hausto à quarto vètriculo insidens euehatur in processus mam-
millares, seu odorandi organa: sicuti per nervos opticos videndi vis in oculos. Ho-
rum nervorum origo & progressio Vesalio, Realdo, ceterisq. incompèta, quia fortè
cerebra putrida dissecuerunt, Archangelus. & Galen. 6. de Plac. t. Sic & Va-
rolus.

riam. Quare P nasus semita quidem est rerum odora-
bilibum, quamvis respirationis P potius gratiâ, quam
olfactus causa creatus sit. Corpus ergo, quod odores
sentit, altius ° locatum erit: hoc autem, vel erit os
spongoides: seu ethmoides; at cum os non sentiat,
hoc statui non potest; vel erunt processus, qui mam-
millares à formâ dicuntur, qui ex cerebri basi pro-
deuntes, tenui meninge q cerebro iunguntur, & of-
sis ethmoidis eminentiori parte intra cranium re-
ponuntur, & cum duo sint ab ossis productione, que
calcaris effigiem refert, distinguuntur, & nervorum
naturam obtinent; quemadmodum supra osten-
sum fuit. Hi enim cum naturam, figuram & compo-
sitionem f peculiarem habeant, præcipua odoratus
instrumenta esse creduntur: maxime, cum nulla pars
in naso sit, quæ tam facile ab odoribus alterari que-
at; nam cum spiritu plena & vaporosa, facile odorum
species recipiunt. Nam cum odores t in quadam ex-
halatione consistant: (eiusque enim corpora odo-
rem spirant, quousque exhalant; quare æstate magis,
quam hyeme odorem vnumquemque percipimus)
& exhalatio naturâ suâ sicca sit, debuit olfactus sen-
sorium à principio humido prodire, ut ratione con-
trarietatis, actionibus necessario requisitæ, ab exha-
latione pati & moveri posset: & quo ipsa exhalatio
ad ipsum perueniens, commode expandi & dilatari
possit, hoc sensorium seu instrumentum, non à spi-
nali medullâ, nec à partibus eidem in angusto cir-
cum-

cumpositis oritur, sed à media cerebri magnitudine, & in substantiâ eius, veluti insculpti, qui ad anteriora producuntur, in supremam narium partem desinunt, & olfactus sensorium constituunt.

Concludentes, dicimus olfactum sic fieri: aer odoribus vel spirituosa exhalatione rerum odorabiliû alteratus, à naso extra faciem prominente, veluti camino quodam inferius lato, superius angusto, excipitur; at cum imbecilli suo motu impressionem sufficientem efficere non possit, tractu aliquo excitari debuit: quare ore clauso, & pectore dilatato (sine enim pectoris dilatione, florem vel quoduis odorem porrectum nemo olfaciet) exhalatio per aerem dispersa, inspiratione intra nares attrahitur: & cum foramina duo ad palatum quoq; accedant, maior pars pulmonem ingreditur, sed sine odorum dignotione: altera pars sursum fertur ad olfactus instrumenta, sed hîc in spongiosis ossibus alteratur; quemadmodum in auris cavitatibus aer auditorius præparatur: hic in anfractibus alteratus cum odoris specie per foramina ossis ethmoidis trãsiens, in processus mammillares fertur, seu ab ijs recipitur, & inde ad communem sensum, qui in cerebro est, vt de eo iudicium ferat, defertur. Cerebrum enim commune est sensorium, seu instrumētum omnium sensuum: siue instrumentum est, per quod anima sensitiva sentit sensibiles qualitates omnes, easque internoscit & diiudicat.

DE PARTIBVS, QVÆ INTER
Nasum, aures & mentum sunt.

CAPVT LXVII.

FACTÆ partes, quibus solus hōmo donatur,
& quæ sub oculis sunt, & inter Nasum & au-

a Μηλας In-
troductorio &
Polluci.

b Quos in mu-
lieribus radi,
duodecim ta-
bularum in-
terdicto anti-
qui vetasse-
runt. Hinc Ci-
cero libro de
legibus mulie-
ris genus ne
tradunt.

c Eis τὸν ἡ-
τα καὶ ἡ ἀνω
γνάθον Hip-
pocr.

d Polluci.

e Horatio &
Persio.

f Introduct.
Polluci & Eu-
stachio.

g Polluci &
Ruffo, Iacu-
na, Lactan-
tio, Vesalio,
Sulculus.

h Labra Ci-
ceroni de Div.
& Persio: la-
bia à lamben-
do dicti, licet
canes, feles &
alia animalia
linguâ magis,
quam labiis

lambant: Contra homines labiis magis lambunt, Archangelus.

i Aristoteles 1. hist. animal. 11. **k** Homero. **l** Ruffo. **m** Polluci & Ruffo.

n Aristoteli & introductorio. **o** Introductorio & Xenophonti. **p** Ciceroni
Plinius dominicantem tribuit, & si rotundum sit, iuxta Pythagoram, animi ef-
fœmmati indicium esse solet.

res vsque ad mentum sese extendunt, priscis ^a Genæ,
quod in his pili ^b gignerentur, dicebantur: Diuidū-
tur autem ^c in partem superiorem & inferiorem: su-
perior sub oculis inter nasum & aurem leuiter emi-
nens ac rubens, & quæ pudoris sedes Plinio censetur,
eo quod rubor eâ in parte maxime per pudorem cer-
natur κυκλὸς προσώτου, faciei circulus Hippocrati &
μῆλον, ^d malum seu pomum faciei nominatur, à simi-
litudine cum malis, quoad formam & colorem, &
quod in vere ætatis floreant. Inferior pars laxior ex-
tra maxillas clausas sita, & à mente ad oculos ferè ex-
tensa est, quæ spiritu à pulmone reuocato, & labiis
oppressis retento, inflari potest γνάθος, bucca ^e pro-
pria. At pars à naribus ad labrum vsque superius, my-
stax ^f dicitur. Cavitas vero labrum superius findens,
valliculæ instar impressa ^g φίλτρον, quasi amatorium
vel amabile dixeris. Labia ^h autem duo sunt, superius
& inferius, quæ oris musculosæ extremitates exsi-
stunt, quæ ⁱ χείλαι, ^j ἴον ἐχέλη, quasi ipsum os teneât,
& sint ἐρκος ὁδόντων, ^k septum dentium, quo dentium
deformitatem tegant: horum partes extremæ pro-
minentes προχέιλαι, ^l prolabia, & quæ in complica-
tione & commissura propter sanguinis affluxum ru-
bent, ^m ὀροσμία nominantur. Foramen vero seu ri-
ma, quæ à labiis constituitur, cum mutuo diuidun-
tur, ⁿ ὄμα os vocatur. Inferior denique sub labre
inferiori pars faciei ima in acutum tendens, ^o γέρον
mentum ^p à memorando quibusdam dicitur, quod
eius inter recordandum aliquis vsus esse videatur: fo-
uea, quæ ornatus causa eius medio impressa est, ^q νόμ-

¶ *9* menti acuta pars in maxillâ inferiore eminens *q* *Russo.*
 δρυγὲς; *r* carnosâ sub mento pars, χαρχαρία, *r* buc- *r* *Polluci.*
 cula, forsan, à similitudine cum Suetonio dici posset.
 Tandem & pili in malis, labio utroque & mēto pro-
 rumpentes barbâ constituunt, de quorum nomi-
 nibus quemadmodum & partium faciei diligenter
 & fufe egimus in libro nostro, qui partes externas
 proponit capitibus 6. & 7. quorum solum gustum a-
 liquem in hoc opere, vbi locus requirit, exhibe-
 nus.

D E O R E.

CAPVT LXVIII.

Aristoteles de Ore egit 2. part. 3. 3. part. 1. sic 1. hist. anim. 11.

& 4. eiusdem 3.

O *S* *6* *μα* Græcis dicitur & de rima, quæ in me- *a* *Inter ma-*
 dio buccarum *a* ex labiis constituitur, & delata *xillas & la-*
 uitate seu inanitate, quæ ore aperto vsque ad fau- *bra describi-*
 ces conspicitur: in anteriore & media faciei parte lo- *tur, 1. hist. 11.*
 atur, quo cibus æqualiter à manibus ei porrigatur: *in crustaceis*
 latim sub naribus: quo in ciborum assumptione nō *oculis subdi-*
 solum ori sapores, sed etiam naso odores offeruntur, *tum, 4. hist.*
 cum ea, quæ assumuntur non solo gustu, sed & odore *3.*
 cognosci debeant. Huius partes duplices sunt, aliæ
 quæ os constituunt, aliæ quæ intus in ore continen-
 tur. Constituentes duplices sunt, carnosæ & ossæ;
 Carnosæ sunt Labia & muscoli buccarum, labiorum
 & maxillæ inferioris: antè enim os labijs circum-
 datur, quo os melius claudi, & liquida forberi pos-
 sint: utrinque vero buccæ protuberant. Hæc integun-
 tur cute cum subiecta pinguedine, quæ per *b* trans-
 versum in medio scissa est (ad modum palpebrarū)
 quantum pro cibo assumendo sufficit. Ossa vero sunt
 maxillæ superior & inferior, cum dentibus utrique
 Kkk infi-

b *Cur cutis*
ad oris gene-
rationem hoc
loco, non vero
aliâ corporis
parte, diuisa?
11. vs. part. 7.

TABVLA XXVI. *Fig. 1. Musculos frontis, palpebrarum & buccarum proponit. Fig. 2. musculos nasi, labiorum, maxillæ inferioris & hyoidis.*





FIG. II.



infixis. Quæ omnia, vt & tota oris capacitas intrinsecus succinguntur membrana crassa, quæ in palato nonnihil rugosa, & dentis gingiuas ambit, labiorum partem superiorem obducit, & reduplicata Gargareonem constituit: de quibus singulis ordine.

Vsus oris primarius duplex est: primus, vt sit meatus ^c ad cibum & potum assumendum, quo in eo primum prægustetur, siquidem gustus qualitatem eorum, quæ nos commode nutrire possunt, percipit, quare in oris statim ingressu, lingua tanquam proprium gustus instrumentum occurrit, ita vt nihil intra os admittatur, quod non prius suas qualitates contactu linguæ manifestet: dein, vt in eo veluti culina alimenta antequam deglutiantur, scindantur, comminuantur & misceantur, quo præparata in ventriculum deferantur. Alter ^d ad usum spirationis, inpirationis & expirationis, quo aer naribus etiam occlusis intromissus, & sursum ad nares, & deorsum ad pulmones feratur, ad spiritus vitalis nutritionem, eiusdemque expurgationem: præsertim ad vocem edendam, cum per os sermo fiat. Secundarius vsus: quo per id thoracis & pulmonum excrementa screatu, quemadmodum ipsius ventriculi, quandoq; vomitu reiiciantur.

^d Natura per se partibus omnium communib. ad pleraque officia propria abuti tur: proinde oris quoq; officium omnibus commune, cibus conficiendus est. robur nonnullorum peculiare est: sermo aliorum. At vero nostra hac omni eodem coniecit, adhibita differentia eius partis, pro actionis discrimine. Sunt enim alia ore compressiori, alia ampliori: quibus enim cibi conficiendi, & spirandi, & loquendi gratia os datum est. ijs compressius est: quibus auxiliandi gratia. ijs, si dentibus sint serratis, rescissum. Quum enim tota eorum vis in moriendo sit, hiatus oris amplio rem esse necesse est, eo namq; pluribus & plenius morsum insigent, quam amplius rescissum os sit, &c. Arist. 3. part. 1.

DE BUCCARVM ET LABIORVM musculis communibus.

CAPVT LXIX.

De lato musculo Galenus de dissect. musc. 1. & 4. adm. ana

1.2. &

1.2. & 3. egit, at 11. vs. part. 15. musculofam quandam substantiam, ac tenuem cuti faciei subiectam vocat, cui cutis sit vnita: sequenti vero cap. quemadmodum & cap. 4. musculus latus ac tenuem in genis, vnum in parte vtraque ad colli spinam, &c,

MVS CVLI buccis & labiis communes quatuor sunt, vtrinque duo, Quadratus & Buccinator dictus.

Quadratus [tabul. 26. fig. 1. Γ Δ Ε Ζ η θ. circumscriptus] ue, vt Galenus^a vocat μυῶδες πλατύσμα musculodilatatio (siue μύες πλατεῖς^b καὶ λεπτοί, musculi ac tenues, cum membranei sint, & admodum npli.) Hic sub colli cute^a latitat, & per totam faciei inferiorem regionem sub ore expanditur: membrana est^c fibris carnosus, à nullo tamen osse pronatis, daucta, quæ à spinarum vertebrarum ceruicis regionibus, colli parte externâ, vbi extumescit, scapularum, clauicularum, & pectoris ossis sedibus, sensim vrio ductum sursum ad faciei medium ascendunt, musculus latus ac tenuem efficiunt: quare si quis musculus appellare nolit, sed musculofam naturam vel substantiam, vel quomodocunque quis voverit, id faciat licet: & hæc forte causa fuit, cur veteres à cute non distinxerint, sed cum eâ amouentes in musculorum numerum minime reposuerint, quem

^a Disssect. musculi.

^b 4. admin. ana. 1. quos antiqui ignorarunt, qui in buccam & labia cessant, à spina vero colli incipiunt: primum par buccarum & labiorum, Vesa. Fallop. instit. musculi lati in collo positi labiis ancillantes, Columb. Musculus cuneus oris labia & buccas

Kkk 3

Gale-

tiens primus, Plater. musculi duo labris communes, Archangel. musculus latus, Laurent. quem ita descripsit; Carnosa faciei totius membrana, musculus latus Galeno dicitur, qui similis est equitantium capucio, si tantum eius demas, uacuum pileolo tegitur; quare solius faciei cutis in homine ~~de~~ mouetur.

Incipit hic musculus in priori parte labiorum & buccarum: in posteriore vero exina regionibus, toti cuti. qua circa collum est, in orbem subiensus, tenuis & membranofus existit, at latet, an membrana potius, quam musculus esse videatur: sed si cute separetur, manifestus euadit: qui deorsum fertur, anterieus ad clauiculas, posterius iuxta scapularum spinas ad dorsi principium; quod vero medium est, & membranofum, per mediam spinam, qua in collo est, extenditur, quod corpus dissentionis Professores cum male animal excoriarent, ignorarunt. Gal. diss. musculi. 1.

Disssect. musculi. 1.

c 4. *Adm. a-*
nat. & dissect.
musc. 1. 11. vs.
part. 16.
f Nervorum
vim immen-
sam ex omni-
bis propemo-
dum collispar-
tibus recipit.
musculus hic
latus ab Ana-
tomicis igno-
tus, &c. ubi
eum descripsit
11. vs part. 16.
at Vesalij hac
sunt, primo v-
triusque late-
ris musculo,
Galenus, qui
ipsum cum li-
bros de vs. par.
conscriberet,
latuit, quem-
que tandem à
se inuentum
fuisse, non se-
mel in libris
de admin. a-
nat. inculcat,
adeo facit, il-
lum q. ut ve-
terum oscitā-
tiam magis
argueret, tan-
ti momenti es-
se tradidit,
&c.
g Recta, obli-
qua, transuer-
sa, Vesal. par-

Galenus ^c primus descripsit. Cum enim ad hanc mē-
 branam ^f nervorum furculi plures à ceruicis nervis
 mittuntur, qui fibris his etiam porriguntur, idcirco
 membrana hoc loci validius (quam in reliquo ferè
 corpore) partibus vnitur, & fibrarum varium ^g du-
 ctum causat. Ab osse siquidem pectoris & claviculæ
 regione ferè mediâ, fibræ secundum colli longitu-
 dinem recto ductu feruntur [à *d. ad* [?]] & quæ ex cla-
 vicularum sede reliqua humero summo, & cæteris
 nominatis partibus incipiunt, oblique sursum ten-
 dunt, [à *θ. ad* *o. & H.*] & quo ceruicis spinis propin-
 quiores, eò obliquiores conspiciuntur, ita, vt vbi oc-
 cipitio viciniore sunt, penè transuersæ existant: hæ-
 rum tamen fibrarum in collo intersectio nulla con-
 spicitur. Hæ, vbi ad mentum peruenire, vbi labrum
 superius cum inferiore ^h iungitur [inter *H. &* [?]] po-
 tissimum ad labrum inferius, ita inter se confundū-
 tur, vt amplius distingui nequeant. Quadratum vo-
 cauimus, quia ab elatiori ceruicis parte, secundum
 ossis occipitij latera versus aurem fertur, & nōnun-
 quam in ipsius radicem fibris carnosiss implantatur,
 beneficio quarum in hominibus, qui talem muscu-
 li ductum habent, aures moueri diximus: nonnun-
 quam sub ipsius radice [*o.*] in faciem ducitur, ma-
 xillæque musculum masseterem integit: simul & ossi
 malarum validius, quam alibi connascitur, ita, vt hanc
 partem maxillæ musculum quintum aliqui censue-
 rint; hinc nasi radici inseritur. Alterum latus est per
 transuersum [ab *o. H. ad* [?]] tertium vero à summo
 humero ad os pectoris [à *θ. ad* *d. &.*] inæquale ac va-
 rium; quartum à summo mento ad os pectoris [*?* *ad*
d.] Hi musculi faciei cutim, quæ à musculosa fron-
 tis, occipitis, aurium & nasi substantia, eorundemue,
 vt &

tim recta, partim oblique ascendunt, Archang. h In labrum inferius & buccam
inferius, Plat. i Penè quadratus, Colum. & Archan.

ut & palpebrarum musculis non mouetur, mouentur k *Ab hoc musculo nullus articulus detinetur, cum in articulum non inferatur, sed buccas, ac cutim, cui coalescit, solus mouet; huius motus ante dissectionem evidens est, cum buccas à seipsis ad latera citra inferioris maxilla*
 vel potius, sicut dexter labrum tam superius, quam inferius l in dextram partem trahit, & mouet, sic sinister ambo labia in sinistram oblique deorsum trahit; & quia cum mento plurimum coherant, idcirco oris apertioni auxilium ferre videntur. Hic est, qui primus m omnium in ijs, qui spasmo corripiendi sunt, intenditur, vnde spasmi m cynici fiunt, cum homines ex horum contractione earum rictus imitentur. Huius autem n fibræ à Chyrurgo noscendæ, propter incisiones, quæ aliquando fieri debent: harum enim naturam ignorantes nonnulli, ampliore sectione transuersa ipsas diuidentes, buccas ad alteram partem auulsas, n effecerunt.

o Buccinator seu buccas efformans [tab. 22. fig. 2. X. tabul. 26. figur. 2. M. tabul. 27. figur. 3. M.] prædicto subia-
 et, & totam buccarum sedem, quam inflamamus, implectitur, & rotundus p est: hic à maxillæ q su-

Kkk 4

perio-

ic ipsius actio, utilitas vero, quoad sermonem ac masticandum valde confert, v. p. part. 16.

Totæ buccas in latera deducere idonei: si enim dentes utriusque maxilla inuicem firmiter commiseris, utrinque buccas in aduersum colli latera, distorquere poteris 4. adm. anat. 2. hi cum contrahuntur, eos motus efficiunt, quas immotæ inferiore maxilla, inferiore labro deorsum tracto, abire possumus, Fallop. Institut. ueterum & iuniorum, qui solius musculi lati operâ moueri, utrumque labrum uoluere, & propter fibras varias, varios & contrarios motus edi, Lauren. buccas & inferius labrum totum deorsum retrahunt, & ad latera simul cum superiore labro abducunt, opitulanti sequenti, Vesal.

n Galen. dissect. muscul. 1. n 4. Adm. anat. 1. o Galen. 11. v. p. part. 4. huius sic nomen, masticatorijs musculi maximo auxilio sunt, fines buccarum inferiores, qui cutanei sunt, spectantes ad labia, ad quos perueniunt, tenues ac lati musculi, p. 2. par buccarum & labiorum, Vesal. musculi buccarum duo, quos quidam in magna volumine describere blitus est, Colum. 2. par faciei buccas formans, Fallop. p. 2. musc. cutaneus, oris labia & buccas mouens, Plat musculi buccinatorij, u buccarum musculi, Archang. Musculus sphincteris modo buccas circumdans, buccinator dictus, quem plerique maxilla inferioris muscul. esse putant, sed male, Lauren.

Latius & quodammodo orbicularis, Vesal.

Sic & Vesalins.

† *Colum. Archang.*

† *Hic 2. buccarū musculus vix aliud est, quam carnosarū fibrarū implexus, admodum tenuis, ac quodāmodum membraneus, Velsal.*

† *Sic & Archang.*

perioris longitudine ferè totâ exortus, in inferioris maxillæ longitudinem ad gingivarum radices inseritur: vel, si mauis, à summis gingiuis † in summas gingiuas circuli instar terminatur; nam cum circulum æmuletur, & in circulo quicquid sumatur, illud idem & principium & medium & finis sit, parum refert, an à superis, in inferas, an ab inferis in superas progredi dicas. Tenuis est, membraneus, † varijs fibris intertextus, vnde variæ ipsius actiones promanant, quas intra extraque, & supra infraque obimus. Huic intrinsecus oris tunica succingens connascitur, ita, vt integre auelli nunquam possit. Hic licet maxillâ quiescente, buccas cum labijs moueat, eius tamen officium, cibum ab ore in buccas elapsum, tanquam manus dentibus ministrare, nunc huc, nunc illuc propellere, quo alimentorum à dentibus accurata fiat confractio, comminutio, & ad chylum in ventriculo concoquendum, præparatio. Buccarum vero earumue cauitatum † vsus duplex est: primus, vt si quid inter mandendum à dentibus foras excidat, non disperdatur, sed intra buccas retentum asseruetur. Alter, vt sint, veluti receptacula cibi continendi, quod in simijs videmus, quæ ipsas cibis distendunt, quos postea sensim conficiunt. At in homine etiam ad loquelam conferunt, maxime iis, qui buccinâ vel tuba modulate canunt, inseruiunt: si namque buccas inflatas in oris amplitudinem volueris, nunc extrorsum, nunc fursum, nunc deorsum, nunc antrorsum, nunc retrorsum, huius musculi motus varios videbis.

DE LABIIS ET EORVM MUSCULIS propriis.

CAPVT LXX.

De his consule Galen. libro de dissection. musculor. 2. & 11. v. f.

11. vs. part. 15. & 16. sic 4. admin. Anatom. 3.

LABIA, oris opercula, duo^a sunt, superius & inferius; quorum substantia^b carnosae & fungosae est, permobilis, cui cutis cum musculis per totum miro artificio exacte^d commiscetur, ita, ut recte Galenus^c illorum substantiam ita conformata dixerit, ut cutim musculosam, aut musculum cutaneum appellare liceat. Et quemadmodum extrinsecus cutis, sic intrinsecus membrana ventriculo & ori communi conteguntur: unde in vomituriis inferius labrum tremit. Data autem sunt omnibus animalibus propter edendi & bibendi commoditatem: homini insuper propter loquelam & vocum formationem, propter spatij reiectionem, & quo dentes, dum os claudunt, ab aere frigidior tuebantur, & quatenus eos tegunt, ad ornatum quoque faciunt.

Ad quae praestanda motu voluntario moueri debere, quare musculos^f obtinuerunt, quorum alii communes sunt labijs cum buccis, de quibus iam dictum fuit: alij proprii sunt, sex. Labio^g quidem superior-

Kkk 5

iorum, & nasi alarum simul recedat, & paria facit sex, vel musculos duodecim, uos latos ex carneâ membranâ constantes: duos varios ex unâ quasi maxillâ in liam pronatos (intellige eos, quos praecedenti capite proposuimus) hos quatuor communes dicit; quatuor labris proprios, duos superioris, duos inferioris; quatuor alarum nasi, nisi duos ex carneâ membranâ unum facere velis: vel etiam narium primum par externum, quod labrum superius & alam simul adit, duos facere velis: hac Vesal. At Fallop. in Institut. musculos buccarum & labiorum, & nasi utrinque quatuor constituit, 1. par à membrana carnosâ, 2. qui buccas formant, 3. labij superioris, 4. labij partem freni nomine donatam, 5. in alam narium & labiū superius, 6. in narium, 7. inter tertium & quintum in frenum, 8. in radicem pinnae narium, 9. carnea moles labia efformans: Plat labiorum & buccarum sex paria sunt: narium vero tria. Archang. nasi musculi duo: lambitorij sex, quatuor proprii, duo superioris, duo inferioris, duo communes (intelligit quadratos) habet & duos buccinatos: Laurentio, Labiorum musculi 8. duo superius sursum, 2. deorsum, 2. inferius sursum, 2. deorsum agentes, quibus buccinatorem addit, quatuor narium, duo dilatantes & duo occludentes. g Galen. dissect. muscul. 2. quatuor sursum, utrinque, & duo ex inferioribus ab extremâ maxillâ, ubi

a Aristot. 26. probl. 6. Gale. dissect. muscul. 1. & 11. vs. part. 16.

b Tota labiorum natura ex fungosa substantia mixture, cute & trib. lati musculi terminis inuicem concretis, conflata est 4. adm. anat. 3.

c Arist. 1. hist. anim. 11.

d Dissect. muscul. 2.

e 11. vs. p. 15. & ex eo Lauren.

f Vesal. muscul. 10. buccarum,

perio-

men-

mentum, al-
ter à dextrâ,
alter à sini-
strâ: hac Ga-
lenus, vide &
11. v. part. 16.
& 4. adm. a-
na. 3. Vesalius
tamē ait, Ga-
lenum nullam
ferē, uti dece-
bat, aliorum
musculorū pre-
ter lati (quem
quadratiū vo-
cauimus) fe-
cisse mentio-
nem, at Lectior
consulat 11. v
su part. 4. 5 &
26. cap. praefer-
tim 16. ubi de
labiorum mu-
sculis totū ca-
pite egit: Ca-
lumbo, labio-
rum musculi
4. duo in supe-
riori, duo in
inferiori.

periori, vtrinque duo, inferiori vero vtrinque vnus.

Superioris primum par [*tab. 26. fig. 1. G. H.*] & ab
offsi iugalis futurâ extremâ, & eâ, quæ primum os
maxillæ superioris à tertio separat, & ab osse malæ,
principio lato & carnosio enascitur, deorsum oblique
in priora fertur, & in labii latus se inserit, & labrum
superius, & sursum & deorsum, & introrsum & ex-
trorsum mouere potest, idque propter fibras varias,
ac varie inter se commistas, & cum cute intertextas:
à quâ tamen, si corpus musculosum, quod pingue
non sit, detur, & sectio diligens instituatur, aliquo
pacto separari possunt.

Secundum ⁱ par [*tabula 26: figura 1. sub H.*] à caui-
tate malis subiectâ, carnosum, gracile, teres, pin-
guedine multâ obuolutum, in frenum, vbi labia
conueniunt, inseritur, & labrum deorsum vertere
volunt.

Inferioris par ^k vnum est [*tab. 22. fig. 2. Z. & tab. 26.
fig. 2. N.*] quod à maxillæ inferioris humiliore parte,
vbi asperitas quædam insculpta est, ad menti, quasi
latera, carneum exortum, oblique sursum proten-
sum, latumq; permanens: (latius enim & breuius est
superiore) in labij medium implantatur, eiusque
cuti,

h Superioris labij musculus, cui origo quadruplex, *Columb. & Archang.* hicque
vult sursum, deorsum, introrsum & extrorsum mouere: Labrum superius sursum
mouentes duo à mala orti, *Laurent.* Labio superiori peculiares duo, à maxilla su-
perioris osse enati, vtrinque in sui labri latus inseruntur, *Vesal.* 3. par buccarum &
labiorum à mala osse oblique in labri superiora latera ad superiora oblique trahē,
Fallop. Instit. vel 3. par musculorum faciei, 3. par musculorum cutaneorum, à mala
osse, *Plat.* i 7. par musculi faciei (cum quo eiusdem 4. par idem videtur) *Fallop.*
Instit. at in obs. ad quartum par musculorū faciei à *Vesal.* pratermissum, in omni-
bus cadaueribus à me reperiuntur: 4. musculus cutaneus, *Plat.* Verum *Laurent.* duos
quidem habet, deorsum mouentes sed à mento in idem labrum delatos. k Duo la-
brum inferius constituentes. *Galen. diff. musc. 2. Vesal. Columb.* labij inferioris duo
proprii, *Archang.* 5. Muscul. cutaneus, *Plat.* At *Laurentio* quatuor sunt, duo qui sur-
sum mouent, ab osseo ambitu oculi, & malo orti in labrum inferius oblique inse-
runtur: deorsum mouent totidem à mento in idem labrum inserti.

cum, quemadmodum & prædicta ita miscentur, ut fibræ decussatim se interfecent: quarum fibrarum beneficio labiorum motus diuersi fiunt. Quare Galenus¹ notauit, per hos musculos (quos tamen quatuor tantum esse voluit) motus octo effici, quatuor quidem obliquos, in utroque labio duos; præter eos autem alios rectos quatuor, duos quidem omnino rectos, cum labia plurimum à sese distant, alterum uidem sursum ad nasum protensum, alterum deorsum ad mentum detractum: tum, quando inter se committuntur, superno scilicet deorsum, inferno autem sursum tracto. Quemadmodum enim in cario ac brachio ex obliquis motibus recti fiunt, sic & in labijs accidit: si enim musculus solus utriusvis labij agat, motus fit ad obliquum: si vero tensi utriusque ierint, eo modo iam totum simul labrum sursum uidem à musculis superioribus trahitur: deorsum autem ab inferioribus. Atque etiam tensis fibris exterioribus, labia foras deflectere, intro autem cedere ac collinari ab internis¹ accidit; at si duos hos motus, ijs, ui plane sunt recti, adnumeret, quatuor quidem ex bundanti accedentes octo omnino labiorum motus reperias: quatuor enim sunt obliqui: Hæc Galenus.

His addamus carneam & indigestam molem [tab. 7. fig. 3. C.] musculosam tamen, quæ labrum utrumque in oris circuitu efformat, & à nonnullis musculorum faciei par^m peculiare constituitur: in musculis enim duos diuidunt, quorum alter superius, alter inferius labrum efformet: suosque motus aliorum musculorum instar habeant, & carnem labiorum, uando os paruum formatur, in sese colligere ac corrigare.

Neruorum quoque propagginesⁿ [tab. 27. fig. 3. ad 1.] ad utrumque labium mittuntur, quare sensu exquisi-


l. 11. v. s. par. 18.
vide & de
diff. muscul. 2.

m 9. par musculorum faciei, Fallop. in duos musculos à Fallop. distinguitur. Plat. n De his 4. adm. anat. 3. 11. v. s. par. 16.

TABVLA XXVII. Fig. III. Musculos aliquot
maxillæ, laryngis, ossis hyoidis, &c. ex-
hibet. Fig. IV. partes in ore
latitantes.



FIG. III.



o. 11. v. f. part.
16.

quisitissimo prædita sunt. Venæ item & arteriæ à propinquis ° locis inter cutim & carnosam membranam disperguntur.

DE MAXILLÆ INFERIORIS musculis.

CAPVT LXXI.

De his egit Galenus lib. de dissect. muscul. 6. & 4. adm. anat. 4. & de musculo ori aperiendo præfecto 4. adm. anat. 11. 11. v. f. part. à cap. 1. ad 8. & com. in libr. de arte Hippocr.

MAXILLA duplex est: superior, quæ in homine immobilis; inferior altera, quæ mobilis existit, & voluntarie mouetur: cuius motus duplices sunt, simplices sex, & compositus vnus. Simples sursum & deorsum, dextrorsum & sinistrorsum, antrorsum & retrorsum: Compositus vero ex dextro & sinistro, & eo, qui antrorsum & retrorsum fit, quo maxilla circumduci videtur: motum sursum, temporalis; deorsum, digastricus; ad dextram & sinistram, mansorius primus: retrorsum vero, mansorius alter, siue in ore latitans: antrorsum autem quintum par absoluit. Mouetur sursum & deorsum mordendi secandique gratiâ, ad latera, dextrorsum, sinistrorsum, antrorsum, retrorsum, molendi gratiâ: nam in maxillam inferiorem dentibus instructam, tanquam in molam quãdam mouendam, insinuantur. Quemadmodum enim in mola, à saxi mole frumenta & legumina teruntur, ita cibus intra dentes superiores, tanquam molæ partem firmam, & dentes inferiores, maxillamque inferiorem, tanquam mole partem mobilem & incitatam teritur, comminuitur atque conficitur. Quare musculi hi molares, & quia
actus

actus hic masticatio dicitur, masticatorij quoque & a Maxilla inferior, quatuor musculorū coniugationibus mouetur, sursum trahunt crotaphita, & qui intra os siti sunt; ad latera adducunt, qui in buccis locati, quos masseteres appellant: deorsum trahunt reliqui duo, Galen. dissect. muscul. 6. de horum musculorum magnitudine differentia 11. vs. part. 6. maxilla motus, sursum cum os claudimus,

1. Temporalis ^b κροταφίτης [tabula 26. figura 1. & 2. tabul. 22. figura 2. eius circumferentia N N N. pars carnosior Q Q Q. pericranio adhuc intectus O. membranā retractā] qui à situ nomen obtinuit, vt qui capitis partem lateralem obfideat, v^sque ad auris partem posteriorem & superiorem, ossium temporum cavitatem totam implens, & omnium maximus, validus & robustus: hic à maxillæ superioris osse primo, frontis, synipitis, temporum & sphænoide, initio lato, carnosior & semicirculari oritur [tabul. 26. figura 2. α β γ.] qui insim carnosior redditur, & angustatus sub osse extrinsecus transuersim imposito & circumposito, quod c Zygoma seu iugale appellatur [tabula 26. figura 2. G.] & cui nonnihil adnascitur, tutelæ gratia elatus, breui, neruoso & validissimo tendine,

in manducantibus prorsum ac retrorsum, & in latera circumfertur, & cum os aperimus, nunc rectā, nunc pabulum in alterutrum latus declinans deorsum agit, quatuor utrinque musculis, Vesal. utrinque quatuor, temporalis, in ore latissimus, masseter, & os aperiens, qui duos ventres obtinet, Columb. 4. tantum paria describunt, quintum ignorantes, cum inter secundum perspicuum sit, & proprius suus eum etiam prodat, Fallop. obseruat. at in Instit. quartum nominat: quatuor vel quinque paribus mouetur, Plat. Octo musculi motorij, masticatorij, quatuor qui sursum, duo qui deorsum, duo qui in latera movent, Ambang. moventes sursum seu claudentes quatuor sunt, quo utrinque, duo aperiens, & duo in latera, utrinque vnus, Laurent.

Crotaphita Galen. dissect. muscul. 6. dissect. nervorum & 4. adm. anat. 4. quos iuniores tantum Medici, sed & antiquiores etiam, veluti Hippocrates praestitit vocant, de dissect. muscul. 6. & 4. admin. anat. 2. temporalis & primus maxilla, Vesal. Columb. Plater. Archangel. 1. par, Laurent. 2. par maxilla, Fallop. sit.

De dissect. muscul. 16. 11. vs. part. 3.

d In extremas
maxilla coro-
nas, & in ma-
xillam ipsam
pertingūt, cir-
ca corona ec-
physin validis
aponeurosis
inferitur: idē
desinit in ma-
gnam tendi-
nem, qui ma-
xilla inferio-
ris curuo acu-
mini infigitur,
11. vs. part. 4.
de huius ten-
dinis magni-
tudine & usu
11. vs. part. 5.
e Colum. (ad
dit vsu amo-
to, vita defice-
ret) Archan.
f Μαρονηγός
μύες lib. de ar-
te.
g Reliquos o-
mnes Lauren-
mirari nequeo
quid sit in hoc

maxillæ inferioris processui acuto [tabul. 27. fig. 4. B.]
validissime^d eum suâ amplitudine amplectendo, in-
feritur. Validus est, quia omnes huius musculi fibræ
tanquam ex tribus circuli partibus ad suum cētrum
abeunt: quod propter vulnera, quæ aliquando dila-
tari debent, & propter abscessus^e horum musculo-
rum notandum, quo incisio secundum fibrarum re-
ctitudinem fiat, non in transuersum, aliàs horum
musculorum vsus & actio periret. Huius cum socio
vsus, si rectà sursum trahant, maxillam inferiorem
sursum trahere, maxillā valide astringere, & os clau-
dere. Si vero alteruter, tum oblique id fit, quod à tri-
bus musculis, temporali, massetere, & in ore latitan-
te, Vesalius fieri censuit, vnde quidam Masseteres
tres constituunt; at Hippocrates^f duos agnouit. Hic
musculus præstantiâ & dignitate^g multos, & prop-
ter viciniam, quam^h cum cerebro habet, cum so-
lum os intercedat, & propter neruos insignes, su-
perat.

Neruiⁱ enim vtrinque tres huic musculo inferū-
tur: duo quidem à tertiâ coniugatione: tertius au-
tem durior ex quinta vulgo dicta coniugatione, & i-
roboris gratia, cum musculis, ex neruorum multitu-
dine robur ad actionem accedat. Non mirum ergo
si hoc læso & contuso, conuulsio, imo mors succe-
dat

musculo tantopere à Galeno 11. vs. par. 5. decantatum, cum in huius tendinis pro-
ductione nil rarum, nec ab illorum, musculorumq; gibbum & cauum scapula im-
plent, & qui ex ilium osse pronati femoris motibus famulantur, diuersum sit, &
Vesal. Verum Galen. 11. vs. part. 2. Natura solertiam admiratur, quemadmodum
Hippocrates admirans, assidue iustam nominabat propter musculi temporalis i-
magnitudine ratione diuersorum animalium eorundemq; maxillā & vsu, disse-
rentiam, quod diuina iustitia proprium, non modo inuenire, quæ oportet, verum et
iam tribuere cuiq; pro merito ac dignitate, &c. h Natura miram diligentiam i-
temporum musculis tuendis explicat 11. vs. par. 3. ubi ostendit, quomodo & cur in-
ter omnes musculos eos potissimum, si læsi fuerint conuulsiones, febres, soporem &
deliria inferre, & Hippocrates lethales plagas & sopores in temporibus fieri dixit.
i De Neruis ad musculos faciei 11. vs. part. 7.

At: hinc etiam Hippocrates maxillæ inferioris luxa-
tionem sæpe lethalem, ob muscoli huius distensio-
nem existimavit, & libro de articulis ait, nisi inferio-
ris maxillæ ossa reponantur periculum vitæ immine-
re, ob febres continuas & soporem torpidum, hos e-
nim musculos, si præter naturam alterentur & in-
dendantur, soporiferos esse. Quare tutelæ^h causa na-
tura adposuit; primo membranam crassam ac durā,
pericranium, cuius nomine musculus exterius^k li-
et: nam interior muscoli pars, quæ ossi adhæret, to-
ta carnea est: os enim eā parte, periosio^l non tegi-
tur, & propter hanc pericranei portionem, aliqui hu-
ius musculi tendines duos, internum & externum
describunt. Deinde partem inferiorem nervosam
ossi iugali, ne nerui^m lædantur, vallavit, ita, ut hoc os
musculi huius solius gratiā constructum videatur.
Cum huius tendinem infra supraque carne muni-
t, quo minus ab externis offendatur. Et hi in ho-
minibusⁿ respectu aliorum animalium, quemad-
modum & in simijs, minimi sunt, ac minimum ner-
vosi; maximi vero, ac nervosissimiⁿ leonibus, lupis,
canibus, & omnibus animalibus, quæ *καρχαρόδοντα*,
id est, dentes ferratos habentia, appellant; in alijs a-
nimalibus, ⁿ ut porcis & asinis sunt maximi, non ta-
men æque nervosi: magni autem effectiⁿ ob actionis
maudendo robur, & maxillæ inferioris magnitu-
dinem: at homo omnium animalium minimum ha-
bet, quod & maxillam inferiorem, respectu aliorum,
minimam, & ad actiones imbecillam, utpote dentes
id solum esum idoneos; cum hominisⁿ fortitudo
non in morsu consistat, neque eo cætera animan-
ia coerceat, sed ratione ac manibus. Inter maxillæ
amen musculos^o maximi sunt, quia totam maxil-
am inferiorem, velut à se pendentem attollunt ac
sustinent.

*k Exteriore
tantum sede
propter ppria
membrana cras-
sitiæ, per quam
liuidum, Vesal.
l Sic & Laur.
reprehendens
eos, qui duos
tēdines descri-
bunt. Et Col.
tendo alter in
acutum ma-
xilla processū,
alter tēdo mē-
branosum, mu-
sculū exterius
liuidum red-
dens, sub osse
iugali defer-
tur.*

*m 9. v. s. par. 8.
de diff. nervor.
s. Os iugale ad-
positum secu-
ritatis gratiā
11. v. s. par. 5.
n 11. v. s. par. 2.
ubi plura ani-
malia recēset,
& differentiā
musculi huius
o 11. v. s. par. 6.*

p *Masseteres*,
nomine ab u-
tilitate impo-
sito, i. Masti-
catorij, qui in
buceis sunt lo-
cati diff. musc.
2. diffect. ner-
uor. 5. 11. vsq.
part. 4. 4. ad
min. anat. 4.
etiam mandib-
ulares: Fall.
in Instit. 1. qui
ab osse iugali
in maxilla par-
tem inferiore
inseruntur, &
ad latera cir-
cumagūt: Ve-
sal. & Plat. 2.
Colum. 3. Ar-
chan. molarij,
3. Laur. quar-
tū par ad la-
tera mouens.
q Sic & Lau-

rent. At Vesal. Columb. & Archang. tendinosa & carnosā origine nati à iugali &
à primo maxilla super. osse, & in maxillam inferiorem inseruntur, non autem (ad
dit Columb.) à 3. & 4. vertebrā colli, quemadmodum Galenus voluit. Hunc ait
Galen. 11. vsq. part. 4. nonnullos utrinque triplicem existimare, quod tres ipsorū sin-
d'ονεγώτες aut tendines, aut in maxillas insertiones instar principiorum quorun-
dam, sed inter se non conueniunt, siquidem hic tria utrique musculo principia tri-
buit: ille vero caudas aut aponeuroses aut tendines. aut insertiones: sed nulla est i-
re controuersia, sed in docendi ratione: triangulari enim quodammodo musculo
rum uterque est. 11. vsq. part. 4. Vesalius censuit temporali musculo, massete-
ri & in ore latitanti cum suis in altero latere coniugibus concreditum, ut maxil-
lam inferiorem nobis mordentibus simul sursum ducant, & contrahant: nullie
nim priuatum hoc commissum. At Fallop. censuit Masseterem hoc secundario fa-
cere, primo maxillam ad latera ducere, Vesa. masseterum & in ore delitescentium
operā circumduci voluit dextro massetere, & sinistro in ore latitante simul cōtra-
ctis maxillam in dextrum latus agi; sinistro massetere & dextro in ore latitante
una contractis manducantibus maxillam in sinistrum latus circumferri, mola-
deniq; versus priora & posteriora in manducantibus à masseterib. præcipue consici-

II. p Mansorius primus μαασητήρ & molitor, quia
propria eius actio est μάσσησις, māducatio, & in buc-
cis locatus est [tabul. 26. fig. 2. & tab. 27. fig. 3. 1. tab. 22. fig.
2. V.] duplici q est capite, vnde & Biceps dici posset.
altero neruoso à malā [tabul. 26. fig. 2. λ.] prodiens ad
futuram, vbi maxillæ os, ossis iugalis portionem edu-
cit, & in maxillæ angulum extremum, seu ipsius pro-
cessum acutum fertur: altero carnosō ab osse iugali
[tab. 26. fig. 2. κ. & tab. 27. figur. 3. ad G.] versus mentum
fertur & toti maxillæ inferioris amplitudini validif-
sime & latissimā insertionē implantatur, [tab. 26. fig. 2.
μ.] ita, vt obtusi r trianguli alicuius angulum expri-
mat, veluti verticem quendam trianguli iuxta ma-
lam habens [Λ.] hinc vnum trianguli latus versus os-
sis iugalis extremitatem porrigitur [à λ. ad κ.] aliud
versus maxillam inferiorem [à κ. ad μ.] reliquum ve-
ro ac tertium, velut basis quædam prædictum v-
trumque latus omnibus maxillæ inferioris partibu-
coniungens secundum ipsius longitudinem exten-
ditur, & horum capitum fibræ sese in modum X. in-
tersecant, quare f & in latera, & antrorsum retror-
sum-

sumque maxillam mouent, (cum in mandendo & cibo molendo motus varius requiratur) & circumagunt: quemadmodum enim temporalium actio fuit, dentes inter se vehementer committere, & id, quod inter eos est, comminuere; sic cibum læuigare; in partes minimas conterere masticatorum musc-
orum actio est: hi enim tensi & contracti, & cibos nutant, & qui à dentibus exciderunt, rursus iisdem adducunt, temporalibus musculis nihil ad id con-
ferentibus. At lingua ad hanc actionem non mini-
us confert, vt quæ instar manus cuiusdam cibos ore assidue transfert, ac voluit, quo omnes partes
suis conterantur, & linguæ masticator musculus, elut secunda quædam manus adiutor comparatus
est: Verum & buccarum musculi maximo auxilio
int.

¶ Fines buccarum inferiores, qui cutacei sunt, & ad labia spectant, ad quos perueniunt tennes & latissimi musculi, utraque parte vnus toti colli circumiecti: mouentur enim ab his buccarum labiis, etiam si maxilla omnino immobilis fuerit, ut.
¶ v. part. 4.

III. Par^e [tabul. 27. fig. 4. iuxta B.] sub temporali musculo, in ossis temporum cauitate humiliore sede, tum est, & partim à supernis processuum aliformi-
um partibus externis, asperis & inæqualibus, & partim ab ossis sphæroidis elatiore apice aspero & acuto, qui in temporum cauitate ex aduerso os iugale
aspicit, vbi rimam amplissimā, quæ ab eodem sphæroide & malorum osse maximo formata est, immittit, ortum ducit, & quidem principio partim neruo-
so, & partim carnosio, quod satis carnosum redditum retrorsum oblique ducitur, & in maxillæ inferioris
cervicem & illius capitis internam sedem inseritur, hoc maxillam antrorsum, quemadmodum subse-
quens retrorsum mouet & exerit.

¶ u. Temporalis musculi pars, Vesalio; musculus maxillæ antrorsum producens, Fallopi. Obseru. at in Instit. meminit, s. musculus seu brevis. Plat. Musculus à Fallopio additus, Laurent. cum actio exerens.

IV. Manforius alter, seu in ore latitans, à Galen.^x dictus
[LII 2] maxilla, tum masseteri, tum in ore latitanti propter fibras eorum obliquas ac-
cipi referenda sit, non est, cur numerum augeamus, sed Vesalij examini subscri-
amus, Arantius Obser. cap. 30.

¶ v. d. v. c. p. 50. p. 4. adm. anat. 4. & dissect. musc. 6. 11. v. part. 6. parui Sylvio; 2. par

2 part. Col. secundum seu molarij, Archan. maxillâ claudens alter, Laurent. Tertius, Vesal. Fallop. (cui musculus latentes in ore) obseru. & Instit. Plat. y Canis maxilla inferioris partib. incumbunt, ad palatum ascendunt, canis ossib. quæ à processib. pterygoideis circumdantur, inseritur, Gale. diff. musc. 6.

2 Gal. dissect. musc. 6. eandem quam temporalis, actione obit, quare quidam partem temporaliu existimant, ut Marinus; priuatim separant, Aëtianus & Pelops,

Lycus prorsus ignorauit: quare reprehendit eos, qui quatuor temporales musculos dicunt: Idem temporali multis partibus cohaeret, adeo, ut si partem temporalem esse dixeris; haud aberrasse videaris, 4 adm. anat. 4. a Dicunt (ait Fallop in Instit.) maxillam supra trahere; antrorsum retrorsumq; agere. b De hoc 11. vs part. 4. & 5. tot sunt quor temporales. duo scilicet, utrinq; superioribus oppositi, vocari possent pterygoideis, aut beloroides, quia à styloide processu oriuntur. 4. par maxillæ dorsum, trahens, & cum tenduntur, aperiens, diff. musc. 6. at 4. adm. ana. 11. ori aperiendo profectû, 4 musc. maxillæ inferioris, Vesal Col. Fall. obser. & Instit. Plat. (cui & longus) Archan. 3. part. Laurentio. c Innuere videtur Vesal. & Laurent.

dictus [tab. 27. fig. 4. D.] quia in maxillæ internæ sinu maximo latitat: hic crassus ac brevis est, & à cavitatē internâ, vel canali y processuum ossis sphæroidis alas referētium valde neruosus exortus, carneus, amplius & crassus redditus, rectis fibris descendens maxillæ inferioris parti internæ, & posteriori, vbi asperitates notantur, & vbi sinus insculptus, ne fauces nimium occupet, tendine satis valido, nerueo & lato inferitur, & hic 2 temporalem musculum, cui iuxta tēdinis sui productionem & insertionem admodum connascitur, adiuuat, maxillam introrsum & sursum trahendo, & ore claudendo, cum rem grauem sursum trahere, & res duras perfringere & comminuerē, laboriosum sit: sed etiam maxillam productam retrorsum a reuocat.

V. b Graphioides seu Digastricus [tab. 27. fig. 3. O. P. & fig. 3. N. O. tabul. 26. figur. 2. O.] tenuis est & paruus à styloide appēdice (hinc graphioeides dicitur) membraneus & latiusculus exortus, statim carnosus & teres redditus, sub maxillæ superioris humiliore sede & aure delatus, in medio, vbi ad maxillæ inferioris flexionem curuatur, carnosâ substantia denudatus, neruosus redditus, rursusque carnosâ in maxillæ medium iuxta menti partem inferiorem, vbi os interiorius, insertionis gratiâ aliquantulum exasperatum est, & vbi ambo vtriusque lateris muscoli concurrunt, inferitur; quamuis mediâ sua parte hyoideis ossi adhæreat. Sed & c trochleæ quædam imago occurrit;

it; alias enim, cum hi muscoli à colli inferioribus d
 partibus non oriantur, sed potius à superioribus, omnes muscu-
 maxillam deorsum mouere non possent, nisi ad infe- los ambas par-
 rioris maxillæ angulum inferiorem, veluti ad troch- tes extremas
 eam obuoluerentur. Huius paris vsus, maxillam de- carnosas ha-
 orsum trahendo os aperire, & quodam consequio bent, media
 inguam in fauces retrahere: si vero alteruter solus a- vero redonem
 rat, oblique ad suum latus maxillam deducet. Dictus exquisitum,
 uit digastricus, quod duos ventres^d habeat, quia i- Gal. diff. musc.
 itio & fine carnosus existit, in medio vero [tab. 27. 6. his peculia-
 g. 3. inter O. & P. fig. 4. inter N. & O.] neruosus seu ten- riter accidit,
 inosus (quod huic & secundo pari hyoerdis [tab. 27. ut medio isti-
 g. 3. V V.] peculiare est) partim roboris gratia, par- nere pars ipa-
 am, ne maius^e spatium occupet: cum locus angustus rum carnosus
 it, in quo multa^e organa collocanda erant, maxillæ aboleatur, 4.
 ngux & hyoidis muscoli: quare etiam parui ac^f te- adm. anat. 11.
 ues, rotundi ac oblongi constructi, maxime cum vide & 11. vs.
 iotus hic facilis sit: siquidem maxilla suo pondere part. 5.
 eorsum vergens, nullo valido retrahente opus ha- c 11. vs. part. 5.
 ebat, sed veluti res grauis minimo negotio deorsum Multa recen-
 ucatur. § sentur, sic Col.
 Et tandem, cum muscoli quadrati, (quem cum & Lauren. sed
 ialeno inter buccarum musculos recensuimus,) negat Vesal.
 ortio maxillæ inferioris ossi insigniter infigatur, h propter orga-
 extro & sinistro ad menti medium conuenientibus, na ibi posita
 eidem deorsum trahendæ inseruiat, idcirco Aran- in medio ten-
 dius (qui tertium par propositum nō agnoscit) quin- dinem obtine-
 um par maxillæ fecit: & hanc portionem vnā cum re, sed potius
 quarto pari (scilicet Digastrico) ore patefacto ma- propter refle-
 liatur, quādo xū huius mu-
 maxillam de- sculi secundum
 trahit; tunc e- maxilla infe-
 rioris angulū,
 quem ibi mo-
 liatur, quādo
 maxillam de-
 trahit; tunc e-

LII 3

xil-

im in collectione insigniter & valide contrahi. f Fallop. Archangel. g Addis
 allopium, Vesalium omisisse hunc musculum, cum ad mentum deuenieris ante in-
 rtionem, portionem quandam carneam oblique ductam à se emittere, qua ab o-
 o quoq; musculo deducta fibris inter se implexis, atque transuersis iuncta, partim
 yoidi, partim mento copuletur. h Paulo validius ossi in mala, quam alibi in re-
 quo ipsius progressu conascitur. Vesa. simul & in osse maiorum primum par buc-
 arum & labiorum inseritur, Fallop. Infit.

xillam deorsum trahere, ita tamen, ut à quarto magis secundum rectitudinem, & sine buccarum motu: ab hoc vero, si alter tantum in actione versetur, oblique simul cum buccis inferioreq; labio ad latus distorqueri: ceteri vero agentibus, in neutram partem inclinando ad laryngem duci.

Ligamentum quoque vtrinque conspicitur membraneum, aliorum articulorum ligamentis correspondens, quod maxillam inferiorem processu suo latiore ossi temporum alligat.

DE OSSE IUGALI.

CAPVT LXXII.

De hoc Galenus lib. de ossib. 2. egit.

O Siugale [tabul. 2. fig. 6. V X.] ζύγωμα aut συζυγέ-
des, quasi coniugale, & ex duobus coniugatum, in faciei latere, sub oculi orbita situm est, non quidem os peculiare, sed ex duorum ossium processibus, altero ossis temporum, altero maxillae primo compositum: qui duo processus in medio per futuram a obliquam [tab. 2. f. 6. T. t. 3. f. 8. P.] committuntur, & os vnum iugo simile efformant, quamuis & ponti affimilari possit. Foris gibbum, intus cauum, radicibus quidem crassis vtrinque, sed in medio processus à temporum osse prodeunte, gracilescens.

a Male interpretès Galeni habet transuersum, cum in Græco legitur λοζόν non exigatur.

b Vterq; processus iugale os constituens, medulla est expers & solidus, Vesalius, Gorraus: non caret medul-

Substantia dura, ac pene solida (cum non omni cavitare destituatur, quo medullam b pro nutritione contineat) quo ab iniurijs externis musculum temporalem, cui præponitur, potissimum eius tendinem tueatur, & ut ab eo musculus maiorius originem ducat; sic & caluariam ibi tenuem c firmat.

DE
lâ, ut Vesalius existimauit: Effractum enim cauernosum apparet, Columb. c Et oculorum sedem in angustâ caluaria hac sede admodum protuberantem egregie summat, Plat. & Laurent.

DE MAXILLÆ SUPERIORIS

sutura.

CAPVT LXXIII.

De hac Galenus de ossib. 5. 11. v. s. part. 18. 19. & 20. Aristot. 1. hist. 11. 3. eiusdem 7. & 4. part. anim. 11.

MAXILLA, σιαγών^a (quod maxillas clausas continentes silentia agant, quod σιγᾶν dicūt) ^{et} ^a γένος Græcis: duplex^c est, superior & inferior, ^{et} ^{et} καὶ κάτω γένος, Hippoc, Aristoteli^b & Galeno. ^c superior faciei pars est ossea,^d quæ oculorum orbitæ artem inferiorem & laterales, narium cauitatem, ialas, & oris amplitudinem superiorem, seu palatum constituit, & dentium superiorum seriem completitur. Hæc vel tota, vel secundum partes, ex quibus componitur, considerari debet: si tota, tum vel ipsius conformationem, vel connexionem, quæ per suturis fit, perpendemus; si partes, tum ipsa ossa, ex quibus componitur, examinabimus. Totius maxillæ vasa est, superius latior, inferius angustior, idque ob prominentias, foramina & cauitates, quib. donatur.

Prominentias etenim obtinuit, superius quidem in faciei medio, qua nasum efformat [tabul. 3. fig. 8. f.] quod soli homini peculiare est, cū ei soli nasus emineat: ad latera, vtrinque; ad tempora propter oculorum & malarum marginem inferiorem [supra r.] quamuis etiam oculorum cauitatem inferiorem efficiat. Inferius vero & exterius, vbi dentium radices situm habent, vtrinque extuberans circulariter prominet [sub Δ.] at interius, palati anteriore maioremque partem asperam constituit [tab. 3. fig. 9. t. γ λ.] & in circūfretia propter dentiū alueolos protuberat [fig. 9. u. u.]

Foramina partim exigua, quo venæ, ^f arteriæ & aerui transmitti possint, exsculpta, vt in singulis ossibus dicetur; partim magna, & quidem duo in ocu-

^a Arist. 1. hist. anim. 11.

^b In Physogn. cui & σιαγών 3. hist. 7. 3. p. 11.

^c De ossib. qui com. 2. in libr. de arte scribit, γνάθον & γένον ab Hippo. confundi.

^d Osseum opificiū, quod caput nominatur, à naturā in tres partes distributū, scilicet caluariā, maxillam superiorem & inferiorem, Archang.

^e Duplex est: cuius pars prior γένειον μέν- tum; posterior γένυς, mandibula est, 1. hist. anim. 11.

^f Nam sola, vt scribit Hippo. ex ossibus maxilla ipsa in se ipsis venas, & ob id alimentū amplius in ipsas quam in alia ossa trahitur, Laur.

li cauitate inferiore, vt in secundo osse [fig. 8. C.] per quod pituita & neruul⁹ ad nares mittitur, & in quarto, per quod neruulus ad malarum exteriora fertur: sic in palato anterieus & in medio vnum, venulam & arteriolam transmittens [fig. 9. 2.] in eodem posterius vtrinque duo ad narium latera delata [ad v.]

g Arist. 1. hist.

11. 3. hist. 7.

Gale. 4. adm.

anat. 2 sic A-

rif. homo &

vinipara qua-

arupedes ma-

xillā sursum,

deorsum, & in

latera agitāt.

Pisces vero &

aues, & oui-

para quadru-

pedes sursum

deorsumq; nō

mouent, causa

est, quod eius-

modi motus

utulus ad mor-

dendum secā-

dumq; est: qui

autē in latera

agitur, ad ci-

būm molendū

cōficiendūq;

accommodatur:

cetera omnia maxillam inferiorem mouent: Crocodilus fluuiati-

lis vero solus superiorem, cuius causa, quod pedes ad capiendum & retinendum in-

utiles habet: parui enim admodum sunt. Ad hūc usum natura pro pedibus os vti-

le ei condidit. At Archang. ait, rationem propriam adferri non posse, communē ve-

ro, quia Aristot. scribat, corpus esse anima instrumentum: quare naturam accom-

modasse anima humana corpus tot partibus instructum, quib. vires insitas expre-

mere posset, equo item bonique, ita & crocodilo, cuius anima vim aliquam habet

nobis incognitam & incompertam, quam exprimit motu superioris maxillae.

h Hor primus, quod sciam, obseruauit, Col. Archang. Laurent. ratio Archangelis,

quia ei tale corpus & instrumentum attributum fuit, quale effligitabat Psittaci

anima. i impedimentum adferret & odoratus & visui, Archang. Laurent.

Cauitates proprias & communes obtinent: proprias, ipsi ossi quarto, in quo antrum ad latera narium ossi inclusum [fig. 8. sub B. A.] & alueoli, quasi locelli, dentium gratiā insculpti, de quibus in quarto osse: Communis est narium cauitas septo distincta, ossibus fungosis repleta, quæ & foris in naso [fig. 8. O. O.] & intus in ore [fig. 9. ad q q.] semper patet, quo & aerem respirationis causa retrorsum, & odoris gratiā sursum intromittat, & aerem in expiratione & voce, & pituitam emittat.

Immobilis est in omnibus animalibus, Crocodilo & fluuiatili excepto, cui superior maxilla mobilis, inferiore cum ossibus temporum adeo vnita, vt ne tantillum moueri queat, & superior capitulis vtrinque singulis & latis, inferior duobus sinubus inarticulatur: at Psittaco vtraque mobilis existit, qui eodem tempore vtramque & alterutram separatim, prout vult, mouet: h at homini immobilis est, primum, quia ipsius motus i oculis maiore circulo inspecturis impedimento foret: dein naribus odores excipientibus

aerem-

accommodatur: cetera omnia maxillam inferiorem mouent: Crocodilus fluuiatilis vero solus superiorem, cuius causa, quod pedes ad capiendum & retinendum inutiles habet: parui enim admodum sunt. Ad hūc usum natura pro pedibus os utile ei condidit. At Archang. ait, rationem propriam adferri non posse, communē vero, quia Aristot. scribat, corpus esse anima instrumentum: quare naturam accommodasse anima humana corpus tot partibus instructum, quib. vires insitas exprimere posset, equo item bonique, ita & crocodilo, cuius anima vim aliquam habet nobis incognitam & incompertam, quam exprimit motu superioris maxillae.

h Hor primus, quod sciam, obseruauit, Col. Archang. Laurent. ratio Archangelis, quia ei tale corpus & instrumentum attributum fuit, quale effligitabat Psittaci anima. i impedimentum adferret & odoratus & visui, Archang. Laurent.

neremque inspirantibus, tum & ciborum duriorum exquisitam cōfractionem impediret; nam vt in molâ molendinariâ ad triticum in farinam comminandum, pars vna molæ lapidea immobilis persistit, altera vero quoque lapidea mobilis, ita in molendis conterendisque cibis, tale instrumentum condendū fuit, cuius pars vna immobilis, qualis est maxilla superior, altera mobilis, qualis est maxilla inferior. Quamuis etiam ad venustatem^k faciat: si enim mo-

^k Colum. Arch. Chan. Laurent.

Connectitur maxilla superior, vel cum ossibus circumiectis, vel cum ossibus proprijs, ex quibus cōposita est, & quidem commissuris immobilibus, partim per suturas,^l partim per harmoniam.^m Sunt au-

^l Gale. in pro-
om. de ossib.
nonnulla ma-
xilla superior
ossa p harmon-
iam seu sim-
plicem lineam
iunguntur. Co-
lum. reprehē-
dit Gale. quod
libr. de ossibus

LII 3

tuo maxilla supe-

rioris ossa per harmoniam coniungi dixerit, cum in Introd. sub symphysi posuerit & si, lib. de ossibus harmonia synarthros species sit. Resp. librum Introductorij Gale- non esse. m Cum harmonia ista magnâ ex parte, si quando effringantur, intus utrumque quendam contextum referant, quem sutura quodammodo comparare- ueas, illa suturarum etiam nomine in sup. maxil. historiâ donatur, Vesal. per sym- physin eamq. speciē, que harmonia nominatur, qua veluti linea apparet, ossa ma- xilla inter se colligantur, Arch. n Maxilla superior à calua discriminatur lineis q. suturis tribus, duabus communibus, & ea, qua in osse iugali est, Columb. Ar- chan. Laurent.

tuo coeuntibus communes sunt, quæ vero vni ossi peculiares existunt.

• *Suturas à Galeno positas aliquas canibus & simiis, aliquas, ne his quidem recte tribui statuit Vesal. Suturarum enumeratio à Galeno propo- sita, falsa est, non solum in hominib. sed etiam in simiis, canibus, & brutis fere omnibus, quæ ego videre potui: ab aliquot tamen Anatomicis falsa in hominibus, at in simiis & canibus vera creditur, Fallop. Obser.*

p *Sutura maxill. super. Secunda tripartita scissa, Galen. de ossib. 3. Verum primâ huius futura parte ppe marginem oculi angulû exterius ad mediû su-*

° Suturarum internarum prima, in faciei internâ sede, in narium amplitudine occurrit, quæ septo cû quinto osse communis est, & deorsum oblique breui ductu fertur. [tab. 3. fig. 8. sub f.] Secunda ibidem reperitur, quæ septo narium cum osse quarto & sexto maxillæ communis est, & transuersim longiore ductu antrorsum fertur [tab. 3. fig. 8. g.]

Suturarum externarum prima, ad os malæ oblique ducitur & quidem tertio: P primum per temporum caua extrorsum & deorsum ad malæ inferiora dein per malæ anteriora sursum & introrsum ad oculi sedem mediam [tabula 3. figura 8. ab a. ad D. inferius] tum in oculi antro retrorsum & extrorsum fertur [à D. inferiore ad Q.] & ad futuram secundam caluariæ communem finit: hæc primo ossi cum quarto communis est.

Secunda in oculi orbita per ossis ambitum circulariter ducitur, à futurâ communi tertiâ deorsum, mox antrorsum, inde rursus sursum: hæc communis est secundo ossi cum tertio parte posteriore, & cum quarto anteriore & inferiore sede [tab. 3. fig. 8. ab V. ad i. inde ad C. Δ.]

Tertia in oculi quoque orbitâ, quæ ab ossis sphenoidis futurâ cōmuni secundâ, rectâ extrorsum abit, & in futurâ secundâ desinit: hæc ossi tertio cum quarto communis est [tab. 3. fig. 8. à b. ad c.]

Quarta ad nasi latera exteriora, à futurâ communi tertiâ rectâ deorsum secundum ossis quarti longitudinem ad cartilaginem ducitur; hæc communis est quarto ossi cum quinto [tabula 3. figura 8. à E. ad e.]

Quin-

p *preciliorum, homines destituuntur, quæ in canibus & simiis caudatis manifestissima est, Vesal. sed de his vide Galen. Vesal. & Ingrassiam.*

Quinta in palato est, & per palati partem posteriorem transversim abit, & communis est quarto ossi cum sexto [tab. 3. fig. 9. t u.]

Sexta in nasi elatiore parte existit, & à supercilio- rum medio à futurâ communi tertiâ rectâ per nasi longitudinem fertur, & quintum os per medium di- ligit [tab. 3. fig. 8. f.]

Septima in palato est, linea potius quam futura, non secus, quam sexta dicenda; quæ per totam ipsius longitudinem rectâ fertur, & foris & in narium am- plitudine conspicitur, & quartum os, quemadmo- dum & sextum à suo coniuge per medium diuidit, [tabul. 3. figur. 9. y & x.] Sic etiam in maxillæ anteriore eadē à nasi amplitudine per dentium incisiorum medium rectâ deorsum ad palatum vsque, ubi con- iunguntur, fertur. [tabula 3. figura 8. h.] Verum in cani- us, simijs, porcis, & quibus canini dentes validi- vertique sunt, duæ occurrunt futuræ vel harmo- iæ conspicuæ, quibus homo caret; quare & pecu- aria habent ossa, quibus incisorijs dentes infigun- tur.

Spuriæ etiam futuræ dantur, quæ os non penitus diuidunt, quæ potius lineæ sunt seu rimæ, & in quar- to osse tantum conspiciuntur; & quidem primo in- culi orbitæ humiliori sede, quæ à primo foramine oblique ad oculi ambitum tantum ducitur, & quarti ossis partē inter primi foraminis sedem superiorem & oculi ambitum diuidit. [tabul. 3. figur. 8. i.] Dein in palati sede anteriore nonnunquam à quarti ossis foramine secundo ad dentes caninos oblique du- citur, utrumque den-

q Linea per palati longi- tudinem du- cta, &c. Columb.

r Vesal.

f Galen. de ossib. 3. etiam homini tri- buit.

t Sæpe oblite- ratur, Plat.

u Futura alia sub palato transversim datur, & ad

in caninum in pueris terminatur. Hac in pueris conspicua est, in adultis sic obli- ratur, ut nullum sui vestigium relinquat, Columb. Dissentio ab iis, qui testan- tur, reperiri futuram sub palato per transversum ad utrumque caninum pertinen- tem, qua in pueris pateat, in adultis obliteratur: nam reperio, hanc diuisionem vel- lam potius esse, quam futuram, cum os ab osse non separet, neque in exterioribus appa-

apparere, vel citur, & partem eam, quæ ad dentium incisiorum cum os cū offe regionem est, diuidit, [tab. 3. fig. 9. a.] nusquam tamen nō coniungat, adeo penetrat, vt totum diuidat, vt in canibus & si- quod futura- miis, porcisque, in quibus non solum in palato futu- rā quartum os diuidit, verum exterius in maxillæ an- tiore sede. teriore sede.

hi videtur hac diuissio magis conspicua in pueris, quam adultis, in quibus paucissi- mu, atque iisdem senioribus, vidi hanc esse oblitteratam, Fallop. Obseru.

DE OSSIBVS MAXILLÆ.

CAPVT LXXIV.

MAXILLA non ex vno offe, sed pluribus con- stat, non tam, vt iniurijs pellendis promptior reddatur, quam, vt ex eorum commissuris ligamen- ta musculorum constructionem ingrediētia prode- ant, quo firmitus principijs suis, tanquam offeis par- tibus alligentur, & validiores fiant. Dein etiam, quia maxillæ ossa non vndique pariter, aut densa aut du- ra, aut crassa aut mollia requiruntur. Sunt autem duplicia,^a communia & propria. Communia sunt os sphænoides & spongoides, seu septimum & octauum capitis: ab hoc prodeunt duo ossa spongiosa in naso interno sita (quibus iunguntur duo, quæ oculi orbi- tam internam perficiunt, quæ pro tertio maxillæ ex aliorum sententiâ recenscimus) & processus na- rium superiorem partem distinguūt. Sed de his par- tim inter capitis ossa, partim inter ossa nasi dictum fuit: quare ad priora veniamus: propria ossa^b duo-
decim
tes superiores: duo qua prominentiorem maxillæ partem constituunt: alia, qua in oculorum orbitâ delitescunt, & vt duo ossicula ad angulum maiorem, duo minima illis conneza. Communia quinq, cum caluariâ, hac intus latitant, duo spongiosa, qua velut appendices ossis frontis, duo ad posteriorem palati partem, qua sunt spha- noidis, vnum quod est ossis ischioidei: nasum diuidens, Archang. ^b Galenus lib. de ossibus 4. monet alios 15. ossa maxilla super. recensere, quibus sphænoides addant: a-

^a Maxilla su-
persoria fabri-
eam constitu-
entia 15. sunt
ossa, 10 ppria,
qua duplicia;
alia oculis ob-
uia faciem of-
seam intuentib.
qua sex sunt,
duo nasi, duo,
in quibus den-

decim sunt, quæ ad faciei constructionem tantum faciunt.

Primum [tab. 3. fig. 8. Γ Γ.] quod malæ non minime partem, & oculi orbitam inferiorem versus tempora, & rotundam eam extuberantiam, quam Hippocrates κύκλον προσώπε, alij μήλον appellant & ossis orbitalis partem alteram, non nihil temporis & oculi angulum externum constituit: formâ quasi triangulum, ex medio lato extuberantias tres emittens, ad oculi angulum ad dentes & præsertim processum ad iugale cum temporum processu efformandum, [tab. 3. fig. 9. Γ. cum Γ.] foramen vnum vel alterum exitum habens: hoc quatuor ossibus committitur: superius frontis ossi, ubi supercilij extremum habetur futurâ communi [tab. 3. fig. 8. R.] prima [tab. 2. fig. 6. 7. g.] posterius sphænoidi futurâ communi secundâ [tab. 3. fig. 8. ab S. ad Q.] ad latera processu suo, temporum processui futurâ obliquâ communi quarta [tab. 3. fig. 8. P.] inferius vero maxillæ superioris quar- iuxta malam, & in oculi sedis inferiore parte [tab. fig. 8. à D. inferius per D. superius ad Q.]

Secundum [tab. 3. fig. 8. Δ.] quod in oculi angulo maiore iuxta nasum consistit, & statim ad anguli initium, ubi foramen in nares est [tab. 3. fig. 8. C.] se offert: caruncula, glandulæ instar pituitam à cerebro ad oculum manantem, ne in genas defluat, excipit, ut ad nares h exprimat: est autem minimum squammæ modo tenue & pellucidum, quod quia laxè hæret, & quarto ossi antè harmoniâ verius, quam futurâ ingatur, facile frangitur vel deperditur, & in calua-

lios ossis tantum enumerare, consule locum.

At 11. vs. part.

18. & 20. no-

uè: In Introd.

Herophil. 12.

posuit, huic po-

steriori Vesal.

subscripsit &

Plat. Sic Col.

ego 13. semper

observavi, qu-

que in utraq;

parte, undeci-

mum aratro

simile, 12. &

13. duo spægio-

sa, in interno

nas. Fall. un-

decim tantum

malæ. ossa 1.

2. 4. 5. & 6.

Vesalij, quæ inge-

minata decem

sunt: illud quod

vomeris, figu-

ra constat, ut

undecim fiat:

hunc sequitur

Lauren.

c 1. maxill. su-

per. & maxi-

mum Gal. de

ossib. 3. 1. Vesal.

Columb. Plat.

Lauren.

rijs è d Figura va-

um, Columb. c Ossa septem. Colum. f Sutura sexta beneficio, Columb. sutu-

huic & ossi cuneiformi communi, Vesal. g 3 minimum Galen. de ossib. 3. 2. Ve-

Col. Plat. Laurent. h Quod, ut Galen. comprobatur: addis medicamenta in

ulos immissa per nares effluere solere: id quod hætenus mihi experiri minime li-

uit: & mirum est, quomodo membranam, qua ibi assistit, ocularia hæc medica-

menta penetrare possint, Columb.

i Sutura 2.3.
& 4. officulo
communis,
Vesal.

k Hoc alterū
Galenī vide-
tur, de offib. 3.
at Vesal. Plat.
3 sic vero Fal-
lopius (quem
Laurēt. sequi-
tur) Vesalius
tertium addit
in utroq; late-
re positum in
oculi orbitā, q
pars coli seu
ethmoidis est,
quare his de-
ptis, decē tan-
tumerant de-
scripta ossa ab
ipso, alij sunt,
q ut numerū
augeāt, ac 13.
numerēt, spō-
giofa duo ad-
dunt, quorum

rijs è terrā effossis raro occurrit: cum enim tenue sit,
& humido loco positū, facile putrescit: in coctis vero
caluariis absque negotio seruatur. Iungitur autem
tribus ossibus superius cum osse frontis, futurā com-
muni tertiā i [iuxta v.] posterius cum maxillæ tertio,
i futurā externā secundā [ab V. adr.] anterius & infe-
rius cum maxillæ quarto: eadem futurā [à C. versus u.]
nonnunquam & nasi ossibus fungosis committitur,
hic locus est, ubi abscessus fiunt, quos Græci ἀσθη-
μας nominant; qui si negligantur, ad os penetrant, &
in fistulas lacrymales desinunt. Foramina habet, su-
perne quidem exigua communia: at vnum insigne,
quod illi cum quarto commune est [tabul. 3. fig. 8. C.]
quod ex oculi angulo interno rectā deorsum in na-
rium cavitatem fertur, vt per id, non tam neruorum
tertij paris minoris dicti radice portuunculam de-
mittat, quam vt pituitam transmittat.

Tertium, k quod quartam partem ossis spongio-
dis esse diximus [tab. 3. fig. 8. Θ.] plerique tamen ter-
tium maxillæ faciunt, in oculi interno latere reposi-
tum est, & interius narium ossibus fungosis conti-
nuum: hoc secundo latius existit, paulo minus toto
quadrangulum, oblongum tamen, tenue & instar
squammę pellucidum, leue foris, intus ob squammas
adherentes asperum, & si effringatur, intus sinus am-
pli, aere oppleti conspiciuntur: committitur quatu-
or ossibus, superius quidem frontis ossi futurā com-
muni tertiā interuallo longiore [tabul. 3. fig. 8. à T. ver-
sus V.] posterius sphænoidi eadem futurā [iuxta E.]
sed ductu breuiore: anterius cum secundo maxillæ
osse futura secunda [ab V. ad c.] inferius cum quarto
osse maxillæ futurā tertiā [à c. ad b.]

Quar-

mentio facta est in cribro: verum decipiuntur, cum illa sint communis ossis partes,
non autem propria malorum ossa, hac Fall. in Obser. fungosorum ossium, & per cō-
sequens cribrosi ossis partem Fallopp. facit. cum simul continuentur, verum cum &
frontis ossi continuentur ossa fungosa, vix assentire ausim, Plat.

Quartum¹ [tab. 3. fig. 8. A A.] narium & oris partem anteriorem, cui dentes superiores omnes infixi sunt, & palati & narium foraminum latera, & inferiorem eadem maximâ ex parte constituit (& à Galeno os malæ^m & proprie maxilla superior dici meretur) inno & oculi cameræ inferiorem partem versus narium efformat: quare cæteris longe maius est, & varijs utur is circumscribitur, siquidem septendecim ossibus (si dentes addas) conterminum sit. Iungitur superius iuxta nasum ossi frontis, sed breui portione naturâ communi tertia [tabula 3. figura 8. XX.] inferius cum sphænoide futurâ communi secundâ [tabul. 3. figura 8. à D. ad H. figura 9. à d. ad e.] vbi etiam superior os sphænoides & maxilla in oculorum cavitate dehiscunt: committitur etiam cum maxillæ superioris ossibus, vt primo, futurâ primâ obliquâ [tabula 2. figura 6. a. b. Q.] in malâ, oculi cavitate & temporum cauis: antè cum secundo in oculi angulo interno futurâ secundâ [tabula 3. figur. 8. à C. versus X.] posterius cum tertio futurâ tertiâ [b. ad e.] cum ossis quinto in nasi summitate exterius futurâ quarta [e. .] cum sexto in palato, futura quinta [tab. 3. fig. 9. t. u.] tandem cum suo coniuge futurâ septimâ vel potius lineâ, partim in maxillæ sede anteriore [tab. 3. fig. h.] vbi labri superioris sulculus consistit, partim in palato. [tab. 3. fig. 9. x. y.] Huic & n dentes superiores per gomphosin infiguntur, & cum nasi cartilaginis vnitur.

Foraminibus & antris donatur: foraminibus com-

¹ Quartum os insigni magnitudine, cuius os mali dentiumque omnium exceptis incisoriis alveoli partes sunt, Galenus de ossibus 3. quare sequen. cap. (quod tamen non separandum erat à priori capite) in maxilla superior. extremo ait, os vnum, in quo dentium incisiorum radices & alveoli continentur, quod plerumque simplex esse videtur, quod ossa, ex quibus structum est, exactissime committantur. Et addit, interdum futuram in cadaueribus admodum exsic-

atis, manifeste apparere, quæ per totum palatum porrigatur: at Vesal. hominem æstui asserit, in canibus, simiis porcisque duas futuras admodum perspicuas acurrere. Verum Galenus non omnibus locis, incisoriis dentibus os peruatum tribuit. 4. os Vesal. & Plat. 3. Columb. & Laurent.

n 11. vs. part. 19. n Galenus incisores excipit, saturam inter caninum & incisores dentes ponens, quæ in hominibus nunquam reperta, sed simiis & canibus, Columb.

communibus & proprijs: commune paruum habet, iuxta oculi angulum internum; propria vero tria. Duo in oculi sede inferiore, vtrinque vnum, quod squammâ ossêâ tantum integitur, & ex oculi sede inferiore, versus anteriora ducitur, quod neruorum tertij paris minoris radicis vulgo dicti sobolem ex oculi sede in faciem transmittit [*tabul. 3. figur. 8. ad B.*] Tertium foramen in palato est, iuxta dentium incisiorum partem posteriorem, vbi vtrumque os maxillæ conuenit [*tab. 3. fig. 9. 7.*] quod ex palato in narium amplitudinem fertur & venulam ac arteriolam

o Cum quib.

Et tunica palati portionculam ad eâ, qua nares succingit, transire, ut inuicem consentiant, vult Vesal. at eum posteriore sede amplo spatio inuicem continuentur, qd in hac angustia opus sit, nō video, Plat.

p Supior maxilla omnino medulla expers, quod prorsus nō moueatur 11. v. par.

18. Galeno non assentiendum, qui superiorem maxillam medulla expertam duris ossibus, nec leuitate indigentibus efformatam dicit: quod hac non, ut inferior moueatur, cum hac illâ multo sit validior, & osse constet iniurijs propellendu longè promptior, Vesal. q Vesal. Plat. Laurent. cui (& Plat.) ad totius genæ leuitatem constructi: fortasse dicit Columb. 1 Producentia voci miris modis opportuna, Vesal. 1 Sic & Fallop 1 Cavitatis insignis medulla plena, qua & ipsa ossa dentes continentia & superiores omnes dentes aluntur, Archang. u Nasi ossa duo, Galen. de ossib. 4. 3. Vesal. Columb. Plat. Laurent.

ad nasum transmittit;° ad cuius latera sutura in pueris apparet. p Antra & cauitates duplices habet. Antrum vtrinque vnum ad narium cavitatis latera inferiora sub oculorum sedibus situm, insigniter cauum & ita amplum aliquando, vt in illo articulus pollicis manus vltimus delitescere possit: quare imaginibus cauis, ex cerâ fufis q pulcrè assimilaueris; sed ab osse veluti ampullosa & attenuata obtectum [*tabul. 8. fig. 8. sub B. A.*] quod partim leuitatis ossium causa, quæ hic oculorum situs gratia crassa esse debuere, factum est, partim producendæ voci 1 opportunum est. At in 1 pueris non reperitur, sed illis crescentibus primum fit, ac tenuissimâ pelliculâ inuestitur, sæpe etiam muco repleta 1 reperitur. Alueoli seu præsepia huius ossis margini inferiori insculpuntur, quo ijs dentes infigantur [*tab. 3. fig. 8. sub h.*]

u Quintum [*tab. 3. fig. 8. E E.*] quod cum suo pari nasi

nasi partem eminentiorem osseam constituit, paruum est & pene^x quadrangulare, oblongum tamen (in homine lōge breuius, quam in canibus & simijs) durum, solidum, latum & tenue, foraminibus communibus exiguis donatum; committitur autem superius cum osse frontis futurâ communi tertia [tab. 3. fig. 8. r. z.] sic in lateribus cum maxillâ primo vtrinque & extrinsecus cum quarto, futurâ propriâ tertia [fig. 8. ab e. versus r.] & in medio cum coniuge futura sexta [fig. 8. à z. ad f.] harmoniâ non admodum dissimili, quâ à futura frontis secundum ossium nasi longitudinem rectâ fertur; inferius vero futuram non habet, sed asperum & inæquale existit, quo cartilagine rectius iungantur. At parte interna, vbi hæc duo ossicula iunguntur, adhærent septo osseo & subiecto, quod ossi spongioso cohæret.

Sextum [tab. 3. fig. 9. π] ad palati extremum, vbi nares in fauces defluunt, reponitur, & cum suo pari palati & nariû amplitudinis posteriorem partem cōstituit, latum est, tenue, solidum, semicirculum in fine (vbi asperum est) referens [fig. 9. supra q.] committitur^b posterius cum osse sphænoide ad ipsius processus alas referentes, inferius & exterius futuræ communis secundæ portione [q.] dein interius narium septo futurâ internâ secundâ [tab. 3. fig. 2. 8. g.] & maxillæ quarto futurâ quintâ transversâ [fig. 9. t.] & cum socio in posteriore palati parte futurâ sextâ per palati longitudinem ductâ [tab. 3. fig. 9. à t. ad x.] Foramina duo habet vtrinque, alterum amplum, quod sursum in posteriora ad sphænoidis ossis foramen commune nonum fertur [tab. 3. fig. 9. paulo infra μ.] alterum exiguum, quod aliquando in prædictum, interdum in futuram communem secundam terminatur, [supra q. vbi r.]^c

^x Quadrangulo potius, & triangulo simile, Vesal.

^y Ossis cribri speciem referentis pars est, Columb.

^a Duo alia exiguâ ossa max. sup. quâ nariû foramina ad

palatum tendunt, Gal. de ossib. 3. 6. Ves. Plat. 4. Col. & Laur.

^b Separantur ab osse maximo futurâ transversâ, à sphænoide eâ lineâ, qua inter extremos dentes & apophysis pterygoeiae fertur, à se invicem palati futurâ mediâ, Laurent.

^c Undecimum addit os aratro simile, Colum. Fallo. & Lauren. quod supra medium intimumque palatû, cuius formam aratri vomer imitatur, narium imam partem

septi more discludens: At Vesal. scribit, addi posse 12. & 13. duo scilicet ossa spongiosa in interno naso sita, satis inaequalia, ubi mucus retinetur: Columb. prater tenuias fungosa, & quodammodo membranæ, cartilagineæque officula in narum cavitatis summo occurrentia, duodecim maxilla ossa sunt, Vesal.

DE INFERIORE MAXILLA.

CAPUT LXXV.

Galenus 11. vs. part. 18. & 20. libro de ossibus 6. de hac egit.

a Haliabbatis
interpret, fau-
cem appellat.

b Mouet ani-
malia omnia
maxillam in-

feriorem (xg-
δωτεν γένον,
at 3. hist. 7. &

3. part. 11. xg-
δωλεν σία
γών) crocodilo
fluuiatili ex-

cepto, is enim
superiorem so-
lus mouet, 1.

hist. 11. 3. hist.
7.

c 4. adm. ana.
3:

d Vesal. Col.

Plat. Archæ.

e Colum. fur-

cam quādam

refert, Plat.

INferior^a maxilla [tabul. 28. fig. 1. & 2.] quæ oris am-
plitudinis inferiorem partem, cui dentes infigun-
tur, efficit, & caluariæ articulatur, in homine^b mo-
bilis est, quò cibi masticari possint: nam cum dentes
& cibos secare & conterere debuerint, superiores ab
inferioribus recedere debuere: & tanquam forcipes
rursus accedere; ideo hæc maxilla à superiore mobi-
lis facta est; quæ cum in descensu nullo robore indi-
geat, at in ascensu maximo ob ciborum fractionem
propterea musculis imbecillibus deprimitur, robu-
bustissimis vero attollitur, vt supra monuimus. In
crocodilo fluuiatili vnico, immobilis existit; Et ho-
mini inter omnia animalia pro totius corporis mo-
le breuissima est, ac pene orbicularis ob faciei rotun-
ditatem, quæ elegantior & venustior est; cæteris e-
nim animantibus (simiâ exceptâ, cum non multum
ab humanâ facie recedat, & manibus quodammodo
vtatur) maxillæ oblongæ sunt ac prominentes, cum
ijs loco manuum vtantur, & ad cibum^d ab humo ca-
piendum inclinari debuerint.

Figura^e arcum refert, sinumque amplum relin-
quit, quo leuior sit, & musculis eam mouentibus mi-
nus incommodet. Anterius in summo mento lata
est & crassa, in reliquis animantibus angustata pro-
minet: posterius diducta, partim, vt ciborum trans-
itus nō impediatur; partim, quo commodius vtrin-
que

que caluariae ad motum articulari possit.

Processus enim vtrunque duos habet sede posteriore (aliquibus ^e cornua dicuntur) qui sursum feruntur: alterum antrorsum diductum [fig. 1. & 2. C.] latum, tenuem, in mucronem desinentem ^{κρόνον} dictum, qui muscoli temporalis tendinem excipit, à cuius tendine totus ambitur, & in illum validissime implantatur; hinc forte Hippocrates maxillae inferioris luxationem plerunque lethalem dixit, propter muscoli temporalis distensionem & alterationem. Alter vero & posterior processus ^{ποσὶ τὸ ὤσθης} nominatur, & tuberculum refert; quod retrorsum fertur; qui capitulum habet prominens transversim oblongum [fig. 1. & 2. A.] sub quo ceruix insignis [B.] est: hoc capitulo vtrunque sinui sibi respondentem, & in osse temporum insculpto, inter iugalis & ossis radicem & foramen auditorium inarticulatur, quo maxilla ad caluariam sursum & deorsum, & non nihil ad latera moueatur; huic capitulo, quemadmodum & sinui cartilago ^h crustae modo obducitur: praeter hanc omnibus articulis communem, inter sinum & capitulum cartilago alia reponitur, laevis, tenuis & mollis, quae non modo ligamenti munere fungitur, ut processum in suo sinu contineat, sed etiam articulationis motum lubricum magis reddit; tum etiam, cum praedictis cartilaginibus impedit, quo minus in validis assiduisque maxillae motibus ex mutuo affrictu ossa vel rumpantur, vel saltem atterantur. Ligamentum quoque commune membraneum, articulum maxillae inferioris cum ossibus temporum obuoluit.

M m m 2

At

mammillari distet, *Columb. lib. 1. cap. 3. & 9.* h. *Vesal. Columb.* Sic Archang. non cartilaginosa aut ferrata compage formatum, sed articulis duntaxat, quae motum liberum & expeditum cardinis modo maxilla inferiori permittant, ut haec una sit mobilis ex omnibus capituli ossibus. ⁱ Et *Plater.* quare *Galen. 1. v. part. 20.* ait, ac habet articulatio fortia quadam ligamenta, ac praeterea cartilaginem multam in orbem sibi circumfusam.

^e De ossib. 6.
^f 11. v. part. 20.
^g Posterior articulus, qui est ad mammillares productiones
^h 11. v. part. 20.
sub exortu, quem mammillarem vocat, alligatur, ibique in parvulum sinum rotundo quodam, quasi tuberculo sese inserit, lib. de ossibus 6. hunc sinum *Gal. sub mammillari processu posuit,* cum tamen à

At posterius vtrinque, vbi processus educit [fig. 1. & 2. EE.] prominentijs aliquot, veluti monticulis paruis exasperatur, potissimum iuxta posteriorem & latissimam regionem inferiorem. Anterius vero & interius in menti medio [fig. 2. H.] tuberculo exasperatur, idque propter musculorum propriorum, quorum ope deorsum trahitur, validiorem insertionem (cum asperis inæqualibus locis promptius aliquid adhæreat, quam planis) & quorundam linguarum musculorum commodiorem exortum: Sic etiam exterius ad summi menti regionem [fig. 1. sub G.] quo labri inferioris muscoli commodius illinc pronascentur.

Sinus etiam superficiarios ad processuum latera obtinet, ita tamen, vt intus magis, quam foris sinuetur, extrinsecus quidem vtrinque vnum & amplum [fig. 1. inter B. & C.] interius geminum, tubere quodam distinctum: [fig. 2. iuxta D. B.] horum anterior ad radices dētiū, forte gingiuis cedit: Posterior & amplior musculo in ore latitante locum præbet, quo minus suâ crassitie ac mole faucium angustiam infarciat.

k Quamuis in pueris ex duobus ossibus per unionem commissis efformentur, non tamen simpliciter duplici osse maxillam constare recte dicemus, nisi Ex ossibus duobus composita est, siquidem in infantibus ex duabus ^k partibus osseus, cartilagine copiosa in medio mento coniunctis constet, ita vt in aliquot, qui septennēs sunt, etiam vestigia quædam appareant, at in adultis cartilagine in ossis naturam mutatâ adeo stricte agglutinantur vt lineæ nullum vestigium appareat: quare nec coctione, nec putredine, aut vi vllâ, vt duo esse videantur, in adultis separari etiam occipitis os, vertebrae & ossa, quæ sacri ossis lateribus coarctantur pluribus ossibus effingi dicamus: cum hac in pueris ex pluribus ossibus extruantur. Vesalius. Respondet Fallopius, si dicatur, non decere de imperfectis partibus dogmata assumere, sed de perfectis: tum omnes Anatomicos errasse, qui de appendicibus ita diffuse locuti sunt, cum illa in imperfectis tantum ossibus, non autem in adultis rependantur.

parari potest. idcirco vnum^l os esse, plerique volunt. At linea, quæ in puerorum maxillâ conspicitur, futuræ rationem obtinet, quo ex eâ ligamenta producuntur, quæ musculos ibi existentes ingrediuntur. Canum vero, boum, asinorum & plurimorum ad huc animalium, etiam citra coctionem paruo conatu interdum diuelluntur.

Est autem os durissimum, & magnâ ex parte solidum, quo validior sit, non quia sola mobilis, sed quia varios & fortissimos motus in mordendo, mandendoque sustinere debuit: intus tamen excavatum, ne suo pondere musculis mouentibus incommodo sit. Cavitates etiam habet, quo^m medullam nutrimentum contineant; quæ non, vt in quadrupedibus in maxillæ parte posteriore exsculptæ sunt, sed parte magis anteriore versus menti regionem & maxillæ atera, sub dentium alueolis; quare circa hæc loca rassa est, quemadmodum circa posteriora tenuior.

Alueolorum enim gratia inferiorem maxillam rassiorem euasisse hinc constat, quod in vetulis, & lis, quibus dentes eruti sunt, & in quibus dentium alueoli succreuerunt, maxilla ab imo sursum multo enuior & angustior efficitur. In circuitu quoque alueolos, quibus dentes infiguntur, habet.

Foramina vtrinqueⁿ duo obtinet, quæ canalis nodo per maxillam feruntur: nam si maxillæ exscicata foramini interno setam indideris, ab hoc ad externum foramen facile protrudes, & si maxillam frangeris, iter continuum ab vno foramine in alterum analis modo calatum obseruabis. Alterum interius & posterius ad finem internum, non longe à processibus (vtrinque vnum) quod maius est altero, & inæquale seu asperum squammæ modo incipiens [figura F.] per quod neruorum tertij paris portio ad den-

^l Gal. ex duobus ossibus, 4. admin. anat. 11. v. p. 18. vnicam habet diuisionem & eam non plane perspicuam in extremo mento: Celsus, Vesal. Colum. at Arch. duobus lineâ cõspiciuâ discretis: Hip. & Gal. duob. constat ossib. ait Lauren. in paruulis in medio menti coalitis diuisa, Plat. in Maxilla inferior medullam habet, cuius substantia superiore expers est 11. v. p. part. 18. intus caua & medullosa ad dentium nutritionem, accretionem & nouam generationem, Lauren. Vesal. Col. Plat. Laur.

tium radices dispersa, vna cum venulâ & arteriâ, quas dentibus & maxillâ, furculos intromittit. Alterum paruum & rotundum exterius ad latera menti insculptum est [fig. 1, ad G, vtrique,] per quod neruuli dicti ingressi sobolem rursus ex maxillâ extrorsum in humilius labrum emittit, & interiore longe minus est.

DE ALVEOLIS & DENTIVM.

CAPVT LXXVI.

Vide II. vs. part. 8. lib. de ossib. 5.

IN maxillâ vtriusque circuitu & margine (quam regionem Galenus ^b φατίαν vocauit) cavitates seu sinus occurrunt, quos ^b βόθρια Galenus, at Ruffus ^c ὀλμίσκοις & φατίαι vocari scribit: Latinis ab imagine, quam cum brutorum præsepibus habent, præsepiola, locelli, & à fouearum specie, alueoli, ^c fossule, mortariola. Sûnt autem alueoli satis profunde insculpti, quo ijs dentes per gomphosin, ne prompte vacillent, instar clauorum infiguntur; quare radices alueolis ad amussim respondent; nam si latiores essent, harmonia ^f laxior euaderet: si angustiores, tum dentium radices ad imum non peruaderent; at hoc modo se habentes, validissime continent. Horum certus numerus vix assignari potest, cum pro radicum ratione, nunc simplices, nunc duplices, nunc triplices existant.

Et licet offei sint, cerea tamen propemodum videntur, cum nullam stabilem formam aut numerum habeant: cum ex his quidam renascantur, quidam pereant & obliterentur: dente enim epulso, ni-

si no-

a De his Galenus in epitomate Anatamico ex Marcano conscripto libro secundo abunde tractasse, certo scio, Eustach.

b Galenus dicit, dentes contineri in ὀστέων φατίων βόθροις de ossibus: at βόθριον Hippocrati. vlcus & cauum cornea tunica.

c Apud Ruffum etiam φατίαι legitur: apud Pollucem & φατίαι & φατίαι.

e Frena sunt dentium alueoli, Aretaeo libro primo,

capite 9. de causis & sign. acut. morb. locelli dentes complectentes, Galen. 5. compos. medic. secundum loca 8. cauea, Galen. de anat. viutorum.

f II. vsu part. 8.

si nouus succedat, alueolus ita constringitur, vt ipsius vestigium pereat: imo si dens cadat, & ipsi nouus subrogetur, alueolo priori oblitterato, nouum sibi excauat.

Hinc colligit Fallopius, viuificam vim formatricem in dentibus ad extremum senium remanere, quâ crescant, & formam capiant. Sic in malis & maxilla, cum circa septuagesimum annum, aliquando erumpentibus genuinis dentibus alueoli noui formentur, & in vltimo senio cadentibus occæcentur, maxillâ eâ parte adeo comprimitur, vt os vndique cohæreat, constipetur, & tandem vniatur: nam alueoli non modo ossea substantia implentur, & obcæcantur, sed vtraque maxillarum squammâ inuicem occurrente, extremæ partes coniunguntur, acuta acies efficitur: Et hæc pars propter duritiem & figuram, dum cibus manditur, in senibus dentium munere recte fungitur.

DE PARTIBVS IN ORE

contentis.

IN ore partes plures, vt eo aperto patet, continentur, vtpote dentes cū suis gingiuis, palatum, vuula, tonsillæ, lingua, os hyoides, larynx, earumq; partium muscoli, & œsophagi principium.

DE DENTIBVS, DE EORVM NO-
mine, definitione, figura, magnitudine,
numero, situ, & articula-
tione.

CAPVT LXXVII.

Consule Hippocr. lib. de carnibus, & de Dentitione: Aristote-
lem 2. hist. 1. 3. 5. 3. hist. 7. 9. 3. par. 1. de eorum generat. &
augmen-

augmentatione 2. gen. an. 4. & 5. eiusdem 8. Galen. lib. de ossib. 5. 11. vs. part. 8. & 9. de dentium vtilitate, numero, & varietate in animalibus, 5. compos. medic. secundum loca, 8. & 9. libr. de anat. vii. & in introduct. 12.

a Dicitur etiā dens de secunda ceruicis vertebrā & eius apophysi ab Hippoc. & Galen. 6. epid. com. 7. 4. loc. aff. 3. 4. adm. an. 8.

b Dicuntur etiam nonnulli Crāteres, Ruf. lib. 1. c. 8. c Negant aliqui ossa esse. 1. quia ossa insensilia sunt, dentes sentiāt: verum sensus de natura ossis non est. 2. ossa certos au-

ctionis terminos habent, nec unquam renascuntur, contra fit in dentibus. Respon. accrescere, quia attritu comminuuntur. 3. Reliquis ossibus duriores sunt. Respon. magis & minus speciem non immutare, alias os ethmoides non esset os. 4. Ossa aeri exposita nigrescunt, non autem dentes. Respon. dentes aeri externo assuetos, & periostio denudatos esse, & a consuetis secundum Philos. non fit passio. 5. Hippoc. dentes ab ossibus secludit 5. aph. 18 frigida inimica ossibus, dentibus, nervis, &c. Respon. diuerso modo hac a frigido affici, ossa patiendi tantum, dentes patiendi & sentiendi simul. 6. Lapidem sarcophagum intra 40. dies totum corpus exceptis dentibus absumere. Respon. forte, quia dentes reliquis ossibus duriores sunt: hac etiam Laur. habet.

d De ossib. 5. ad commune genus ossium refert, & eiusdem natura dicit: Sic Aristoteli 2. gen. an. 4. eandem quam ossa habent naturam. e Partes esse aliqui negant, quamuis partis definitio competat. 1. Partes ex semine procreantur, quae semel abscissae non regenerantur; at dentes exempti regenerantur. 2. Partes incrementi definitum

Dentes^a Græcis ὀδόντες, ^b quasi ἔδοντες ab ἔδω, comedo, & latinis dentes, quasi edentes dicti. Ossa sunt omnium durissima, intus caua, venulis, arteriolis, nervisque prædita, ipsarum maxillarum alveolis per gomphosin articulata, membranis & carne ceu vinculis alligata, & ad cibos comminuendos primariò creata.

Ossa esse^c Hippocrates, Aristot. & Gale. censuere Gal. enim enumeratione partium similarium^d probat, siquidem ad similarium^e partium nullam, quam ad ossa referri possint: quare in communi ossium genere secundum materiæ qualitates dentes collocauit: quod etiam eorundem durities, soliditas, læuor, candorque comprobant. Quare sui generis esse differentiae, quibus à cæteris ossibus euariant, ostendūt. Nam soli inter ossa exquisitè sentiunt, cum soli inter ossa nervos intra eorum cauitatem admittant: soli omnium longiore tempore vitæ augentur, quo proprium,

prium munus^f sine detrimento obire possint: nam cum in cibis mandendis atterantur, tantum augescunt & quantum atteruntur, alias prorsus deficerent: reliquis ossibus non sentientibus, nisi fortè obscurè: nec semper crescentibus, sed ad statum ubi peruenerunt, consistantibus. cum in munijs suis obeundis non imminuantur. Differunt etiam, quod nudi sint, nulloque periosio vestiti, quia attererentur, dolorque causaretur. Quare Aristoteles^h sæpè dentes inter ossa non numerat, sed nunc osseos vocat, nunc ossium naturam eos æmulari scribit. Et sanè duritie ac densitate seu soliditate alia ossa superant, imò lapidibus vix cedunt, & circa extremitates alij lapidis molaris instar lapidei, alij sicuti cultrorum acies chalybeati. Durissimi videntur esse debere, ne prius conterantur quam cibos comminuant, neque mutuo rerum duriorum mandendarum & frangendarum occursum frangantur, cum nec adipe, nec cartilagine, ut reliqui articuli ad attritionem præpediendam, superlinantur: quare ossa frangunt, soli aciei ferri resistunt. igne ac flammâ haud facillè cum reliquo corpore cremantur.

M m m 5 Super-

iunt, quod apparet in dentibus qui exemptis oppositi sunt: sic & Arist. tota vita rescere 2. gen. an. 4. asserit: addens, si decies millies annis vita seruaretur, & præparandis primos oriri oporteret & sapius renasci: sic Archang. dentes semper augentur & crescunt. g 5. comp. secundum loca 8. h 3. hist. an. 9. naturam ossium amuantur: sic 3. hist. 7. in maxillis sunt dentes genus ossium & solum inter ossa quod impossibile sit scilpi (vel ut Gaza vertit solam ferri aciem respuit.) i Lapidea & iura substantia Galen. 5. comp. secundum loca 8. ossa duriores, Celsi lib. 8. cap. 1. Cur duriores effecerit ceteris ossibus: Aristotelici rationem referunt in causam præparantem materiam, ex qua tum dentes tum ossa procreantur: nam cetera ossa ex semine, materia à vasis spermaticis in testibus præparata: at dentes ex alimento & materia à maxillis præparata, qua durissima sunt. Hippoc. de carnibus rationem refert in qualitatem materia ex qua dentes progignuntur: dum scribit, ex ossibus capitis & maxillarum fit incrementum glutinosi, & quod ex pingui inest in glutinoso delapsus in alucolos à calido exsiccatus exurit, & fiunt dentes reliquis ossibus duriores, quia nihil frigidi inest. l ii. vs. part. 8. m Ossia non sunt, deo omnia ossa confringunt, Galen. de nat. & ord. corp. n Soli igni, ac flammis in domiti

nitum tempus habet: at dentes cum atate grandescunt.

Resp. Archangelus distinctione Aristotelica 2. gen.

an. 4. partes alias in prima corporis constitutione, a-

lias post primam constitutionem, ut dentes gigni de illis ar-

gumenta intelligenda esse, non de his.

f Gal. 5. comp. secundum loca 8. dentes ex

nutrimeto ferre per omnem animantis a-

tatem incrementum acci-

Arise. tota vita

præparandis primos oriri oporteret & sapius renasci: sic Archang. dentes semper augentur & crescunt.

g 5. comp. secundum loca 8. h 3. hist. an. 9. naturam ossium amuantur: sic 3. hist. 7. in maxillis sunt dentes genus ossium & solum inter ossa quod impossibile sit scilpi (vel ut Gaza vertit solam ferri aciem respuit.) i Lapidea & iura substantia Galen. 5. comp. secundum loca 8. ossa duriores, Celsi lib. 8. cap. 1. Cur duriores effecerit ceteris ossibus: Aristotelici rationem referunt in causam præparantem materiam, ex qua tum dentes tum ossa procreantur: nam cetera ossa ex semine, materia à vasis spermaticis in testibus præparata: at dentes ex alimento & materia à maxillis præparata, qua durissima sunt. Hippoc. de carnibus rationem refert in qualitatem materia ex qua dentes progignuntur: dum scribit, ex ossibus capitis & maxillarum fit incrementum glutinosi, & quod ex pingui inest in glutinoso delapsus in alucolos à calido exsiccatus exurit, & fiunt dentes reliquis ossibus duriores, quia nihil frigidi inest. l ii. vs. part. 8. m Ossia non sunt, deo omnia ossa confringunt, Galen. de nat. & ord. corp. n Soli igni, ac flammis in domiti

Indomiti cum
reliquo corpo-
re non cremā-
tur, & cum
sarcophago
lapide totum
corpus intra

40. dies absu-
matur, soli de-
tes inuerti ma-
nent, Lauren.
soli igne inui-
cti, ijdem flā-
mis indomiti,
tate cauuntur
pituitatis, Eli.
lib. 7. cap. 16.

o 2. hist. a-
nim. 3.

p 2. hist. a-
nim 13.

q Vt oves, bo-
ues, equi & a-
lia multa,
Gal anat. vi-
uor.

r 2. hist. 1. 3.
part. 1. Gal. 1.

usu part. 2.

200 λιόδοντες
vocat.

s 2. hist. anim.

t 1. 1000000
vocat,

Gal. 11. vs.

par. 9. 6. adm.
an. 1.

u Vide 11. vs.

part. 9. u 11. vs. part. 8.

x Maribus dentes plures sunt, quàm fœminis (hoc fal-
sum scribit esse Vesal.) ut in genere hominum, ouium, suum, caprarum patet: qui-
bus plures viuaciores magnâ ex parte sunt: quibus pauciores & rariores: hac ma-
gnâ ex parte vite sunt breuioris. 2. hist. anim. 3. & in probl. 47. Gal. lib. de nat. &
ord. corp. viris 32. mulieribus. 30. tribuit.

Superficie externâ naturâ albi sunt, nitidi & poli-
ti: at senio, incuriâ ac morbo liuidi & obscuri sæpè
sunt: sic adhaerente etiam materiâ tophaceâ & cor-
rupti & scabri & asperi redduntur, exceptis equis, in
quibus per senectutem candidiores reddi Philoso-
phus^o scribit.

Formâ sunt anteriùs non nihil rotundi, posteriùs
impressi; vbi mutuò iunguntur, plani & in extremi-
tate nunc tenues, nunc acuti, nunc plani, sed inæ-
quales.

Differunt inter se figurâ, magnitudine & numero
figurâ, in homine sunt dissimiles pro ratione officio-
rum, quæ masticando absoluuntur: cùm in piscibus
p acutâ tantum figurâ præditi sint: in 9 ruminantib;
duplicis formæ, cùm incisores ac molares habeant;
Homini verò secundum tres 9 speciales ciborum di-
uisiones, tres species sunt, incisores, canini ac mola-
res: verùm exertos^r non habent, vt apri, sed intra os
conclusos; nec ferratos^r vt canes, cum his animali-
bus pro armis quoque dati sint.

Magnitudine humani dentes multis animalibus
cédunt; os enim angustum habet, & dentes exiguos.
nam pro oris^r magnitudine, dentium quoque ro-
bur, quod in figurâ, duritie ac mole consistit: imò
humani dentes inter se collati æquales non sunt, sed
alij magni,^u alij parui: molares enim cæteris maio-
res sunt,

Numerus^x omnibus hominibus vnus & similis
non est, cùm modò plures, modò pauciores repe-
riantur, licet maior numerus minori præferatur,
cùm il-

part. 9. u 11. vs. part. 8. x Maribus dentes plures sunt, quàm fœminis (hoc fal-
sum scribit esse Vesal.) ut in genere hominum, ouium, suum, caprarum patet: qui-
bus plures viuaciores magnâ ex parte sunt: quibus pauciores & rariores: hac ma-
gnâ ex parte vite sunt breuioris. 2. hist. anim. 3. & in probl. 47. Gal. lib. de nat. &
ord. corp. viris 32. mulieribus. 30. tribuit.

cum illos longæuos Hippocrates y, hos verò breuioris vitæ Aristoteles x pronuntiârit: quia dentiũ paucitas & raritas, aut materiæ spermaticæ inopiam, aut facultatis formatricis imbecillitatem notat: Dein, quia ij, qui dentes pauciores habent, cibos non rectè mandunt, nec ventriculo præparant: vnde chylus minùs rectè conficitur, & per consequens, nec sanguis, cum primæ coctionis errorem quæ in ventriculo, secundæ quæ in venis hepatis sit, corrigere non possit. Tam verò licet fuerint, qui vnum dentem z in superiori maxillâ habuerint, ita vt *μονάδοντες* appellari mereantur: alij item quibus ordo dentium duplex, alij, quibus a triplex fuit: Et plurimum tamen vnicus dentium ordo b (*φραγμός*, septum, quod linguam sciat, dictum) existit, & in vtraque maxillâ in adultis c trigintaduo sunt, in qualibet sedecim: in paucis triginta, & quidem in superiori sedecim, in inferiori quatuordecim: in nonnullis vigintiocto (qui numerus minimus est) quatuor vltimis deficientibus, qui non in omnibus, nec eodem tempore erumpunt, sæpè intra alueolos imperfecti latitant, interdum à naturâ non formantur.

Et sane molares in causâ sunt, cur inter auctores de dentium numero non conueniat, cum horum numerus frequenter mutetur (incisoriorũ verò & caninorum in homine rarissimè variat) interdum

y 2. *Epid. sect. 6. longæui plurimos dentes habent.*

z Vt Euripheus Cyrenæus, Euryptolemus Cyprius, nec non Pyrrhus Epirolarum rex: alij vice dentium continuo offe gnuntur sicuti Prussia regis Bithyniorum filius supernâ parte oris, quare *μονάδοντες* apud Festum de Valer. Max. lib. 1. c. 8. Plin. lib. 7. cap. 16. Soli-

nus: at Plutarchus hoc Pyrrho regi ascribit. a Mithridatis regis filio duplici, referente Valer. Max. lib. 1. cap. 8. Trimarchus Cyprius duplici, & Hercules triplici, ordine fuit secundum Cœlium Rhodig. lib. 4. c. 3. & Columb. in filio suo Phosbo triplicem ordinem notauit.

b Animantes aut vnum tantum ordinem habent, vt cornigera, quorum dentes in maxillâ inferiore ordinatim infixi, in superiore primorib. carent: aut duos, in superiore & inferiore, vt homo; aut tres: vipera, in aquis duplici serie in superiore maxilla inferiore & exteriore, at in inferiore simplici, qui inter geminos superi eritur: aut quatuor, vt pisces quidam; aut sex, vt Mantichora bellua apud Indos, vtrinque triplici ordine dentium, monente Arist. 2. hist. 1.

dum enim in vnoquoque latere quinque, interdum quatuor, nonnunquam quatuor à sinistris, quinque verò à dextris, vel contra: vel infrà quatuor & suprà quinque, quam varietatem postremi genuini dicti pariunt.

Tot verò dentes potius, quàm vnum fieri expediebat, vt varijs officijs in cibis incidendis, frangendis & comminuendis satisfacere possint; dein, ne vno aut dolente aut vi vel vitio pereunte, affectio alijs communis fiat.

Siti sunt humani dentes in vtraque oris parte, in maxillæ vtriusque ^d extremo ambitu sicut piscibus ^e in palato & lingua, cancris etiam ^f in ventriculo: sic qui ruminant dentium ^g ordinem inferiorem habent, scilicet ad labrum pertinentem: at sic disponuntur, vt continui sint & ferè æquales, choreā ^h benè imitentur. & instar clauiculi ^h lyræ extra gingiuas nudi ^k promineant, & inferiores superioribus, dextri sinistris respondeant. Recti sunt, & in neutram partem inclinant & parte anteriore ^l Incisores, proximi Canini, hos Molares sequuntur, qui interiores sunt ita tamen vt decenti & vsui consentaneo interuallo ^m disiungantur, quod ^{appell} Græci nominant: sic enim connectuntur vt proximi sint & sese tangant, ne id, quod ab eis frangitur & manditur, in spatijs medijs detineatur & putrescat. Radicibus suis maxillarum foramina seu alucolos, (de quibus iam dictū) subeunt, quibus ita ad amussim respondent, vt clauo ligno infixi videantur, vt ne tantillum quidem moueri possent.

d Vno ordine in vtraq; maxillâ humani dentes 11. vs. par. 8. in Hipp. de art. com. 2. e Arist. 2. hist. 13. & 3. part. 1. in hominis palato quandoq; generari Alex. Benedictus testatur, & Eustachius in muliere Romanâ dentem enatū vidit, quem scalpello incidi & igne exuri curauit: meminist etiam monialis, cui dens in medio

palato, anno 18. creuit. f Crustatorum & locustaceorū & cancrorum stomachum excipit venter, in quo locustæ & cancrorum nonnulli dentes alios habent, quoniam superiores illi secare non satis queunt 4. part. anim. 5. g Vide 2. hist. anim. 1. Gal. in Hipp. de artic. 6. 1. & 6. ad anat. 3. Galen. in Hipp. de artic. 16. 1. 6. adm. amat. 3. h Gal. 11. vs. part. 8. laudanda natura, quæ dentium choream tam bellè exornauit. i Democr. in Epist. ad Hippocr. k 16. vs. part. 2. l 11. vs. part. 2. m continui sunt equo & boui 2. hist. 1.

ueri possint. Singulis enim dentibus tenues maxillarum processus¹ circūdati eos vndiq; validissimè cōstringunt ac continent, ne facilè excidant vel concutiantur. Nervus singulis adiunctus, vt Galenusⁿ asserit, ad stabilitatem quoque facit: neruo enim à nimia humiditate laxato mobiles & prominentiores sunt (hac ratione, per synneurosin iunctos esse dici posset,) Vinculis præterea fortissimis radicibus adiacentibus præsepiolis arctissimè colligantur. Sic & multifida oris^o compago à Gingiuis facta dentesⁿ s. compo. quamprimum^k alueolis emergunt, vndique com- medic. s. l. 3. prehendit: quare Gingiux ad dentium firmitatem quoque faciunt, quæ obⁿ exactam compagis ipso- o r. hist. anim. rum conglutinationem contingit. Hæc commissura, quemadmodum & maxillarum colligatio à Rufo habena dicitur, & quemadmodum cutis vnguium p lib. i. cap. 8. radices q complectitur & adherescit, ita gingiue den- q Galen. com. bus iunctæ sunt: hac ratione per eam symphyseos i. in Timæum. peciem, quæ syssarcosis¹ dicitur, dentes iunctos esse, r Aliqui existi- ci posset, nisi vinculis fortissimis colligarentur. stimant à solis gingiuis dentium & al- Quare vniuntur neruorum, membranarum & car- ueo'orum con- nis interiectu: nervus cavitati insertus, dentes fir- iunctione fieri nati: membranarum fibræ dentium radicibus hæ- & dentium ta- rentes, eos colligant; caro eos circumdat, quæ exesâ tum gratia ut vacillant, aut excidunt.

Caro hæc^f GINGIVAS constituit (Græci ἔλον^{hanc symphy-} vocant, δὲ τὴν εἰλεῖν, quod est, inuoluere) quæ dura seos speciem, itq; immobilis est, ceu vallum, cui dentes infixi sunt, quam syssarco- & eis adnascitur, quò dentes in alueolis firmentur, & sin vocat, in- troductam. quasi ligamentis fortibus alligentur, inque edentulis si. hist. ii. gin- givæ carne etiam cibaria conterunt: ad quam carnem etiam ner- constat: glan- dosâ dicit A- vi mittuntur.

Articu- uerr. i. coll. 10. carnes dentes

circumdantes g. vs. part. 16. additamenta carniū lib. de amat. vii. caruncula circa dentes. Rufo lib. i. cap. 8. r Vel quòd cicatricem seruent ex vulnere in ossentium accepto, quæ ἔλῃ dicitur, ex Meletio de nat. hum. Eustach. & Laurent.

u Galen. in
procem. de of-
fib. & cap. 3.
at 11. vs. part.
8. syntaxin
dentium har-
moniam vo-
cat: quemad-
modum 5. comp.
secundum lo-
ca 8. dentium
compagem. At
Aristoteli 2.
part. 9. gom-
phosis est, duo-
rum ossium
concauorum
cōiunctio, qua
medio quasi
cōiunguntur,
ut flecti extendiq; possint: at Galeno cum ossa natura vi, quasi cunei aut clauis in-
figuntur. x Procem. de offib. y Dentes tangunt ossa, cum cominuantur. 2. Gen.
anim. 4. z Gal. 5. comp. f. l. 8. a 5. comp. med. fil. 9:

Articulatio ex dictis facile colligitur, quæ^u gom-
phosis dicitur, quæ synarthroseos species est, non ta-
men^x exquisitè synarthrosis dici meretur; quare &
Galenus^x ambigere & propè ad symphyisin accedere
pronunciauit: siquidem dentes suis alueolis haud
prorsus adhærent y, quod percipitur, quando vel
eruuntur, vel spontè decidunt: nam quamprimum
alimenti inopia aridiores^z & macriores, alimentum-
que non sentientes & ob id tenuiores reddit, com-
pages latior fit; quare & dentes laxantur & vacillant:
quæ affectione^a senes laborant: alij quidem citius;
alij seriùs: aliquibus non modò propter ætatem seni-
lem exsiccati mouentur, sed etiam, quia neruis radi-
cibus subditus humore copioso irrigatur. Infigun-
tur autem suis radicibus: alij simplici, alij duplici, alij
triplici, alij etiam quadruplici mucrone.

DE DENTIVM SPECIEBV8 & quidem de Incisorijs & Caninis.

C A P. LXXVIII.

Arist. 2. hist. anim. 1. 3. part. 1. Gal. 11. vs. part. 8. lib. de ossibus
5. & alibi.

a Tres sunt
species dentiũ,
secundum tres
speciales diui-
siones ciboriũ,

Gal. de anat.
vniur.

b 11. vs. par. 8.

c Superni den-

tes anteriores Hipp. 4. epid. diuidentes & secantes, lib. de hominis struct. d Homi-
nibus acuti primores ut secant, 3. part. 1. primores dentes maximã ex parte
acutios habent animalia; interiores planos 2. hist. 1. at 5. gener. an. 8. inciso-
res vocat.

TRIPLICES^a in homine dentes sunt, pro ra-
tione triplicis officij, Incisorij, Canini & Mo-
lares.

Incisorij [tab. 28. fig. 3. D. 1. 2.] in anteriore^b maxillæ
parte siti: primi sunt, quare^{opóθεοι}; primores ab
Hippocrate^c & Aristotele^d dicti, non modò quod

ceteris

cæteris prius prodeant, sed etiam, quia primi nobis
 occurrunt: hi ad cultri similitudinem acie sunt tenui (quare ὀξεῖς, acuti) & lati^f quo morfu cibum oblatum cultri modo, cum in sibi oppositos & in eundem usum fabricatos impingunt, incidere possint; quare τομῆς ἔσθ' ἀπὸ τῆς τέμνειν, vel Celsus^h τομινεῖς, ab officio dicuntur, quemadmodum & δισχαστῆρες: nonnunquam res forcipis instar abscindunt, quando in morfu inferiores non ad superiorum acutiem sed latius ad ipsorum corpora impelluntur; & quia interridendum deteguntur, γελᾶσιν οἱ nuncupantur. Quatuor sunt, i horumque duo caninis proximi, lijs minores sunt, caninis etiam breviores [tab. 28. g. 3. ch. 2.] semel in quodam Theologiæ Doctore in maxillâ inferiore anteriores duos geminos observavimus; nam cum exteriores duo ferè absumpti essent, circa annum ætatis quadragesimum, duo alij intro prorupere; Horum pars extra gingivas à basi latera angustior, antè verò crassior est, & sensim tior & tenuior ad extremum euadit: præsertim in superioribus duobus, qui duales^k nominantur, & alæ,^k à formâ palatum dici possunt: superficie foris iquantum gibbâ, intus verò simâ. Altera verò pars maxillæ infixâ à lateribus compressa, acuto apice terminatur: singulas enim^l radices habent, quibus majori ex parte cæterorum radices magnitudine superant, aut æquant, & cum simplici sint radice, facilius accidunt, præsertim superiores. In harum extremitatibus in adultis vel nullum, vel obscurissimum foramen conspicitur:

Canini

que etiam plures, nullo sæpè ordine collocati, sed partim recti, partim foris exerpertim intro in oris capacitatem irrumpentes, & manducationem & pronunciationem per sæpe vitiant, ut frequentur eos vel euellere vel urere vel limâ tenuiinuere oporteat, Gorrhaus: sciuris gemini, canibus seni, arietibus octoni.

^k Sic & Plat. l. De offib. 5. & lib. de nat. & ord. curus corp.

e Et Eustachius: at Laurent. non ortu, sed occursum & sita primi. f Acuti & latiti, ideo cibos molles cultri modo incidunt, Aristot. 3. par. 1. 5. gen. an. 8. Gale. de offib. 5. 11. vs. part. 8. lineare habent acumen ad modum gladij, de anat. vinorum. g De offib. 5. 4. adm. anat. 4. introduct. 12. h Cels. lib. 8. cap. 1. i Aliqui pro his quatuor siue supernis, siue infernis, duos tantum habent, sed ferè tam latos, ut usum spatiumque quatuor dentium comprehendant: alijs verò p. 4. incisoriis, sex, octo,

TAB. XXVIII. *Maxillam inferiorem cum dentibus Fig. 1. & 2. dentes omnes Fig. 3. exhibet: Et Fig. 4. & 5. Ipsum os hyoides.*



FIG. I.



FIG. II.




FIG. III.




FIG. IV.




FIG. V.



*ni Quod caninū
dentib. quā
similimi sint,
Galen. de
off. s. exertis
canum denti-
bus similimi,
qui hos ha-
beat multos,
& hac ferē se-
de insignes,
Vesal. Col. si
de propria si-
militudine lo-
quamur, fal-
sum esse inspe-
ctio coarguit,
gravius autē
errant, qui
exertis denti-
bus similes af-
seuerant, quā
prioris, qui fe-
rocibus ani-
mantibus os
acutis dentib.
refertissimum
esse scribentes,
triangulari-
bus, ut conij-
cio, caninos
comparant,
Eustachius.
n Duo tantū
in homine, cū
leones, lupi ac
canes multos*

Canini succedunt [*tab. 28. fig. 3. ch. 3.*] *κυνός σοντες*
 Aristoteli & Galeno dicti ^m, non tam à figurâ, quā
 vsu: nam in canibus post incisores dentium acuto-
 rum duplex genus occurrit: alij exerti, alij triangu-
 lari formâ, at ab vtrisque hominum canini discre-
 pant. Duo ⁿ tantū sunt in qualibet maxillâ, quia
 homo animal mansuetum ^o est, & ciuile cuius robur
 & vires magis in sapientiâ quā corporis fortitudine
^o consistit; quare eius os minimē caninis dentibus
 vti ferocium animantium impleuit: quare ad dura
 frangenda ^o duo satis erant. Hi planos ^p ab acutis, si-
 ue maxillares ab incisoriis determinant, & inferius
^q ad gingiuas lati, crassi, superius acuti ^r, & supra re-
 liquorum dentium ordinē aliquantum prominen-
 tes: ab incisorijs in hoc differentes, quod mole cras-
 siore sint, & sine angustiore magis que obtuso, (ita,
 vt median ^p inter vtrosque formam habeant) quare
 & duriores, vt siquid propter duritiem ^q ab incisorijs
 scindi minū potuit, id frangere ipsi queant: siqui-
 dem vt incisores cibos potissimū molles secant, ita
 hi duos validissimē confringunt.

Radices, quemadmodum & incisores ^f singulas
 habent; altiū tamen infixas & robustiores & ex an-
 teriore parte minū, quā à posteriore pressas & an-
 gustas: quæ proceritate singulas alias cæterorū den-
 tium superant, ita tamen, vt superioribus longiores
 & acutiores sint, quā inferioribus. Hos oculares
 quoque vocant, non quod ita producantur, vt ocu-
 lorum ^t ferē ambitum attingant; cū vix alarum

nasi

vtrunque habeant, quod ipsorum utilitas latius pateat. *II. vs. part. 9. o II. vs.
 part. 9. vide & caput 2. & 18. p Arist. 2. hist. 3. & 3. part. i. de variis formis acu-
 tor. dentium vide Plin. lib. II. c. 37. q II. vs. part. 8. Arabes pineum nucleum for-
 mâ imitari existimarūt: & lib. anat. viūor. canini pineale habent acumen. r Etiā
 acutos subinde vocat Galenus, non secus ac incisorios, vt II. vs. par. 8. f De offib. s.
 t Inferiorem. q. oculi ambitum ac foramen, per quod tertij paris nervus ad faciei
 partem*

nasi oram inferiorem transcendant, sed quòd nerui *partem emis-*
oculos mouentis portuluncula ^u in hos feratur; qua- *titur, tangit,*
re eorum extractio ^x periculosa censetur. *Fallop. non*

tamen veluti
multi scribunt, producantur, ut oculorum ferè ambitum attingant, Eustach.

^u Sic & Laurent. non sine periculo vi euelluntur, Plat. x Æsculapius dentium
auulsiōnem primus inuenit, Cic. 3. de nat. Deorum, quam Galenus etiam veterum
inuentis multa adiciens, persecutus est.

DE DENTIBVS MOLARIBVS.

C A P. LXXIX.

MOLARES ^a dentes [tab. 28. fig. 3. ch. 4. s. 6. 7. 8. & ^b *a Maxillares*
^{Mc}] qui *μύλαι* ^b, *μυλῖται* & *μύλοι*, Græcis di- *& molares*
untur, quòd ijs cibus, veluti molis ^c, conteratur: in *Vesal. Col.*
oris parte interiore locantur & buccis occultantur: *Eustach. Ar-*
Vnde Germanis, Buccarum dentes nominantur. *chang. at te-*
Nam cum incisores & canini parte anteriore locari *rentes & mo-*
debuerint, quò cibum capiant, mox incidant, tum *lares, Varolo*
rangant, què cum molares comminuere debuerint, *Cic. 2. de nat.*
n interiore oris parte, quæ tecta est, sedè rectè obti- *Deor. molares*
uerunt, ne dum cibum comminuunt, & linguâ ad- *omnes genui-*
quante, huc & illuc impellunt, aliquid effluat. *nos vocat.*

Formâ & vsu molis ^c, quibus cereales fruges te- *b. 11. vs. par. 8.*
uantur & atteruntur, persimiles: sunt enim inæ- *Clauales ver-*
quales asperi ^b, duri, lati, & magni: asperi & inæqua- *tunt aliqui,*
es, quò cibus comminuendis apti sint; quod exem- *Φεσῆπες etiā*
plo molarum declarari potest: si enim molis asperi- *appellati, cum*
as desit, vel eam molendo deposuerint, malleis fer- *miscentes*
reis, incidi ^b & exasperari solent: verùm dentes tan- *pueriententi-*
tem attritione æquantur, vt in senibus videmus, in *bis ijs fari so-*
quibus etiam ob continuum vsum, cæteris facilius *leant, Lau-*
roduntur & franguntur. *rent.*

Quare horum pars extra gingiuam prominens
quadrata est; in tribus tamen posterioribus perfe-
rior, & licet eorum summæ partes valdè amplæ
sint, ita vt *παραπέζαι* mensæ, a Ruffo ^d dicantur, *d Lib. 1. cap. 8.*

c Sic & Eustachius.

non tamen læues sunt, sed quilibet ^e foueam habet vnam vel alteram in medio, sed loco haud certo: quare ipsorum partes extremæ eminent: duo quidem caninis **proximi**, interiore parte & extrinsecus elati sunt, licet primus, & præcipue inferior, apice interno quandoque careat: tertius in quatuor angulis extuberat: quartus & quintus plerumq; eminentias extrinsecus duas, intrinsecus verò vnam tantum habet. His sinubus & tuberibus mutuò conuenientibus, cibi commodius apprehenduntur, & ne effluant vel dilabantur, continentur. Duri^f quoque sunt, vt cibus conficiendis sufficiant: lati (quare $\pi\lambda\alpha\tau\epsilon\iota\varsigma$ Galij) propter magnitudinē & plani^h propter superficiem, vt cibosⁱ ab incisorijs incisos, à caninis effractos molere, ^k læuigareⁱ ac cōterere (quod propriē mandere est) queant: quando eos optimē contritos homini deglutire expedit; cibus namque hoc pacto comminutis oris calore^l accedente & humore immutatis coctionis initium rude in ore fit. Dicuntur etiam $\gamma\omicron\mu\phi\iota\omicron\iota$,^m non quidem ab insertione clauorum simili, hoc enimⁿ omnibus dentibus æquē conuenit, sed $\delta\pi\omicron\tau\eta\varsigma\ \gamma\omicron\mu\phi\iota\omicron\sigma\epsilon\omega\varsigma$,ⁿ hoc est ab asperâ molarum superficie, cuius figuram & vsum molarium dentium partes superiores eleganter imitantur.

f Durissimi omnium ossium, Vesal.

g Arist. 5. gen. anim. 8. 3. par. anim. 1.

h Ar. 2. hist. 1. & 2.

i 11. vs. part. 8.

k Arist. 3. par. anim. 1. 130.

lendi officio delegati sunt molares. 5.

Gen. anim. 8.

quare elephas

dentib. conficit

cibum & in

farina speciem

molit. 2. hist.

anim. 5.

Magnitudine variant, cum medijsⁱ maiores sint; qui verò vtrinque sunt, minores, tertius omnium maximus (at in simia quartus & quintus maior est) non

^l In ore cibi fit alteratio: mutat id in alteram speciem manifeste, non tamen ad perfectionem transmutatur: discas id ex ijs, quæ ex cibo in dentium intervallis relictæ per totam noctem haeserunt & paulo post: ciborū alterationem magnam in ore fieri patet, si mansum triticū, crudis furunculis applicaueris, cernes id ocysimè hos mutare & coquere: & paulo post: qui mansi sunt cibi, primum pituitâ hac imbuuntur & cum eâ commiscentur: dein carnē oris omnes contrectarunt, Gal. 3. nat. facul. in De ossib. 5. n Sic & Eustachius; vel vt alij $\Delta\iota\grave{\alpha}\ \tau\eta\omega\ \kappa\acute{\alpha}\mu\psi\iota\nu$ propter inflexionem, quod in maxillarum partib. sedem habeant, Meletius de natura.

non enim conueniebat i oris internam capacitatem quæ eo modo, quo anterior angustior est, dentes æquè magnos habere, ac mediam, quæ est ad buccas, quæque est amplissima. Nonnunquam in quarto aut quinto, sed superiore potius, quàm inferiore dimilius pene dens adiungitur, quando Natura plures molares efficere contendens ob loci angustiam nequit, necessariò simul iungit.

Numero communiter tam ex superiore; quàm inferiore parte vtrinque^o quinq; sunt, coniunctim scilicet viginti P: plures enim homini molares, quàm incisorij dati sunt, siquidem Natura pro fissuræ oris amplitudine angustiaue, animalibus plures paucioresue tribuit: homini quidem, cui os angustissimum, uique dentes ad mandendum præcipuè vsui sunt, multo plures, quàm incisorios aut caninos tribuit: contra in ferocibus molares aut nullos aut pauciores, sed incisorios, cum ijs ad pugnam vtantur. Hinc incisiorum & caninorum numerus in homine vix variat; at molarium q cum interdum quini^r interam quaterni aut seni^r sint (rarissimè^r terni) forte propter maxillarum q breuitatem. Quam varietatem Galenus apertè scripsit; quæ in simia vix vnquam conspicitur: quare cū Eustachio dicimus, & hoc ipso quoque probari posse, Galenum non tantum simias, sed etiam homines secuisse. Rectè ergo Aristoteles, omnes homines totidem dentes non habere scripsit, quod & Galenus innuere videtur.

Molarium duo posteriores tum situ, tum generatione vltimi σωφρονισμός^r Hippocrati, u sapientiæ dentes vocantur, eò quòd dum nascuntur, homo σωφρονισμός^r est, id est, sapere incipiat, siquidem circa

N n n 3

umerus omnium minimus est, etiam in puerulis, Eustachius. t Alij sunt dentes norantia, ut qui pueris nascuntur: alij sapientia, qui nascuntur, quando homo el sapit, vel sapere incipit, Archang. u De carnib.

o 11. vs. par. 9.

p In Introd.

12. Ruffus lib.

1. cap. 8.

q Maxillariū numerus non est definitus, sed qui longiores habet maxillas quinq; sunt vtrinque: qui verò minores, quatuor: maximā tamē ex parte

sunt quatuor

11. vs. part. 9.

r De ossib. 5.

s Tātum ternos in quodam

Cardinali ob-

seruari, qui

x post pubertatem venenescitq; usum, quod nonnulli male obseruantes, aut alios dentes euellunt, aut humorum vitio infestari sibi persuadentes, acres pilulis molestant, cum leui gingivarum ad postremum dentem scarificatione, ac interdum offis perussione, praesentius remedium adferri non possit, Vesal.

¶ Ruffus lib. 1. cap. 8. vel ut Meletius, quia in oris suo prudentia percipiendae temporis pueris adducant.

z Nouissimos maxillares genuinos vocamus, qui viris

quartum septenarium^x, quo tempore y moderatos temperatosque nos esse conuenit, & quidem subinde cum maximis cruciatibus, erumpant, quare dentes sensus & intellectus Auicenna appellat. Hi quandoque etiam in summâ senectâ prodeunt, idcirco xραυτήρες Aristoteli z Latini Genuinos^a nominant: quibus hoc proprium, vt alijs iam pridem absolutis erumpant: saepe etiam vel perforatis tantum gingiuis vix prominent, vel eis integris in suis alueolis latitant, vel etiam nullâ ex parte creantur.

Radicibus in homine non eâdem perpetuò sunt formâ, sicut in simiâ, vt eleganter Eustachius declarat: nam in simiâ molares maxilla superioris tres radices habent, inferioris verò duas, quinto tamen aliquando excepto; quartus vt maximus sic etiam radices maximas obtinuit. In homine non rarò plures radices habent, quæ vnius speciem præ se ferunt: aliquando in quinto (in secundo etiam obseruauit Eustachius) maxillæ inferioris, qui ob magnitudinem multipliciter findi debuit, simplex^b radix est, crassa, & vno foramine, coque latiore peruia. Sic aliæ radices vel æquali vel inæquali superficie sunt, quæ nihilominus intrinsecus duo triaue foramina tenuissimis squammis discreta elegantissimè incisa habent, fauo mellis quàm simillima, vt in quinto molari tria, in pluribus alijs duo foramina habentur: saepe radices aut conatæ, aut vix inchoatæ, alias rudiore lineâ, alias nullis lineis discretæ. Figura^c quæque v-

Et mulieribus nascuntur z hist. 4. dentes omnes cranteres vocari Ruffus testatur.

a Quia post pubertatem primum ferè deteguntur potius, quàm erumpunt genuini dicuntur Plat. Prater 32. aliquib. alijs prodeunt, quos Plin. genuinos appellat ob anno 18. ad 26. vel vt Plinius ait etiam 80. aliquando indolenter saepe cum magno cruciatu, Gorræus: circa 26. annum, alijs 40. alijs 80. Archang. b Hippocr. 4. epid. septimus dens radicem vnâ crassâ eandemq; acutam habere scribit.

c Hippocr. 4. epid. in Hegesistrato planas obseruauit: inflexas seu hamatas in

quodam

que variant, cum aliæ teretes, acutæ rectæque sint: quodam aliæ
 aliæ obtusæ, planæ & curvæ. Magnitudo eadem non plures incur-
 est alteri nunc crassissimæ, nunc angustissimæ; alteri uatas, aut eu-
 breues alteri longæ: nonnullis latissimæ & tenues: spide occurrē-
 plerumque tamen superiores longiores sunt, in- res, aut aduer-
 inferiores breuiiores: situ variant, cum aliæ se mu- so tramite in-
 tuò tangant, aliæ vicinæ sint, aliæ longo interuallo clinatas, aut
 disiungantur: aliæ distant, quidem, sed incurvæ instar S. literæ
 sunt, & sibi inuicem ita occurrunt, vt extremis vel hinc inde du-
 se mutuò tangant, vel viâ aduersâ euntes, magis ma- pliciter flexas,
 gisque disiungantur: & hæ, si dentes ferro eru- notauit Eu-
 untur, mediæ franguntur, & hominem maximè cru- stachius.

Quod si tres sint, & præcipuè in maxillâ superio-
 re, vna ad interiorem duæ ad exteriorem partem
 vergant. Concludens dicimus; communiter mo-
 lares duos superiores caninis proximos, binis radici-
 bus, tres reliquos ternis, nonnunquam & quintum
 quaternis (quod ^d rarum est) infigi: quemad-
 modum duo inferiores ad caninos singulis, tres
 reliqui duabus. At postremi genuini, radices bre-
 uissimas obtinent, partim, quia illa maxillæ portio
 insertionem profundiorē non admittit: partim,
 quia in cibis læuigandis, cæteris minùs exercen-
 tur.

*d Rarissimum
 est Columb.
 obseruauit,
 Eustachius.*

Quare molarium maxillæ inferioris, quàm su-
 perioris, radices & pauciores & breuiiores e exi-
 stunt, quoniam maxillæ inferioris substantia du-
 rior densiorque, dentes etiam suâ grauitate in-
 cumbentes, firmius continere potest, quàm ma-
 xilla superior, quæ rara mollisque, pendulos
 & velut in casum ob suam grauitatem procliues;
 idcirco radicibus longioribus quo tenacius &
 altius infigantur, quò firmius & validius hæreant

*c An potius,
 vt ego arbi-
 tror, quia ma-
 xilla superioris
 dentes dissimi-
 liter ac mola
 quiescant, ac
 motum susci-
 piant, Eu-
 stach.*

pluribus quasi vinculis indiguere; & cum radices breuiores sint, minori periculo, sed maiore labore, cum plures habeant, præsertim, si radices alucolis adnatae sint, euelluntur. Radices dentium omnes perforatae sunt usque ad earum cavitates internas, foramine^f tamen in absolutis dentibus valde exiguo, in acutiore summaque radice parte, quo venam, arteriam & neruum admittant.

f Absoluta dentium radices plerumque ita coacta sunt,

ut nullum prorsus in ea foraminis vestigium, aut profecto maxime obscurum appareret, Eustachius.

DE VENIS, ARTERIIS ET neruis dentium.

C A P. L X X X.

a Galeni de vasis & neruis dentium sermo 11. vs. part. 8. ita coisus est, ut nihil inde colligatur, quam in ipsorum desponsatione summam Naturae aequitatem apparere esse, ex ossibus solos dentes mollium nervorum cerebri partici-

VASA^a per foramina radicum dentium ad anteriorem cavitatem feruntur & diuariantur. VENAE quidem, quod vberius & copiosius alimentum adfluat: hinc dente perforato sanguis aliquando effluit. Debuerunt enim dentes perpetuo accrescere^b, cum mansione attritu mutuo alterantur; quod ostenditur^c, si dens aut decidat, aut auellatur, is qui exempto aut elapso ex opposito respondet, alijs qui in eadem sunt serie, prominentiorem exertumque magis fieri, quia contrario dente non amplius attritur, cæteri mutuo congressu & attritu in ciborum confectione, tantum augentur, quantum læuigandis cibis comminuuntur.

Arteriae

pes, eosque vix conspicuos ex tertio pari cerebri, Eustach. Nerviulos venulas & arteriolas ad radices dentium peruenire, non est negandum. Fallop. & Laurent. ^b Euulsi saepe renascuntur prodidit Mutianus, visum à se Samothracenum ciuem, cui renati essent dentes post centum & quatuor annos; & Aristoteles, mulieribus quibusdam maxillares dentes post 80. annum denud erupisse scribit, Laurent. ^c Aristot. 2. Gen. anim. 4. Galen. 5. compos. medic. f. l. 8. Vesal. Col. Laurent. non credo verum esse, quod dentes auulsis oppositi, quoniam mutuum contactum in occursum declinant, semper & in omnibus augeantur; quandoquidem in me ipso contrarium experior, Eustach.

Arteriæ ad caloris natiui custodiam dentes quoq; subeunt: hinc fit, quod dolor pulsatorius per inflammationes sentiatur; quemadmodum & carnosæ partes inflammatione vexatæ patiuntur, quod Galenus primus deprehendit: qui in seipso, non solum dentem dolere, sed etiam pulsare aduertit: quare alium dolorem in gingiuis, alium in ipsius dentis substantiâ esse, clare se scire asserit; Et citra gingiuarum inflammationem aliquando in ipso proprio dentium corpore, aliquando in neruo dolorem fieri contingat; Et nisi arteria subiret, quomodo à perforato dēte tantum sanguinis lucidi aliquando emanare posset? quod Eustachius notauit in quodam, qui eiusmodi hæmorrhagiâ laborans, vitam pene cum sanguine effudit.

Nerui f molles ac tenues à tertiâ coniugatione vulgo dictâ (nobis vero quartâ) feruntur [tab. 9. fig. 1. ad dentium super alueolos T T. ad dentes inferiores] & per fororum radices in ipsa dentium primâ conformatione in cauitatem feruntur, & per interna dentium disseminantur, & surculis minutissimis cum orum substantiâ mucosâ commiscuntur: quâ materia ex parte in os firmatâ, causa est, vt dentes cum neruis facilius consentiant, & sic sensus participes fiant, cum ad cætera ossa nulla nerui propago pertingat, per eorum cauitatem transfundenda; hanc ob causam ossa neruis carere dicuntur, quamuis membrana, quæ periostrium dicitur, sensu prædita sit, & neruos habeat, & quemadmodum partes cicatricis & hepatis eius membrana sensum tribuit; sic & periostrium illis impertiri potest, cum exquisitissimi sensus sit, ita vt quando male habet, ipsius affectio ossium dolor censeatur. Nisi lubeat dicere, os

ds. comp. med.
secundum loca
8. & ex eo Vesal. Col. Eustach. Laur.

es. comp. med.
secundum loca
9. si in intimâ
cauitate dentes
videntur

pulsare, dum
inflammationem
patiuntur.

id accidit, quia
ad dentis ra-

dicē arteriola
pertingit, quæ

fortassis minima
cauitatē

ingreditur,

quamuis hoc
oculis non as-

sequamur.

Fallop.

f Galen. 9. vs.
part. 14. & 15.

& lib. 11. eius.
7. solis dentib.

ex ossib. molle
genus neruorum

inest, 16. vs. p.
2. de ossibus. s.

applantantur
radicib. dentium

molles nerui:
quare hi duntaxat inter

Nnn 5

sa, cum

ta euidenter sentiunt, Vesal. inseruntur & per cauitatem disseminantur Col. & aur. in radices dentium neruuli membranulis suis conuicti penetrant, Archam.

g Reprehendē-
di, qui obscu-
rissimi forami-
nis in dētis ra-
dice nullā ra-
tione habitā,
neruorū vaso-
rumq; conti-
nuum ductū,
distributionē
& insertionē
in eandem ca-
uitatem, vel-
uti facile pin-
gunt, ita sese
ostensuros re-
cipiunt, Eu-
stach.
h In ossa ner-
uos inseri asse-
rit Actuarius
4. meth. 14. ob-
scure sentire
cognouit Gal.
cum Hippocr.
quare 2. de
fract. 12. ossa,
quæ cruri iun-
guntur, dolore
affici scribit.

sa, cum per animam sentientem existant, ipsius be-
neficio sentire, obscure tamen, cum ossium durities
sensui non mediocriter aduersetur, quo sic ossa à
plantis distinguantur, & animalis particulæ sint. E-
quidem Vesalij g & aliorum tabulas imitati, nervos
maiores longe delineatos proposuimus, quam in se-
ctione ostendi possint. Verum, quâ ratione vasa &
nervos demonstrare soleamus (Eustachij lectione
admoniti) subiiciamus.

Cum in maioris alicuius animalis maxillâ, vt bo-
uis vel arietis rectius hæc, quam in hominis demon-
strari possint, bouis maxillam inferiorem (cum in
hac, quam in superiore administratio facilior sit) ac-
cipimus, latere interiore aperimus; quâ apertâ caui-
tas medullâ plena, vnâ cum neruo membranâ inuo-
luto occurrit: medullâ remotâ & membranâ secun-
dum longitudinem scissâ, neruus ex pluribus quasi
funiculis conflatus conspicitur, inter quos venarum
& arteriarum propagines feruntur. At vbi membra-
na hæc cum neruorum & vasorum furculis ab osse
remota sensim subleuatur, fibræ nonnullæ araneis si-
miles, ab eâ distributæ conspiciuntur; sic in maxillâ
arietis fibræ ossium interstitium, quod tenue & ra-
rum, & inter neruum & dentes positum est, ad den-
tium molarium radices penetrant. A molaribus ve-
ro ad dentes caninos & incisorios, neruus, arteriâ co-
mite delatus, bipartito diuiditur, cuius pars vna per
foramen eo loco exsculptum ad labrum inferius e-
mergit; altera ad dentium incisiorum radices ten-
dit, cuiuslibet furculum largitur, & altera portione cū
radicum parte exteriore iungitur: altera autem eaq;
tenuissima dentium sinum penetrat, quod etiam in
homine non difficulter videri potest.

Et sane mirum est, incisores & caninos dentes,
qui minores vnaque radice infixi sunt, neruorum

ac va-

acvaforum furculos magnos & conspicuos viâ patente ad insertionem accedentes obtinere: molares vero, qui maiores & tribus, interdum etiam quatuor radicib. pæditi sunt, eosdem furculos, qui bifariam, trifariam, ac etiam quadrifariam scindi debent, capillorum modo tenues & itinere obscurissimo incedentes, habere.

Quod si vero molarem vel incisorem è proprio alveolo sensum extrahas, fibras gracillimas è maxillæ concavitate emergere, & dentium radicibus coniungi videbis: simul etiam interstitij ossi partes substantiâ mucosâ refertas observabis, quæ ei substantiæ, ex qua dentes eiusque folliculi generantur, non absimilis est.

Dentibus euulsis, in radicum extremitatibus, materia partim mucosa, partim fibrosa, quæ nervi atque utriusq; vasis speciem, obscure tamen præ se fert, occurrit.

At dentem medium, si diuidas, substantia mucosa vasis, & nonnullis alijs fibris intexta se exhibet. Hæc in bouinâ & arietinâ maxillâ & dentibus demonstrari possint; quæ etiam in humanâ, licet non ita perspicua sint, ex parte observari possunt. Quis ergo negabit internam dentium partem dolorem cum pulsu experiri (quod cum Galeno & Eustachio asserimus) cum illam arteria cum nervo subeat; Sic & venas in homine sinum ingredi quis dubitabit? cum sanguine aspersus conspiciatur, & in bobus manifeste demonstrari possit: nam licet in homine non ita aperte conspiciantur, negari tamen non possunt; quemadmodum in oculi tunicâ adnatâ, quamdiu homo valet, venæ nullæ apparent, quæ inflammatione accedente conspiciantur.

De sensu i dentium hoc videtur, ipsos interuen- i De sensu dē-
tu mem-

Alij sentire negāt, quia ossa sint, & citra dolorem limā afficiantur, referente Galeno 5. cōp. modic. secund. loca 8. alij sentire volūt, sed sensu per se, ut

Et reliqua ossa sine nervis, unde dolor, qui dentibus inesse credatur, esse extra dentem in membranulā alueolos succingente, Plato: per ingentem calorem vivere & sentire censet Aretæus lib. 2. de sig. & causis diut. morbor. 12. dolore affici tradit Hippoc. 5. epid. frigidum amplius quam calidum sentire statuit Arist. 34. probl. 2. & 3. dolere & pulsare, & nervos molles recipere, Gal. l. c. Sed qua pars sentit? alii dentis corpus, sed solum secundum partem internam, Varolus: alii totus dens sentit, sed non totus dolet: Sentit primas & secundas qualitates, sed prima tantum dolore afficiunt, quia vires effundunt in radices dentium, in quas nervuli penetrant, Archang. Sic Laurent. totus sentit, sed exquisitius interna, minus externa. Vnde sensus quod doleant? alii tum propter nervos, tum propter substantiam propriā. Actuarius 6. meth. 7. alii propter membranā tenuissimā internā cavitatem succingentem, Fallop. alii propter nervum & propter membranā, qua cavitatem subit: alii propter nervum, qui vicinis partibus, & tantum dentium radicibus cohæreat: alii a nervo subeunte, & a membranā, qua tantum radici instar perioestij adhæreat: alii a nervo substantiam subeunte, Varolus. Dentes & eorum substantiam sentire, probatur auctoritatibus Hippocrat. l. c. qui dentes dolore affici tradit Aristotel. cui & calorem & frigus sentiunt. Galen. l. c. cui dentes dolent & pulsant, & 5. admin. anat. 3. ab ipsiē nervis & gingiva, & dentes & membrana sensum accipiunt. Experiētiā si ferrum frigidissimū vel glaciē admoucas, statim obrigescunt: Sic & rem calidā sentiunt. Sentiunt & secundas qualitates auritiem, mollitiem, asperitatem, Sed primas qualitates vehementer sentientes, dolore afficiuntur, quia vires effundunt in radices dentium, in quas nervuli penetrant, at secundas qualitates, ut duritiem, asperitatem, limantes & frangentes sentiunt quidem, sed dolorem non adferunt, quoniam vires non effundunt in dentium radices, in quibus sedes est tactus, Archangel. cum periosteo careant, de debant sensu aliquo donari, ut saltem primas ciborum qualitates actuales perciperent: at per osseam substantiam durissimā sentire non poterant: ergo quemadmodum in ense sub cortice chalybis durissimo latitat, medulla ferrea longe minus dura: ita sub cortice dentium esse, adest substantia quadam mollior, ad quam nervi perveniunt, sensumque illi impertiuntur, & sicut cutis sentit per cuticulā non sentientem, ita dentis medulla sentit qualitates tangibiles per partem osseam omni sensu priuatā, Varolus.

k 1. causis sympt. 5. 1 2. locis affect. 6.

rum non quælibet dentis pars æqualiter sentit: sed interna, neruo & membranæ vicina magis sentit, quam externa: hæc enim partim propter spissam & duram ipsorum substantiam corticis instar internam partem obducentis, quæ vim nerui & spiritum animale vix admittit; partim propter aeris ambientis continuam mutationem pati assuescunt, quemadmodum sensus in cute callosâ pedum rusticorum bene obliteratur. Quare pars, quæ extra gingiuas est, seu dentium cortex, ab asperis & duris non læditur, nec ex eo constat, quod dentes eâ parte licet secentur, limis atterantur ac læuigentur, imo candentibus verris vrantur, tamen non dolent, imo vix sensus inlicia deprehenduntur: imprimis vero dentis apex, cum solidior esse debuerit, ob cibos atterendos, & intrinsecus cavitates eò non pertingat, ergo nec neruus. Quod autem dentes nec ab igne, nec ferro, licet obscure sentiant, non tamen doleant, causam solos Deos nosse, Aretæus inquit; aliud pronuntiare non possumus, quam dentibus proprium esse, vt nec ab omnibus, quæ eos immutant, nec ab his, quæ molestiam afferre possunt, æque adficiantur, cum magis à calido & à frigido, quam ab alijs qualitatibus lædantur, & frigidi sensus ^m qualitas, illis molestior sit, quàm calidi: quare ab humidis & siccis, duris ac mollibus æduntur, cum horum qualitas non statim membranae aut neruo communicetur. At à calidis & frigidis adficiuntur, quia spiritus animales, qui in dentium substantiâ continentur (& quidem longe melius, quam in cæteris ossibus, cum in propriam cavitatem neruos molles recipiant, & eorum substantia interia, quæ à sensibilib. immutatur, non nihil rara sit) & per eorum substantiam diffusi sunt, alterantur, dum eos vndique penetrât, & simul cum ipsorum substantiâ spiritum animale, & successione quadam mem-

*m Frigidum
amplius, quàm
calidum sen-
tiunt, caro e-
cōtrario, quia
reperit frigidi
sunt, & me-
tus habent te-
nues, quibus
calor inditus
exiguus est,
Arist. 34. pro-
blem. 3.*

*n Gal. s. comp.
med. secundum
loca 9. Tral-
lianus lib. 3. c.
9. dolores fiunt
cum pituita
radices denti-
um subierit,
Hippoc. lib. de
affect.*

*o 16. vs. part.
2. in dentibus
gustandi tan-
gendiq; sensus
in esse videtur,
Galen. 6. epid.
com. 6. sensu*

*donari debuere,
ut saltem primas ciborum qualitates actuales perciperent, Vario-
lus, non subscribimus, alioqui fateri cogeremur, & dentes esse gustandi instrumen-
ta; Archangelus.*

membranam & neruum afficiunt & immutant. Dolor autem hic, qui in dente percipitur, distingui debet ab eo, qui gingiuis^a vel ex intemperie quapiam vel humorum quorundam defluxu, & neruo ad radicem substrato contingit.

Sentire autem debuere, melioris vsus gratia, cum perioestio non cingantur, & iniurijs externis expositi sint, quò ea, quæ nocitura aut profutura erant, percipiant. Dein & saporès (si Galeno^o credimus) aliquo pacto, quemadmodum & reliquæ oris partes discernere debuere, cuius nomine neruos molles recepere: nã sicut cutis sentit per cuticulã non sentientem, ita dentis medulla sentit qualitates tangibiles per partem osseam, non secus ac membrana nervea sub vnguibus locata sentit caliditatem & frigiditatem per ipsos nullo sensu præditos.

donari debuere, ut saltem primas ciborum qualitates actuales perciperent, Varolus, non subscribimus, alioqui fateri cogeremur, & dentes esse gustandi instrumenta; Archangelus.

DE CAVITATE DENTIVM IN- terna & membrana.

CAPVT LXXXI.

*a Recentiores
aliqui, quasi
cavitatem in-
uenerint, pal-
mam iniuriã*

VASA cum neruis dentium cavitatem subire, dictum fuit; qualis ergo cavitatis sit, explicare conuenit. Dentes omnes intrinsecus caui^a sunt.

poscunt, cum veteres Anatomici scripserint, dentes os esse, partim cõcauum, partim solidum. Galenus in libris, qui extant, cavitatem hanc, qualis & quanta sit, & quid in se contineat, non explicat: at cum cauerna dentium sape meminerit, vix verisimile ipsum ignorasse: nam si nihil concauitatis initio ortus dentes sortitos esse credidisset, frustra docuisset, in vehementissimo dolore, eorum substantiam prorsus solidam terebello tenui perforari, s. compos. med. secundum loca 9. Dein apud Hippocratem 4. epid. legitur, puero ab ulcere phagadenico erosi dentes emergebant, quæ cavitatem habebant: his erosionem substantia, & naturalem simul dentium cavitatem non obscure innuit. Imo neruos ac vasa peculiari dentium sedi insita, sensus

[tab.

als.

[tab. 28. fig. 3. E.] verum cavitas magna vel parua est; *menti & vita causa excogitata, & admirabili Opificis diligentia procurata scribit: Hac Eustach.*
 proratione magnitudinis, ac figuræ dentium, quod etiam Aristoteles ^b agnouit, dum dentes ossa dixit, partim concaua, partim solida. Hæc in pueris ad septennium ^c & plures etiam annos insigniter ampla est, & squammâ tenui circumscripta, cæcis fabricis, aut apum potius fauis valde similis: humore albo (non verò ^d medullâ) plena, quod in vitulorum lente ultimo; in maxillâ latitante, quem lacteum ^{b 3. hist. animal. 7.}
 lentem nostri vocant, in mensa conspiciere facile est: humor hic procedente ætate exsiccat, durior redditur, ossis formam maiori ex parte suscipit: sicque concauitas, dum dentes absoluuntur, in lites imminuitur, ita tamen, vt in medio ipsius crassitie ad radicem sinus quidam remaneat, qui partem illam, quæ extra gingiuas est, vix attingit. Nam cum vasa inferantur, & arteria, quod libere distendatur, spatium requirit, quamuis aliqui sensum hunc pulsationi non absimilem, non ab arteriâ excitari vident, sed à spiritu varie concitato, quemadmodum in uribus experimur & baculum percussum, si partikulam sensu præditam contingat, concuti & resonare videmus.

Hæc clarius in molaribus bouinis fractis conspiciuntur, cum in vitulo & agno quilibet molaris ^c *Dentes exiguas, sed notatu dignas, cauitates intus obtinent, quo leniores sint, & commodius nutriantur, Velsaluis non, ut leniores fiant: hac enim mihi ratio in ipsis ineptissima videatur, sed vt commodius nutriri ac sentire possint, Eustachius.*
 caui-

Sinus totum dentem occupat, ex parte excepta, qua gingiuus denudata est, qua Glidior, &c. Fallopius. In dente perfecto in medio cavitas, quibus & fibra quatuor inesse videntur, Plater. ex pingui in se habente aliquid frigidi, os cauernum fit; at cum pingue id, ex quo dentes fiunt, nihil in se frigidi habeat, deo nulla cauernula & laxitates fiunt in ipsis, ideoque dentes densissimi, & cæteris ossibus duriores euadunt, Archangelus, Eustachius, Laurentius.

Dentes nostri ossa non sunt, nec medullam habent, Galen. lib. de nat. & ord. corpus. neutiquam medullâ plena, vt nonnulli hodiè Galenum insimulantes ferunt, Eustachius.

cauitatem triplicem habeat, anteriorem, posteriorem & mediam, quarum media foramine instar literæ C. curuo etiam peruia est, quod ad extremum vsque dentis gingiuas egressuri pertingit, & in duabus reliquis materia mucosa continetur, quæ maiori ex parte, dum dens perficitur, in os transit: & cum in his animantibus plerunque duo molares, ac etiam tres, & non raro quatuor coniuncti occurrant, quo mutuo consentirent, natura foramine transuerso officium interstitium incidit, per quod materia, quæ membranam æmulatur, ceu furculi ab alterâ cauitate in proximam traiecit, Eustachio notante.

e Substantia mucosa dura, superficie lubricâ cuticula simili, quæ concretionis specie magis, quam membrana texturam dum eruitur, præsefert: nominet tamē eā quisque arbitrio suo, aut membranam, aut concretionem: siquidem negandū non est, hanc substantiā in umbrā exsiccata, tunica haud absimilem videri, Eustach. f Fallo. Laur. at Gorraus dicit, neruum cū

Cauitas hæc succingitur substantiâ membranulam æmulatē, quam alij membranulam tenuissimam ^f vocant: exactissimi sensus esse, & propterea caloris & frigoris sensum dentes percipere, eam sæpe humorem à cerebro defluentem imbibere: vnde dolores vehementissimi causentur, qui tamdiu permanent, quam diu humor in membranulâ detineatur, vel vsque dum cerebro purgato fluxionis causa tollatur. Huius cauitatis causa, si dentibus & ex humorum acrimie affluxu foramina oboriantur, quæ ad eam cauitatem pertingunt, dentes citissime ad radicis extrema eroduntur: in hac erosio præcipue & putredo dentium incipit: in hac caries dolorosa subnascitur, vermesq; aliquando colliguntur, qui hominem mirum in modum excruciant. Vfus huius cauitatis, vt dentes commodius nutriantur ac sentiant.

meninge tenui subire: membranula ex venarum, arteriarum & neruorum complicatione in cauitate gignitur, quæ materiam defluentem imbibit, vnde dentium dolores ingentissimi, Col. sunt qui asserant, ex arteriâ venâ, & nervulo simul mixtis constari, quæ opinio similis ei, quâ antiquiores asseriebant, ex nervo, cute, carne & ossibus simul mixtis vngues constare, vt testatur Gal. 2. adm. an. 11. hæc Fallop. Sed non ita recte improbat: quia multa de vasorum neruorumq; in dentes distributione scribunt, quæ et si sensu perfecte percipi nequeant: quia tamē verisimilia sunt, non contemnuntur. Eustach. alveoli membranulâ succinguntur exquisitissimi sensus, quæ si afficiantur, colorem illum, quem dentibus ob vicinitatē inesse putant, causat, Plat. & Vesal.

DE

DE DENTIVM GENERATIO-
ne & usu.

CAPVT LXXXII.

Hippocrat. lib. de carnib. de septimestri partu, Aristotel. 2. gen.
animal. 4.

Dentium ^a generatio in vtero est, cum cæteris ^a De dentium
ossibus, cum quibus simul delineatur, sed sen- generatione
n formantur & absoluuntur: quare in maxillis ali- opiniones va-
andiu imperfecti latitant, nec omnes simul è pro- ria alij intra
rijs alueolis erumpunt, sed alij citius, alij tardius ab- vterum gene-
luti, prout necessitas requirit, exeunt: hæc causa rari volunt,
b, cur duplex generationis tempus constituatur, a- ut Colum. &
ad in vtero materno, aliud extra vterum. Eustachius: a-
lij extra vte-
rum, ut Ari-

In vtero post maxillarum generationem, in qua- stoteles, alij
bet dentes ^b duodecim formantur: ex quibus inci- partim intra,
rij quatuor sunt, canini duo & maxillares ^c sex, qui partim extra
nnes radicibus carentes, in alueolis vndique val- vterum, ut
lati Hippocra. qui
triplex tem-

O o o

constituit, at Fallopius duplex solum. Hippocr. de carnib. tribus diuersis tempo-
ribus produci censuit, ex triplici alimento materiam subministrante. 1. à victu in
vtero. 2. vbi natus, puero lactanti à lacte. 3. vbi illi exciderint, à cibo & potu:
in quicquid in eiusmodi alimento glutinosi insit, id totum ad dentes firmandos
huius pinguedine, qua in hac, quam in ossium materiâ copiosior est, caloris vi ex-
catâ. Sic Laurent. ut triplex hoc alimenti genus differt crassitie, ita non est ea-
dem dentium soliditas, durities & crassities: qui enim ex fœtus in vtero & editi pu-
er lactantis alimento gignuntur, molliores sunt & facile decidunt: qui ex solidio-
ribus duriores & firmiores: tales enim 7. & 14. erumpere solent: decidunt enim den-
tes 4. 5. & 6. anno & c. Aristoteli 2. gen. anim. 4. post ossa nascuntur, quare cum de-
derint, oriri denuo posse, cum ossa tangant, non continuentur: & quidem ex ali-
mento, quod in ossa administratur: beneficio enim caloris, qui in lacte est (ut ha-
betur 5. gen. anim. 8.) dentes primi oriuntur: siquidem infantes lactantes, qui cali-
re lacte vtuntur, occlusi dentiunt: calor enim vim augendi obtinet. Galenus ex
alimento eos creari simpliciter scribit: Sunt qui dentes post alia ossa produci, & con-
tinuum ossium morem toto vitæ curriculo augeri putent; quare ossium & dentium ma-
teriam longe diuersam esse asserunt. b Incisores canini, ac tres molares, nimirum
1. & 4. Eustach. c Semel aut bis in maxillâ superiore quatuor tantum maxil-
lares reperi. Fallop.

d Homo dentib. carēs, venit in lucē, nisi quid prater naturam interuenerit. 2. gen. anim. 4.

e In recens editis in lucem animalib. dentes intus in gingiuis adhuc latitant, quæ in abortus dissectione aperte perspicies. Gal. 2. de de sen. s. Col. Fall. Eustach. Laurent. dentes in utero gingni diligenter perquisiui, & de his plerique, ne verbum quidem, Col. f Folliculus albus subobscurus, potius mucosus ac tenax, quam membranæus, sicut lobus frugibus obducitur. Eustach. g. Et Fallop.

lati sub gingiuis integris latitant (pauci enim exettr dentibus^d nati sunt, vt M. Curtius Dentatus cognominatus & Cn. Papyrius Carbo) quod maxillæ alicuius crudæ abortus,^e aut recens nati puelli apertio docet, ex cuius alueolis exigui dentes eruntur. Horum dentium adhuc imperfectorum substantia est, partim mucosa, partim ossæ: posteaquam enim folliculus, (qui singulis dentibus albus, mucosus ac tenax, quasi membranæus^f obducitur, & quo dens mollior & recentior est, eò mucosior existit) & parte superiore nonnihil perforatus, vt dentis mucronem emitat, existit, detractus est, cum dēti subiecto nusquam coalescat, tunc dens partim ossæus, partim mucosus conspicitur: pars enim, quæ extra gingiuas eruptura est in squammam candidam, tenuem & excauatam instar faui mellis formatur, sicque pars superior ossæa est, dura & caua.

Altera dentis pars maxillæ infixæ, mollis est & humida & mucosa, vt in pennarum generatione apparet, quæ substantia fibras & stamina habere videtur quare veluti pellicula quædam tenui vestita, cum superficie lubricæ cuticulæ similem obtineat, quæ substantiæ, quam continet, agglutinata & iuncta est. quod & etiam in origine pennarum, dum adhuc teneræ sunt, apparet: nam pars extra cutim prominens, cornea & dura est, quæ vero in alijs latitat, mollis, humida, & veluti sanguis, vel pituita concreta existit.

Mollis hæc pars, dentibus erumpentibus sensim obdurescit, sensim & ossæa fit, & quandoq; intus excauata in radices formatur. At folliculus ossæam partem tegens, dentis vinculum fit, eo enim firmiore reddito dens ipsis alueolis & gingiuis veluti glutino quodam adhærescit.

Hi in gingiuis latitant, ne papillam nutricis, dum fugunt,

sugunt, perforant; at septimo^h mense, vel etiam se-
 rius, si tussiculaⁱ infanti molesta est, ex alueolis egre-
 di incipiunt, & tunc pueri febres, conuulsiones & al-
 ui profluuia, maxime, vbi caninos dentes producūt,
 patiuntur, Hippocrate^k tradente, quæ euenire do-
 cuit Galenus, quod vbi gingiuarum à dentibus prode-
 untibus perforantur, dolores similes sint, quales, vbi
 carni stimulus infigitur; sed reuera dentes plus affli-
 gunt, quam stimuli, siquidem stimuli semel infixi &
 irmati quiescunt, dentes vero tantum procedunt,
 quantum augentur. Erumpunt autem, non simul o-
 mnes, sed celerius superiores, quam inferiores, & in-
 ciso- res, quam molares. Quod vero serius in homine,
 quam in brutis^l erumpant, imo sine illis nascantur,
 causam retulit Aristoteles^m in excrementum ter-
 reum, ex quo generantur, quo homo inter omnia a-
 nimantia minime particeps sit. Verum cum & hi, &
 ui eos sequuntur, & regenerari creduntur, in ma-
 illis latitent, Opificis voluntati potius, qui omnia
 moderatur, tribuendum est. Hos naturaⁿ prodire
 soluit, cum mandendiⁿ actio accedit, ne infans ma-
 ius semper sit molestus, & lacte dimisso solidiorem ci-
 um capere incipiat; tunc enim vnaquæque^o parti-
 cula efformatur, quando utilitas requirit, quare &
 ost partum^o dentes nascuntur.

Idcirco & incisores ante molares extrudi Philo-
 sophus^p censuit; eò quod cibus prius diuidatur,
 quam atteratur. Excidunt^q autem hi circa an-
 num

Ooo 2

num

us, quam dentibus indigeat. ^p Gen. anim. 8. contra Eustachius ait, non sequi,
 ut homo nihilo prius illorum, quam horum opera egeat, vel utatur. Addit Ari-
 stoteles, rem minorem, si simul inchoetur, celerius perfici quam maior: at primores
 molares esse maxillaribus. At Eustachius hoc negat, siquidem carpi tarsique ossa,
 & minora sunt, absolutis iam humeri & femoris ossibus, adhuc carrilaginis na-
 ram vetinere. ^q Vbi ad annos primi alimenta peruenierint, quibusdam prius,
 à morbido alimeto nati fuerint, renascuntur autem ad decimum quartum, Hip-
 pocr. de carnib.

^h Hippoc. de
 carnib. post se-
 ptimum men-
 sem, & lib. de
 septimest. par-
 tu.

ⁱ Qui cū tussi-
 culā detinuit,
 tardius dentes
 producūt. Hip-
 pocr. de denti-
 tione.

^k 3. Aphorif.
 25.

^l Statim cum
 natus est Ele-
 phas, dentes
 habet, 2. hist.

^m 2. gen. an.
 4.

ⁿ 15. vs. par. 7.

^o Gal. lib. an
 omnes partes

simul fiunt: at
 Eustach. cen-

set, non aque
 necessarium,

quia vterus i-
 nitio genera-

tionis creatur,
 & ante den-

tes absoluitur,
 quamuis fœ-

mina, eo poste-

*1 Secundum
Democritum
vero, quoniam
properant, &
ante tempus
oriuntur, quod
Aristotel. re-
prehendit, 5.
gener. an. 8.*

*1 Sic & Fal-
lop.*

*1 Vesal. lib. 1.
cap. 3. & 11.*

*puerorum de-
tes imperfectis
& mollibus,*

*& quasi me-
dullosis con-
stant radicib.*

*& eorundem
pars extr. gin-
giuas conspi-
cua, dentis ra-
dici appendi-
cis modo qua-
si committi-
tur: quare se-
ptennies pueri
vacillantes*

*dentis, praesertim incisores, unguibus, aut filo denti circumdato, eximere consue-
runt: quod accurate perpendendum, ne pueris reliquam effracti alicuius ex casu
dentis portionem unquam eruamus, sed duntaxat appendicem, in cuius locum a-
lia prompte succrescit, modo radix asseruetur. Hac Vesal. idem Columb. qui addit
in radice enim, velut in semine quodam dentis regenerandi speciem residere. Sic
vero Varolus: Intra maxillas appendices quadam ossea, acutissimis mucronibus
pradita, fabrefacta sunt: qua appendices ante perfectionem dentium ad gingivas
propelluntur, quo ipsi ad cibaria atterenda utatur, & per multos menses & annos
vices dentium gerunt; qui ubi dentes ad complementum peruenerunt, è maxillis
prosilunt, & cum ambitu gingivarum non amplius contineantur, per se ipsi deci-
dunt, Eustachius. Posteriores, ut arbitror, decepti, quasdam commentitias appen-
dices excogitarunt. & Laurentius reprehendit.*

*u Cels. libro octauo, capite primo. Alexander Benedict. Vesal. Columb. quia
crediderunt dente lacerato partem mollem cum pelliscula in alueolo relictam
esse.*

*num septimum; quibusdam etiam citius, quando
ex male affecto humore nati sunt: Et quidem pri-
mores primo, quia cito hebetescit secundum Phi-
losophum, quod acutum est: idcirco alios in offici-
um succedere oportet: lati autem non hebetantur
sed tempore duntaxat attriti laeuigantur, ut Aristo-
teles credidit.*

*Iam vero, cum circa septimum annum dente
praedicti aut à suppullulantibus expelluntur, aut e-
uelluntur, in extremo imperfecti conspiciuntur &
molles, & quasi cauati: idcirco censuerunt aliqui, ta-
tum appendices esse quarundam radicum, in maxi-
la relictarum, & sic dentes appendicibus donari
quæ excidant, subnascente dentis reliquo, ex priori
dentis radice relictâ, cum tamen inter eos, qui deci-
dunt, & eos, qui circa septimum erumpunt, nullam
esse coniunctionem, Anatome doceat; imo, ne qui-
dem seipso tangere posse propter interstitium, quod
inter ipsos medium est, quo perforato dens nouus e-
rumpit.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

*Alterum generationis dentium tempus est extr-
terum, circa annum septimum, eorum, qui rena-
scuntur.*

sci creduntur: qui tamen eo tempore minime nascuntur, aut renascuntur proprie loquendo, sed cum primis dentibus in initio generationis ex eadem materia rudem quandam formam cum alijs accepere, alias enim nervos, vasa, vincula (vt recte Eustachius) internasque membranas, quæ spermaticæ partes sunt, & dentium constitutionem absoluunt, eodem tempore contra naturæ legem extra vterum produci, concedendum foret. Verum hi dentes sero absoluntur, & quemadmodum illi communiter septimomense, ita hi septimo anno extra gingivas erunt.

Septenario enim annorum circulo inter alia multa, quæ animantibus accidunt, dentes pueris excideant, ac alios nasci Hippocrates^x tradit. Nisi forte luceat cum Fallopio pronuntiare, hos posteriores dentes post priores nasci, non quidem ex diuersâ materia, sed eadem, seminarijs^y generationis in maxillis adhuc latitantibus; siquidem & ipse Eustachius fatetur, detracto & remoto interstitio tenuissimo, vix esse, quod illos & hos dentes intercedit, incisivos & caninos illis minores obseruasse; primorum mortuum vero & genuinorum, qui circa septimum annum & longe etiam postea oriuntur, nullum vestigium vidisse.^z

Sunt autem dentes decem, qui in qualibet maxilla circa annum septimum prorumpunt, vel vt alij, re-

^x Lib. de septimest. partu & lib. de carnib. pueri septem annis præteritis dentes expleant.

^y Seminariam facultatem, qua dentes fingit in maxillis ossibus ad extremum vitæ tempus reservari recentiores Anatomici as-

Ooo 3

nouan-

erunt, & Aristoteles innuere videtur, dum scribit, dentes idcirco regenerari posse: quia in osse adhuc crescente oriuntur 1. gener. anim. 8. quoniam initio non oriuntur, sed ex alimento ossium producuntur 2. gener. anim. 4. hac Eustachius facultas conformatrix in dentibus nunquam otiosa est, cum horum figuram semper seruet, nec in eo assiduo incremento sinit incisivas mutari in caninos, aut hos in molares. Archangel.

Verisimile tamen est, eos perinde ac secundos incisores, ac caninos, rude quidam initium ortus in vtero sumere, & sensim postea formari, non absolui, Eustachius.

nouantur: Incisorij quatuor, Canini duo & maxillares quatuor: duo nimirum caninis proximi, & duo, qui genuini dicuntur. Verum ex his incisores erumpentes, primos extrudunt, & inter duos primos secundumque & caninum sibi proximum, è proprijs præsepulis emergunt: quod si forte primores non excidant, vel non euellantur, vel si protrudantur antequam primi cadant, nihilominus posteriores per alueolos nouos, in superiori quidem, vt plurimum extra, in inferiore intro erumpunt, ita vt nouus^a dentium ordo videatur,

^a Qui historicos saepe & Anatomicos decepit, Fallop.

^b Et Laurent.

^c Homini primores dentes mutantur, maxillares nullum animalibus mutat: sus nullum omnino dentem amittit. Arist.

^{2. hist. 1. vide} res expellunt, frequentius tamen ad latera exorti numeri augent: duo vero genuini, alios nunquam expellunt, cum etiam^d in summâ senectâ in maxillarum extremis finibus prodeant, ita vt post octuagesimum annum, prodixisse non sine dolore Philosophus testis^e sit, quod tamen rarius viris, quam mulieribus vsuvenire scribit. Et hos secundo loco genitos seu renouatos simul consenescere, diuinus Senex^f voluit, nisi morbo confecti, vel perforentur aut atterantur, aut macie imminuantur, aut laxati ante senectutem eruantur, vel sponte decident.

^d Quarto septenario dentes enascuntur, plerisque hominib. duo, qui sapientia dentes appellantur, Hippocrat. de carnib. circa tertiam annum septimanam, & ulterius etiam vsque ad decimam exoriuntur, Fallop. e 3. hist. 4. s. gener. anim. 8. f De carnibus.

Canini etiam excidunt, & succedentium sedes elata est, sub canini prioris extremâ radice & aliquantulum obliqua. Quod enim dentes^b circa quartum, quintum, sextum, & etiam septimum vacillent (qui postmodum vel excidunt, vel euellantur) causa est, quod alueoli continuo crescunt, & dentes adhuc molles sunt, qui ob durioris & idcirco inepti alimenti adpulsum tabe quasi conficiuntur; qui vero post septimum erumpunt, non item.

Ex maxillaribus^c duo priores aliquando primores expellunt, frequentius tamen ad latera exorti numeri augent: duo vero genuini, alios nunquam expellunt, cum etiam^d in summâ senectâ in maxillarum extremis finibus prodeant, ita vt post octuagesimum annum, prodixisse non sine dolore Philosophus testis^e sit, quod tamen rarius viris, quam mulieribus vsuvenire scribit. Et hos secundo loco genitos seu renouatos simul consenescere, diuinus Senex^f voluit, nisi morbo confecti, vel perforentur aut atterantur, aut macie imminuantur, aut laxati ante senectutem eruantur, vel sponte decident.

Modum generationis horum dentium Fallopius sic

fic

fic expressit: A facultate viuificâ, spiritu agente os excavatur, folliculus membraneus simul gignitur, qui apicem geminum possidet, alterum posteriorem, cui neruulus arteriola & venula applicantur: alterum vero priorem, à quo neruea veluti cauda pendet, quæ per ossis foramen angustissimum ad dentis illius lateris, cui nouus successurus est, vsque ad gingiuas extenditur. In folliculo dicto, materia quædam alba & tenax concrefcit, & dentis pars prior ossea redigitur, posteriore adhuc molli existente; quod etiam ijs, qui in vtero geniti sunt, accidere diximus.

Erumpit autem vnusquisque dens per foramen dilatatum, per quod folliculi cauda transmittetur: folliculus mox disrumpitur (qui postmodum dentis vinculum, vt supra diximus, existit) dens nulus & durus prodit; verum & temporis successu in partibus exterioribus materiâ induratâ perficitur.

Vfus dentium primarius cibos & diuidere, frangere, comminuere, & ventriculo præparare. Alter, vocis formationi inservire: ad literas enim exprimendas incisorijs dentes plurimum conferunt, quod in edentulis apparet, qui literas aliquas pronuntiare non possunt, vt R S X Z. Et homo solos incisores orationis gratia habuit, licet non escas, intimi

Ooo 4

autem conficiunt, qui genuini vocantur. Dentes alijs rem vnâ tantum expediunt cibi confectionem: alijs non solum ad hoc vsui sunt, sed etiam ad pugnandum, vt ijs omnibus, quibus aut serrati, aut exerti sunt 2. part. 9. vide & 3. part. 1. alijs ad cibum, alijs ad vocis creationem, 5. gener. anim. 8. Os & dentes cibum extenuant & molunt, in introduct. 11. cibum diuidunt atque conficiunt dentes, nonnihil ad vocis articulationem conferunt, lib. definition. Medicarum. Homo dentes habet ad solum esum idoneos 11. vs. part. 2. quibus verbis humanos dentes armorum munire priuare voluit, & communem vsum cum Aristotele tribuere.

h Vnde 3. facult. nat. 7. & lib. de Anat. viuorum.

i Aristoteles 3. part. 1.

g Cicer. 2. de nat. Deor. dentib. in ore constructis manditur, extenuatur ac molitur cibis: eorum aduersus acuti diuidunt.

k Gal. lib. de
nat. & ord.
cuius corp.

non facile prius loquatur, quam triplex genus dentium extra gingivas promineat. Infans^k enim dum dentes non habet, vagit: dum vero duos vel quatuor dentes habuerit, mussitat, dum os dētes repleuerint, loquitur. Et quamuis incisores non parū vsus ad loquendum linguæ præbeant, non tamen omnem verborum prolationem æque adiuuant, sed quandam claram & facilem reddunt: his enim amissis, sermo

l Amissio dē-
tium inciso-
riorū in causa
est, ut mādū-
catio, atque
vna sermonis
explicatio la-
datur. Gal. de
diff. morb. 8.
m Gal. in com.
6. aph. 32.

n Turpe enim
est, edentulum
cōspicere, qua-
lem Phorecra-
tem Poetam
fuisse tradunt,
Laurent.
o Homer. cen-
suit.

tardior^l efficitur: aliorum vero, quæ ex T. & R. literis composita sunt, quasi organa sunt, & ad articulos eorum plurimum conferre, in balbis^m experimur: quorum lingua eas voces exquisite dearticulare nequit, quæ per T. & R. proferuntur, vt traulus & trepidus, quæ linguam se ampliantem^m & prioribus dentibus innitentem exigunt. Sunt, qui dentes etiamⁿ ad ornatum, & ad garrulitatem^o cōspescendam homini datos esse putant. Natura enim oris pulchritudini & dentium salutē cōsulens, gingiuis, ne horriduli essent, muniuit: Labijs vero, tanquam clypeo texit, vt septi instar aeris frigidioris ingressum prohibeant, frangant & immutent.

At brutis, quæ cornubus, vt boues, & vngulis solidis, vt equi, se tueri possunt, solius cibi gratiā dati sunt; ijs quæ ferratos & exertos dentes habent, & ad cibum comminuendum, & ad pugnam tributi sunt pro armis ad vim faciendam & repellendam: homini vero manus datæ sunt, quibus se tueri possit.

DE PALATO ET GAR-

gareone.

CAPVT LXXXIII.

De Gargareone egit Aristoteles 1. hist. animal. 11. 1. part. 17.
Galenus 11. vsa part. 11. & lib. de voce ipsomet atten-
stante.

PALA-

PALATVM superior oris pars est, quare Græcis ὑπερώα^a, alijs ἔρανος^b καὶ ἔρανίσκος^c, quasi oris cælum & Latinis palatum^d, quod dentibus ceu palis vallatum sit, dicitur [tab. 27. fig. 4.*] Hoc à faucibus ad dentes vsq; extenditur, & in fornicis modum concavum est, sed leuiter, non verò supra modum, ut ijs accidit, qui capite acuto sunt, quemadmodum Hippocrates^a annotauit: & est veluti cerebri basis, osse sphænoide, quod propterea Galenus^c τὸ κατὰ ῥῆν ὑπερώαν ὀστέον, aliquando appellat, firmata.

Constat autem partim osse, partim carne glandosâ osse duro & denso, ne ab excrementis delabentibus facilè computrescat, quod ipsi in lue venereâ accidit: hoc os vtrinque geminum est, siquidem ex maxillæ superioris osse quarto, cui dentes infiguntur, quod palati maximam regionem constituit, & osse sexto, quod eiusdem posteriorem amplitudinē format, componitur [tab. 3. fig. 9. A II.] & per medium futurâ diuiditur [tab. 3. fig. 9. x. y.] in cuius extremo foramina duo, per quæ cerebrum in os purgatur, habentur, sicque narium & palati maxima fit societas: quare per hæc ore clauso inspirare & expirare licet, & vijs narium obstructis, excrementa in ventriculis cerebri collecta per os reijciuntur. Verùm posterior pars palati ferè dimidia in fauces definens à latere in latus tensa, carne glandulosâ & satis crassâ constat.

Inuestitur tunica crassâ à durâ matre pronatâ, quæ caluariam egressa amplificatur, crassiorque red- litur, & vniuersum palatum & os internè succingit, & cum gulâ & cum ventriculo communis est: hinc palati & ventriculi consensus: palati enim tunica guttum habere debuit, quò tanquã prægustatore ventriculo inseruiat. Quare sensu & exactiore prædita est, cum neruuli à quarto pari, quod etiâ ad linguam

^a Hippoc. 6. epid. sect. 1. aphons. 2. Gal. 1. ad Glauc.

quoniâ summum in ore locum occupat ὅον enim superiorum domus partem, significat. sic ὑπερώα qui in intimâ adium parte est.

^b Arist. 1. hist. 11. ὑπερώον.

^c Galen. 12. vs. part. 11.

^d Quibusdam testudo & solium oris, Latrent.

^e Os sphænoides palati os ipsi dicitur, etiam si palatum vix contingat. 11. vs. part. 19. & 20.

^f Palatū cum vniuersâ & glandulis ac faucibus lues venerea mirè exercet. Vesal. palati & dentium corruptio glandularum in faucibus tumores, Fallop.

^g Dentes ac totum palatū

sensu exactio-
re indigebant,
Gal. 16. vs.
par. 3.

h Plinius cre-
nas appellat,
asperitatibus
scabrum Ar-
chang.

a Gargar, gur-
gulio, garga-
rion, sibilus
ac tintinabu-
lum à voce &
sonitu Vesal.
vula, vula,
columella, &
gargarcon,
Columb. co-
lumna, vula
seu gurgulio
Fallop. in Inst.
columella seu
gargarcon
Plat. vula,
gurgulio, plo-
strum Lau-
ren. Columel-
la infra, Ar-
chang.

b De morb. in
prognost. ubi

curatione inflammata tentati & ipsius praecisionem docet. c i. hist. 11. penitus verò
particula alia πινυλφρον κλον επιφλερον, vniuera, columella vena applicata.
d De tumorib. & 6. comp. med. s. l. 11. vs. part. 17. Ruffo. & Aretao 1. de sig. acut.
e Ut ex Aretao lib. 1. de caus. & sign. acutor. morb. 3. & lib. 1. cur. acut. 8. Egineth.
lib. 6. cap. 31. Aërio tetrab. 2. lib. 4. cap. 43. Erotiano in lexic. Hipp. colligere est.

f A titillatione, quem aspera arteria affert. Erotianus. g αεγοφους & τις
ιπερπικας Ruffo. h Natura sua neruus est sed humidus, Aretaus 1. sig. ac. s. fun-
gosa & carnea, Vesal. & Pat glandosum non autem carneum corpus, Fallop. glan-
dula, varolo, glandulosa caruncula, Archang. caruncula fungosa, Laurent.

distribuitur, ad eius partem posteriorem mittantur.
Hæc causa etiam est, cur caput masticatorijs euacua-
re non possimus, quin simul & ventriculus per pala-
tum euacuetur: euacuatur autem caput per pala-
tum, quia ex capite venarum capillamenta descen-
dunt, quæ in palatum desinunt. Tunica hæc palati
in quibusdam locis rugosa^h & aspera, quò cibi re-
ctius masticientur. Concauum est, vt aere reuerbera-
to, vox reddatur, & aër attractus tanquam in sinu
tepefiat, ne frigidus membra vitalia offendat.

GARGARCON^a seu Curgulio, γαργαραν Hippo-
crati^b κίων Aristoteli^c, veteribus Medicis κίων & γαρ-
γαραν, Galeno^d monente dicitur; propria ta-
men huius partis appellatio est γαργαραν; κίων verò
columna & σαφυλα; vula, ipsius malè affectæ^e no-
mina sunt. Nomen effectum videtur à sono, qui gar-
garizatu editur, aut à gargarismis, qui in eius affecti-
bus vsurpantur; ubi & titillatio^f quædam fit, quæ
γάρφαλος & γαρχίλη dicitur. Particula oris est, seu
processus^g quidam [tab. 27. fig. 4. E] à palati parte
penitiore, iuxta narium meatus in fauces spectantes,
in oris amplitudinem inter amygdalas [FF] supra
laryngis rimam [infra E] è directo propendens,
quemadmodum apparet, si quis ore toto aperto lin-
guam deprimat.

Substantia est glandosa^h, rubra, fungosa, quæ ex
glandosâ palati ferè mediâ parte propendet, non-
nul-

nullisⁱ ex palati tunicâ ad oris extremitatem re-
 duplicatâ, & aliquantulum oblongatâ enascitur: ex
 rotunditate longiusculâ, crassiuscula supernè, vbi pa-
 lato continuatus lata, inferiùsⁱ pyramidis inuersâ
 instar obtusè^k acuta (quare fundibulumⁱ nonnulli
 vocant) quæ pelliculâ quadam laxâ ac molissimâ ve-
 stitur, & venulas à venis palati tunicam nutrientibus
 in ipsius medium recipit.

Quòd si morbo afficiatur ab humoribus dela-
 bentibus, non ampliùs γαργαρεύει, sed κίων & κιονίς &
 σαφυλή & ἱμάς & ἱμάντων ᾗ appellatur; nam si æquali-
 ter à basi ad extremum crassescat, & in longitudinem
 protendatur & rubeat κίων, columna dicitur; n si ve-
 rò superior tenuis gracilisque reddatur & inferior
 tantum rotunda euadat & cum magnitudine liue-
 scat & subnigricet, σαφυλή^o, vna nominatur, quia ei
 figurâ (superiore parte pediculum referente) colore
 & magnitudine similis est. dicitur & κιονίς : hinc, qui
 gargareonis vitio laborant, κιωτικοὶ à Galeno p di-
 cuntur. Quare Galenus eos reprehendit, qui γαρ-
 γαρεύειν nomine σαφυλήν, Atticos imitati, donant.

Vfus ipsius est aërisⁱ inspirati frigiditatē tempera-
 re, ne subito in pulmones irruat, & sicⁱ sanguis frigi-
 di inspiratu, densetur, crassescat, pulmones ad motū
 tardiores efficiantur: sicq; ex valido conatuⁱ ad motū,
 vasa

ipsa particula dicitur Arist. Gal. II. v. s. part. II. Ruffo, Aretæo Archang. dicitur ta-
 men etiam de particula æqualiter oblongata Aretæo lib. I. sig. acutor. S. σαφυλή di-
 citur quidē de morbo Hipp. 3. pren. Arist. Aretæo I. sig. acutor. S. Egineth. l. 6. cap.
 31. at Hippoc. ipsam particulam sic appellasse videtur, in lib. de dentitione dum ait:
 infantes, quos inter sugendum tussis premit, ἢ σαφυλήν maiorem habet: & ibidem
 ait, serpentina circa σαφυλήν ulcera. Gal. 3. comp. medic. f. l. Archigenem reprehen-
 dit, quod columella inflammationem cum vniūgo σαφυλήν vocet, cum tamen lib.
 de Tumorib. idem faciat: imò ipse Arist. I. hist. II. si columella immodicè humefa-
 ta inflammetur, σαφυλήν vocatur, & suffocat. n Dicitur & κιονίς Aretæo lib. I.
 cur. acut. 8. Actuar. 2. dign. affect. 18. o Aretæus lib. I. sig. acut. S. p 3. Euporist.
 q 6. compos. med. f. l. 13. r Secundus vsus Galen. & Vesal. hunc unicum vsum
 ponit Laurent. f Aphrodisæus in Problem.

i Columb.

k Gal. 6. comp.
med. f. l.l Sic ait Ves. &
addit, nervus
nō admodum
participare.m Confundūt
auctores hac
tria nomina,
γαργαρεύειν,
κίων & σα-
φυλή. γαργα-
ρεύειν propriè
quidē ipsam
particulam si-
gnificat. Hipp.
2. de morb.Gal. II. v. s.
par. II. attā-
men Hippocr.
lib. de affecti-
bus ait, si σα-
φυλήν ᾗ ᾗ ᾗ
& suffocet, ef-
fectum hunc
quidam γαρ-
γαρεύειν vo-
cant; κίων de

et Voci ad magnitudinē & elegantia confert, Gal. qui proæ. primo vsu vocenset, sic & Vesal. 2. vsus Columb. vocem modulatur, Plat. voci ad suauitatem & modulationē veluti plectrum confert, Arch. u Solius hominis propria, Gorrao. x Aliquod vocis plectrum subinde destillationē a capite recipit, Ægineth. lib. 6. cap. 31. y Columb. asserit: & qui-

vasa disrumpantur, tabesq; sequatur. Dein ad ^t vocis modulationē, cum soli ^u homines & paucæ quædam aues obtinuerint; quare $\pi\lambda\eta\nu\tau\epsilon\sigma\nu$ ^x, plectrum vocis dicitur. Hoc enim dum ad palati cauum pendet, inter laryngem & narium cauitatem aeris percussio fit. Hinc ad pronunciationem non parum ^y conferre asserunt, & exemplis ^y eorum, quibus lues venerea exedit, vel quibus præfectum est, qui rauci admodum fiunt, probare nituntur. Verum exemplum habemus cuiusdam mercatoris, cui nunc ab aliquot annis gargareon ab acrium humorum defluxu absumptus est, qui tamen nullum vocis detrimentum persentit; sed corpus tabidum redditur. Quare in ijs, in quibus ex lue venereâ vox deprauatur, vlcera non solum gargareonem, sed magnam ^z etiam illius glandosi corporis (quod inter os palati eiusque tunicam positum est & palati extremum complere diximus) partem exedit; aut vbi palati os & membrana fuerint perforata. Addunt ^a & tertiū vsum ad aeris expurgationem nō nihil conducere; puluerē enim sibi applicare, qui alioqui cum aëre in laryngem deferretur. ^b

DE FAV-

bus exesa crocitare potius, quàm humano morē loqui: hac reprehendit Fallop. si quidem plurima habeat exempla, eorum quib. gurgulio exesus est, nullum tamen vocis detrimentum ipsis superuenisse. ^z Sic & Fallop. ^a Tertius vsus Galen. 11. vs. par. 11. Vesal. & Columb. qui vsus parui faciendus, cū cetera animalia ad terram magis spirantia, quàm homo, gargareone destituantur Vesal. ^b Humiditatem quoq; a cerebro precipitantē detinet, & partes illas, quarū motus penē perpetuus est, humectat, Columb. cui primus vsus est: gurgulio pendens supra epiglottida ac laryngē mediā, aliquid quod limpidissimū sit semper instillans humectat, talis est huius vsus, nō ille, quem ad temperandū aërem, aut cōmoderandam vocē adscribūt; hac Fallop. quā ratione receptaculum sit excrementorū a crebro descendentiū, cum nullam cauitatem nanciscatur, imò quoties imbuitur, laxatur, propendet, aut alio vitio conflictatur, Vesal. Vuula excrementū cerebri per infundibulū ad conan non delatum excipit, ad palatum, linguam & alia vocis instrumenta humectanda dispergit. quod superabundat, spūto ac sreatu eicitur: quemadmodum enim in fistulis artificialibus commodē sonus non fit, nisi aliquā ratione irrorentur: idcirco vuula humidum cerebri ad palatum destillans supra laryngis rimam è directo locata est, ut guttur & aspera arteria leuiter humectentur, Varolus.

DE FAUCIBVS.

CAP. LXXXIV.

ET SI FAUCIVM nomen ^a quandoque totam ^a Vniuersum
 eam capacitatem, quæ hians ore percipitur, de- ^a spatium ab in-
 notet: communiter tamen oris posteriorem & infe- ^a feriore maxil-
 riorem ^b partem seu spatium, vbi gulæ & asperæ arte- ^a lā intus cir-
 riæ ^c extrema concurrunt, quæ ore aperto & lingua ^a cumscriptum,
 depressâ conspicitur, significat [tab. 27. fig. 4. inter F & ^a Vesal. & Lau-
 I.] Græcis φάρυξ ^d & φάρυγξ ^e & ^f φάρυγξ ^e Galeno, qui de ^a rent. fortè ex
 dicitur. Quamuis φάρυξ varia significet & g fauces ^a Galeno, qui de
 & laryngem ^h propter partium vicinitatem, & qui- ^a lor. 15. corpus
 dem vel asperæ arteriæ caput tantū, aut ipsam quoq; ^a isthmum am-
 arteriam. Sic apud Aristotelem ⁱ collū seu potius gu- ^a biens, pharyn-
 la sic appellatur: optauit, inquit, quidam Philoxenus ^a ga nuncupari
 Erixius, quod heluo esset, pharyngem sibi esse grue ^a tradit.
 maiorem. Alijs glandulosa corpora omnia circa fau- ^a b Gal. corum.
 ces notat: vbi verò apud Hippocratem simpliciter ^a 3. in Progn. &
 φάρυγξ positum est, faucium affectus significat, vt ^a 4. aph. 34.
 eorum ^k asperitatem, vel ^l inflammationem. Dicitur ^a c 4. loc. affect.
 quoque locus hic ^m Galeno & ⁿ Hippocrati propter loci angustiam per metaphoram. si- ^a d Hipp. 4. aph.
 quidem ^o partes τὸ μὲν ^a 34. 2. Protrh.
 quidem ^o partes τὸ μὲν ^a 4. epid. part. 3.
 quidem ^o partes τὸ μὲν ^a lib. de flatib.
 quidem ^o partes τὸ μὲν ^a Aristoteli 1.
 quidem ^o partes τὸ μὲν ^a hist. 11. oris

φάρυγξ τὸ ὅ φάρυγξ. Gal. in comm. & Homero. c Hipp. de resect. corp. Russo
 lib. f Galen. in Hag. aut Medico, et si alias os hyoeides sic dici scribat. At Hesychio
 & Varino φάρυγξ ^g In coac. aph. 276. & Prog. fauces ulcerata cum febre &c.
 at precedent. aph. collum intelligere videtur per fauces graciles. h Hippoc. de cor-
 de bibit & in guttur: & lib. de ossium nat. potus per fauces & gulam. Gal. 2. plac.
 & 8. vs. part. sic & Praxagora vt Homeri Scholiastes testatur Suidas (& Gram-
 matici) masculini generis vocem, laryngi accommodat, foemini verò faucibus: sed
 parum hac curanda, cum Aristoteles mascul. genere pro Oesophago posuerit, ubi
 Athenaus foeminino utitur, in Phylloxenis Pharynge. i 28. probl. 7. 3. Ethic. Eu-
 dem. 2. & 3. Nicomach. 13. Athenaus lib. 1. at Orisbas. vult apud Hippocratem 2.
 aph. 15. labia, palatum & vnam significare. k 3. aph. 5. vt Galenus explicat.
 l 6. epid. sect. 7. aph. 1. m de musc. diss. 15. hac regio, quia angusta & oblonga est.
 isthmum appellant, corpus verò totum ambitus pharynx nuncupatur: nonnun-
 quam tamen partem inter os & gulam mediam sic appellat. vt 3. aph. 26. n Hipp.
 de dentitione vlcera & i φάρυγξ periculi plena.

63. aph. 26.
Galen.

quidem isthmus^o propriè terræ angustum tractum inter duo maria significat, cum in corpore vniuerso nulla regio sit æquè angusta, & interim tot instrumenta contineat. Nam in faucibus considerantur nariū foramina per palatum in os descendentia [*tab. 27. fig. 4. post*] de quibus in nasi historiā; faucium muscoli, os hyoeides linguæ radici subiectum, lingua, larynx cum epiglottide & œsophagi principiū, ac illarum partium muscoli, & nonnulli maxillæ inferioris: neruorum tertij, sexti & septimi paris propages: venæ iugulares, arteriæ carotides, & glandulæ, de quibus nunc.

a Tertium genus glandularum in faucibus, cui aliqui

DE FAUCIUM GLANDVLIS.

C A P. LXXXV.

duo genera ignorantes, tonsillarū & amygdalarū nomina tribuisse videntur, Vesal.

b Secundum genus, quas nimis oscitant, alij enarrarunt, Vesal. dicitur paristhmia, tonsilla, amygdala, faucesque, Columb.

c Primum genus glandularum quod ab Anatomes p-

GLANDVLARVM triplex genus in Faucium regione existit: primum est^a sub aurium radicibus, & vniuerso spatio inferioris maxillæ circumscripto, de quibus suprà post aurium tractationem egimus. Alterum est^b earum, quæ Tonsillæ dicuntur, de quibus nunc sermo erit. Tertium^c est, ad laryngim radicem asperæ arteriæ lateribus adnatum; de quibus in laryngis historiā.

scriptū fuisse, haecenus non obseruauit, Vesal.

TONSILLÆ [*tab. 27. fig. 4. F*] quæ à Celso^d simpliciter glandulæ appellantur: sunt glādulæ in utroque oris latere, ad linguæ radicem inter narium foramina & laryngem, seu inter œsophagi & asperæ arteriæ principium: vtrinque vna, vtcunque insignis, oblonga, amygdalis assimilata: quare à Latinobarbaris, & à nostratib. Amygdalæ dicuntur. Græcis παρ-
ισθμια^e, alijs παρὰ τὴν ἀσπερὰν τὴν ἰσθμῶν, quod in isthmo^f sitæ sint. alijs, quod gargareonis latera respiciat:

d Lib. 2. cap. 1. & 3. aph. 26. e Hipp. de dentitione: bifida oris compago παρὰ τὴν ἰσθμῶν Arist. 1. hist. 11. f Si ad loci angustiam

cat: si enim oris aperti cavitatem inspicias, & nariū foramina & gargareonē intuearis, foramina veluti quod maria, ipse gargareo veluti angustus terræ tractus inter illa deductus apparebit: quo nomine & ratō faucium & eiusdem inflātio, imò & glandularum & earū affectus significatur, vbi vel inflātur, vel supra naturalem modum augentur & veluti resiccātur, vbi & potūs & spiritūs iter, vt Paulus ^h loquitur, impediunt. Interdum tamen παρίσμιον nomine ⁱ solius tunicæ, q̄ faucibus, toti ori & ventriculo cōmunis est; interdum musculorū ⁱ tunicæ subiectorum, interdum ^k corporū, quæ in faucib. sunt, inflātio significatur. Dicuntur etiam ^l αντιάδες,

ἀπὸ τῆς ἀντικειμένης ἀλλήλοις, q̄ è regione sibi inuicem opponantur: verū & hoc nomen, nō solūm glandulis, sed etiā earum morbo ^l tribuitur: nōnulli tamē inter ἀντιάδες & παρίσμια distinguūt; volētes, p̄prie ἀντιάδες ^m inflammationē ipsarū tōsillarū, παρίσμια verò inflātionē partiū tonsillis circūiectarū esse.

Integuntur ⁿ tunica oris communi, quæ neruosa est, varijsq; in locis foraminibus satis amplis perforata, ita vt à nonnullis fungosa dicatur: quæ, vt rectè Gallopius monet, si glandulæ aliquando moderatè intumeant, Chirurgis imponere solent, ita vt vlcera esse credant, & partē ipsam tanquam vlceratam curant, cū tamen reuera vlcera non sint; siquidem glandularū tumore residente secundū naturā penitus se habeant: Venulas etiam à iugularib. recepēre.

Substantiā quidem sunt glandulis simili, sed rariore, magis spongiosa & valde fungosa, quare Hippocrati ^o ἀπόλοι, spongiæ dicūtur (qua tamen voce etiā

earum

stiam & instrumentorū hac sede frequentiam respicias, glādes aspera arteria adnata, cū in maioribus angustis reponantur, quam ha consilla dicta, potius παρίσμια vocitanda fuerint, Vesal. g Vi 3. aphor. 26.

h Lib. 16. c. 30.

i Galen. in corum. 3. aph. 16.

k Gal. lib. de

Tumorib.

l Hippoc. 2. de

morbis sic ait:

si antiades o-

riatur sub ma-

xillis ab utra-

que parte tu-

mor sit, qui ad

contactū foris

durius est, &

totus garga-

reos inflama-

tione laborat:

cū sic habue-

rit, digito im-

misso antiades

protrudisse p-

fuerit, &c.

n Celsus ad p-

Et Columbi-

idus tonsillas q̄ post inflātionē induere, à Græcis vocari scribit. Et addit hāc tunicā à durā matre pronatā, naves intus, palatū & linguā circū dare & duplicatā, vuulam constituere, eam descendere, œsophagi, ventriculi & intestinorū internam tunicā constituere, & post linguā, latā epiglottida, larynge, asperā arteriā ad extremos ramos per pulmonē delatos ambire. o 4. epid. par. 3. & Gal.

in exegesi scribit: αὐτοὶ οἱ νεκροὶ καὶ οἱ ζῶντες, in 4. Epidem. p Hipocr. de Gland. dicuntur glandula colli, qua fluxionem à capite decumbentem recipiunt: vsus fauces humectare, ait Col. q 11. vs. part. 10.

earum tumores expressit) eò quòd spongiarum more humorem combibant. Vfus harum est humiditatem p cerebri suscipere, in saliuam conuertere, omniaque in oris amplitudine humectare, & linguā q, ne exsicceetur, tardius moueatur, œsophagum & laryngem; quamuis etiam ad gustum faciat, siquidem gustatio sine madore non perficiatur: vt neque coctio in ventriculo sine elixatione, quod experiuntur ij, qui linguam aridam siccamque habent.

DE MUSCULIS FAUCIUM qui deglutationi inseruiunt.

C A P. LXXXVI.

Pharyngis musculos duos descripsit Galen.^a lib. de dissect. musculor. 15. & horum 1. de motu musc. 3. bis meminit.

a In faucibus musculus vtrinq; unus, tunc suo munere fungens cum vox editur, aut deglutitio fit: horum caput prope eos musculos sitū est, qui ab inferiorib. partib. in lingua latera ascendunt, Galen. memi-

FAUCIUM Musculos primus Galenus descripsit, quē Oribasius & Auicennas sequuti sunt, vtrinq; vnum constituentes; ex posterioribus Anatomicis primus Fallopius tria paria descripsit: quæ in ore inter palati & nariū amplitudinis tunicam locati sunt. Quatuor paria recensebimus, quorum duo dilatant, duo verò constringunt: quare deglutationi inseruiunt, cum ad cibi potusque ingressum fauces & dilatari & constringi debuerint.

Primum^b par principio tenui & neruoso à sphæroidis ossis apice, qui iuxta maxillæ inferioris cum

tempo-
nit & Oribas. & Auicen. cap. de gutturis musculis. sic ait Fallopius, Galenus lib. de dissect. muscul. duos faucium musculos describit, & reliquos pratermisit, & Vesalius leni negligentia pratermisit, quia Galen. de dissect. musc. liber nondum editus erat: at tria sunt paria, quibus lingua par quartum addi potest. Plat. sequitur Fallopiū, & ad loquelam necessarios esse refert: sic & Laurent. qui quartum par addit, quod ab alijs pro tertio pari communium laryngis recensetur, quos Oesophangicos vocamus. b Fallop. Plat. (cui gracile) & Laurent.

temporum osse articulationem exortum, gracile admodum per internam pterygoeidis cauitatem descendens, in tendinem, nerucum tenuem & latiusculum definit & rimam in pterygoeidis extremis insculptam transit & reflexum in palati cutaneam partem à qua gargarcon dependet, inseritur: & si ambo agant, palatum extremum cum gargarcone sursum & antrorsum trahunt: si alter tantum agat, tum in illo latus, in quo situs est, trahit.

Alterum par^c ab eodem ferè principio neruosum exoritur & deorsum declinans, faucium lateribus, ubi tonsillæ resident, inseritur, & totam ferè faucium lateralem ac posteriorem partem amplectitur: hocque tonsillas sursum & ad latera trahit, & faucium cauitatem totam diuellendo quasi dilatat. Hæc duo ariæ faucibus dilatandis inseruiunt, & quò minùs quida in vomitu ad superiora propulsa ad nares feruntur, prohibere volunt.

Tertium^d par faucium posteriorem ac lateralem cauitatem ambiens, inde ubi caput ceruici iungitur, exoritur admodum, & descendens in hyoidis latera & laryngis cartilaginem primam, aliquando etiam in linguæ radicem, sed obscurè, inseritur, & auces in deglutitione constringit: & vt credit Fallopius offæ deglutitioni inseruit, quatenus in ciborum deglutitione guttur subleuat.

Quartum^e par à styloideis appendicis, facie interna gracile admodum exoritur, ad anteriora declinat, & tendine membraneo laryngis cartilagini primæ, hyoeidis ossis lateribus & linguæ extremo inseritur; quare faucibus & linguæ par commune dici possit;

Ppp

siqui-

rerare possumus. Fallop. quartum par lingua Fallopij commune faucibus cum lingua, Plat. At Laurent. quartum par addit, quod ferè omnes laryngis esse putant, & communem vocant, qui à cartilaginis hyoidis lateribus exortus Oesophagum fibris circularibus & transversis amplexatur, & ita deglutitioni inseruit: ac ille.

c Fallop. Plat.
(cui latum)
& Laurent.

d Fallop. Plat.
(cui par peculiare)
& Laurent.

e Quartum
par lingua,
quod aequè inter
faucium
musculos ac
inter lingua
motores enu-

liber transitus relinquatur, cum faucibus & laryngi præponatur.

Hoc licet unitatis nomine exprimatur^k, vnicum & simplex non est, sed componitur ex ossibus^m ali- quod, quorum minimus^l numerus trium est; maxi- mus tredecim, magnâ tamen ex parte ex undecim in- viris atate prouectioribus constat, quæ laxo conne- xu cartilagine interueniente, quò in motu cedere possint, inter se iunguntur. Extrema autem, alio- rum ossium extrema non tangunt: quare recte Ari- stoteles, ⁿ ossa omnia aut continua, aut contigua es- se, voluit: hoc autem os, quod pensile est, & ab alijs separatim cum vicinis partibus alligari debuit: alias enim huic tanquam basi lingua hære non posset: quare musculorum & ligamentorum operâ conti- nuitatem habet: siquidem maxillæ^o inferiori cir- ca mentum, sterno, scapulis, occipitis appendici styloidei continuatur, & quidem per eam *συνφύ- σεναι* speciem, quam Galenus *συνάφνωσις* vocat.

Inter quæ ossiculum primum, quod medium ex- istit, cæteris maius & latius^p & cæterorum basis quæ- dam [*tabul. 28. fig. 4. A B C D*] anteriore & posteriore sede, quâ os respicit, conuexum, & in obtusum an- gulum desinit (quod supra laryngem tactu depre- henditur, ipsius processibus penitus latitantibus) partim, quò ab iniurijs extrinsecis securius sit, par- tim, vt musculi aliqui implantentur: interiore seu posteriore sede, quâ fauces spectat, cauum [*figur. 4. D S P*] propter duorum musculorum linguæ exortum, & vt ^q epiglottidi se aperiendi & attollenti cedat.

Sinus tres obtinuit, supernè quidem sinum trans- uersim depressum [*C*] quò secundum par musculo- rum sibi peculiare admittat, in medio extuberat [***] in eius lateribus dextro, scilicet & sinistro, alij duo

^k Archang.
qui non de-
scripsit, in ossi-
tamen catalo-
go pro vno re-
censuit.

ⁱ Sic & In-
grassias.

^m Ex quinq;
ossibus Vesali.
& Col. variis
ossiculis, Plat.
multis parti-
culis, Lauren.
ex undecim
ossiculis in vi-
ris, nonnun-
quam ex 13.

aliquando ex
9. aut 7. vel
etiam paucio-
ribus præse-
tim in pueris
& maximè
femellis, In-
grass.

ⁿ 3. hist. an. 7.
^o Galen. diff.

musc. 13. 7. vs.
par. 19. & Ve-

sal.

^p Leniter la-
tam, dissect.
muscul. 13.

^q Posterior in-
feriorque ossi-
culi porciõ ca-
ua & in si-
num addu-
cta, vt ce-

deret aperien-
ti ac sese at-
tolienti singu-
la, Columb.

sinus existunt, quò ad eius latera; primum par mu-
sculorum implantetur.

Processus ^r habet vtrinque binos à basi eductos
EFIK] cornua seu costas ^r vocatos, quibus ossibus
vicinis iungitur.

Duo inferiores ^t qui secundum & tertium os cõ-
stituunt [EF] vtrinque vnico osse constant & su-
perioribus breuiores & latiores sunt, & ipsius ossis
primi seu medij lateribus humilius [tab. 24. fig. 4. G]
cartilaginis & ligamenti cartilaginei satis lati inter-
uentu validè nectuntur: at extremis suis [HH] cum
ipsis nullum aliud os nectatur, cum processib. ^u car-
tilaginis scutiformis laryngis [tab. 32. fig. 2. & 3. IK]
copulantur: & hi processus cum ossiculo medio ima-
ginem ^v referunt.

^r Est autem
recta huius
ossis linea, se-
cundum colli-
longitudinem
extensa, os le-
niter latum,
quatuor verò
reliqua linea
obliqua sunt
& à prædicto
osse lato secun-
dam duas cõ-
iugationes
exoriuntur, de
diff. muscul. 13.
latera vocat
Auicennas &
Vesal. alterũ

Verum cum hoc os veluti pensile existat, satis ro-
boris habiturum non erat, si tantum cum laryngis
cartilagine iungeretur: quare duos adhuc alios pro-
cessus addidit, quo styloeci ^x appendici, quæ tem-
porum ossi affigitur, connectatur & firmet, quò in
medio facilè consistat. Quare duo ^y processus supe-
riores, qui quartum & quintum os constituunt [IK]
graciliores veluti styloecidis extrema teretes ^z longif-
simi

humilius, al erum superius: processus elatior & humilior Plat. additamenta, Fal-
lop. processus quatuor cornua vocat Laurent. l. Galen. diff. musculor. 13. ^r Ab
inferioribus altera coniugatio, qua mediocriter litorum ossium est Gal. n. l. c.

^u Alij processus non sunt ita prolixi, ut alijs, & per hos processus, os hyoides pro-
cessui stylium referenti in signi ligamento connectitur, Columb. cum arytanoide car-
tilagine duo vincula validè copulant, Galen. dissect. muscul. 13. at ceteri Anatomi-
ci cartilagini scutiformi iungunt. ^x Columb. vult à prædictis processibus non ab
his fieri. ^y A superioribus partib. altera ossium coniugatio quæ tenuium ac graci-
lium est, veluti styloecidis extrema & processuum styloecidis extremis iunguntur.
diff. muscul. 13. superiora ossicula seu latera, Vesal. duo processus, qui extremas ap-
pendices habent, qui cum superioribus laryngis lateribus suis ligamenti nectun-
tur, Columb.

^z Ex ossiculis ternis, aut quaternis inuicem iunctis compositi, Vesal. Plat. Lau-
rent. ad-

simi ad latus primi seu medij ossis sede elatiore committuntur, quibus sæpe vtrinq; tria officula addi solent, quæ 6. 7. 8. 9. 10. & 11. officulum constituunt, & ligamenti teretibus ac tenuibus styloeidis appendicis extremitatibus alligantur. [tab. 2. fig. 6. & 7.] & quemadmodum duo inferiores processus, seu secundum & tertium os cum primo literam v referebant; sic & hi duo processus superiores, siue cum primo quartum & quintum alijque vtrinq; aliud v efformant, ita vt duplex literæ v figura ex huiusmodi offibus resultet.

Aliquando processus superior vtrinq; vnico osse & satis breui ac gracili cõstat, & per ligamentum nerueum satis longum styloeidi processui adnectitur. Aliquando a processibus inferioribus tantum donatur, & superiora ossa quartum b & quintum cum alijs ad vndecimum vtque annexis, præsertim in c mulieribus defunt (quemadmodum figurâ quintâ, tab. 28. expressimus) tumque illorum locorum ligamenta c oblonga, teretia, valida & nervosa subeunt, quæ a medio seu primo officulo ad styloeidem d vtrumque abeunt, & tunc tria tantum ossa sunt: sæpe quartum d & quintum indurata reperiuntur, reliquis deficientibus tamẽ ossa quinque erunt: procedente d autem ætate reliqua, quæ tanquam additamenta sunt, quò magis siccescendo indurescunt, eò magis numerus augetur, vt septem, dein nouem, postea vndecim, & nonnunquam, quamuis rarissimè ad tredecim quoque perueniant.

Ppp 3

Tan-

tantum, quorum locum ligamenta subeunt, a medij officuli finibus ad processus styloiformes, Col. sæpe & sapius etiam reperi corpora mollia, qualia sunt fœminarum, os hyoides habere sine additamenti superioribus &c. Fallop. b Sic & Ingrass. c Vesal. Fallop. Plat. Ingrass. defunt hac aliquando, tum eorum vicem gerit vinculum validiss. Laurent.

d A styloeide osse exordiens in primi ossis superius latus inseritur, vt os vides in superiore parte firmaret. e 7. v. f. part. II.

rent. additamenta superiora, quibus cum processu styloeide iunguntur, quæ nunc tribus nunc quatuor officulis, & quasi intermedijs constare dicunt, quorum vtrumque nunquam videre potui, sed ferè semper reperi vnico osse breui ac gracili constare, quod ad styloeidem processum nequaquam pertingeret, sed per ligamentum nerueum satis longum admitteretur, Fallop. a Ex quinque ossibus construitur, aliquando tamẽ processib. pronatum inuenitur, nunc verò altero

c7. vſ. part.

11.

Tandem, ne os hyoeides ^e à mediolaryngis lo-
deuolueretur, & ad obliquū plurimū circumage-
retur, non solum musculis æquabilitatem & velut æ-
quilibrium Natura commisit, sed fortia quædam
ligamenta in duobus ^{uo}esid^{es} lateribus etiam con-
struxit, imò & alia cartilaginosa ac rotundo produ-
xit & utrique lateri inferuit, & etiam per ^e membra-
nas quasdam non modò ad laryngem ac epiglotti-
dem, verum etiam ad œsophagum stabilimenti quo-
que causa connectit.

f *Lingua pecu-
liare os, illiq;
uni deseruit.
Columb. in
gratiam ex-
tollendâ la-
ryngis factū.
processib. sty-
loideis calua-
ria connexum,
ut lingua ra-
dix innitatur,
& guttur mu-
sculis alliga-
tur, quibus
contractis sur-*

sum extollitur & remissis deorsum descendit, Varolus, solius lingua & laryngis
gratia constructum, Laurent. g Anguilla & murena in medium, Laurent.

h 1. & 2. par Vesal. & Ingrass. i Ex hoc osse musculorum lingua bona pars ha-
bet originem & musc. laryngis anterior coniunctio aliq; nonnulli, qui ad omopla-
tas feruntur, angustii, ac longi, aliq; & c. 7. vſ. part. 19.

DE MUSCULIS OSSIS hyoidis.

C A P. LXXXVIII.

a Galen. diff.
musc. 13. tres

De his Galen. lib. de diff. muscul. 13. 7. vſ. part. 19. a

CVM

CVm cibus ab vtraq; maxillâ & dentibus ijs in-
fixis ope muscutorum, buccarum, maxillæ in-
ferioris & linguæ comminutus, deglutiri & in ven-
triculū demitti debuerit, & deglutitio motus sit vo-
luntarius, ad hanc actionē obeundam musculis opus
fuit, à linguæ musculis distinctis, siquidem degluti-
tio, linguâ etiam immotâ, fieri possit, & linguæ mu-
sculi alios motus absoluant. Ac deglutitioni infer-
uientes ossi hyoidi proprios faciunt, cum ei & anne-
ctantur & id moueant & sursum & deorsum & in la-
tera: nam cum hoc os transglutitioni vtile fuerit,
mobile esse debuit. Verum musculi ossi hyoidi com-
missi duplices sunt: alij namq; ab hoc osse originem
ducunt, sed alijs partibus subseruiunt, vt sunt ij, qui
linguæ & laryngi inseruiunt: alij verò, qui ab alijs os-
sibus principium sumunt, & ossi hyoidi inseruntur,
ipsique proprii sunt, de quibus nunc: & horum mu-
sculorum paria quatuor recensebimus, licet sint, qui
sex adscribant. Duo enim paria linguæ adnumera-
mus, cum hyoidis & linguæ motus germani sint;
quare musculos plurimum commistos & connexos
habere, mirum non est.

I. Par^b, sterni hyocideos constituit [*tab. 26. fig. 2.*
QR] qui antèrùs sub cute occurrunt, asperæ arteriæ
& laryngis cartilagini thyroëidi incubentes, qui lato
& carneo principio, à sterni clatiore & inferiore sede
rectâ sursum delati, in ossis hyocidis basim & sedē an-
teriore^c carnosî implantâtur, totòq; ductu carnei &

Ppp 4

lati-

secundo pari Vesalii secundum & quintum par faciens: quod vero pro sexto pari
enumerat, videtur Vesalius pro primo pari lingua proposuisse: At Plat. quatuor
paria Vesal. proponit, duosq; Fallopij addit: Arantius ait sex potius esse quàm paria
quatuor, eo quod totidem in hyoidem inserantur ac desinant.

. b 1. par Ves. Columb. Fallop. Plat. Archang. Arantio (qui deglutitioni cum
4. pari præcipuè inseruire dicit) Laurent. 4. par Syluio. c Absque tendine Col.
terminatione carnosî insinuantur, Archang.

*dicat, coniuga-
tiones ossi lab-
doidi proprias,
breuibz mo-
tionibz os mo-
uentes: duo la-
ti os hyoides
inferior in ma-
xille coniu-
gentes: duo a-
lij in extremâ
maxillâ mu-
tuò inter se
colligati; duo
alij à radice
ossis styloëidis;
cateri ab osse
hyoide exorti,
aliarum par-
ticulariū causa
facti sunt: hi
in scapulas, a-
lij in linguam,
& ultra hos
reliquos fan-
cibus extrin-
secus insidet,*

*&c. Quatuor
musculorum
paria agno-
scunt, Vesal.
Columb. Ar-
chang. Lau-
rent. at Fal-
lop. sex recen-
set paria, ex*

d Deorsum re-
ctâ trahit Vesal. Columb.

Archang.
e An de hoc
Gal. diff. musc.
13. ultra hos
reliquos fan-
cibus insidet,
sive quis ipsū
unicum, sive
bifidum ap-
pellare velit,
sive duos sibi
mutuò adna-
tos, quod &
mihi satius
esse videtur:
hi asperâ ar-
teriam ad-
stringunt &
os lambdoi-
des retrahūt.
f 1. par Galen.
duo musculi

latiusculi sunt, inque medio secundum longitudi-
nem lineâ diuisi: hi os^d deorsum rectâ, simulque re-
trorsum trahit, & per accidens arteriam asperam^c &
cartilaginem thyroeidem muniunt.

II. ^f Par : Geniohyoeidei [tab. 26. fig. 2. S] sub
mento sunt, & quinto maxillæ inferioris pari subij-
ciuntur [tab. 26. fig. 2. O] ampli sunt, & breues,
omniq; ex parte^g carnei, & à maxillæ inferioris par-
te internâ vario fibrarum ductu exoriuntur, & in of-
sis hyoeidis sedem mediam, in quam & primum par
infigebatur, eadem pene latitudine inseruntur: hi re-
ctâ^h sursum & modicè antrorsum trahunt.

III. ⁱ Par : Styloceratocidei [tab. 27. fig. 2. T.] si-
militer sub mento situ obliquo quinto maxillæ pari
exteriùs^k attensi, graciles, teretes, à stylocideis appen-
dicis radice supra quinti maxillæ musculi exortum
prodeunt, & in hyoeidis cornua vel laterales partes
desinunt, & aliquando in medio^l perforantur, vt
musculo maxillam aperiendi aditum præbeant; hi os
m in latera & nonnihil sursum mouent.

IV. ^u Par:

lati ex transversis rectâ lineâ: ipsius ossis hyoeidis partibus enati in maxilla infe-
rioris partes transversas post musculorum maxilla priorum exortum inserun-
tur. 2. par Vesal. Columb. Fallop. Plat. Arantio, Archang. Laurent. 3. par Syluio.

^g Vesal. interna sede carneum dicit; at Fallop. quasi cutaneum, quare Fallop.
duo facit paria, partem cutaneam pro 2. pari, carneam pro 3. pari recensens. ^h Os
sursum trahit rectâ, Col. Fallop. sursum & modicè in exteriora Vesal. sursum si-
mul & antrorsum, Archang. linguam partim rectè, partim obliquè producit,
Arant.

ⁱ 3. par. Gal. à radice ossis stylocideis incipiens in rectâ ossis lambdoidis lineâ in-
ferno termino utrinque unus inseritur: hac Gal. Vesal. Col. Fallop. Plat. Arant.
Archang. 1. par Syluio. 4. par Laurent. ^k Gracilis & teres Ves. subtilis & parui,
Col. tenues & parui Archang.

^l Fallop. Plat. Laurent. ^m Hinc os aut in dextrum aut in sinistrum reuella-
tur, prohibent, & nonnihil sursum & introrsum contrahunt, Vesal. sursum attra-
hit, Columb. in latera idque sursum, Archang. sursum & magis introrsum trahit,
Fallop. ad latera mouet, Arantio.

IV. ⁿ Par: Coracohyoidei [tab. 26. fig. 2. V V. t. 27. f. n 4. Par Vesa. 3. V V.] hi sub scapulæ musculo ^o quarto latitant, graciles P & longi sunt, & ex scapulæ elatiore sede iuxta Colum. Fallo. eius cervicem ex processu coracoeide exoriuntur, & Plat. Arant. oblique sursum sub capitis musculo septimo delati Archæ. 3. par, in hyoeidis inferioris processus principium, vbi & Lauren. 2. par tertium par, implantantur: & hi ⁹ in latera deorsum Syluio, Gal. 4. trahunt: Hoc par longum est, vtrinque; carneum, du- admin. anat. scapula pro- blicque ventre donatum (quare Digastricus Gale- prium, eā sur- agēs: at 11. vs. par. ossi hyoei- no dictus) at in medio non secus, quam quartus ma- di adscribit: illæ musculus, gracile ac nerueum ^r est, tendinis rursus 13. vs. nodo extenuatum, fortè, vt capitis musculo septi- par. inter sca- pula motores no [K.] qui hîc illi insternitur, quasi digniori ce- recēset: idcirco lat,

De vsu horum musculorum quædam adhuc lu- à Vesalio, Col. et addere: sunt qui non motioni, sed tensioni poti- & Lauren. ar- us dicatos censent, & os ^r hyoides nectere, stabilire, & guttur. elut suspēdere. Alij ^r deglutitioni inservire, & hyo- o 3. Vesal. Pla. idis pprios esse. Alij vero ^u cum hoc os linguæ basis p Nullus uni- uersi corporis t, & rei cuiusq; basis nulla ratione loco moueri pos- his simul & t, quin simul moueatur & illud, quod basi stabilitur: gracilior & longior occur- ratuunt, hos musculos linguam ipsam pro arbitrio rit, Vesal. sub- mouere, & quidem eò magis, quod linguæ adeo fre- tilis & longus est, tamen ne- quentes motus vix à tam paucis atque exiguis in lin- que prolixior est, neque gra-

PPP 5

guæ

lior aliis musculis, vt Fuchsis visum est, Colum. q Deorsum ac vtrinque ad la- era os detrahit, Vesal. deorsum oblique trahit motu opposito, Col. retrahit deorsum etia vtrisque agentibus, deorsum oblique, si alteruter, Plat. eidem vsus, quo 3. par amulatur, Arantio. ^r Eneruationem vocat Vesal. tendo in medio, Colum. in me- tio exangues & neruei, Laurent. non meminit Archang. ^r Laurent. ^t Archang. ui deglutienti instrumentum ponit, glandulosam illam substantiam ossi hyoeidis mplicatam & connexam, qua musculorum deglutitorum siue deuoratoriorum ariam quatuor habent, qui motus illos edant. ^u Musculi ossis hyoeidis ad linguo- motum destinati. Nouem musculorum paria lingua motibus destinata sunt; si x uidem hyoeidi inserta, qua insignioribus eiusdem actionibus presunt, vt primum, rtium & quartum: Communia vero, secundum, quintum & sextum, qua cum opriis lingua musculis cōnexionem habent, mutuamque inter se & complicatam aram, mento vix perceptibilem, prestant. Arant.

guæ substantiam desinentibus musculis perfici posse videatur: quare hos communes linguæ & hyoeïdi musculos appellare licet; in quos nerui à sextâ coniugatione distribuuntur.

D E L I N G V A.

C A P V T LXXXIX.

Aristot. 1. hist. anim. 11. 2. eiusdem 17. præsertim vero 2. part. an. 17. (vbi de varietate in quibusvis animalibus tractat) egit. Galen. vero 8. vs. part. 5. 9. eiusdem 8. 11. eiusdem 4. & 10. 16. eiusdem 3. & de dissect. musc. 14.

*a Varroni, q
cibū liget, vel
quod dentium
septis, quasi
muro circum-
vallata atq;
ligata sit.*

*b, Aristotel. 2.
part. 17.*

*c Cicer. 2. de
nat. Deor. gu-
stus habitat
in eâ oris par-
te, quâ escule-
tis & poculen-
tis iter natura
fecit.*

*d Os capiti ad
iacere erat ne-
cesse, aut poti-
us linguam i-
psam contine-
re: neque enim*

*nudam ipsam &
penitus sine operimento esse melius fuit, neque alio potius quouis,
quam ore tegi. Etenim saporis, ibi locata, melius erat dijudicatur, loquendique in-
strumentum melius futura, ciborumq; masticationi ac transglutitioni non medio-
criter opitulatura, Galen. 8. vs. part. 5. e Pyramidem refert, Archang.*

*f Sedis ac firmitudinis gratia magna ad basin ac fortis fuit, celeris motus causa
ad extremitatem tenuis, 11. vs. part. 10. g 2. part. an. 17.*

Lingua vulgo à lingendo ^a γλωσσα & γλώττα Gre-
cis, loquelæ & gustus instrumentum est, quod in
ore palato ^b subiacet [*tab. 27. fig. 4. I.*] eâ parte, ^c quâ e-
sculentis & poculentis natura iter fecit, & basi suâ
ossi hyoeïdi, supra quod mouetur, incumbit, iuxta-
que epiglottidem angulum constituit, indeque in o-
re liberè vagatur. Debuit enim prope cerebrum ^d
collocari, sicut & reliqua sensoria, cum gustus præci-
puum instrumentum sit: ideo natura ipsius gratia os
imprimis ad caput efformauit, in quo tanquam an-
tro resideret, vbi & gustus & loquelæ instrumentum
foret, & masticationis atque transglutitionis officii-
um melius adiuuaret.

Figura non omnibus animalibus eadem, cum a-
lijs trifulca, vt serpentibus; bifida, vt lacertis; duplex
vitulis marinis; piscibus totâ adhærens; leonibus ac
pardis, asperitatis imbricata: at homini oblonga, ^e in
radice, crassa, f. roboris gratiâ, lata, vt ad ^g vtrumque

offi-
cium ^f penitus sine operimento esse melius fuit, neque alio potius quouis,
quam ore tegi. Etenim saporis, ibi locata, melius erat dijudicatur, loquendique in-
strumentum melius futura, ciborumq; masticationi ac transglutitioni non medio-
criter opitulatura, Galen. 8. vs. part. 5. e Pyramidem refert, Archang.
f Sedis ac firmitudinis gratia magna ad basin ac fortis fuit, celeris motus causa
ad extremitatem tenuis, 11. vs. part. 10. g 2. part. an. 17.

ciū commodā sit, hoc est, ad saporē percipiē-
 & ad literas exprimēdas, quæ *πρόσλωσις* dici-
 ; quæ in extremitatē (*πρόσλωσις*) tenuē &
 icronē acutū sensim definit, quō velocitē mo-
 i possit, cum faciliōris motus gratia non eandē
 sitiem vndiquaque habeat. Superior vero pars &
 erior *ἐπιγλωσσική*, excauatione vtrinq̃ue *χηραμοὶ* &
πρόσωπα nominantur. Lingua enim ē mollis, lata &
 oluta, quō contrahi, produci, dilatari, denique
 ie efformari possit: vt patet ē in ijs, quibus non sa-
 soluta est; blasi enim, ^h balbi & torti sunt, quod vi-
 m literarum defectus est. Sic videmus apes, & quæ
 ras proferre possunt, lingua latiore esse cæteris: sic
 ad rēpēdēs vocem parum explanare possunt, vt
 æ linguā, durā, crassā, & minime absolutā
 hent.

Magnitudo huius in omnibus animalibus eadē
 n est, sed tanta, quanta quæque species require-
 ; nec in ipsis hominibus eadē est, longa tamen
 gis, quam lata, & lata magis, quam profunda; attā-
 n tanta dici consuevit, quanta i oris amplitudini
 congruat (quo in omnem eius partē pertingat) &
 æ ciborum ingestionē minime impediāt. Vē-
 m ^k nō solum magnitudine, sed & substantiā v-
 cum musculis saepe peccat: nam si iusto maior sit,
 s fauciumque spaciā repleat, cum expedite mo-
 tū nequeat, blasi & balbutientes efficiuntur, ma-
 ne, si nimia quoque ^l mollities (quod vt pluri-
 um fit) adsit, quare & infantes, & qui præ cæ-
 ris humidiores sunt ob linguæ eiusdemq; muscu-
 rum mollitiem, articulatas voces serius proferunt,
 iousque ætate caloreque simul augeſcente, humi-

^h Quæ causa,
 vt linguā ha-
 sitates aliqui
 fiant, quarit
 Aristot. dein
 cur hōmo so-
 lus ex omni-
 um animar-
 tium numero
 linguā haſi-
 tans oriatur,
 ii. probel. 54.
 & 55.

ⁱ Lingua mo-
 les ori ad a-
 muſſim ada-
 ptata eſſe de-
 buit, quo in o-
 mnē eius par-
 tē pertingat:
 quod ſi minor
 eſſet, haud-
 quaquā potu-
 iſſet: nuſquam
 autem a loci
 anguſtia im-
 peditur, quod
 facillime ei
 accideret ab

moderata magnitudine, xi. vſ. part. 10. ^k Arantius l. Hac aut lata est, aut an-
 ta aut mediocris, qua quidem optima ē exploratissima est: item aut absoluta
 & conſtricta, qualis tortorum, balborumq; est. i. hiſt. anim. ii.

ditas nimia absumatur. Breuitate etiam interdum peccat, ob funiculum eius non satis refectum, quo impeditur, quo minus se ori vndique applicare possit; vel quod ob minores musculos celerius agitata, sermonem implicat, orationemque præcipitem reddit.

Connectitur posterius, tum laryngi, tum ossi hyoidei, cui radice sua, quasi basi nititur & sustentatur, tum faucibus, vtrinque vero tonsillis; at inferius ligamento.

Componitur autem lingua carne propriâ, tunica, nervis, venis, arterijs, musculis & ligamento.

m De hoc ligamento 11. vs. part. 10.

n Facit, ut lingua exerta melius sic retrahatur, Plat.

o Ligamentum, cui fibra musculorum firmantur, lingua ossis vice autem est, Vesal.

p Arantius. Laurent.

q Archangel. & Laurent.

^m Ligamentum [tab. 29. fig. 3. 11.] enim validissimum membraneum & latum corpori ipsius medio subijcitur, quod præter id, quod suâ soliditate & robore ei attollendaⁿ & exerendæ prodest: sine hoc enim lingua aliquândo nimium in se retrorsum colligeretur, nec facile exerta intro traheretur, nec si vndique soluta esset, sedem stabilem & tutam obtineret: hoc enim munere fungi, quoties id præscinditur, aut propter nimiam humiditatem laxam resiccamus, experimur. Propriorum etiam musculorum insertioni^o excipiendæ præcipue factum est, aliàs facile aut laxati aut diuulsi fuissent. Ligamenti huius extremo versus linguæ mucronem funiculus adnascitur, quæ linguæ frænulum^p vocant: homines cum lingua, in infantibus modo natis ad extremum vsque vinculo connexa reperitur, quod obstetrices aliqua ex parte vngue diuellunt: aliquando vero inciditur, eò, quod locutioni impedimento sit, imò & suctioni. Nam cum incitata^q & volubilis naturâ suâ esset, ne fort indomita plus æquo in loquacitatem solueretur, et tanquam fræno cohibetur. Quare & ligamēti & frænuli beneficio & musculis plurimis simul agentibus & ad suam originem contractis, lingua angusta & acumi

luminata efficitur, eadem attollitur, & varie agitur, & ne plus iusto ad omnem regionem moueri possit, impeditur.

Tunica ^r ori, palato, œsophago & laryngi communi inuestitur [tab. 29. fig. 1. AA. BB. C.] ne linguæ substantia laxior diffiliat: quæ tenuis, ^r quo sapor eam facile penetrantes in linguæ pulpam & substantiam expedit subeant, in quam, ut & carnem ipsius nervi sensifici disseminantur.

Substantiâ ^r est mollis, & spongiæ instar, rarâ, laxâ, & humore, saporum vectore, facile imbuatur, & saporibus discernendis idonea sit, cum omnium saporum differentias ^u agnoscat, & in morbis variæ afficitur, & quando humorem aliquem imbibit, ut in intericticis & febricitantibus contingit, deprauati sensus causâ esse solet. Est autem caro peculiaris, quæ in reliquo corpore non reperitur, ad glandosam naturam, præsertim ad basin, potius accedens, quam ad musculosam substantiam, quâ multo mollior est,

omni

^r Tunica Col. Fall. Archang. membrana (binas dicit Ves. una musculus communis, quæ est interior: altera eius tunica pars censetur, quæ os vniuersum succingit) Plat. Laurent.

^r Crassa & dura Plat. prætennis, Arch. tenuissima Laurent. hanc ex nervis sensificis amplificatis contexti a-

liqui censuerunt. ^t Carne soluta, rara, fungosa constat, 1. hist. 11. musculoſa & cor-
^u is instar fibrosa, Vesal. Plat. ^u Lingua humorum præstantiam colore refert, adeo-
que per hanc ad humorum dignotionem peruenimus, Hipp. 6. epid. sect. 5. aph. 15. lin-
guarum plurimarum index cur possit esse? cur amara, salia, acida, fieri possit, nõ
autem dulcis? cur tot coloribus euariet, quod cutis? 34. probl. 4. s. & 6. ^x Substan-
tia & caro lingua principalissimum gustandi instrumentum, Archang. musculoſa
dici nequit, cum per eam fibra excurrant nullæ, sed peculiaris caro, qualem in reli-
quo corpore nullam reperias, Laurent. Musculos duos aliqui ex hac substantia faci-
unt: hi enim Vesal. alij inuicem mixti raro corporis partem efformant, duorum vel
uti oblongorum musculorum concursum, qui in ipsorum medio ligamentum adipi-
ſcuntur, & hi omne fibrarum genus obtinent, quid ipsis peculiare, cum cæteri cor-
poris musculi unicum fere fibrarum genus obtineant: hac Vesal. Nouem sunt mu-
sculi præter ipsius substantiam peculiarem, quæ cum caro confusa sit, inter musculos
adnumeranda non videtur, et si alia ratione, quod voluntate iubente moueatur,
non videatur à musculorum numero seiungenda, quod si fiat, duo musculi nouem
musculis addedi sunt: nam videntur esse duo musculi, cum lineam cæcidam in me-
dio habeat: igitur duo prædicti musculi à basi ossis hyocidis emergunt, & in summâ
linguam desinunt, & hoc primum par erit, Col. addunt aliqui duos musculos, qui
lingua

lingua pul-
pam & sub-
stantiam con-
stituunt, me-
dia linea usq;
ad linguam
extremam di-
uisos. Sed si
musculi essent,
eorum munus
duntaxat es-
set mouere &
non gustare:
nullus enim
musculus gu-
stat: hac enim
pulpa prop-
rium gustus in-
strumentum
est, Archang.
Lingua mu-
sculis non est,
quod eius de-
finitione

omni fibrarum genere donata, quæ adeo intertex-
ta, vt à se inuicem sciungi nequeant, quod tamen in
musculis fieri potest: per quos etiam secundum lon-
gitudinem fibræ feruntur, non vero per linguæ lon-
gitudinem: nullæ enim fibræ ligamentales ad robur
(præter medium illud, quod sub lingua fertur) vt in
musculis: nulli denique nerui à cerebro, qui moti-
uam facultatem tribuant: per ipsius substantiam in-
teriore discurrunt: quare musculosa dici nequit.
Huius radici præter musculos in eam insertos, & a-
deps duriusculus copiosus adhæret.

² Nерuorum duplex genus ^a lingua recipit, alte-
rum molle, sensificos nimirum à tertio quartoque
pari, ita tamen, vt ramus vnus in tunicam linguam
inuestientem disseminetur, tanquam tactus instru-
mentum, cum ipsa lingua tangibiles qualitates, vt ca-
lorem, frigus & cæteras percipiat.

Alter vero neruus in linguæ carnem, quæ gustus
instru-

minime subeat, & ad eius constructionem particula arbitrarij motus organum
constituentes minime concurrant, Arant.

Y. Cur nullius animalis lingua pinguis est? an quoniam pingue vnumquodque
densum est: lingua autem rara suâ naturâ propterea est, vt percipere possit genera
saporum, 10. prob. 21.

z. De neruis egit 9. vs. part. 8. & 12. 16 eiusdem 3. de dissect. neru. cap. 3. & 8.

a. Tertia neruorum coniugatio gustatoria est, Galen. de dissect. neru. 5. Tunica pri-
uatim tertij paris neruorum cerebri præcipuas portiones sibi vendicat, quarum be-
neficio lingua gustus organum efficitur: at à septimo præcipuo pari & à sexto, lin-
gua musculis motus præbetur, Vesal. Neruorum quartum par in tunicam inseritur
gustus causa, quorū pars ad palatū, at 7. coniugatio duos neruos gignit, 2. motus gr.
tia huic parti addicti, Col. Nervi duo, aliter gustatiuius tertij paris præcipua portio:
motiuus septima coniugatio portio, Plat. duo genera alij gustatoriij, qui sunt 1. paris,
à quo ramus vnus in membranam linguæ, vt tactus sit instrumentum, ramus
alter in lingua carnem gustatus instrumentum disseminatur: alij lingua motores,
sexti paris (intelligit aliorum 7. par.) qui per musculos disseminantur, verum &
ab 8. coniugation. ad musculos linguæ, & vocis laryngis & maxilla inferioris per-
ueniunt, Archangel. Neruorum tria paria, duo per tunicam ad gustum, postre-
mum in lingua musculos ad motum & locutionem, Laurent. à cerebro nerui multi
disseminantur, Fallop.

Instrumentum est, spargitur, & ita lingua saporē apprehendit. [tab. 9. lib. 2. fig. 1. V V.] Alterum durum, notorios puta, septimum videlicet par, quod multis circulis in musculos disseminatur, quo lingua motu voluntario moueatur, & cum in inferiore parte collocetur, cauendum diligenter, ne vna cum ligamento, quoties excindendum est, neruus quoque incidatur.

Venæ etiam binæ satis insignes, à colore magis, uam figurâ ranarum, Raninæ dictæ, à iugularium externarum ramo interiore [tab. 7. lib. 2. T. X.] pronæ sub linguâ, vt eâ subleuatâ, conspicuum fit, feruntur, quæ in affectibus oris, faucium ardore & angina, post sanguinis euacuationem & renulsiōem, iumerariâ sectâ, ad deriuationem inciduntur.

Arteriæ etiam duo maiusculæ, vtrinqve vna, à arotidibus venas comitantur [tabul. 12. lib. 2. h.] quæ nguæ concessæ ad vitam, quemadmodum venæ ad utritionem.

Corpus linguæ; etsi continuum sit, nulloque secto^c diuisum, propter gustandi commoditatem & cibos conterendi, & loquendi in homine, diuiditur tamen mediante lineâ candidâ, quam primus Hippocrates^d *διπλήν*, medianam vocauit, quæ ipsam medianam superficiem percurrit, in dextram & sinistram quasi diuidens (non tamen, vt^e in serpētibus) eminamque facit, quemadmodum omnia reliqua instrumenta: quare Galenus duplex membrum^e esse pronuntiauit.

Vfus linguæ: etsi lingua pusillum membrum sit, magni dispersâ; quod

illa quidem coniugatione saporē discernere, hac autem motu voluntario moueri ipsam oportebat. 10. vs. par. 10. idem 16. vs. par. 3. c. 9. vs. par. 8. & 10. d. In Coacis. Summa eorum lingua bifida est, vt in lacertis, & vitulo marino, 2. hist. an. 17. & par. 17. quibusdam animalib. vt serpentibus lingua diuisa est, 12. vs. part. 10. Edendo, bibendo, loquendo nobis præsto est, & gustandis saporib. opportuna, Col. vs.

^b Multa & tenues vena ad linguam procedunt, præter eam, qua sub linguâ est, aut sub maxilla res dentes feruntur. Hippoc. de oss. nat. lin-
^c quas duas habuit in seipsâ inferiorem arterias, vtrinqve vnâ, duas etiam venas, ac r. enorum coniugationes duas, alteram mollem, alteram duram: illam quidem in extremam ipsius tunicâ distributam; hanc autem in musculos

*usus alius pri-
marius, ut sit
organum gu-
stus & vocis
articulatae: se-
cundarius, ad
ciborum inges-
tionem, in ore
agitationem,
ut & ad lam-
bendum & fi-
stulandū, Pla.
usus quadru-
plex, duo com-
munes omnib.
animalibus. 1.
ut gustet, &
sapores inter-
noscat. 2. ut
esculēta ver-
sus dentes mo-
ueatur & cō-
minuatur, &
ut eius motu
deglutiantur.
3. in quibusdā
animalib. ut
vocis distincta
fictrix sit. 4.
ut solius ho-
minis propri-
us, sit mentis
intellective &
volūtatis nū-
ria, Archang.
Gustus & lo-
cutionis organum ad sapores percipiendos, truden-
dos & transmittendos in gulam
cibos, & literas exprimendas, Laur. g. 1. hist. anim. 11. h Ori inest pars sentiens sapo-
rem, lingua vim istam sentiendi obtinens, praeipue parte sui primore, nam si inte-
riore tangat, minus sentiet 1. hist. 11. lingua non quavis sua parte sensum saporis ob-
tinet, sed extrema potissimum, ideo piscibus particula hac tantummodo discretā
habetur 2. part. an. 17. i Lingua in voce formanda quid conferat, Hippocrat. de
carnibus, k 2. de anima, cap. 8. l Lingua minister cerebri, Hippocrat. de sacro
morbo.*

magni tamen usus est, cum omnes animi conceptus
exprimat: quare Summus Opifex eam multis muni-
uit dentibus & labijs, frænoque firmavit, quo sic cu-
stodita mentem non præcurrat, sed prius deliberet,
quam proferat. Cuius usus alius primarius, alius se-
cundarius. Primarius, ut sit instrumentum gustus &
vocis articulatae. Gustus (qui usus homini cum cæte-
ris animalibus communis est) ut gustet, & saporum
differentias omnes internoscat: quare Aristoteles g
dixit, ori inesse τὸ αἰσθητικὸν χυμὸν γλῶττιαι, sentiens
saporem linguam. Quem tunica os succingens, præ-
cipuæ, quæ linguam inuestit, efficit, eoque commo-
dius, quod lingua in masticatione, dum cibis vndiq;
se applicat, gustum ipsorum melius percipiat, & cum
illa exeri possit: illorum etiam, quæ extra os posita
sunt, saporem, quibus admouetur, deprehendat, ma-
xime apice suo, cum sensus hic in primâ linguâ, ut
Plinius secutus Aristotelem h asserit, subtilior sit. Vo-
cis i vero (hinc Aristoteles k naturam linguâ ad lo-
cutionem & gustum vti scripsit) ut sit vocis articula-
tæ edendæ organum (quare αἰγελὸν λόγῳ, sermonis
nuntiam Euripides nominavit) quam solus homo,
cum linguam absolutam habeat, in loquelâ perficit:
quamvis etiam in quibusdā animantibus vocis di-
stinctæ fictrix & moderatrix sit, ut in psitaco, merulâ
& alijs quibusdā animantibus, quæ voces distinctas
proferunt, ita ut tanquam homines loqui videantur.
At in homine l intellectus & voluntatis nuntia est: in
bru-

brutis vero mentis sensitiuæ tantum, non intellectus, quam Galenus^m rationem delitescentem nominare videtur, & in omnibus animantibus etiam rationis expertibus collocat. Linguâ enim exprimuntur quædam, quæ solum sub sensum, quædam quæ sub mentem & intellectum cadunt.

Secundarius vsus adⁿ masticandum & deglutendum; quo eius motu alimenta assumpta deglutantur, si animalia dentibus careant: at si habeant, res omnes esculentæ in ore^o versus dentes moueantur, ut ijs atterantur, comminuantur, & ad feliciorem ventriculi coctionem, præparentur, ne quid non molitum deglutiatur. Verum & eius ope cibi in œsophagum protruduntur. Denique ad lambendum quoque & fistulandum ore collectæ & lingua dentibus inferioribus affixa, facit. Quæ omnia in homine lingua præstat, at in multis animalibus, vel vnum vel plura efficit. Ex his vsibus primus præcipuusque, & ad vitam necessarius videtur, siquidem gustus secundo adiungatur, cum natura p^a à plantis ad animal perficiendum gradatim incedat.

ⁿ Sapores diiudicat, loquendi instrumentum est: ciborum masticationi ac transglutitioni non mediocriter opitulatur, Ga. 8. vs. par. 5.

^o Lingua ad masticationem non minimum cōfert, ut quæ instar manus cuiusdā cibos in ore assidue transfert ac

voluit, quo pars ipsorum omnis ibidem conteratur, Gal. 11. vs. part. 4. p Gal. 2. de sem. 5. sic habet, ita fit, ut quasi gradus quosdam habere videatur natura, primum cum parum à plantis recedens, tactu, hoc est, vno tantum præditum sensu animal fingit: secundum, cum gustatum: tertium, cum olfactum adiungit: quarto gradu postmodum progressa auditum, quinto visum addit.

DE LINGVÆ MUSCULIS.

CAPVT XC.

Vide Galen. de dissect. musc. 14. & 11. vs. part. 10.

Cum lingua in tres potissimum fines comparata sit, ut loquatur, gustet, cibumque reuoluat, & absque motu absolui nequeant, Natura^a musculos tribuit, qui à tribus hisce actionibus & locutorij & gusta-

^a Bubula lingua sedecim esse musculos.

Qq q

gusta-

dicat Præ-
ptor noster Pe-
lops, nobis ve-
ro octo sunt:

qui à processi-
bus acum re-
ferētibz pro-
deunt, *πλά-
γιοι*, i. trans-
uersi seu late-
rales vocantur;

qui ab obliq-
uissimis *λ῀δοι*,
eidēz partibus
λ῀γοι, i. obli-
qui; sicuti, qui
à superiore e-
iusdem *λ῀δοι*
eidēz partibus
termino ena-
scuntur, *ἑνθεῖς*
recti appellā-
tur: subiiciun-
tur illi, qui si-
bras *ἑνθεῖς*
as, idest, trans-
uersas habēt,
à totā linguā
exorti, & in
maxilla ferē

gustatorij & cibi reuolutores dici possunt. Nam in
homine locutionis potissimum causa mouetur: in
brutis vero gustus gratia: cum enim hæc manibus ca-
reant, linguam ad res gustabiles tangendas exerunt:
quare eam moueant, oportet: at homo citra eius mo-
tum gustare potest, cum manibus res gustabiles lin-
guæ imponere possit. Verum in vtrisque, cibum in
oris capacitatem à dentibus lapsum, sub eos remittit
& reuoluit.

Ad hæc ergo munia obeunda mobilis esse debuit,
idcirco & musculos obtinuit: & facilioris motus gra-
tiā eandem crassitiem non habuit; & ne plus iusto in
omnem regionem commoueri possit, Natura liga-
mento prospexit: sic & substantia ipsius ex fibris di-
uersis contexta, quo ad varias obuolutiones & im-
plicationes apta fiat: de quibus omnibus, musculis
exceptis, dictum fuit.

Sunt autem duplices, alij communes, alij proprij:
communes censentur ij, qui sub osse hyoeide enar-
rati fuēre, ad quos sorte & tertium par nunc recen-
sendum, referri potest. Proprij, qui aliunde exorti in
linguæ substantiam desinunt.

1. Par: Styloglossi [tab. 29. fig. 1. & 2. F. at Sculptor in-
sertio-

totum, præterquam in mentum inserti, Galen. de diss. muscul. 14. Vesalio, nouem sunt
musculi, quibus addit musculosam linguæ corporis substantiam: sic & Colum. Val-
uerda & Laurent. decem faciunt. Fallop. in obseru. vel tria vel quatuor paria, quia
quartum par vel ad fauces, vel ad linguam referri potest: at in instit. paria quatu-
or, sic & Plat. qui alios dicit communes, primum Fallopij, seu 9. Vesalij, & 4. Fallo-
pij (quod inter faucium musculos recensuimus) proprios vero 2. 3. & 4. par Vesalij,
& Archang. qui gustatorios, locutorios & cibi reuolutores vocat: Arantio paria
tria tantum linguæ propria sunt.

b *Πλάγιοι*, transuersi seu laterales Galeno dissect. muscul. 14. 1. Par sursum mo-
uens, Laurent. 2. Par linguam intro reuocans, Archang. 3. Par (quod carnosum
& crassum) Vesal. Colum. Fallop. instit. at hic addit, secus quam in bobus inseri
in media insertione secundi, non in fine, ut in bobus, quod par à Vesalio ignoratum
videatur: Verum in obseru. dicit. 3. Pari Vesalij respondere: 3. Par glaucilius, Plat.
3. par introrsum ducens, Arantio.

sertionem male exprefit] à stylocidis appendicis externâ facie (quemadmodum faucium ^c quartum par ab internâ eius facie) graciles in homine, in bobus carnosî & crassi orti, fibris transuersis in linguæ ^d vtriusque latus circa medium implantantur: iino vltèrius progrediètes, quasi ad linguæ summum apicem ver-
gunt, & linguam foras exertam, introrsum ducunt. Verum propter fibras ^e adeo intertextas, cum ambo simul vèrsus originem suam contrahantur, linguam quoque sursum recta eleuant: cum vero alter duntaxat agit, tum linguam sursum ad alterum latus ducit.

^f II. Par: Myloglossi [*tab. 29. fig. 1. & 2. G.*] à maxillæ inferioris lateribus, iuxta dentium molarium radices principio lato & inuerso, fibrisque transuersis, exoriuntur, & sub linguæ basi in ligamentum, quod in frænum degenerat secundum longitudinem, quâ lingua faucibus alligatur, ad latera vtrinque inferuntur. Horum altero agente: lingua subuersa sursum oblique ducitur, vtrisque vero agentibus, mucrone recta ad palatum & dentes superiores attollitur. Aliquando quasi duplicatam & canalis in modum sinuatam reddit, & ad palatum hinc inde ligamenti frænulique rigidiusculi effecti beneficio, arcus in modum sustinet. Si vero hyocidis secundum par coopereretur, tum lingua ligamenti auxilio acutior, solidior & angustior reddita, extra labia longe produ-
citur.

§ III. Par: Geneoglossi [*tab. 29. fig. 1. & 2. H.*] at
Q q q 2 scul-

lens, cum mandimus, aut deglutimus, Columb. quartum par Vesali non reperitur, sed pro eo videtur, 2. par hyocidis rursus repetere: e, Fallop.

g. 1. Par linguam exerens Fallop. instit. & Archangel. 1. par Fallopij seu 9. Vesalij, Plat. 2. par cæteris Anatomicis ignotum, linguam exerens, Columb. 3. par antro-
rsum aut extrorsum mouens, Laurent. Nonus musculus, carnæa moles sursum & retrorsum ad fauces ducta, in lingua radicem inseritur, & linguam ad mentum
cor-

^c Lingua quar-
tum par Fal-
lop.

^d Lingua late-
ribus, Vesal.
in latera ra-
dica,olum.

^e Archang.
etiam ad lin-
gua summum
apicem, Fal-
lop.

^f Columb. &
Archang.

^f Qui fibras
exnegatias
transuersas
habent, Gale-
nus l.c. 1. par
attollens lin-
guam, Aran-
tio, 2. par de-
orsum mouens,
Laurent. 4.
par ad infe-
riora contra-
hens, & ad la-
tera inuoluens,
Vesal. 4. par
in latera tra-
hens, Archan-
4. par Vesaliij,
Plater. 5. par,
nunc huc, nunc
illuc impet-

T A B. XXIX. *Linguam eiusque musculos fig.
1. & 2. proponit : at fig. 3. linguam diuisam eius-
que ligamentum.*

T A B. XXX. *Larynx scutiformi cartilagine
diuisa, cum glottide & epiglottide exhibetur.*

FIG. I.




FIG. II.




FIG. III.




FIG. I.




FIG. II.



contrahit, nunc exqui-
site ad labrum
medium, nunc
autem ad la-
tus, prout has
vel illas fibras
laxat, & in-
tendit; Vesal.
videtur pri-
mum hoc par
illa moles car-
nea, quæ pro
9. musculo à
Vesalio nu-
merata est,
Fallop. obseru.
hyoidis pro-
prium est, &
cum lingua
nullam con-
nexionem ha-
bet, Fallop.
Institut. 5. par
hyoidis, quod
una cum 6.
pari hyoidis
subiecto, lin-
gua basi ad mentum contracta, eiusdem proprijs concurrentibus efficiunt,

ut eadem vincula beneficio acuminata longe producantur, Arantius. Hunc nonum Vesalij musculum contrarium motuum opificem esse, ut scilicet linguam, tum producere, tum reuocare queat, credidit Fernelius: quod si esset, sequeretur, eum em musculum, tum duplici actione praditum, tum eodem tempore simul agere & pati, quod rationi & Galeno, 1. mot. muscul. 4. aduersatur. Arant.

h Auerrhoes non musculorum ope, sed proprio motu linguam exeri censuit; quod Columbus reprehendit.

i & ceteris, recte, Galenus l.c. Primo, par intro trahens Vesalius, hoc illud est, quod pro sexto pari ossis hyoeidis Fallopius numerat, Plater. 2. Par ab hyoeidis lateribus in lingua latera productum retrahens, Arantius. 4. Par retrorsum mo-
uens, Laurentius.

sculptor principium nimis latum adiunxit] ab asperitate quadam in interno, ac medio mento principio satis angusto exorti, mox latiores redditi, rectisque fibris præditi, in mediam fere linguam inferius implan-
tantur, & quidem in homine (in brutis enim corpus vnum refert) parte maximâ versus linguæ radicem; minima vero versus linguæ apicem ferun-
tur: ita, ut eiusdem musculi partes, actiones contra-
rias edant; maximâ namque fibrarum parte ad exor-
tum tractâ, linguam^h extra dentes & labia exerit; minimâ vero agente, introrsum reuocat. Nonnun-
quam fibræ aliquot ossi hyoeidi communicantur, quod ad mentum trahunt; inscriptiones etiam qua-
dam habet, ac si plures musculi forent.

i IV. Par, Basiglossi vel Ypsiloglossi [tabula 29. fig. 1. & 2. D.O.] ex ossis hyoeidis superiore & mediâ sede carnei & recti, aliquot locis obscure à se inui-
cem, ac si plures essent diuisi, & secundum linguæ longitudinem producti, ipsius medio inseruntur: hi contracti eam intro recta & velut ad posteriora, tra-
hunt.

k V. Par:

* V. Par: Ceratoglossi [tab. 29. fig. 1. & 2. E.] à cor- k Αοξοὶ obli-
 quibus superioribus¹ ossis hyoidis, si adsint, exorti, & que Galen. l.
 aliquantum oblique procedentes, in linguæ latera, c. 2. part. Ve-
 sal. Fallop. ob-
 iuxta ipsius radicem inseruntur: interdum ab humi- seru. & Instit.
 lioribus prodeunt, quando superiora defunt, vel Plat. 3. par,
 non plane ossæ, sed ligamentorum naturam refe- Archangel. 4.
 runt, quod potissimum in mulieribus fieri diximus. par, Columb.
 Horum, si alter solum contrahatur lingua, potissi- qui omnes vo-
 mum sua radice in latus deorsum trahitur, sicque in guam deor-
 latus mouere dextrorsum sinistrorsumue dici po- sum trahi. 5.
 test: Si vero ambo contrahantur, tum recta deorsum par in latera
 versus interiora mouetur. Hoc par in bobus gemi- mouens, Lau-
 num est, at in homine simplex existit. rent.

Horum musculorum munus, linguam sursum, l Ab ossis hyo-
 deorsum, antrorsum, retrorsum, dextrorsum, fini- eidis lateri-
 strorsum, siue in latera mouere: qui si successiue a- bus in homi-
 gant, linguam in orbem torquent atque conuer- ne simplex,
 tunt, quos motus ossis hyoeidis musculi non parum Fallop. Obser.
 iuuant; quod nonnulli ipsius linguæ substantiæ^m si- quamuis in
 brofæ, quæ triplici fibrarum genere donatur, adscri- homine inge-
 bunt.ⁿ minari possit,
 tamen pro u-
 no recense-
 tur, Fallop.
 Instit.

Qqq 4

Ad

Instit.

^m Musculorum, qui ad linguam porriguntur, plurimi circa ipsorum fines inuicem
 confunduntur, ac duo musculoſa lingua corpora constituunt, quæ triplex fibrarum
 genus adeo confusum permixtumque obtinent, ut fibras internoscere sit difficilli-
 mum: reliquorum tamen omnium obliqua transuersaque in corporum medio pluri-
 ma reperiuntur, quæ utrinque in lingua ligamentum, tanquam ipsorum firmamē-
 tum hominibus, canibus & simiis, secus, quam in bobus, ouibus propemodum desi-
 nere videntur: recta vero pauciores, omnes propemodum in corporum illorum ex-
 ternâ superficie excurrentes: transuersorum beneficio lingua corpus in se contrahi-
 tur, incrassatur, & rursus egeri tenuarique arbitror: rectis fibris in semicirculum
 ad palatum & fauces conuoluitur, prout superiores aut inferiores collecta fuerint:
 obliquis vero linguam in latera agi omnino coniecto: ita tamen, ut alij interim
 musculi linguæ radicem, alij lingua corpus moneant, Vesal.

ⁿ Præter hos duo adhuc sunt linguæ corpus constituentia, &c. Vesal. duos adhuc
 addunt linguæ pulpam constituentes, sed musculi non sunt, sed proprium gustus in-
 strumentum, Archang. caro linguæ, musculoſa dici nequit, cum per eam nulla fibra
 excurrat, Laurent.

o Vndecimus
musculus, quē
carnis, pin-
guedinis, glā-
dulaque con-
fusam, miscel-
lam rectius
diceremus,
quam vero
musculū: post-
eaquam au-
tem ceteri, qui
ante nos scri-
psere, inter
musculos de-
scripsere nos
quoque mu-
sculum appel-
labimus, ne
confusioni lo-

Ad linguæ radicem, musculis his remotis adhuc
caro ex glandulis compluribus & pinguedine com-
mixtis conspicitur, quæ musculi ° nomen non me-
retur; cum musculus non ex glandulis, sed ex fibris
carnosis constet [tab. 29. fig. 1. & 2. H.] Hæc glandula-
rum congeries linguæ radici innascitur, quo lingua
perpetuo madeat, cum gustatio sine madore perfici
nequeat; vt neque concoctio in ventriculo elixatio-
ne facta; quare pancreas glandulosum ventriculo
contiguum, vt perpetuo vapores humidi eructent,
quo ventriculi concoctio elixatione fiat. Præterea,
quo ad motum expeditior sit: exsiccata p enim ad
motus tardior efficitur, vt constat ex ijs, qui siti im-
modicâ infestantur; Et ijs, quibus in febribus arden-
tibus linguæ humor omnis exhaustus est. Verum &
tonsillæ, vt supra monuimus, perpetuo humectan-
do, linguæ motum promouent, eamque hume-
stant.

cus relinquatur, ductusque ipsius est ab hyoeidis offe, qua particula in humano cor-
pore perexigua est, & nullius fere pretij, Columb. Musculus non est, quem ponunt
ad radicem mediam lingua glandulis compluribus conflatum gustatui, & denti-
bus gratissimum, Archang. p Galenus 11. vs. part. 10.

DE SENSU GUSTVS.

CAPVT XCI.

De hoc egit Plato in Timæo, Aristot. 2. de anim. cap. 10. Theoph.
6. de caus. plantar. quædam habet. Galen. 7. de Plac. 5.
& 6. quemadmodum ex Platonis senten ia, 1. facult.
simpl. 37. & cap. seq. de propriis linguæ sensibilibus &
differentiis gustabilibus.

TRia ad quemlibet sensum requiri, supra osten-
dimus, instrumentum, medium & obiectum,
quæ tria in quarto sensu, ipso nimirum gustu, breui-
ter, quâ tum ex Anatome colligere possumus, osten-
demus.

Instru-

Instrumentum ipsum ^a linguam esse, Medicorum
 essentia, quæ ita se ad sapes habet, quemad-
 modum oculus ad colores: verum quemadmodum
 in oculo pars vna est, quæ videndi principalissimum
 instrumentum dicitur, reliquæ verò illud adiuuant,
 sic in linguâ vnâ pars similis est, quæ gustandi prin-
 cipalissimum instrumentum existit, ipsius nimirum
 substantia rara & laxa, quo humore saporum vectore
 facîle imbuatur. Reliquæ verò partes in subsidium
 contributæ sunt. Hæc cum omnes sapes recipere
 debuerit, omni sapore denudatâ esse oportuit, quare
 insipida est; talem esse, experiuntur illi, qui linguas
 animalium sine sale elixatas aut sine cõdimentis co-
 ctas comederint. Verum saporum natura subiecta
 humida est (hinc Galenus ^b gustatûs instrumentum
 humidum, quemadmodum visus lucidum, auditûs
 aëreum, olfactûs vaporosum, tactûs terreum esse
 pronunciauit) cum nihil absque humiditate saporis
 sensum, Philosopho ^c monente, efficiat, & omne
 quod ipsum sensum efficit, humiditatem vel actu vel
 potentiâ habet; & quantò magis humidum, tantò
 magis saporosum, cum vnumquodq; saporem suum
 magis sub formâ molli & humidâ, quàm durâ & so-
 lidâ imprimat: quare quæ dura sunt, nisi earum par-
 tes superficiales liquecant, suas qualitates gustatiles
 non exerunt: sic Sacchari dulcedinem, vbi liquatum
 est, meliùs percipimus: sic salsum, ait Philosophus,
 potentiâ humiditatem habet; quod & ipsum lique-
 scere facîle potest, & linguam, cum liquecit, humi-
 diorem efficere. sic Rhabarbari infusionē, ipsâ sub-
 stantiâ amariorem esse, constat. Cum ergò sapes
 non percipiantur, nisi quatenus natura humidis aut
 liquidis inhærent (siquidem corpus, secundum Phi-
 losophum, in quo tanquam in materiâ, sapor est,
 qui gustu percipitur, humidum est) necesse est, in-

a Gal. lib. de
 Instr. odorat.
 lingua gustûs
 instrumentū
 est, ac 7. de
 Plac. 5. gusta-
 tûs instrumē-
 tum humi-
 dum.

b 7. de Plac. 5.
 Gustandi fa-
 cultas Theo-
 phrast. 6. de
 caus. Plant.
 Aristoteli &
 Mnesitheo
 Medico χυμὸς
 nuncupatur.
 1. simpl. 38.
 c 2. de Anim.
 cap. 10.

strumentum ipsius sensûs neq; humidum esse actu, neq; etiam tale, vt humectari non possit, humidumque euadere; sed potentiâ humidum sit, necesse est, & actu humectari, ita tamen, vt cùm humectatur, eius ratio conseruetur: cuius rei signum est, quòd lingua, neque cum valde sicca est, neque cùm humida nimium est, sentit; quare gustûs humidi primi beneficio sit. Exēpli gratia, si quis vehementē acremque saporem prægustarit, dein alium gustet, non rectē posteriorem discernere poterit, quia lingua tali humore acri imbuta est, quod etiam in ægrotantibus accidit, in quibus sæpe cuncta amara videntur. Idcirco lingua ex substantiâ terrestri & aridâ constructa fuit: licet enim humida credatur, ex mollitie quam habet, tamen humiditas hæc insita non est, sed aduentitia, à cerebro perpetuò destillans, quæ linguæ se insinuat, quemadmodum aqua spongiæ: hoc verum esse, exinde probatur, quod capitis destillatione cessante statim exsiccatur, & ex vaporibus calidis ab hepate, ventriculo, pulmonibus eleuatis, adeò exsiccatur, vt aspera reddatur; imò in febribus sæpe findatur, cuius fissuræ vestigia in multos annos persistunt, quod mihi contigit, cui ante annos septendecim ex febre, per medium fissâ est, & vestigia adhuc manifestissima conspiciuntur. Rectē ergò Galenus

*d De instrum.
odoratus 2. q
sapores digno-
scit, quòd lin-
guam appella-
mus, ex humi-
dioris corporis
substantiâ mo-
lita est; C. 7.
de Plac. 6. gu-*

gustandi instrumentum ex humidâ substantiâ conflatum esse docuit; dum qualitates instrumentorum singulis sensibus inferuentium explicat. Vnde si lingua nimis exsiccata fuerit, saporum etiam dignotio interit. Quare & consillâ additæ, ne assiduo aeris per respirationem, ingressu & egressu, nimium exsic-
cetur.

Medium

standi instrumentum humidum statuit, quemadmodum, ait, sensus tactus sensilia per eum sumit, ita gustatus obiecta per humiditatem, saporesq; in cognitionem veniunt.

Medium ipsius, linguæ tunicam cēsemus (quemadmodum in instrumento tactûs cuticulam esse, libro primo, cap. 2, ostendimus) siquidem ex Philosophi sententiâ^e, omnia, quæ sentimus, per medium sentiamus, & nulla fiat sensatio per immediatum cōiectum sensibilis & sensorij; quamvis postmodum ipsi gustui, tanquam & tactui medium deneget.

Gustabile, inquit^f, est quoddam tangibile, & hæc causa est, ut ipsum non sit sensibile per medium corpus externum; quia nec tactus tali medio percipitur, quare, addit, etsi in aquâ essemus, dulce tamen sentiremus in ipsâ positum, quia permistum illud esset cum humido, quemadmodum in potione fieri solet. Hanc quoque ob causam gustum & exactiorem nos habere asserit, ipso odoratu, ex eo, quod gustus tactus quidam sit, quem sensum homo exactissimum habet.

Obiectum, res sunt gustabiles & quidem duplices, aliæ propriæ ipsius gustûs, ut sapores: quemadmodum enim^f visibile est color, sic est gustabile sapor, sed nihil abque humiditate saporis sensum efficit: aliæ communes sensuum omnium, rerum gustabilium magnitudo, numerus, situs: quare lingua vini saporem gustat, non vinum, ex quo mens colligit & cognoscit, vinum esse. Vinum enim, ut vinum, & saccharum ut saccharum non sunt obiecta facultati gustandi, sed quatenus saporibus & gustabilibus qualitatibus prædita sunt: nam mens ratio- cinando, gustû tamen intercedente, saporem acrem & amarum cognoscit: siquidem qualitates sensibiles ipsarum rerum facultates sentientes moueant & afficiant. Quo verò sapor exactè apprehendatur, corpus in quo est, inter palatum & linguam conteri debet; quare palatum & lingua eadem tunicâ succinguntur; quamvis & palatû aliquid ad gustû conferre

c 2. de anima,
textu 114. mē-
brana exilis
omni sensu gu-
stûs & tactûs
carente ob-
uoluntur, Va-
robus.
f 2. de anima
cap. 10.

g 2. de anima
cap. 9.

vidca-

videatur, cum eo modo, quo & lingua neruorum propagines ab eodem pari recipiat.

Sicut autem visus visibilis & inuisibilis est, & auditus similiter, sic & gustus gustabilis & ingustabilis est; quod quidem aut exiguum habet aut prauū aut corruptentem gustum saporem: videtur autem potabile & impotabile esse principium: vtrumq; enim gustu percipitur: at alterum prauum est, gustumque deuastat; alterum naturæ amicum est. ^h Saporum vero species ex Philosophi sententiâ se habent, quemadmodum & colorum: dulce namque & amarum contraria simplicia sunt. Hæret autem dulci quidem pingue, amaro autem falsum, & inter hæc collocantur acre, acerbum, acidum atque acutum: hæ enim videntur saporum esse differentiæ ipsi Philosopho: plura qui volet, Galenum lib. i. de facult. simpl. consultat.

h Plato in Timæo gustabiles differentias exponens sic ait, etiam Galeno 1. simpl. 27. referente: tenduntur à lingua ventula ad cor, saporum nuncia, in quas si quæ ita inciderint, ut rariorem mollioremq; carnis partem penetrantia terrestri suæ naturæ lique factâ, venulas cōtrahant atque desiccant,

Concludentes dicimus, linguam tanquam instrumentum gustûs, non siccam, nec nimium humidam, nec aliquo humore prauo imbutam, per ipsius tunicam, tanquam medium, sapores, qui in humido consistunt, percipere, facultate ac potentiâ à cerebro per neruos tertij quarti que paris, in ipsum sensorium, linguæ nimirum carnem, penetrante: Communis enim quædam facultas est, docente diuino ⁱ Platone & assen-

si quidem asperiora sint, acerbæ; seu minus aspera, austera nuncupantur: &c. Sapores, qui tum in vnoquoque animali ac plantâ, tum in terrâ inueniuntur, plurimi sunt, nec facillè specierum numero comprehensibiles: ceterum differentias gustabiles aliis octo creduntur, aliis septem, nonnullis autem pauciores. At Plato primum duos sapores numerat eiusdem speciei, sed in ratione maioris ac minoris differentes, eorum alterum austereum (quem alstringentem voco) alterum acerbum nominat. Altera est eorum, quæ illis opposita sunt, nitrosorum videlicet, salis & amarorum, & in his quoque amarum ex nitroso intentione prouenit; salis vero aut nitroso imbecillior, aut adstrictionis assumens quoque aliquid. Deinde à Platone acris expositus est, mox acidus, postremo dulcis: at à Theophr. additus est vinctuosus siue pinguis à Platone præteritus, ut qui ad gustum nihil attineret. 1. simpl. facult. 38. i. Et in Theæteto.

& assentiente Galeno, ^k quæ à primo sensorio, ipso ^{k 7. Plac. 8.} cerebro per nervos in singula sensoria penetrans, omnes ipsorum alterationes persentit & dijudicat.

DE LARYNGE VOCIS ORGANO.

CAP. XCII.

Consule Galenum 7. *vs. part. à cap. 11. ad 19. lib. de vocal. instrum. dissect. lib. de diff. musc. 10. & 11.*

ASPERAM arteriam supra libro secundo, diuisimus in fistulam, quæ ex cartilaginibus semicircularib. & membranâ constet. (de quâ eo loci egimus) & in caput ipsius, quod laryngem vocamus. Dicitur Græcis ^a λάρυγξ à λαρυγγίζω, quod significat, gutture latius diducto vociferari, vel ex λα ^b par-ticulâ, quæ per se sola nihil, sed in compositione magnum quid significat & ἀρύω, haurio, quod ad vocē formandam spiritum è profundo trahamus, nonnullis, sed improprie, φάρυξ ^c cūm proprie de faucibus intelligi debeat; pharynx enim ante laryngem consistit.

Est ergo larynx asperæ ^d arteriæ vel ^e bronchij caput, finisue ^f superior faucibus continuus, ex cartilaginibus ^f magnis ^f, figurâ & magnitudine ab ijs, quæ in fistulâ reperiuntur, dissimilibus, musculis, membranis, & organis communibus composita, ut sit pri-

a Hippocr. de Natur. off.
b Vel ex λα & ἀρύω quod est attolli, & vehementer in deglutitione & vocibus acutis aut grauius atollatur, aut ex λα & ῥύγχη, rostrum, quod propter cartilaginem ary-tanoidem rostro similis sit,

vel ex λα & ῥύγχη, tueri, quod diligenter asperæ arteriæ viam tueatur, ne quid, quod non oportet, incidat; Aquapend. c Arist. 2. hist. anim. 12. interdum laryngem cum pharynge confundit, interdum propria voce utitur, quemadmodum Gal. quoque ex eius sententiâ 8. *vs. part. 1. statuit.* Hippocr. de nat. off. φάρυγξ ipsa est fistula, & lib. de corde, bibit quoque & φάρυγξ: at in Introduct. 11. unde initium aperturæ arteriæ, & ubi aperitur, φάρυγξ fauces, vel λάρυγξ Græci vocant; Auienna Augena; Halliabbari, iugulum; Hesych. ἀπαράγξον vocat. d Galen. 4. ph. 34.

e 7. *vs. part. 11. bronchij principium, Polluci, aliis nodus gutturis.*

f 6. *vs. part. 21. & 8. eiusdem 1.*

g 8. vs. part. 1.
at 7. vs. part.
11. spiritus in
strumentum:
voci vehicu-
lum, seu mea-
sus, Aristo-
phani: caput
aspera arteria,
larynx potius,
quam guttur
appellandum,
Vesal.

h Est veluti
fistula episto-
mium Plat.
arteria aspera
operculum &
caput, Lau-
rent.

i 4. vs. part. 8.
e 7. eiusdem
18.

fit primum, ac s principalissimum vocis modulanda
instrumentum, cum in eâ primum vox fiat.

Situs est in collo; cum via sit aeris, & in arteria
aspera summitate^h, quò spiritus vocis materia à pul-
monibus ad vocis formationem, exiliat: prope fan-
ces, os & linguam, vt statim vox in sermonem abeat.
Et cum perpetuò vna cum respirationis organis di-
latari & constringi debuerit, extrinsecus situs est, &
ipsi œsophago incumbit, ne ab vlla re comprimatur:
qui tamen situs etiâ deglutitioni confert: dum enim
adsumpta deglutimusⁱ, œsophagus quidem deor-
sum trahitur, larynx verò sursum recurrit, & deglu-
titioni famulatur, quatenus & locum liberio rem re-
linquit, & vi depressoria adiuuat. In colli medio lo-
catur, cum vnus sit larynx, sicut cætera instrumenta,
quæ vnica sunt, in medio posita sunt, quò corpus in
æquilibrio sit: Vnicus autem factus, vt vna vox eda-
tur, ne duæ voces vno tempore editæ, duos animi af-
fectus simul confundant.

Figurâ est rotundâ & circulari, sed imperfectâ;
anteriori extuberante, quò minùs ab externis afficia-
tur; posteriori depressâ, quò œsophago cedat, & de-
glutitioni locus sit; dein, vt concauus sit, quò vocem
perfectam edat, spiritum à pulmônibus eò delato: at
orificium inferius^k superiore amplius est, quò aer
expiratus copiosior ad laryngem feratur, si quæ vox
grauis causetur, & tandem fistulæ instar oblongatur.

Magnitudine pro ætatis ratione variat, quare &
vox ipsa: nam in minori ætate, vbi larynx adhuc an-
gustus est, vox acuta fit, quia ex angusto paucus aer
velociter motus egreditur: econtrâ in grandiori æta-
te, latiore larynge^l, aer copiosior profluit, motus tar-
dior fit, & vox grauis redditur: ad quod & longitudo
& breuitas non parum conferunt.

Connectitur cum asperâ arteriâ musculorum &
membra-

I Latitudinem
ad vocem ma-
gnam conferre
ostendit Gale-
nius in arte
Med. 67. & 7.
epidem. 25.

membranarum ope, cum œsophago, thorace, osse hyoide & beneficio organorum communium cum partibus principibus.

Partes laryngem cōstituentes sunt ^m cartilagines, muscoli, membranæ, venæ, arteriæ & nervi vna cum glandulis adnatis. Ex substantiâ enim tali componi debuit; cartilaginosa quidem, quò durior sit, densior, ac crassior, quò minus ab iniurijs externis lædi possit: dein cum via sit spiritûs, vt cavitas, quæ necessaria est, non solum ex duro corpore constituatur, sed etiam, quò ingredienti & egredienti aëri perpetuò pateat: ⁿ nam si ex carne constaret; vel membranâ, meatus concideret, spirituum transitus ita liber non esset, & sic non solum voce, sed respiratione quoq; priuatû, corpus ⁿ mortuum redderetur. Musculi ⁿ quoq; propria actione priuarentur, quippe, qui nihil solidi trahere contrahereq; suis ipsorum ansis possent. Quòd si ⁿ ossea foret, duritiæ suâ œsophagû comprimendo, deglutitioni impedimento foret: pondere linguâ & os hyoïdes detraheret, eorumq; actiones læderet, musculis maioribus, vtpotè grauius corpus moturis indigeret; qui maius spatium requirerent. Quòd si ex tenuibus ossibus constructa foret, facile tanquam fragilia & externis exposita frangerentur, & non, vt cartilagines, cederent.

Tum quia vocis instrumentum est, vt proportio sit inter

^m Ex innu-
meris p̄mo-
dum sectioni-
bus obseruari,
humanam la-
ryngem in pro-
uectioris atatis
corporibus, la-
ryngem osseâ
esse, non carti-
lagineâ, quâ-
quam à tene-
ris annis, cum
nōdum ad suâ
duritiem soli-
ditatemq; re-
ducta est, ex
cartilagineâ
substantiâ cō-
structa esse vi-
deatur, nō pos-
sum nō opina-
ri, eam magis
ex osseâ natu-
râ, quam ex
cartilagine cō-
stare: mox ossa
eam color ac
durities, ac
præterea me-
dulloso substā-
tia (qualem
sæpè deprehen-

li, quo vno potissimū cartilagines ab ossibus differūt) ostendunt, Col. idem accusat
Falenum, quod simias dissecandas curarit, & quòd in ijs laryngis substantiâ osseam
is aduerterit, reprehendit Vesaliū, q̄ laryngem bruti secare semper solitus sit thea-
ris publicis, quib. per sæpè interfuerit. At Fallopius sic: primâ & secundam reperi-
liquando in valde senib. osseas factas, neq; solum in decrepitis, sed etiam in primo
nio constitutis: tertiam vero & quartam osseam nunquā vidi, nec possum illorū
tinionē probare, qui laryngem osseam, non autem cartilagineam esse volunt. Quod
cartilagineâ reperiatur, imperfectam tunc esse asserunt, quia Natura, vt ossea
ac pars esset, destinārit: hoc, si verū, tunc homines vocis organum integrum, vs-
que ad consistentem atatem non habebunt, quod minimè concedi potest. Sic Laui-
ent. errat, Columbus dum ossibus adscribit, licet in senibus quibusdam ossea appa-
rant, reliquo vita tempore sunt cartilaginea. n De instrum. vocalium dissect. 6.

De vocal.
instr. diff. 2.

fit inter aërem percussum & corpus percutiens, quò ad vocem edendam resonet: cùm vox aëris ° percussio sit; quare nulla substantia ipsâ cartilagineâ aptior est: ossea enim duram percussione in aëra faceret; & licet sonus à corporibus duris, non autem à mollibus, vt lanâ, spongiâ, oriri possit, cùm aër non frangatur, nisi ad solidum, durum & læue allidat, attamen non penitus durû esse debet: tale enim aërem promptè tum secat, tum euertit: neque nimium molle, cùm enim penitus cedat, vocem edere non potest: quare corpus, quod moderatè cedit, & spiritum blandè pulsat, id vocis causa efficitur: tale autem est cartilagineum corpus. Tandem vt sint veluti fundamenta Preliquorum corporum ipsum laryngem constituentium, & vt inde muscoli vel oriuntur vel implantentur.

p De inst. vob.
cal. diff. 4.

q 7. vs. part.
11. de vocal.
instr. diff. 6.

Verùm nō q ex vnâ cartilagine creari debuit (quò nō solùm meatus esset, sed etiam instrumentum voluntati inseruiens) & quæ nullam articulationem haberet, quæuè immobilis esset, sic enim nec clauderetur, nec aperiretur, nec omnino dilataretur, nec comprimeretur, sed ex pluribus simul & sibi mutuò applicatis, & quidem quibus motus esset, non quidem naturalis, vt arteriarum, sed qui ab animalis voluntate penderet. Nam cùm ipsius vsus sit in inspirationibus & expirationibus, vtriusque respirationis inhibitionibus. Præterea efflationibus, ac vocibus, cùm instrumentum sit, per quod spiritum admittimus, eundemq; reddimus, & in quo primò vox effingitur, satius fuit, hæc omnia à voluntate nostrâ proficisci: quare ad hos motus præstandos à Naturâ muscoli instituti sunt, ad quos nerui transmissi pro motu: venæ, pro nutritione; arteriæ, pro vitâ, & membranis circumdantur tutelæ gratiâ, & glandulæ humectationis causâ additæ fuere.

Ex tri-

Ex tribus autem non pluribus cartilaginibus factus fuit, cum laryngis motus duplices sint, quibus tum dilatatur ac constringitur, tum clauditur ac aperitur; duabus idcirco de articulationibus opus fuit; quarum singulae singulis motibus inferuiunt: ita, ut dilatatio & contractio ab eâ de articulatione fiat, quæ est primæ cartilaginis ad secundam: clausio verò & apertio, ab ea, quæ est tertiæ ad secundâ, perficitur.

De vocal.

instr. diff. 6.

(Secunda ad
tertiâ, Ga-
len.

DE MUSCULIS LARYNGIS.

CAP. XCIII.

De his egit Galenus lib. de diff. musc. 10. & 11. lib. de vocal. instr. diff. 5. eorum dissectionem, at actionem cap. 7. proponit. 7. vs. part. 11. 12. 14.

CVM Laryngis actiones motu voluntario absoluantur, musculos obtinuit, qui per suam actionem, quæ contractio est, cartilaginum articulos flectunt & extendunt, & ad latera mouent, quo glottis mobilis efficiatur, eiusque rimula latior & angustior reddatur: sic enim decebat; cum vocem ex arbitrio edere debuerimus, sicut & loquelâ: etenim nisi lingua mobilis ex voluntate nostrâ facta foret, profectò neque ex arbitrio loqui potuissimus. Habuit ergo Larynx necessariò musculos, qui a duplices sunt, alij communes, alij proprij. Communium

a Mouetur à
musculis pro-
pria quidem
suâ compo-
sitione.

Rrr

sex sunt

tionem, duodecim: quatenus verò communionem habet cum partib. vicinis, ab alijs octo. Galen. 7. vs. part. 11. & 12. at de dissect. musculor. 10. & 11. Musculos aspera arteria quatuor proponit, prout in simiis reperiatur, qui eam contrahant & arctent, cum extensi fuerint, & os hyocides & guttur reuellant: subiungit laryngis musculos proprios duodecim, & his, in quibusdam animalibus circa aretanoeidis basin musculum unum bisidum, vel duos connatos reperiri, qui guttur claudant. Sic libr. de vocal. instr. diff. 5. tria paria communia facit, in quorum numero transversum gula musculum recenset: Vesalio & Fuchio sunt 20. communes 8. sex prima cartilagini, duo epiglottidi inserti, proprij 12. Plat. tria paria communia omnibus in confesso sunt, quartum addit Vesalius quod solum ruminantibus concedit Fallopius; contra Vesalius etiam in porco; propriorum paria sex. Auicenna & Syluius, 18. Co-
lumb.

T A B. XXXI. *Laryngis musculos exhibet, fig. 3. Musculos aliquot cum nerui portione. Fig. 4. Musculos proprios, rimulam, epiglottida & cartilag. fig. 5. laryng. posteriorem partem cum cartilaginib. & muscul. aliquot separatis. fig. 6. Laryngis anteriorem faciem cum musculis nonnullis. Fig. 7. Musculum gulæ transversum, duos communes & nervos recurrentes proponit.*

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VI.



lumb. 14. communes 5. proprij 9. Fallop. 14. communes 6. proprij 8. Archang. 14. communes 4. proprij 10. & horum 5. & reliquus simplex est, vocat musculos vocales vocemue edentes: Laur. 14. communes 4. proprij 10. quinque utrinque: Aquap. 16. comm. 6. proprij 10. Placent. 13. in homine, communes 4. qui per se deglutitioni, secundario laryngi inferunt, proprij vero 9. addit aliquos 32. recensere.
b Sic & Gale nus de vocal. instr. 5. Col. Fallop. Archang. Laurent. Aquap.

sex sunt (seu paria tria) quorum quatuor constringunt, duo dilatant: communes dicti, q̄ ab alijs partib. enati, in eam inferantur: de his primò^b, cum primi sub aspectū cadant, & primò demonstrandi veniant.

I. c Par communium [tab. 31. fig. 7. x x] in anteriore laryngis parte situm est, vtrinque vnus quos Bronchios vocamus, eò quòd arteriæ asperæ perpetuò adhæreant, cuius longitudinem etiam adæquant; siquidem à pectoris ossis parte superiore & interna ad iugulum, principio lato^d & carnosò exorti, fibrisq; rectis præditi sursum secundum^e asperam arteriā carnosā paulòq; latiores redditæ, producuntur, & in thyrocidis^f cartilagini's latera infernè iuxta glandulas sine lato carneo, in homine quidem vno, inferuntur: at in quadrupedibus circa medium bifidi & in plerisque portione vnâ in laryngem, alterâ in os hyocides infinguntur: longissimi sunt. quia non solum thyrocides, sed sæpè^g totus larynx mouetur: imò in grauioribus vocib. totus larynx deorsum mouetur & aspera arteria in membranosis spatiis contrahitur, quare ipsi fistulæ adhærent. Sunt tenuissimi, cum magnum robur non requirant, larynge ob pondus faciliè descendente: nihilominus tamè in eorum corpore inscriptiones^h neruosæ conspiciuntur, quales in rectis abdominis musculis reperiri diximus, à quibus robur accipiunt, cum longi sint, & ob tenuitatem debiles: Horum vsus, thyrocidem deorsum trahere, infra constringere, & sic simulam in graui vocè dilatare

placent: at cōtra Vesal. & Plat. Galen. de diff. musculor. 10. musculos asperæ arteriæ vocat. c 1. Par Columb. Archang. Laurent. & Placent. hic & inferioris laryngis, musculos vocat: 2. par Vesal. Fallop. Plat. Aquapend. d Carneo, sed non lato principio, Vesal. carnosī, & acuto principio, Plat. carnosī Columb. Archang. Aquapend. membranoso, placent. e Plat. secundum anteriorem arteriæ sedem, Vesal. super arteriam, Columb. Archang. Placent. ferè supra, Aquapend. per latera, Laurent. f Galeno à thyraide incipiunt & in os pectoris inferuntur. g Gal. de vocal. instr. 7. h Placent. quia laryngem os hyocides & linguam corpora magna mouent.

careⁱ & ynà nonnihil asperam arteriam contrahere, ne quicquam, cùm homo vocem edit, reduplicetur, & larynx supernè plurimùm dilatetur.

II. Par^k communium [tab. 31. fig. 3. b] quod in anteriore laryngis sede locatum est, Hyoeideos, vel rectius Hyothyroeideos constituit, qui prioribus opponuntur & longè breuiores sunt: hi ab ossis hyoeidis totà penè inferiore^l sede lati carnosique exorti, internisq; lateribus quasi continui, fibris rectâ deorsum sensim progredientes & lateribus internis mutuo abscedentes, singuli in thyroeidis partem inferiorem lato & aliquantum obliquo sine, ipsam ferè totam contegentes implantantur. Horum vsus thyroeidis partem inferiorem dilatare, superiorem comprimere, & laryngem sursum trahendo rimulam breuiorem & angustiolem reddere hinc in voce acutâ larynx sursum recurrit: quòd si obliquè posteriùs musculus progrediatur, tum sursum & anteriùs thyroeidem mouet: An breuiores, idcirco, quia os hyoeides ab alijs musculis sursum motum, laryngem quoque totum sursum impensius trahit, sicque larynx non solum ab his sursum trahatur?

III. ⁿ Par communium [tab. 31. fig. 7. ll] quod in

Rrr 3

poste-

Archang. Laur. Placent. cui & superiores laryngis musculi: 1. par Vesal. Fallop. Plat. Aquap. 1. Vesal. Plat. Placent. à laterib. hyoeidis, Col. Archang. Laur. ab hyoeidis humilibus lateribus, Aquap. m. Vesal. Col. Plat. Archang. Laur. Aquap. contra dilatare voluit Galen. 7. vs. part. 12. thyroeidem sursum tractâ, ligulam dilatare videtur, Fallop. Instit. deglutitioni inferuiunt, & ubi sursum fertur larynx contractus & scutiformi paulatim motâ rimula dilatatur, & vocib. grauioribus sit accommodata, Placent. n. 2. par musc. laryng. à posterioribus thyroeidis extremitatibus gula inseruntur, ipsam perinde ac sphincteres comprehendentes, diss. musc. 11. 3. par thyroeidi proprium musculi transversum ex obliquis thyroeidis partibus enati in orbem stomachum complectentes simul inter se coeunt. 7. vs. part. 11. 3. par Vesal. Fallop. Plat. Aquap. qui gula potius quàm laryngi adnumerandum censet. 5. Musculus œsophagum complectens, qui unicus & deglutitioni opem præstat, Columb. 1. priorum, qui unicus, Archang. œsophagi potius, quàm laryngis musculi, Laurent. unicum esse, nec inter cõmunes laryngis recensendum, cùm deglutitionis musculus

i Vesal. Col. Plat. Archang. Laurent. Aquap. contra Fallop. in Instit. ipsam decisum trahendo, rimam laryngis coarctare, creduntur. Gal. de vocal. Instr. 7. dilatare dicit: at 7. vs. part. 12. contrariū statuit: Placent. deglutitioni per se inferuiunt, secundario laryngi, ubi larynx deorsum fertur, thyroeides paulatim infernè trahitur, cui rimula angustia succedit, qua voci acuta auxiliatur. k 2. par Col.

fit, & laryngi,
non nisi per
accidens fa-
muletur, dicit
Placent.

o Vesal. ex sto-
machi postica
parte orti, la-
teribus i. car-
tilag. implan-
tantur. sic &
Plat. qui ad-
dit, forte à li-
gamentis po-
stius illius loci
pronasci: Lau-
rent. ab œso-
phago nati in
thyroëidis la-
tera: Col. à
scutiformis la-
teribus oritur,
quare Galenū
& Vesal. repre-
hendit, quod
ab œsophago
oriri volue-
runt: Fallop.
Instit. à i. car-
tilag. ortum
gulam ample-
xatur, & ab
ipso rimā con-
stringitur:

Archang. à la-
tere dextro
scutiformis su-

pra œsophagum progrediens simili sine in latus sinistrū terminatur: cuius officium
partes laterales laryngis ossiumque scutiformium perstringere, qui laxatus easdem
dilatari sinit. p. Propriū gutturis seu laryngis musculi, Gal. dissect. muscul. 11. facit
22. Galen. Ves. Fuchsius, Gorreus, Plat. at Archang. Laurent. Aquapend. 10. Col.
Plac. 9. Fallopius 8. q. Gal. 7. vs. part. 11. de vocal. inst. diff. 5. duo facit paria: secuti
sunt Vesal. Sylu. Fuchsi. volentes alteros alteris superpositos & se fibris ad X. litera
similitu-

posteriore laryngis fede œsophagiæos constituit, hi
toti carnei & ampli œsophagi parti superiori incum-
bunt, quem Sphincteris modo, vt Galenus loquitur,
transuersim & quidem latitudine trium digitorum
amplexantur, & ferè adhærent: à lateribus ° thyroci-
dis secundum eorum longitudinem, vbi linea aspe-
rior occurrit, prorumpunt & fibris ferè transuersis
supra œsophagum feruntur & extremis cœcunt, ita
tamen, vt lineā candidā per longū ductā distinguan-
tur, maximè in brutis, cum sæpè in homine nō con-
spiciatur, & fibræ perpetuæ, non diuisæ, reperiuntur,
ita vt vnus musculus videri possit. Horum vsus, qua-
tenus thyroëidis latera contrahunt, eam comprime-
re, rimulam constingere & angustare; quatenus
verò œsophagum in orbem cingūt, & in seipsos cō-
trahūtur, motu quodam voluntario deglutitionem
adiuuant, & facultati naturali auxilio sunt, quemad-
modum libro secundo monuimus. Nūc ad proprios.

Propriorū p. decem sunt (seu paria quinque) quo-
rum sex dilatant, quatuor constingunt: proprij di-
cti, quia & à larynge, cui adnascuntur, oriuntur, & in
eam desinunt, huicque vni seruiunt, rimulam ape-
riendo in inspirationibus, & claudendo in expira-
tionibus, cartilagineas duas simul committendo, qui
vocis formationi primò & per se auxiliatur: horum-
que alij anteriùs, alij posteriùs, alij exteriùs, alij inte-
riùs positi sunt.

I. Par q. propriorum [tab. 31. fig. 4. s. at fig. 6. alter se-
paratus, alter in suā sede] quod anteriores & exteriores
consti-

constituit, Crycothyroideos anticos nominamus: hi in inferiore & anteriore laryngis parte positi, à Crycoide anteriùs carnosi (sed exigui, fibris obliquis donati) exorti obliquè, delati in thyrocidis basin inferiùs (mediâ parte exceptâ) toti carnei latique implantantur; & si thyroides processum infimum à crycoide separes, & sectione prosequaris, vnum in parte qualibet esse videbis. Horum munus, thyroidem ¹ supernè deorsum mouere crycoeidi iungere, thyroidis partem inferiorem constringere, superiorem dilatare, & sic laryngis rimulam aperire.

II. Par¹ Crycoarythenoideos posticos constituit [tab. 31. fig. 5. f.] hi in posteriore sede crycoidis locati à crycoidis ² partib. infimis & posterioribus, angusti & carnosi exorti, sursumq; delati [tab. 31. fig. 5. f.] ca-

Rrr 4

reperisse asserit Vesal. utrunq; par Vesalij proponit Plat. 1. par & vnum Col. Fallop. Laur. Aquap. Plac. 2. & 3. musc. propriorum Arch. Fallop. in Inst. scribit, se Vesalij alterû par nullibi adhuc inuenisse, sed forsan deceptû à fibris musculi interioris, què 5. numerat, cuius fibra ablato priore musculo, apparent, eo modo, quo musculus thoracis interior, tanquâ pars musculorum intercostalium foret, decepit. At Vesal. in Apolog. se aliû à spinâ primâ cartilag. obliquè ductum comperisse affirmat. Galenus videtur excusandus, ut qui in lib. de diss. muscul. pro uno tantum pari numerauit, & sic tacitè seipsum castigauit, quod in secundâ editione minimè fecere Vesalius, nec Valuerda. 1. Ab innominatâ. sive crycoide in thyroidem, Col. Fall. Arch. Laur. Aquap. & Columb. reprehendit Vesaliû, q. velût, à scutali oriri, & in inxominatâ desinere, cum innominata mota careat, & omnis musculus ad suum principiû trahat. Verûm Plac. à thyroide in crycoidem tendit, quare Thyrocrycoides rectiùs vocari. 1. Inferiores laryngis partes adstringere, inferiorem meatum claudere, primâ cartilaginem secunda applicantes, Galenus asserit: Vesal. & Plat. primâ & secundam cartilaginem inuicem adducunt, laryngis rimulam clausuri: Aquap. de horû ² vobus hucusq; anceps fuit: Archan. inferiorem glottidis partem rectè constringunt, ut superior amplificetur: Lauren. thyroidem constringunt superiorem laryngis partem dilatant: Plac. scutiformè deorsum mouent, ex quo laryngis rimula thyroide aliquo modo arytenoiden comprimente paululum constringitur & ad acumen vocis efficiendum aptior euadit. 1. 2. par Col. Fallop. Laur. Aquap. cui & posteriores primi: Plac. cui etiâ à formâ Cucullares, & quia dorso crycoidis incumbit, pectorales seu Thoracei dici possunt, & à figurâ diuisos & eleuatos inspiciamus, antiù alis similes conspiciuntur, quare Alati vocentur: 3. par, Vesal. & Plat. 4. & 5. propius, Archa. 1. A 2. cartilagin in tertia radicem, Ves. Plat. Col. Fall. Instit. Archang. Laur. Aquap. pendens, at Plac. ab arytenoide membranosi enati in crycoidem inferuntur.

similitudinem
intersecare:
par externum
à primâ car-
tilag. ortum
deorsum pro-
cedere: par in-
ternum à 2.
cartilag. pro-
dire & 1. car-
tilag. implan-
tari (hoc ita
falsum, ait
Columb. ut ne
in homine, nec
in brutis repe-
riatur, idem
Fallop.) ali-
quâdo tamen
unicû utrinq;

1. Recta parū
 pcedūt, Plat.
 fibris rectis pū
 ti, Arch. rectā
 ascēdes, Laur.
 y Fallop. Inst.
 Plat. Archan.
 glottida aperi
 re creduntur,
 Laurent.
 23. par. Col.
 Fallop. Laur.
 & Plat. 4. par.
 Ves. Plat. A
 qua. cui & in
 teriorum pri
 mum: 6. & 7.
 Apprius, Arch.
 a A 2. carti
 lag. tertia inse
 riur, Ves. Fal
 lop. Inst. Plat.
 Aquap. ab an
 nulari emer
 gūt & in 4. &
 5. os terminā
 tur: (non autē
 in sciale, ut
 voluit Ves. ait
 Col.) Col. Ar
 chang. ex ary
 thenoidē in an
 nularē car
 tilaginem de
 sinunt, pyra
 midari figurā,
 induti, quare

uitatem leuē in posticā crycoidis facie cesophagū re
 spiciente muscutorū gratiā factam, opplet, & tādē
 ampli validiq; fibris quodammodo * obliquis à cry
 coidis lineā alperā extuberante seu spinā, in inferiore
 arythenoidis partē, quā crycoidi articulatur vtrinq;
 neruosi inseruntur: Horum munus, tertiam cartila
 ginē ad exteriora laryngis retrorsum vertere, rimu
 lam aperire, & versus latera dilatare, & ad vocem gra
 uem conferre: At quatenus fibras rectas & obliquas
 habent, eatenus motibus mixtis inseruiunt; rectis ri
 mulam retrosum reuellendo aperiunt; obliquis ve
 rò, motui ad latera conferunt, ut tum in longitudi
 nem, tum in latitudinem rimulam y aperiant.

III. 2 Par seu Cricoarythenoidei laterales [tab.
 31. fig. 4. r] hi à crycoide^a cartilagine, vbi latior est,
 carnosi exoriuntur, dein sursum rectā progressi, am
 pliores carnosioresq; redditi ad arythenoidis latera
 ad articulum inserūtur, & sedem totam radicis tertiæ
 cartilaginis, quæ non tangitur à priori pari, occupat.
 Horū munus arytenoiden vtramq;, quantū quintū
 par ad mutuū contactum traxit, tantundem exterius
 diducere & alterā ab alterā separare, sicq; ^b rimulam
 in latus distendere & laryngem aperire: Verum, cum
 hi partim extra, partim intra capacitātē siti sint fortē
 parte exteriorē aperiunt, interiorē verò adstringunt.

IV. ^c Par, seu Thyroidei interni, siue Thyroary
 thenoidei [t. 31. fig. 4. e. t. 30. f. i. e. e] in laryngis capita
 te trāsuersim positi, carnei, lati, varijs fibris ijsq; inui
 cem vnitis donati, in inscriptionib. quibusdā in princi
 pio,

Arythenoi: hyroidei seu laterales dicendi, Plac. ^b Rimulam aperire etiā Galenus
 statuit, Aquap. Glottidis anteriora adstringunt, posteriora dilatant, Col. Archan.
 Laur. c 4. Col. Fallop, Laur. Plac. 8: & 9. Apprius Arch 5. par Ves. Plat. quod Val
 uerda in opere Hispanico nunquam in conspectum venisse asserit: Aquap. cui & in
 teriorum par alterum. d Vesal. Plat. Fallop. Inst. triplex exortus assignari potest.
 superior, inferior & medius: superior ab epiglottidis radice internā & c. glottida
 magnā ex parte constituunt, Aquap. varietate fibrarum rectorum obliquarū tum

pio, ac si tres^d essent muscoli, notati: hi principiis cō-
 riguis à thyroidis parte interiore simâ & mediâ (cuius
 cavitatē internam opplent) secundum totā longitu-
 dinem prodeuntes, fibrarum ductu obliquo sursum
 ascendentes & angustati, in latera arythenoidis, quæ
 glottida efformant, rimulæ ductum sequentes, inse-
 runtur. Hi priorum maximi sunt & robustissimi,
 ita vt fere omnes alios laryngis musculos simul sum-
 ptos æquēt, & id, quia in spiritus cohibitione omni-
 bus thoracis musculis resistere debuēre: nam hi ary-
 thenoidis partes ad thyroidem trahendo, easque cō-
 stringendo, & glottidem in anteriorem partem com-
 primendo eam claudunt; quare & laryngem claudere
 dicuntur. His musculis, si inflammatio accedat,
 angina exitialis inuehitur, nihil ruboris, neq; in fau-
 cibus, nec ore, nec ceruice exhibens: nam in anginâ
 aliquando sternon^e & ceruix rubēt. Rubet sternum
 propter musculi bronchij continuitatem: rubēt cer-
 uicis latera, propter œsophagiæos: & colli anterior
 superiorq; pars propter musculorum hyothyroidæo-
 rum continuitatem.

V. f Par seu Arytenoidæi [tab. 31. fig. 4. & 5. g.] exte-
 rius & posterius supra cartilaginem, vbi arytenæi &
 vasis effigiem refert, siti sunt, & vbi œsophagus laryn-
 gi committitur & tertia cartilago secundæ articula-
 tur: hi à posticâ arytenoidis lineâ exorti fibris obli-
 que ascendentibus ad medium eiusdem progrediun-
 tur, ac vbi duæ cartilaginis partes inuicem colligan-

R r r 5

tur, Coacis aphor.

365. quib. unâ rubent, & fauces & ceruix & pectus longiores quidem sunt, illa an-
 gina, sed maxime ex ijs euadunt, quare: respon. ex 6. aph. 25. & ex coactis aph. 366.
 Erysipelas ab interioribus ad exteriora ferri bonum: contra 2. epid. sect. 2. & 5. epid.
 f 6. Par Vesal. Fuchso, Plat. (cui ex radice 3. oriuntur, & ad eius medium finiunt)
 qui duos faciunt, at Columb. 9. musculus est & unicus ob fibras continuas, et si Ve-
 salius duos esse voluerit: Fallop. unus videtur, qui lingula partem dilatat; at in In-
 stitut. 5. par fecit, quemadmodum & Laurent. 10. proprius soliuagus, Archangel.
 Unicus musculus est, Placen. 3. Par seu posteriores duo, Aquapendens. g Basim ary-
 tenoidis Galen. vocat, & simia deesse 7. vs. partium 11. censuit, hoc negat Aquap.

ascendentium,
 tum descendē-
 tium nō pauci
 decepti, plures,
 quā duos de-
 scribere ali-
 qui fabricā nō
 recte inspectā,
 particulā hu-
 ius superiorem
 ad epiglottidis
 basin ascende-
 re existimā-
 runt, quod nō
 est, Placē. Hos
 alij unum cō-
 stituunt, alij
 duos, vt Gale.
 qui interdum
 bifidos esse, in-
 terdum duos
 cōnatos dicit,
 desciss. musc.

11. unicus est
 musculos, q̃a
 unico motui
 substituitur,
 quāuis in ca-
 preolo in tres
 diuidatur pro-
 pter sui latitu-
 dinē, Aquap.
 e Hipp. 3. Pro-
 gnost. 20. &
 Coacis aphor.

h Minor in vniuerso corpore non reperiatur, *Columb. Archan. Placent. cui & semicircularis.*

i Et si duos obscuros vires obtineat, quib. s. par efficere videtur, unde vulgo 10. musculi numerantur, fabrica tamē & usus unitatē illius perspicue testatur: Si geminus est, actionē duplicē & oppositā edet: si ad suum principii contractus moueatur, sed cū simplici motu solum agat, unus tantum erit, nisi contra naturā prescriptum illum operari existimes, *Placent.*

k *Vesal. Fallop. Instit. at. Plate. lingula aperiunt, Archan. glottidis*

pars adstringitur, anterior vero diducitur, Lauren. aperit fistulam. l Sic & *Vesal. in Fall. in Instit. n* De musculorū laryngis actione, lib. de vocal. instr. dis. 7. o *Arch.*

tur, simul coniunguntur & inseruntur. Hi breues^k sunt & exterius pyriformes, intus vero cartilagini cōnati; at in medio, ybi se coniungunt latiores & crassiores, vbi etiam linea alba occurrit, & tendine quasi communi vniri videntur, cum neruosi euadant, idque roboris gratiā, ne in perenni motu, maxime in cohibitā respiratione periclitētur: quare ab alijs pro vno, ab alijs pro duobus musculis recēsentur: & cum vtrinqueⁱ carnosī sint, inter eos cōnumerandi sunt, qui tendinem in suo medio habent, quemadmodum musculus maxillæ inferioris quintus Digastricus dictus, & ossis hyoidis quartum par. Horum vsus arytenoidem ad latera seu ad dextram sinistramque mouere; imo arytenoidis basim^k constringere, duas eius partes adducere, inuicem comprimere, & rimulam claudere & arctare; quo ostenditur, Cartilaginem tertiam necessario geminam esse: nam si simplex esset, ab his constringi non posset, nec à præcedēti pari occludi, nec à secundo & tertio pari aperiri potuisset. Et musculis his^m internis inflammatis, angina acutissima generatur: his enim tumentibus, ob materiei copiam, spiritus exitus prohibetur, ita vt homo citissime suffocetur.

Vfusⁿ musculorum laryngis tam communium, quam priorum, laryngis cartilagines motu voluntario ad vocum modulationes pene infinitas, mouere, vt dum pars ipsius, potissimum superior apte dilatatur & constringitur, seu aperitur & clauditur, rimula ipsius, quod proprium vocis instrumentum, vel dilatetur in voce graui, vel constringatur in voce acutā edendā, quod sane musculi communes manifestius, proprii obscurius agūt. Hi à musculis^o hyoidis & linguæ diuersi sunt: nam si his quiescentib. manu la-

nularyngi admotâ canere velis, in vocibus grauib^s edendis, laryngem deorsum quasi præcipitari, in acutis vero eam fursum ferri percipies,

DE CARTILAGINIBVS

Laryngis.

CAPVT XCIV.

De harum dissectione Galenus lib. de vocali instrum. diff. 4. 7. vs. part. 11. & 12. 17. & 18.

Cartilagines laryngis ^a quatuor sunt, thyroei-
des, crycoeides, & arytænoides gemina, quæ
musculis extrinsecus remotis, asperæ aliquantulum
sunt, quo musculis principium & insertionem largi-
untur: interius vero, cum membranâ succingantur,
eues sunt, & humore quasi mucore suffunduntur:
his tres mouentur ad vocis modulationem, sola
thyroides immobilis est: & harum prima & secunda
senescentibus ita duræ, vt ossæ videantur. Verum
larynx ex cartilaginibus, non ossibus ^b constare de-
uit, propter rationes antea explicatas.

Prima θυροειδής, ^c alijs ἀαιτοειδής (ἀαις enim
typeū significat) scutiformis, seu clypealis à ^d formâ
dici-

a Ex trib. tota
fere antiquitas
constare voluit
& Gal. 7. vs. part. 11. & 12.
& 1. loc. aff. 6.
thyroide, cry-
corde & ary-
thenoide, &c.
Vesal. Fallop.
Plat. Lauren.
Aquap. Plac.
ex quatuor,
thyroide, cry-
corde, & ary-
tenoide dupli-
ci, Columb. ex

inque ossibus, & Archan. ex 5. ossib. siue durioribus cartilaginibus, quorum duo
utrum referunt, tertium innominatum, duo unicâ tunicâ cincta, arytena formam
ferente, Aquap. pennatorum larynx ex duabus tantum arytenoide & innomi-
natâ constat, deest scutiformis cum huius vsum alia suppleant: deest quoq; epiglot-
is & tota glottis ab arytenoide perficitur & musculos tres habent. ^b Ossæ ob-
ruauit, Col. duo exempla habet Cardan. lib. 2. contradi. tractat. 2. Bononia suspens-
qui vt mortuus patibulo solutus, viuus inuentus est; alterum lib. 14. de varietate
rerum, cap. 76. qui suspensus miraculi specie bis seruatus, tertio iudicis solertia pe-
t: Cartilaginea est larynx vsq; ad primum senium, postmodum ossæ fere euadit,
quap. c. Diff. musc. 10. & 11. vocal. instr. 4. & θυροειδής; Auicenn. Clypealis, pel-
lis, scutalis; Alliabbati modo umbo, modo ab anteriore eius prominentiâ, malū
natum. Anticam etiam dici à situ, monet, Laur. d. 7. vs. part. 11. cui & 1. carti-
30, qua scuto non rotundō vndiq; sed præ longo, quod proprie scutū appellamus, diff.
cal. instr. 4. Vesal. adhuc Turcarum aliqui in nauib^s præsertim viuuntur.

dicitur [*tab. 32. fig. 2. & 3. tota.*] Figura enim scuto antiquorum prælongo similis & veluti scutum ventre concauo, dorso gibbofo alijs præponitur: Etenim ossi hyoidi subiecta partem anteriorem tegit, eamque tangimus maxime in virorum gutture, in quorum magis, quam in mulierum prominet, & tuberculum

e In viris ut plurimum, in fœminis raro cōspiciua, Placent.

f In bove superne duo evidentissima foramina, ut per ea nervorum recurrentium propagines ferantur ad musculos laryngis proprios, Placent.

g Subinde gemina, & potissimū in viris & hominibus peculiare est, Vesal. duplex est, & testudinis ritu per acutū angulum anterioris unitur, Columb. & Archæan. interdū per medium in

obtinet, quod pomum Adami^e dicitur, eo quod Adamo Dei mandatum altius rimanti & pauenti, fatalis pomi buccella ipsius gutturi hæserit, à muliere credulâ iam deglutita: imo potius, quod in fœminâ glandulæ ad laryngem positæ, earum collum exæquent. Quadrilatera est, propter processus^f quatuor, quos parte posteriore obtinet, cum posterius lateribus non vniatur.

Vnica est, & licet in eius medio crebrò linea conspiciatur [*tab. 32. fig. 2. & 3. inter G. & H.*] cæterarum^h maxima & latissima, cum dimidiū totius^h capacitatis laryngis comprehendat; quare alijs triplo maior, quo laryngem & glottidem vndique ambiat, & in homine sede superiori, quam inferiori amplior est.

Connectitur cum ossè hyoide, processibus superioribus: cum cartilagine secundâ, processibus inferioribus.

Substantia est cartilaginea, tenuissima, dura tamē, quo glottidem tueatur, & pro voce efformanda auxilio sit: quæ in senibus aliquando adeo dura, ut ob insignem siccitatem naturæ ossæ particeps sit; & quando ossæ fit, ad latera indurescere incipit, remanente lineâ mediâ, angulum cartilagineum referente, quæ tandem quoque ossescit. Superficies exterior

ⁱ conuexa, ad parietum extrema vtrinque latera, aspe-

ra, con-

duas partes diuisa, plerumq; integra & cōiunctionis lineâ tantum apparente, Plat. interdum gemina præsertim in mulieribus, Laurent. Vnicam tota censuit antiquitas & fere semper ita est, Aquap.^l solâ imaginariâ distinctione separata inuenitur, Plat. ^h Gal. de vocal. instr. diß. 4.^a maxima, at 7. de vs. par. 12. reliquis maior. ⁱ Hac quibusdâ imponere posset, ut istâ cartilaginē geminā esse crederet, non a. vñâ, Fall.

raconspiciuntur, quo musculorum laryngis communibus pari primo insertionem præbeat, item tertio pari communi œsophagum cingenti exortum. Interior^h caua, quo laryngis cavitatem oblongam efformet, & quo plenior & elegantior sonus edatur, quod à concavis, quam à planis rectius perfici campanæ demonstrant.

Processus^k quatuor habet [*tabul. 32. fig. 2. & 3. I K L* ^{k Membranis vinculis. Vesal. Col.}] supra infraque binos, vtrinque in lateribus singulos: duobus superioribus [*tab. 32. fig. 1. I K.*] per ligamentam^k oblongum ossis hyoidis humilioribus lateribus [*tab. 32. fig. 1. B B.*] iungitur, quæ per intervalla^l corpuscula oblonga, rotunda ac cartilaginea obtinet [*tab. 32. fig. 1. supra K. & I.*] quo robustius reddatur, ^{l Monet & Aquapend.} maxime cum lingua exeritur ac retrahitur. Duobus inferioribus [*tab. 32. fig. 2. & 3. L M.*] qui in homine superioribus breviores sunt (contra vero in ouibus) secundæ cartilaginis sinui leuiter cauo, capitulo depresso per arthrodian articulatur [*tab. 32. fig. 1. L ad I.*] quo thyroides sursum ac deorsum moueatur. Iuxta processus vtrinque cavitates^l quasdam recurvas seu arcus obtinet, quarum superior [*tab. 32. fig. 2. & 3. G.*] in medio posita minor est, quæ propter epiglottida facta, quo facile & cito attollatur: inferiores vero [*vtrinque ad H.*] vtrinque vna, quo musculi anteriores implantentur [*tab. 31. fig. 6. f.*] Est deniq; mobilis partim articulatione, partim flexione: articulatione, quæ arthrodia dici potest, tum in longitudinem sursum & deorsum articulis innixa trahitur, qui articuli inferiores sunt ad processus, qui cartilagini secundæ nectuntur, & id musculorum communium pari primo & secundo: tum in longitudinem compressa à tertio pari, & laxata à cartilaginis flexibilitate sine musculo. Flexione; ppter sui enim tenuitatem flexibilis est, in latitudinem mouetur, in profundum cedit, & iterum

TAB. XXXII. *Laryngis cartilaginee proponit: fig.*
 1. *laryngem cartilagineam integram cum osse hyoide,*
fig. 2. & 3. cartilag. thyroidem, fig. 4. 5. 6. cricoidem, fig.
7. 8. 9. arytenoidem, fig. 10. epiglottidem, &
fig. 11. bronchij cartilaginem ex-
hibet.


LIB.III.

TAB.XXXII

FIG. I.



.II.



.III.




.III.



.V.



.VI.



.VII.



.VIII.



.IX.



.X.



.XI.



rum recurrit, sicque laryngis cauitas attollitur & deprimitur, vel comprimitur & laxatur. Vfus huius cartilaginis quadruplex, ad cauitatem laryngis parandam, ad glottida stabiliendam, ad musculis sedem præbendam, ad articulationes propter motum constituendas.

m 7. vs. part.

ii.

n De vocal.

instr. dis. 4.

o Vesal. Col.

Laur. Aquap.

Placent.

p Galen. diff.

musc. ii. cau-

sam dicit lib.

de vocal. in-

strum. dis. 4.

quod haud fa-

cile alicui rei,

qua in mundo

nomen sortita

est, assimilari

possit; quare

nominis defe-

ctu vocatam

esse: at Alber.

Magno, quod

oculis conspici

non possit; Ve-

sal. huic nul-

lum nomen est

inditū, idcirco

peculiari quo-

dam modo no-

mine innomi-

nata vocari

potest: Colum.

tertium os in-

nominatum, quod annulata voco, & Archæan. cui & circulare: Fallop. altera a

annuli similitudine crycoides dici potest, quāvis ab Anatomicis sine nomine sit di-

missa: Plat. & Laur. annularis q Postremo cartilagini incūbit, Gal. voc. instr. dis. 4

Secunda^m & inferior *κρυκοειδής* annularis [tabul. 32. fig. 4. & 5. & 6.] ab annuli formâ Galenoⁿ & Oribasio: similis namque annulo osseo, quem Turcæ^o sagittas eiaculari pollicis dextro imponunt, vt eius annuli beneficio arcus neruum robustius trahant: vulgo innominata, p quia ab antiquis ante Galenum sine nomine relicta fuit; forte, quia laryngis actiones cum motu fiant, & aliæ tres motum præstent: hæc vero quasi aliarum fundamentum se habeat, immobilis ac veluti otiosa sit. Scutiformi q subiacet, & reliquarum cartilaginum, quas sustinet, basis est: hæ enim fistulæ cartilaginibus infirmis inniti minime potuissent: arteriæ asperæ cartilagini primæ q incumbit, cui vinculo iungitur, & maximâ sui portione, in posteriore laryngis sede reponitur; & totam laryngem annuli modo ambit, quo suâ duritie eius firmamentum existat. Annulum & circulum perfectum referre debuit, partim, quo laryngis fistula semper pateat, & aeri liber ingressus & egressus concedatur, & ne in laryngis motu fistulæ cartilagine semicirculares comprimantur; partim etiam, quo impediatur, ne ab œsophago inter deglutendum rem aliquam crassam vel duram dilatato, fistula, quæ respirationis via est, artius comprimatur, & suffocatio sequatur. Exterior & antè gibba est, angusta, tenuis & teres, reliquarum fistulæ cartilaginum modo [tabul. 32. figur. 4. R.] gib-

gibba, ad sui tutelam, & quo cavitatem cum scuti-
formi paret, ad sonum faciliorem & gratiorem red-
dendum; tenuis, ne aerem in thyroïdem impellen-
dum impediat: quod si hac parte latior foret, tum
thyroidi locus pro motu defuisset. At posterius, cum
partem eam thyroidis non ambiat, latior esse potuit
& debuit [*tab. 23. fig. 4. 5. 6. S.*] latior, inquam, annuli
palam referens, & depressa, aliàs suâ rotunditate, ac-
cedente etiam duritie, deglutitionem impediuisset;
imo & crassior, maxime versus superiora articuli cau-
sa, vtque vndique rimula muniatur, quo duritie suâ
glottida stabiliat & tueatur; & inde muscoli aliqui
prodeant. In latissimâ enim & mediâ parte linea aspe-
ra eminet [*tab. 32. fig. 6. T.*] quam spinam innomina-
tæ cartilaginis Galenus ^r nominat: cuius beneficio ^r *De vocal.*
cavitas vtrinque lævis constituitur [*tabul. 32. fig. 6. V. instr. diss. 7.*
X.] quo musculorum propriorum secundum par
commodius situetur. At sede superiore & posteriore
tuberculum oblongum, vtrinque vnum obtinet [*ta-*
bul. 32. fig. 6. Y Z.] seu processus extuberantes, quos
Galenus ^f humeros appellauit, quibus arytenoides ^f *De vocal.*
[*tab. 32. fig. 9. e. e.*] inarticulatur, quo loci semper duri-
^{instr. diss. 4.} or & crassior est, ita, vt quæ in puerili ætate cartilagi-
nea fuit, in mediâ & adultâ ætate ossea esse videatur:
Sede vero mediâ modice quoque extuberrat vtrin-
que, crassiorque est [*tab. 32. fig. 6. N O.*] sinusque oc-
currit, quo thyroïdes processibus inferioribus, qui-
bus capita valde depressa sunt, articulatione fere pla-
nâ ipsi validissime iungatur. Sede denique infimâ
[*tabul. 32. fig. 4. 5. 6. S.*] velut processus quidam deor-
sum ducitur, quo inde musculorum propriorum
tertium par exoriatur.

^r Hæc quanto prima est minor, tanto tertiâ ma- ^r *7. v. p. ar. ix.*
ior existit, est etiam strictior, quam fistulæ inferna
basis sit, quare totius laryngis pars inferior amplior
est

est superiore orificio, quod in faucibus est: omnium durissima & crassissima (licet eandem crassitiem vndique non habeat) cum aliæ huic tanquam basi inruntantur; quare & immobilis, quo supra hanc reliquæ & moueantur & articulentur, & in eam aliarum musculi firmentur.

Connectitur etiam thyroïdi membranarum seu vinculorum operâ à primâ ad secundam pductorum, quæ gemina sunt, quemadmodum & ea, quæ secundam cum tertiâ copulant, docente Galeno^u illæque membranæ non modo mediam crycoidis partem, sed etiam vniuersam thyroïdis basin, obducunt.

Lib. de voce
& anhelitu,
& 7. vs. part.
11.

x 3. Cartilago
Gal. de vocal.
instr. diss. 4. 7.
v. p. 17. quar-
tum & quin-
tum laryngis,
vt Col.

y Gutturij in
fundibili for-
mâ represen-
tat. Gale. diss.
musc. 12.

z De vocal.
instru. diss. 4.
Theophilus li-
gneū muscu-
lum dixit, quo
Nauta aquâ
ex naui ex-
hauriunt, &

Tertia^x in lateribus est, [tab. 32. fig. 7. 8. 9.] & ἀρ-
ταρσοειδής, seu guttalis dicitur, quod gutturnij^y for-
mam repræsentet, si duo processus superiores, mem-
branâ adhuc obducti perpendantur, vel quod illi ol-
larum parti, quâ manus lauaturis aqua affunditur, si-
milis sit, quàm ἀρύταρρον^z Græce, Gutturium Latini-
corum aliqui appellant. Hæc communiter pro vnâ^a
cartilagine recensetur, eò quod ex toto inuicem se-
paratæ non sint, & simul sumptæ, & non seorsim a-
ctionem absoluant, & pro diuersitate subiecti, vt plu-
rimum figurâ variat; quare dum tunicis adhuc tectâ
est, triangulo imperfecto assimilari potest. Quod si
vero membranâ, quibus obtegatur, libera, ex duab.
cartilaginibus compositam conspicias [tab. 32. fig. 7. 8.
9. β γ.] siquidem duntaxat ligamentorum & mem-
branæ

Olitores ad hortos irrigandos vtuntur, quod Vesalio non placet: inter vasa balnea-
torum numerat Pollux lib. 10. ori vasis olearij assmilis Gorrao, Lauren. cui & postica
dicitur à situ, quod posterius sita sit. a Tertiam cartilaginem omnes pro vnâ
descripsere, cum membranâ suis liberata, ex duabus constituatur, Vesal. ex binis
ossibus 4 & 5. constat, Columb. & Archan. ex duplici cartilagine, Fallop. Gorrao,
Aquap. utrinq; vna arytana dicta, Plat. Anatomicus fere omnibus simplex, nobis
semper gemina visa, Laur. interdum unica, vt in homine, interdum duplex, vt in
quibusdam alijs reperitur, quod primus Fall. notauit, Placen. in suillâ unica vide-
tur, quàm Galenum descripsisse constat, ac forte etiam priscos, Aquapend.

branz laryngem succingentis beneficio infra supra-
que laxè committantur, in medio vero dehiscant.

Hæc in sui medio, vbi crassior est, articulum ade-
pta est, quo crycoidis summitati œsophagum spectā-
tis applicetur, & cum cartilago duplex sit, duplex
quoq; articulatio est, quæ cavitatē suā, seu sinu vtrin-
que [tab. 32. fig. 8. 9. e. e.] crycoides extuberantias [tab.
32. fig. 6. T. Z.] excipiant, quo commodè coarctari &
dilatari possit.

Substātiā est ab alijs diuersa, reliquis mollior, quo
ad motum musculis maioribus non indigeat; tenui-
or, pinguior, humidior, ne ab acre calidiore exsicce-
tur, alijsque multo minor, ne meatus angustior fiat.

Processus habet superiores & inferiores: Superio-
res [tabul. 32. fig. 7. 8. 9. Z.] qui simul iuncti vasis aqua-
rij seu gutturnij figuram exprimunt: exterius recur-
vantur, ne interius propendcant, sicque cavitatem
implendo spirituum transitum liberum impediunt:
laxi sunt, molles, pingues, flexibiles, quo totius glot-
tidis motum sequantur: hi ex toto inuicem separati
non sunt, ne forte vna ab alterā distrahatur: quare in
homine superne membranā iunguntur; in porcis ve-
rō vna esse videtur. Hæc pars adeo mollis & flexilis
est, vt in vomentibus antrorsum in laryngem reclī-
netur; quo arteriam exquisite tegat, ne ex vomitu ar-
teriæ aliquid illabatur, & ad pulmones deferatur.

b Vide 7. v. s. 16.
Vesal.
Columb.

Inferiores vero processus, γλωττίδα, seu rimu-
lam modulandæ voci accommodam constituunt,
quā parte ex toto diuisi sunt [tabul. 32. fig. 7. & 9. C. C.]
cum rimulam mobilem liberamq; esse oportuerit;
nisi enim transitus angustus sit, vox fieri nequit, cui
præcipuū vocis articulatæ tribuitur. Hi quoq; in la-
ryngis cavitatē mediā, membranā pingui obducuntur,
quo rimulā firmiorē efficiant. Mobilis est arytaenoides,
cū larynx citra motū angustari & dilatari rursus non

possit; quare vtrinque ad partem inferiorem musculus inseritur.

Articulationis vero arythænoidis cum crycoide motus quadruplex est, flexio, extēsisio & ad latera motio, sicque sursum, deorsum, dextrorsum & sinistrorsum mouetur: per flexionem arythænoides in cauitatem pellitur, à quarto pari propriorum musculorum ad rimulam occludendam: per extensionem, extrorsum reuellitur, à secundo pari propriorum, ad rimulam aperiendam: rursus per motum ad latera, à quinto pari ad eam coarctandam coniunguntur, quemadmodum à tertio pari ad rimulam delatandam separantur. Differt autem arythenoidis flexio & extēsisio, ab aliorum articulorum extensione & flexione, quod in cæteris vnus motus alterius gratia fiat: at in arythænoide ambo per se vtilis sunt: flexio quidem, ad rimulam constringendam, quo spiritus cohibitio & consequenter vox fiat: Extensio vero, ad ipsam dilatandam, quo spiritus copiose recipiatur.

c Vbi minor
cartilago, qua
intus est, desin-
nit, dua super-
iacent parua

Sinus c inter arythænoidem & thyroidem, à membranis cartilagineis alligantibus efformantur, in quos sc. epiglottide propter risum aut loquelā inter comed-

den-
conuexitates, 7. *Uf. part. 11. vide & cap. 13. de laryngis duplici sinu nihil penitus scripserunt, quod sciamus, quotquot à Galeni temporibus auctores extiterunt, præter Casparum Bauhinum, &c. Hac Seuerinus Pinaus in præfatione opusculi sui Anatomici: inter ligulam & epiglottida sinus membranosi à veteribus non descripti, qui aeris sunt conceptacula, Laurentius. Hos ventriculos à Galeno inuentos Vesalius fictitios asserit, sed experientia Vesalium confutat. Verum cuncta animalia his meatibus haud sunt prædita, cum solis porcis, euidentius equis & quibusdam alijs, canibus præsertim id tantum commune ac familiare sit, Placent. cauitates in porcis ventriculis similes, partim à scutiformi, partim à musculo interno scutiformi proximo, qui tanti sunt, ut possis, non difficile digitorum deorsum in eos immittere: quos ventriculos non modo in porcis, sed etiam in equis obseruau; omnia terrestria animalia obtinent ante rimam & ad rimam, sed alia exiguos, alia maiores, alia maximos: equi & sues maximos: homines habent, sed non ita profundos: simia media est, qui ad spiritus cohibitionem faciunt, dum ex toto glottis clauditur, & omnibus thoracis musculis resistit, Aquapendens.*

dendum aut bibendum aperta, aliquid cibi vel potus illabatur, quia subito contra respirationem feruntur, rursim excitat, ubi natura summo conatu ea expellere nititur: horum sinuum usus, ad aerem attractum, ne impetu illabatur alterare, quemadmodum ab auriculis cordis fieri solet, qui sinus in canibus ventriculis similes sunt.

DE GLOTTIDE ET LARYNGIS RIMULA.

CAPVT XCV.

Galen. 7. v. s. part. 13. & lib. de voce.

QUOD γλωττις dicitur, corpus est rimam seu fissuram in larynge constituens, quod vocis edendæ ac conformandæ instrumentum ^b præcipuum est [tab. 30. fig. 1. d. f. 2. q. tab. 31. fig. 4. d.] Sic autem nominatur, quod figurâ & usu linguæ ^b fistulæ alicuius similis sit, quare lingula & parua lingua Latinis dicitur (quamvis naturalia artificialibus assimilari non debeant, ex Galeni ^b mente, tum quod natura prior sit ante, tū quod in operibus sapientior sit arte.) Quemadmodum enim vox à fistulæ ^c lingula, ita etiam à laryngis lingulâ vox fit: & quemadmodum homo per linguam loquitur, sic fistula per hanc tanquam per linguam loqui dicitur, siquidem lingua non solum loquelæ, sed etiam vocis instrumentum sit. Intus collocata est, quo vox facilius generetur, & eius instrumentum ab externis tutius sit.

Figuræ est ovalis, vtrinque acuminata, magis tamen, qua thyroidem, quam quâ arythænoïdem spectat; longitudine laryngem æquat, & quo ab eius cartilaginibus stabiliatur, & quo voces graues, acutæ & mediæ edi possint: & quo ad aeris copiam iustam ^d inspirandam sufficiat. Et quemadmodum larynx vnus

a Aristot. corpus, q̄ in larynge, γλωττις dicitur, non agnouit, imo præter vocem totius instrumenti & ἐπιγλωττιδα nil aliud in larynge nouit, A-quap.

b 7. v. s. par. 13. apud Gal. tum interpretum, tū Graci exemplaris vitio, saepe γλωττις pro ἐπιγλωττις, (praesertim in 8. v. s. part.) ac rursus deuerso ordine legitur, Vesal.

c Ab ea singulorum similitudine, quas ex duob. arthridinum laminis compactos, tibiis accomodamus, Vesal. Columb.

d Sic & A-quapen.

est, sic & lingula vna est, quæ ab arythænnoide cartilagine incipit, & in thyroideam finit, quo motu voluntario mobilis sit. Diuidi tamen potest in eam, quæ parte superiore ex arythænnoidis partibus potissimum componitur, & eam, quæ parte inferiore ex membrana duplicata efformatur. In laryngis mediâ parte glottis & rimula rectâ à prioribus ad posteriora posita est, quo aer à rima exiliens, voceque efformatâ rectâ ad palati fastigium feratur & linguæ apicæ (quæ loquelæ potissimum auctor est) ad articulos conformetur. Quemadmodum autem fistularum rimulæ, modo latæ & longæ, modo strictæ & longæ vel breues, ita hæc existit: quod si longa sit, & lata vox grauis; si stricta, vox acuta producet. Magnitudo tamen corporibus proportionem respondet, ita ut magnis magna, paruis parua à Naturâ tributa sit, quæ sane ad vocum differentias confert.

e Galen. 7. vs. par. 11. partem dicit similare esse, & peculiarem corporis proprietatem habere, quæ adiposum, glandulosum membranosumque corpus, & amulatur & dici possit, imo glottidis substantia nullam aliam simile in toto ani-

e Compositio huius artificiosa est, quo aer; qui vocis materia est, facile & ascendat & descendat, & cōmode percipi possit: componitur enim ex cartilagine arythænnoidis utroque processu [tabul. 32. fig. 7. 33.] vel à duplici cartilagine arythænnoide & portione musculi thyroidis, & arythænnoidis processus inserti, quæ duo membrana (interiorem rimulam constitutens, de qua infra) non modo densa, ut eam teneatur, sed etiam humida obuoluit; humiditas viscosâ simul & vinctuosa facta est: quamuis & humiditate propriâ lingula perpetuo madeat, ne nobis vox celeriter pereat, ipsa lingula vnâ cum omnibus particulis ad laryngem pertinentibus exsiccata, sed in multum tempus

mantis corpore reperiri 7 vs. part. 13. asserit. At Aquapendens hoc reprehendit. 1. quia pars dissimilans, sit & composita. 2. dum dixit, adiposam, glandulosam & membranosa, porcorum glottida descripsit, quæ adipe est duriore ac densiore, ut glandula etiam substantiam præferat; cui membrana ita inhaeret, ut pars eius videatur: Sic Placent glottis substantia membranosa, adiposa, glandulosa, peculiari carne & aremate conflata.

dus sufficiat. Cum enim substantiæ sit membranosa
 ex motu frequenti, qui in voce fit, & ex aeris perpe-
 tuo affluxu, & spiritus qui exspiratur, calore exsicca-
 retur; sicque laryngi accideret, quod fistulis, quæ sub-
 inde humorem nouum requirunt: quare exsiccata
 vocem edere non potest; quod ijs accidit, qui feбри-
 bus ardentissimis ^f laborant, & qui per æstus magnos ^{f7. v. part. 23.}
 iter faciunt: hi loqui non possunt antequam laryn-
 gem humectârint, vel si loquantur, voces clangosas,
 vt Hippocrates ^g nominat, edunt: ob hanc humidi-
 tatem superficies glottidis maxime lubrica existit: est
 tamen etiam læuigata & polita, ne aer in partes inæ-
 quales impingens, & inæqualiter profluens vocem
 insuauem ac asperam reddat. Moderate tamen hu-
 mida esse debet, cum nimium madida corpora dete-
 rius ipsis siccis sonent: quare in catharro & grauedi-
 ne vox rauca est, quia larynx humoris superuacui co-
 piâ perfunditur: & propter hanc humiditatem ho-
 mines diu sine vlllo impedimento, humorisque de-
 fectu voces aptissime proferunt. Huc forte respici-
 ens Galenus, ^e lingulam non modo membranosam,
 sed etiam adiposam, glandulosamque constituit: &
 hæc quatenus mollis est, ad contractionem & dilata-
 tionem facit, cum tantum constringi ac dilatari de-
 beat, quantum ad aeris exspirationem sufficit: nam
 glottis aut quiescit, aut mouetur: quatenus quie-
 scit, liberæ inspirationi famulatur; quatenus moue-
 tur, vocis instrumentum est, ad quam formandam
 duplici motu concurrit, ^h dilatationis & constrictionis,
 dilatatio vocum magnarum & grauium causa
 est: at constriction duplex est, vel vt rimulam an-
 gustiorem reddit, sic vox acuta & parua, vel o-
 mnino occludit, quo spiritum violenter intus co-
 hibeat, ad pondera magna attollenda, ad foetus
 exclusionem & alia. Quare, quatenus musculosa

^g In prorrh.
 αἱ πνεύμα-
 τες αὐτῶ φωνῇ
 κλαυθόμεναι, de-
 sapientia cum
 voce stridula,
 in coac. 7. e-
 pid. Gal. com.
 2. prorrh.

^h Auicenna
 ait, quemad-
 modum lingula
 dilatatur ac
 constringitur,
 ita percussio
 & vox.

motum dilatationis ac compressionis præstat: Quatenus cartilaginea, de articulationes ad motum præstandum obtinet, & robur ad motum acquirit, ne à spiritu euertatur, & ad arythænoidis motum & glottis mouetur: quatenus membranosa, facile dilatatur & comprimitur, rima perfecte conformatur, & musculum tuetur.

i Arant. huius meminit, & hanc anteriorem rimulam præcipuam esse modulanda vocis sedem existimat, cui glottidis diuifio subseruiat.

Verum i præter rimam illam ab arythænnoide constitutam in interiore cauitate ex membranarum concursu alia rima in homine tantum efformatur, fistularum scissuris appositæ respondens: nam ab anteriore & mediâ parte cartilaginis thyrocidis membrana, quâ interius succingitur, in medio è directo glottidis duplex ac solidior efficitur, & per diametrum ad posteriorem laryngis partem perueniēs, in teriori annularis cartilaginis sedi nō lōge ab arythænnoide connectitur, ita vt tensa satis conseruetur: inter has membranas duplicatas, rima oblonga à posteriore in anteriorem partem ductâ [tab. 32. fig. 7. 8. 9.] relinquitur, quæ thyroide, musculorum beneficio dilatata, latior fit, vox grauis efformatur, contra acuta, si angusta reddatur, cui glottidis diuifio auxilio est, cum vtraque rima eodem momento & dilatari & constringi videatur.

k Plurimæ præcipuam vocis organum putarunt laryngis operculum id temere γλωττίδα & ἐπιγλωττίδα vocitantes, cum hac nomina diuersas prorsus partes venteribus significent, Vesal. 17. vs. part. 11. m 7. vs. part. 13. & de voce. n 8. de Plac. 9.

Vfus k glottidis, vt sit vocis opifex præcipuus, vel pars præcipua, in larynge, quæ actionem, id est, vocem, quæ propria huius instrumenti actio, efficiat, cum aer pertransiēs compressus & elisus vocem producat, & vox m fieri non potest, nisi transitus sit angustior: (recte ergo Galenus l laryngem, sine glottide ad vocem formandam prorsus ineptam dixit, & crystallino in oculo assimilauit) talis autē est, quatenus mouetur, hoc est, dilatatur & contrahitur: in nostrâ n. potestate n est, osculum laryngis, cum volum⁹, aperire & claudere, & prout, vel arctamus vel laxamus.

mus, vocem nunc grauem, nunc leuem reddimus
nam si leuiter ac molliter spiritus efferatur expira-
tio sine sono fit; si vero repente, simul ac vehemen-
ter spiritus effundatur, tunc vox verè efficitur.^o

faciunt facit, & adiutà tamen epiglottide, arythanoïden magis minuscule clau-
dente, Laurent.

DE EPIGLOTTIDE EIVS. que musculus.

C A P. XCVI.

De Epiglottide egit Hippoc. lib. de corde, Arist. 3. par. anim.
3. & 2. hist. an. 12. Gal. 7. vs. part. 13. & 16. de vocal.
instr. diff. 4.

Επιγλωττις^b & ἐπιγλωσσις Græcis, quasi supra
glottida positum, exigua aut minor^d lingua La-
inis dicitur. Cartilago est & operculum rimulæ, ne
quid inter deglutiendum facile in arteriam asperam
delelabatur [tab. 30. inter fig. 1. & 2. posita est, sed inuersa &
fig. 1. vbi a a abscisa fuit: at tab. 31. fig. 4. 5. 6. b]

Sita est inter laryngem & linguam; & si membra-
ræ linguam obuoluentis superficiem inspicias, quæ
cum epiglottide continua est, quasi linguæ pars cen-
teri poterit; quare aliqui,^e ex linguæ radice originem
trahere voluerunt, cum à thyroide potius^f oriri vi-
leatur. Nam basi amplâ & antrorsum recuruatâ à

Sss 5 thy-

periet, non omnia viui paræ eam obtinent, sed ea tantum quib. pulmo, & cutis pilo-
nata, non cortex non penna operimento est &c. 3. part. anim. 3. vide & 1. hist. 16.
Lanas etiâ carere dicit Plac. b Aristoteli, Galeno. c Hipp. de cond. at. 2. de morb.
c. 1. h. p. claustrum. Erasistrato ab usu claustrum mutuum. d Plin. l. 11. cap. 37. Celsi
ib. 4. c. 1. carna pulmonum operculum, Cic. de nat. deon. alijs singula fistula. Gazæ
inguulam & minorem linguam vertit 1. hist. 15. & 2. epid. 12. apud Arist. Celsi er-
ore delusus, qui per multa, quæ ad Anatomem spectant perperam intellexit, Vesal.

e Vocal. instr. diff. 4. quæ ipsius bronchij non est propria. Introd. 11. lingua basi cu-
sdam musculi interuentu circa partem superiorem ossis hyoidis in quadrupedib.
obaret, & cum laryngis cartilaginib. membranarum nexu, Placen. f Col. ipsius
ortus vel cum eâ connexus, Vesal. prodit interius à scutiformi, Plat. firmiter
annecti-

o Vocem acu-
tam & grauem

à Epiglottide
carent ouipa-
ra: sic enim
Arist. linguâ
illam minorem
operiendi mi-
nistrant, nul-
lum ex ijs quæ
oua pariuunt
superimpositâ
sua arteria
continet: sed
meatû ipsum
modo trahunt,
modo laxant
pro sui cõmodi
desiderio: atq;
ita efficitur, ne
quid ponderis
in pulmonem
delelabatur. 2.
hist. an. 12.
natura molita
est minorem lin-
guâ quæ arteriâ

annectitur,
Aqua. potius
eam contingit
quod ei conne-
ctitur, idem.

thyroidis parte interiore & elatiore assurgit [tab. 31. fig. 4. * fig. 5. †] modicè lateſcit, & mox arcuata rotunda fit, at in brutis ſenſim anguſtatur & velut in cuſpidem acutam deſinit; baſi ſuâ thyroïdi annectitur, reliquâ parte vndique libera eſt.

g 4. de Morb.
trianguli ima-
ginem expri-
mit, Vef. mo-
dicè curuati
ſcuticuli for-
mam imita-
tur & ſenſim
arctatur in
mucronem,
Col. in mucro-
nem non val-
de acutum de-
ſinit, Lauren.
trianguli cur-
ua quadante-
nus habentis
latera, Aqua-
pend.

Forma folium hederæ, ex diuini ſenis ſententiâ & refert, cùm ex latâ baſi antrorſum arcuata rotunda fiat, vel exiguam minoremque linguam, ſecundùm Plinium & Celſum: parte ſuperiore, quæ dorſum dicitur, & quâ palatum reſpicit, aliquatenus conuexa & extrorſum eminens: interiore verò, quâ rimulam ſima & nonnihil caua: latitudine ſuâ non ſolùm rimulam tegit, ſed etiam aliquantulum excedit.

h 7. vſ. par. 16.
& Introd. 11.
addit: quare
non ſolum os
claudit arte-
ria, ſed etiam
cibum à lin-
guâ veluti
vètilabro pur-
gatum & ar-
teria oriſicio
impoſitum ad
ſtomachum
pontis modo
deijcitur.

Rigida quoque & erecta eſt naturâ ſuâ, quò arteriæ aſperæ fiſtula aperta maneat, ne cor ſuffocetur, flexibilis tamen, quò rimulam, ſupra quam recuruat, perfectè claudat, vbi cibus potuſque deglutitur, à quorum pondere deprimitur: ijsque deglutiti ſubito virgæ ritu attollitur & recurrit. Quare ſubſtantia ipſius cartilaginea eſt, & tenuis, cæterâ cartilagine mollior, ita tamen, vt parte exteriori, quâ palatum reſpicit, mollior, tenuior ac flexibilior ſit, & quæ laryngem reſpicit: maximè verò in extremo ad œſophagum inſigniter mollis eſt. & membranâ pingui obducta. Nam dum animal reſpirat, ſpontè attollitur, vt viam aëri faciat: cùm autem tranſglutit, laryngi accumbit, ne id in pulmones decidat: quocirca enim h tranſglutitur ipſius radici primùm incidens poſt dorſo inuectum, inclinare ipſam cogit & collabi: quos motus nō præſtitiffet, ſi fuiſſet vel membranosa vel carnoſa, quoniam vel ſemper depreſſa iaceret, vel ſemel depreſſa difficulter attolleretur, ne vnquam erigeretur: vel oſſea, quoniam ſemper erecta atque eleuata perſiſteret, nec de labentibus cibi & potibus deprimeretur. Quare cum Galeno epiglottid

lottidis motum in homine naturalem censemus, rimulam non musculorum beneficio, sed assumentorum pondere, tegi atq; retegī censemus. In brutis erò ruminantibus muscoli reperiuntur,^k quos breviter attingemus (eius nomine, quòd in bouis larynx sapius Studiosi exerceantur, in humani defectu, eius nomine in toto hoc opere sapius brutorum, maximè eorum, in quibus iuvenes exerceri consue-
re, vt simiarum, porcorum, ouium, potissimùm item canum partes, in quibus ab humanis differūt, censuimus, quòd iuvenes ab errore liberemus) si
ius monuerimus, epiglottidem quoque membranam obducī pingui, ligamenti naturam referente, quæ cartilaginem thyroidem adipe multâ abundat.

Musculi reperiuntur duplices Hyoglotti & Arytanoglotti d. & i.^l Hyoglotti in dorso epiglottidis ositi, ab ossis hyoidis parte inferiore mediâ^m enati, rinq; in epiglottidis basin prope eius mediū inserti: qui epiglottidem in cibi potusq; deglutitione prepressum, rursus attollūt, ne exspiratio impediatur.

Arytæ-

ii opposito munere fungantur se nullos obseruasse: nec mirum, cūm cibus & potus pondere facile comprimant: imò & illi, qui rectum intestinum, & testes sursum hincunt, oppositis destituuntur, Vesal. Ex Vesal. sententiâ proponit Plat. addens in brutis duntaxat & ruminantibus ipsorum epiglottida validè reflectere cūm nominat, & voces magnas edant; subiungit, quid si in hominibus, qui facile vomunt, inueniretur, Plat. in boue, bubulo & eiusmodi inuenire poteris, in homine nequaquam, Columb. nulli in homine reperiuntur, Lauren. Musculos habet epiglottis, sed quot sint, & num homines habeant, incertū est. Gale. non meminit, quam nec simia ijs destituatur: in brutis duo musculi epiglottidi versus basin inserti: homine & brutis unus membranosus versus summitatē insertus: duo adhuc alij
bus euidentijs. claudetes &c. Epiglottidis motus sursum per musculos absoluitur, quaquā sua tantū natura recursus cōmittitur, Aquap. Hi in homine non reperiuntur sed bobus, suibus, quadrupedib. omnibus: Epiglottidis motui musculi quatuor destinantur, duo ab osse hyoide, duo à primâ cartilagine prodeuntes, at in superem epiglottidis basin vt attollant, implantari, quâ sententiâ nihil excogitari testē absurdius, Placent. in Geminus non est, licet ab osse hyoide principio duplicato carneo & ab inuicem separato exurgere videatur: at cūm diuisio non multo post originem obliteretur & ante sui medium vniatur & unus simplex ad finem progrediatur, fateri cogimur simplicem & singularem esse musculum, Placent.

i Voluntaryū est totius epiglottidis opus aperiendi claudendiq; arteriam & perfectè claudendi effectus in musculum referri debet, Aquapend.
k Musculus tam in homine, quam in brutis necessarius, membranosus &c. Aquapend. vide cap. seq. in margine.
l Vesal. 4. par. communium laryngis qui Galeno cogniti sint: huic pari duos alios

Arytænoglossi, qui in bobus propter laryngis magnitudinē euidentissimi sunt: hi carnosī ab arythænoide supernā ad articulum videlicet exoriūtur, qui ad originem contigui & per longum spatium ferè vniti & commisti, & per internam thyroidem, similiter crassitie longissimè producti, tandem in internam epiglottida ad basin vtrinq; mutuò sese contingentes inseruntur. Nunc ad vsum epiglottidis.

Vsus epiglottidis, glottidē operculi modoⁿ dum super eam recuruatur, in cibi & potūs assumpti deglutitione tegere, ne cibū potūsue copia confertim delabatur: nam si quid cibi aut potūs in arteriā^o imprudentius delabatur, strangulationes & tussēs statim excitantur, donec a spiritūs impetu excussa efferrantur. quia ea res descendens respirationem tollere videtur: at homo sine respiratione viuere nequit quare natura necessariò ad expulsionē insurgit. Notamen ita exquisitè clauditur, quin non p̄ potioni exiguum quid in asperam arteriam feratur & sensim per glottidis parietes illabatur, licet id non persentiat: quā sanè ratione putandum est, destillationes capite in pulmones ferri, quæ licet interdum copiosissimæ sint, attamen ab ægrotante non percipiuntur, & noctu per somnum magnā ex parte insensibiliter aggregantur. Ferri enim potūs portionem in arteriam asperam, tali exemplo dictator noster Hippocrates^q ostendit: si quis aquam cæruleo colore aut rubricā temperatā, sitienti valde bibendam dederit, maximè porco, hoc enim pecus non est curiosum

neq;

sculenta & poculenta deglutiuntur, Archang. addit qui ad moderandam voracitatem conditum censent, parum reinaturam inspexerunt, cum glottis non epiglottide praeset. ^o Introd. 11. sic Anacreon poëta acino vna passa suffocatus & Fabius inator in lactis haustu pilo poto strangulatus fertur. Refert Alexan. Benedict. B. xiensem matronam filio pilulam assumere nolenti, digito in arteriam impulsam, tuncq; protinus exanimatum. p Gal. 7. vs. part. 17. 2. simpl. 4. Meth. med. 7.

^q De corde, repetit Galenus 8. de Plac. 9.

n Hippocr. de corde operculum ne ampliorē potum transmittat; Aristoteles. arteria operculum dū cibi potusq; deglutiuntur. In Introd. 11. ne quid ex firmioribus humidis in arteriam delabatur: ne quid cibi potusue in laryngem defluat, Vesal. (addit accurate prohibere) Col. Plac. ne quid de assumptis in illam illabatur, Plac. aurum laryngis claudit, cum escu-

que munditiei deditum: dein ubi bibit, ipsius gut-
 r refecet, hoc colore ipsum tinctum reperiet. Et
 nè nisi per arteriæ parietes aliquid deflueret, fru-
 a in thoracis affectib. eccelegmata syrupi, tabellæ
 ascribentur; quæ omnia expectorationem & spu-
 m promouere, experientia docet, si modò sensim,
 clinato capite & parum incuruato collo lamben-
 deglutiantur, vel tabellæ donec liquecant in ore
 tineantur & absumentur, quò earum portio in la-
 ngem feratur, imitantes Galenum^r, qui vlcus in-
 næ tunicæ arteriæ asperæ curaturus, iubet cubanti
 vino humidum medicamentum, quod ad eiusmo-
 vlcus faciat, exhibere, in ore diutissimè continere,
 omnes, qui illic sunt, musculos relaxare & remit-
 te: sic enim sensim & paulatim de medicamento
 quid sensibilibiter & manifestè in ipsam arteriam
 fuere.

Quòd verò aqua ἀνεδὲς ἐνυρρον, siue aceruatim ir-
 ens, vt cum Hippocrate⁹ loquamururbationem,
 tussim multam exhibet, fit propterea, quòd con-
 respirationem fertur. quod enim per rimam illa-
 tur, tamquam iuxta parietem delabens, aëris ela-
 tioni non obstat, sed leuem ac lubricam viam hume-
 tio ipsi præbet. Exinde sequitur, malè^r veteres
 tuisse potum per asperam arteriam in pulmones,
 cum verò per œsophagum in ventriculum ferri: &
 et Hippocrates alio loco^r multis rationibus dispu-
 t contra eos, qui potum in pulmones ferri volue-
 ant, non tamen de omni potu loquitur. Hoc osten-
 turhis diuini senis verbis⁹: Homo maximam par-
 tem in ventrem bibit, cum œsophagus sit velut in-
 indibulum potûs copiam & quæcunque volumus,
 accipiens: bibit autem & in guttur ac arteriam; mi-
 nis verò & quantû latere possit per rimam illapsum:
 oerculum enim exactum epiglossis, ne permiserit
 quidem

^r 4. Meth. 7. 3.
 eiusd. 12.

(Plato, Philo-
 stones, Locrus,
 Dioxippus
 Hippocrati-
 cus, Plutarch.
 7. sympos.
 quest. 1. quos
 & Gallius lib.
 17. cap. 11. ci-
 tat.
^r 4. de morbis.
 vide Galenū
 8. de Plac. vl-
 tim.

quidem aliquid amplioris potûs penetrare; hæc Hippocrates. Quare sic Galenus q, si potum omnem in pulmonem ferri existimet Plato, meritò accusandus est quippe qui apertissimâ rem ignorat: si verò portionem aliquam potûs per asperiam arteriam in pulmonem deriuare arbitratur, probabile quippiam dicit; & subiungit: si multa potio *ἄφρων* seu confertim in pulmones influat, vt spirationis vias occupet, tussim excitabit, vocem intercipiet, & difficilem spirationem pariet: quòd si sensim per latera arteriæ asperæ in pulmonem feratur, nec tussim, nec vllum irritationis sensum excitabit. Sic de Aristotele statuimus, qui refert, ^u errorem esse, potum meare per arteriam, quia nullus sit meatus à pulmone ad ventrè, sicut ex ore gulam tendere cernimus; si de omni potu loquitur, fallitur. Sed de hac quæstione satis. Alter ^xepiglottidis fortè vsus, aërem vi & impetu à pulmonibus pulsus ad vocis modulationem percutere!

u 3. part. a-
nim. 3.

x Alter vsus
Laurent.

DE MEMBRANA LARYN- gis quæ eiusdem l' gamentum existit.

a Oritur ex
communi car-
nosâ membra-
nâ colli, quæ in
musclos la-
ryngis & to-
tum corpus
cartilagino-
sum progressa,
vndiq; sparsa,
intus delata
arythanoiden
amplexa, tan-
dem ad glotti-
dem pertin-
gens, illi adha-
rescit, Placen.

C A P. X C V I I.

LARYNX succingitur ^a mēbranâ, quæ cum oris membrana cōmunis est, tam extrinsecus, quàm intrinsecus; tutelæ gratiâ: & quò aër blandè percussus vocem suauem ac moderatam reddat. Intrinsecus quidem, cavitâ totâ succingitur & laryngis superi sedi transuersim obducitur, & in medio longitudinis diuisa, rimulam acquirit. Extrinsecus verò, partim externam superficiem obuoluit, partim & cartilagines & musculos interiùs cingit.

Perfunduntur autem humiditate quadam lentâ, partim ne respiratiō calida, fumosa, siccaque has partes duras reddat; partim, vt epiglottis glottidi exactè applice

applicetur, & eius quoq; exsiccatio impediatur, quæ
 humiditas interiùs copiosior existit, ita tamen, vt in
 etè habentibus, nec copiosior sit, nec paucior, quã
 ocis instrumentum requirat, quò perpolita sit, sic-
 ne vox iucunda & æquabilis reddatur: humiditate *Placens.*
 quidem aliquã imbuta spiritum blandè pulsat, vn-
 e vocis suauitas dependet. Probaturs hoc tubici-
 m exemplo, qui fistulas seu tubas longiores, siue
 æneas, siue ligneas inflaturi, illas paululum hume-
 are solent, quò sonus suauis edatur, aliàs ob nimia
 citatem, sonus non modò ingratus & durus, sed
 iam difficulter redditur: quemadmodum si plus
 sto y humectetur, sonus obtusus causatur: quare &
 prà monuimus, ab humoribus à capite in fauces
 elapsis vocem raucam effici.

Sunt verò alijs membranis ferè omnibus crassio-
 s & firmitiores: exterior crassissima & laxissima &
 lut aspera & rugosa. Supra enim epiglottidem laxa
 crassa est, qua cartilaginis tertiæ lateribus colliga-
 r, & inter eam & cartilaginem, potissimùm ad ba-
 i, pinguedo occurrit. Laxa est, quò facilè incuruari
 eueri supra laryngem possit, & in deglutitione, *Aquapend:*
 oce acutâ & graui, sursum deorsumq; moueri: cras-
 verò & duriuscula, densa que, cum per eam viam
 bialiquando minùs masticati, duri & magni transi-
 debuerint.

Hanc carneis fibris adaugeri & membranam mu-
 ulosam, tam in homine, quàm in brutis euadere, ad
 iglottiden attollendam, sunt qui velint: quas fi-
 ras pellicula quædam exteriùs superiusque, ne in ci-
 orum transitu lædatur, obluoluat.

*Musculus tam
 in homine,
 quam in bru-
 tis necessarius,
 membrano-
 sus, ex mem-
 branâ crassif-*

Interior

*na supra epiglottida consistente conflatus, fibris carneis intrinsecus positus adau-
 u, qua rectâ ab osse hyoide per epiglottidis dorsum excurrunt, & versus epiglot-
 tis summitatem inseruntur, ipsamq; attollunt; quam membranam musculosam
 et retrahas, lingua ligamento similis vixebitur, Aquapend.*

Interior verò tunica, quæ in laryngis cauitate crassior est, quàm in ipsius arteriæ fistulâ, mollis, distenta & lubrica, quia cauitas perpolita paranda erat. at vbi laryngis rima conuiuet, membrana hæc vtrinque ad latera durior, callosaq; , à frequenti, dum spiritum retinemus, compressu, redditur, & cum substantiâ etiam colorem mutat, magisq; candicat; sed de hac membranâ vide supra in arteriæ asperæ historiâ libro 2. cap. 27.

DE VENIS, ARTERIIS, NER-
uis & Glandulis Laryngis.

C A P. XCVIII.

LARYNX venas recipit à venâ iugulari externâ [tab. venarum V] & quidem ab eius interiore portione [in venar. tab. X ad latus interius lit. V] quæ oris interiora subiit: ab hac enim furculi notatu digni in laryngē & glandulas ipsi proximè adnatas & faucium vniuersam sedem pro nutritione, distribuuntur.

Arterias quoque habet: nam ab arteriæ carotidis maiore & interiore ramo [tab. arterior. a] fauces subeunte [c] furculi laryngi & linguæ communicantur, vt vitam caloremq; deuehant.

^a De his Galen. 7. vs. part. 14. & 15. de

diff. nervor. 10.

^b Equiuerat

naturam non

ab ignobiliore

nervorū prin-

cipio, sed à di-

gniore laryngi

vocis organo

principalissi-

mo nervos im-

pertiri, quare

à cerebro,

placent.

^a Nervos recipit, non à spinali medullâ in vertebribus existente, eò quòd obliqui essent futuri, sed à sexto pari à medullâ ^b cerebri prodeunte, qui secundum asperam arteriam rectâ deorsum vtrinque fertur, & quidem ab eius propagine maiore à quâ nervus infernè sursum recurrit, à dextris quidem, sub arteriâ axillari ad iugulum: à sinistris verò, sub arteriæ magnæ trunco circa cordis ventriculum sinistrū, qui sursum proximè ad asperæ arteriæ latera progrediuntur, & ad laryngem in ramos finduntur, & in laryngis musculos, qui capita deorsum habent, distribuuntur.

ouuntur: & quidem vel ad principium, vel ad medium, omnes tamē ab infernis partibus sursum porriguntur, quò musculi deorsum trahant, ob quam causam recursus factus est (hinc recurrentes, seu reuersiui dicti) quem recursum glossocomium motumque metapleticum seu transumptium æmulati Galenus^c voluit: vel si mauis: motus hic ei motui persimilis, qui in architecturæ machinis troclearumope absoluitur, & hac ratione nerui sicciore & valiores sunt. Et hi vocales sunt nerui Galeno^c, quòdoci efformandæ maximè conferant; de quibus lib. dictum fuit [*exprimuntur aliquantum tab. 31. fig. 3. &*]. At à recurrentibus ad quatuor paria priorum, anquam ad musculos internos rami distribuuntur; communes verò cum exteriores sint, aliunde neruos accipiunt, vt primum & tertium par, à neruis eruicis: secundum verò par, duplicē suscipit: quemmodum quintum par proprium, à sexto neruorum pari ramum recipit.

c7. vs. part.
14. horū. Galenus inuentor est, vbi conditoris animalium, potentiam, sapientiam, prouidentiam & virtutem prædicat.

Glandularum duo paria laryngi adiacent, aliud uidem ad laryngis sedem elatiorem, ad gargarconis latera, quæ Amygdalæ & tonsillæ dicuntur, de quibus suprâ.

Aliæ vtrinque ad laryngis^d humiliorem sedem seu radicem [*tab. 14. fig. I. ii.*] arteriæ asperæ lateribus sub pleuris bronchiis, adnatæ: vtrinque vna satis magna & quemodum fungosa cæteris crassior & spissior & vti carnea in homine; at in^e mulieribus magis conspicua: per quas à venâ iugulari externâ rami satis conspicui disseminantur. In boue substantia carnea sita vt musculus æmuletur, quæ ad crycoidis cartilaginis latera reposita est.

d De his 7. vs. part. 17. aliis glandulis laxiores & fungosiores.
e Aquapend.

Vfus harum duplex est: alter quatenus ad ipsæ & umidæ, vt fauces & laryngem suâ humiditate non uidâ sed viscosâ & pingui, irrigent. Alter, quatenus

Erysal

spongiosæ & humiditatem affluentem imbibunt, quàm humiditatem laryngi communicant, quò cartilagine foveantur, ad motum aptiores reddantur, & vox suauior efformetur: quod nobis ij, qui fistulas oleo inungunt, ostendunt. Vtilis tamen quoque est humoris huius effusio ad^f mutuam laryngis & stomachi eleuationem & detractionem quæ in deglutientib. & respirantibus accidit: quemadmodum & salina in amygdalis cõtenta, in hunc quoq; vsum facit.

DE SONO ET VOCE.

CAP. XCIX.

Consule Hippocr. de Carnib. Aristot. 2. de anim. cap. 8. sic 4. hist. anim. 9. quæ animalia vocem, quæ sonum, quæ murmur edât, quæ item loquâtur, ostendit. Gal. de vocal. instr. diss. lib. de voce 7. vs. part. 5. & 13. sic 16. eiusd. 4. de partib. voci seruientib. agit. 2. de decretis 4. 5. & 6.

^a Larynx primum ac principalissimū vocis instrumentum. 7. vs. part. 5. & 13. 16. vs. part. 4. primū ac propriū vocis instrumentum 2. de cr. 4. b 2. de anim. 8. c Vocē ex pulmone edimus, quòd canus sit, prater eaq; eius fistula vocem aut labia & lingua articulata reddunt, Hippocr. 4. de Morb. in fine.

EX ijs, quæ proposuimus, liquidò constat, laryngis actionem vocem esse, & vocis instrumentum laryngem, primam item & immediatam vocis^a causam glottida esse, id quæ ex Galeni sententia, quare de voce per pauca subiiciamus.

Vox sonus quidam est animantis significatiuus Aristoteli^d; vel vox est aer percussus Galeno finiente. Sonus verò^b percussio est alicuius ad aliquid & in aliquo: quare ad sonum efficiendum tria requiruntur, vtpote duo corpora, quæ se mutuò percutiant, & aer, in quo percussio fiat, inter vtraque corpora percussus & fractus.

Quò verò corpora mutuò se cõtudentia sonum edant, primò tensa esse debent, ob quam tensionem quodammodo obdurâtur, quare dura esse oportere Aristoteles censuit: siquidem spongia aut lana, etsi se inuicem percutiant, sonū tamen nullum reddunt. (sed dicas^a duris quidem frequentius sonū edi, verum &

rūm &c

rūm & à quibusdam mollibus: nam si labia duo iungas, sibilus auditur, sed ex eorum tensione, quā aërem comprimendo extrudunt) dein superficie lata & planā: duæ enim acies acie se^b ferientes, sonum nō reddunt: tum vehemens & celer percussio: nam si manū rei alicui placide admoueās, nullus sonus exaudietur. Quod si etiam polita & concava sint, & ex materiā solidā & aereā, quale est æs, aut vitrū, conflata, tum sonus maior, clarior gratiorq; editur; q; campanis musicisq; instrumentis ostendi potest: quia talia multū aëris in se cōtinēt, qui cōmotus exitū quærēs, huc ac illuc ad latera offendit, & varijs modis resonat.

Iam cū vox animalis sonus sit, seu soni species quædam, tot in voce requirentur, quot in sono, tria nimirum, aër^d tanquam materia; corpora, quæ aërem comprimendo elidunt, velut efficiens; addē & locum asperæ arteriæ caput.

Aër, qui ad vocem formandam requiritur is est, quem expirando reddimus & hic vocis generandæ materia est: cū is, qui inspiratur ad cordis & caloris innati refrigeriū & pabulum comparatus sit. Quare tam diu vox editur, quā diu expiratio^f perdurat, atq; deficiente, simul vox desinit. Hic autem aër expiratus, à spiritalibus instrumentis eliditur, tum enim vox formatur, vbi aër eliditur, & vbi eliditur, protius percussio sequitur. Quodnam verò ex spiritalibus instrumentis, spiritum percutere & comprimere potest. Thorax & pulmo vocem non faciunt, quia eorum motiones sunt diastole & systole, siue dilatatio & contractio, quæ vocem non efficiunt; non asperæ arteriæ fistula, seu maxima ꝑ bronchij portio, cum musculis careat; quare vocem, quæ voluntarium opus est, perficere haud potest. dein si fistulam infra^h caput incidas, animal liberè expirabit, sed vocale non erit, & si sectionem constringas, tum vox

d Vox sine aëre fieri non potest, & quic-

quid superuacaneū & inutile, erat expirandum, id in vocis materiam conuertit, 6. vs. part. 2.

e Cum spiritū reddimus non quando capimus, vocem formamus 11. probl. 14.

f Hippocr. de Carnibus.

g De vocal. instr. dissect. 2. h 2. de decret. 4. Hippocr. de Carnib.

i Fama est,
Tereum, cum
Philomela vo-
cem adimere
vellet, vocis
instrumentū,
linguam, in-
quam, absci-
disse, quod
Galenus reci-
tat & repre-
hendit, de diff.
vocal. inst. 2.
lingua rō vo-
cis, sed loquela
instrumentū
est 2. de cr. 4.
lingua in fau-
cibus interse-
ptum suo ap-
pulsu format
& ad palatū
ac dentes im-
pingens, cla-
ram reddit,
quod nisi lin-
gua suo sem-
per appulsu
formaret, non
distinctē homo
loqueretur, sed
singula unam
naturā vocem
ederent. Hipp.
lib. de carnib.
k Laryngis
cartilagine
vocalis sunt in-
strumenta 7.
v. part. 5.

redibit, non nares, quia tantum meatus sunt; non os, quia tantum receptaculum est: non^f lingua, quia ij, qui aphoniā laborant, linguam & respirationem sanas habent: sic ij, quibus lingua absecta,ⁱ vocem aliquam edunt. Remanet ergo ex spiritalibus instru-
mentis tantum larynx, qui vocis officina, in quo percussio fit: quod & constructio ipsius comprobatur.

Habet enim^f musculos, qui ad vocem edendam, quæ voluntaria actio est, requiruntur, & nervos, qui motum suppeditant: habet^k cartilagine, corpora dura, lata, perpolita & concava, in quæ aer illidi, comprimi & constringi facile, sicque simul resonare possit. Habet & rimulam, quæ ad aerem elidendum, ut sonus fiat, requiritur. Aeris enim elisio fieri non potest, nisi per angustam viam elidatur. Elisio fit per rimulam, dum angustatur & constringitur per ary-
tænoidis dearticulationem & per musculos: quare Galenus vocem fieri non posse scribit^l nisi transitus sit angustior, nec simpliciter angustior sed qui paulatim ex amplo ad strictius tendat, paulatim rursus ex strictiore amplificetur. Hanc elisionem pro-
tinus percussio sequitur, vel ad aerem, vel ad corpus solidum, idcirco Galenus voluit, gargareonem esse veluti^m plectrum in voce efformandā, cum ad id aer exfufflatus impellatur.

Verum ad vocem non solum rimulæ angustia necessaria est, ut aeris angustus sit transitus, sed etiam vehemens spiritus impulsus, ut simul repente & affa-
timⁿ foras erumpat, alterutro enim deficiente vox non fiet, quam subitam & vehementem expirationem, ἐκφύσησι seu efflationē^o Galenus vocat: quare altera vocis causa efflatio est, sine quā vox fieri nequit, at efflatio sine voce.

Efficiunt

l 7. v. part. 13. m 7. v. part. 5. n Nam si leuiter ac molliter spiritus efferatur, exspiratio fit sine sono 7. v. part. 13. o 4. loc. aff. 6. 2. de de cr. 2. de mot. musc. ultimo.

Efficiunt autem hanc exsufflationem musculi p thoracem & abdomen constringentes, ex quâ con- p Non simpli-
 strictione pulmones deprimuntur & constringun- citer expiran-
 tur, septum transuersum versus cavitatem thoracis tibus vox effi-
 incuruatur, quò eius cavitates angustior reddatur, & citur, sed pro-
 spiritus ex pulmonibus sursum per asperam arteriam pria vocis ma-
 feratur (quare in asperâ arteriâ præparari vocem Ga- teria efflatio
 lenus dixit, & cum aër ibi conclusus & compressus, est, quam mu-
 quodammodo statum solidi corporis adipiscatur, sculi thoracis
 antequam per rimulam efferatur) & per rimulam efficiunt; 7. vs.
 angustam cum impetu & violentiâ extrusus, vox part. 5. efflatio
 formetur. spiritus latio
 extra qua per
 musculorum

Vocis vsus Galenus^r expressit, dicens, cogitatio-
 num mentis nunciam esse, meritò ergo omnium
 animæ actionum principalissima censetur. intercostaliū
 actionem fit. 2.
 Motu muscu-
 lor. 9.

q Arteria prius vocem concinnat ac præparat laryngi, quæ cum in ipso iam fa-
 lla fuerit, adauget eam & palatum velut ἡγεῖον quoddam præpositum & ὑποβο-
 ταν quasi plectrum 7. vs. part. 5. vide & 2. decret. 4. r 16. vs. part. 3.

FINIS LIBRI III.



TABVLA I. LIB. IV. *Corpus proponit tale,
quale post viscerum tam infimi quam medij ventris
demonstrationem & ablationem, occurrit: brachia
dextro cum suis musculis in naturali situ existente,
musculo pectorali & serrato minore excepto, qui pro-
pter ossis pectoris ablationem separari debuerunt: sinistra
vero à thorace propter scapulam & claviculam à
corpore retracto, quo ea quæ sub scapula
latitant, in conspectum
veniant.*





DE ARTVVS

LIBER IV.



ORPVs humanum cum Hippocrate^a & Galeno^b in ventres ac artus diuissimus. Ventres tres cōstituimus, primum & infimum, qui partes naturales continet: secundum & medium, cui partes vitales inhabitant: tertium & supremum partium animalium domicilium, de quibus præcedentibus libris tribus, ea qua fieri potuit, breuitate & perspicuitate egimus: quare superest, vt Artuum historiam prosequamur.

ARTVS seu *ἄλλα*, membra sunt ex corporis trunco explantata: diuiduntur autem in superiores & inferiores, siue MANVS & PEDES, de Manu primò agemus.

Verùm Lector candidus hic monendus, cur libro hoc de Musculis capitis, ceruicis, thoracis & dorsi agamus, cum ad artuum historiam minimè pertineant: causa huius rei est, quòd toto hoc opere Anatomicam Methodum, quanta fieri potuit, diligentia, obseruauimus: quare & hic ab ea recedendum non fuit: cum ergo prædicti muscoli, si vnus tantùm cadaueris copia sit, demon-
strari

strari non possint, nisi prius brachij & scapulæ muscoli separati sint: horum historia cōmodiore loco proponi non poterat, sed ad rem.

DE MANU.

CAPVT I.

De manu Galenus totis duobus primis de usu partium libris egit.

CUM Deuster Opt. terque Max. Hominem solum inter creata animalia nudū & inermē creasset (cuius nomine Epicurus, Plinius, alijq; Ethnici Deum imperfectionis & iniustitiæ ethnice accusant) d sui tamen imaginem clementer formasset, nē brutis animalibus inferior foret. Rationem & manum ei dedit, quæ ceteris animantibus denegauit. Rationem crebro indidit, quæ omnium artium officina & arte artes. Manus vero corporis trunco adnasci voluit, quæ ὄργανον est ὄργανων, vt Philosophus^a loquitur, siue instrumentum ante omnia instrumenta, dabitur autem homini tanquam animalium^b sapientissimo, cum organum sit animalium sapientissimo conueniens, & id^c pro corporis nuditate, ne inermis^d esset, sed manu sibi varia tum instrumenta, tum arma pro necessitate & sui^d defensione pararet, & pro temporis occasione & arripere & deponere posset, sicq; foret instrumentum ad omnes^d artes necessarium, ac non minus quam bello idoneum.

Cuius actio est^e apprehensio, quare Galeno^f ὄργανον ἀντιληπτικόν dicitur.

Quo vero multiformes figuras comprehenderet, multiformiter diuidenda^g fuit, eiusq; nomine figuram

Ttt 5

bus non instituerunt, sed ratio: manus enim rationis ministra sunt. c 1. v. par. 4. 1. v. par. 2. e 1. v. par. 8. 9. 10. & 16. f 3. de usu part. 1. v. par. 8.

a 4. part. an.

10. Gal. 1. v.

par. 4.

b 1. v. par. 3.

ex Aristot. A-

naxagoras re-

ferēte Plutar-

cho, ἐν τοῖς

χερσὶν τὴν αἰ-

τίαν τίθεσθαι τῆς

ἀνθρώπων

σοφίας: mani-

bus adscripsit

sapientia hu-

mana oriū &

causam, quod

Gal. l. c. repre-

hendit, quia

non ideo homo

animal sapiē-

tissimū, quia

manus habu-

it, sed quia a-

nimal sapien-

tissimum ideo

manibus in-

structus fuit:

manus enim

hominem ar-

ram oblongam obtinuit, imò quò maiora corpora æqualiter apprehenderet, à se inuicem diduci debuit; quare in digitos & diuifa: indiuiſa enim, minima, quæ duobus etiam digitis, pollice & indice comprehendit; paulò maiora, tribus, pollice, indice & medio; quæ his maiora, quatuor; adhuc maiora, quinque totaq; manu. Aſt cùm non pauca corpora mole & maiora ſint, quàm vt manu vnâ comprehendì poſſint, duæ^h creatæ ſunt, quò altera & alteri auxilio ſit: idcirco ad ſe inuicem inclinatæ & æquales productæ ſunt. Sunt autem in manu qualibet digiti quinque, & tot eſſe debuère, quò perfectæ apprehenſio fieret: ſi enim pollex adimatur, aliorum robur minuitur: ſi minimum demas, difficulter, ne dicam, vix ea complectèris, quæ circulo apprehendi debent. Iam verò non omnes digitis vnus longitudinis eſſe debuère, ſed quatuor & vnus opponi debuit, quò id, quod fideliter apprehenderunt, quintus ſuâ & parua flexione curuatus, actionē perficiat, qui ab alijsⁱ diſtat, quò ſitu contrario ijs opponatur. Quomodo verò ſinguli digiti appellantur, ſuſè in libro de partibus externis pertractauimus.

^h Duarū manuum utilitas
Gre. 3. vſ. part.
1. explicatur.

ⁱ Ex Hippoc. 1.
vſ. par. 9.

ⁱ 1. vſ. part. 10.

Verùm cùm manus actio ſitⁱ apprehenſio: apprehenſio autem abſque motu fieri non poſſit, muſculisⁱ tanquam motus voluntarij instrumentis opus habuit, quare primaria manus pars, quæ primò & per ſe actionem edit, muſculus eſt; qui ſanè hoc loci carnem paucam, ſed tendines multos obtinuère, quia manum extremam leuem & tenuem eſſe oportebat. Cùm verò facultas motiua à cerebro deferatur per neruos, idcirco neruus hic pars eſt ſine quâ apprehenſio non ſit. Quò autem actio hæc perfectior ſit, oſſa ad robur & ^k firmitudinem actionum obtinuit, ſine quibus digiti flecti quidem & extendi potuiſſent, ſed ob mollitiem tremuli ſemper forent; neque quod

quod comprehenderent, arctè continerent, quæ per articulos ^k ad actionem omnem promptè figurandam, connexa sunt; vngues quoq; firmamento sunt, k 1. v. par. 12.

Digitorum namque summitates ^l ex carne & vngue componuntur, quò inter nimis ^m mollia & dura naturam mediam sortiantur, sicque firmior ^m apprehensio fiat. Si namque extremitas ipsorum non esset carnosa, sed ossea ^m, spinas, pilos non comprehenderent; nec etiam si humidior aut molliore carne cõtarent, cum ei quod ^m apprehenditur, apprehensens circumplicari debeat, l 1. v. par. 7.
13. 18.
m 1. v. par. 6.

Vngues his extrinsecus apppositi, non solum ⁿ munimenti gratiâ, verum ^l firmamenti, vt melius ^o fiat apprehensio; quos nec ^l superiores nec inferiores esse digitorum summitatibus conuenit: eosdem etiam non conueniebat ^p duriores esse, ne rumperentur, sed tales ^p qui in apprehensione flecti possent. n Vt voluit
Arist. monente Galeno 1.
v. par. 8.
o 1. v. par. 10.
p 1. v. par. 11.

Ossa verò cuilibet digito tria ^q esse debuêre, quò multiformiter moueantur & patiendi promptitudinem effugiant: non plura ^q, aliàs extensionem læsissent, eam minùs firmam efficiendo: non pauciora tum enim digiti figuras diuersas nõ haberent. Horum primum maius altero, cum illud vehat, hoc vetatur. Sunt quoque parte superiore latiora & extrinsecus maiora, vt liberè intus flecti ^r possint, & vnumquodque eminentiam ^r cavitati immissam habet. Qualibet cavitatis iusto amplior non est, nec strictior, e articulus ^r infirmior sit, vel motus difficulter fiat: hic & vtrinque os cartilagine ^r subunctum, quibus umorem vnctuosum ad mobilitatem & attritus contumaciam, superfundit. q 1. v. par. 14.
r 1. v. par. 15.

Denique actionem manus conseruant venæ, quæ sanguinem pro nutritione deferunt: Arteriæ, quæ vi li spiritu & calore perfundunt. Cutis & pinguedo, quæ partes prædictas inuestiunt & coniungunt.

Vfus ma-

Vfus manus triplex statui potest, primus vfus propriaq; actio est apprehensio: alter, vt sensus tactus iudex sit; etsi enim tactus per totū corpus diffusus sit, exquisitius tamē manu extremā sentimus, tum quādo cutis ipsius polita est, depilis & minime callosa reddita, quod in remigibus & fossoribus fieri cōsuevit: tertius, vt ijs iniurias propellamus, & ab aduersarijs tueamur. Hæc de manu in genere.

f Vt Homerus

Plutarch.

t i. hist. anim.

25.

u Gale. de in-

eq. intemp. 2.

z ἀκρόχειρ

Hipp. χεῖρ ἀ-

κροχ, Galen. de

Fract.

γ Cap. 14.

Diuiditur autem manus siue ea pars, ^f quæ est à summo humero vsq; ad digitorum extremos apices, quæ antiquissimā significatione χεῖρ siue manus (ab Aristot. ^t βραχίον) dicebatur, in ^u humerum, seu βραχίονα in specie sumptum, seu partem eam, quæ est à summo humero ad proximum vsq; articulum, cubitiue flexuram. Dein cubitum πῆχυν, seu partem, quæ est à cubiti flexurā ad proximum articulum carpi. Tū eam, quæ à cubito extremo incipit, & in aciem digitorum terminatur, quæ pars manus extrema ^x siue ἀκρόχειρ dicitur. Hæc rursus in tres partes subdiuiditur, primo in brachiale καρπὸν, seu partem eam, quæ flexuræ cubiti proxima est, & vbi palma cubito iungitur; dein in postbrachiale, μετὰ καρπὸν, seu partem eam, quæ est inter carpum & digitorum principium, cuius pars interior θέλαρα, vola & palma; exterior vero, quæ auersa manus pars est, dorsum manus dicitur. Tertia pars est, quæ digitos δακτύλους, complectitur: quæ omnia tanquam externa in historiā externarum partium ^y exposuimus.

Partes totius manus duplices sunt, continentes aliæ, aliæ contentæ; Continentes communes, cuticula, cutis, pinguedo cum suā membranā, panniculus carnosus, de quibus lib. 1. sermo fuit: propria statui forte posset, membrana, quæ musculos inuestit & separat. Contentæ sunt, muscoli, vasa & ossa.

Musculi totius manus quinquaginta duo sunt, si

sca-

capulę musculos huc referamus, quorum brachium septem, scapularum quatuor, cubitum quatuor, radi-um quatuor, carpium quatuor, metacarpium octo, digitos viginti, & in volâ latitantes duo, mouent. Vâ sunt venę, arteriæ & nerui. Offa in qualibet manu quadraginta duo sunt: Humeri vnũ, cubiti duo, carpi octo, metacarpij quinque, digitorũ quatuordecim, & denique sesaminorum duodecim: de his ordine à musculis humeri principio factò.

DE MUSCULIS ^a HUMERI seu brachij.

CAPVT II.

De his Gal. de diff. muscul. 18. & 19. 13. vs. part. 13. & 14. 5. adm. anat. 1. & 2. item 1. adm. anat. 11.

HUMERVS prima totius manus pars est, quæ à summo humero ad proximum vsq; articulum, ubitiue flexuram extenditur, & Græcis βραχιον; Latinis humerus dicitur: eius vero sub humeri articulo auitas, ala vulgo nominatur. Quo vero in omnes artes moueri possit per enarthrosin cum scapulâ articulatur, musculisq; agitur. Mouetur autem quinque motibus voluntarijs: antrorsum ad pectus, retrorsum versus dorsum, sursum ad ceruicē & caput: eorsum ad thoracis latera, & in gyrum quodammodo agitur, vel circumuertitur, quibus motibus absolendis musculus septem ^b constituti sunt, quorum alij pectoraci instructi primus & tertius; alij scapulæ adnati, quos dissectionis ordine enumerabimus.

^c Pectoralis [tab. 1. L. tab. 8. fig. 1. L.] à situ sic dictus,

cum 18. At Vesal.

ol. Archang. Fallop. in inst. septem sunt: Fall. in obs. & Laur. octo, Plat. 7. qui & illopij octauum recenset: Scapula musculos præmittunt Galen. diff. muscul. 18. (non item 13. vs. par. Col. Archang. & Laurent. c Vesal. Col. Fallop. Plat. (cui mammillaris & clypeiformis) Archang. 1. est Laur. antrorsum mouens siue pectoralis, aut magonius, quodammodo quinquelaterus, Ves. quinque latera habet, Col. Laur.

^a Musculi humeri articuli mouentes, Gal. diff. muscul. v. musculos humeri vocant, Ves. Col. Plat. Brachij Fallo. & Laur. Amplexorios humerarios, i. in amplexu humerum cientes, Archang.

^b Undecim sunt tres à pectore in brachium ascendentes, duo ab ilium regionibus quinque à scapulâ prodeunt; undecimus post hos epomida occupat diff. muscul. 18. At Vesal.

à Ex 7. & 8.
 Ves. Col. Fall.
 Archan. ex 6.
 7. & 8. Laur.
 e Tres à pecto-
 re in brachiū,
 siue tres, siue
 quatuor ipsos
 dicere velis,
 diff. muscu. 18.
 13. vs. part. 13.
 hoc Col. repre-
 hendit; at Ve-
 sal. nihil obsti-
 terit geminū
 pronuntiāre
 ac duorū mu-
 scul. loco enu-
 merare.
 f Meminit et-
 iā Col. an hoc
 intellexit Ga-
 len: diff. musc.
 18. dū muscu-
 lum secundū
 mamam si-
 tu exiguum
 describit, qui
 ad humeri ar-
 ticulum ascē-
 dit, & ad co-
 stas spurias
 brachiū adi-
 gat, quem Ve-
 sali. in homine
 dari negat, in
 simijs vero sub
 primo situ es-
 se: quemadmo-
 dum & alterū
 adhuc descri-
 bit, qui altioris brachij ad pectus ductionis auctor sit.

cum thoracis anteriorem partem occupet: magnus est & carnosus, inæqualibus lateribus propter exortū constans: hic ex pectoris osse pene toto & cartilagini- bus ipsi annexis, clauiculâ mediâ, quâ pectoris ossi proxima est, & sextæ, ^d septimæ & octauæ costæ carti- laginibus, tâquam ex pluribus musculis compositus enascitur [tabul. 1. a β 7. circumscribitur, & tabul. 8. fig. 1.] Quare Galen. ^e in tres vel quatuor diuidi posse cen- suit. Exoritur enim à clauiculis principio carnosus, ab ossis vero pectoris medio, & costarum cartilaginibus membranoso & neruoso; mox paulatim crassior car- nosiorque redditus, sensim quoque coarctatur, & superius carneam naturam ppter fibrarum ductum breuiorem, reseruat: inferius vero multo ante inser- tionem liuidus & nerueus conspicitur, & secundum profundum superiore parte multo tenuior est: tan- dem tendine breui, sed lato nerueo & robusto [tab. 1. & tab. 8. fig. 1. & 2. d e.] humeri ossi secundum longi- tudinem, paulo infra ipsius caput interius nonnihil in priora vergens (quasi reduplicato tendine) inter deltoidem & bicipitem implantatur [tab. 1. & tab. 8. fig. 1. M A.] Sic nonnunquam ^f in quibusdam hominib. portio quædam in acutum tendens reperitur, quæ quasi peculiarem musculum æmulatur, cum tamen huius pars sit. Hic propter exortum diuersum fibris variat, alijs ex superioribus deorsum oblique produ- ctis, alijs oblique sursum protensis, ita vt paulo ante tendinis productionem sese pene decussatim inter- secēt, quæ tamen omnes demum in vnum angulum concurrentes tendinem efformant. Ob hanc fibrarū varietatem differentes quoq; motus præstantur.

g Huius munus est, dum fibras omnes potissimum medi-

Si omnes à pectore enati tā superiores, quam inferiores ex aquo tendantur, medius efficitur motus: si alter dun- taxat

medias omni sui parte æqualiter cōtrahit, brachium antrosum rectà in neutram partem inclinās, æqualiter mouere & pectori adducere: sicut vel ad superiora magis, vel inferiora, prout fibræ contrahuntur, oblique adducere, & pectori ad mouere.

II. Deltoides à forma literæ Δ. [*tab. 1. 2. 3. tab. 8. fig. 1. 2. 4. M.*] quibusdam vero ἐπωμὶς, quod humeri capiti minori infertur, & aliquando contegat, & humeralis dictus, carnosus est, & ^k triangularis: hic ex clauiculæ mediâ parte scapulam spectante summo numero, quâ clauiculâ iungitur, totaque scapule spina oritur [*tab. 3. & tab. 8. fig. 1. 2. n.*] non quidem ex humero ossiū amplitudine, sed prominentiore sede, tanquam crassiore lineâ, initio latò (ex varijs, continuis tamen principijs cōposito, quasi ex musculis diuersis conflatus esset) nerueo, ^l quod statim carnosum crassumque redditur: musculus hic carnosus permanet, & sensim velut in trianguli verticem angustatur, donec in validum partim carnosum (extrinsecus) partim neruosum (intrinsecus) modiceq; trāsuersum ^m ten-

taxat agat, altior altiore, humilior humiliorē adductionem efficit, diff. musc.

18. brachium sursum deorsū & recta mouet, sed antrosum semper, Laurent. tum recta, tum oblique sursum vel deorsum anteriùs ad pectus, Plat.

h Gal. 5. adm. an. 1. alium à se inuentū addit, qui brachium pectori adducit, qui ex membrana carnosiore musculi figuram

adepta constat: Hunc Fallo. in Inst. in homine non reperiri, sed in simia optime apparere scribit. i Musculus superiorem humeri partem amplexus ἐπωμὶς, de quo etiam Hippocrat. scripsit, nonnulli etiam δελτοειδής, quasi duos Δ. imitantem nominarunt, Galen. 3. adm. anatom. 3. Sed de hoc egit r. ad anat. 11. Musculus qui ad epomida duo habens capita, quem primo loco describit diff. musc. 8. Vesal. Columb. Fallop. Plat. Archang. 2. at brachium sursum mouens prius siue deltoides; Lauren. Graci, δελτοειδής & ἐπωμὶς Vesal. Colutub. alijs ἐπωμὶς & humeralis Laurent. omnes recentiores in hac sunt sententia δελτοειδής à Gracis ἐπωμὶς vocatum esse, quod falsum est Hipp. Galeni, Ruffi & Oribas. authoritate & eam ἐπωμὶς significat externum & minus caput humeri, vel tuberculum cutius in humeri capite, totaq; etiam regio, qua ab ipsa usurpatur, hoc à deltoides musculo occupatur, Fallop. obseru.

^k Tetragonum fere firmam sortitus, Archang. 1 Initio latò & tendinoso, Columb.

^m Non ad amussim transuerso, sed modicè obliquo, qui ab anterioribus deorsum in posteriora nonnihil vergit, nihilq; minus quàm declinè rectius occurrit, si Galenus secus attestetur, Vesal.

n Brachium
 sursum per re-
 ctam præcipue
 lineâ attollit,
 de diss. mus. 18.
 o Gal. dis. mu-
 scu. 18. magnū
 imo maximū
 ab imis regio-
 nib. ascenden-
 tem vocat: &
 dicit, duos sur-
 sum ferri, al-
 terū crassissi-
 mū & longis-
 simū omnium
 musc. brachiū
 mouētium; al-
 terum gracil-
 limū esse, lon-
 gitudine tamē
 ab altero non
 separat, q. ab
 Anatom. igno-
 ratus fuerit,
 ut qui dū cu-
 ris male exco-
 riatur, obscu-
 retur & cor-
 rūpatur: Vesa.
 Colum. Fallo.
 Plat. Arch. 4.
 at Laur. de or-
 sum mouens
 primus seu la-
 tissimus.

p A spinis ossis
 sacri liborum
 & nouem tho-
 racis, Laur.

q Vesal. ac
 Valuerda &
 alij hoc prætermiserunt, quod in quamplurimis obseruauit, Fallo-
 pius.

tendinem, qui humeri mediam crassitiem amplecti-
 tur, desinit, inque humeri medio sub ipsius ceruice
 inseritur [tab. 8. fig. 2. θ.] Hic etiam fibras aliquantum
 diuerfas obtinet: partis enim anterioris oblique de-
 orsū in posteriora, posterioris vero, oblique in priora
 feruntur: harumque nonnullę parum implicari con-
 spiciuntur: medię vero recta deorsum vergūt. Quare
 fibris anterioribus in se collectis brachium sursum
 ad anteriora versus faciem attollitur: posterioribus
 ad posteriora versus occiput: medijs vero æqualiter
 contractis brachium recta sursum attollitur.

o III. Latissimus & Aniscalptor [tab. 2. 3. N. tab. 4.
 separatus] totum fere dorsum cū suo pari integit, qua-
 re dorsalis maximus dici posset: hic p à vertebrarum
 spinę apicibus, quę inter sextam thoracis vertebrā &
 ossis sacri medium sunt [tab. 3. S. μ.] principio mem-
 branoso & latissimo, nec nō à superiore ilij ossis par-
 te, oritur; dein ascēdens, vbi ad eam dorsi regionem,
 vbi costę versus posteriora extuberāt, carnosior red-
 ditus, scapula basis angulo inferiori superuectus, an-
 gustior redditus, tendine valido, breui, lato tamen &
 quasi reflexo infra humeri caput superius, secundum
 ipsius longitudinem intrinsecus inter pectoralem &
 rotundum inseritur: inter horum enim tēdines eius
 nomine interuallum existit, vbi quoq; Axillę cauitas
 est ab hoc & pectorali efformata. Hic trianguli figurā
 refert, cum angulibus tribus inæqualibus præditus sit
 duobus lōgis, & altero breui, quorum acutissimus est
 is, quā parte ab osse sacro enascitur: alter iuxta thora-
 cem, quā à vertebrarum apicibus pedit: tertius ad hu-
 merum in tendinem desinens. Musculus hic, cum ad
 scapularum angulum q inferiorem peruenit, aliquā-
 do inde fibras carnosas plurimas recipit, ut recte Ga-
 lenus

lenus^r docuit, & quasi nouo, sed minimo principio donatur: Sic & scapulæ basi fibris quibusdā adnascitur, ne scapula dum mouetur, musculū transcendat, cum ijs tanquā ligamenti impediatur, ne musculus à scapulâ decidat: & huius adhærentiæ beneficio scapulam quoq; ab hoc musculo moueri Gal.^f prodidit. Huius musculi fibræ pcostarum inæqualitate quoq; differunt, siquidem aliæ longæ & minus oblique, aliæ breuiores sunt & magis transuersæ: quare prout fibræ in se colliguntur, brachium retro deorsum magis vel minus trahitur, & nunc ad superiora, nunc ad inferiora versus dorsum deprimitur.^r

^u IV. Rotundus maior [*tab. 1. 2. 3. 4. 5. 6. tab. 7. fig. 4.*] q parte posteriore sub axillâ oblique situs est, cariosus, crassus, & inter cæteros vtcunq; rotundus vel eres est; hic principio carneo à scapulæ costâ inferiore, eâ parte, quæ basi magis ppinqua est, maiore parte iusq; angulo, modico principio, continuâ tamen origine, sumpto progreditur, & vbi ad ipsius costę medium peruenit, à scapulę osse abscedit, & modice furum delatus, x tendine breui, sed lato, valido, mēbratoso & neruoso in humeri superiorem & interiorē y partem inseritur, vbi & pectoralis, cuius etiam tēdini correspondet. Huius munus brachium retro^z deorsum trahere; sicq; deltoeidi contrarius fit.

V v v

Ad

t. cum in scapulam non inseratur proprio motu una cum brachio nequaquam desum vellere; quare Fallop. Instit. an scapulam quoq; moueat, non ausim affirmare; ut certissimū, et si ad scapula motum, motū aliquem conferre videri possit. r Gal. 1. 1. musc. 18. addit parū musculū in humeri dearticulatione occultatum, qui sub brachij caput in media regione inseratur, quem quis vel magni portionē, vel etiam sum priuatim per se statuere possit, cum nonnihil oblique extensioni conducatur.

Vesal. Col. Fallop. Plat. (cui & transuersus musculus longior) Archan. 3. at Laurent. deorsum mouens, alter siue rotundus maior. x Super gibbam anterioremque scapula partem progreditur, Col. Archan. y In posteriorem humeri partem Colum. exteriorem Archan. in brachij ceruicem, Laurent. z Galen. inter brachium circumuertentes recensuit, qui ad exteriora circumuertat: quod Vesal. reprehendit, &

r s. adm. anat. & 13. vs. part. 12. Vesal. hoc negat, volens scapula ossi nō nisi musculo- rum, qui ab illo pronascuntur, interuentu contiguum esse, eo modo, quo & dorsi musculis, quibus insternitur: neutiquā ossi connasci. Fallop. in Instit. eū reprehendit, asserens hucusq; apparuisse in quibuscunq; quos secuerit.

f Non modo brachium ab hoc musculo moueri, sed etiam scapulam ad inferiora detrahi 13. vs. par. s. adm. anat. at Vesal.

bra-

brachium re-
ctâ ad dorsum
agere vult; at
Archang. &
rectâ & ex-
trorsum & a-
liquantulum
introrsum mo-
uet: Laurent.
obliquè tamè.
a A reliquis
omnibus ma-
nifestè sejun-
ctus, quem in
omnib. homi-
nibus reperi
quem magni
momenti mu-
sculum pra-
terierunt, cum
tamen à Ga-
leno non fue-
rit pratermis-
sus in simis,
in lib. de diff.
musc. 18. & 5.
adm. anat. 1.
hac Fall. qui
pro octavo re-
censet & cum
suo septimo eiusdem motûs auctore facit.

Ad huius musculi partem inferiorem, siue à scapula costa inferiore, portio distincta obseruatur, neruoso fine prope quinti musculi insertionem implantata, quam octauum brachij musculus Fallopius^a fecit.

V. ^b Superfascularis inferior [tab. 2. 3. 4. Pt. 8. f. 4. P] scapulæ exteriorem & gibbosam partem totam, quæ sub ipsius spina est, tegit, ipsiusque formam refert: hic à scapulæ basi infra spinam carnosus enatus, & ad scapulæ formam angustia redditus, tendine lato breuique humeri ligamento articulum continente extrinsecus veluti in semicirculum^c obscurè infertur. Huius munus brachium ad exteriora circumagere^d.

VI. ^e Superfascularis superior seu rotundus minor [tab. 3. 4. 5. 6. Q] supra axillam est, vt cauitatem omnem quæ inter scapulæ costam superiorè & eiusdem spinam est (à quâ enascitur) carnosus, oblongus, fibris oblongis donatus implet: procedit enim ab eâ scapulæ basi, cui valide connascitur, & vbi ad scapulæ ceruicis sedem superiorem peruenit, sub ligamento transuerso humerum scapulæ processui inferiori copulanti, delatus, tendine lato & valido articulum

Transuersus musculus breuior, qui octauus Fallopij Plat. Rotundus minor est retrorsum mouens alter in brachij ceruicem & interiorem humerum. ^b Galen. 5. ad anat. inter brachium attollentes recenset: at in 13. vs. part. brachium retrorsum ad dorsum ab hoc agi credidit: Vesal. (cui & triangularis) Fallop. Plat. (cui & humilior) septimus: Columb. & Archang. sextus: Laurent. infra spinatus, siue retrorsum mouens primus: at Vesal. & Col. volunt, hunc cum duobus sequentibus brachium circumagere. ^c In caput humeri versus posteriora Col. in exteriorem partem capitis humeri, Archang. in brachij caput & ceruicem, Laur. ^d Humerum sursum simulq; extrorsum adducit, Arch. brachium retrorsum mouet, Lauren. ^e Huius Galenum non meminisse opinor, nisi forè inter brachium attollentes reponat: dein descriptio nulla congruit etsi quendam scapula eminentiori costa exprorectum obiter narret, hac Vesalius: Vesal. Columb. Fall. Plat. (cui & elatior & minor) Archang. 5. supra spinatus seu brachium sursum mouens 2. Laurent.

enulum superante, articuli ligamento obliquè inferi-
tur. Huius munus cum priori & sequenti idem est g.

VII. ^h Subscapularis seu immerfus [tab. 1. R] inter
scapulam & costas litus, carnosus admodum & late-
re superiore cum præcedenti cōtinuus, scapulæ par-
tem internam simam, vnde enascitur, occupat, & ad
scapulæ formam triangulum imitatur, sensimq; ar-
tatur ad articuli regionem internam, tendine lato
n humerum internam ⁱ quasi in semicirculum in-
eritur, ita vt trium musculorum humerum circum-
gentium tendines articuli ligamentum totum quasi
n orbem complectatur. Huius munus ^k brachium
ntrosum circumagere; his insignem illam muscu-
osam portionem à scapulæ processu anchoræ simili;
xortam & humero insertam nōnulli humeri ^l mu-
culum esse cēsent, (quem alij cubiti musculum pri-
um faciunt) cuius munus sit brachium scapulæ
rocessui adducere: humeri enim & cubiti germa-
os motus esse, flexo namque cubito, humerum ple-
in; attolli corporis actionib. obeundis ex usu esse.

ⁱ In humeri ceruicem & caput Laurent. ^k Brachij caput ad posteriora cir-
muertit, Galen. diff. musc. 18. brachium sursum simulq; introsum ciet. his tribus
isq; successiue agentib. humerum in orbem circumq; ducunt, Archang. hic cum
frappato & rotundo minore brachium retrorsum mouent & semicircularem
otum edere videatur: circularis verò præfectus, quia ex rectis omnib. & obliquis
mponitur à peculiari nullo perficitur, sed ab omnibus successiue agentibus, Laur.

^l Arant. in obseru. anat. & sic Plac. humeri musculi vtrinque 7. octauum ad-
t Fallop. excepto interiori, initio musculi cubiti flexentis, quod etiam humero
aludis. adnascitur.

DE MUSCULIS OMOPLA- tæ seu a scapula.

C A P. III.

De his egit Galenus de diff. musc. 7. & 8. 13. vs. part. 13. 4.
adm. anat. 10.

— V M scapula quatuor motib. rectis agatur, an-
— trorsum, retrorsum, sursum & deorsum, natura

^f In superio-
rem facie ca-
pitis humeri.

Archang. in
brachij cer-
uicem, Laur.

^g Humerum
sursum simul-
que retrorsum

ducit, Arch.
retrorsum mo-
uet, Laurent.

^h Musculus à
simis scapula
enatus, diff.

musc. 18. Ves.
Fallop. Plat.
6. Col. & Ar-
chang. 7. Lau-

rent. subca-
pularis seu im-
mersus, vel re-


trorsum mo-
uentium ter-
tius.

^a Scapula mu-
sculos vocant
Anatomici, as

Arch. Ample-
xorios sca-
pula t. in com-

plexu scapulæ
mouentes.

T A B. II. *Musculos posteriore corporis sede
locatos exhibet.*



b Galeno se-
ptem sunt, Syl-
uio 5. Ves. Fal.
Col. Plat. Ar-
chan. & Lau-
rent. 4.

ei musculos ^b quatuor largita est; in orbem enim nō mouetur, partim ad humeri robur, partim, quia clauiculæ scapulis affixæ motum circularem impediunt.

c Vesal. Fallo.
& Plat. 1. (hic
addit foris ad
thoracem mo-
uentes com-
modius refe-
ratur) Col.
& Archang. 2.
Laurent. 3. &
serratus mi-
nor.

I. ^c Serratus minor [tab. 1. & tab. 9. fig. 1. S] qui musculo pectorali substratus est, à costis ^d superioribus quatuor, (primâ exceptâ, & rariùs à sextâ) [tab. 9. fig. 1. n. β] paulò antequam in cartilagine abeat (vt principium firmum sit) principio latiore quasi digitatim oritur, ac sursum obliquè ascendens carnosus & verus articulum angustior redditus, tendine partim carnosus, partim neruoso iuxta processum ^e internum, trianguli figuram adeptus, scapulæ inseritur, & eam antrorsum ad thoracem ^e adducit: nam si fibræ altiores contrahantur, scapulam pectori elatius, si inferiores demissiùs, si mediæ rectâ pectori admouent.

d à 2. 3. 4. 5.
interdum 6.
Vesal. Colum.
Fallop. à 2. 3.
4. 5. Archang.
à quinque su-
perioribus,
Laurent.
^e Gal. humero
inseruire &
pectori altius
adducere cen-
suit.

II. ^f Cucullaris [tab. 2. T] quòd cum suo pari dorsum integens cucullam monachi ^g referat: quemadmodum Galeno ob figuram Trapezii dicitur: hic principio carneo, sed tenui transuersim ab occipite [tab. 2. ab 0 ad π] & membranoso latoque ex vertebrarum colli ac thoracis ad octauam ^h [tab. 2. à σ ad ρ] spinarum apicibus exoritur atque inde versus scapulam angustatus procedit inq; scapulæ spinam totam & sum-

^f De hoc Gal.
de diff. musc. 7.

musculus ex osse capitis ad scapulas: hunc 4. ad anat. vocauit Trapezium, quem in duos diuisit. de superiore musculi parte contra Lycum fusè disputat (huic partem montem Trapezii impositum vult Col.) at in fine lib. inferioris partis obiter meminit, ubi ostendit scapulam duobus proprijs musculis ad dorsum agi: hancq; partem alib. scapula demissiorem musculum appellat, Columb. ait in homine unum, in simiis duos esse, vnum ab acromio usq; ad occipitium: alterum ab hoc ad octauam vertebram, Vesal. Fallop. Plat. (cui & cucullaris) 2. Col. Archang. 1. & cucullarem appellant Laurent. Trapezii & 1.

^g Col & Laurent. addit ille aut panno quem vidua super humeros gestant. hic vero & ancillarum collaris similis. at Fallop. singularem inter omnes musculos figuram adeptus est. ^h Ab octo superioribus non 12. thoracis vertebrarum spinis. ⁱ Gal. 4. adm. an. 10. voluit, Vesal.

& summum humerum, basinq; ferè mediam & clauiculæ latiore partem [tab. 2. τ v] neruosus simul & carnosus implantatur: verùm vbi scapulæ ceruicem spectat, semicirculus quidam membraneus ac nerueus occurrit [tab. 2. ϕ] fortè, ne musculum, qui scapulæ gibbo insidet [tab. 2. M] arsiùs premat. Circumscribitur lineis quinque, quarum vna secundum occiput transuersa [tab. 2. ab ϵ ad π] altera secundum spinas recta fertur [tab. 2. à σ ad ρ] duæ verò obliquæ, quarum vna ab aure ad clauiculam, altera ab huius fine vsque ad lineæ rectæ per spinam exporrectæ terminū [tab. 2. à τ ad ρ] quinta transuersa in ipsius medio, qua scapulæ spinæ, humero summo & clauiculæ parti latiori inferitur. Quare propter varium exitum, ac varias fibras, quas obtinet, scapulam variè mouet. Fibris enim, quæ ab occipitio & ceruicis spinis obliquè deorsum feruntur, retractis vel parte superiore retracta [tab. 2. Γ sculptor τ posuit] scapula sursum obliquè attollitur: fibris verò à thoracis i spinis obliquè sursum delatis & in se collectis, vel parte humiliore collecta [tab. 2. Δ] scapula^k deorsum trahitur: medijs denique siue etiam transuersis attractis [tab. 2. ad σ] scapula recta ad dorsum ducitur^l.

Hæc partem monachorum cucullis similem facit Fallop. in Instit.

III.^m Rhomboides à figurâ dictus [tab. 3. V] sub cucullari situs, tenuis est, latus, quadrangularis, à spinâ vertebrarum trium inferiorum colli, & trium superiorum thoracis carnosusⁿ enatus, fibris obliquis

k Deorsum mouet Trapezi portio inferior, & latissimi portio: peculiare enim deprimentes


V u u 4

à dor-

necessarij non fuere, quia suo pondere, laxatis supernis, facile concideret, Laurent. Galen. 13. *vs. part. addit. al. um quem cubitum extendentem nominabimus, quem scapulam quoque deorsum ducere vult.* l Sub hac in simijs caudatis tres adhuc reperiuntur à Galen. 4. adm. anat. propositi, quorum medius etiam in homine reperiatur. m Vesal. Columb. Fallop. Plac. Archang. 4. Laurent. 4. *ut Rhomboides, qui in duos secari possit.*

n Nimum latum initium Galen. 4. adm. anat. 10. adscripsisse Vesalius monet, qui à 4. 5. 6. & 7. ceruicis & à quatuor ante quinque thoracis prædire vult: sic ut Plat.

T A B. III. *Musculos aliquot capitis, thoracis, scapulae & humeri exhibet.*



à dorso ad scapulæ basin delatis, dictæ basi iuxta eius longitudinem carneus quoque latusque, vt in exortu, inseritur, eamque sursum nonnihil ad posteriora trahit, ac dorso applicat.

I V.º *Leuator* [*tab. 3. 6. 7. X*] supra clauiculam situs est, qui à vertebrarum colli *P* (& quidem communiter 1. 3. 4. & 5. rariùs à 2.) transuersis processibus varijsque 9 principijs enascitur (vnde plures videri possunt) mox coeunt & descendentes, validum carnosumque musculum efformant: & scapulæ angulo lateriori & interiori, tendine lato & carnoso, fibris ferè omnibus rectis, per paucis obliquis, inseritur; hicque scapulam sursum versus anteriora & ceruicis latera trahit. His musculis scapula per se & brachium simul per accidens mouetur; quemadmodum & scapula per accidens à brachij musculis mouetur, qui dum brachium trahunt, simul & scapulam illi adnexam consecutione quadam ducunt.

Vesal. (cui scapulam attollentium aliter) *Col. Fall. Plat. Archan. 3. at Laurent. Leuatores musculi quatuor cum diuersis eorum sit. exortus diuersa insertio. & prius membranis discreti sint, est q. ei in ordine 2. quos sursum mouere vñctum Trapezij portione asserit. p. A transuerso processu 2. 3. 4. & 5. Columb. Archang. à 1. 2. & 3. Laurent. à 1. dein 3. 4. & 5. Fallop. interdum etiam à 2. Vesal.*

q. *Gemino principia ex transuersis processibus vertebra 1. & trium sequentium enatus, Plat. 1. Galen. huic addit 4. adm. an. 10. de diff. musc. 8. 12. & 13. alium quem 2. par ossis hyoidis siue Digastricum enumerauimus, quo censuit scapulam in anteriora colli attolli. Syluius his quatuor serratum maiorem addit, eò quòd scapula adnascatur, qui tamen thoracis secundus est: Fallop. & Plat. censent, scapula potius quam thoracis musculum esse.*

DE LIGAMENTIS IN genere.

CAPITULUM IV.

CVM ligamenta plurima in artuum historiam occurrant, eaque non secus, quam cetera partes explicandæ sint, pauca quædam de ligamentis in genere

genere præmittemus, cum de ijs libro de partibus similaribus capitibus quinque ex professo egerimus.

Ligamentum, συνδέσμος ^a seu vinculum, corpus est inter cartilaginem & membranam medium: quare prout ad huius vel illius naturam accedunt, vel ligamenta membrana, vel ligamenta cartilaginea dicuntur. Hæc autem ipsas partes vel connectunt ^b vel continent. Connectunt ossa ^c duo vel plura simul in articulatione, ne facili loco moueantur: quæ vel omnibus articulis communia sunt, quæ nexu laxo, ne motus impediatur, coniungunt, & sunt membranæ ^d hæcque vel tenuiora, vt in ginglymo, vel crassiora roboris gratiâ, vbi articulus magnis motibus subiicitur, vt in diarthrosi: vel ob cavitatem superficialiariam inualidus est, vt in articulo humeri cum scapulâ, cui ligamentum validum, ne facili luxetur, contigit.

Adhæc articulum totum ambiunt, si nihil impediat (vt in genu articulo propter patellam totus articulus non cingitur) quod in nullam partem luxatio facili fiat, & adnascuntur vel ossibus articulum constituentibus & cavitatum supercilijs capitumue circumferentijs, vel cartilagini articulum intercedenti: si verò plures articuli conueniant, tum extrinsecus pluribus simul obducitur, vt in dorso fit.

Præter hæc communia articulis quibusdam, qui nexum validiorem requirunt, peculiaria contigere, quorum alia sub communibus reponuntur, parte eâ, in quam facili articulus declinaret, quæ crassa sunt, alia teretia, alia lata, quæ ab vno osse in aliud, nunc rectâ, vt in vertebræ secundæ ceruicis dente, nunc obliquè, nunc trâsuersim, quemadmodum humerû priuata sua ligamenta habere, capite seq. ostensurimus.

a Hipp. ex Galeno plarisq; in locis. à συν cum, & σύν ligo: plerique post Hippocratem σύν, neruum & σύν σύνδεσμον neruum colligantē vocarunt: quâ voce & Hipp. lib. de Arte & lib. de locis in hom. vsus & Aristoteles 3. hist. anim. 5. Gal. in proæ. lib. de ossib. b 1. Plac. 9. 1. adm. anat. 10. 1. de motu muscul. 1. c 16. vs. part. 2. vide lib. de partib. similarib. parte ult. cap. 16. d 1. de Plac. 9.

ε Νευροχον-
δράδης σπινδ-
σματος 2.
Temp. 3. vel
nerui cartila-
ginei 1. Plac. 9.

sumus. Alia verò sunt, quæ articulum intercedunt, & ligamenta^e cartilaginea dicuntur, quorum aliqua teretia sunt, quæ ab vnius ossis capite, in sinum alterius feruntur: aliqua verò lata, vt quæ vertebrarum corpora intercedunt: item ea, quæ commissuris partim obducuntur, partim ijs se inferunt, vt ea validiùs nectant: & sic commissurarum spatia replent, si ea dehiscant, vt in ossis sacri cum coxâ interstitio; vel si plura ossa inæqualiter iuncta sint, quemadmodum in brachialis ossibus fit: hæc de connectentibus, nunc de continentibus.

Ligamenta partes in suâ sede continentia (quorum nonnulla per accidens quoque colligant) alia viscera, quæ suspendunt continent, vt Hepatis & vesicæ ligamenta: alia ossa, alia musculos, ossa quidem quæ eorum vel processibus articulo vicinis, vel sinibus connascuntur: illa, vt articuli luxationem impediant, vt in humeri articulo nunc ostensuri sumus: hæc, vt sinuum vel rotunditatem, quemadmodum secundæ vertebræ ligamentum, vel profunditatem augeant, hæcque cartilaginea sunt, superciliis in ambitu adnata, vt in coxæ acetabulo.

fi. adm. anat.
20.

Quæ verò musculos vel^f totos vel eorum partes quasdam in sede suâ continent, ne in partis motu declinent, eiusmodi sunt, quæ tendines musculorum manuum & pedum orbiculatim ambiunt, vt sunt digitorum ligamenta, brachialis transversum ligamentum eorumque ossib. adnata: sic in brachialis sede externâ ligamenta quinque annularia, vlnæ & radio affixa. Sic alia sunt, quæ musculos suâ sede cōtinent, & ne ossium duritie lædantur, sinus succingunt, vt in ijs femoris musculis, quorum tendines per pubis os feruntur. sic denique quædam membranosa sunt, quæ ossa intercedunt, & eorum spatia replent & cōnectunt, vt sunt ea, quæ cubiti & tibiæ ossa intercedunt:

dunt: vel etiam ossis foramen opplent, vt ossis pubis foramen. Plura qui volet, lib. de partib. similarib. nostrum consulat.

DE LIGAMENTIS HUMERIOS

cum scapula ceruice iungentib.

C A P. V.

De his egit Galenus 13. vs. part. 12.

CUM de ligamentis humeri ad scapulam superius meminerimus, nunc ablati humeri & scapulæ musculis, de ijs sermo rectè instituetur, nisi luceat prius cubitum flectentes musculos demonstrare.

Humerus cum capite sit rotundo, quò manus^a rotunda, quæ ad varios motus comparata est, celeriter moueatur, scapulæ cui cavitās superficiaria, vel acetabulum leuiter profundum, neque in^a supercilia magna desinit (quemadmodum superius libro secundo monuimus) ne in varijs motibus facilè articulo excidat, & assiduo^a humeri caput luxetur, cum cavitāte adeò exiguā vehatur, vt pars ipsius maximè extrahit, Natura partim ligamentis, partim scapulæ^a processibus duobus recuruis articulum munientibus & ex eorum vtraq; parte^a musculis magnis ipsum constringentibus, vti paulò ante ostensum fuit, prospexit.

Ligamenta autem^b quinque obtinuit; primum^b latum est & membranofum^b, quali & cæteri articuli donantur, quod ex ceruicis, scapulæ supercilijs principium orbiculatim assumit, totum articulum in orbem complectitur, & in humeri capitis initium internè infligitur, & capitis amplitudini exteriori & ceruici vtriusque implantatur.

Alterum^d quod cum sequenti prorsus rotundum nerui instar existit [tab. 8. fig. 3. d] ex scapulæ processu^c

^a Enascitur primum ex sine apophyseos, quam ab anchoræ similitudine ἀγκυροειδὲς nominant, Galen. l. c.

^a 13. vs. part. 12.

^b Tria valida ligamenta præter cōmune omnium articulorum rotundum Natura machinata est, 13. vs. part. 12.

^c Latum ligamentum processus cat. Gal. l. c.

cessus interioris, apice enatum, humeri capitis exterioris partibus internis circumtenditur, & validissime adnascitur.

Alterum q Tertium, quod prædicto crassius & maius *[tab. 8. fig. 3. e]* ex scapulæ ceruicis parte superiore ortum, humeri caput superans, capite exteriori, ubi ad eius sinus latus externum extuberat, inseritur: ita ut hæc duo ligamenta simul velut vnum ligamentum transuersum efforment *[tab. 8. fig. 3. f]*

Quartum f, quod leuiter latum est *[tab. 11. fig. 1. inter Q q]* ex eodem, quo tertium, loco prodiens, & quidem principio amplo, oblique defertur, in humeri capitis exterioris sedem posteriorem infigitur, & articuli partem posteriorem eo modo, quo & primum ambit.

Quintum a scapulæ processu interiori prodit, & oblique sursum ad summum humerum porrigitur, *[tab. 8. fig. 3. c]*

Vfus horum ligamentorum, primi quidem, cum cæteris articulis communis est: trium sequentium, humerum, ne deorsum & extrorsum ex sua sede excidat, custodire: quinti vero, ne humerus in anteriora luxetur, impedire, cui musculi bicipitis caput externum auxilio est.

orbem articulum complectitur: est enim ipsum quodammodo ipsius articuli pars, Galen. l.c.

DE MUSCULIS THORACIS sive Respirationis.

C A P. VI.

De his Gal. lib. de diff. muscul. 23. 5. adm. anat. 3. 16. v. s. part. 7.

THORAX cum vitalia instrumenta contineat, & vita sine respiratione persistere nequeat; respiratio autem sine motu fieri non possit, idcirco respirationis gratia thorax moueri debuit. Requiritur autem respiratio, propter cordis calorem maximum, ut is ab aere, re-

ære respiratione attracto, refrigeretur, & ab eo, tan-
 quam flabello conseruetur. Mouetur autem vel per
 se, vel per accidens, cum spinæ motū sequitur, siqui-
 dem dorso flexo & thorax flectatur. Per se, & quidē
 motu proprio, respirationis causâ, quæ duplici tho-
 racis motu absoluitur: vel enim dilatatur, quando
 inspiratio fit, & ær in pulmones attrahitur, cordisq;
 focus refocillatur: vel contrahitur, quando expira-
 tio fit, & ær per asperam arteriam pro vocis genera-
 tione exprimitur, & fuligines, ne ab ijs cor suffoce-
 tur, excernantur: ita tamen, vt dum inspiramus, tho-
 racis partes inferiores dilatentur, superiores verò an-
 gustentur; & contra cum expiramus, interiora con-
 stringantur, & superiora dilatentur. Hæc causa est,
 cur thorax non ex offe vno^a, quemadmodum cal-
 uaria conformari debuerit, sed ex pluribus, quæ vt
 motui magis obediant, cartilaginibus coarticulata
 sunt. Verū quemadmodum cor motu naturali mo-
 uetur, sic ipse thorax partim motu^b naturali, cum in
 somno naturaliter non ex voluntate moueatur: par-
 tim voluntario, cum quosdam spiritûs retentione si-
 mi mortem intulisse, legamus, mouetur: quemadmo-
 dum pulmo thoracis motū vacui potissimum fuga,
 tam in vigilantibus, quàm dormientibus sequitur. Er-
 go thorax musculis indiguit propter respirationem,
 quæ ipsius diastole siue dilatatione in inspiratione, &
 systole, siue contractione in expiratione absoluitur.

Sunt sit animal.

fieri nunquam

cessat, quare Gal. in 8. de Plac. ipsum accusat quod voluntate non utatur, nec in
 respiratione, nec in perspiratione. Aristoteles in fine lib. de spirit. respirationis opus
 otum ideoq; & pulmoais, & thoracis motum naturalem esse proficitur. An Hip-
 ocrates hac de re in hanc vel illam sententiam scripserit, manifestè & ex professò,
 ignoro. Vesalius motus thoracis arbitrarius est: non autē naturalis probat exemplo
 rum, qui se ex spiritûs retentione interfecerunt. Columbo tum electione, tum na-
 turâ mouetur. Respirationem non ex nostro arbitrio pendere vt Galenus censuit,
 id animalibus tam rationalib. quàm irrationalib. à Natura ingentam esse, pecu-
 ari libro Thaddæus Dunus contra Galenum ostendit.

a 7. vs. par. 21.
 vide etiam su-
 præ lib. 2. c. 1.

b Galenus re-
 spirationem
 motum vo-
 luntariū esse
 voluit 2. mot.
 musc. Platonis
 in Timæo sen-
 tentia, ex his
 ipsis verbis col-
 ligitur, id (in-
 quit) donec
 mortale exi-
 stit animal.

c Cū octo ab-
dominis muscu-
lis in vniuer-
sum 89 sunt,
vtrunque 44.
& vnus vtri-
que lateri com-
munis: at ca-
nes & simia
vtrinq; duo-
bus abundāt,
vt simul ha-
beant 93. Ves.
Thoraci mu-
sculi proprij
81. sunt & 8.
communes in
abdomine po-
siti, Colum.
Thoracis mu-
scul. 65. exce-
ptis 8. abdo-
minis, Plat.
Musculi respi-
rationi dicati
65. Laur. Mu-
sculi respirato-
rij sunt 93. alij
sunt supra tho-
racem quales
sunt nasi 2. a-
lij in thorace
& horum alij
sunt super co-
stas, qui dicū-
tur musculi
thoracem mo-
uentes, 12. alij
inter costas &
sunt interco-
stales 68. alij
infra seu sub-
ter costas, & sunt diaphragma & sextus Thoracis: alij sub thorace & sunt muscu-
li abdominis 10. Archang.

Sunt autem sexaginta & quinque: vtrunque trigin-
ta duo: vtpotè intercostales viginti duo, interm vn-
decim, externi totidem, vnus vtrique lateri commu-
nis, ipsum septum transuersum, de quib. lib. 2. cap. 7.
& 11. egimus? dein abdominis (præter pyramidales)
vtrunque quatuor, de quib. vide lib. 1. cap. 8. & tan-
dem thoracis proprij, vtrunque sex, nisi lubeat adhuc
tres ex Fallopij sententiâ addere (& sic forent se-
ptuaginta & vnus) de quibus in præsens. At horum
omnium alij communes sunt, vt musculi abdomi-
nis, qui non ad solam respirationem sed alios etiam
vsus comparati sunt; alij proprij, qui soli respirationi
inseruiunt: at cū respiratio duplex sit, alia libera
seu naturalis, alia coacta seu violenta. Libera, quæ
placidè fit, hoc est, vbi in inspiratione sine vi tantum
aëris attrahitur, quantum ad spiritûs vitalis genera-
tionem sufficiebat, & in expiratione, vbi aëris attra-
cti pars rursus placidè ad vocis generationem reddi-
tur: vtrumque à solius Septi transuersi motu effici-
tur. illa quidem ex septi contractione, in qua notha-
rum costarum fines sursum nonnihil colliguntur,
thoracis parte anteriore & inferiore coangustatâ,
posteriore verò ad vertebrae deducta, & costis infe-
rioribus septem diremptis, thorace dilatato: hæc ve-
rò ex septo laxato, tum enim thorax pondere suo fa-
cilè concidit. Coacta verò, vbi thoracis dilatatio &
contractio euident est, hoc est vbi in Inspiratione
cū vehementiâ spiritus attrahitur, quemadmodū
in corde nimium calefacto fit: in expiratione verò,
cū aër vi efflatur vel propellitur, vt pro voce, cla-
more edendo, ad tussim & sternutationem efficien-
dam: vel propulsus retinetur, ad conatum pro facib.
excludendis intendendum. hæc respiratio à muscu-
lis sexa-

lis sexaginta quatuor (adiuuante tamen & septo) ab-
soluitur: ita tamen, vt in inspiratione pauciores,
quàm in expiratione laborèt. In ^d inspiratione qui-
dem subclauius, serratus maior, serratus posticus su-
perior & inferior & tres Fallopiani: at ipsi intercosta-
les per accidens aliquid cōferunt, de qua re lib. 2. cap.
7. In expiratione verò plures musculi requiruntur,
cum impetu fortiore efflemus, quàm inspiremus. Sunt
autē sacrolumbus, triangularis, intercostales omnes,
quorū exteriōres costas inferiōres fursum adducūt.
Interiōres, costas superiores deorsum adducunt: Ab-
dominis musculus octo & fortē in magna necessitate,
humeri & scapularū musculi in subsidiū veniunt.

Proprij thoracis musculi, qui thoraci adnati sunt
& sex vtrinq; communiter recensentur, quibus tres
adhuc Fallopius addidit, quorum duo parte ante-
iore subclauius & triangularis, vnus latera occupat,
serratus maior, cæteri parti posteriori incumbunt,
res quidem dorso, serratus posticus vterq; & sacro-
lumbus: tres verò in ceruice, qui à Fallopiō propo-
nuntur, & à Vesalio partes musculorum ceruicem &
lorsum occupantium esse existimantur.

I. ^f Subclauius [tab. 1. Y. t. 8. fig. 3 Y] q̄ sub clauiculā
itus sit, dicitur, & spatium quod inter clauiculam &
primā costam est replet, hic à clauiculæ parte interio-
re ac inferiore costam respiciente carnosus enatus,
obliquè antrorsum defertur, & in primæ costæ partē
superiōrē, quæ sterno iūgitur, carnosus implantatur;
ibras obtinet impensè obliquas & propemodū trās-
uersas: huius beneficio costa prima fursum & extror-
sum trahitur, sicque thoracis cavitās & dilatur.

XXX

II. ^h Ser-

uē Vesal. pro 2. pari dorsi musculorū recenset. Plat. & eos quos Vesal. & quos Fall.
proposuere, recenset. sed Fallop. exortū posuit, vbi Vesalius insertionē & sic vsu-
m immutauit. ^f Musculi sub clauiculis, de diff. musc. 12. Ves. Col. Fall. Arch. 1.
ar. Plat. inter intercostales recensuit: Laur. distendens in thorace primus. g Cum à
jugulo

d Inspirationi
coacta infer-
niunt musculi
32. in qualibet
parte 16. qui
costas didu-
cunt, subcla-
uius, serratus
maior, serratus
postici ambo
abdominis ob-
liquus exte-
rius: interco-
stales externi
vndecim. To-
tidem exspi-
rationi inser-
uiunt, thora-
cem cōtrahen-
tes, intercosta-
les interni 11.
triangularis,
sacrolumbus
obliquus ascē-
dens, rectus &
transuersus
abdominis;
Lauren.
c Galeno octo
Ves. in hominē
6. (in canib.
& similibus)
Col. Archam.
Fal. in Inst. as-
Fal. in obser.
nouem, sex
ipsius Vesalij
duo ab ipso in-
uēti, & vnus

TAB. IV. *Musculos potissimum Thoracis, ca-
pitis & scapulæ proponit.*



ingulō oriatur, ingulū vero ipsum sternō atq; acromio, q̄ thoraci innititur, copulatum sit, non potest valide omnium costarū elevationi inferuire, Fallop. obseru. h Gal. dissect. musc. 17. Vesal. Col. Fal. Plat. Arch. 2. Laur. distendentium 2. scapula potius musculū esse voluit Syluius. Fallop. at cum scapula mouentium primo ortu & in senio ne respondeat, dubium est, an scapulas potius cū illo moueat vel aliud simul cū isto thoracem, Plat. Hūc scapulam mouere existimarunt quidam, sed falso, Lauren. i Vesal. Col. Plat. Arch. ad octo superiores: Fall. in 6. vel 7. superiores costas, Lauren. k Ves. ex Gal. l Ves. 3. hominis, & simiarū ac canū 4. Col. Fall. Plat. Arch. 3. Laur. distendentium 4. m Quamuis collas attollat, tamē quia paruus & obliquus acerbilem infertionē habet, solus hanc functionē integrē obire non potest. Fall. obser.

II. ^h Serratus maior [tab. 1. 4. 5. 77] in thoracis latere situs magnus est, latus, vndiq; carneus, ex scapulæ basi interiore totā carnosus ampliusq; enatus, carnosus, versus costas expanditur, ijs incumbit, fibris cōnectitur, & octo superiorib. ⁱ quandoq; & nona ⁱ, antequam in cartilagine finiant, infertionib. acutis, ppter tendines obliquē descēdentes, tanquā digitis diuisus inseritur, & cum abdominis obliquo descendente ferratam compagē efformat, quemadmodum & ferratus posticus inferior. Hic fibris collectis in maximis conatib. costas octo extrorsum trahendo, thoracem dilatat. At in canibus & simiis non solum costis octo inseritur, sed etiam vertebrarum cervicis 4. 5. 6. & 7. processibus transuersis implantatur, vel, si mauis, inde exoritur. Tertiū ^k quoq; canes habēt, quo homines destituuntur, qui ab interiore parte processus trāsuersi secundæ vertebræ cervicis, & aliquot subsequētium carneus enascitur, & primæ costæ cōmittitur: hīc latior & tenuior redditus, quatuor costis superiorib. carnosus incumbit, firmiterq; adnascitur, & post quartam vel etiam quintam costam in tendinem membranosum neruosumq; desinit, & ad septimam vel octauam, vt eas attollat, exporrigitur.

III. ^l Serratus posticus superior [tab. 4. A] in dorso sub Rhomboeide siue scapulæ tertio inter vtramque scapulam & supra musculorū capitis primū situs est, paruusq; existit: hic à spinis vertebrarum trium inferiorem colli ac primæ thoracis, latus & membranosus enatus, ac nonnihil sub scapulā obliquē ductus, carneus euadens, costarū quatuor superiorum tribus interuallis tripartitus inseritur: hic contractis fibris, costas, ^m quib. implantatur, sursum trahit, sicq; thorax dilatur, eiusq; cavitās posterior, amplior redditur. In

tur. In

tur. In canibus variat, cū nonnihil altiùs exoriatur & longiùs descendat.

Habent autē canes & simiæ & quintū, quo homo caret, qui supra thoracē situs est, & musculi recti abdominis portio videtur, quemadmodum lib. I. c. 8. ostendimus (vel saltem ipsi firmissimè cōnatus) qui supra cartilaginē ensiformem in membraneū tendinem desinit, & sine carnoso costæ primæ inseritur, & costarū verarū fines comprimēdo, thoracē coarctat.

I V. ⁿ Serratus pōsticus inferior [tab. 4. B] in dorsi ferē medio, sub latissimo, seu humeri musculo tertio situs est. hic membranofus nerveus, latus & penē quadrangularis, quemadmodum & præcedens (quo maior est) pectinem referens, ex spinis vertebrarū duarū, nonnunquā trium, inferiorū thoracis, aliquando etiam superioribus ^o lumborū enatus, transuersim delatus, dorsalibus incumbens, & fibris carneis adauctus ad costarū inferiorū quatuor interualla ipsis costis, antequam in cartilagine desinant, veluti in digitos diuisus, inseritur, estque in homine multò latior, quam in simijs & canibus; & in his insignior, quā in simiis. Hic costas tres vel quatuor inferiores extra trahendo, thoracis partem inferiorē dilatat. quemadmodum secundum octo vel nouē superiores attollere & superiorē partē dilatare diximus.

V. P Sacrolumb. [tab. 5. 1] qui thoraci ac dorso cōmunis censi pōt, & præcedēti substernitur, ex sacri ossis sede posteriore, & superiore & ilij ossis parte interuallā carnosus pedit, vertebrarū & lumborū pcessib. transuersis innixus sursum abit, & vsq; ad thoracis vertebrā infimā dorsi musculo lōgissimo [tab. 5. ad φ] commiscetur, vt difficillimè ab ipso sectione separari possit, quare illius portio esse videtur. [tab. 5. α β] mox supra infimā thoracis vertebrā ab alijs musculis, quibus conuascabatur, secedens sensim tenuior redditus

n Vesal. 5. hominis, qui simiarū & canum 7. Fall. Plat. 5. Col. & Arch. 4. Laur. distendentius. o Nonnunquā etiam à primis lumborū Col. Arch. aliquot etiam primorū lumborū, Ves. Fall. Laur. & spinis postremis thoracis & primis lumborum, Plat. p Vesal. 4. hominis, simiarū 6. Fall. Plat. 4. Col. & Archang. 5. Laur. 13. expirationi dicatur. q Ab osse sacro & spinis lumborum nascitur, Lauren.

*r Omnis. costis
inferitur, Col.
Fall. in Inst.
Arch. decem
superiorū co-
starum, Vesal.
Non in omnes
costas inferun-
tur, sed tantū
in sex inferio-
res, a quib. sin-
gulis tendo in
superiores mit-
titur, Fallop.
obs. in costas
ferè omnes in-
feritur, & sin-
gulis costis du-
plici tendine
eoq; validissi-
mo alligatur,
quorum alter
deorsum, alter
sursum fertur,
vt videantur
quasi sese in-
tersecare, &
eo motu costas
archare & cō-
stringere, Lau-
ren. Interdum
etiam ceruicis
vertebra septi-
ma processui
transuerso ten-*

obliquè costarum inferiorū sex tuberculis, quæ ad
radices sunt, tendinib. ferè teretibus, non tamè peni-
tus carnosus, externo latere pductis [tab. 5. 22] infe-
ritur: inde verò, vt rectè Fallopius) sex noui quasi
musculi carnei pducuntur, qui tam ortu, quam in-
sertione neruei sunt, & in superiores costas sex im-
plantatur; ita, vt à duodecimâ costâ, vbi hic musculus
inferitur, tendo quidâ oriatur, qui carnosus redditus
& ascendens iterū excarnis factus in sextam costam
infigitur, & musculum gracilem æmulatur: sic ab vn-
decimâ costâ similiter alius tendo pdit, qui in quin-
tam costam inferitur, à decimâ quoq; vnus, qui in
quartâ, & à nona alius, qui in tertiâ; deniq; ab octauâ
& septimâ gemini, qui in secundam & primam im-
plantatur: omnesq; hi tendines musculos distinctos
referunt, ita tamen inuicē & cum Sacrolumbo in su-
perficie cōmissi, vt ipsius partes esse videātur. Quare
dum Sacrolumbus costas inferiores sex retrorsum,
simulq; deorsum trahit: sex etiam superiores prædi-
ctorum additamentorum (quæ ansulæ vocantur)
mouet, sicq; thoracem constringit.

VI. ^t Triangularis, à formâ dicitur, cū ex duob.
longissimis lateribus, vnoq; breui cōstructus sit; hic
intra thoracis cauitatē sub sternō situs, paruus est, ac
subtilis, & in quibusdam, præsertim macilentis, ^u vix
carneum quid ostendit, & in aliquibus partibus ner-
uosam membranam carne infarctam refert: hic à
sterni
dinem quoq; offert, Vesal. ad primam vsq; vertebrā & sæpè ultimā ceruicis quoq;
attingit, Plat. ^f Cū reuera non sint, Fall. obseru. ^t Ves. 6. hominis, 8. canum &
simiarum; Col. Fallop. Plat. Arch. 6. Lauren. t. 2. expirationi dicatus. ^u Totus car-
nosus per vniuersum pectoris ossis latus sub totâ verarum costarum cartilaginum
regione, Vesal. Columb. Carnasi sed exiles ab extremis clauiculis oriuntur, & deor-
sum supra os sterni vtrinq; vnus decurrit, & terminantur in infimum sterni os.
Archan. Vesalius canini muscul. structuram pro humanâ proposuit, nam in homi-
ne, neq; totus carnosus est, neq; omnes integrarum costarum cartilagines occupat,
Fallop. obser. & Inst.

sterni parte inferiore enatus obliquè sursum versus exteriora cartilaginibus costarum verarum ad secundam usque innatus procedit, hicq; in causâ est, quòd musculi intercostales & intercartilaginei diuersi ob fibras^x diuersas, appareant. Huius munus costarum cartilagine inuicem adducendo thoracem constringere, siue thoracis partem anteriorem, quantum ad respirationem satis est, deprimere. In canibus verò, totum sterni latus, carnosus totus occupat.

Fallopium primum & tertium musculum imbeciliores existimauit, quàm vt thoracis eleuationi sufficere possint vt qui secundum, potius scapulæ motum iudicet, idcirco tres alios^y statuit qui hanc actionem obire possint, quos in ceruice collocat; hosq; Vesalius partes musculorum ceruicem & dorsum occupantium in suâ Apologia existimauit.

VII.^z Nervoso principio ab internâ facie processuum transuersalium 3. 4. 5. & 6. vertebræ ceruicis natus, carnosiorque factus in costam primam inseritur, vt illam, ac totum simul thoracem attollat.

VIII.^a Scalenus [tab. 7. & tab. 15. lib. 2. CC] ob triangularem figuram, eamque inæqualem sic dictus: hic b omnium vertebrarum ceruicis transuersis processibus (aliquando tamen 1. & 2. exceptâ) nervosus oritur, & in costam primam, aliquando etiam secundam carnosus inseritur: hic attollendo thoraci inseruit.

IX. A processibus transuersis vertebræ ceruicis quartæ & quintæ, in secundam, nonnunquam in tertiam costam finè carnosio implantatur, eamq; attollit. Ab his ergo tribus & à Serrato postico superiore, thoracem eleuari, Fallopium censuit.

^x Huius fibra deceptere veteres, & neotericos serè omnes, ita vt inter cartilagineos addiderint externos & internos
24. Fallop. Laurent.

^y In suis obseruat in Instit. pratermisit, fortè, quia Vesalius scripsit, se vereri, ne musculi ceruicis & dorsî, à Fallopio in sectione dilacerati, illi plures statuendi occasionem prabuerint.

^z Hic à nemine descriptus, ait Fallop. in obseru.

^a 2. par dorsaliū Ves. verum ex insertione à Vesalio ei tributâ, illius exortum & ex principio insertionē Fallop. facit, & sic usum immutat.

Musculi, qui DE MUSCULIS CAPITIS.

C A P. VII.

caput mo-
pient, numero
sunt octo &
viginti, aut eo
plures, instar
chori cuiusdā
in orbē ipsum
circumstātes,
quorum alius
aliam habet
actionē, quo-
rum octo par-
tibus antero-
ribus, quā-
tuordecim au-
tem posteriori-
bus ex diame-
tro sibi ipsis
oppositi &c.
12. vs. part. 8.
b Vtrum uti-
lius sit obli-
quam motum
ad primā ver-
tebram, vel
contra moue-

De his Galenus de diff. Musc. 9. 4. adm. anat. 6. 7. & 8. 12. vs. part. 8. 9. quemadmodum de duplici motu capitis egit lib. de ossib. 8. quorum alter annuendo, abnuendo-
que fit: alter in latera circumagendo: illum vertebra
secunda cervicis processus potissimum praestat: hunc
verò summa vertebra vide & 12. vs. part. 6. & 7.

CA P. V. T dupliciter mouetur, primariò & secun-
dariò: primariò quidem supra secundam colli
vertebram antrosum flectendo & retrorsum exten-
dendo: supra primam^b verò velut ad axim circum-
ducitur: qui motus à septem^c vel potius nouem mu-
sculorum paribus proprijs absoluuntur, quorum se-
ptem extendentes & circumagentes parte postero-
re in ceruice siti sunt: duo verò flectentes in colli an-
teriore parte locantur: secundariò verò & per acci-
dens, cum ceruicis motum sequitur, à ceruicis mu-
sculis, sed ad latera mouetur: immotā enim ceruice,
caput proprio motu ne minimū humeris adducemus.

I. d Par;

12. vs. part. 6. & 7. inquitur sic de motu primae & secunda vertebra 4. adm.
anat. 8. caput proprio motu, quiescente etiam oeruice, flectitur & extenditur seu
antrosum & retrorsum super primam cervicis vertebra fertur: dein alio pecu-
liari motu supra secundam vertebra velut ad axim circumducitur sine flexu si-
ue extensum cum ceruice aut citra ceruicem existat: at in latera non ceruicis be-
neficio, ac velut secundario inclinatur, Vesal. Plat. primariò cum primā & secun-
dā vertebra, secundario cum toto collo: proprijs ives videntur, unus ante, retro: al-
ter ad latera: tertius cum circumagitur: motus recti super primam vertebra
sunt, obliqui super secundam, quidquid Galenus in hoc asserat, qui neq. mathe-
maticam, neq. anatonem in hoc calluisse videri possit, Columb. De Motu capitis
elegantem pro Galeno scripsit Bartholomeus Eustachius libello proprio: c Septem
paria partim caput, partim primam vertebra cervicis agunt, Vesal. 7. paria pro-
prijs capitis motibus famulantur, Col. Et Arch. qui musculos cephalicos, id est, ca-
pitales, seu caput mouentes vocat: decem paria proponit Fallop. in obser. at in Inst.
tantum septem: paria 7. Vesalijs & 9. Fallopij recenset Plat. capitis musculi 14
sunt, flectentes duo, extendentes octo, semicircularem motū edentes quatuor, Law.

I. d Par; Splenij [*tab. 5. Δ Δ initium char. 8. insertio- nem ch. 9. indicat*] qui oblongi sunt & crassi, vtrunque vertebris instrati, & licet satis carnosi sint, nervosi tamen à spinis quinque vertebrarum superiorum thoracis (rarius à sextâ) oriuntur; dein ascendentes carnosi à f ligamento per spinas cervicis ad occipitiū medium delato, exoriuntur: (quare alij s à spinis quinque vertebrarum inferiorum cervicis tantum leuiter enasci dicunt) qui obliquè ad caput ascendant: verum ab eâ parte, quæ à thoracis spinis pro- dit, tendines membranei duo producuntur, qui in processus transuersos primæ s & tertiæ h vertebræ cervicis, vel secundæ, tertiæ & quartæ aliquâdo h in- feruntur: parte verò carnosiore ad occipitium vsque ascendunt. Siquidem in thorace neruei in ceruice carnei existant. Horum k quoque fibræ obliquè sur- sum à vertebrarum spinis, quasi ad vertebrarum su- periorū processus transuersos ducuntur, dum omnes simul in occipitio finiant. At vbi ex thoracis verte- brâ prodeunt, angulum acutum referunt, & sursum ascendentes sensim dilatantur, & circa tertiæ verte- bræ colli spinam sensim, dexter à sinistro extrorsum ad occiput notabili spatio seiungitur [*tab. 5. charact. 12.*] ita vt horum musculorum recessus triangulum æmuletur [*tab. 5. char. 9. 10. 12.*] & tandem lato carneo- que fine obliquè k in occiput implantantur [*tab. 5. à ch. 11. ad 9.*] & sic latera tria habent; vnum ab initio, vsque quò à socio diuiditur, alterum inde ad occi- put, tertiu ab occipitio ad exortum vsque. Nonnun- quam etiam l nervosa particula in processum mam- millarem inseruntur.

Xxx 5

Horum

Arch. h In transuersos secunda vertebra processus portione alterâ, alterâ in occi- put inseruntur, Laur. i Nexum exiguum in vertebrarum transuersos processus mo- litur, Vesal. k Fibræ ab origine suâ donec diuidantur, rectæ sunt, dein obliquæ, Col. Archang. hic vult inter posteriorem occipitij partem & aures in caput desinere. l Transuersa linea, Vesal. transuersim, Plat. l Fallop. obser.

d. par mu- sculor. capit. Vesal. Colum. Fallop. in obs. & in Instit. Plat. Archan. extendentium magnorū pri- mi duo Sple- nij, Laurent. e A quartâ thoracis ver- tebræ spinâ vsq; ad tertiâ cervicis spinâ, Fallop. Inst. à sextâ thoracis ad tertiâ cer- uicis, Plat. f Fallop. obser. à ligamenti cervicis ena- tis putat Fal- lopius, Plat. g A quinque sed nimis quâ leuiter, Vesal. à colli verte- bris ad tertiâ vsque Col. à quinque ver- tebr. thoracis & ab inferis quatuor cer- uicis orti, Lau- rent. à quinq; superiorū dor- si & trium in- feriorum colli,

TAB. V. *Musculos capitis, Thoracis, humeri
& scapulae aliquot proponit.*



Horum vsus, cū ambo agunt, caput ad posteriorem partem rectā trahere & extendere: at cum alter duntaxat agit, caput in latus circulariter vertere.

Tum dexter caput retrorsum sinistrorsum, evidenter dextrorsum, contra sinistram sinistrorsum ducit Archang. n. 2. par Vesal. Col. Fallop. in obser. & Insti. (qui capiti & cervicis communes dicit) Plat. (qui addit à Vesalio in unū, Fallopio in duo distinguere paria) Archang. extendentes complexi seu implicati, Laurent.

Gal. refert, quosdam non duos tantum, verum quosdam 4. quos-

dam 6. recensuisse: verum ait Vesal. hanc coniugationem in homine multò aliter comparatam esse, quàm Galenus descripserit: ex quatuor veluti musculis, Vesal. plures, quàm quinque musculi videntur, Col. triplici oritur principio, Fallop. obser. ex quatuor veluti musculus utrobique constans, quorum alij à processu transverso 4. & 5. vertebr. thoracis: alij à spinâ 7. vertebra cervicis, alij à transversis processibus 1. & 2. thoracis, alij ab omnibus istarū vertebrarum transversis processibus. molè carneam efformantes per eam occipitio adnascuntur, Fall. Instit. trib. vtrinque partibus constitutum est, Plat. principio multiplici à spinâ 1. & 2. thorac. vertebr. & transversis processibus. quinque inferiorum cervicis & variè permixti unum corpus efformantes in medium ferè occiput desinunt, Laurent. à transverso processu 4. & 5. dorsi vertebr. oriuntur, Archang. p. A spinis prima, secunda & septima cervicis interdum oriuntur, Plat. q. A thoracis 1. & 2. & quinque inferiorum cervicis, Plat.

II. ⁿ Par: Complexi [tab. 6, A. B. C. D. E. F.] à variâ formâ & impressione sic dicti: siquidem principia varia habeant, & diuersâ ratione in occiput inferantur, partes multas tendinosas, multasque carnosas obtineant, ita ut ex ^o tribus veluti musculis quilibet compositus videatur. Horum enim aliud longius acuto initio ex processu transverso vertebræ thoracis quartæ & quintæ prodit [A] quod illicò ab exitu carneum apparet, & muris formam acquirit: vbi verò ad cervicis initium peruenit [B] carnosum esse definit, & velut in tendinē teretem finit, & vbi cervicis radicem superavit [C] carnosus denuò redditur (quemadmodum hyoidis ossis digastricus dictus) talisque in occipitis ossis medium [D] inseritur. Aliud verò principium brevius [C] à septimæ vertebræ cervicis spinâ neruosum & teres nascitur, ascendens carnosus euadit, & cum prædicto, ante insertionem, commissus, occipitio implantatur. Aliud velut tertium [E] ad [F] in latere situm à processibus transversis vertebrarum thoracis secundæ & primæ q. partim

tim carnem, partim nerueum enascitur, & oblique extrorsum exporrectum, carnosum latumque redditum, ad processus mammillaris radicem occipitio inferitur: verum & in canibus & simijs longè aliter se habet. Hi si simul agant, caput ad posteriora trahendo, rectè extendunt: si alteruter solus^r agat, ca-

r Si solus dexter, retrorsum

simul, sed leuiter ac paulatim dextror-

sum, & contra Archang.

f Vesal. pro quarta parte

secundi musculi recen-

suit: at Fall. in obseru. tertium facit ex-

actè distinctū musculū: ad-

dens Vesalio errandi cau-

sam prauisse, quod fibras a-

liquot cuiusdā dorsalis mu-

sculi cum prin-

cipio huius conuasci vi-

deantur. Idem duos adhuc

addit, admo-

hi mu-

qui à processu

transuerso prima vertebra orti, graciles valde ad caput ascendunt, & propè mam-

illarem processum in illud inferuntur, qua tamen tertij musculi particula vi-

deantur: quorum Galen. diff. musculor. videatur meminisse, dum de undecimo

musculo, vel pari caput mouente loquatur: 8. Fallopio carnea moles quarta pars

secundi musculi Vesalio, Plat. 1 3. par Vesal. Columb. Fallop. Inst. Plat. Archang.

muscul. Fallop. obseru. extendentes parui recti, Laurent. u 4. par Vesal. Col-

allop. Instit. Plat. Archang. 5. muscul. Fallop. obseru. extendentes parui recti mino-

res, Laurent.

III. ^r Par [tab. 6. G G] quod non admodum magnū & crassum est, & sub secundo pari situm, à processib. transuersis sex priorum vertebrarum ceruicis, varius etiam à quinque superiorum vertebrarū thoracis, principio neruoso oritur, carnosumque redditum, oblique sursum introrsum, fibris ad spinas pertinentibus, porrigitur; sine quoque neruoso in processus mammillaris radicem posteriorem, iuxta insertionem duabus portionibus à processu transuerso primæ vertebræ exortis, adauctum, inferitur. Huius vsus, si ambo agant, caput retrorsum leuiter ducere; si alteruter, caput retrorsum ad latus trahere.


IV. ^r Par: Recti maiores [tab. 7. A B] parui sunt, carnosi & graciles, qui ab apice spinæ secundæ vertebræ ceruicis [E] in exortu contigui prodeunt, & latim inuicem abscedentes, ambo sursum porrecti, eretes in occipitium medium desinunt.

V. ^u Par: Recti minores [tab. 7. F G] sub illis sitiunt, illisq; substantiâ, formâ, ductuque similes sunt, qui à primæ vertebræ parte posteriore, vbi vertebra in spinam desinere debebat (deficit autē spina, quia

hi mu-

transuerso prima vertebra orti, graciles valde ad caput ascendunt, & propè mammillarem processum in illud inferuntur, qua tamen tertij musculi particula videantur: quorum Galen. diff. musculor. videatur meminisse, dum de undecimo musculo, vel pari caput mouente loquatur: 8. Fallopio carnea moles quarta pars secundi musculi Vesalio, Plat. 1 3. par Vesal. Columb. Fallop. Inst. Plat. Archang. muscul. Fallop. obseru. extendentes parui recti, Laurent. u 4. par Vesal. Colallop. Instit. Plat. Archang. 5. muscul. Fallop. obseru. extendentes parui recti minores, Laurent.

T A B. VI. *Musculos capitis, dorsi, thoracis
scapulae & humeri aliquot exhibet.*



*x Horum v-
sus; ut & se-
cundorū Ar-
chang.*

hi muscoli læsi fuissent) in exortu quoque contigui prodeunt, mox inuicem diducti, sursumque porrecti, teretes occipitio medio vtrinque insiguntur. Hæc duo paria ^x, si simul agant, caput ad posteriora trahendo rectā extendunt: si verò horum alter solus agat, in latus circulariter mouet. Quod autē tot fuerint muscoli caput retrahentes, causa est, quia anterior pars propter faciem & maxillam inferiorem, ponderosa est.

*y s. par Vesal.
Fallop. Instit.*

Plat. 6. par

Columb. Fal-

lop. obser. obli-

qui muscoli

primi, Laur.

z Oblique de-

scendentes Ve-

sal. oblique re-

ctā ferè de-

scendūt, Plat.

quasi rectā;

non autē obli-

quē, ut Vesal.

voluit, Fall.

obseru.

a Hinc oriri

in caput desi-

nere videtur

potius statue-

re Fallopius,

Plat. b Galen. de diff. musc. 9. caput in gyrum mouere voluit Vesal. verum cum

non oblique declinet, uti in motu circularis requiritur, in gyrum non mouebit, Fal-

lop. obseru. serui circula rem capitis motum edunt, Laurent. plurimum valent cum

præcedenti pari ad facilitandum motum capitis in orbem factum, Archang.

c s. par Columb. 6. par Vesal. Fallop. Instit. Plat. 7. par Fallop. obseru. obliqui

musculi posteriores, Laur. d Primam vertebram cum capite supra secundam cir-

cum uertunt duo posteriora paria Vesal. at sic Fallop. quod caput in gyrum mo-

ueant, mihi à veritate penitus alienum quoad sextum par. cum capitis dearticu-

latio cum primâ vertebrâ tali motui inepta sit: at de septimo verum apparet: sic

Laurent. ad obliquos motus peculiare musculi non sunt, sed dum alterius partu

flexo.

VI. y Par: Obliqui superiores [tab. 7. HI] sub rectis siti sunt, ijsque formâ & substantiâ respondent, parui sunt, qui è medio occipitio iuxta externum latus quarti paris orti deorsum ^z descendentes in apicem [D] processus transuersi primæ vertebræ cervicis transuersim, dexter in dextrum, sinister verò in sinistrum processum ^a inseritur. Horū munus, si ambo ^b agant, ut rectā leuiter abnuamus: si alter tantum, caput retrorsum in illam partem inclinat.

VII. c Par: Obliqui inferiores [tab. 7. KL] à spinâ secundæ cervicis vertebræ prodeunt [ab E ad D] & oblique sursum procedentes processui transuerso primæ quoque vertebræ implantantur. Hi cum obliquis superioribus oblongi sunt, carnei & penè teretes (in cane & simiis multò quàm in homine crassiores & insigniores) triangulum æqui laterum constituunt. Huius septimi paris munus ^d caput cum secundâ

Plat. b Galen. de diff. musc. 9. caput in gyrum mouere voluit Vesal. verum cum non oblique declinet, uti in motu circularis requiritur, in gyrum non mouebit, Fallop. obseru. serui circula rem capitis motum edunt, Laurent. plurimum valent cum præcedenti pari ad facilitandum motum capitis in orbem factum, Archang.

c s. par Columb. 6. par Vesal. Fallop. Instit. Plat. 7. par Fallop. obseru. obliqui musculi posteriores, Laur. d Primam vertebram cum capite supra secundam circum uertunt duo posteriora paria Vesal. at sic Fallop. quod caput in gyrum moueant, mihi à veritate penitus alienum quoad sextum par. cum capitis dearticulatio cum primâ vertebrâ tali motui inepta sit: at de septimo verum apparet: sic Laurent. ad obliquos motus peculiare musculi non sunt, sed dum alterius partu flexo.

fundâ vertebrâ supra primam circulariter, vel, si ma-
 nis, semicirculariter cum perfectus circularis motus
 capitis non detur, circumagere, quando e vnicus
 agit: si ambo e, aut sistet caput, aut illud retrorsum
 trahet ad motum, sed ad quietem vertebræ, cum
 hæc capiti ob ipsam vertebam accidunt.

VIII. f Par: Mastoidei [tab. 26. fig. 2. K posterius. tab.
 7. fig. 3. K] parte anteriore siti sunt, membraneo la-
 tiorque musculo in collo occurrente [tab. 26. fig. 1. T]
 proximè subiecti validi, longi, ac teretes, qui etiam
 opndum excoriato cadauere in macilentis apparent,
 nò in viuentibus conspiciuntur, & ij sunt, qui ab
 antiquis in numismatibus tantâ diligentia obseruati
 uere; Hi à summi sterni [p] regione mediâ & par-
 te clauiculæ, quâ sterno [σ] coarticulatur, neruosi
 utique, sed à sterno neruosiores exorti, obliquè sur-
 sum procedunt, carnosif denique redduntur, & sine
 arnoso crassoque in processum s mammillarem,
 uem suâ amplitudine complectitur, & occipitis
 artem posteriorem obliquè inseritur [tab. 26. fig. 2.
 .superius,] & hunc propter duo principia, inter quæ
 cauitas aliqua, cum in duos diuidi possit [tab. 26. fig.
 .pσ] aliqui in plures secant. Hi si simul agunt, ca-
 ut antierius in prouum flectunt, quod annuendo
 it, siue rigidâ siue inclinâtâ ceruice: si aluteruter so-
 us caput ad anteriora in latus dextro quidem agente
 inistrorsum, sinistro dextrorsum circumagit, q̃ in
 quorû habenis animaduertitur. Hoc par cû hyoidis
 vari secundo [t. 26. fi. 2. V V] in collo crucē, efficiunt.

Yyy

IX. i Par:

parte mammillari processui, alterâ ad auris radicem caluaria insertum; tres autem
 ines in nullo comperisse, nec principium in duas tresue partes manifestò distinctum,
 uamuis hi musculi utring, ab aliquib. tres aliquando & duo, enumerati fuerint
 ue numerus pro musculi finium ratione in simis & canib. inter Anatomicos va-
 iat: licet pleriq, hos à capite natos pectoris ossi & clauiculis inseri, thoracisq, mo-
 ib. præfici contenderint, Vesal. h Columb. in duos & tres secant plurimi: sunt
 im distincta eorum principia inter quæ cauitas sensibus conspicua, Laurent.

flexor cum ex-
 tensore opposi-
 to, simul agūt,
 obliquum e-
 dunt motum:
 & hac duo pa-
 ria semicircu-
 larem capitis
 motum edūt.

Caput in or-
 bem vnâ cum
 primâ verte-
 bra trahunt, à
 primis tamen.
 atq, extremis
 adiuti, Col.

e Fall. obseru.
 f 7. par Vesal.
 Col. Fall. Inst.
 Plat. (cui &
 elatius par)


Archa. 8. par
 Fallop. Instit.
 flectentes duo,
 Laurent.

g In processum
 māmillarem
 inseri voluit
 Ves. Col. Plat.

Laure. Arch.
 addit Vesa-
 lius, se in quā-
 busdam qua-

drapedibus in
 medio ductu
 bipartitum
 inuenisse, vna

TABVLA VII. *Capitis & cervicis muscu-*
los exhibet.



19. par Fallop.
in obseru. at in
Instit. prater-
missum: par
profundius &
9. par Fallo-
pij, Plat.

IX.ⁱ Par: [tab. 15. lib. 2. ad latus A B] à Fallopio addi-
tum, aliquâ ex parte à Galeno descriptum, sub cœso-
phago in anteriore colli parte situm, & à primo cer-
uicis pari, [tab. 1. D E; tab. 15. lib. 2. A B] cui tamen adia-
cet, diuersum, principio neruoso à chordis vertebra-
rum ceruicis oritur, quæ chordæ à processibus trans-
uersis vertebrarum ceruicis ferè omnium, præsertim
7. 6. 5. 4. & 3. oriuntur; quod carnosum aliquantum
redditum ascendens, sine carneo in capitis basin in-
ter vtrumque processum, quo cum primâ vertebrâ
articulatur, inseritur, & caput manifestè ad anterio-
ra, dum annuimus, flectit.

2. Cervicæ,
dorsi & lum-
borum muscu-
los dorsales
vocat Vesal.
(& Plat.)

DE MUSCULIS CERVICIS seu Colli.

CAPUT VIII.

De his consule Galenum de diff. muscul. 16

MVSCVLI cervicem seu collum primariò, se-
cundariò verò caput mouentes, vtrinq; ^b tres
sunt, vel quatuor, si Scaleni, quos inter Thoracis
musculos recensuimus, addatur, qui sub capitis mu-
sculis locati sunt: quorû alij parte anteriore, & ad cer-
uicis latera: alij parte posteriore siti sunt, quib. ceruix
antrorsum flectitur, retrorsum extenditur, & in late-
ra, pro diuersâ eorum actione, reliquo corpore im-
moto persistente, mouetur, & his successiuè agenti-
bus, ceruicis motus, qui circularem æmulatur, effici-
tur. Plures autem sunt, qui eam retrorsum, quàm
qui an-
thus: Columb. & Laur. musculi ceruicis, à quib. secundariò caput mouetur: Arch.
musculi cervicales id est cervicem mouentes. ^b Sunt sexdecim, octo nimirû parib.
complexi, quorum octo primi, ceruicis potiss. famulantur motibus (de quibus hic
agimus) ac inter musculos caput agêtes subinde recensentur, Vesparia octo sunt Ve-
salio, sex tantum Fall, ait Plat. octo sunt musculi, Col. Arch. Laur. & hic, quatuor
flectere, quatuor extendere, motum ad latera ex altero extensore & flexore simul
agentib.

qui antrorsum ducunt, cū illud propter cervicis capitisque pondus operosius sit.

I. Par c: Longi duo [tab. 1. D. E. t. 15. lib. 2. AB] qui parte anteriore^d sub œsophago siti sunt; quare & musculi sub œsophago latitantes dicuntur. Hi principio carneo, tenui & acuto, à quintæ thoracis vertebræ corpore, vbi ipsi costa articulatur, prodeunt, & secundum colli longitudinem vertebris quinque superiorū thoracis & cervicis omnium, latiores redditī & innati ascendunt, vtriusq; lateris musculis sensim & mutuò appropinquantibus, ita tamen, vt mediā partē, quā œsophagus descendit [tab. 1. inter DE] detestā relinquant: tum tendine acuto & nervoso in vertebræ rimæ processum extuberantē, ambo simul coeūtes coniungunt: rariū occipitio ad magnum ipsius foramen, obscurè tamen inferuntur, ita, vt ab ijs etiam occiput ecti videatur. Hi proprio motu cervicem^e rectā anteriora versus flectunt, & ynà caput inclinant: si erò alteruter solus agat, in contracti latus antrorsum cervix inclinabitur.

II. f Par faciunt eos, quos Scalenos vocauimus [tab. 15. lib. 2. C C. tab. 7. λ] & thoracis musculum octavum fecimus, qui latera magis occupant, quos à coram primā carnosos amplosq; oriri & in omnes transversos processus & vertebrarum colli, primā & secundā nonnunquam exceptā (vnde eos prodire diximus) inferi volunt, & cervicem^h anteriora versus flectere, quemadmodum & primum par faciat. His

Yyy 3

pecu-

agentib. perfici
asserit: Fallop.
obseru. totam
molem carneā
in dorso (intel
ligit & cervi-
cus & dorsi
musculos) sa-
tis commode
in sex paria
dividi potest.
c Musculi spi-
nam flecten-
tes, diff. musc.
25. 1. par dorsi.
Vesal. Fallop.
obseru. Plat. 1.
par cervicis,
Col. Arch. fle-
ctentiū prim.
par, Laurent.
ex Galeni sen-
tentia nonnulli
non duos enu-
merarunt, sed
singulos duorū
vice aut triū
enumerasse
videntur, for-
tè quod qui-
busdam in-
scriptionibus
secundum fi-
brarum du-
ctum exporre-
ctis instar li-

nea alba appareant: sed si musculi principia & insertiones consideres, multo plures, quam tres, tribus ad tres superiores thoracis vertebrae & septem ad septem cervicis relatis, quare satius unum numerare, aut decem, quamvis præter rationem Vesal. d. 5. adm. anat. 9. diff. musculor. 16. & 25. c Gal. 13. vs. part. caput releuare & sursum ducere docuit parum rectè: alijs non solum cervicem flectere creduntur, & etiam thoracis vertebrae superiores, Vesal. l. 2. par dorsi, Vesal. Plat. 2. par cervicis, Col. Arch. flectentiū cervicē 2. par, Laur. 8. par thoracis, Fall. obser. g Hic Vesalius insertionem, Fallop. exortū posuit. h Cervicē retrorsum recta contorquere Arch.

IVesal. Plat.

peculiare i quò foramen habeant, quò venæ & arteriæ in brachium excurrentes transire possint.

k3. par dorſi,

Vesal. Plat. 3.

par ceruicis

Col. Archang.

1. par exten-

dentium cer-

uicem, Laur.

2. par dorſi

triplici princi-

pio ortū, Fall.

obſeru.

1 Sexta dorſi

vertebra Ar-

chang.

m Tum dorſi

tum ceruicis

inter ſpinam

& tranſuerſos

proceſſus 2. ver-

tebra termi-

nantur Arch.

n Horū ut &

ſecundorum

collum recta

ad ſcapulas

ſtendere 1. ad

latus, Col.

o 4. par dorſi

Vesal. Plat. 3.

par dorſi Fall.

obſeru. 4. par

ceruicis, Col-

Archang. 2.

par extenden-

tium, Laur.

p à proceſſibus

tranſuerſis ver-

tebrarum tho-

racis incipiens

à 9. vel 8. ad primam, & omnibus proceſſibus tranſuerſis vertebrarum ceruicis

uſque ad ſecundam, ubi inſeritur, Fall. obſ. q In ſpinas ceruicis deſinit, Laurent.

III. Par^k: Tranſuerſales duo [*tab. 6. E*] in dorſo ſiti ſunt, & à radicibus tranſuerſorum proceſſuum ſex^l thoracis vertebrarum ſuperiorum orti, ſenſim craſſiores validioresque redditi, in omnes tranſuerſos^m proceſſus vertebrarum ceruicis, ſede externâ inferuntur, rariùs in primæ vertebræ proceſſum implantantur: aliquando duo alia principia acquirunt, vnum à ſecundo pari dorſi, alterum à quinto pari thoracis, quæ ſimul muſculos hos efformant. Hi ſi ſimulⁿ agant, rectâ in poſteriora extendunt, ſi alteruter agat, obliquè mouet: Inter hos nerui ſpinalis medullæ è vertebris colli exeuntes feruntur.

IV. ^m Par: Spinati duo [*tab. 7. II*] inter ſpinas ſiti, totam ceruicem occupant: hi à radicibus ſpinarum ſeptem ſuperiorum vertebrarum thoracis exoriuntur, qui vbi ceruicis vertebram infimam contingere, ampliore ſede ab illâ enaſcuntur, & fibris à thoracis vertebris enatis, obſcuram inſertionem in illius vertebræ ſpinam moliuntur; reliquis ceruicis vertebrarum ſpinis validè innafcuntur, & ab eorundem tranſuerſorum proceſſuum radice uſque ad ſecundam, initia noua educunt, enatas fibras ſpinæ ſuperioris vertebræ inferentes, donec in totam inferiorem ſpinæ ſecundæ q vertebræ ceruicis ſedem implantantur, & dexter cum ſiniſtro iungatur, & toto per ceruicem progreſſu mutuò accumbunt, & duntaxat ſpinis vertebrarum diſtinguuntur: horum quoque fibræ ab exterioribus ſuſſum modicè intrò feruntur. Hi ſi ſimul agant, ceruicem rectâ ad poſteriora trahendo, extendunt: ſi alteruter ſolus agat, obliquos motus perficit.

DE MV-

DE MUSCULIS DORSI.

CAP. IX.

De his Galen. lib. de diff. musc. 24. cui πᾶσι τὰς, spinales dicuntur, & 25. 5. admin. anat. 9. & 10.

DORSI musculi, quemadmodum & vniuersæ spinæ, adeò varij, misti & connexi sunt; ita, vt alij in plures, alij in pauciores musculos diuiserint, & que ob infinitum fibrarum & originem & insertionum multitudinem. At singulari naturæ artificio, vt rectè Arantius, inuicem adeò cōnexi, & intertexti sunt, imò potiùs continuas indiuisibilesq; particulas habent, quò actiones validas quibus præsumunt, faciliùs sustineant, ac perficiant, dum omnes simul in vnum motum conueniunt: siquidem vnà cum vertebris omnibus reliquam corporis molem, quæ offe-
 ãcro, tanquam basi stabilitur, exigere ac retinere destinati sint. Quare cum Galeno^a dicimus, cum verè
 a diff. musc. 24.
 eiungi nullâ ratione queant, vel totidem quot sint vertebrę paria numeranda videri, vel vnum tantummodo partendinosas distributiones vertebris omni-
 bus offerens, statuendum; cuius quidem paris altero-
 gente spina extensa in illud latus inclinat; vtrisque
 erò æqualem actionem obeuntibus, pro eorundem
 ntensione aut remissione in neutram partem ver-
 gens, retrorsum recuratur. Cum autem musculis
 penè omnibus actionis contrariæ opifices dati sint,
 qui mutuam actionem & passionem experiantur,
 quiete per mediam figuram interpositâ, his tamen
 spinæ dirigendæ dicatis, si ceruicem flectentes exci-
 pias, musculi contrarij dati non sunt: nam cum in-
 terna regio thoracis ac lumborum, visceribus nobi-
 issimis respirationi ac nutritioni inseruiantib. dicata
 fuerit, nulla instrumēta voluntarij motûs, quæ eorū

b Dorsi musculi octo sunt, quatuor vtrinque. Colum. musculi dorsales & lumbales, hoc est: dorsum & lumbas mouentes octo sunt, Archang. dorsi musculi decem sunt, Laurent.

Lumborum musculos vocat & sex constituit Sylluius, c. 5. par dorsi, & secundus musculus lumborum Vesal. (qui censuit quemadmodum & Col.) in eorum musculo numero haberi, qui vocat & adpines Gracis dicatur, quāvis Clearchus exteriores quoque sextum & septimum par sic appellauerit, quā in re reprehendit: Fall. Vesalium, quia reuera musculi vocat ab Hipp. & Galeno dicti, duo sint femur mouentes musculi, quos pro sexto pari Vesalius retensuit, & quamuis Clearchus, auctore Polluce, vel Clitarchus auctore Russo, dorsales musculos exteriores his nominibus vocari dixerit, in errore tamen fuit, eodem Russo teste: at Plat. vocat cum sexto musculo femoris efficere asserit. s. par dorsi, Plat. 6. par dorsi Fallop. 2. par dorsi Col. Archang. (cui & lumbaris interior) Laur. d. Quadrangulum constituit Vesal. figurā quadrilatera Col. alijs triangulares. e. Hi ambo duntaxat lumborum vertebrarum motus auctores sunt, Vesal. f. Galeni in s. adm. anat. 9. descriptio simia non admodum quadrat, & longè minus homini, Vesal.

actionibus impedimento forent, adhibenda fuere: unde musculi hi in senibus cum ob corporis pondus & imbecillitatem, tum quòd pituitosis succis abundant, laxiores reddit, corpus erectum minimè continere possunt.

Verū Anatomici, cum dorsum antrorsum, retrorsum, ad latera & ferè semicirculariter (quos motus in Saltatoribus obseruare licet) moueri animaduertissent, ad hos motus obeundos quatuor^b vtrinque musculos constituere.

I. ^c Par: Quadrati [tab. 1. lib. 2. r. t. 1. lib. 4. Σ Σ, t. 6. & 7. Σ] ab ossis ilij cavitare posteriore & superiore & ossis sacri superiore & interiore, lati, crassi, carnosiq; exoriantur, & quasi quadrati^d supra lumborum vertebrae in abdominis parte interiore ascendentes, modicè angustantur, & processib. transuersis vertebrarum lumborum adhærentes, costæ duodecimæ parte inferiore carnosæ inseruntur. Huius fibræ ab exterioribus introrsum obliquè ad superiora ascendunt, & quæ à sacro osse prodeunt, lumborum vertebræ infimæ inseruntur, quæ has versus iliū os succedunt, sensim in vertebrae superiores desinunt, ita vt toto ductu processib. transuersis vertebrarum lumborū, ipsorumq; lateribus inserantur. Hi lumborū^e vertebrae, seu dorsi partē inferiorē recto motu in anteriora flectūt: si verò alteruter solus operetur, tū obliquè flectendo ad latus simulq; antrorsum trahit. Verū forma in canib. & simijs^f longè ab hominis varians.

II. Par 8:

Fall. Vesalium, quia reuera musculi vocat ab Hipp. & Galeno dicti, duo sint femur mouentes musculi, quos pro sexto pari Vesalius retensuit, & quamuis Clearchus, auctore Polluce, vel Clitarchus auctore Russo, dorsales musculos exteriores his nominibus vocari dixerit, in errore tamen fuit, eodem Russo teste: at Plat. vocat cum sexto musculo femoris efficere asserit. s. par dorsi, Plat. 6. par dorsi Fallop. 2. par dorsi Col. Archang. (cui & lumbaris interior) Laur. d. Quadrangulum constituit Vesal. figurā quadrilatera Col. alijs triangulares. e. Hi ambo duntaxat lumborum vertebrarum motus auctores sunt, Vesal. f. Galeni in s. adm. anat. 9. descriptio simia non admodum quadrat, & longè minus homini, Vesal.

II Pars: Longissimi [tab. 4. 5. 6. 7. 8.] omnium g *De his Gal.*
 musculorum corporis nostri, siquidem ab ossis sacri *s. adm. anat. 9.*
 extremo ad primam vertebra[m] thoracis, aliquando *6. par dorsi Vesal. Plat. 5. par dorsi Fall. ob-*
 ad ossis temporum processum mammillarem expor- *serv. 2. par dor-*
 rigan-^{tu}r: thoracis musculorum quinto pari sacro- *si Col. Archam-*
 lumbo dicto similis [tab. 5. r.] cui in exortu & per *(cui & lum-*
 lumbos progressu connascuntur, quasi illius paris *bare, & dor-*
 parr foret, suntq; dorsaliu[m] omnium maximi. Hi ex *sales) Laurent.*
 ossis sacri spinæ summo [tab. 6. L.] secundum ipsius *2. par lumboru*
 longitudinem & ex spinis quinq; vertebrarum lum- *seu extenden-*
 boru[m], nervoso admodum, valido & acuto [tab. *tiū primū, Syl-*
 7. b.] principio exorti, & ossis ilium h sede [tab. 7. 8.] *nio. semispirari*
 internā, qua sacro iungitur principiu[m] i nervosum *h quibusdam.*
 educunt, sub quo principio nervoso, tanquam sub *h Vesal. Fall.*
 tegumento quodam, aliud summe carneu[m] princi- *non meminit*
 pium latitat: hinc ascendentes ad externu[m] latus *Columb.*
 carnosiores k redditu[m] processibus transuersis verte- *i Carnosum,*
 brarum lumboru[m] inferuntur k, ac omnibus pro- *Vesal. nervo-*
 cessibus transuersis vertebrarum thoracis, sensu[m] ab *sum. Fallop.*
 vndecimā ad primam angustiores redditu[m], vñu[m] ner- *k Triplex in-*
 uosum tendinem internā sede, instar ansulæ cuiusdā *sertio 1. tendi-*
 nervosæ [tab. 6. M. M.] oblique versus exteriora sur- *nib. partes in-*
 sum expansos largitur, quemadmodum sacro lum- *costas omnes*
 bi ab exteriori sede costis singulis tendinem offere- *inferuntur, uti*
 bant; & aliquando in primam vertebra[m] thoracis l, *& subsequen-*
 aliquando à processibus discedens, & ascendens in *tes & thoracis*
 os temporu[m] supra mammillarem processu[m] desi- *proprij inseru-*
 nunt. His internā sede propter carnosæ partis cras- *tur, aliquando*
 sitiem & nervosæ tenuitatem, secundum ipsoru[m] lon- *in octo tantum*
 gitudinem sinus cuilibet, quasi insculptas [tab. 7. inter *costas. 2. aliis*
 8. & a] quo dorsi musculo tertio, Sacro dicto, locum *tendinibus in*
 præbeant. His simul contractis dorsu[m] & lumbi *omnes pcessus*
 recta *transuersos ver-*
tebra thoracis.
3. in spinas ver-
tebrarum eius-
dem thoracis à

Yyy 5

recta

tantum usq; ad tertiam sine nervoso. Fallop. obseru. 1 Vesal. Sylu. ad caput usq;
 in temporale os, & hanc partem Vesal. cum masculis capriuis confundit. Columb.
 omnes cervicæ vertebra[s] decurrentes à sese abduci insiguntur in ossa Lapidea, Arch.

in Vniuersum
dorsum & ca-
put etiā ad po-
steriora flectit,
& ut mole cor-
poris semicir-
culi figuram i-
mitari possi-
mus. Columb.
Archang. cer-
uicem totā &
dorsum ad po-
steriora flectit,
Laurent.

n 7. Par dorsi,
Vesal. Plater.
Par dorsi. Fal-
lop. obseruat. 3.
par dorsi, Co-
lumb. Arch.
(cui & lumba-
res exteriores)
Laurent. 3. par
lumborū Sylu.
seu extenden-
tium 2. Sylu.
o Vesal. Plat.
Lumbos fle-
ctunt, Colum.
Lumbū in po-
steriore curuāt
non curuato
thorace ac dor-
so, Archang.
p 8. par dorsi
Vesal. 4. par
dorsi Columb.
Arch. cui &
dorsales dicun-
tur, duo paria
habet Laur. 4.
à transuersis

recta m extenduntur : at alterutro tantum contra-
cto, spina in latera extenditur cum fibras obliquas
obtineant.

II I. n Par : sacri [tab. 7. 4] prædictis subiecti ab
ossis sacri parte exteriori, ubi ipsi spina cum osse iliū
connectitur, acuto initio [tab. 7. 5] ambo contigui
exorti, quemadmodum etiam à transuersis proces-
sibus & spinarum radicibus vertebrarum lumborū,
[tab. 7. 6.] vel si mauis, dicas cum Fallopio, hos
ascendentes à processibus hisce, variis principiis au-
geri, quemadmodum etiam à vertebris thoracis, &
quidem triplici, imo elatiore, à cuiuslibet processus
transuersi extremo, altero inferiore, quasi ab eiusdē
processus radice: tertio à spinis singularum vertebra-
rum, ita ut tria musculorum genera simul mixta ef-
se videantur, vno exteriori longioribus fibris, alte-
ro interiore, fibris breuioribus, tertio ad huc bre-
uiore, quod à spinis ortum est : & sensum lati redditi,
in duodecimā, aliquando vndecimā vertebræ tho-
racis spinam graciliores redditi, acute terminantur,
& horum fibræ obliquè sursum versus interiora fe-
runtur: Hi si simul agant, fibrasq; contrahant, totam
spinæ partem cui committuntur^o, extendunt: at si
vnus solum agat, dorsi partem in obliquū extendit,
lateralemq; inuolutionem in semicirculū parit.

IV. p Par : Semispinati [tab. 4. 5. 6. 7. 8] à spina
duodecimā, aliquando, vndecimā vertebræ tho-
racis principio acuto exorientes sursum exporrecti
paulatim crassescunt, carnei q; redduntur, potissimū
ad spinam quintę vertebræ thoracis, & omnes spinas
vertebrarum thoracis nervosis fibris intertexti am-
plexantur: mox rursus attenuati in spinā primæ ver-
tebræ thoracis fine acuto finiunt. Et hi rectas fibras
potis-

processus 1. 2. & 3. thoracis vertebr. orti, in transuersas apophyses omnium fere ver-
tebra-

robustissimum obtinent. His musculis, quemadmodum
& à præcedenti pari spinarum intervalla opplentur,
& ibi inuicem contigui sunt, & nihil præter ligamen-
tum membraneum à superiori spinâ in inferiorem
porrectum intercedit. Horum munus spinas, quib.
inferuntur, colligere, & dorso partem, cui adnascun-
tur, seu dorsum proprie dictum, cum reliquis mus-
culis, immotis & lumbis extendere seu erigere: alter-
utro agente, in latus mouere: omnibus vero octo
inul in actionem concurrentibus, dorsum totum re-
ctum detinere. Quod si quatuor agant simul, ut unus
scilicet, alterum subsequatur, in semicirculum mo-
uent: agentibus autem musculis, qui ex altera dun-
taxat parte sunt, corpus in latus voluitur.

tebrarum cer-
uices feruntur.
s. par à spinis
vertebrarum
thoracis orti,
in spinas ferè
omnes cervicis
inferuntur:

Hæc ille.

q Archang.

Laurent.

r Vess. thora-
cæ exigere Co-
lumb. dorsum
proprie dictum
curuate, Ar-
chang.

DE LIGAMENTIS CAPITIS, & vertebrarum & thoracis.

C A P. X.

De ligamentis vertebrarum agitur 13. vs. part. 4. & 3.

CV M capiti cervicis vertebrarum primam [tab.
17. fig. 5. lib. 2. A B C.] committi necessum fuerit,
deinde natura ligamentum membraneum, quod
totum articulum ambit, robustum & crassum [E E E]
creavit, quod capiti primam vertebra[m] utrinque
in occipitio nequit, à cuius basi exoritur, & quo
firmius stabiliusque sit, Natura in pueris occiput
multifidum creavit: hoc autem validissimum esse
debeuit, cum articulatio hæc nullam luxationem pa-
ciatur, siquidem talis lethalis sit: quare hic ligamenta
validiora, quàm cetera corporis nostri, quib. arcte cō-
nectitur, ut harum luxatio difficilima sit; quare prima &
secunda vertebra frangi facilius, quam luxari potest.
Alterum vero est: quod vertebra[m] secundam capiti copulat,

a Inter primam
& secundam
vertebram non
figitur, ut non
nulli sunt opi-
nati, sed orbicu-
lare vinculum
est, & utrinque
circumquæritur
validissime ad-
heret, ante, re-
tro, & ad late-
ra, Columb.

vali-

validissimum & teres [I] cartilaginem æmulans, quod ex densis vertice [H] enatam occipitis ossi ad magnum ipsius foramē infigitur, quo vertebram occipitio colliget, & vna cum dente velut axem efformat, secundum quam caput in gyrum agitur. Tertiū ligamentum est transuersum [K] ipsi denti obductum, ipsiusque posteriorem sedem ambiens, quod ex latere interno vertebræ primæ prodiens, alteri eiusdem vertebræ lateri validissime implantatur, quod robustum est, & cartilaginæ naturæ ne in capitis motibus vehementioribus dens ex sinu suo luxetur, sicque spinalem medullam, quæ illac transit, comprimatur aut frangat.

Quartum ligamentum [FF.] est quod primam vertebram [A B C.] secundæ [D] iungit, membraneum quoque est, & eiusdem cum aliorum articulorū ligamentis membraneis naturæ & vsus. De ligamento maxillæ inferioris cum ossibus capitis, quemadmodum de ipsis hyoidis, suo loco diximus.

Vertebrarum quoque corpora inter se ligamentis colligantur, ita ut duarum corpora, anteriore potissimum parte, & in lateribus iungantur, & quidem primum ligamentis communibus validis & mucosis: humiditas enim crassa ac viscosa circumfusa similis ei, quæ per alios propemodum omnes articulos dispersa est, quo expeditius partes moueantur: hæc ligamenta vertebrae ambiunt, & per totam longitudinem dorsum valide connectunt, ne dum dorsum curuatur, periculo subiectum sit, vel gibbus generetur [tab. 16. lib. 2. fig. 6.]

Alterum ligamentum ^c cartilaginofum est, quod

b 13. *Vsu partium 6.*

c *Gal. de ossib. 8. cartilaginem vocat, & quæ vertebrae invicem haud colligari contra anatomicorum, qui eam præcesserant, ententiam asserit: voluit enim ipsas committi tertia*

cor-
spinalis medulla tanica, quæ inter vertebrarum corpora se insinuat, quæ membrana est vertebrarum foramina omnia succingens, & quæ à periostio solâ crassitie differt. Vesal. Idem & Columb. habet, Galenumq; reprehendens addit, quo pacto illet verisimile videri poterat. Vertebrae ossa non parva à tam exigua membrana continari posse.

corpora ipsarum, vti coniunguntur, intercedit, eaq; validissime connectit [*tab. 16. lib. 2. fig. 6. ch. 5.*] quod cartilagineum, fibrosum, & mucosum est, extrinsecus crassum, versus medium attenuatum, & corporis vertebræ figuram refert, illiusque amplitudini respondet, & cartilaginem inter vertebrae mediam desinet. Sic etiam processuum vertebrarum articulos, ascendentes cum descendentes ligamenta membranæ communia colligant.

Musculos quoque, qui vertebrae adnascuntur, sustinent, & intervallis processuum vertebrarum inferuntur, tam transuersorū, quæ membranæ sunt, quam posteriorum inter ipsorum spinas & radices, quæ in spinarum apicibus adeo crassescunt, vt ad apices simul coeuntes, velut vnum ligamentum per spinarum longitudinem ductum forment.

Insuper ligamentum quoddam priuatum, subflauum ex vertebræ foramine sede internâ, ad radicem processus posterioris, inter duos ascendentes aut descendentes processus exoritur, quod in vertebræ subsequenti sedem eandem inseritur.

Verum in canum ceruice ligamentum occurrit, raram, robustum tamen & flauum, quod in fibras nullas dissolui potest, quod ex apice spinæ septimæ vertebræ ceruicis enascitur, & ascendens nullique connatu secundæ ceruicis spinæ apici infigitur; in ouibus verò occipiti connascitur. Quod in animalibus onera dorso ferentibus crassissimū^d est: ad dorso firmitudinem, & solum inter corporis ligamenta, tanquam esui ineptum reiicitur, & à nostris Waldenwachs dicitur. Hoc prompte in fibras dissoluitur, ne vertebræ ceruicis suo loco excidant, cum laxè admodum articulentur, & processus oblique

*d Bruxellensis
à robore vasti,
nuncupât: qui
huius esum
puellis ad co-
mam prolixio-
rem concilian-
dam commen-*

agan-
*dant: hinc, opinor ipsas ridentes, quod velut in flauam pallidamque comam
prompte dissoluatur, Vesal.*

^c Quale Galenus hominibus fere in lib. vj. par. tribuit, Vesal.

agantur: in quibusdam animalibus secundum dorsum longitudinem vtrinque; vnum secundum spinas inter musculos, dorsum mouentes, occultatum.

Thorax quoque sua ligamenta habet, cuius articuli omnes iunguntur ligamentis membraneis communibus eos ambientibus; sic costæ cum vertebra colligantur, validis & cartilagineis fere ligamentis, potissimum in primâ & secundâ costâ, propter onus, quod sustinere debent; sic & duodecima, cum hæc processu transuerso non sustineatur. Eadem costæ, cum sterni ossi cartilaginibus intercedentibus, ligamentis iunguntur: ipsa vero sterni ossa cartilagine tenui & pertinacissimâ intercedente duplicique perioestio obductâ connectuntur.

DE MUSCULIS CUBITI.

CAPUT XI.

^a Musculi amplexatorii, & cubitorij in amplexu cubiti mientes: facit autem amplexorios triplices, scapularios, humerarios, & cubitarios, Archang.

DE his Galenus 2. vsu partium 5. 1. adm. anat. 11. Et lib. de dissect. muscul. 20.

^b Galenus motum quoque obliquum tribuit, quem nunquam in homine reperiri asserit Columb. Non enim cubitus recta primum,

CUBITVS, qui secundam manus partem constituit, & ossibus duobus, cubito, seu vlnâ & radio constat, diuersos motus habet; quare alij cubiti, alij radij musculi sunt. Cubitus motibus duobus agitur, flectitur & extenditur ^b rectâ. Radius verò motus, manû vel pronam vel supinam reddit, sed de cubiti motu primo, qui musculorum quatuor ^c beneficio absoluitur, qui cubiti dicuntur, non quod in cubito siti sunt, sed quod eum moueant, Hi enim ab humero & scapula exorti, humeri sedem occupant: duo quidem flectentes sedem internam

dein in alterum latus inclinans flectitur, ac dein vtrisque simul recta flexio & insuper singulis priuata ad latera flexio tribui debet, Vesal. c. 4. Syll. Columb. Fallop. Archang. Laurent. 5. Vesal. Plat.

nam seu anteriorem: duo ^d extendentes externam seu posteriorem: at qui in cubito locati sunt, partim radio, partim brachiali, partim digitis mouendis inferuiunt.

L. ^e Flectentium Biceps dicitur [*tab. 8. fig. 1. 2. 3. & 9. fig. 1. & 2. A.*] quod principio gemino & validissimo inuicem tamen distante, (vt neruum brachij & musculorum in humerum insertionem transmittat) à scapula oritur, quæ tamen à Deltoide teguntur, [*tab. 8. fig. 1. M. at fig. 3. N. deteguntur*] hincque in humeri parte interiore situs est, & in musculosis etiam ante sectionem sub cute conspicitur: horum principiorum alterum exterius est [*tab. 9. fig. 1. n.*] nerueum ac teres, à superiori supercilio acetabuli ipsius scapulæ pronatum, quod sub ligamentis articuli humeri, & supra humeri caput per eius fissuram, huius tendinis gratiâ exsculptam, defertur; alterum [*tab. 9. fig. 1. o.*] partim nerueum, partim carneum illo ^f latius, à scapulæ processu anterioris simili supra humeri caput delatum, paulo infra eius caput cum altero vnitur [*tab. 9. fig. 1. & 2. p.*] & musculum, crassum, validum, liuidum ac ferè teretem, fibrisque rectis donatum constituunt. Vtrumque portio carnosæ in humeri medium, vbi os aperitatem priuatam nanciscitur, ad eius eleuationem inferitur: tandem ab humero abscedens, aliunde musculū conscendens, teretis carnosiq; musculi figuræ præ se ferens paulò supra cubiti articulū neruosior redditus in tendinē robustū, crassum, teretē, neruosum finit, & in radij ^h eminentiam interiorem

^d Tres extendentes Galen. Vesal. Plater. addit Vesal. si ad minimum numerum referantur, aut duo aut unus erunt: at in canibus & simiis caudatis tres extendentes necessario recensentur.

^e Cubitum flectentium 1. & anterior, Vesal. cubitum flectentes 1. Columb. Fallop. Archang. interior & latior 1. Plater. biceps Laur. il pescetto Italis, Colum. 1.

^f Et si Galeno 3. adm. anat. secus videatur, Vesal.

^g Videtur conuenientibus distinctus musculus, qui hu-

huius

et illum versus pectus trahens, Columb. huius portionis meminit, Vesal. Columb. Laurent. non autem Fallopius, nec Archang. At ab Arantio pro octauo humeri musculo proponitur.

^h Vesal. Columb. Laurent. hic addit, non cubiti, vt sentit vulgus, in cubiti longam cavitatem, Archang.

huius insertionis causa creatā, modice dilatatus inseritur, & articuli ligamento nonnihil adnascitur [tab. 9. fig. 1. q.] hic, quemadmodum & secundus fibras rectas obtinet, quare cubitam cum sequenti rectissime i flectit.

i Siue ambobus
nam, siue seorsim
singuli contrahant, Vesal.

cubitus recta
etiam flectit sursum, Archang.

k Cubitus
flect. 2. seu posterior, Vesal.

cubitus flectent.
2. Colum. Archang. cubiti
musculi interior,
profundior,

Plat. Brachiaas, Laurent.

l Ab interiore
parte humeri,
Archang.

m Mihi unus
principij loco
haberi finito
ne omnibus
torum musculorum
exortibus prater
more plura
principia cogar
tribuere, Vesal.
duobus ex
ortibus, Plat.

II. k Flectentium seu Brachiaas [tab. 8. fig. 2. 3. 4. tab. 9. fig. 1. 2. 3. B.] praedicto subiacet, quo breuior est, totusque carnosus exigit, & mediam inferiorem humeri longitudinis sedem, proxime amplexatur, illique adnascitur: hic ab osse humeri ea sede, ubi humeri muscoli inseruntur, prope medium longitudinis humeri latere exteriori principio carnosus, quod m bicornis est [tab. 11. fig. 2. 3. V] Et in medio angulum obtusum exprimit, enascitur; mox crassior redditus, humeroque validissime adnatus, deorsumque latus, cubiti articulum, anterieus carnosus integit, montis speciem refert, & amplius carnosusque in cubiti ac radij partem anteriorem & articuli ligamentum validissime infigitur [tab. 11. fig. 2. G. f. 30.] ut cubitus n rectissime flectat

III. o Seu Extendentium primus siue Longus [tab. 8. fig. 2. 3. 4. tab. 9. fig. 1. 2. 3. & in aliis fig. C.] per humeri posteriora carnosus, fibris rectis donatus, defertur: hic principio valido latoque partim carnosus, partim neruoso ex humiliore scapula costā nonnihil sub illius ceruice ubi sinum peculiarem obtinet, exortus, carnosus recta deorsum ad humeri latus internum descendens ei connascitur, vel potius q portione carnosus [tab. 11. fig. 1. λ.] ex humero ena-

n Galen. 1. adm. anat. cubiti flexionis in exteriora inclinantis auctorem esse censuit; at Archang. cubitus recta flectit introrsum. 1. & 2. successiue agentibus cubitus introrsum flectant in dimidiatum orbem. o Extendentium primus Vesal. (quem cum Galeno diuisit extendentium 1. & 2. constituendo.) Fallop. Archang. Laurent. cui & longus. 3. cubiti musculus Colum. & Plat. p Neruo prorsus principio, Vesal. Platon. Archang. q Huius meminit Vesal. Extendentium. 2. faciens, Fallop. non autem Col. Archang. Laurent.

ta, veluti altero principio augetur, ipsique robur addens miscetur: quâ ad auctas, recta deorsum fertur (portione carneâ ad finem vsque, humero adnata) & partim nervosus foris, partim carnosus intus, in posterioris^r cubiti processus (siue olecrani) latus internum inseritur, hic cum sequenti^f recta extendit.

IV. ^r Seu extendentium secundus siue brevis *tab. 8. fig. 4. tab. 10. fig. 1. & 2. D.*] qui externam sedem posterioris humeri regionis occupat; hic à ceruicis humeri sede posteriore principio nervoso exoritur, qui^u carnosus redditus, priusquâ humeri longitudinem mediam superarit, cum prædicto ita miscetur, vt ad insertionem nullo modo separari possit, sicque vnus^x videatur, seu vnum corpus ex tribus musculis compactum, cum tamen duo reuera sint, hic tamen in processus^y posterioris vlnę latus externum, partim carneus, partim nerveus, potissimum parte ea, cui innitimur, validissime inseritur [*tab. 3. fig. 4. x. tab. 10. fig. 1. & 2. x.*] Hic quoque cum tertio fibras rectas obtinet, quare & cubitum recta extendunt^z. Verum in canibus & simiis caudatis & aliis, quæ anterioribus cruibus innituntur, tres musculi extendentes valde conspicui, præter vnum gracillimum^a in simiis caudatis à scapula ad vnam porrectum.

Sic ergo in his cubiti musculis ipsorum actio primaria euidens est, quæ est contraria, & secundaria, quæ est relaxatio: flectentibus enim contra-

Zzz

ctis,

vnus loco habueris, Vesal. pro vno numerare & rursus in plures diuidere possumus, Fallop. instit.

y In exteriorem tum radij, tum cubiti partem, vbi oblonga quadam cauitas est impressa, Archang.

z Cubitum extendunt, recta simulque deorsum. Archang. 3. & 4. munus cubitum recte flectendi, Columb.

a à Galeno prætermisus. Vesal.

r In radij exteriorem partem vbi cauitas quadam veluti inusta apparet. Archang.

f Recta simulque sursum extendit, Archang.

t Extendentiū 2. Fallop. Archang. Lauren. cui & breuis. Extendentiū 3. Vesal. 4. cubiti muscul. Columb. Plater.

u Duobus initius à ceruice humeri, Columb.

x Vnius loco recenseri possunt, qui ex

3. principiis conformatus sit, aut duorum, si primū & secundum

TABVLA VIII. *Figuris quatuor muscu-
los aliquot humeri, cubiti, carpi, radij, &
digitorum manus proponit.*



ctis, extendentes relaxantur, quo cubiti inflexio fiat. Sic extendentibus contractis, flectentes laxantur, quo cubiti extensio sequatur, quæ motu solum recto perficiuntur; vt per accidens ad humeri motum. Cubitus etiam in latera & in gyrum mouetur.

DE MUSCULIS MANVS

Extrema.

CAPVT XII.

De his vide lib. 1. & 2. de vsu part. apud Galenum.

a Galen. manus admirandam compagē perpendens, & quod sit instrumentū instrumentorum, de manu primū, egit in libris de vsu partium. Columbus de musculis manum summam mouētibz potestremo egit, qd illarum (aut) compago miraculi instar esse videntur, vt sic memoria magis inhaereat: suadet etiā, vt in scholis dum secantur corpora hic ordo seruetur,

CVM manus actio^a propria sit apprehensio, apprehensio autem motus sit, à voluntate nostra dependens, idcirco musculis, motus voluntarij instrumentis, indiguit, qui & manum totam, & digitos mouerent. Quare manum mouentes muscoli duplices sunt, alii qui totius manus motui præsumunt, alii qui digitos solum mouent, illi duplices sunt, alij enim carpum seu brachiale, vel extendunt vel flectunt; eodemque motu & manum agunt: alii radium mouentes simul & manum vel pronam vel supinam reddunt: hique muscoli cubitum occupant, partim eius partem internam, partim externā. Huc referri potest is, qui cutim volæ manus mouet. Qui vero digitos mouent, eos vel extendunt, vel flectunt, vel in latera mouent, scilicet abducendo adducendo. At quia pollex solus toti manui æquipollere debuit, idcirco inflexione & extensione peculiare, quid à ceteris digitis quatuor, qui motum similem habent, obtinet; quare musculos peculiare obtinuit, quemadmodum & ceteri suos habent,^b quorum alii in

tum quia hi muscoli diutius incorrupti seruentur, tum quod dum viuimus, hos musculos magis exerceamus, tum quod minus pinguedinis contineant. *b Galenus 1. adm. anat. 5. & 6. hos musculos in internos & externos diuisit, quem Columbus imitatus,*

lij in cubito siti sunt, alij in metacarpo, alij in vola manus. Rursus cum alia sit articulatio in primis articulis digitorum quinque, & in secundo pollicis quam in secundo & tertio quatuor digitorum, & tertio pollicis. Cum illa per ginglymon iungantur superiore osse in sinum suum, inferioris ossis, tuberculum excipiente, & osse inferiore suis sinibus ossis superioris capitula recipiente, huic articuli hi motum simplicem tantum obtinent, qui sola extensione & flexione, siue declinatione in latus, absolvitur ab quatuor digitorum prima ossa & pollicis primum cum ossibus illis, quibus sustentur articulatione coarctentur, non solum flectuntur & extenduntur, sed etiam ad latera inclinantur, dum ad pollicem adducuntur, aut ab eo abducuntur.

In summa manus mouentes musculi quadraginta sunt: carpi quatuor, radij quatuor, volæ manus tres aliquando quatuor: digitorum viginti nouem, & horum alij in cubito siti sunt quia magni esse debere, horumque tendines tantum ad digitos mittuntur, quod si in manu locati forent, tum infarciendo eius motum impedirent, alij vero in manu

Zzz 3

siti
pollici, quatuor minimo

digito, reliquorum unicuique tres opem ferant, unusque lato tendine. Vesalius brachialis 4. radij 4. digitos mouentes 28. flectentes nimirum 20. extendentes 8. At Fallopio totidem brachialis, radij & digitorum, sed 8. tantum flectentes & 20. extendentes dicit, nam lumbricales 4. & metacarpi 8. quos Vesalius flectere voluit, extendere dicit Fallopius. Archangelus musculos manuum mouentes apprehensorios vocat & diuidit in interiores 8. & exteriores 9. qui omnes à partibus, qui manus compositionem non ingrediuntur, oriuntur, & alios natos à partibus manuum componentibus, & in eam terminantibus, qui ut plurimum sint 21. Sequitur enim Columbum. Laurentio radij 4. carpi 4. digiti 26. Alij flectentes tres palmaris, sublimis, profundus, alij extendentes quam plurimi, quos Syuius pro unico numerant, & digitum tensorem vocat, qui impares 4. diuidi potest: alij adducunt digitos, lumbricales 4. alij abducunt interossei sex non 8. Sic pollicem flectit vnus, extendunt duo, adducunt tres, abducunt totidem & minimi digiti tres aut quatuor.

siti sunt. Horum nouem flectunt, duo quidem digitos quatuor, septem verò ipsum pollicem: alij extendunt viginti numero, sedecim quidem digitos quatuor, inter quos lumbricales quatuor & interossei octo recensentur: quatuor vero pollicem extendunt, idque vel simpliciter extendendo, vel adducendo, vel abducendo, quorum tendones in ossis ^c mouendi articulum infiguntur. Sed de musculo palmari, cum is inter secandum primo occurrat, agamus.

*DE MUSCULO PALMARI,
cum duobus aut tribus à panniculo car-
noso prodeuntibus.*

CAPVT XIII.

Vide apud Galen. 2. vsu. part. 6.

*a Musculus
media vola &
interna digi-
torum sedis
cuti subnatus,
Vesal. 1. musc.
interior ma-
nus, qui mus-
culi verā for-
mam refert,
Colum. & Ar-
zhang. late e-
stis chorde mu-
scul. Fallopius
obseru. musc.
cutis manus
vola, Plat. di-
gitos flectens*

MVSCVLVS omnibus summæ ^a manus mu-
sculis interioribus superstratus [*tab. 8. fig. 1.*
& *2. tab. 9. fig. 1. E.*] & in cubito situs neruosus est ac-
teres ab humeri tuberculi interni apice acuto, ner-
ueoque principio prodiens, & medio ^b duorum mu-
sculorum carpum flectentium [*tab. 8. fig. 1. Δ ⊙.*] &
ex eodē tuberculo prodeuntiū, incumbens & adna-
tus, illico carnosus ventre tamen exiguo redditus
antequā ad cubiti medium deueniat, nonnihil ob-
lique delatus, denuo attenuatus gracilisque reddi-
tus, in tendinem, rotundum, angustum primum
& longum [*tab. 9. fig. 1. μ.*] desinit, qui carpi liga-
mentum internum supergressus sub cute transit, &
ten-

primus, palmaris. Laurent. musculum à quo latas tendo dilatatur, ego primus
obseruaui, Columb. lib. 8. cap. 5. ^b Non in illorum capitum medio repositus, ut
alij scribunt, Vesalius. ^c Non decuit magnum esse cum nullius ossis mutui pra-
fici, illum credamus, Vesalius.

tendo in vola ^d dilatatur. attenuatur, & cuti sub-
nascitur; ita tamen vt cuti, quæ musculos in pollicis
monte [tab. 8. fig. 3. sub p.] & qui paruum digitum à cē-
teris abducunt [tab. 8. fig. 1. & 3. S] integit, non sub-
tendatur tādē ad digitorū extremā aciem nexi-
bus adeo fibrosis & validis iungitur, vt cutim manus,
à tendinis neruosa tenuitate, licet^e pinguedo vel sub-
stantia similis intercedat, liberare vix possis.

Huius vsus cutim ^f volæ in apprehensione rerum
firmiter corrugare, ne cutis facile moueatur, & sic
minus exacta, tutaque rerum comprehensio fiat:
forte etiam quo cute reliqua totius corporis sensu
exactiore prædita sit, non quod sensus huius ten-
dinis beneficio manui contingat, sed neruorum
quatuor, qui ad singulos digitos feruntur.

Musculum hunc geminum ^g in vtroque brachio
ab eodem loco exortum ter aut quater Fallopius
obseruauit, quorum vnus in tendinem latum desi-
nebat: alter in ligamentū transuersum carpi infere-
batur. Contra Vesalius ^h non semel, quo ad partem
carnosam defuisse ostendit, ac portionem tendi-
num carpum flectentium [tab. 8. fig. 1. Δ Θ] prius-
quam carpum ascendant in tendinem latum abiis-
se; nonnunquam à ligamento transuerso [tab. 9.
fig. 1. V] interno, tendinibus carpi obducto, tendo
producitur.

Z z z 4

Præ- Fallop. instit.

vola media tantum ^g digitorum interna regioni nonnihil. Plat. sub omnem cutem
manus interiorem ad primum ossis articulum tendinem diffundit, Laur.

^e Non citra alicuius interuentum, vt ex Galeni locis nullis colligi potest, nam
adeus plurimus continetur, imo ^g canes plurimū obtinent, Ves. ^f Vesalius: hac
ipsius utilitas fertur, Fallop. in instit. vsus digitis flectendis auxiliari, & vt acuto
sint sensu, Columb. ad flexionem manus opitulatur maxime ad cauam manum ef-
ficiendam, cum post brachialis ossa cutem ipsis adhærentē trahendo simul colligat,
cuius munus ipso absente brachialis musculi, qui hac tendines mittunt, obeunt,
Plat. digitorum, 4. prima ossa flectit, Arch. ^g Geminus à Vesalio repertus Plat.

^h In quibusdam furibus ac latronibus, licet tendo adesse à ligamento brachia-
lis interno exortus, Columb. interdum abest, Plat.

d Gal. toti de-
pili manus cu-
ti subnasci ar-
bitratus est ve-
rum tendo me-
dia vola cuti in
palma totum
subnascitur, nō
autem cutim
contingit ob-
ductā musculo
paruum digitū
abducenti, nec
musculo primo
pollicis articu-
lo incumbenti,
nulla etiā por-
tiones in digi-
torum altera
excurrūt, Ves.
per volam ex-
tenditur reli-
ctis duob. mon-
tibus maiorib.
detectis postre-
mo in quatuor
digitos inseri-
tur, Colum. &
Archang. ad
extremos digi-
tos obnascitur
pertinaciter,

i Ab Antio-
cho Tiburtio
Luna mons
vocalur, Fal-
lopius at Ar-
chang. Mar-
tus nominat.
Columb. &
Plat. Vene-
ris.

k Horū men-
tionem nulli
ex antiquis a
natōmicis se-
cēre, Fallop.
insit. horum
inuentor, Ioan.
Baptist. Co-
nanus: primus
autē Valuer-
da publicis
scriptis com-

mendauit, sed vnum tantum musculum esse & ad extensionem factum dicit,
cum potius cutim illius partis corruget, quam quod extendat, Fallop. obseruat.
Primus externa manus musculus, paruus transversus, supra veneris montem po-
situs, à membrana carnosa exorīens, fibris carnosīs refertus in tendinem latum
inseritur, quem dilatant, quem neque ex veteribus quisquam, nec Ves. mouit.
Columb. idem fere, Archang. qui r. muscul. à manū orū nominat, & duos
montes Martis & Veneris leuiter astringere statuit. Caro quadam ex musculis
constans, monticulum Veneris efficiens. Plat.

DE SVBSTANTIA CVTIM VO- le manus & digitorum eorumq; tendi- nes intercedente.

CAPVT XIV.

Galenu. i. vsu part. 7. carnem vocat. vide & 13. & 18.

CVm inter tendinem & cutim volæ manus & di-
gitorum regionem internam substantia qua-
dam

dam carnea adipi similis reposita sit, pauca de ea dicere conuenit. Hæc ad carnis genus referri debet, siquidem per eam & fibræ nervosæ frequentes & venæ capillorum modo tenues per eam disseminantur & etiam in extremè emaciatiss huius portio aliqua semper reperitur: quare Galenus carnem vocat; colore tamen subalba & duritie sua ad adipem accedit: hæc autem ab ossium nervosarumque partium accumbentium tactu durior efficitur, quare & adipi qui ossium articulis apponitur similis videtur. Hæc substantia tanquam stratum aliquod existit, nervorum propaginibus quæ à nervis maioribus ob sensum tactus exquisitum per manum internam dispergidebuere. Reperitur quoque inter tendines digitos flectentes & cutem eorum ne dum corpora duriora apprehendimus tendines aut premantur aut externis contundantur: quare & cuti plantæ pedis copiosè apponitur: paucior tamē est circa articulos ne eorum motum impediat, maxime eorum in angulos acutos flexionem. Sic & digitorum lateribus aliqua apposita est, quo spatia media, quæ ob articulorum tubercula vacua mansissent, repleat, non tam ornatus causa, quam ut manus digitis adductis ab hac substantia oppleatur, ut si quid liquidi manu continere velimus, cyphumque Diogenianum efformare, id non elabatur. Denique substantia hæc digitis summis utilis est ad commodiorem apprehensionem, quemadmodum cap. i. huius libri monuimus: ossium enim extremis si nihil appositum foret, quod in apprehensione cederet, facile fracta fuissent, plurima etiam apprehendere nequiremus, quæ huius substantiæ & vnguium renitentium beneficio absoluiamus.

Arabes hanc substantiam extra musculi corpus carnē simplicem esse affirmarunt, illorum modo qui nescio quā simplicē carnem in gingivis ac pene collocant, Vesal.

DE MUSCULIS DIGITOS quatuor flectentibus.

C A P. X V.

De his & sequentibus egit Galenus lib. de diff. muscul. 21. & 22. item 2. usu part. à cap. 2. ad 6. 1. adm. anat. 5. 6. & 9. 2. de mot. muscul. 2. & 3.

a 1. digitos
mouens; Ves.
Fall. Plat. A-
rantio; 2. digi-
tos flectens si-
ue sublimis,
Laur. 4. ma-
nus interior
musculus, Co-
lumb. & Ar-
chang.
b Exortu ha-
bet admirabi-
lem nerueus
etenim acu-
tusq; nasci-
tur, Columb.

I. **F**LECTENTIVM [tab. 8. fig. 4. F] ab humeri
tuberculo interno, principio [n] tereti^b &
magno, ex carnea nerueaque substantia, mixto, sub
musculi palmaris [tab. 8. fig. 1. & 2. E] & duorum
carpum flectentium capitibus [tab. 8. fig. 1. Δ ⊙] ena-
tus, mox latior redditus per vlnæ & radij anteriorem
partem, mediam delatus, carnosus & teres redditus
antequam ad carpi radicem perueniat, venter ipsius
angustatus [tab. 8. fig. 3. o] in partes quatuor carno-
sas diuiditur, quæ singulæ in tendines exquisitè ro-
tundos, nerueos & pellucidos cessant: qui simul mē-
brana communi, tenui mucosa, quo tutiores pro-
grediantur inuoluti, sub ligamento annulari [tab. 9.
fig. 1. V] quod in carpo transuersum situm est, delati
ad digitorum quatuor, os secundum iuxta articuli
partem mediam longa sectione diuisis, quo suble-
quentis & subiecti musculi tendines, qui ad tertium
articulum ferri debuere, transmittantur & quo faci-
lius moueant & apprehendant, latiores redditi, pau-
lò post diuisionem in digitorum quatuor ossa secun-
da inseruntur: quæ^c sanè res admiranda spectatuque
digna, quod à natura prudenti factum, quo digiti or-
dine quodam sese consequantur & digitorum recta
inflexio

c Tertium,
Vesal. secun-
dario etiam
primum quic-
quid velit cō-
tra Galenum Vesalius, qui huic musculos in metacarpo stros ascribit, qui tamen
hunc articulum non flectunt sed potius secundum & tertium extendunt, Fallop.
in instit. sum. & primum, Laur. prim. an. digitorum phalangem non secundam
flectit, Arantius.

inflexio efficiatur. Dum verò digitorum ossa prima percipiunt, transuerso quoque ligamento obuoluntur quod ex ossis parte interna enatum canalem efformat, quo musculus huius tendo vnâ cum alterius subiecti muscoli, secundum digiti longitudinem securissimè deducatur, & ne sua sede à digito declinet, complectitur, ne contractus eleuetur potissimū quando secundum aut tertium digitorum internodium flectimus, aliàs tendines non incuruati, tanquam funiculi recti exurgerent, cutim attollerent: volamque implerent: quare ligamenta hæc, etsi tendines contrahantur, eos tamē ossibus quibus non infiguntur adiacere cogunt, & iter liberum per ligamentum velut annulum lubricum & læuem relinquit. Hic internodium secundum ^c primariò flectit, & secundariò simul & primum, dum in transitu mēbranarum & villorum interuentu ita firmiter alligantur mouet: cum huic primo articulo musculus alius ^d datus non sit.

II. ^c Flectentium [*tab. 9. fig. 2. 4. G*] priori subiicitur & toto ductu corpore & tendinibus ipsis ad insertionem vsque substernitur, hic paulo humiliter ab vnâ ^f processu parte eius anteriore exoritur [*tab. 9. fig. 2. n*] illoque validior est, siquidem huic motus maior maiorisq; momenti futurus erat, exactè carnosus est & latus, cubiti partem mediam occupans tum vnâ (à qua etiam robur acquirit) tum ligamento, quod vnâ cum radio iungit, & interiores musculos ab exterioribus separat, adnascitur; ybi verò ultra cubiti medium descendit, augustior redditus [*tab. 9. fig. 2. x. fig. 4. β*] in partes carnosas quatuor diuidit, quæ tunica neruosa teguntur, & sensim colle-

d Vesalius interosseos dictos in metacarpo primo inter nodio tribuit:

at Archang. a palmari 4. digitorum prima ossa flectuntur.


e 2. Vesal. Fallop. Plat. Arantio. 3. diguoz flectens sine profundus, Laurent. 5. manus interior musculi Columb. & Archang.

f Nascitur prope quartum sed maiori parte superiore

at ten-

viore interioreque cubito, Columb. & Archang. ab eodem exortus tuberculo, Laurent.

TABVLA IX. *Musculos aliquot cubiti, radij, & qui digitos flectunt, exhibet.*



Etæ tendines neruosos teretes, superioris musculi tendines perforantes, proferunt: qui per ligamentum membranosum transuersum ipsius carpi delati in vola singuli membranulis proprijs vestiuntur, quæ ipsis tendinibus fibrosis nexibus iunguntur: mox digitorum ligamenta singula subeunt & foramina seu diuisionem tendinum primi musculi [tab. 9. fig. 2. γ δ] transcunt, quo tertio internodiō, & latiores tamen redditi, implantari possint: & paulo ante insertionem in senibus ossiculum sesamoides reperitur, quod patellæ in genu vsu, formamque refert: quemadmodum enim primi musculi tendinibus ossicula sesamina innascuntur, sic alia secundi musculi tendinibus antequam tertijs ossibus inserantur.

g. Secundi digitorum ossis lateribus inseri voluit Galenus 1.

adm. anatom.

Sic etiam vo-

luit tendinem

unum ad pol-

licem tendere:

quod verum

in simiis, in

hominibus

nequaquam,

Columb. at 1.

vsu part. se-

cundi tendi-

nes primo qua-

Huius munus tertium articulum flectere: verum & duodecim articulationes contrahere videtur, quatenus in transitu tendines primæ & secundæ articulationi membranosis eorum ligamentis affiguntur: Si enim tertium internodium flectere velimus, etiam inuitis nobis reliquos curuare cogimur; nam tertia & secunda extensis & immotis primis flecti possunt.

DE MV-

tuor digitorum ossi implantatos asserit. h. Galenus & omnes Anatomici opinantur hunc 1. & 3. os flectere, cum tamen duntaxat tertij flexionis opifex, quemadmodum. 1. musculus secundi: cum nullus musculus primariō os mouere possit, nisi eidem inseratur, secundum Galeni axioma: at 2. musculi tendines primis ossibus ne obscurissimè quidem inseruntur, Vesal. 4. digitorum tertium articulum flectit & optime constringit, non quinque, ut Galen. lib. de vsu part. 1. adm. anatom. & lib. de muscul. voluit, Columb. tertium articulum flectunt, Fallop. instit. Archang. Laurent. etiam 12. articulationes insigniter contrahunt, Arantius.

DE MUSCULIS POLLICEM
flectentibus.

CAPVT XVI.

FLECTENTIVM pollicem [tab. 9. fig. 2. & 4. i] in cubito quoque situs est, & secundo quatuor digitorum musculo [tab. 9. G] adiacet, cuius cubiti cum humero articulo aliquantum continuus, totoque progressu cohærens: hic principio carnosio tereti ex vlnæ sede iuxta cubitum ubi radij capitulum recipit, pronatus, perque radium delatus cui vniuersa propemodum longitudine adnascitur, & ab ipso continuè principium ducit, quemadmodum et ab ipso ligamento^k membranoso [tab. 9. fig. 4. *] portionem acquirens, simul delatus ad carpum in tendinem teretem & nerueum definit, qui sub ligamento annulari carpi, cuius lateri attenditur cum iobus præcedentibus delatus, peculiarique membrana mucosa tectus, per sinum ossis carpi pollicem stinentis & huius tendinis causa insculpti intertendinosos, primum & secundum pollicis os flectens occultatus, ligamento transuerso, secundi ossis pollicis exceptus, in eius tertium articulum dilatatus, valide inseritur^l eumque flectit. Et hic musculus, secundi digiti flectentes crassitiem vincit, cum & pollex robore & mole cæteros superet: hicque musculus in simijs^m caudatis non reperitur.

II. Flectentium pollicem [tab. 9. fig. 1. 2. K] à ligamento annulari seu transuerso quod in carpo est [tab. 9. opifex, Vesal. cum secundo] etiam flectit, Arantius. ^m Qualem habeant ostendit, Vesal. ⁿ 12. dist. seu primus pollicem flectens, qui eum sequenti primo ossi famulatur, Vesal. 9. extrema manus musculus Columb. 9. à manu prodians seu pollicis 3. Archang. 4. pollicis musculus obliquus in vola elatior, Plat.

i Digitum mouens, Vesal. Fallop. Plat. Arant. 6. manus interior musculus, Col. & Archang. flexor pollicis quod unicus est, Laurent.

k Oritur à radio & ligamento illi adhaeret &c. Columb. Arch.

l Galen. & cæteri 2. & 3. pollicis ossis flexum moliri opinatur, cum tamen duntaxat 3. flexionis opifex, Vesal. cum secundo.

[*tab. 9. fig. 1. V*] sede superiore carneus enascitur, & pollicis ossis primi toti internæ regioni annectitur, carnosusque inferitur & secundum obscurè attingit.

● 13. digit. seu
2. pollicis, *Vesal. 8. extrema manus musc. Col. 8. à manu prodiens seu pollicis 2. Archang. 5. Fall. pollicis musculus obliquus minor, Plat.*

p Primus articulus in flexione ociosus, ideo nullus interna parte tendo applicatur, 1. vs. part.

17. *Galenus unicum musculum putauit, qui pollicem ab indice abduceret, eiq; validiorem motū & tendinem crassio-*

III. ° *Flectentium* [*tab. 9. fig. 2. & 4. L*] prædicto subijcitur eoque longè minor est: hic partim ex eodem loco, partim verò ab osse carpi pollicis subiecto exortus, in radicem primi ossis pollicis vsque ad medium inferitur. Hi duo p primum pollicis intermedium flectunt, & vna cum extendentium pollicem tertio carneam molem ad pollicis radicem repositam constituunt.

IV. ° *Flectentium* [*tab. 9. fig. 4. char. 1. 2. 3. hic musculus cum duobus sequentib. notatur*] ab osse metacarpi indici præposito origine tenui lataque exoritur: hinc carnosus progrediens & nonnihil angustior redditus, tendine membraneo in latus ossis secundi pollicis versus indicem inferitur.

V. ° *Flectentium* prædicto contiguus, similis est origine & carnosus, ex media sede ossis metacarpi, quod medio præponitur, prodit & parte aliqua os, quod annulari subijcitur, tangit, & carnosus redditus, tendine exiguo in medium secundi ossis pollicis parte interna inferitur.

VI. ° *Flectentium* à metacarpi osse annularem fulcien-

rem quam musculo 3. articulum flectente, perperam ascribit, *Vesal. hi tres motem Martis constituentes, Versus originem pollicem trahunt, eundem extendunt & procul ab aliis abducunt, Col. Archang. monticulum veneris constituunt tres adducentes ex osse carpi prodeuntes, Laurent. q 14. digit. Vesal. 6. Fallop. in instit. 2. pollicem mouens, Fallop. obser. 10. extrema manus musculus Columb. 10. à manu prodiens seu 4. pollicis, Arch. pollicis musculi tres obliqui in manus vola profundiores scilicet 4. 5. & 6. Plat. 1 15. digit. Vesal. 7. Fallop. in instit. 3. pollicem mouens Fallop. obs. 11. extrema manus musc. Col. 11. à manu prodiens seu 5. pollicis Archang. 1 16. Ves. qui hoc tres secundo pollicis ossi famulari statuit, qui licet in simiis, obseruentur, Galenum ignorasse, at Arabes agnouisse & duos qui primi pollicis ossis flexioni præsumt neglexisse, undecim digitos flectentes recensuisse, octo a digitos 4. tres ad pollicem referentes: fortè casu 11. loco 10. enumerantes, cum mu-
sculi*

fulciente, latiusculus oritur, & eodem loco ubi prior inferitur: nonnunquā etiam t̄nervoso principio ab osse metacarpi, minimo digito subiecto, ubi cum carpo iungitur, prodit. Hi tres muscoli sub linea vitali siti, principio sunt semicirculari & distincto, verum in vnum & eundem tendinem desinunt, qui semino ossiculo interno & inter eos qui circa manus digitos sunt maximo, attensus in latus secundi, ossis, eiusdē digiti inferitur. Et quēadmodum illi quos interosseos vocabim⁹, qui in metacarpo siti sunt, recta feruntur: sic qui pollicis primum os flectunt, nonnihil obliquē ducuntur: sic qui secundum pollicis articulum flectunt quodammodo transuersi uferuntur. Hi si simul contrahantur, pollicis internodium secundum volam versus flectunt; primo autē trium solum agente, pollex sursum indicem versus mouetur: si secundus ad medios digitos: si tertius, pollex deorsum & versus minimum flectitur.

VII. * Flectentium his tribus subiectus carnosus ab osse metacarpi, quod indici subditur oritur infra medium vsque ad iuncturam cum carpo, qui eodem modo quo tres dicti pollicis ossi secundo, iungitur, situm transuersum obtinens, spatiumq; quod inter pollicem & indicem est occupat. Huius munus pollicem versus indicem trahere & indici superponere. *sculos Oribasij more enumerent, Vesal. 12. extrema manus Col. 12. à manu ortus seu 6. pollicis, Archang. 4. pollicis, Fallo. obs. 8. Fallop. in instit. Fallop. obs. x 5. pollicis musc. Fallop. obser. quem anatomici prætermiserūt: & addit, cū quatuor hi vnicū tendinem habent, pollicem in eandem partem trahere & istorum motus per magis & minus differre, posse pro vno, aut pro 4. recenseri: Columbus pro 7. pollicis musculo recenset: Archang. 13. à manu ortus seu pollicis, 7.*


DE MUSCULIS EXTENDENTIBUS digitos quatuor.

C A P. XVII.


EXTENDENTIVM^a I. II. III. & IV. [tab. 9. fig. 2. n. n] qui lumbricales seu vermiculares à forma Aaaa dicuntur. *a Quatuor ultimi digitorū musculi sine 25. 26. 27. & 28. qui digitos ad pollicem adducunt, Vesal. quatuor extrema manus musculi qui à tendini-*

T A B. X. *Musculos aliquot humeri, cubiti, radij carpi & digitos extendentes exhibet.*

FIG. I.



II.



III.



IV.



tendinib. musculi qui tertium articulum 4. digitorum flectit, egrediuntur, Col. 2. 3. 4. & 5. musculus à manu exortus, Archang. quatuor musculi parui in vola hærentes, Fallop. adducentes digitos lumbrici 4. Laur. digitorum manus musculi recti quatuor, tendinibus secundi musculi adnati, Plat. b Ad digitorum 4. primū internodium eiusq; latus internū quo 4. digitos in latus ad pollicem inclinēt, Vesal. Plat. In tertium articulum immit-

tuntur, non in primum quemadmodum Galen. & Vesal. voluere, qui horum insertionem & usum ignorarunt, qui digitos pollicem versus adduci voluerunt cum tamen quatuor digitos extendunt, Columbus primus insertionem veram & usum ostendi, quamvis Valuerda in opere suo meminerit, in eo deceptus, dum vult musculos hos digitos extendere cum potius alteros & postremos articulos erigant, Fallop. obseru. ad digitorum partem superiorem perueniunt & terminantur propè ungues, quorum usus, digitos 4. extendere, Archang. obliquè ad externam tertij articuli partem inseruntur & digitos adducunt, Laurent. c Columb. & Archang.

d 17. digit. motor vel extendentium, primus, Ves. 1. manus exterior musculus, Col. Archang. 9. Fallop. 4. digitorum manus musc. Plat. digitorum tensor qui in partes 4. diuidi potest, Laur.

dicuntur & in vola hærent: hi secundi musculi, tendinibus, qui digitorū quatuor, os tertium flectunt, carnosi graciles, teretes, oblongi subiacent & à membranis (q̃ his musculis quæadmodum & oculi musculis cōmune est) digitorū, quatuor tendines obducuntibus, ad latus internum oriuntur & per digitos intrinsecus iuxta eorum longitudinem delati tendine nerueo & exiguo, tendinibus musculi sequentis, qui digitos quatuor extendit, adhærent: insertio autem circa primi articuli medium fit in secundum, b quare ipsis ad principia contractis, digitorum secundi & tertij articuli interosseis adiuuantibus, primario extenduntur, quamuis etiam per accidens vt maximo labore obliquis motibus conferre possint, extenduntur. Nam quatenus horū tendines in trāsitu ad digitorum exteriorem regionem cum ligamento laterali, primi articuli colligantur, possunt etiam primum internodium leui motu ad pollicem adducere, & cum sequentis c musculi tendines exterius siti sint, sicque periculo obnoxij, natura hos interius collocauit, quo exterioribus tendinibus incisis digiti horum ope extendantur.

V. d Extendentium [tab. 10. fig. 1. & 2. P. inferius, qui in fig. 2. propendet.] ab humeri tuberculo exteriore, principio ex carnea nerueaque substantia mixto [b] enatus, mox carnosior redditus, & parte posteriore

inter

inter cubitum & radium descendens, propè carpum
 [supra b] angustior redditus plerumque in tres, ra-
 rius in quatuor partes carnosas finditur & statim in
 tendines nerueos rotundos exquisitè, quo difficul-
 ter patiantur, abeunt, qui tamen ligamèto membra-
 neo, à radij appendice pronato, colligantur & vnâ
 per sinum^f in radij parte externa exsculptum ad car-
 pum feruntur: ne verò tendines hi aliquando sinu
 excidant, neue contracto musculo in altum exsur-
 gang, ligamento annulari [tab. 8. fig. 2. & 4. char. 3.] ob-
 uoluuntur: mox sub carpo à se inuicem recedentes,
 non amplius rotundi sed latiores reddit, cum os ex-
 terius nimis rotundum sit, vnus ad indicis alter me-
 dij, tertius annularis, internodium & secundum &
 tertium petunt & ad extremos digitos sub ipsis vn-
 guibus^h feruntur: hinc tantus dolor, si quid vngues
 & carnem intercedat: aliquando in duos tendines
 tantum diuiditur, qui indici & medio inseruntur.
 Huius munus trium illorum digitorum secundum
 & tertium articulumⁱ extendere. Et huius tendines
 longi sunt, nec musculorum ventres ad carpum
 producuntur, quia manum leuem simul & tenuem
 esse præstabat, quo omnia promptè agat.

VI. ¹ Extendentium [tab. 10. fig. 1. & 2. Q.] ab eo-
 dem tuberculo principio acuto & nerueo, gracilis
 longusque exortus, mox carnos redditus, cum prio-

Aaaa 3

read

id sequenti musculo seruiat, Vesal. g Fallop. radici primi ossis insigunt, & per
 totam digiti longitudinem ascendentes, medio exterioris trium ossium regionis ad-
 nascuntur, Vesal. finiuntur à primo vsque ad tertium articulum 4. digitorum:
 cum vero 3. tendinibus tantum pradius est, auricularem digitum dimittit. Co-
 lomb. & Archang.

h Hoc à nobis primo fuit animaduersum, Col. i Gal. 1. vs. part. 17. k Cum
 primum os auricularis, annularis & medio attigerint, bipartito scinduntur, for-
 tissimo ligamento suffulti, excurrunt per latera horum trium digitorum in exte-
 rimum vsque & 4. digitos extendunt & posteriores tres in latera contorquent, Ar-
 chang. l 18. digit. Vesal. 2. manus exterior musc. Columb. & Archang. 10. Fallop.
 3. digitorum manus musc. Plat.

e Galeno an-
 tequam car-
 pum conscen-
 dat in 4. ten-
 dines scindi-
 tur, horum v-
 nū primo digi-
 to quoque tri-
 buens cum tā-
 tum in tres
 disseceatur: dein
 tantū ad arti-
 culi compagē
 conuasci, cum
 toti ossium lon-
 gitudini ad-
 nascatur, Ves-
 sal. nunc in
 quatuor nunc
 in tres, sed fre-
 quentius in 4.
 Columb. Ar-
 chang. plerun-
 que in tres
 Fallop. instit.
 f Per sinum
 transversumq;
 ligamentum
 fertur qui ra-
 dio & vlna
 commune est
 Galeno, cum

read medium ventrem commiscetur, ita vt ad exortum vnus videatur: hic secundum cubiti longitudinem per sinum vlnæ & radium communem & sub ligamēto transuerso delatus, in tēdines nerueos rotundos modo ^m duos, modo ⁿ vnum diuiditur, quorum alter ad annularē alter ad digitū min^mū latior reditus trium ossium regioni posteriori implantantur, quo digitos hos extendant & nonnihil ad exteriora potissimum minimum ^o abducant.

in Galen. duos tribuit, qui annularem & paruum à pollice abducant, Vesal. in duos tendines plerunque, Fall. n In vnū tendinem ad paruum digitum, nonnihil cum tendine præcedentis annularem aduētis, portione ad parui digiti radicem commixtus & illi quodammodo tendini portionem vnā offert, Vesal. In tendinem qui nonnunquam bifidus est in minimum di-

VII. p Extendentium [tab. 10. fig. 2. & 3. R] prædictis duobus subiicitur & à cubito medio (vbi linea oblonga & aspera pro musculi exortu occurrit) exactè carnosus enatus ad radium obliquè descendit, & carpi appendicem cōscendens in tendines q duos diuiditur [tab. 10. fig. 2. o. p] qui per sinum proprium in radij appendice & sub ligamento transuerso [tab. 8. fig. 2. 3. char. 4] deferuntur, quorum superior ad indicis (rarius^r ad pollicis) inferior ad medij (nonnunquam ad indicis^t tantum radicem) obliquè, cum totius musculi ductus obliquus sit, inferuntur, vt extendant & indicem extendendo à pollice abducit.

VIII. t Extendentium [tab. 8. fig. 1. t. & tab. 10. fig. 1. x] in manu positus est, brevis & validus ^u à carpi osse quarto carneus enatus, & per metacarpij partem infe-

gitum, Columb. In tendinem qui in brachiali bipartito finditur & in auricularis ambo latera excurrit, Archang. o Extensionem potius quam à cæteris abductionem moliri, rectus ipsius per cubitum incessus, ipsiusq; situs arguit, Vesal. minimum digitum abducit, & ad palmam gignendam vsui est, Columb. & Archang.

p 19. digit. Ves. 11. Fallop. 3. manus exterior musculus (cuius tendo in indicem inseritur, vt indicet, siue obliquè extendat, qui in nonnullis bifidus est) Col. & Archang. inferior seu 3. musculus, Plat. Indicatorius qui citra dissectionem conspicuus, & 18. loco recensendus, Arant. q In tendinem qui in indicem se insinuat, Arch.

r Tribus pollicis ossibus inferior versus indicem ac medium à pollice abducere creditur, etsi potissimum indicem a deat, Ves. f Fallop. t 20. digit. Ves. 12. Fall. 6. extrema manus, Col. 6. à manu exortus, Arch. minimi digiti musc. crassior in vola, Plat. u. a ligamento brachialis & 4. osse eiusdem exit, venerisq; montem constituit, Col. & Archang.

inferiorem delatus, ad minimi digiti radicem ascendit, eiusque ossis primi lateri externo gracilis & nervus inseritur, ipsumque digitum extendendo à reliquis digitis^x abducit, quoties figuras rotundas manu comprehendimus. Et hic muris formam refert, ^{x Sunt mu-} cum in exortu & fine tenuis, in medio teres crassusque; ^{sculi in mini-} sit. Ad extendentis interossei musculi quoque per- ^{mo digito qui} tinent, de quibus propter sectionis methodum pau- ^{in tres aut 4.} ^{secari possunt,} ^{qui auricula-} lō postagemus.

rem digitum ab alijs abducunt, monticulum efformant, Mercurio dicatum, hac Laurent.

DE MUSCULIS POLLICEM extendentibus.

CAPUT XIX.

I.^a **E**XTENDENTIVM pollicem [tab. 10. fig. 1. I. ^{a 21. digit. Ves-} ^{inferius}] à cubiti exteriore sede ad lineam eius ^{sal. 13. Fallop.} asperam iuxta^b ligamentum membraneum [tab. 10. ^{4. manus ex-} ^{fig. 4.*}] quod cubitum radio iungit, carnosus exori- ^{terior, Colum.} tur & versus radium obliquè delatus antequam eius ^{& Archang.} appendicem attingat, in tendinem teretem & nervu- ^{7. pollicis mu-} sculū descendit, qui per sinum per quē & bicornis carpi mu- ^{sculus, Plat.} sculus descendit, & sub ligamento ad manum abit & ^{1. extenden-} totius pollicis longitudini qua indicem spectat ad ^{tium duo tan-} eius internodium tertium vsque inseritur, eumque ^{tum sunt,} indicem versus extendit & ab alijs abducit, ideoque ^{Laurent.} in latus mouet.

II.^c Extendentium [tab. 10. fig. 2. & 3. V] ab eadem ^{cipio carneo à} cubiti ^{cubito egredi-} ^{tur, Columb.}

^{c 22. digit. Vesal. Plat. 14. Fallop. 5. manus exterior qui varias habet inscri-} ^{pciones & in tendines quatuor (4. Archang.) quandoque quinque definit, quarum} ^{unus ad 3. pollicis articulum, alter ad secundum, alius ad 1. quartus ad os brachia-} ^{le cui pollex innititur Archang. addit Columb. & nonnunquam præter prædictos} ^{alijs adhuc duo inveniuntur, ita ut possis ex hoc uno tres aut quatuor efficere cum} ^{unicus sit: 2. extendentium bisido est tendine, Laurent.}

cubiti linea secundum ipsius longitudinem carneus enascitur & obliquè supra radium conscendens in partes duas impares sibi mutuò hærentes diuiditur & sinu proprio in radij appendice inciso infidet & ligamento peculiari [*tab. 8. fig. 2. & 4. char. 6.*] obducitur: parsque superior, aliquandiu carnea in tendinem penè teretem desinit, & in carpi ossi, pollicis subiecti [*K*] sedem anteriorem implantatur: inferior verò [*I*] in portiones duas carneas subdividitur, quæ singulæ in tendinem finiunt, quorum altera radici primi pollicis internodij [*m*] altera membranoso nexu secundo & tertio pollicis ossi pertinaciter adnascitur [*n*] cuius vsus, pollicem introrsum versus extendere.

III. ^d Extendentium [*tab. 8. fig. 4. P. tab. 9. fig. 1. X*] à carpi ossis pollicem substituentis parte ^einteriore nervoso principio, q̃ statim carnosum fit, oritur & deorsum latus in pollicis internodium primū ^ftendine membranoso inseritur, eumque ab indice abducit. Hic cum secundo & tertio pollicem flectente volæ carnosam partem ad pollicis radicem efformat.

IV. ^g Extendentium [*tab. 10. fig. 1. 2. 3. 4. 2*] spatium q̃ inter pollicem & indicē est occupat, hicq̃; ab ossis metacarpi indici subiecto, interna & quasi posteriori parte ^h, carneus, partim etiam nerueus oritur, & in pollicis

^c Carnosus erumpit & carnosus in os secundum immititur, Archang. ^f Primum, Fallop. secundum Vesal. Columb. Archang. Galenus in primum pollicis os inferi scripsit, non admodum verè, cum vera insertionē ipsi non adnascatur sed duntaxat fibrosis nexitus inualide hereat, imò duos musculos primum, pollicis os flectentes præsentis musculi partes arbitratus est, Vesal.

^g 24. digitorum, Vesal. 13. extrema manus, Columb. 13. à manu exortus, siue 7. pollicis, Archang. 16. Fallop. instit. 1. pollicem mouens, Fallop. obseru. pollicis musculus rectus Plat. ^h Carneus, Vesal. Columb. Archang. partim etiam nerueus, Fallop.

pollicis, internodium ⁱ primum toto externo lateri ⁱ Os pollicis
 carnosus inferitur, & tendinem membraneum ^k se- secundum Ar-
 cundo transmittit: pollicis lateralibus motibus fer- chang. In os
 uit, eum indici adducit, & superimponit. pollicis inferi-
 tur, Columb.

^k Nunquam inuenire potui, Fallop. obseruat. & in institut. agnoscit, ceteri
 non meminere.

DE MUSCULIS METACAR- pi seu Interosseis.

CAPUT XIX.

METACARPIVM manus pars altera est inter ^a Galenus 1.
 carpum & digitos sita, quæ musculos ^a octo adm. anat. 9.
 obtinet ^b, cum in singulis ossium interuallis, bini fatetur seigno-
 reponantur, eorum lateribus attensi: qui ab hisce rasse: 4. 5. 6. 7.
 ossibus, quibus connascuntur, exoriuntur omni fe- 8. 9. 10 & 11.
 re ex parte carnei sunt, & secundum ossium longitu- digitorum pri-
 dinem recta feruntur, per digitorum posteriora re- mum interno-
 punt, ipforumq; tendines, cum lumbricalium, qua- dium, cui in-
 tuor tendinibus, aliquando etiam ante insertionem seruntur fle-
 miscentur, ita vt videantur lumbricales, & interos- cientes (quod
 sei tendinem vnicum, eumq; latum efformare, & li- Fallopius re-
 gamento primi articuli aliquantisper colligantur, & prehendit) re-
 per latera ad exteriores tendines musculi quinti di- cta quidem, si
 gitos extendentis feruntur; & in illos inferuntur, & utrinq; mus-
 cum illis extensionis secundi & tertij articuli omniū culi fibra con-
 digitorum auctores sunt, & quatenus digitorum la- trahantur: s; exterior inte-
 teri- rum inclinans: rior quiescen-
 te flectitur ex-
 trorsum pa-

Aaaa 5

interiore agente ad interiora flectitur, Vesalius, Plat. Octo postremi extrema ma-
 nus, quorum duo si simul agant primum articulum, in quem inferuntur recta fle-
 ctunt: si unus solus agat, motum obliquum flectendo efficit. Columb. Archang.
 cui 14. ad 20. usque à manu orti. Fallop. metacarpij musculi, at Plat. digitorum
 musculi recti ossium post brachialis interuallis quatuor innati interossales dicti:
 Laurentio, interossei.

^b Octo dicit, tria tantum interualla constituendo, Vesal. octo, qui duos uni-
 que digito contigisse præter pollicem, scribit Columbus, sic & Archangel. octo
 Fallopius obseruation. interossei sex non octo digitos abducentes, quamuis & ex-
 tensioni inserviant. Laurent.

teribus hærent, digitos procul inuicem diducere & adducere videntur. Quare, vbi vulnus metacarpio exterius inflictum est, digitorum articuli primi extendi non possunt, idque propter musculum digitum extendentem sectum cum articuli secundi & tertij exiguis his remanentibus cito & valide extendantur. Verum hi musculi ^ccauitatē intro flexam in metacarpio (quemadmodum alij in pedio) ita æqualem & planam reddunt, vt musculorum horum tendines singuli ad munera sua recte obeunda plano ac molli strato insidentes, recto itinere proueniant, & ne ossium subiectorum duritie collidantur, prohibeatur, & eisdem cum pinguedine supposita exsiccari minime permittant.

c Sic & Aranzius.

DE MUSCULIS CARPI, seu brachialis.

CAPUT XX.

De his egit Galenus lib. de diff. muscul. 21. & 2. vs. part. 4. item 1. admin. anat. 5.

CARPUS seu brachiale pars est ea, quæ inter cubitum & metacarpum ^aseu post brachiale media est. Carpus autem potissimum flectitur, & extenditur, & in vtrunq; latus agitur, cum quo & manus reliqua pari motu agitur, idq; beneficio musculorum quatuor, quorum duo flectentes intrinsecus siti sunt, duo vero extendentes extrinsecus locati sunt.

I. ^bFlectentium & inferior [*tab. 8. fig. 1. 3. 4. & tab. 9. fig. 1. & tab. 10. fig. 1. & 2. 3.*] ab humeri tuberculo interno seu inferiori, principio acuto ex carnea ^cnerueaq; substantia mixto oritur & carnosus per vlnæ longi-

^a Musculi brachiale mouentium 4. Vesal. carpi seu brachialis 4. Fall. Laurent. musculi manus 4. Colum. & Archang. manum integram mouenter in brachiale & post brachiale infert 4. Plat.

^b 1. Brachiale mouens, Vesal. Fallop. inst. 2. manus interior muscul. Colum. Arch. 1. manus muscul. Plat. 1. Carpi flexor, Laur. ^c Vesal. Col. Archang.

longitudinē, cui adheret, & in pgressu ab ipsa ad car-
pum vsque, exortus sui robur assumit, & cubito pul-
uinaris loco est, cui, dum scribimus, innitimur: mox
ad carpum in tendinem carnosum neruofumq; de-
generat, qui in carpi os quartum, quod cartilagi-
nosum à Galenō dicitur, implantatur, & ligamentis
illius articuli connectitur, & membrana communi
obuoluitur [*eius principium, & insertio.*]

II. ^d Flexentium seu superior [*tab. 8. fig. 1. 2. & d 2. Brachia-*
tab. 9. fig. 1. & 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.] ab eodem tuberculo enatus, oblique *le mouens, Ve-*
iuxta radij longitudinem descendit & ante carpi ra- *sal. Fallop. in-*
dicem, in tendinem teretē & validum desinit, qui à *stitut.*
carpo liberatus, eiusq; sedem internam prætergres- *3 Manus in-*
sus, latiorq; redditus, in radicē ossis metacarpij, quod *terior, Colum.*
indici præponitur, inseritur, & ligamento transuerso *& Archang.*
quoq; adnascitur. Hi duo ^e si simul agant, carpū an- *2 Manus mu-*
trorsum flectūt, secundo & manū: alterutro vero *scul. Plat.*
agente, oblique nūc sursum, nunc deorsum mouet, *2. Carpi fle-*
cam carpi partem, in quam infigitur duobus tamen *xor seu supe-*
musculis, qui exterius siti sunt, opem ferens. *rior, Laur.*

I. ^f Extendentium seu inferior [*tab. 8. fig. 4. & ta. f 3. Brachia-*
10. fig. 1. & 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.] inter primum carpi, & quintum digi- *le mouens, Ve-*
tos extendentis situs, cum ab humeri tuberculi ex- *sal. Fallop. in-*
terni seu superioris [*tab. 10. fig. 1. c*] radice principio *stitut. 6. musc,*
sumpto, tum à summo cubito quem amplexatur, & *exterior ma-*
per eius longitudinē fertur, & cum ad carpum per- *nus, Columb.*
uenit, tendine tereti, nerueo & valido supra cubiti *& Archang.*
appendicem in sinum iuxta styloidem in os meta- *3. Manus mu-*
carpij, quod minimo ^g digito subiicitur, & nō procul *sculus, Plat.*
à carpo infigitur, & nonnunquam ante insertionem *2. Carpum ex-*
officulum sesaminum innatum habet. *tendens seu*

II. ^h Extendentium seu superior vel Bicornis *inferior, Lau-*
[*tab. rent.*]

^g Annulari, Archangelus. ^h 4. brachiale mouens, Vesal. Fallop. institut. *7. musculus exterior manus, Columb. & Archang. 4. manus musculus, Plat.*
1. carpum extendens siue supernus, Laurent.

T A B. XI. *Musculi aliquot cubiti, radij,
pollicis & interossei delineantur.*

LIB. III.

FIG. I.



FIG. II.



TAB. XI.

FIG. III.



i Quare bicornis nomen impositum, Col. & Archang. qui bicornis bipartitusue statim ab ortu spectatur, Ves.

k Hunc bicornem non raro geminum inueni, id est, duos musculos unum maiore principio nervoso, qui tendine infra hu-

meri articulum in quatuor digitos desinit, alterum minorem principio nervoso, qui tendine in radium medium desinit: tendines primo lati sunt, postea rotundi sunt, Archang. l Brachiale & postbrachiale extendunt Arch. Gal. 2. vsu part. carpo motus proprios in prouum & supinum ascribit, quorum authores facit quatuor hos musculos, prout hic illone contrahatur agunt, aut quiescat: Vesalius. Galenum hac finxisse asserit.

[tab. 8. fig. 2. 4. e & tab. 10. fig. 2. 3. E] ab acie ossea, quæ in humero est, supra tuberculum exterius [tab. 10. fig. 3. r] carnosus latiusculo principio pronatus, radio innititur, & supra radij medium excurrrens in tendinem crassum robustum ac bicornemⁱ finit, & vbi supra carpum recto tramite, progressus est, alter in metacarpi os primum, quod indicem sustinet, & in radij extremum: alter vero in secundum, cui medius innititur inferitur:^k

Hi si simul agunt^l carpum extrorsum flectunt, & extendunt, & secundo manum, quibus portio musculi tertij pollicem extendentis simul auxilio est: secundo quoque carpum vel manum extremam circumagunt, quando vnus alium in agendo immediate subsequitur: alterutro vero agente varij motus efficiuntur, nam si aut seorsim operentur, aut flectentium vnus cum extensore simul agat, carpum oblique, & ad latera mouet.

DE MUSCULIS a RADII.

CAPVT XXI.

a Radij musculi quatuor, Vesal. Colum. Fallop. instit. Plat. Archangel. Laurent.

De quibus Galenus libr. de diff. musc. 21. 2. vsu part. 7. & i. adm. anatom. 8. egit:

CVBITVS ex ossibus duobus constat, altero inferiore, quod cubitus seu vlna [tab. 11. fig. 1. 2. 3. N] altero superiore, quod radius dicitur [ta. 11. fl. 1. 2. 3. O] & quodlibet musculos peculiare obtinuit. Radij motus duplex est, vel enim mouetur per se, vlna immota propter ipsum articulum, tum superiorem cum humero, tum inferiorem cum carpo, tum vtrinque supra

supra & infra cum vlnæ articulatione, & sic manus tota, vel in primum, vel in supinum mouetur: manus enim tota, cum eam radius ferè solus excipiat, eisdem motus obtinet: quare musculorum duorum exteriorum ope supina, duorum vero interiorum pronare dicitur, simulque circumagitur: vel mouetur per accidens, cum vlna in rectum cum totus cubitus flexitur & extenditur.

I. ^b Supinatorum seu longior [*tab. 8. fig. 1. 2. 3. & 10. fig. 1. 2. 4. II*] omnium eorum, qui cubitum erumpunt, quoad ventrem ^c longissimus, ab humeri tuberculi externi, & superioris acie, carnosus oritur [*tab. 9. fig. 2. f. tab. 10. fig. 4. a*] mox expansus radio oblique inferitur, & tendine latefcente membraneo radij appendici versus interiora inferitur [*t. fig. 2. t. & tab. 10. fig. 4. b*] Hic radij partem inferiorem conuellit, manumq; supinam reddit.

II. ^d Supinatorum breuior [*tab. 10. fig. 1. 3. 4. & tab. figur. 1. z*] ab articulatione ^e, quæ cubitum humeri connectit, & ab vlnæ processu [*tab. 10. fig. 4. a*] posteriore sine olecrano carnosus erumpit, oblique progreditur, & in radium fere medium, cui etiam adheret implantatur [*tab. 10. f. 4. 2*] estque foris membranofus, intus vero carnosus. Hic radij partem superiorem, oblique extrorsum conuellit, & manum posteriori in parte supinam reddit.

I. ^f Pronatorum seu quadratus [*t. 9. f. 3. 4. & t. 11. f. 2*] ab vlnæ parte inferiore & interiore prope carpum carnosus latus & quadratus exoritur & anteriore parte transuersus (fibris transuersis ex vlna ^g in radium transuersim conscendentibus) in radij internam partem tendine ^h membranoso inferitur.

b 2. Radij, Vessal. (cui & exterior) Fallop. Plat. cui & supinator primus. 8. exterior manus longissimus nuncupatus, & Archang. 1. Supinatorum longior. Laurent.

c 1. Adm. anat. 8. longis.

d 4. radij Vess.

(sive exterior) Fall.

Plat. sive

supinator secundus.

9. exterior

manus. Colum.

Arch. 2. supinatorum, Laur.

e à ligamento

valido, quod

cubiti humero

constringit, &

superiore radij

parte, Plater.

Archang.

f 1. radij, Vess.

(cui & interior)

Fall. Plat.

ter. cui & pro-

Hic

tor primus, 8. interior manus muscul. Columb. Archang. 2. Pronatorum seu quadratus, Laur. g Galenus 1. adm. anat. radium vlnamq; intercodere voluit. 2. non, ut in radium inferitur, Columb. Archang.

His enim secundum cubiti interiorem amplitudinem totam radij vlnæq; sedem complectitur : quadratus est cum ipsius longitudo tanta sit, quanta est cubiti interior regio, ab vlna & radio constituta, estque omni ex parte carneus, qui in medio extuberrat crassusque est, quo pulvinaris instar tendinibus ad digitos excurrentibus substernatur. Hic dum radij partem inferiorem carpo, proximam introrsum trahit, radium & manum radio adstrictam in pronum adigit.

i 3. radij Ves.
(cui & interior) Fallop.
Plater. cui & pronator secundus. 7. interior musc. manus, Colum. Arch. 1. pronatorum seu. rotundus, Laurent.
k Et à ligamēto illius articuli interno, Fallop.

II. i Pronatorum seu rotundus [tab. 8. fig. 1. 2. 3. & tab. 9. fig. 1. 2. 3. 4. & tab. 11. fig. 1. 2. Ω] ex humeri tuberculo interiore ^k & ex vlnæ latere interiore superioreque, qua humero articulatur, carnosus enascitur, & obliqui radij sedem internam conscendens, circum eius medium carnea insertione implantatur [tab. 1. fig. 4. γ] à qua insertione nervosus ad radij medium usque educitur, eiusque superiori regioni asperitudine nervoso valide infigitur [tab. 11. fig. 1. μ.] Hi quoties contrahitur, radij superiorem partem introducens, radium & totam manum in pronum contorquet.

1. Rotundus carneo, partim nervoso, Columb. Plat. Archang. membranoso; Laurent. propter ductus brevitatem, hic quemadmodum & quartus & primus carpo tendine destituitur. Vesal.

DE LIGAMENTIS CVBITI & summae manus.

CAPVT XXII.

De ligamentis musculorum cubiti, & summae manus egi
Galenus 1. adm. anat. 10.

ET si per cubiti longitudinem vniuersam, musculis omnibus membrana valida circumdetur, quae musculos inuicem committit, in sua sede continet

tinet & instar ligamenti alicuius transuersi continet, quibus etiam pertinaciter proprię musculorū membranæ modo adnascitur, sunt tamen ligamenta alia quæ ossa inuicem committunt.

Quare cubitum ex radio & ulna compositum, ligamenta & humero & carpo & inter se connectunt. Humero quidem ligamenta communia, quæ ulnæ humero & radium humeri tuberculo exterioris ligamenti validis, sed membraneis, sicuti & cæteros articulos iungunt, [*tab. 10. fig. 2. i.*] At carpo committitur ligamento membraneo reliquorum articulorum communi, & duobus priuatis tendinibus, quorum aliud ulnæ iungit, quod à processu styloide in carpi os quartum ducitur, & cæteris magis est cartilagineum: aliud radium carpo nectit, quod ex radii apice educitur, & in carpum fertur: inter se verò ossa hæc duo vniuntur, tum communi infra supraque, tum priuato membraneo validoque, quod per totam longitudinem vtriusque ossis educitur, & inter ossium horum interualla situm est, & ab acutiori ulnæ linea, in radii lineam inferitur, [*tab. 9. fig. 4. tab. 10. fig. 3. & 4. **] & fibris obliquis constat, quæ à radio deorsum in ulnæ oblique prorepunt. Huius usus ossa hæc coniungere & vincire, musculos exteriores ab interioribus distinguere & musculis, quibusdam vel principium præbere, vel principiis robur addere.

Carpi ossa ligamenta communia obtinuere, quibus obducuntur & alicubi etiam ossa intercedunt & cartilaginea fiunt, [*tab. 10. fig. 4. 3.*] At ligamentum hoc ab ulnæ & radii appendice inferiore prodit, validum certè & officula ei colligat, vt motibus propriis edendis (obscuris licet) idonea sint, quod in ossis metacarpi appendicem tandem implantatur.

Metacarpi etiam ossa ligamenti communibus inuicem committuntur, quæ non tantum ossa orbiculatim ambiunt, verum etiam iuxta extremitates in ipsorum medio, quæ ossa se inuicem respiciunt, se non nihil insinuât & cartilaginis naturam referunt, verum hisce per exteriora ductis & carpi ossibus iunguntur.

Digitorum denique internodia etiam ligamenti communibus vinciuntur. Præter hæc ligamenta adfunt in manu adhuc alia, quæ ossibus articulandis non seruiunt, sed tantum tendines ad digitos abeuntes obuoluunt ac continent, ne dum mouentur loco excidant: hocq; duplex est, Alterum ad carpum parte interna [tab. 9. fig. 1. γ] transversum, latum & cæteris huius generis robustius, quod armillæ instar in carpo situm est & finem carpi succingit, omnes tendines huc prorepentes simul continet, & ab hoc aliquando & tendo palmaris musculi, procedit: hocq; nec metacarpo, nec cubito commune est. Alterum parte externa, qua corpus cubito articulatur, à prædictis duabus appendicibus ortum ducens per totius cubiti latitudinem expansum, quod primo intuitu unum esse videtur, cum tamen dissectum, sex^a ostendat ligamenta transversa, tendinibus musculorum digitos extendentium annulorum instar obducta, eoque continentia [tab. 8. fig. 2. 4. char. 1. 2. 3. 4. 5. 6.] primum ex vlna in radium procedit, & ad finem com-

^a Galenum i. adm. anat. ad minimum duo latuere, Vesal.

^b Galenus extendentium quinto tribuit, Vesal.

munem vlnæ & radio refertur, & sexto^b digitos extendenti peculiare est: Secundus vlnæ proprius & primo carpum extendenti: tertius radio proprius & tendinibus indicem medium & annularem extendentibus; quartus angustissimus annatus est, tendinis gracilis musculi indicem & medium à pollice abducentis: quintus carpum extendenti secundo, & ei qui pollicem indicem versus evertit, viam præbet, nonnunquam pollicis tendi-

nem,

nem, ligamentum peculiare obducit: sextus tres tendines [*tab. 10. fig. 2.3. l m n*] musculi secundi pollicem extendentis [*tab. 10. fig. 2. γ*] transmittit.

Digitique quoque singuli secundum eorum longitudinem, ligamenta habent, ab internis ossibus digitorum ad latera pronata, quæ longa sunt, & canalem imitantur, quæ tendines digitos flectentes in suis sinibus veluti annuli retinent, ne in flexione extra sedem attollantur & vel vagentur.

Tandem ligamenta dantur membranæ, vel potius membranæ mucosæ, (de quibus in tendinum musculorum manus enumeratione) quæ tamen ceteris tendinum membranis rubicundiores sunt, & tendinibus ad manum & digitos transmissis, ligamentorum ritu obducuntur, eosque quo tutius procedant, inuoluunt: & ab his aliquando & musculi ortum acquirunt.

c Quare Gal.

lib. vj. part. a-
iebat, ope ten-
dinum quinti
musculi tertium
internodiū fle-
ctentium, pri-
mum quoque
flecti: ad rei ve-
ritatem: i. ad-
min. anat. a-
gnouit Col.

DE VENIS TOTIVS

manus.

C A P. XXIII.

De his vide Gal. lib. de dissect. venarum, 3. 4. 3. adm. anat. 5. 6. 7. & de ratione victus acutorum, text. 10. & libr. de curat. per sang. mis. & alibi.

VENÆ caux truncus sub osse pectoris ad iugulum [*tab. venarum, & tab. 12. figur. 1. H*] in duos^a insignes [II] ramos diuiditur, quorum alter

a Vena caua
thymosuffulta
in duos trun-

Bbbb 2

dextram, cos diuiditur

& à sinistro, quemadmodum à dextro grandis vena oritur, quæ prima costâ innixa sub clavicula in axillam prorepit, ab huius vena medio fere ductu humeraria oritur, Vesal. vena caua ad iugulum duas magnas emittit venas axillares, Colum. in duos grandes ramos, quorum alter dextram, alter sinistram partem petit, & ad latera deducti quilibet in tres ramos partitur, alter qui ad axillam per brachium disseminatur: duo alij per cervicem ascendunt, iugularis exterior & interior, iuxta eandem regionem, alia producit, non magna, infra cervicis vertebrâ permeat, & nutrit, nec calvariâ, ut Vesalius voluit ingreditur, Fallopius instituit.

dextram, alter sinistram partem petit, & quamdi in thorace est subclavius dicitur, ubi vero thorac cavitatem egressus est, cum ad axillas feratur muta

^b *Ab Axillari* to nomine Axillaris dicitur, à quibus varij pro
(intelligit sub- deunt rami, de quibus in thoracis & colli histori
clavia partem egimus. Verum ^b Axillaris in duos abit ramos, su
thoracē egres- periolem seu venam Cephalicam [a] & inferiorem
sa) tres vena seu basilicam [m] ita vt vtriusque idem ^c exortus sit
oriuntur Tho- seu de quibus sermo erit.
racica, Basili-

ca, & Cepha- ^d Cephalica [a] axillaris ramus ^e superior est in
lica: idem ram- homine ^f, quæ in plerisque quadrupedibus à iugu-
mus dū supra lari externa promanat, sic dicta, quod in capitis af-
claves emerfit, fectibus incidi soleat: Humeralis etiam nuncupa-
superclavius tur, quod per humerum in manum feratur: & cu-
dicitur Syluio, bitus exterior, quod cubiti latus exterius perreptet.
à quo Ingula-
res dua oriun-
tur, Laur.

^c Venarum duarum à causa in brachium, una eademque radix à iugulo extra
thoracem vsque extitit, Vesal. ^d Humeralis Galen. de ven. sect. ^{quiza}. 1. adm.
anat. 11. humeraria & cubiti exterior, Vesal. & Plater. humeralis Cephalica &
capitalis, Columb. Galenus per eleganter veraque eas enarrauit Venas, qua citra
sectionem in nudato brachio, vt in vena sectione fit plurimum & frequenter illi
occurrerunt, quas cum simiis conuenire vidit, Vesal. ^e Superior & gracilior,
Vesal. de huius positus differentia & crassitudine, vide de dissect. ven. 3.

^f Exterior & grandior supra iugulum facta diuisionis ramus, siue iugularis
exterior ex Galeni sententia venam insignem profert, qua humerariam nobis nū-
cupatam venam constituit, cum tamen propter Aristotelem, qui humeraria or-
tum sub aure esse falso tradiderat, & Galeni obscuritate locorum studiosius hu-
meraria originem indagatus sum, venam hanc, non vt Galenus censet ab ex-
terna iugulari enatam vidi, verum ab ea vena, qua transuersim supra primam
costam in axillam tendit, Vesal. Humeraria axillaris propago est in hominibus &
omnibus, qua iugulum habent. In iis vero qua iugulum non habent, vena iu-
gularis externa ramus est, quam rationem exortus in homine inuenire nunquam
potui, Fallopius obseruat. haud verum est, quod Vesalius dixit humerariam à
iugularis exterioris latere externo produci, sed axillaris vocata propago est (idem
& Laurent.) deceptus in canibus & simiis; Fallop. institut. Syluius in ramum
subclaviū, à quo Basilica & ramum superclaviū à quo Cephalica prodeat, di-
uisit: quemadmodum etiam Vesalius & Plater. pinxere, & lib. 2. tab. 6. fig. 1. à
dextris falsitatem, à sinistris veritatem proposuimus. At Vesal. errorem agno-
uit, quare tab. ult. lib. 3. & veram & falsam proposuit originem: sed Valuerda
primus totius causæ veram delineationem exhibuit.

Hæc enim per humeri summum deducta, ad cubitum summamq; manum superficietenus inter membranam carnosam & musculorum tunicam descendit, & antequam sub humerum se abdat, modo vnum, modo duos ramos emittit [dd] qui per musculum brachij deltoideum & cutim, qua tegitur, distribuuntur. Deîñ exterius cubitum adit (hîc nonnulli cephalicæ principium statuunt, partem altior em humerariam vocantes:) etiam citra sectionem conspicua, nisi forte homo vel obesior sit, vel venas raciliores obtineat: ac in descensu ad cubiti articulum vsque venulas tenues in brachij musculos, & d cutim exterius [ee] partim rectâ, partim oblique prorepunt, ita vt aliquando cum Basilicæ ramo in cute distributo [f] coire videatur: aliquando ramus ad musculos internos cubiti [g] mittitur, qui in hominibus frequentissime deest, vbi vero ad cubiti articulum peruenit [f] iuxta brachij tuberculum externum, in ramum s interiore m & exterior em diuiditur.]

Interior ^h quidem [h] oblique ⁱ ad medium flexuræ cubiti sedem sub cute deductus, cum Basilicæ venæ ramo [t] coiens, venam medianam dictam constituit [a] verum aliquando ramus hic vix conspicitur, opposito ex Basilica, prodeunte manifesto, nonnunquam vice versa fit.

^k MEDIANA vena mediana [a] à situ nominata, communis etiam, quia ex Cephalicæ & Basilicæ ramis in vnum concurrentibus [t. h] generetur,

Bbbb

3

& qui-

g *Humeraria*
in tres ramos
diuidit, 1. qui
g. notatur. 2.
notatus. *h.* &
3. funem brachij.
1. *Vesal.*
in internum et
externum se-
catur, *Col.*
h *Secundus* &
præcipuus hu-
meraria ra-
mus, *Ves.* *Basi-*
lica *Auicenna.*

ⁱ Transuersim ad axillaris ramum mittit, Fallop. instit. ^k Graci & Latino- rum præcipui ramos, qui hanc efformant, medias (vt lib. de vena section.) vt & obliquas nuncupant: at Galenus 1. ad Glauconem, mediam videtur appellare, quam alias communem vocitat, *Ves.* communem venam constituentes rami, mediana appellantur, quo semper fere vulgo secant: & prope humerariam & eius medianâ neruus nullus adest: quemadmodum prope basilicam Columb. errant, qui medianam peculiarem & tertiam brachij venam agnoscunt, *Laur.*

T A B. XII. *Figur. 1. Venas totius manus,
quemadmodum Fig. 2. Arterias eius-
dem exhibet.*



& quidem communiter in cubiti flexu, aliquando multo humilior, non procul à medio longitudinis cubiti, & ab Auicenna nigra vocata: hæc oblique deorsum per mediam brachij regionem ducitur, & supra radium hinc inde furculos diffundit: nonnunquam etiam ab iis, quæ cubiti sedem internam perreptant, alios assumit, at supra radium [*infra β*] in duos ramos [*γ ε*] finditur: quorum exterior [*γ*] furculum [*δ*] ad carpi sedem interiorem pollicem versus mittit, & cum aliis [*qz*] commiscetur, reliquum versus pollicis & indicis regionem ^l exporrigitur, quam alij Saluatellam, communiter tamen à chirurgis cephalica, ab aliis ocularia dicitur. Alter vero interior [*ε*] inter indicem & medium, & aliquousq; annularis sedem in varios furculos absumitur, & à quibusdam Syele Auicennæ censetur: sed adeo varia est venarum manus cutim implicantium distributio (imò etiam in cubito) ita ut hominis eiusdem dextra cum sinistra raro conueniat: imò inter quamplurimos homines, vix duos venarum æquali in ramos distributione inuenias, quare horum ductum explicare difficile est.

l Tertius humeraria ramus, Vesal.

Exterior ^m cephalicæ ramus seu funis brachij Auicennæ [*ι*] oblique per radium in cubiti longitudinem externam venulis in cutim [*k*] passim dispersis, abit: at ubi ad carpi medium parte interiore iuxta vlnam peruenit [*l*] ei Basilicæ ⁿ ramulus [*χ*] coniungitur, quo adauctus externam carpi sedem conscendens, regionem, quæ ante auricularem & annularem digitum habetur, ramulis implicat, & venam ab Arabibus Syele, vulgo Saluatellam dictâ constituit, quæ exteriore palmæ parte ante digitos consistit, cuius sectio in sinistra manu in melancholicis affectibus tantopere ab Arabibus & practicis commendatur. Interdum hic cephalicæ ramus defi-

n Alteri commiscetur vena, quæ ab axillari ramo pendet Vesal. cū alio communi ramo commiscetur, constituens saluatellam, Fallop. inst.

deficit^o & tunc vices eius Basilicæ, ramus [X] toti vlnæ longitudini exporrectus, supplet, nonnunquam verò ramuli à vena mediana in cutem excurrentes.

^o Non infrequenter, Ves.

BASILICAP [mm] ramus alter est & quidem inferior ab Axillari prodiens q qui maior & amplior est cephalica & etiam in frequentiores furculos diuiditur, quæ multis Axillaris, alijs cubiti interior^r quod per cubiti interiora descendat dicitur, & ratione brachij apud Practicos nomen mutat: dextri enim, Hepatica, quod in hepatis affectibus secetur: sinistri vero Lienaris, quod in lienis morbis incidatur, nominantur. Hæc per brachij interiora, inter musculos brachij os amplexantes lata, ad axillam à multis glandulis excipitur, ibique in plures propagines diuiditur: quarum præcipua ad musculos thoraci instratos disseminantur & harum insignior Thoracia, inferior [k] quæ iuxta costas diducta, venarum illarum, quibus costarum interualla nutriri diximus, oscula quæ extra thoracem prodeunt excipit, siue oscula venæ siue pari, cum osculis Thoracicæ inferioris, ab utroq; latere tribus, interdum quatuor ramis^f coeunt [tab. 8. lib. 2. xxxxx cum yyyy.] hinc cuilibet patet, ex quonam latere in pleuriticis sanguis mittendus sit, an scilicet ab eodem, an contrario inflammationi latere (qua de re supra lib. 2. cap. 18.) Verùm ramulum

p Vena interior, Gal. de ven. sect. Axillarium venarum tres sunt, una basilica, iecoraria, & Hipp. cubiti interna dicitur, Col. Axillaris, Vesal. Plat. cui & interior cubiti & hepatica, Axillaris seu iecoraria, Fall. Basilica & hepatica, Laur.

q Axillaris à cava diuercatione ubi prodijt thoracem egressa & sub clavicula deducta ad axillam deuenit priusquam

Bbbb 5

quo-

ed pertingat, multos ramos ad musculos cervicis & scapula enutriendos de se promittit: præterea ramum præcipuum, qui ad humeri superiora ductus, humeralem facit venam, Fallop. inst. 1 Hipp. τῆς εἰς τὴν φλέβα lib. de victus ratione, Col. Lauren. at φλέβες αἱ εἰς τὴν, vena interiores dicuntur & de venis brachiorum intelliguntur, 2. Epid. qua dictione etiam vena secundum rectitudinem significantur & vena poplitis, 6. Aph. 36. & 7. aph. 48. Foesius. f Fallop. in instit. at Lauren. observatio noma & pulchra est, quod ignoravit Vesalius, quare breuior à sinistro latere ad sinistram basilicam quam ad dextram est via: quare Vesal. sententia de sect. perpetuo dextra cubiti vena explodenda & ab eodem latere venam secemus, Gracorum vestigiis insistentes, non omnem quidem sed Basilicam tantum ex mandato Hipp. lib. de ratione vict. in acutis, idq; vacuationis, reuulsionis & deriuationis ergo: hac Laur.

r Axillaris
 vena sub pri-
 mo musculo
 cubitum fle-
 ciente tres in
 venas insignes
 diuiditur, qua-
 rum una Ba-
 siliica hepaticae,
 altera
 axillariam
 asfunde subit:
 alia medio
 humero plus
 minus refle-
 ctitur ad po-
 steriorem par-
 tem, Columb.
 u Aliqui osci-
 tantur hume-
 rariam cum
 carnea mem-
 brana ause-
 rentes, post-
 modum alte-
 ram Basilica
 partem con-
 notatam hu-
 meraria loco
 describunt,
 & simul
 cum axillari
 vena hume-
 rariam porri-
 gisse aduertisse
 scribunt, Ve-
 sal. quae diui-
 sio Galenum
 3. adm. anat.

quoque ad musculos cubitum extendentes [n] mit-
 tit, cui ex opposito venula in glandulas dispergitur.
 Ex eadem ^r regione posteriore vena alia [o] ad eos-
 dem musculos mittitur, à qua nonnulli furculi in cu-
 tım brachij sede externa sparguntur. Sub hac propago
 insignis [p] obliquè deorsum sub humeri osse versus
 tuberculū exterius cū neruo quarto brachij fertur.

Mox Basilica non procul ab egressu è thoracis ca-
 uitate in duos ^u truncos [tab. 12. fig. 1. q. r. at in venarum
 omnium tab. r. & q.] penè pares diuiditur, quorum al-
 ter profundus, alter subcutaneus dicitur. Ille cum
 toto ductu in profundo latitet, profundus [q] vel
 truncus in alto latitans ^x dicitur, qui arteriæ axillari
 in brachium exporrectæ [tab. 12. fig. 2. N] attensus,
 cum qua eadem ferè serie distribuitur, simul & nerui
 tertij ramo quarto [tab. 15. & 16. lib. 3. T] ad brachium
 delato, comitatus, per medium brachium sub media-
 na descendit & vbi cubiti articulum superauit [*] in
 ramum anteriorem & posteriorem diuiditur, qui nō-
 nihil à se inuicem recedentes & furculis in musculos
 sparsis, cum tendinibus musculorum digitorum per
 ligamentum transversum descendunt & per digito-
 rum sedem internam, distribuuntur. Exterior enim
 qui secundum radiū descendit, pollicis & indici duos
 medio vero digito ramulum vnum exhibet. Interior
 vero ramus cubiti ossi attensus, in duos quoque di-
 uiditur & ab his digito medio similiter vnū, medico
 verò & minimo ramulos duos largitur, ille quidem
 musculis manus externæ, hic verò internæ.

Alter Basilicæ truncus [r a tab. venarum vniuers. r]
 Subcutaneus dicitur, quod sub cute excurrat, qui
 per brachij longitudinem inferiorem ad cutem ra-
 mulis

latuit, vel quam iuxta cubitum, atq; adeò in brachij extremo fieri scripsit. Idem

x Ductum venarum, quæ per manus profundum porriguntur, Gal. de diss. ven.

4. & 3. adm. anat. 7.

mulis varijs dispersis, fertur: dein paulò supra brachij tuberculum internum: (vbi non minus quam Cephalicæ cubitum, ante sectionem conspicitur) in ramum anteriorem [t] & posteriorem [paulo supra n] diuiditur. Anterior ramus per cubiti flexum mediū obliquè delatus cum Cephalicæ ramo interiore [b] sub cubiti flexu venam communem [a] efficit: aliquando tamen ramus hic, qui ad communem fertur, Cephalicæ ramo longè aut gracilior aut aptior est, & interdum hic vel ille geminus conspicitur. Posterior verò subcutaneæ ramus [n] iuxta humeri tuberculum interius [sub n] bipartitur & horum exterior & maior [xx] secundum vlnæ sedem ad carpum descendens, ramum deorsum [xx] propè carpum iuxta digitum minimum mittit, & iterum cum altero cephalicæ ramo [i] illuc abeunte [l] coit, hæcque perinde ac prius diximus in externam manum distribuitur: ab eodem ramo furculus ad cutim [γ] & partes posteriores disseminatur. Sunt & alij rami [z inferius] ab hac propagine [n] prodeuntes in cubiti cutim parte interiore disseminati, qui diuersimodè permiscuntur, & modo coeunt, modo recedunt, furculos à propagine x notata assumentes, aliosque eidem communicantes.

Tandem à Basilicæ ramo [t] medianam constituyente, sede humiliore & media, alia vena insignis factis [z superius] profluit, quæ interdum rectâ, interdum vario ducto ad carpum descendit & alijs venis vicinis variè vnitur (quare y nonnunquam sedes cubiti interna quemadmodum & supra varicibus molestat) & huius furculi modò rectâ, modò transuersim, modò obliquè & quidem modò vniti, modò diuisi manus cuti internæ connascuntur.

Ex hac venarum coniunctione adeò varia, maxime verò cum tam Cephalicæ quàm Basilicæ exortus
idem

2 Æsculapij
nostri ridiculè
cōtendunt, nū
humeraria,
aut commu-
nis, aut axil-
laris in manu
diuidenda sit:
humerariam
aperire existi-
mantes, quan-
do venam in-
ter pollicis &
indicis radicē
aperiunt: &
Axillarem si
venam ad an-
gularem &
minimum in-
cidant: imò in
cubito propè

idem sit[mncxI] facilè colligere possumus inutilem
esse 2 adcò curiosum delectum venarum vnus vel
alterius venæ in eodem latere: quare si constet ve-
nam secandam esse & quidem brachij & etiam con-
stet ex quo latere sanguis educēdus sit, præstabit eam
quæ ligato brachio magis conspicitur, magisq; tur-
get tundere. Tres enim sunt loci sanguinem ex cu-
bito mittēdi, interior, exterior, medius Galeno^a do-
cente: quare dum ad venam secandam accedimus,
vel tres æquales videre licet, vel duas tantum, vel in-
æquales omnes, nonnunquam etiam occultatur vna
ex ijs, aut etiam duæ eodem^b mouente. Interioris
^a sectionem vtilem censuit quibus inferiores colli
partes patiantur; exterioris quibus superiores, vt fa-
cies aut caput: medij verò vtrisque communicare,
cum venas vtrinque diductas ac cōeuntes habeat.
Sunt & valuulæ in Cephalica & Basilica de quibus in
historia pedis agemus.

nullam præter axillaris ramum ad communem exporrectum diuidunt: etiam an-
te venarum sectionem, quod parum Anatomicum de aperienda vena non secus
contendunt, quam si peculiaris quapiam vena à singulis partibus affectis in bra-
chium duceretur & non ab vno trunco ex magna caua in ingulo partitione edu-
cto, omnes vena pullulent: cui ridicula vulgi Medicorum opinioni Hipp. vel eius
qui de morbis scripsit auctoritas satis congruit, qua hepatitis vel splenitis ipsi vo-
catarum venarum ductus, imaginatione tantum traditur, Vesal. His ita se ha-
bentibus patet, quo in pelago versentur medici anatomia imperiti, qui in secanda
vena in affectibus capitis, tam magnum ponunt discrimen inter humerariam &
axillarem, ac si non ab eodem prodirent ramo &c. Fallop. instit. in cubito atque
summa manu axillaris & humeraria ita simul iunguntur vt aliquando nil refe-
rat, aut hanc aut illam secemus, Idem in obseru.

a De Cur. per sang. miss. b De diff. ven. 3. at quomodo cubiti vena superficia-
ria secanda sint ostendit. 3. adn. anatom. 6.

DE ARTERIA MANVS.

C A P. XXIV.

Vide Gal. 3. adm. anat. 8. & lib. de dissect. venarum & ar-
ter. 9. & 16. vsu part. 11.

ARTE-

ARTERIA magna postquam extra thoracem ab Axillari^a vtrinque ramos distribuit quatuor, ^{a ab Axillari, Thoracica & Basilica procedunt: Thoracica duplex alia in anticos, alia in posticos thoracis musculos fertur} primum ex sede posteriore ad musculos in scapulæ sede locatos, [tab. 12. fig. 2. I] alterum ex superiori sede ad humeri cum scapula articulum (quem humeralis vena aliquo vsque comitatur) [K] tertium ad musculos thoracis parti anteriori instratos: [L] quartum qui secundum thoracis latera deorsum fertur, [M] & ramulos exiguos inter tertium & quartum ramum glandulis sub ala sitis, communicat, de quibus in thoracis historia dictum fuit, reliquum in manum [ab N] mittit.

Hæc [N] enim per brachij partem internam cum Basilica vena [tab. 12. fig. 1. m] inter musculum bicipitem descendens, vtrinque surculos graciles ad musculos humeri sedem internam amplexantes, distribuit: [sub M] mox secundum brachij partem posteriorem vnà cum vena^b profunda [tab. 12. fig. 1. g] seu Basilicæ ramo interno, cui toto ductu attensa est, & nervo brachij quarto [tab. 16. lib. 3. Φ] in cubiti sedem externam, sub musculorum inde natorum capitibus aliquo vsque abit, & ramulos graciles supra infraque [O] profert & iuxta cubiti flexuram vtrinque ramulos duos [PP] articulo largitur, vbi sæpè pulsus euidenter persentitur.

Diximus Arteriam^c cum vena ferri, certum enim ^{b Interior axillaris truncus, Vesal. Basilica est tò interna, Col.}

axillaris vena ramus altum tenens, Plat. c Aristoteles de spiritu 4. vena cui libet sua arteria adiuncta est, & Galen. 6. vs. part. 10. & 17. in toto corpore mutua est anastomosis & osculorum apertio: & 5. vs. part. 2. ut vasis ipsis sit conspiratio quadam ac materiarum communio: & 16. vs. part. 12. huius connexionis usum ostendit, & cap. ult. nusquam vena ab arteria relinquitur, sed ubi vas arteriosum videris, ibi necesse est venam etiam esse; paucis tamen venis in corpore, quæ ad cutim pertinent, sine arteriis diuisis: id quod accidit in manibus & cruribus & iisdem externis atque anterioribus potissimum; quod partes hæ positionem habeant, minus præcipuam quam internam. Quare 5. vs. part. 2. ubique natura inquit, nisi maius quid obstat, cum venis Arterias simul diuidit: & lib. de diff. venar. ultimo, non omnes coniunctas habere arterias ostendit.

ἐστὶ τὸ συναναστροφῆς αἱματὶς ἀρτηρίας ταῖς φλεβὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα vt Galenus loquitur: arteriæ enim spiritum, caloremque vitalem sanguini impertiunt, & vicissim eadem ex venis sanguinem tanquam spirituum, imò & arteriarum nutrimentum exhauriunt, & hæ vasorum coniunctiones, quæ per oscula fiunt, præsertim in brachijs & cruribus reperiuntur, idcirco aliquando euenit, vt vena vna duntaxat fauciata, non modo naturalis sanguis vniuersus, sed vna vitalis quoque effluat, ita vt vulneratus intereat. Quod Galenus etiam innuisse videtur, ostensurus enim vasorum vniones, asserit venis maioribus sectis si totus sanguis effluere permittatur, consecutione & arterias euacuari & hoc ex eo constare, quod aperto cadauere, non solum venæ sed etiam arteriæ sanguine vacuæ reperiuntur. Sed redeo vnde digressus sum.

Arteria axillaris sub cubiti flexura vbi cubiti sedem internam nonnihil perrepsit, in musculos duos digitorum flexores descendens, in ramos duos^d insignes diuiditur^e: quorum alter superior secundum radium delatus [Q] rectà carpum adit, (quo loci arteriæ motum^f seu pulsum ipsum Medici digitis explorare consueuere, ex eius dilatatione & contractione & intermedia quiete, cordis constitutionem coniectantes,) & antequàm ad digitos abeat, furculum versus manus exteriora [R] inter primum pollicis os & Metacarpi quo index suffulcitur deducit & in musculos eius loci distribuit. Tandem sub ligamento annulari & musculi palmaris tendine progrediens (quemadmodum & vena & neruus illi quoque attensus) in ramos tres secatur, horumque primus pollicis, alter indicis internæ sedi furculos duos offert,

d Cum flexura cubiti præterijt in duas sæpè tres arterias secatur, Columb.

e Alij profundius delitefcunt, alij superficialitenuis deducti exteriorib. partib. vitam præstant, Fallop. f Ramus hic in aliquibus non parte interna locatus, sed

foras versus fertur, vnde si quis Medicus rei Anatomes ignarus, huius pulsum præsertim, dum agrotat loco consueto duntaxat quærat, nec inueniat, hunc morti proximū esse falsò indicabit, & prædicet falsò, Columb.

tert, at tertius, indiuisus medium accedit [inter R & T.]

Inferior & verò ramus [S] vlnam rectà percur-
rens, carpum quoque adit, quo loci etiam tangentes
Arteriæ motum perſentimus, præſertim ſi homo aut
macilentus fuerit, aut pulſum magnum habuerit;
quare prædictum ramum potius, quam hunc tangi-
mus, cum is minus à tendinibus occultetur, idcirco
etiam melius exploretur: qua de re in introductorio
ſeu ſynopſi noſtra de pulſibus egimus. Hic ramus
ſub ligamento quoq; tranſiens, manus volam ſubit,
& antequam digitos adeat, ramulum [*] muſculis
iuxta minimum digitum ſitis largitur, reliquum (ve-
na & neruo comitibus) digitis communicat, medio
quidem ſurculum vnum, at medico duos & mini-
mo totidem impertit. At externa manus vt ^h muſcu-
lis, ſic & Arterijs ⁱ caret, excepto ramo illo quem R
notauiſimus.

g Non memi-
nit, Colum-
bus.

h 3. adm. a-
natom. 4.
i 16. uſ. part.
vlt.

DE NERVIS MANVS.

C A P. XXV.

De his egit Gal. 3. adm. anat. 3. & 4. at 16. uſ. part. 8. oſten-
dit quare natura miſtiones fecerit in neruis & quo-
modo ad extremam manum ferantur, & obiter lib. de
peruorum diſſ. 15. & 16.

MANVS cum inſtrumentum ſit inſtrumento-
rum, hoc eſt inſtrumentum ipſius mentis in
efficiendis inſtrumentis omnibus ex aliqua materia
conſtantibus, ad aliquam hominis commoditatem &
utilitatē ſpectantibus, quò actiones ſuas liberius obire
poſſit, nō ſolum Muſculos motus voluntarij inſtru-
menta & Venas quæ ſanguinē & alimentū, & Arterias
quæ vitā deferūt, obtinuit: ſed etiam Neruos, & quo
vim mo-

a Galeno 3.

adm. anat. 3.

sex nervi brachij qui de spinali medulla in brachium proreptant, quorum duo ramorum solbole, manuum cutim adeunt, quatuor alij per profundiora in omnes totius membri musculos disseminantur ac propagines quasdam tenues cuti transfmittunt.

b à 5. 6. 7. cervicis, 1. & 2.

thoracis sex nervi digeruntur, Ves. nervorum manus paria quinque, tria ad

extremos digitos, duo ad extremam usque ad manum, Columb. brachij nervi sex, Plat. per brachium & manuum totam sex paria disseminantur, Laurent. Sexta coniugatio nervorum medulla spina, inter quintam & sextam vertebra omittitur & derivatur ad scapulas, portio illius insignis. Septima inter sextam & septimam, cuius portio maxima in brachium porrigitur: reliqua ramulorum portione in caput, cervicem & diaphragma diffusa. Octava cuius distributio potissimum fit in cubitum & ulnam nec ultra pergit. Nona in manus extremas totam propeans, cum ad cubiti flexum carne quidem nudum se appulerit, ne forte periclitaretur, inter ossium tumores atque nodos se abdidit, illincq; tuò triplici propagine in manum diffunditur, una quidem intus ad minores digitos, altera in maiores fissata, tertia in summa manus externam regionem inflexa, Archang.

c Vesal. Columb. d 16. v. f. part. 8.

vim motuam ad musculos deferrent, & sensum tactus acerrimum tribuerent. Quare Nervorum paria^a modò quinque modò sex ad manum mittuntur, quæ à spinali medulla, in cervicis & thoracis vertebis contenta ortum ducunt, & quidem ex^b quinta sexta & septima colli, prima & secunda thoracis vertebra. Hi per vertebrarum dictarum foramina communia egrediuntur, qui statim post egressum ad latera vertebrarum uniuntur, mox denuò separantur, denuò coeunt, & postremò separantur, ita ut videatur rete quoddam constituere [vide tab. 17. lib. 3. & huius lib. tab. 13. fig. 3.] vel quid simile cordulis^c quæ in cardinalium galeris cernuntur: qui sanè implexus securitatis gratia^d factus est, quo nervi qui longius ducendi sunt duriores & ad iniurias pellendas fortiores reddantur. Hi nervi sub clavicula feruntur, ad scapulæ processum internum ubi & vena Basilica & Arteria axillaris transeunt: unde non mirum si vulnera hac in parte accepta, periculosissima sint. Sic etiam ex luxatione humeri facilè tabes sequatur. A dicto ergo Nervorum implexa manus seu brachij nervi exoriuntur, qui inter cutim & membranam carnosam prorepunt, in homine multa pinguedine immersis, à quibus membrana cuti pertinacissimè committitur, nec eandem semper magnitudinem, situm &

nume-

numerum^e retinent: in plures tamen ramos posteriores nervi ipso primo distribuuntur: maiores verò nervos, manus internis partib. natura meritò distribuit, siquidem manus actiones omnes per eas obeat.

^f Primus, soboles est rami quinti nervi cervicis [tab. 15. lib. 3. char. 5. & tab. 13. huius libri fig. 1.] qui per humeri sedem superiorem & externam [tab. 13. fig. 1. 2. f] fertur; & in ramos duos diuiditur, altero elatiore, qui ad deltoideum musculum mittitur [tab. 13. fig. 1. 2. h] à

quo & cuti illi instrato ramulus [tab. 13. fig. 1. 2. g] vena humeraria comitatus communicatur. Altero qui ad scapulæ sinum, vena & arteria comite, ad ossis hyoidis musculum coracohyoideum seu secundum, scapulæ sedem elatiorem occupantem abit, & in deltoidis partem & cutim medijs brachij parte superiore [tab. 13. fig. 1. 2. i] & brachij nervum primum [tab. 13. fig. 1. π π] constituit, qui paulo sub medio brachij longitudinis cessat.

Secundus ^g [tab. 13. fig. 1. p] crassior est, & ab amplexu^h quem nervi brachium ingressuri ad vertebrarum latera efformant, principium ducit, per cubiti anteriorem & mediam partem delatus, primum musculo bicipiti, qui cubiti primus est, [tab. 13. fig. 1. c c] dein cum tertioⁱ nervo [tab. 13. fig. 1. 2. τ] post con-

Cccc

iun-

^g Columbus subsequendo pari recensuit, id quod pro secundo & tertio enumeramus quare coniunctionis secundi cum tertio & cum quinto non meminit: ab hoc mitti nervos ad musculos humero famulantes, digitos quinque flectentes, musculum radij quadratum & ubi sub ligamento transit musculus pollicis & qui à quinti musculi tendinibus oriuntur & ad partem illorum qui à postbrachiali exoriuntur: tum in vola manus ut plurimum in nervos quinque quandoque in septem secari: quorum duo per pollicis latera, duo ad indicem, quintus per medium digitum parte interna: at in quibus septem sunt, sextus per externam regionem medijs, septimus per internam auricularis iter habere interim ab his ad cutim circulus pullulare, Columb.

^h Vnde nemo hunc ramum altero pari verè ascribet, cum non uno sed pluribus nervorum paribus textus ille constituatur, Vesal. i. Siue tertius secundo propaginem im-

^e In maioribus vasis & nervis neque numerus, neque situs, neque magnitudo exactè necessariò permanet, 3. adm.

^f Primum par nervum mittit ad musculum i. thoracis, alium ad 2. scapula, alijs ad 1. & 2. cubitum flectentem, inde sub bicipite trāsfit, & post cubiti flexuram vena communi associatur & una ad extremam manum deducitur, varijs ramulis ad cutim missis, Col.

T A B. XIII. *Nervos totius manus proponit fig.*
1. faciem anteriorem fig. 2. posteriorem exprimit fig.
3. nervorum brachium adeuntium
flexum.



FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.



nem imper-
riatur, siue à
secundo quod
verius duco,
ad tertium p-
pago perti-
neat, siue etiā
nullus secundi
cum tertio cō-
gressus fiat, se-
cundus perpetuò
deorsum
cōtendit, &c.
Vesal.

k In duos cras-
sitie impares
ramos secatur
superiorem &
humiliorem,
hic in elatio-
rem & humi-
liorem, Vesal.
in duos secatur
ramos, Lau-
rent.

l Superior &
gracilior, Ves-
m Humilior

& crassior,
Vesal.

n Rami humi-
l oris propago

b: mior, Vesal. o Galenus 3. adm. anat. ab hac propago diffunditur, arteria
adharecens, cuius pulsus tangimus; at Vesal. non agnoscit, quia hac arteria pro-
funde incedit, nerui huius propagines per cubiti superficiem: dein, quia illa ar-
teria, neruum (qui præcipua tertij nerui portio est) alium adharecentem (44.)
habeat.

p Galen. l. c. asserit ab hoc neruo ubi hunc ramulum deprompsit tantam pro-
paginem diffundi & secundo neruo commisceri, quanta nerui secundi sit portio,
& sub anteriore cubiti flexentium musculo deferri: dein addit, se semel obser-
uasse à 3. neruo ad secundum nullam propaginem communicari. Vesalius asserit
se virumque animaduertisse, sed ferè perpetuò in homine à secundo neruo propa-
ginem notanda crassitudinis ad tertium neruum deductam, qua tertius crassior
validiorq; reddebatur.

iunctionem deorsum repens [tab. 13. fig. 1. w] ab ex-
terno latere ramulum [tab. 13. fig. 1. r] musculo ra-
dij, seu supinatori longiori communicat: vbi verò
ad cubiti flexum peruenit, in ramos tres (aliquando
k duos, inferiore rursus bipartito) diuiditur. Verùm
superiorem^l & graciliorem [tab. 13. fig. 1. ab E superius ad
E inferius repens] qui per brachij sedem externam,
cùm venæ humeralis ramo aliquousque delatus, ad
pollicis internodij modò primi, modò secundi se-
dem externam fertur, eamque ramulistenuibus in-
terdixit. Alter^m verò [tab. 13. fig. 1. o] & medius qui
aliquantum crassior & venæ prædictæ ad medianæ
exortum succumbit, secundum cubitum super pan-
niculum carnosum ad carpum vsque obliquo ductu
descendit [tab. 13. fig. 1. Δ supra 44.] Tertiusⁿ infe-
rior [tab. 13. fig. 1. E] qui venæ Basilicæ ramo interio-
ri, cum obliquè magis ppgrediatur, attensus, in cubi-
ti regione in ramos duos scinditur [tab. 13. fig. 1. π Σ]
tandem carpum superans in manus internæ cutim
furculos distribuit: & ab his aliquando soboles ad
pollicis sedem externam, furculis rami posterioris
commixti, pertingunt^o.

Tertius [tab. 13. fig. 2. τ] per cubiti sedem ante-
riorem & inferiorem fertur & sub bicipiti in hume-
ro secundi p nerui ramo [tab. 13. fig. 1. φ] adauctus,
mox

mox diuifus ramulos duos cuti brachij parte anteriore largitur [*tab. 13. fig. 1. v inter τ & χ* :] mox vbi ad cubiti flexuram peruenit, cum quinto pari miscetur [*tab. 13. fig. 1. ch. 43.*] & ad musculos ab humeri tuberculo interno enatos, ramulos mittit: hinc ramum insignem obliquè radio exporrigit [*tab. 13. fig. 1. ch. 44.*] qui comite vena & arteria ad manus sedem internam tripartitus fertur, furculis duobus pollicis, duobus indici & vnum medio elatiore latere communicans: quando verò medius à quinto neruo furculum non recipit, tum medio duos & interdum annulari vnum tribuit.

Quartus 4 [*tab. 13. fig. 1. 2. φ*] qui omnium qui in brachium feruntur crassissimus est, & à neruorum plexu reticulari principium ducens, per cubiti sedem posteriorem, eiusq; partem superiorem humeri tuberculo externo insidens & cum vena profunda & arteria axillari progrediens, ad brachij partem anteriorem & posteriorem se inflectens, musculis cubiti extendentibus [*tab. 13. fig. 2. ψ*] & cuti ad eius articulum ramos duos distribuit, alterum ad partem posteriorem, alterum ad anteriorem [*tab. 13. fig. 2. Ω & ch. 32.*] Tandem iuxta cubiti articulum ad humeri tuberculum externum [*tab. 13. fig. 2. ch. 34.*] modò in duos truncos scinditur, in profundo, vt & ipsorum radix reconditos [*ch. 35. 37.*] modò in tres ramos diuiditur [*ch. 33. 35. & 37.*] quorum exterior [*tab. 13. fig. 2. ch. 33.*] per cubiti sedem externam eam ramulis implicans; obliquè ad carpum descendit, à quibus cutis cubiti sedem externam obtegens intertextitur. Alter verò elatior [*tab. 13. fig. 2. ch. 35.*] secundum radii longitudinem ad manus partem externam delatus [*tab. 13. fig. 2. char. 36.*] furculis duobus in pollicem, duobus in indicem, & vno in medium absumitur. Tertius [*37.*] secundum vlnæ longitudinem descen-

q Quartum
coniugium omni-
bus nervis qui
in manu cer-
nuntur, maius
existit &c.
Columb.

dens, musculus digitos extendentibus furculos impertit [ch. 38. 39. 40. 41.] & in carpi partem anteriorem ad eius radicem [char. 42.] furculis aliquot articulum carpi cum cubito implicans, absumitur.

1 Tertium par nervorum qui manui additi sunt, &c. furculos per primum musculum à quo fit, latus tendo distribuit &c. ad dimidium cubiti in duos ramos inaequales finditur, alter maior qui introrsum, alter minor qui extrorsum fertur, ab interno furculi ad musculos palmarum minimum digitum abducentem, ad eos qui à quinti musculi tendinibus oriuntur, ad eos qui ossibus postbrachialis adheret: dein in tres nervos dissectatur,

nonnunquam in quinque, qui per latera auricularis & annularis deferuntur, in quibusdam in medio digiti medij sistit, mittit ad cutim & ad volam ipsam, quare pars interna manus, adeo acuto & exquisito sensu tactus praedita est. Minor ramus supra brachiale reflectitur, in tres ramos finditur & nonnunquam in quinque per superiora postbrachialis, & per latera auricularis & annularis & medij digiti medietatem, ad quorum extremum deferuntur, Columb.

*1 Quintus [tab. 13. fig. 1. 2. *] à dicto plexu principium obtinens, quartoque attensus, inter musculos cubitum extendentes & flectentes, nullis furculis radio distributis, delatus, per cubiti sedem posteriorem & inferiorem, ubi ad humeri tuberculi sinum internum peruenit (hic aliquando impingentes vel nervum comprimentes stuporem in digitis persentimus) ad cubiti anteriorem sedem nonnihil reflectitur, & musculus ab humeri tuberculo interno & ab ipsa vlna radioque enatis, qui à nervo tertio furculos non accepere, soboles largitur, [tab. 13. fig. 1. ch. 43.] tum progrediens ramo insigni, vena & arteria comitatus, vlnæ attenditur & in cubiti medio in ramos duos dividitur [tab. 13. fig. 1. ch. 45. & 46.] quorum alter internus [45.] per vlnæ sedem internam, inter musculos digitos flectentes deductus, vena & arteria comitatus ad carpum ducitur, & per transversum carpi ligamentum ad volam tendit, furculos duos minimo, duos medio & vnum medico sede interna largitur. Alter externus [46.] ad vlnæ medium, ab externo ipsius latere, inter musculos carpi flectentem & extendentem propaginem educit, quæ secundum vlnam in cubiti sedem externam porrigitur, & ad carpum sede externa minimo duos medico duos & medio vnum impertit. Verum interni, externis maiores sunt, cum externa internis faci-*

facilius lædi possint. Nonnunquam tamen ab hoc furculi in manus sedem internam non distribuuntur: aliquando etiam à tertio neruo, externum latus interioris sedis medij digiti, & internum latus annularis, furculos acquirit, quinto, duas tantum propagines, minimi digiti & vnam annularis internæ sedi, porrigente.

^fSextus [tab. 13. fig. 1. 2. 8] qui crassitie secundo ubi cubitum accedit respondet, per humeri & cubiti anteriorem & posteriorem sedem ad manum vsque perreptat [tab. 13. fig. 1. ch. 47.] & iuxta humeri tuberculum, internum furculos frequentes hinc inde in cubiti cutim distribuit [tab. 13. fig. 1. ch. 48.] qui venæ Basilicæ ramis nunc subijciuntur, nunc verò incumbunt, eiusque finis non procul à carpi cum cubitu connexu existit [tab. 13. fig. 1. ch. 47.]

^fQuintus par
neruorum te-
nue admodum
& cutaneum
venam Basi-
licam comita-
tur & ad ex-
tremam ma-
num desinit,
&c. Columb.

Verum notandum cum quarto, quinto & sexto brachij manusue neruo, sæpè ramulos à quinto pari neruorum capitis prodeuntes (quemadmodum superius monuimus) misceri.

DE OSSIBVS HUMERI ET CUBITI sive radij & ulnæ.

C A P. XXVI.

De his Galenus lib. de ossib. à cap. 16. ad 20. & 1. & 2. de vs. part.

EXPLICATIS totius manus partibus tam continentibus quam contentis, musculis nimirum & organis communibus, ossa enumeranda supersunt. Ossa totius manus triplicia sunt & quidem vel humeri vel cubiti vel manus extremæ.

^a De hoc Gal.
de ossib. 16. &

^a Humeri os, quod ^b ὀστέον Græcis, vnicum est

Cccc 4

[tab. 14. 2. vs. part. 16.

& 17. ^b Humerus Celso, Columb. (qui brachium vocat eam partem, quæ ex humeri,

humeri, radij
 & vlna ossi-
 bus constat,
 Plat. Humeri
 seu brachij os,
 Vesal. Fallop.
 Brachium,
 Laurent.
 c Omnia to-
 tius corporis
 ossium femore
 excepto maxi-
 mum, Galen.
 de oss. in homi-
 nis, tamen ti-
 bia & fibula
 os longius, Ve-
 sal. neque ma-
 gnitudine sa-
 crum, neque
 latitudine
 iliorum ossa,
 neque longi-
 tudine tibia
 superat, Co-
 lomb.
 d In duo diri-
 mitur capita,
 Vesal.
 e Caput ap-
 pendicis inte-
 rius latus cō-
 stituens, Ves.
 caput humeri
 superius glo-
 bosa appendi-
 ce instructum,
 Archang. f Caput appendicis externum latus constituens, Vesal. supra caput ro-
 tundum processus duo eminent, Columb. Plat. g Caput interius ab exteriori di-
 uidit, Vesal.

[tab. 14. fig. 1. & 2.] teres & inæquale, longum ac ma-
 nus ossium^c maximum & scapulæ & cubito articu-
 latum, vtrinque ad extremitates articuli causa pro-
 tuberans: nam parte superiore, qua scapulæ sinui in-
 feritur & per eam diarthroses^e speciem, quæ enar-
 throsis dicitur, inarticulatur, appendice^d donatur,
 [fig. 1. ABFH.] quæ humeri dictum caput^e siue æ-
 πώπιος constituit, quod in eminentiore loco, sede-
 que interna positum est, amplum & orbiculatum,
 cartilagineque incrustatum [fig. 1. 2. ABC] quod ad
 omnes brachij motus in scapulæ cavitare, quæ carti-
 lagine quoque multa amplificatur, circumuerti po-
 test. Ad huius externum latus^f processus duo col-
 lis modo prominent, asperi & inæquales, quo hinc
 ligamenta valida huius articuli educantur, quæ hu-
 merum scapulæ nectunt: quorum alter parte ante-
 riore [fig. 1. D] alter qui maior est parte posteriore
 [fig. 1. & 2. E] situs est, & amborum portio maxima
 in appendice continetur.

Sinus duos^g obtinuit, alterum orbiculatum aspe-
 rum ad capitis latus, ipsum à processibus distinguens
 [fig. 1. FG] cui ligamentum implantatur, alterum
^h externum & oblongum, inter processus duos quos
 distinguit deorsum latum [fig. 1. HI] qui propter mu-
 sculi bicipitis cubitum flectentis principium à sca-
 pulæ acetabulo pronatum, exsculptus est, quo per si-
 num hunc, tanquam per trochleam feratur.

Ima verò humeri pars, ad cubitum, vlnæ & ra-
 dio articulata quæ in infantibusⁱ appendice adauge-
 tur, at

Archang. f Caput appendicis externum latus constituens, Vesal. supra caput ro-
 tundum processus duo eminent, Columb. Plat. g Caput interius ab exteriori di-
 uidit, Vesal.

h In capitis anteriore parte scissura, caput in duas portiones diuidens, Lau-
 rent. i Fallop. obseru. appendice obscura in pueris donatur, Vesal. appendice dona-
 tur quicquid sentiat, Galen. & Vesal. qui opinatus est appendice priuatum, Co-
 lomb. v. Archang.

tur, at temporis successu, ossibus ita vnitur, vt appendicis vestigium nullum conspiciatur, lata est, & admodum varia, partim protuberans, partim excavata existit. Processus enim duos ^k insignes vtrinque, ad orbitæ latera vnum obtinuit, eo quod ossibus duobus articulari debuerit: quorum exterior [P] crassior in caput definit, cartilagine incrustatum, quod radij sinum superiorem subit, anterius locatur, & rotundum est, quo radius in pronum supinumque agatur: hic ad latus externum insigniter protuberat, quo hinc musculi aliquot originem ducant [fig. 1. sub Q] & in lineam inæqualem definit: inter caput & tuber, posterius sinus est [fig. 2. R] qui nerui quarti manum petentis gratia sculptus est. At processus ^m interior [S] qui in viuentibus tactu facile deprehenditur, & introrsum admodum prominet, musculorum educendorum nomine, & incrustatus est: sinus duos iuxta orbitæ latus habet, vnum [fig. 1. T] in anteriore sede leuiter exsculptum, vt neruum tertium, qui manum petit, deducat; alterum in posteriore sede [fig. 2. V] per quem neruus quintus vehitur. Orbita ⁿ vero inter hos duos sinus conspicitur, quæ & trochlea dicitur, cui vlna per Ginglymum articulatur, & motu recto duntaxat mouetur: hæc cum in medio sinum habeat [K] & vtrinque tubera [LM] trochleæ rotulam, ad quam funes voluuntur, refert, quare humeri rotula dicitur [KLM] & sanè pars cavitatis, quæ trochleam imitatur, etiam primo appendix fuit, quemadmodum etiam duos processus cartilago intercessit, quæ post annum septimum offescit, quæ etiam eiusdem cavitatis partem & supercilium exterius perficit: In

Cccc 5 orbi-

^k Processus tres, superior, minor, inferior: maior, medius, prominetior, quod huic duo sinus, vtrinque vnus assistant, Archangel. tria veluti capita inæqualia, at distincta, quæ trochlearum formam ideò effingunt, Col. caput humeri inferius neutiquam globosum sed in tres processus inæquales exasperatum.

^l Externū humeri tuber, Plater.

^m Internus humeri tuber, Vesal. Gal. de oss. 6. externo gradius esse scribit: at Vesal. externū multo maius interiore: Columb.

caput externū maius, internū protuberantius

at processus duo ad vtrumque latus, quorum internus longe maior est. n Pro tertia appendice à curioso Anatomico addi posset, Fallop. obseruat. processus tertius & medius, Archang.

TABVLA XIV. Fig. 1. & 2. humeri ossa,
3. & 4. Cubiti, 5. & 6. vlnæ, 7. 8. 9. 10.
11. radij, 12. & 13. vlnæ itidem of-
sa exhibet.

TAB XIV II

LIB IV



o De brachij
cavitatibus ad
vlnam, 2. v. f.
part. 15.

o 2. v. f. part. et
de off. 16. hu-
meri exterioris
gibbi interioris
simul traditur,
Columbo hu-
meri os sui lon-
gitudine modo
gibbum, modo
simum conspi-
citur, tale for-
ma varietate,
varius muscu-
lorum usus po-
stulauit.

orbitæ sedē superiori sinus duo ° excavati sunt, quos βαθυιδας Hippocrates nominauit, qui squam-
ma duntaxat distinguuntur: quorum alter partem an-
terio[re]m [f. 1. N.] alter amplior & profundior [f. 2. O]
parte posteriore, qui termini sunt ad quos vlnam
moueri oportuit, est præterea hoc os per longitudi-
nem P mediam teres [fig. 1. b.] in lateribus nonnihil
compressum [fig. 1. a. c.] posterius magis depresso,
compressionem obtinens [fig. 2. γ] ad quam neruus
quartus brachij deorsum repit: anterieus vero aspe-
ritas duplex, altera [fig. 1. 2. e] propter musculorum
brachium mouentium, validiorem implantationē
& brachii exortum: in senibus asperitas tanta est, vt
hinc processus quidam enasci videatur, cui deltois
musculus inseritur. Asperitas vero altera [fig. 1. f.]
est, cui bicipitis carnosā pars connascitur: Foramina
parua iuxta capitum & sinuum supercilia, quo liga-
menta aut educantur, aut implantentur, & secundū
ossis longitudinem parte interna nonnulla vt venas
admittant obtinuit. Est deniq; os interius sinu am-
plo excavatum, quo & medullam suam alimentum
contineat, & os læuius sit.

p De off. ca. 17.
deradij & vl-
na situ ac figu-
ra 2. v. f. part.
13. vlna cum
osse brachij cō-
missura ca. 14.
cur ossa duo
sint, & in bra-
chio vnum
cap. 17.

P Cubitus altera manus pars est, quæ inter hume-
rum & carpum, cū quibus vtrinque articulatur, posita
est: & ossibus duobus sibi inuicem incumbētib[us],
& ligamento membraneo commissis, constat, quæ
longa sunt, sed humero breuiora & appendicibus
vtrinque donata. Horum inferius [fig. 3. 4. AB. γ. 6.]
& maius totius nomine sæpe donatur, & cubitus
ωῦνος vlna, barbaris facile maius, dicitur, hoc sinui
[fig. 2. KLM.] in humeri rotula existente per gingly-
mum articulatur, quo per eam articulationem fle-
xio & extensio ¶ fiat.

Proces-

q Capita duo
habet, superius
& inferius

valde dissimilia: illud maius in duos processus acutos turgidum, ex aduerso respon-
dentes semicirculum perfectum efformantes, Archang.

Processus habet parte superiore duos insignes oblongos, & quasi triangulares, angulis obtusis dotatos, qui in foetu vna cum cavitate media, quæ signoides dicitur cartilaginei sunt, ita tamen vt anterior processus vna cum cavitate citissime ossæ reduntur, & appendicis vestigium oblitteretur: posterior vero post septimum annum indurari incipit, & ossi reliquo agglutinari. Horum alter anterior & superior [fig. 3. 5. 13. C] humeri sinum [fig. 1. N] subit & parte interiore cartilagine incrustatur: alter posterior [D] crassior & amplior (quem Hippocrat. ἀγκῶνα, Galenus ὠλέκρανον, Latini giberū vocant) humeri sinum posteriorem subintrat [fig. 2. O] vtri- usque vero processus aspera sedes est [fig. 13. C. D.] quo ligamenta articulum valide ambiant, & musculi aliquot cubiti inferantur, & digitos flectentes inle prodeant, cuius nomine iuxta processus radicem etiam exasperatur [fig. 5. & 13. L] sic & sinus circumferentia aspera est [fig. 13. I. K] quo ligamenta inde prodeant. Nam in horum processuum medio sinus magnus est [fig. 3. 5. E. inter C. D.] humeri rotulam excipiens, qui in semicirculi speciem excavatur & processibus hisce protuberantibus conclusus formā Sigma Græcorum C refert, quare σιγμοειδὴν Galeno dicitur, & cartilagine quoque incrustatur, at quo humeri rotulæ ad amussim congruat, in medio obtuse protuberat [fig. 13. inter FF] ad latera vtrinque comprimitur [fig. 13. GG. HH.] ita vt funi ad rotulam conuoluto conferri possit, quo in hoc cubitus flectatur & extendatur: & ab hac linea protuberante, prohibetur, ne vlna huc illucye dilabatur hinc mutius vtriufque partis ossium ingressus exoritur, quæ articulatio Ginglymos dicitur. Alius adhuc sinus ad

In puerilis interdū appendice donatū, Vesal. superiorem partem cubiti aliqui appendice destituūt, aliqui posteriorem processum parua appendicula donant, ego totam illā partē superiorem cubiti, cartilagineam esse observavi, dū oritur foet⁹, Fall. Cbusto potius quā acuto angulo, tamen si Galen. acutos eos accipiens coronas appellavit, Col. in acutum vergētes νεφῶνας, id est, rostra vel glandes vocatur, Laur. Sic & Fall. obs. & Columb. Athenienses ὠλέκρανον: Diores, ἡΰδεις: Galenus modo ὠλέκρανον modo ἀγκῶνα vocat, qua nomina ab interpretib. confunduntur,

aliquando cubitum reddentes, aliquando vlnam, modo articulum humeri cum radio & vlna & eiusdem articuli flexum.

externū ipsius latus, leuis & cartilagine incrustatus
[f. 5. & 13. l.] qui radij caput excipit [f. 7. 8. 11. m.]

Hinc vlna descendens sensim gracilescit [fig. 3. 4. ab A versus B] & ad caput ceruice tenū augetur [fig. 3. 4. 5. 6. 12. P] & appendice rotunda seu capitulo obtuso, & ad interiora ducto [ysdem fig. Q] donatur; ad quod radius in prouum supinumque aliquousque ducitur: desinit autem in processum acutum [ysdem fig. R] $\sigma\upsilon\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\eta$ à styli scriptorij similitudine * dictum à quo ligamentum pronascitur & articulū carpi cum vlna firmat. Huius etiā appendicis basi sinus alius inæqualis insculptus [fi. 12. S] quī vlnę appendicē à carpo distinguit, cui etiā cartilago iungitur, quæ articulo huic interponitur [fig. 3. 4. 7. 8. 9. 10. T] alius vero sinus oblongus latere externo inter vtramq; protuberantiā insculptus est [fi. 4. 6. 12. V] quō tendinē musculi primī carpū extendentis dirigit.

Est præterea vlna, quā cubito innitimur; aliquos vsque gibba [fig. 6. X R Z] lineæ etiam quaternæ per vlnæ longitudinem extuberant, idque propter musculos carpi, prima quidem [fig. 4. & 6. à z per a, & fig. 1. aa] Secunda, quæ ad carpum magis protuberat [fig. 3. 5. bb *] ad musculi quadrati exortum; tertia quæ acutissima & asperrima [fig. 3. 4. 5. cc] quō ab ea ligamentum radium vlnæ membranæ instar connectens pronascatur: quarta obtusa & modice protuberans [fig. 4. & 6. gg] à qua musculi tres principium ducunt; vsus vlnæ, vt manus citra periculum extrorsum moueri & summa facilitate in aduersum redire possit.

Alterum cubiti os, quod superius & breuius, & totam fere anteriorem cubiti partem occupat [fig. 7. & 8.] $\kappa\epsilon\pi\upsilon\iota\varsigma$ radius, barbaris facile minus: hoc respectu vlnæ obliquum est, eiq; supra infraq; cōmittitur, [fig. 3. hi] ita quidem vt vlna supra radium, infra

u Quod Galen. sensit eiusmodi caput, cū brachiali cōiungi, id nullo modo assequi potui, cum nulla brachialis portio ad infimū vlna caput adhærescat, Columb. x Hunc iudicauit Gal. in extremum brachialis os insigere sic conferre ad manum in obliquum agendam, cum contra hic processus impedimentum sit, ne manus ad eum modum moueri queat, Col. cum carpo articulatur, tū per mediā cartilaginem, tū per acutiā apophysin, quæ $\sigma\upsilon\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ vocatur, Laur. ipsa vero vlna cum carpo per artrodiā, quæ diarthroseos species est cōmittitur videtur.

vero radius vlnam excipiat: at in medio inter se
 magno satis interuallo dehiscunt, [fig. 3. k k] par-
 tim quo radius prompte in supinum pronomque
 agatur, partim quo locus sit musculis cubitum ex-
 tendentibus. y Hoc ex obliqua tenuique ceruice
 [fig. 7. 8. 11. M] capitulo orbiculato depresso [fig. 7.
 11. N] cartilagine ad motionis agilitatem obducto,
 numero per diarthrosin articulatur: verum vbi hu-
 nerum spectat sinum rotundum, sed superficiarium
 [fig. 11. O.] obtinuit, quem humeri caput [fig. 1. P.]
 ubi intrat, ad quod radius vlna quiescente in pronu
 upinumq; agitur. Processum siue tuberculum pau-
 o supra ceruicem habet asperum & abruptum [fig. 3.
 7. 8. 11. q] cui tendo musculi anterioris cubitum fle-
 tentis inseritur, Sic per ipsius longitudinem linea
 cuta & extuberans [fig. 3. 4. 7. 8. rr] fertur, cui li-
 gamentum vlnam & radium coniungens necitur:
 d lineam vero vtrinque os compressum est [fig. 3.
 .ff. & fig. 4. 8. tt] quo musculis cedat, & ipsum os
 iuxta logitudinis suæ medium asperum est [fig. 4.
 .8. n] quo radii musculi duo inferantur. z Radius
 infra ad carpum dilatatur, sinus causa crassescit pro-
 pter carpi a cum cubito articulationem & appendi-
 ce donatur [fig. 3. 7. n] cui sinus geminus cartilagine
 ncrustatus [fig. 9. o] insculpitur, vt in hoc vlnæ ap-
 pendicis capitulum [fig. 5. 12. p] cartilagine etiam ob-
 ductum moueatur. Sinus hic geminus est [fig. 3. 10.
 y] cum carpi ossa duo primum & secundum inarti-
 culantur [t. 15. f. 1. 2. 4. 5. ch. 1. 2.] & vbi hæc duo commit-
 untur in medio modice protuberat [fig. 3. & 10. z] qui
 amen sinus processum quoq; habet [fig. 3. 7. 9. 10. a.]
 præterea appendicis radij pars externa, quemadmo-
 dum & carpi gibba est, cui sinus quatuor insculpti
 unt [fig. 4. 7. d & e ζ n] quo tendines musculorum ma-
 um petentes, certius per annulos deferantur: quo-

y Radius duo
 capita habet
 disparia admo-
 dum, superius
 minus & ro-
 tundius, cerui-
 ce efformatum
 sua appendice
 rotundo muni-
 tum, Columbe
 Archang.

z Inferior pars
 radij capite est
 maiore, Col-
 latum magis
 quam rotun-
 dum, Arch.
 a Per epiphysin
 cum carpi ossa
 maximum di-
 gitū respiciente
 connectitur,
 Laur.

rum quartus [n] leuissime exsculptus, asper tamen, quo ligamentum transversum educat & extuberans, quo tendo muscoli longissimi radium supinantis infigatur: est & alius sinus ibidem radio & vlnę communis [fig. 4. 8] pro tendine musculi paruum digitum extendentis: vtrumque os substantię solidę & durę est, appendicibus exceptis & exiguis foraminulis sparsis, & cavitare medullam continente donatur, hæc quoq; contrario modo se habent, si superiores inferioresque partes perpendas: vlnę enim pars superior crassior, inferior tenuior, contra radij superior tenuior, inferior crassior existit. Vsus denique radij vt manus^a in primum & supinum agi & in

^a Manum sursum, deorsum orbem summa agilitate duci possit.

& ad latera cieri possit, tum precipue vt immoto cubito summa agilitate in orbem circumque ducatur, Archang.

DE OSSIBVS MANVS EXTRE- mę, siue Carpi, Metacarpi, & digi- torum.

CAPVT XXVII.

Vide Gal. lib. de off. 18. at cur carpus ex 8. ossibus, Metacarpium vero ex quatuor factum sit, & de eorum magnitudine figura, duritie & positione, vide 2. vsu part. 8. de horū ossium causa, cap. 10. de articulatione, cap. 11.

MANVS extremę ossa succedunt, quę quadruplicia sunt carpi seu brachialis, metacarpi seu postbrachialis, digitorum & sesamina.

^a Celso, brachiale, Vesal. Col. Archang. ossa carpi (Laurent.) vel prima

Brachiale^a seu *αρπος*, ea manus pars est, quę cubito & postbrachiali articulatur & ossibus octo, duplici ordine distinctis, quo manus magis expedite
ma partis ipsius palma, quę in primo ortu cartilaginea sunt, Fallop. obseruation
^b Vesal. Columb. Plater. Laurent. ex septem ossibus conflat, quoniam autem primum geminum putatur, idcirco octo statuuntur, Archang.

pedite moueri possit, construitur [tab. 15. fig. 3. chart. 5. 6.] quæ magnitudine, forma, situ & consistentia variant, nam in prima generatione cartilaginee sunt non ossa, quæ postea ossæ fiunt, ita ut in adultis dura sint, substantia sunt spongiosa, uti reliqua omnia, quæ ex cartilaginibus in ossa transeunt, ut sunt appendices, pectoris ossa & alia: medulla medica^e plena sunt, quæ ligamentis cartilagineis & validissimis obducuntur & simul (superiora tamen magis quam inferiora) ita constringuntur, ut nisi hæc quemadmodum & membranas refecerit, ^d vnum esse videatur: duas superficies efformant, alteram exteriorem gibbā [fig. 4.] alteram interiorem sinuatā & concavā [fig. 3.] & superius vbi cubito & inferiorius metacarpo^e committuntur, læuia sunt & cartilagine incrustata, & vbi se inuicem contingunt, finibus & capitulis cartilagine lubrica incrustatis donantur: & horum inter se articulatio, ad eam quam Galenus neutram & dubiam appellauit, referenda videtur: ratione enim compositionis diarthrosis, ratione obscuri motus synarthrosis dici potest. Horum quatuor in carpi superiore ordine cubitum spectante [tab. 11. fig. 1. 2. 3. 4. chart. 1. 2. 3. 4.] alij quatuor parte inferiore [ch. 5. 6. 7. 8.] repositi sunt, quæ cum propriis nominibus careant solo numero & ordine dignoscuntur: primum vocantes, quod ordinis superioris latus internum constituit, quod oblongum, est versus interiora curuatum, & radio vna cum secundo posterioris articulatur, & capitu-

c Non prorsus modulla exper-tia, ut quibusdam visum vi sum Vesal.) quamuis exigua sint & dura, non tamen solida prorsus existunt, Columb.

d Hac ligamēta cū nonnulli detrabere minime studuissent, ossicula hac connata prorsus credere. Columb. incerto numero constare voluit, Celsus.

e Ossa carpi per συνάρθρωσιν coniungi asserunt Anatomici, cum primus ordo di-

D d d d

lo se-

ctorum ossium

coniungatur cū secundo eiusdem, laxo articuli genere, in quo adest motus aliquis & satis manifestus, præcipue ad posteriora, Fall. obs. brachialis ossa motu nō carent, nisi nullus illis adsit musculus peculiaris, & ob id obscurus censetur ac sensus notus omnino latet, quare brachialis ossa cum radio per diarthrosin, secum inuicem per synarthrosin cū postbrechialis ossibus, partim per synarthrosin, partim per diarthrosin sunt coniuncta, Col. primus ordo ossiū carpi cū radio & cubito ea diarthrosin specie, quæ arthrodia dicitur, astringitur: at secundi ordinis cum primis ea synarthroseos specie, quæ arthrodia, id est, lenis articulatio nominatur, Archang.

T A B. X V. Figur. 1. & 2. osſium manus fa-
 ciem internam & externam exhibet, 3. 4. 5. 6. of-
 ſa carpi. 7. offa duo pollicis primum articulum.
 8. offa articulum 2. digitorum. 9. offa articu-
 lum 3. digitorum constituentia. 10. Vn-
 gues. 11. ſeſammoida pro-
 ponit.

TAB. XV.

LIB IV

FIG. I.



III

FIG. II.




IIII




VI




VII




V



IX



X



IX

lo secundi ossis sinum latere iateriore subit, quem admodum & altero capitulo maiore & inferiore, sinum à quinto & sexto osse, formatum, antèrius ingreditur: sinum quoq; insignem habet, quo cū secundo osse, caput ossis septimi interius admittit.

Secundum prædicto, cui adiacet minus est, sinui radij appendici insculpto posterius reponitur [*tab. 14. fig. 3. 10. xy.*] cum primo parte anteriore & inferiore, cum septimo iungitur, at parte posteriore, cum tertio superficie plana necitur.

Tertium vlnæ eiusq; cartilagini [*tab. 14. fig. 3. 4. 7. 8. T.*] dein secundo & quarto planis superficiebus iungitur, & inferiore latere capitulo amplo sinum ossis octavi subit.

Quartum os quod rectum ^f dicitur, & omnium minimum & fere rotundum, cum cæteris minus vel cauetur, vel protuberet, hoc capitulo depresso ossis tertij lateri externo committitur: & octavi ossis processui nonnihil inferi videtur, reliqua serie nulli ossi contiguum: at huic superius tendo musculi carpum flectentis inferitur, quemadmodum inferius musculi duo, minimi digiti educuntur.

Quintum quod exterius versus pollicem sinu suo superiore, posterius capitulum primi excipit: quem admodum interius sinu, sexti capitulum suscipit, si-

nu ve-

f Veteres Anatomici rectum appellârunt, et cartilagineum, non quod molle & cartilagineum esse arbitrati sint, cum omnium brachialis ossium facile duriss. & solidiss. sit, sed quod coctum cartilagine obductū

visatur, propter musculorum principia, tendinumq; fines, qui post elixationem cartilaginis molliuscula speciem referunt, quod Gal. 2. v. sup. part. pro octavo recensuisse videtur, Vesal. Octauum à Galeno positum, ultimum est, quod osseum fit: & ideo à veteribus, ut opinor, cartilagineum est vocatum, Fallop. obser. quartum durissimū & pene solidum est, Columb. Huic ossi, quidam, Galeno imponentes id, quod ipse nunquam somniauit, asscribunt in simiis sinum quendam, cui vlna processus styloides aptatur: verum in simiis hoc non reperitur, neq; Galenus sinum hunc unquam in dicto osse somniauit: verum tertio primi ordinis ossi assignat, ubi plane in simiis reperitur, Fall. obseru. Galenus asseruit, ossiculum id sinu quodam pradiū esse, in quē immitteretur processus illa styloides ab vlna capite productus, quod in humanis locum minime habet in simia perbelle obseruatur, Columb.

nuvero inferiore [tab. 15. fig. 3. 6. G] oblongo [fig. 6. ab] interius & exterius magis exsculpto, [fig. 6. cd] capitulum primi pollicis ossis [fig. 1. 2. A] suscipit: quemadmodum etiam portionem ossis quinti metacarpi [fig. 3. 4. 6. e] processum quoque interna sua sede educit [fig. 1. 3. 6. O] quo tendinibus muscutorum digitos flectentium via exhibeatur, & sic cum quarto osse hanc sedem cauam efficit.

Sextum sinu suo posterius, primum excipit, & capite exteriori quinti sinum subit, & capitulo interiore septimo plana pene superficie iungitur & primum & metacarpi os, indici præpositum [3. 4. 6. H] magna ex parte, secundum vero obscure [fig. 3. 4. 6. f] excipit.

Septimum, quod in secundo hoc ordine maximum est (quemadmodum sextum minimum) & ob laxum connexum prompte luxatur, capite suo rotundo, sinum primi & secundi ossis communem subit, sicque primo & secundo iungitur, quemadmodum ab interno latere ipsi sexto, & ab externo capite depresso octauo, laxè admodum articulatur, hoc cartilaginei ligamenti interuentu ipsi octauo quoque committitur, denique & metacarpij ossi secundo h necitur.

Octauumⁱ quod ipsi tertio & septimo cunei modo interiicitur, ad sinistrum latus capite depresso ossi tertio, quemadmodum ad dextram sinu suo depresso septimo committitur: antèius vero lata superficie [fig. 3. 4. 6. K] tertio^k metacarpij ossi iungitur, & sinu quodam [fig. 3. 4. 6. L] quarti ossis metacarpij rotulam suscipit. Processum quoque in Carpi sede interna educit [fig. 1. 3. 6. N] ab externo latere versus internum inclinans ad literæ C modum exsculptum, ut manum cauam efficiat, tendines muscutorum digitos flectentium rectè contineat, & ex

g Primi productionem sustinet, subinde ad tertium vergit, Columb.

h Tertij &

quarti postbrachialis ossium portionem fulcit Columb. ossi tertio, Plat.

i De hoc vide 2. vs. part. 12. k Quarto & quinto postbrachialis ossi, Columb. Plat.

1 Ligamentum apice huius, quemadmodum in quinti ossis proces-
 ex processu o- su ligamentū¹ transuersum carpi nascitur, cui & ossi-
 etano produci- culum sesamoideum adnascitur [figur. 1. 2. M.]
 tur, ac in la-
 tiusculā quin-^m Postbrachialeⁿ μελανόρριον^o Græcis, quibusdā
 ti ossis portione ima palma, pars est manus à carpo ad digitorum in-
 inseritur, Co- dicem, quæ ex ossibus quatuor Paliis quinque consti-
 lumb. tuitur: hi enim pollicis os primum ad postbrachia-
 m De his Ga- lis ossa (quod non vt q reliquorum digitorum ossa,
 lenus libr. de nudum occurrat, sed postbrachialium ossium ritu
 off. 19. lateat) referunt [tab. 15. fig. 1. 2.] Hæc inter carpi &
 n Celfo & aliis digitorum ossa locantur [char. I. II. III. & IV.] qua-
 Græcorum in- re ossibus¹ carpi per σωμα. ὀσσειν¹, seu dubiam arti-
 terpretib. pal- culationem potius, vt digitorum ossibus per ὀσσε-
 ma, quibusdā pectus & pe- ὀσσειν committantur, siquidem omnia metacarpij
 pectus & pe- ὀσσειν committantur, siquidem omnia metacarpij
 eten, ubi Gra- ossa, qua digitos respiciunt, in caput rotundum o-
 corū nonnullis mnos, αἰεῖς ac omnia desinunt, quo subsequen-
 & ἄλκιον: at Ar- tiorum articulorum su-
 chang. postbra- perficiem leuiter excavatam subeant: at inter se com-
 chiale & poli- mittuntur tantū extremitatibus. versus carpi ossa. vbi
 tiores literas se ligamentis cartilagineis connectuntur [fig. 2. P.]
 quætib. pars
 secunda infi-
 maq. palma
 manus.
 o Nonnulli hæc
 voca manum
 vniuersam,
 brachiali ex-
 cepto, intelle-
 ligam-

Columb. p Gal. Vesal. Archang. Laur. q Aristoteli, Eudemio, Celfo, Columb.
 Plat. & quod primum pollicis os, tota forma metacarpi ossibus respondeat, Vesal i-
 mo hoc statim brachiali succedit, & non minus ei committitur, quam reliqua post-
 brachialis ossa, Col. Postbrachiali potius ascribimus, cū una cū reliquis brachiali
 iungatur, palmā constituat, nec inscissa manus parte sicuti vero digiti existit, Plat.
 x Postbrachialis ossa cum brachialis iunguntur per eam synarthroseos speciem, qua
 arthrodia dicuntur: at cum digitorum primis ossibus per diarthroseos speciem, qua ar-
 throdia vocatur, Archang. inferiore parte cū carpo per dubiam articulationem, su-
 periore cum digitis per ginglymum connectuntur, Laur. superiora duo (intelligit 1.
 & 2. hic enarratum) carpi ossibus per ginglymū iunguntur, hæc vero vt & cætera
 digitis quinque inarticulantur ad manifestū motum præstantiū, Plat. [Gal. quod
 secundum Col. & Plat. tertium longissimum est, post hoc vicina duo, Plat.

ligamenta fluunt, quo ossa hæc, laxiore tamen nexu, utrinque iungantur : nam superiores carpi ossibus coarctantur, appendices vero ligamenti cartilaginei interuentu colliguntur : at inferiores quæ grandiores sunt ossibus coalescunt, & capite rotundo & oblongo antrorsum & retrorsum, & ad latera nonnihil deducto, cartilagine obducto, sinum digitorum ossis primi subintrat, sunt aliquatenus teretia, tribus quasi lateribus donata, interioribus duobus in lineâ desinentibus, quo musculis interosseis cedant [fig. 1.] exteriorē vna, manum planam constituyente [fig. 2.]

Interuallum quoque hæc ossa intercedit [fig. 1. 2. R.] quo musculis interosseis dictis locus sit, cui libet enim interuallo duo reponuntur, & ne vola nimia musculorum horum mole impediatur & minus idonea ad comprehendendum reddatur, & locus his sufficiat, ossa hæc interiora versus volam spectantia curuata apparent : quemadmodum ipsorum superficies exterior, gibba existit : ad secundum longitudinem angulosa & lineis extuberantibus musculorum ibi existentium gratia, donata.

Processum quoque primum os vbi carpo articulatur, obtinet [tab. 15. fig. 1. supra char. 6. & 7.] cui musculus carpum flectentium secundus inferitur : sic & quartum os latere externo protuberat [fi. 2. supra M] quo musculus carpi tertius inferatur : & beneficio primi pollicis, quæ alij metacarpij primum faciūt, & quarti ipsius metacarpij vola potissimū caua redditur, reliquis tribus ad cauitatem parum conferentibus. Tandem fistulosa quoque sunt, quo medullam contineant : horumq; vsus est palmam ad commodiorem apprehensionem firmare, quo ea, quæ manu apprehensa sunt, firmitus retineantur.

Quintum minimum subiectū, iisdem motus generibus, quibus pollex, sed minus manifestis mouetur, Plat.

De numero magnitudine & figura ossium digitorum egit
Galen. 1. vs. part. 14. de articulatione mirabili 1. vsu part.
15. & eorum vsu, 1. eiusdem 12.

a Gal. Vesal.
Arch. Laur.
qui pollicis pri-
mum articulu
a metacarpij
ossibus non di-
stinguunt: 14.
Col. Plat. qui
metacarpij of-
sa quinque fa-
ciunt & polli-
cis tantu duo.
b Licet ceteris
manifestius
moveatur, cu
tamen, & 5.
quod minimo
subiicitur, a-
perte satis quo
quemoveatur,
no ob id a post-
brachialis ossi-
bus excludi
debet, Plat.
c Consule Ga-
lenum 1. & 2.
de vs. part. qui
hac quemad-
modum & ma-
nuum nobili-
tatem & sub-
limitatem ita
celebrat, ut o-
mnes legentes

DIGITI qui manus tertiam partem constituunt
ossibus^a quindecim constant: nam & pollicem
triplici osse constare dicimus, cum primi pollicis os-
sis articulatio laxior sit, quam reliquorum metacar-
pi ossium, quare & motus^b euidentior est: singuli
autem ex ossibus ternis seriatim ac veluti in acie posi-
tis constant, quare Græci seriem totam *φαλαγγας* acies
& *συνδαλίδες* a *συνδάλα*, virge forma nominarunt,
ipsa vero ossa nominibus propriis carent, digito-
rum tamen nominibus exprimuntur, ut dicatur
pollicis vel indicis primum, secundum, vel tertium.
Hic autem numerus ad facilitatem & varietatem
motus requirebatur: quod si pluribus^c constarent,
extensionem perfectam & validam vitarent; si pau-
cioribus, tum digiti in tam varias figuras moueri
non possint.

Forma ipsorum externa (vltimis exceptis) gib-
ba & curua est; interna vero plana & quodammodo
fima, partim quia interna manu apprehendimus,
partim quia tendines plures ad partem internam,
quam externam feruntur. Præterea in interna re-
gione lineæ quædam vtrinque per longitudinem du-
cuntur, ut inde ligamenta educantur, quæ annuli
instar tendines amplectuntur, quo firmitus in sua se-
de maneant. Et licet dura sint ac densa, quo manus
ad functiones innumeras iis absque noxa vtatur, sinu
tamen intrinsecus obtinent, qui^d medullam continet.

Magni-

& meditantes in summam admirationem trahat. d Non sunt medulla prorsus exper-
tia, ut Gal. 1. vs. par. arbitrat, Ves. non sunt prorsus solida, ut Gal. placuit. Col.

Magnitudine variant, nam primū digiti cuiusq; os, secundo grandius & crassitie & longitudine & latitudine [tab. 15. fig. 1. & 2.] sic secundum tertio maius est, digitis enim crassioribus, crassiora, longioribus item longiora ossa natura dedit; & licet horum magnitudo eadem non sit, æqualia tamen conspiciuntur, & ad rectam lineam digiti omnis perducuntur, cum ad corpus rotundum apprehendendum operam conferant. Sunt quoque initio latiuscula, sensimque attenuantur, angustioraque fiunt. Hæc autem omnia ad articulum crassiora sunt, quò basibus amplioribus, rectè iungantur: at secundum eorum longitudinem crassitie pari non sunt, ne mole vel pondere incommodent, eorumque tubercula *κόρυμβοι* nodi dicuntur, quemadmodum in partium externarum historia ostendimus.

Appendices quoque supra infraque primi & secundi internodij ossa habent, propter musculorum exortum & insertionem: tertij verò tantummodo supra, nam cum caput extremum alteri non articuletur carni aut vngui iungatur, appendice non eguit: cartilaginibus quoque incrustantur, ut quouis momento prompta & lubrica articulatio fiat.

Primum pollicis os [tab. 15. fig. 1. 2. A] supra sinum oblongum habet, antè & posterius extuberat, quo carpi ossi quinti rotulæ iungatur^f, & manifestè f *Hoc cum 5. carpi osse per arthrodiam diarthroseos speciem coarticulatur, quamvis huiusmodi articulatio pro ratione ossium*

qua parua sunt, ad enarthrosin referri possit, Columb. g Non verò capitis forma occasione etiam circumuertitur, Vesal. circularem motum edit, quamquam Vesalius minimè concedat, Col.

c Col. Fallop. obser. supra infraque appendicum ferè modo nonnihil fungosa sunt, Vesal.

infra verò caput habet, non tamen ad amussim rotundum, quo secundi ossis sinum subit.

Secundum pollicis os, qua tertium spectat, in capitula duo oblonga [fig. 8. GH] anteriore sede vtriusque extuberantia; mediante sinu oblongo [fig. 8. L] diuiditur.

Tertium os sinus duos obtinet [fig. 8. IK] tuberculo oblongo [M.] distinctos, quo ossis secundi capitula excipiant: & tertij ossis tuberculum, secundi sinum subeat; sicque secundum à tertio excipitur & secundum tertium excipit, & sic ginglymos fit amboque ossa ita arctantur, vt tertium os extendi flectique solum possit. Simili ratione reliquorum digitorum articuli iunguntur^h & capita duo sinusque duos obtinent. Verum digitorum quatuor articuli primi, vnico capite & vnico sinu absoluuntur, siquidem Metacarpij ossa singula in vnum caput desinât, quod in manus sedem internam magis spectat & maiori interuallo cartilagine incrustatur; at sinus in digitorum quatuor primo osse orbicularis est, & supra caput illud, os primum flectitur extenditur & in latera mouetur. Ipsum quoque os tertiumⁱ in apicem nonnihil cartilaginofum protuberat & capitulum asperum [fig. 9. Q] obtinet, quo tendo ipsam flectens inferatur: verum & tota sede interna asperum & inæquale est, & ad extremum non vt reliqua eminet, sed vnguibus cedit.

DE OSS-

h Galenus 1. v. part. omnes digitorum articulos ad mutuum ferè ingressum comparauit: Gal. lib. de ossib. eandem articuli speciem omnibus ossibus tribuit dum scribit superioris ossis caput in subsequenti sinum ingredi, Vesal. Sic articulantur vt alia suscipiant

tantum alia tum suscipiant tum suscipiantur, quare Galeni sententia vera non est: nam prima ossa cum postbrachiali per enarthrosin, reliqua per ginglymon iunguntur, Columb. prima digitorum ossa cum postbrachialis committuntur articulis ea, quae species est diarthroseos, reliqua verò ginglymo qui diarthroseos species est, Archang. haec per ginglymon articulantur, Laur.

i Tertia pyramidis formam referunt, Archang.

DE OSSICVLIS SESAMOEIDEIS.

CAP. XXIX.

Galenus 2. vs. part. 12. de his egit & in fine lib. de ossib. horum tantum meminit.

OSSICVLA quæ sesamo^b semini cōparantur & idcirco *συνσάμοες* dñ dicuntur (t. 15. fi. 9.) in digito-um tam manuū quā pedum internodijs sita sunt, & maxima ex parte tendinibus innascuntur & sub ijs atitant, quare in demonstratione tendinum, muscu-orum circa illa ossa sitorum, considerandi veniunt: mō & ligamentis ita implexa, vt nisi ossibus repur-landis accuratē caueris, ea cum ligamentis auferes, hæc cartilaginibus incrustantur & alterius ossis se-tem lubricam contingunt: solida sunt, rotunda, ali-quantulum depressa, aliquando cartilaginosa ali-quando ossea; intus fungosa sunt ac poris scatent, uo succum loco medullæ contineant.

Hæc in singulis manib. ^c duodecim communiter int, vnum articuli internodio tertio, eiusque me-lio præpositum: duo ad secundum ^d pollicis [fig. 1. & 8] duo minora & cartilaginea in primis digitorum uatuor internodijs [fig. 1. T] tendinib. innixa, vtrin-ue ad latera vnum cum tendine duplici flectantur. In aliquis verò articulis secundo nimirum & tertio di-

gito-

a Nonnum car-
pi os numera-
re aliquis pa-
terit, sed non
est numera-
tum ab Ana-
tomicis, sicut
nec aliquod
eorum quæ ον-
οσσεγεῖδῃ (a
sesami legu-
minis minuti
specie) vocā-
tur, quæ mul-
tis manum &
pedum articu-
lis natura ve-
luc anctariū
circumponit,
securitatis gra-
tia; hæc Gal.

2. vs. part. 12.

Ε πνὶ τῶν δα-
κτύλων τρεῖς σῆ-
σε γεγεῖδῃ κα-
λεῖσθαι, hæc
Galen de os-
sib. Ossicula
sesamina cu-
iusmodi sint,
& quibus se-
dibus quotq;
numero in ho-

mine aut etiam simia reponantur, neminem obseruasse, descripsisse scio, Vesal.
^b Ossicula semina, Vesal. Columb. Archang. ossa sesamoidea, Plat. quod parua
modum sint non forma tantum ratione veteres sesami semini compararunt,
Columb.

^c In nonnullis 20. in alijs 15. in quibusdam 10. in alijs plus minusue, Columb. &
Archang. In manu interna & externa deprehenduntur sed in interna multo plu-
s, numerus tamen incertus alijs 12. alijs 16. alijs multo plura obseruauerunt; In ma-
nu enim interna 19. sunt in externa pauciora sunt & minora & minus dura
sunt.

^d Fæno graci seminis molem vix excedunt, Vesal.

gitorum quatuor ad singulos singula cum vno tantum tendine flectantur, medio ipsorum præposita, quæ multo minora [fig. 1. V] & quasi cartilaginea sunt & in manibus, quàm pedibus maiora sunt, verum in senibus & insigniora & quodammodo plana spectantur: in pueris verò adhuc cartilaginea sunt & in tendinibus nõ admodum conspicua. Horum numerus certus non est, ^e vt aliorum ossium, quia nonnulla ita parua sunt, vt in sectionibus non obseruentur.

¶ Tum quia ita parua vt sensum effugientia in ipsis dissectionibus disperdantur: tum quia ex inopia seminis nonnulla natura omittit, tanquam ad corporis fabricam minus necessaria.
Archang.

¶ Ossiculum ex illorum numero quæ sesami seminis imagini assimilantur, Vesal.

¶ Galenus dixit, securitatis gratia: quatuor usus posuere, Col. 63.

¶ Archang. quia internis manus articulis insunt, hoc intro luxari pro-

^f Ossiculum bis adnumerare licet [fig. 12. M] quod subinde in manu iuxta connexum ossis metacarpi, paruum digitum sustinentis ad carpi os octauum conspicitur, quod sedem hic vacuam opplet.

^g Vsus horum quadruplex est: primus in motibus quibusdam, duritie sua ossis impetum sustinere & excipere, cui tendo tali ossiculo munitus prætenditur, nam in digitorum extensione, dum se in articuli spatium nonnihil inserunt, tendinem retinent, ^h ne ab articulo extuberante in motu decidat. Alter ne os cui præponitur facile ex articulo suo recedat & luxetur, impedire, & sic articulis propugnaculo esse. Tertius, interualla quæ inter digitorum ossa vacua remanent replere ad articulationis robur. Quartus, vt manus actionem, quæ apprehensio est, firmiorem & constantiorem reddant. Et hæc de totius manus ossibus sufficiant, de quibus plenius in nostra Osteologia & in cõmentarijs nostris in libellum Galeni de ossibus.

Vngues tandem [tab. 15. fig. 10.] digitis extrinsecus appositi sunt, vt eorum ⁱ apprehensiones firmant, qui nec breuiores nec longiores quam digitorum summi-

hibent, dum manum vehementius extendimus, quæ verò exterius locata sunt, ne in flexione extrema foras luxentur, impediunt, Laur. h Hunc veriorẽ usum credo, quare in omnibus tam manus quàm digitorum articulis se offerunt, Plat.

i 1. vs. part. 9. sed de vnguibus vide 1. vs. part. 9. 8. 10. 11.

summitatibus^k conueniebat, quare vbi excrescunt^k Galenus l.c.
 abscindi solent, ne apprehensioni obstaculo sint, de^{ex Hippocra-}
 quorum natura alibi acturi sumus. ^{tis sententia.}

DE PEDIS PRÆSTANTIA

figura & compositione ac vsu.

CAPVT XXX.

De pede Galenus toto lib. 3. de vsu partium scripsit.

MANVS homo animalium solus habuit, veluti
 Morgana animali sapienti conuenientia, lubet
 nim cum Galeno^a, qui diuinissimè hæc tractauit, ^{23. vs. part. 1.}
 oqui: bipes verò ipse solus inter pedestria erectus
 actus, quia manus habuit: animalibus verò brutis,
 um prona incedant, crura anteriora, posterioribus
 venè similia facta sunt, quod ipsis ad velocitatem cō-
 fert: at homini anteriores artus manus factæ sunt.
 Nam si velocitate opus sit, equo vti potest, quem sa-
 pientia & manibus dōmare potest: quare multò me-
 ius fuit eum organa habere, ad omnes artes necessa-
 ria, quàm vt ijs ad velocitatem vtatur. Nam quod de
 Centauris^b Pindarus refert, qui præter crura qua- ^b Cur homo
 uor etiam manus habebant, tanquam fabulosa & ad ^{talis fieri non}
 electionem scripta, missa facimus: talis enim ho- ^{potueris vide}
 no saltim velocitate in planis vti, neutiquam verò ^{3. vs. part. 1.}
 omnes locorum difficultates superare posset: neque
 manibus commodè vteretur, anterioribus cruribus
 domnes actiones impediētibus, nec ad artem qua-
 emcunque exercendam commodus esset. Nam si
 quod animal manibus recte vsurum est, nullum im-
 edimentum in pectore prominens nec innatum
 nec acquisitum habere debet.

Iam verò^c solus animalium homo rectus est &
 stare ^{c 3. vs. part. 2.}
 stare hominem vt ad cælum promptè suspiciat & dicere possit respicio aduer-
 u olympum fronte intrepida, hominum est qui nunquam viderunt piscem & ego-
 οὐδὲ ποῦ

*monet: hic namq; vel in-
nitus cælum
semper aspi-
cit: homo au-
tem nisi collū
reflexerit, cæ-
lum nunquā
viderit: hic
verò reflexus
non solū inest
huic animali
sed nihil omi-
nis & asinus
vt omittam
aues longum
collum habentes,
quibus nō
solum facile
est sursum si
voluerint as-
picere, sed
quoquo ver-
sum etiam
circumferre
promptè ocu-
los. Quod ve-
rò nē Plato-
nem quidem
intellexerint
dicentem id
non esse sur-
sum aspicere,
cum quis su-
pinum seipsum
reclinari osci-
tans, sed quā-
ni fallor, men-
te naturam
rerum consi-
derat, turpis-
simū est, Ga-
len. 3. vs. par. 3. d 3. vs. part. 3. c 3. vs. part. 4.*

stare potest, quia ipsi soli secundum rectitudinem crurum spina etiam recta linea extenditur, quare & reliquum corpus cum ipsa spina veluti carina quadam est; & si pedibus firmetur, tunc exactè erectus stat; si verò spinā humi reclinauerit, supinus omnino fiet; reliquorum verò animalium alia magis alia minus prona sunt, & alia medium locum inter prona exactè & plana recta, vt equus, bos, canis obtinent. Et licet aues bipedes sint, cum tamen hæ crura cum spina recta linea non habeant, rectè stare non dicuntur.

Sic & solus ^d homo sedere potest, quadrupedum autem nullum, quia omnia posteriorum crurum flexionem antrorsum habent: anteriora enim membra scapulis eorum, quemadmodum hominibus posteriora verò coxis committuntur, flexiones verò amborum contra, quàm hominibus: his enim priorum quidem retrorsum, posteriorū verò antrorsum fiūt: at in quadrupedib. flexiones ad se inuicem conuersas esse præstabat, contra in homine melius erat manus ad se conuerti, crura verò flexionem in genu retrorsum habere: hoc enim solo modo sedere pulchrè licebat.

Vt autem homo vel rectus staret vel sederet, necessum fuit, quia his duabus figuris egent, qui manibus opificium exercere volunt, nam aut erecti aut sedentes manibus operantur, non verò proni aut supini. Quare natura hominem solum fabricata est, qui erectus stare vel sedere possit, cum illi soli manus dederit.

Quemadmodum verò manus ^e apprehensionis instrumentum est, vt supra ostendimus, ita crus ambulationis est, nec id quidem simpliciter, & vt solum gressili animali conueniens, sed vt maximè sapienti animalī

animali conueniebat: quare crura duo tantum obtinuit, quæ ita constructa esse debuere vt maximè animali bipedi ratione prædito commodum futurum erat. Quare ei pedes non rotundi & duri sicut equis, quod quidem ad velocitatem & patiendi difficultatem facit, sed oblongi lati, molles & multifidi creati sunt; talis enim constructio ad omnes locorum difficultates, & si opus, ad muros sublimes conscendendos aut arbores opportuna est: ad quod sanè præstantum rotunditas incommoda fuisset. Licet enim humani molles sint; calceamenta tamen conficere potest, & priori contrito aliud nouum conficere: si verò homo ungulas contritas haberet, calceamentis affecto, illic claudicaret: imò ob pondus, velocitati obstitissent: imò homo sæpè etiam nudis pedibus vti debuit, quare præstitit eos prorsus detectos esse.

Verum non solum^f oblongos & molles esse satis fuit, sed etiam eam longitudinem & latitudinem habere, & parte infera non nihil caui, superna verò parte gibbi esse debuere. Nam cum ambulandi instrumentum crus sit & quidem ita compositum vt animali sapienti maximè conueniebat, ostendamus saucis, quomodo ambulatio conueniens fiat. Ambulatio per firmationem & motum fit: alterò quilem crure in terram firmato; altero autem circumato, illud pedis hoc totius corporis actio est, quod non solum in ambulantibus sed etiam currentibus fit: sic loca mutare beneficio cruris quod mouetur possumus. Quod verò non cadamus pes in terram fixus efficit: ablato enim pede, licet crura habeamus, neutiquam tamen stare, nec sine baculo ambulare possumus, non quod crurum motus baculo iuuatur, sed ad firmitatem facit, quam prius ex pedibus habebamus.

f 3. vs. part. 3.

Ad fir-

g Testimoniū
eius rei locu-
plex tulerunt
nobis duore-
rum exempla,
qua haud ita
pridem casis
quodam obti-
gerunt: pestis
saeva in sum-
mos pedes gras-
sata, & cru-
delitas prado-
nis circa Co-
racisum Pam-
philia: pesti-
lencia namq;
putrefaciebat,
prado autem
abscindebat
extremos pe-
des ut sine ba-
culo non pos-
sent ambulare
qui in huius-
modi incidis-
sent infortu-
nium. Stare
poterant duob.
mutilis innixi
pedibus, am-
bulare verò
non poterant,
quod totam
molem corpo-
ris vni muti-
lato commit-
tere cogeren-
tur, Gal. 3. vs.
part. 5.
h 3. vs. part. 6.

Ad firmam enim stationem & ampli & oblongi pe-
des requiruntur: nam quibus digiti à niue vel frigore
mortificati exciderunt, hi nec stando nec ambulan-
do nec currendo per plana & leuia à sanis vincuntur,
sed si locū difficilem & maximè præcipitem peram-
bulare oportet, non solum à sanis facilè superantur
sed omnino inutiles & præ illis impotentes. At qui-
bus non solum digiti. Sed etiam planta computruit,
his incessus nō solum in præcipitijs sed etiam in pla-
nitie fallax est. Quod si & tarsus, pars ante plantam
posita corrupta fuerit, non solum tuto ambulare nō
possunt, sed ne stare quidem firmiter. Quare ut ho-
mo firmiter stare & in omnibus locis rectè ambulare
possit, varijs dearticulationib. in pedib. opus habuit.

Quemadmodum enim manus, quò corpora cu-
iuscunque figuræ comprehendere possent, & varios
articulos obtinuere & intus cauæ factæ sunt? sic &
pedes manus instar articulationibus varijs donantur:
caui etiam sunt, quo loca conuexa calcaturi rectè fir-
mari possint, ad quod etiam multiplex diuisio con-
fert, digitis in rectis & obliquis & decliuis vten-
tes. Probauit hoc Galenus exemplo eorum, qui ob-
longas & tenues scalas ascendunt, pedes enim con-
cauitate, lignorum conuexitatem comprehendunt
& digitis ac calcaneo, quam maximè fieri potest ba-
sim rotundam efficit, quo manus instar corpus sub-
iectum comprehendat. Ex his patet quomodo pe-
des, tum tubæ firmitatis gratia tum ad talem firmita-
tem, prælongi, molles & lati optimi sint, tum etiam
quo omnia loca peruadere possint multifidi & in
medio caui facti sint.

Iam verò licet^h multifidos & multorum articulo-
rum fecerit, non tamen omnia manibus similia ha-
bent, alias digitū magnum alijs opposuisset. Verūm
sic firmatas perijsset, quare in vno ordine omnes
consti-

constituit: in cæteris verò manus constructionem imitata: nam quod *ταρσός* vocatur, carpo simile, & metacarpo *μετακάρπυον*, & digitis digitos admodum similes, quæ ex pluribus ossibus tum duris tum parvis composita sunt. At pars pedis ea cui crus totum secundum rectitudinem incumbit ex tribus ossibus compositum, astragalo seu talo, calcaneo & naviformi, quibus ossibus in manu, nulla pars respondet, cum solius basis instrumenta sint, aliæ verò & basis apprehensionis simul.

Pes ergo ut apprehensorium instrumentum quædam manus similia sortitus est, quædam ut ambulatorium: ut apprehensionis instrumentum ex multis varijs ossibus, inuicem multifariam dearticulatis ligamentis membranosis connexis constitutus est: ut quemadmodum in manu digitos quinque, eodem articulorum numero obtinuit, sed in eo discrepat quod pedis digiti una serie positi sint & minores sint quàm in manu cui propter apprehensionem maior longitudo conueniebat, non verò pedibus cum ambulatorium potius sit, & quatenus apprehensorium tanta longitudo, quantam nunc habent satis est. At quia ambulando alterum crus mouetur, alterum vero in terra firmatum corporis molem sustinet, interior pedis sedes altior, exterior verò humilior facta est: altior inquam & cauius, tutioris ambulationis gratia, siue propter securitatem firmationis & certitudinem apprehensionis, si enim æqualis utrinque foret, cum pes versus cruris partem sublimem reperet & inclinaret & cum eo totum crus, sicque ambulantes facile cecidissent: hinc ij quibus altiores non sunt, si errant, aliquando etiam ambulantes locis inæqualibus facile cadunt. Quo verò caua esset hæc pars, calcanei ossis pars anterior tenuior est & angustior & l. digitum minimum recedere videtur, in eundem

usum & basis causa, etiam reliqua ossa, eo modo quo sunt & formata & articulata & ligamentis iuncta fuere^k.

^k Vide 3. us.
part. 7. & 8.

^l De cute pedis eiusq; sensu & natura & de tendine 3. us. part. 11. & 12.

^m Manus inferiores idcirco Archang. nominat, & refert historiā puella Roma annos circiter, 15. nata qua brachiis & manibus priuata pedibus loco manuum utebatur.

At cum pes ambulationis instrumentum sit, ambulatio autem absq; motu fieri non possit, Musculos obtinuit, qui facultatē motiuam à cerebro per nervos recipiunt & ipsorum actionem conseruant; Venas, quæ sanguinem pro nutritione deferunt: Arterias, quæ vitali spiritu & calore perfundunt: denique^l cutim & adipem quæ partes prædictas inuestit coniungit. Quæ sanè cutis sensus particeps esse debuit, quo promptè molesta sentiens animal moneat vt au fugiat, alias sæpè contusa, vulnerata & multis modis ab ijs quæ conculcantur vitiata fuisset: hæc quoque partibus subiectis exactè adhæret, ne vsquam promptè circumuertatur: cuius etiā gratia ad ipsam quoq; tendinis, qui in calcaneo est, pars, ad totam disseminatur. Est præterea mollis & dura moderatè ab utroque excessu recedens ne nimis prompta ad patiens dum, neque nimis difficulter sensibilis sit. Denique pedum maxima est, cum manibus similitudo, ita vt visi sint quidam^m manibus & brachijs carentes pedibus scribentes pennas adaptantes, in summa manuum functiones obeuntes.

Diuiditur pes siue pars ea, quæ est à coxendicis articulo ad digitorum summos apices in partes similes & dissimiles. Dissimiles sunt, Femur *μυρὸν*, pars ea quæ est à coxendicis articulo ad flexuram genu usque Tibia *κνήμη*, seu pars à genu ad calcem, & parvus pes, *πῆξ*: quæ omnia vel pedis magni, vel cruris nomine donantur. At minor pes, in *πυδίσκῳ*, *μελάτ* *πυδίσκῳ*, & digitos subdiuiditur, quemadmodum plenius in lib. de partibus externis conscripto exposuimus. Similes sunt continentes & contentæ. Continentes quatuor communes, cuticula, cutis, pinguedo cum

do cum sua membrana & panniculus carnosus de quibus consule librum primum: propria dici posset musculorum membrana; quæ pedis musculos inue- nit & separat. Contentæ verò sunt Musculi, vasa & ossa, Musculi totius pedis sunt, quinquaginta duo, femoris scilicet vndecim, tibiæ decem, pedis octo, digitorum pedis viginti tres. Vasa sunt venæ & arteriæ, nide & nervos. Ossa in quolibet pede quadraginta duo, femoris vnum, tibiæ duo cum rotula, pedis pariter triginta octo, vtpoteⁿ tarfi septem, pedij quinque; digitorum pedis quatuordecim, sesamina duodecim. his addere possumus sesamina duo in poplite & ossa pars in senibus ad os tessaræ: de his ordine, principio à musculis tibiæ facto.

Et carpio pedion à recentioribus medicis vocatum: digitos autem ipsos digitis modum similes: ha igitur tres partes pedis sunt, qualis & manus, digiti, tarsus pedion.

DE MUSCULIS TIBIÆ.

CAP. XXXI.

De his egit Gal. lib. de diff. musc. 32. 2. ad. anat. 5. 3. vs. part. 16. & 15. eiusdem 8.

¶ Vm femoris musculi priusquam tibiæ remoti sint, demonstrari nequeant, de tibiæ musculis imò agemus, sectionis serie ita expostulante. Est tibiæ pedis altera pars quæ inter genu & pariter in pedem existit, & ossibus duobus (quemadmodum & cubitus) tibiæ & fibula donatur.^b Mouetur tibiæ vel per se vel per accidens: per se motibus

Eeee 2

tribus,

¶ tamen & eum qui in poplite est: Columb. decem quia popliteam addit: Ar. 7. decem quos musc. progressiuos, tibiarios, hoc est, tibiæ cientes vocat. Laur. 7. decem quia Vastum internum, seu aliorum octauum, geminum facit. Plat. notat integram tibiæ mouentes & vnus qui per se tibiæ solum os mouet.

Gal. 3. vs. part. tibiæ extendi dixit, & flexionem triplicem enumerare videtur.

n Galen. 3. vs. part. 6. homines, quod tarsus vocatur, carpo assimile habuerunt &

a Musculi genu de articulationem mouentes nouem sunt non decem, diff. musc. 32. cruris mus-

culos nouem recenset 3. vs. part. 16. ubi tamen & de cimi parui musculi poplitis meminit, Vesal. Fallop. nouem tibiæ statuunt, ad-

videtur: primo retrorsum seu in posterio-
ra sursum ver-
sus exteriora
2. introrsum
sursum 3. recta
in neutrum la-
tus inclinan-
do. Vesalio ti-
bia quiescente
femur rectissi-
ma flexione &
extensione so-
lum agitur: si
enim in latus
ducatur, fe-
moris benefi-
cio fit, Colum-
bo, flectitur &
extenditur se-

tribus, flectitur enim & extenditur secundum recti-
tudinem, quâvis & obliquè versus exteriora moueri
videatur: flectit quinque, extendunt quatuor, vnus
solus obliquè mouet: per accidens, femoris ratione,
tibia ad femoris motum vel in latus vel in gyrum du-
citur: de flectentibus c primo.

I. Tibiæ seu longissimus flectētiumue primus [t. 16.
& seq. f. 1. 2. 4. 7. 8. a] qui anteri⁹ statim sub cute occur-
rit, ab ossis ilij appēdice interiore principio [f. 1. 3. 7. a],
acuto c nerueo carnosioq; exorīt, mox carnosus red-
ditus per femoris interiora decussatim, fasciā f præ se
ferens, gracilis alijs musculis instratus fertur, & iuxta
genu angustior redditus [f. 1. 2. 7. 8. b.] in tendinē ner-
uosum g finit, qui in ossis tibiæ lineā acutā parte an-
teriore & interiore sub genu inseritur [tab. 7 c. insertio
1. 2. 3. musc. tibiæ] vt tibiā^h (quemadmodū & subsequē-
tes duo)

secundum rectitudinem, mouetur etiam obliquè versus exteriora, licet obscurus mo-
tus hic sit, quare Vesalius deceptus, qui motum hunc obliquum; e negat: Plat. per-
ficitur hic motus cum tibia rectissimè tantum flectendo vel extendendo, etsi Co-
lumbus obliquè nonnihil etiam, moueri laxi articuli causa velit: Archang. tibiam
in omnes loci differentias voluntariè duci constat: Laur. flectitur, extenditur ad-
ducitur, abducitur. c Quinque Vesal. Columb. Fall. Plat. Archang. at Laurent.
quatuor qui postici dicuntur quorum tres à tubere ischijs nascuntur, interni duo &
vnus exterior. Internorum prior semineruosus, alter gracilis dicitur: quartus duo
habet capita, alterum à commissura ossis pubis, alterum ab exteriori femoris parte
enascitur, & unico tendine in posteriorem tibia partem inseritur, quem flectit &
adducit intrò: hac tota est descriptio. d 1. Gal. 2. ad. anat. Ves. Col. Fallop. Plat.
Archang. 9. Gal. 3. vs. part. at Laur. sic adducunt tibiam intrò flectentes simul duo
musculi, longus & popliteus. Longus musculorum omnium longissimus ab ilij spina
exortus obliquè in tibiam internam & anticam descendit: hac ille. e Vesal. Col.
Archang. gracili ac carnosio, Fall. f Col. Archang. g Qui non latus sed ad amus-
sim teres est, quidquid Gal. 2. adm. anat. suis fidem, simis asserat, Vesal. hic verè
teres non est, vt Vesal. autumat sed lator, Col. in tendinem latiore degenerat,
Arch. h Tibia sursum ad femur allicitur Galeno: qui motus non solum ab hoc
musculo, sed femur mouentium & tibia musculorum auxilio vnâ perficitur, Vesal.
Galenus hunc tibiam supra tibiam deferre voluit, quod in homine falsum, in simia
verum esse deprehenditur. Columb. tibiam flectit seu in posterio-
ra sursum adducit, Vesal. Columb. Plas. Archang. (qui addit alijs musculis in id concurrentibus) ti-
biam extendit, Fallop. instit. adducit tibiam intrò flectens, Laurent.

res duo) flectat introrsum, simulque sursum eleuet.

II.ⁱ Seu gracilis flectentium^{ue} secundus [*tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 4. 5. 7. 8. β*] qui prædicto quoad ventrem introrsum adiacet, & latus internum occupat; hic ad pubis ossis commissuram, cui adnatus est, principio [*fig. 2. de*]^k nerueo amploque, quanta ferè pubis ossis commissura est enatus: mox angustior sed carnosior redditus per femoris interiora ad genu usq; carnosus delatus, ad femoris caput internum non procul à genu vbi teres redditur, in tendinem^l exactū & teretē definit, quo nonnihil dilatato, in tibiā iuxta primum paulò tamen interius inseritur & ^m eiusdem cum priori vsus. Hic in mulieribus ⁿ obesis, quando femora diducunt, instar ligamenti cuiusdam, vel nerui rigidi apparet cum in illis neruosior sit.

III. Seu femineruosus flectentium^{ue} ^o tertius [*tab. 16. & seq. fig. 2. 3. 4. 5. 6. γ*] & posteriore sede locatus est & à coxendicis ^p tuberculi elatiore sede [*fig. 5. 6. f*] neruosus ^q & gracilis oritur & supra femoris mediū carneus euadens musculum teretem constituit, qui per femoris posteriora & interiora oblique nonnihil descendens ad ipsius caput internum reflectitur, & attenuatur [*fig. 5. g.*] & tendine^r tereti in homine, in simijs nonnunquam lato, in tibiā anteriorem ^s partem (vbi & prædicti duo) inseritur ^t verum huius tendo ad tibiā medium vsque descendit.

Eeee 3

IV. Seu

^o 3. Ves. Col. Fall. Plat. Arch. 6. Gal. 3. vs. part. flectentium internus prior seminervosus, Laur. ^p Gal. à coxendice quatuor musculos, exoriri opinatur cum re ipsa (si de homine loquatur) tres duntaxat exeant, Col. exoriuntur ex coxa pleriq; duo tantum ex femoris superiore parte, Plat. ^q Nerueo principio longo & tereti, Col. Arch. principio angustiore sed nerueo, Plat. ^r Gal. 2. adm. anat. lato: Ves. tereti in simijs ferè latus occurrit, & Gal. nulli magis obliquū ductū assignauit, cum tamē primus, quemadmodum & subsequens, longè obliquius ducatur. ^s Sic Vesal. Fall. in posteriorem sed interiorem tibiā, Col. Arch. ^t Gal. 3. vs. part. vsus, tibiā in internum latus inclinantem flectere: & adm. anat. hoc retrorsum sursum ferri & in orbem circumuolui asserit, Vesal. flectit; & hunc à Galeno propositum motum obimus, at non quiescente femore: Anat. ceteris flectit.

i 2. Ves. Col.
Fall. Plat. Arch.
chang. s. Gal.
3. vs. part. flectentium alter
gracilis è tubere ischij enatus, Laur.
k Vesal. Fallo.
Plat. initium illius latum est, Columb. lato atq; carnosio, Arch.
l Exactum & teretem Vesal. penè teretem & rursus dilatatum, Col. & Archang.
m Hic Gal. 3. vs. part. tibiā ad latus internum ducit: at 2. adm. an. huius auxilio tibiā elatius & interius attollitur: ab Anatom. ceteris flectit.
n Vesal. Plat.

u Gal. 2. adm.

anat. Fallop.

Plat. 5. Col.

Archang. 7.

Gal. 3. vj. par.

flectentium

quartus &

exterior, Lau.

x Gal. perpe-

rudo latum vo-

cat, quia in fi-

nis nulla à

femore ossis

enascens por-

tio, quarto

musculo ad-

miscetur, Ve-

sal. notatu di-

gram carnis

molem adsci-

scit, Columb.

geminus qua-

si, Plat.

y Columb.

z Siue unius

loco aut duo-

rum enumeres

nihil interest,

quanquā Ga-

leni gratia v-

nicum oppor-

tunius statues,

Vesal hic tum pro vno, tum pro duobus numerari potest, Fallop. in-

stit. fortè alius quis musculum unum censeret (scil. portionem illam) sed profe-

cto non est distinctus musculus, Col. a Hic tibiam extrorsum simul cum flexione

abducit & quodammodo inuoluit Gal. vno: at 2. adm. anat. simplici motu in ex-

ternam partem agit, ubi exemplum cursoris refert, cui hunc musculum adimiti ius-

sit, quo adempto, nihilominus velocius currere poterat. At Galenus reprehendit

Columbus, nam si, aut, hunc musculum demas, flexionem rectam efficere nullo pa-

cto poteris: at in cursum rectam fieri flexionem Gal. 2. adm. anat. monuit, imo op-

positum comperi, saucios in hoc musculo, neque magno vulnere, qui luet janati fo-

rent, non sine labore tibiam flectebant: hac Col. ceteri, flectere dicunt. b 5. Gal. 2.

ad. anat. Ves. Fallop. Plat. 4. Col. Arch. c Origo tum carnea tum nervosa est, Col.

Archam. caput prorsus nerveum, non nisi longè sub exortu carneus, euadit & cras-

fescit.

IV. Seu biceps flectentium uel quartus [tab. 16. & seq. fig. 1. 3. 4. 5. 6. 10. 13. d] ex coxendicis ossis sede infima seu tuberculo, principio neruo acuto, illoque graciliore [fig. 6. b] exoritur, mox carnosus redditur & per femoris posteriora exterioraque descendens, ad ipsius medium in sede interna (ubi neruus appareret) carneam * portionem [fig. 6. k] quasi nouum musculum ex femoris medio (in homine non simili) pronatum recipit, quo musculus hic validior efficiatur, cum in parte externa hic vnicus musculus sit, at interius quatuor adsint. Quæ portio musculo, ubi tendinem producturus est, ita cōmiscetur ac si alius hic oriretur [fig. 6. k cum d] vnde pro vno ⁊ vel duobus numerari potest: quæ simul descendencia exteriusque nervosa, in tendinem insignem finiunt, qui in fibulæ ossis processum acutum implantatur [fig. 10. i] Huius quoque tendinis gratia, femoris caput, externum sinum oblongum obtinuit læui & lubrico ligamento incrustatum, a quo tuto vehatur, neue hac obliquè flexus à via aberret.

V. Siue semimembraneus flectentium uel quintus [tab. 16. & seq. fig. 2. 3. 4. 5. 6. 13. e e] qui per femoris posteriora fertur: à coxendis ossis tuberculo seu appendice [fig. 6. m] principio neruo f & acuto propè ter-

tij ca-

tij caput [fig. 6. f] oritur nerveus, qui longo ductu *fescit, hoc sibi præ cæteris corporis musculis permanet, cum præ cæteris corporis musculis ad femoris medium primò carnosus fiat, humiliore- rarum & peculiare vendicans, Ves. & Plat. nervoso principio, Fall. instit.* que sede crassescat, & iuxta genu in tendinem tere- *d Gal. 2. adm. anat. in femoris caput & articuli genus ligamenta in-* rem definat [fig. 6. 4.] quo in tibiæ latus internum ^d, *sertionem tribuit & tibiæ sensim in ex-* ubi primus secundus & tertius non nihil dilatatus in- *teriora circū-* feritur. Et hic in posteriore sede etiam ultra me- *uertit & si ad* dium impensè liuidus, sinum insculptum habet [fig. *caput tenda-* 6. m] cui tertij musculi ^e pars anterior innititur, & to- *tur, cū femore etiam tibiæ* to ductu illi se applicat, vt vnus quasi musculus es- *retrosum &* se appareat. Hæc de flectentibus, nunc de extenden- *introrsum fer-* tibus. *tur: leuiter & obscure genus articulum fle-*

VI. ^f Siue extendentium primus, qui membrano- *ctit: hac Ga-* sus dicitur [tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 4. 7. 8. 7] qui femoris *len.* anteriorem & mediam partem occupat ab ossis ilij *e Ita vt exi-* spina & acutus carnosusque enatus [fig. 1. 4. 7. p] ad co- *stimum tertium musculum cum quinto, vnus musculi vice à multis Anatomicis* xendicis articulum delatus ad cuius regionem tan- *ablatum fuisse, Vesal. f. 6. Vesal. Columb. Fallop. Plat. (cui & brevis) Ar-* tum carneus est, & angustior redditus, iuxta femoris *cham. rariorem inter reliquos musculos naturam adipiscitur, quem Galen. 2. ad.* processum maiorē in exteriori parte in membranā *anat. perfunctoriè descripsit & in lib. de vs. part. latuisse arbitror, Vesal. abdu-* longissimam [fig. 6. q] & latissimam tendinis ^h natu- *situr tibia musculi vnus ministerio, quem membranosum & fasciam latam vo-* ram referens, abit; quo in corpore maior non est & *cant: oritur carnosus principio a spina ossis ilium & oblique in tibiæ externam* cutis instar vel ligamenti cuiusdam transuersi ritu *fertur, suæq; tendine latissimo, omnes ferè femoris musculos inuestit & ad extre-* omnes ferè femoris musculos, sed diuersa crassi- *um usq; pedem excurrit, Laur. Carneus, Columb. Archang.*

Eeee 4

tie cir-

g Ab ilium ossis spina acuto & carnosus principio Vesal. è media appendice ilium ossis principia tum neruo, tum à spina ilium ad latus in lacerti morem, Fallop. instit.

h Tendo hic maxima est nobilitatis propterea chirurgi animaduertant ne il- lum transuersim secant, Columb.

T A B. X V I. *Musculos tibiæ, femoris & pedis
seq. tabula sex exhibent.*

TAB. XVI. FIG. I.

LIB. IV.

FIG. II.

FIG. III.



Anteriori & posteriori sede tenuissima, externo femoris lateri, valida crassaque Vesal. crassior circa medium, in extremitatibus rennuior, Plater.

k In anteriorem partem tibia fibulaeque tandem inseritur, Columb. & Archang.

l 7. Vesalius Columb. Fallopius, Plater. Archang. extendunt tibiā quatuor, reclusus, vasti duo & crureus: vasti duo à mola nomen sortiti: externus quidem à radice tota trochanteris magni & cruris osse subiecto, Laur.

m In superiorem & anteriorem tum tibia, tum fibula partem, quasi amplexu quodam terminatur, Archangel.

n 8. Vesal. Columb. Fallop. Plater. Archang. extendentium tertius seu vastus internus, à trochantere paruo & cruris osse subiecto natus, Laur.

o Vesal. Columb. Fallop. nervosi expullulanti, tum à collo femoris, tum à magno trochantirio, Archang.

tie & circumdat & in sede sua continet (eo modo, quo & cubitum occupantes muscoli obducebantur) & genu articulum obuoluit: hic cum musculorum sequentium tendinibus ad insertionem miscetur, & in tibiæ i sedem anteriorem externumque latus infigitur, vt eam recta extendat, & recta antrotrorsum moueat.

VII. ^l Seu extendentium secundus, qui vastus externus, propter molem dicitur, totusq; liuidus est [tab. 16. & seq. fig. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 13. H] & femoris latus externum & magnum quoque anterioris & posterioris sedis partē occupat: hic à femoris externo latere principio neruo lato amploque exoritur [fig. 9. t] & ipsius processus magni radicem in orbem, cum ei adnatus sit complectens, statim ab origine crassus carnosusque redditus, & sequenti aliqua ex parte instratus, totusque carnosus paulo supra patellam [fig. 9. x] in tendinem amplum membranosumque definit, qui cum duorum sequentium tendine commixtus, ad rotulæ, quam complectimur latæ externum descendens (quam complectitur) in tibiæ m sedem anteriorem statim suo ipso articulo inferitur [fig. 9. u]

II X. ⁿ Seu extendentium tertius, qui vastus internus nominatur, [tabul. 16. & sequent. figur. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. θ] qui ossis femoris amplitudinem pene totam parte interna circumdat: à femoris ceruice, [fig. 10. y] nerueus oritur, statimque carneus redditus, etiam à magni eius processus radice, quasi principium o geminum habent,

portio

portio enascitur: hacque origine ampla & obliqua exortus descendit, sensimque carnosior redditus ad femoris latus internum prope patellam in crassum & admodum carneum semicirculum extuberat, ex quo tendo validus enascitur, qui patellam quoque occupat [*fig. 9. u*] & hanc portionem aliqui musculum distinctum facientes, Crureum *P* vocant, [*fig. 2. 7. 8. 9. Z*] hic cum præcedenti musculo a sinu [*fig. 9. char. 8.*] impense liuidum efficit, quo ei subsequens musculus tota longitudine incumbat.

LX ^r Seu extendentium quartus siue rectus [*tab. 16. & sequent. figur. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. u*] qui flexor tendentium primo extrorsum adiacet, & in medio anterioris sedis positus est, & ilei ossis tuberculo interno, regione anteriore supra coxendicis acetabulum posito, principio nerueo & acuto [*fig. 8. char. 1.*] exoritur, & per femoris longitudinem & antero-raj inter duos prædictos musculos recta delatus sensim carnea substantia auctus supra femoris medium sensim gracilior euadit [*fig. 8. char. 2.*] & in tendinem longissimum & fortissimum supra molam paulo angustior & tenuis finit, at in molæ anteriore sede denuo dilatatus, & duorum prædictorum tendinibus permixtus [*fig. 8. char. 3.*] tibix antè statim sub ipso articulo validissime inferitur: at in simiis caudatis membraneus, quodammodo tibix nullò inferius inferitur, quemadmodum & reliquorum tendines membranosiore & latiores quoque in simiis existunt. Ab hoc trium musculorum tendine patellæ integitur, & imo ipsius anteriori sede adnascitur, & ipsi genu pro ligamento est. Hicque musculus est, qui lacertæ formam, vel piscis ob caudam latam refert, qui à Germanis dicuntur *id est mus*, dicitur, & à quo

P. Sic Syllius: at Laurentio extendentium 4. crureus ossi cruris affixus est, ut brachia? brachio: quatuor hi musculi (intellige subsequentes, quem rectum vocat, vestrum virūq. Crureum) in tendinem unicum cessat, qui molam amplexatus, in tibia principii anticum late inferitur & genu hac parte pro ligamento est. q Vesal. Colu. Fallop. Plater. r 9. Vesal. Col. Fallop. Plater. Arch. extendentiū primus seu rectus à spina externa & inferna ilium oritur, Laur. s Nō ex femoris osse enascitur, ut Galen. voluit 2. adm. anat. & aliter 15. vs. part. 8.

corporistotius musculi nomen sortiuntur, & quo læso necessario moriendum statuunt.

† Prater has omnes est parvus musculus popliteus, qui flectit genu. 3. *us. part. 16. 10. Col. & Arch. in poplite latitans, Vesal. & Fallo. musculus os tibiae, per se mouēs, Plat. alter adductorum popliteus ab inferiore & exteriorē femoris tuberculo ortus, in interiorē tibiae partem inferitur, estq; quadratus, Laur.*

† X. Seu oblique mouens, qui Popliteus à situ nominatur [*tab. 20. & 21. fig. 14. 16. 18. 22*] nam in poplite sub pedis musculo Gastrocnimio & Plantari ossibus proximelatitat, quare non nisi his remotis occurrit: Hic brevis est & tenuis, & à femoris^u capite externo principio nerueo [*fig. 16. char. 4.*] & tereti prodit, qui fibris carnosus auctus, sub ligamento delatus obliquè tibiae ossi superuectus carnosus latusq; in tibiae partem posteriorem interioremque ad eius appendicem inferitur [*ta. 16. char. 5.*] cuius munus tibiam oblique versus exteriora mouere, & vna pedem, cum tibiae ossi præcipuè inarticuletur, introrsum nonnihil versus alium pedem circumuertere; quare præcipuum tibiae flexionis authorem esse, ^x Galenus statuit.

DE

u Ex ligamentorum femur tibia connectentibus uno, qui in externo genu articuli latere habetur, ab huius posteriori parte nerueū musculi principium exoritur, *Ves. Plat. prope caput externū femoris enatus, Fall. origine neruea teretiq; emanat ab externo femoris capite, Col. ab inferiori externoq; femoris capite emergit, & sub ligamento decurrēs, unde à ligamento illo nasci, nonnulli sibi persuaferunt, Archang.*
^x Solus poplitē flectere potest, aut maxima potentia præditus est 2. *adm. anat.* mihi videtur nulla prorsus potentia ad tibiae flectendā valere, cum omnino obliquus & pene transuersus recto motui præfici nequeat, dein adeo est inualidus, ut ne tantillū tibiae sursum vellere possit: ad hac breuissimus est, tenuissimus, nec femoris ossi, nec ilij ossi connascitur: nū commune aliquod munus obit, cum eo musculo superiori, qui radiū in pronū mouet? hac *Ves. Vsu* ut tibiae flectat, ut tradit *Gal. Vesalius* negat ab isto obliquo, inualidoq; musculo fieri posse, neq; tamen ipse quem usum habeat tradit, *Fallo. instit.* tibiam obliquè mouet versus exteriora, licet hoc *Vesalius* inficietur, qui hunc musculum in genu articulatione minus quam recte perpendit: laxa enim est, *Columb.* hic eundem usum habet, quem superior radiū in pronum mouens musculus, cui est omnino assimilis, ut pedem tibia in articulatam introrsum circumuertat, qui motus musculis pedis egregie adiuuatur, *Plater.* tibiam extrorsum, idque obliquus mouet, qui motus fere semicirculum extrorsum imitatur, *Archang.*

DE MUSCULIS FEMORIS.

CAPVT XXXII.

De his vide Gal. lib. de diff. musc. 3. 2. ad an. 4. & 6. 15. vs. par.

8. & 5. adm. anat. 9. Jōas explicat.

FEMUR pars ea est, quæ inter coxendicis articulum ad genu vsq; inter tibiā existit, & osse vno, quemadmodum & humerus constat: quæ pars cum ex voluntate nostra occasione sui capitis rotundi moueatur, & quidem omni motus genere, idcirco musculis & quidem multis opus habuit. His autem agitur vel in rectum, vel in gyrum circumagitur: in rectum, vel in longum, vel in transversum, idque vel extensione, vel flexione. Extenditur, vel nobis stantibus, & deorsum versus terram, modice versus interiora id deducuntibus, vel retrorsum in posteriora femur nobis sursum tollentibus, maxime versus latus externum, idque musculorum quinque beneficio, qui maiori ex parte, partem posteriorem occupant: & horum quatuor primi, coxæ, quintus femori incumbunt.

Flectitur vero, quando femur sursum, antrorsumque tollimus maxime versus latus interius (vt in extensione versus exterius) quod musculis tribus antè sitis perficitur: quorum duo primi in ventris cavitāte siti sunt, tertius femori infidet. Circum-

agitur

lum. decē proponuntur, sed 11. pratermiserunt, & pro quinto variā carnīs molem proponunt, at non musculi diuisionem, sed potius unionem affectare videntur, quare potius dicendum tot musculos esse, quot sunt partes nimirum quatuor, cui & octauus ascribendus, cum quinti pars sit, Fallop. obseruat. decem enumerat, idem in instit. sunt decem, vel si diuidas aliquos, plures, Plat. decem etiam pleriq; scribunt, sed duos orbiculari motui famulantes omittunt, quorum undecimus Fallopio debetur: duodecimum ego inueni, Arantius: decem progressores femorales, hoc est femora in progressionē cientes, sursum deorsum, antrorsum, retrorsum, extrorsum, introrsum, ad hos motus musculi vno motu deorsum excepto, qui per se ob femoris grauitatē obitur, Arch. quatuordecim, flectētes duo, extēdentes tres, adducētes & circumagentes intro tres, abducētes & circumagentes foras sex Laur. qui cum Col. & Arch. femoris musc. tibia musculis pramittit.

aCoxa articuli, musculi 2. adm. anat. ubi obscure & secus quam humana fabrica ostendat, pertractat, Vesal. & 15. vs. part. longē rectius describuntur. b Numerus: musculi coxendicis de articulationem mouentes decem sunt, de dissect. musc. 31. & 2. adm. anat. 4. & 6. extenditur, flectitur, introrsum alteri cruri adducitur, extrorsum in latus ammonetur & circumagitur, musc. 10. aut si in maximū numerum redigantur 14. Vesal. decem Co-

gitur autē, vel ad interiora seu priora, vel ad exteriora seu posteriora musculis tribus, coxendicis sedem occupantibus. Quare musculos vndecim esse censemus, licet plures numerari possint, si quintum in partes, quatuor diuidamus, & ex carneo marsupio, quod decimi musculi tendinem complectitur, musculos duos faciamus, & duodecimum Arantij addamus, tunc enim cuiuslibet femoris septendecim erunt: quæ femur extendent, flectent, circumagent, alterum alteri adducent, vel ab altero abducēt, vel alteri imponent, de quibus ordine.

Extendunt
quinque Ves.
Col. Fal. extē-
dūt tres natiū
anchors maior
medius, minor
Laur.

d i. Vesal. Col.
Fall. Arch. 6.
Galeni vide-
tur, 2. ad. ana.
e Ves. Fall. in-
sit. Plat. à di-
midij ossis iliū
appendice, osse
sacro & coxē-
dice, Col. Ar-
chang. à coccy-
ge, osse sacro su-
perna iliū co-
sta, Laur.

f Exteriori ma-
gni femoris pro-
cessus parti se-
cundū longitu-
dinem oblique
infitur, Ves.
in partem ex-
teriorem & gra-

I. ^c Extendentium primus^d seu Gluttæus maior, quia alterius lateris natem fere efformat [tab. 16. & seq. fig. 3. 4. 8. μ] & sub cute summa crassus & carnosus existit, siquidem cum duobus sequentibus natiū puluinū constituere debuere: hic ab ilium ossis ^e spinæ circumferentia tota, ossis sacri parte humiliore vbi opposito contiguus est, & coccygis principio carnosō lato & semicirculari exoritur [tab. 17. fig. 4. a b c] qui oblique nonnihil descendens coxendicis articulum superuectus (quem integens valentius firmat) gracilior & angustior redditur: & in tendinem validum & latum desinit, qui partim in processus maioris radicem, partim infra ipsum in femoris^f os extrinsecus oblique inferitur. Hic ^g quando totus agit femur refellit, & recta extendit: nam si vnā tantum partem tendat id non æqualiter agit, sed in hoc vel illud latus extrorsum magis mouet.

II. ^h Extendentium secundus seu Gluttæus medius [tab. 17. & seq. fig. 4. 5. 8. 9. V] primo magna ex parte substratus, reliqua parte membrana intectus, forma

dicem trochanteris, Fall. in sit. in maiore trochantera & adhuc inferius in femur, Col. Arch. in femoris os palmū sub trochantere magno, Laur. ^g Retrorsum ac quasi extrorsum in latus magis agit, prout sui principij hanc vel illā partem, aut si simul vinculū colligit, Vesal. femur ducit & retrorsum & extrorsum, Arch. ^h 2. Vesal. Col. Fall. Plat. Arch. extendentium 2. seu medius, Laur. 7. Galeno:

forma similis, sed minor & liuidus admodum, quemadmodum & tertius in corporibus ⁱ gracilibus: at in obesis præsertim mulieribus ^k plerumq; fibræ nerueæ per hos excurrentes pinguedine enutritæ conspiciuntur, quo sic sedentibus stratum commodius fiat. Hic ab ossis ilij costa eiusque regione anteriore paulo demissior quam primus, cuius principio nonnihil cedit, ilijque dorso, principio carnofo lato ac semicirculari [*tab. 17. fig. 5. h i*] nascitur, totam ferè ossis ilij sedem occupat, & oblique descendens sensim angustior fit, musculum prædictum subit, coxendicis articulum integit, & in tendinem latum validum & membraneum definit [*figur. 5. k*] qui in trochanteris maioris anteriorem & elatiorem partem, eam vndiq; cingens transversim implantatur: vt femur extendat & versus anteriora in latus sursum, magis tamen quam prius, trahat & huius fibræ cum prioris musculi fibris decussationem faciunt [*fig. 5. µ cum v*]

III. ¹ Extendentium tertius, seu Glutæus minor [*tabul. 17. & sequent. figur. 6. 10. ξ*] qui totus sub secundo latitat, illoque tanto minor est, quanto secundus primo: hic ab ossis ilij dorso ^m, eiusque sede posteriore ac inferiore, vbi coxendicis os incipit, principio carnofo, crasso & semicirculari vt priores duo oritur [*fig. 6. q s x*] qui deorsum in priora declinans, ligamenti ipsius articuli coxendicis, fibrosis nexibus modice hæret, & angustior redditus in tendinem latum ac robustum cessat, qui trochanteri maiori superuectus, eius parti anteriori & apici, vbi is nonnihil inuertitur, implantatur, [*fig. 6. s*] quo femur modice sursum, & in ⁿ posteriora trahendo extendat.

IV. ^o Ex-

usus femur extendere, sursum attrahere, & ad exteriora ducere, Col. trium munnus femur ducere & retrorsum & extrorsum, Arch. tres extendunt cras, Laur.

i Fallop. in m. sculosus & non insigniter obesis admodum liuidus, Vesal. k Vesal.

1 3. Vesal. Col. Fallop. Plater. Arch. extendentium tertius seu minimus Laur. 8. Galeni videtur. m Ves. Fallop. inst. ab osse ilij. Col. ab appendice ilij, Arch. ab ossis ilij facie externa Laur.

n Ves. magis in posteriora quā sursum, Fall. inst. horū triū

TABVLA XVII. Femoris & tibiæ mu-
sculi potiss. proponuntur.

TAB. XVII.
FIG. IV.



FIG. V.



LIB. IV.
FIG. VI.



o 4. Ves. Colu.

Fal. Arc. Plat.

9. Galeni vide-

tur, qui in si-

mis aliter ac

in hominib. se

offert, Vesal.

p Carnosa &

lato, Ves. Fall.

principio car-

noso, quod &

teres videtur,

Col. Arch. ro-

tundo & cras-

so, Plat. Galen.

diuersum exor-

tū assignat, for-

te ppter lineā,

qua in medio

conspicitur, nā

15. vj. par. ortū

assignat ab osse

sacro: at 2. ad.

anat. oriri à

coccyge asserit:

sed in hoc poste-

riore loco coc-

cygem vocat,

tres vertebrae

ultimas ossis

sacri, Fall. inst.

q Vesal. Coll.

Fal. Plat. horū

quatuor cū ea-

dem sit origo, eadē terminatio, munus idem est. Arch. 11. Gal. videtur. 5. Ves. Fall.

8. Col. Arch. hunc triplicē facit, Laur. his verbis, adducunt crūs, circumagiūt intro

tres, quos pro unico numerant anatomici, eumq; tricipitē vocant. (Aut unū con-

stituto: aut si visum ambas partes duorū musculorū vice enumerato: aut anterio-

rā partē in duos musculos subdividito, tres tamen enarraturus, ita tamē vt memi-

neris in simis caudatis posteriorē huius musculi partē, radici interioris capitis fe-

moris, carnea insertione in homine vero tendine implantari, Ves. mira fibrarū va-

rietate refertus, ac si quis decipere cupiat, nō docere, tres quatuorue musc. pro hoc o-

stendere facile possit: oritur ab osse pubis parte eius interna, & à coxendice, minorē

trochantera amplectitur, deorsum tendit, femori adhaerescens sua illa oblonga aspe-

IV. o Extendentium quartus seu iliacus exter-
nus pyriformis [tab. 17. fig. 5. 6. & tab. 10. f. 13. π] eo quod
offis ilij cavitatē inferiorem & exteriorem, quasi to-
tus situ obliquo impleat & pyrū teretem referat, qui
& liuidus existit; hic à sacri ossis vertebriis tribus infe-
rioribus, siue earū lateribus, quasi parte interna (vbi
nonnunquam suo opposito continuus) carnoso &
rotundo p principio oritur, per transuersum ad ma-
gnum rotatorē carneus defertur, sed antequā femur
atingat, angustior redditur, & in tendinem teretem
finit, qui in trochanterē maiorem id est, femoris ca-
put maximū, posterius iuxta appendicē oblique im-
plantur: vt femur q modice sursum, & in posteriora
trahendo extendat, & eius circumactioni foras parū
(magis tamen quam tertius) auxilio est.

V. r Extendentium quintus, qui triceps rectius
Quadriceps eo q triplici imò quadruplici sit princi-
pio [t. 16. & seq. f. 2. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. pp] hic omniū
totius corporis musculorū crassissimus, mira fibrarū
varietate refertus, ita vt cū huius partes inter se ortu
fibris, insertione tunicis & aliqua ex parte vsu variēt,
vt cum Fallopio loquar, tot esse musculos, i quot i-
psius sint, partes dici posset, ad quem tamen & octa-
uus t, qui ipsius portio videtur referri deberet, suūq;
principium sub tribus capitibus musculorum tibiā
constituentibus situm est [ta. 17. fig. 6. f h m] sed ipsius
descriptionem cum Fallopio subiiciamus.

Pri-

dem sit origo, eadē terminatio, munus idem est. Arch. 11. Gal. videtur. 5. Ves. Fall.
8. Col. Arch. hunc triplicē facit, Laur. his verbis, adducunt crūs, circumagiūt intro
tres, quos pro unico numerant anatomici, eumq; tricipitē vocant. (Aut unū con-
stituto: aut si visum ambas partes duorū musculorū vice enumerato: aut anterio-
rā partē in duos musculos subdividito, tres tamen enarraturus, ita tamē vt memi-
neris in simis caudatis posteriorē huius musculi partē, radici interioris capitis fe-
moris, carnea insertione in homine vero tendine implantari, Ves. mira fibrarū va-
rietate refertus, ac si quis decipere cupiat, nō docere, tres quatuorue musc. pro hoc o-
stendere facile possit: oritur ab osse pubis parte eius interna, & à coxendice, minorē
trochantera amplectitur, deorsum tendit, femori adhaerescens sua illa oblonga aspe-

Primā pars ^u [t. 19. f. 12. est pars musculi ^v] à pubis ossis linea superiore principio neruo orit̃ ac descendens in femoris lineā asperā sub ipsius medio inferitur: à cuius tamē tendine portio tenuis p̃cedit, & cū quarte partis tendine vnit̃, & in femoris caput inferius & internū genus inferitur. Altera pars ^x [t. 19. & 20. f. 13. & 14. ch. 6.] ab ossis pubis ima cōmissura, qua simul iungunt̃ oritur, q̃ carnosā & lata fibris obliq̃s descēdens in femoris lineam parte superiore implantatur. Tertia pars ^y [t. 20. f. 13. ch. 6. f. ch. 7. confer inter se fig. 13. p. 60] à coxendicis appendice, & à tota coxendice in gyrū, circa foramen latū, principio carnosō, & aliquantū neruo orit̃, & fibrarū vario genere constat, ita vt geminus musculus esse videatur, siquidē superiores sint quasi transuersæ, inferiores vero plurimæ oblique: & pars hæc descendens in lineam asperā sub rotatore minore inferit̃. Quarta pars ^z [t. 20. f. 12. & 13. p. u. x. y.] à coxēdicis appendice principio neruoso [f. 13. u.] ac dein carneo [f. 13. x.] oritur & musculum efformant, qui in mirā ventris amplitudinē dilatatur [f. 13. p.] & per femoris posteriora delatus in tendinē teretē [f. 13. sub z.] desinit, qui cū tenui portione tēdinis primę partis in femoris tuberculū internum & inferius inferitur [huius musculi partes tres ostenduntur, t. 19. f. 12. p. u., quæ dependēt t. 20. f. 14. p. 6. 7.] Huius ^a mūn^o licet sit femur adducendo erigere, p̃ partiū tamē diuersitate variū est: pars n. posterioris fibris rectis donata femur stabilit, ac terrę affigit, illud extēdēdo anterioris partis portio posteriōr id quoq; p̃stat, sed modice femur

Ffff 2

ad in-

deatur. Octauum Vesalij musculum quoq; comprehendens, Plat. u à Vesalio non descripta Fallop. obieru quarta pars, Plat. primus adducens & circumagens intro, Laur. x Tertia pars Plat. y Secunda pars Plat. z Prima pars neruoso & carneo principio, Ves. i. pars tribus veluti capitibus exorta, Plat. 4. pars neruoso principio, Fall. obs. a Femur erigit ac femoris rectitudine à brutis differimus, & hic 7. auxiliū p̃stat, vt femur femori cū volumus superimponamus, Col. Partim cruris rectum terra stabilit, partim introrsum agit, femur femori superimponit, Fall. insit. femur introrsum simulq; sursum mouet, & quidem femoris partem infimam, Archang.

raa linea, posteriore carnositate: tandē tendi nē efficit, qui in caput femoris interius inferitur, Col. sic & Archæ. descripsit, at sic Laurent. adductor 1. à cōmissura summa ossium pubis & eorum spina in ossis femoris lineā, sub ipsius ossis medio inferitur: adductor 2. ab ima pubis cōmissura, sub trochantère, primo inferitur: (videtur esse octauus) adductor 3. ab eodē enatus principio in parui trochanteris radicē fertur Laur. t Fall. obseru. quinque initiis prodit, vti & reliquo ductus & insertionē quatuor vel quinque partibus cōstare vi-

b Et flexionis
quodam modo
author eua-
dit, Vesal.

ad interiora ac velut ad aliud femur adducit; sic an-
terioris pars prior femur introrsum ducit ^b & fe-
mur femori superimponit. Hæc de extendentibus,
quibus primario femoris extensio commissa est, qui
tamen femori, dum in latus mouetur & circumagi-
tur, famulantur.

c 4. Galeno 6.

Vesal. Fallop.

instit. Plat. 5.

Col. & Arch.

(cui et lumba-
lis & interior)

1. flexentium,

Laur. hic enim

duos flectere

scribit, psoas et

iliacum.

d Reuera mu-

sculi psoa ab

Hipp. Gal. &

veteribus di-

cti, & à qui-

busdam, aliis

υποψήσιες

& ἀλώπεκες

appellati, duo

illi sunt, qui

sexto loco à

Vesalio nume-

rantur inter

femorum mo-

tores: licet

Clearchus, dor-

sales musculos

exteriores his

nominibus vo-

cari dixerit, in

errore tamē est

Epheſio teſte.

e Vesal. Columb.

Fallop. instit. Plat.

Archang.

f Vesal. Col. Plat.

Arch. & lum-

borum elationibus,

Fallop. instit. à

lumborum vertebris

superioribus, Laur.

g Gal. 2. & 5. adm. anat.

in lumborum musculorum seu carniū enarratione ab ho-

minum compositione aberrauit, Vesal.

VI. ^c Flectentium primus seu lumbalis [*tab. 16.*

& seq. fig. 2. 8. 10. 11. 12. 14. 16. 6.] quem *Ψόας* ^d Hippocra-

tes & Galenus vocarunt, & in abdomine aliquantu-

lum oblique situs est, & intestinis exemptis statim

in lumbis consumitur, teres, carnosus, crassus, vali-

duſ totuſque liuiduſ eſt; hic à vertebris thoracis

^e duabus inferioribus & lumborum tribus ^f superio-

ribus, carneus oritur [*tab. 19. fig. 12. a*] qui mox supra

reliquas lumborum vertebraſ, & per os ilium carno-

ſuſ deſcendens [*ab a ad b*] ſupra pubiſ oſ aliquantu-

lum oblique, & nonnihil extrorſum delatuſ, in ten-

dinem validum ac teretem finit, qui rotulæ minoris

elatori parte anteuſ inferitur ^g, vt femur intror-

ſum agendo ſurſum valide trahat & flectat; & quo

huiuſ tendo tuto deſeratur, nec ab oſſiſ duriſ læ-

datur, vel etiam aberret oſſiſ pubiſ ſinuſ inſculptuſ

eſt; qui ligamento membraneo lœui & lubrico ex of-

ſe pronato obducitur: & quia huic muſculo reneſ

incumbunt, ipſi vero neruſ inſignis, hinc ſit, quod

calculo in renibuſ exiſtente, ſtupor in eiſdem late-

riſ crure perſentiatuſ.

VII. ^h Flectentium ſecundus ſeu iliacuſ inter-

nuſ [*tab. 16. fig. 2. † tab. 18. fig. 10. 11. 12. 16. T*] qui prædi-

cto muſculo ad partē inferiorem contiguuſ eſt [*tab.*

19. fig. 11. & 12. T ipſi e] oſſiſ ilij cauitatem interiorem

totam

^e Vesal. Columb. Fallop. instit. Plat. Archang. ^f Vesal. Col. Plat. Arch. & lum-

borum elationibus, Fallop. instit. à lumborum vertebris superioribus, Laur.

^g Gal. 2. & 5. adm. anat. in lumborum musculorum seu carniū enarratione ab ho-

minum compositione aberrauit, Vesal. ^h 5. Galeno. 6. Columb. & Archang. 7. Ve-

ſal. Fallop. instit. Plat. flectentium 2. ſeu Iliacuſ, Laur.

totam occupat, à cuius regione ⁱ tota tanquam ex semicirculo carnosus latus enatus, paulatim arctior crassiorq; redditus in priora super coxendicis ossis elatiora descendens tendine rotundo [tab. 20. fig. 14. T] in rotatorem minorem, sicut & prior, sed paulo humilior, quam sextus implantatur, & cum eo ^k femur sursum attollendo, flectit, sed hic minus introrsum mouet. Vbi vero supra coxendicem fertur, os cavitatē seu sinum læuem & lubricum huius musculi causa habet, & qua parte sinum contingit, liuidus nerueus & validus est, quo facilius ossis impetum sustineat.

II X. ¹ Flectentium tertius [tab. 16. & seq. fig. 1. 7. 10. 11. 12. v] liuidus quoque est, à pubis ossis linea iuxta eius cartilaginem carnosus & ^m latus, enatus, oblique inter quintum musculū, vt eius portio ⁿ cēseri possit, fertur & in tendinem breuem, ^o latum, amplumq; cessat, qui femoris lateri interiori è regione parui rotatoris inseritur, & ad posteriora vsq; progreditur, quo id flectat, sursum & introrsum valide ducat, & sic femur alterum alteri imponat P.

X. ^q Circumagentium primus, seu obturator externus [tab. 19. fig. 2. 14. 16. φ] prædicto subiacet, & foramen totum quod anterius in pubis & coxendicis osse consistit extrinsecus opplet, formaq; pyrū quoque refert; hic à toto ipsius externi ^r ambitu seu fo-

Ffff 3 rami-

^o Vesal. Fall. instit. exiguum Col. paruum Arch. amplum, Plat. ^p Femur valide introrsum vellit, Ves. flectit, introrsumq; valide ducit, Fallop. instit. femur unum versus aliud trahit, & femur femori imponit, si quis recte consideret; non enim flectendi causa, quemadmodum in hoc deceptus voluit Vesalius, Columb. femur eiet sursum simulq; introrsum, unde alterum alteri imponere potest, Archang.

^q 2. Galenus videtur, quem rursus loco noni recenset, ⁹. Vesal. Columb. Fallop. institut. Plater. Archang. obturator externus vel abductor seu circumagens. ¹. Laurent. is enim scribit, abducere crus & simul circumagere foras sex musculos quadrigeminos & obturatores duos. ¹ Ex ossis & membrana foramen occupantis, amplitudine oritur, carneus, Vesal. à foramine circumferentia, Plat. ab appendice ossis pubis parte externa, Archang.

ⁱ A tota illius appendice, Columb. Arch.

^k Hi duo femur ducunt antrorsum, simulq; sursum ac introrsum, Archang.

^l 3. Gal. 7. Columb. Arch.

^o Vesal. Fallop. instit. pro secundo adducente Laurentius proponere videtur.

^m In similibus causis minor est nec adè lato principio enascitur, Vesal.

ⁿ Oscitanter secantibus femur mouentia quinti portio cēsetur, Ves.


^p hic musculus ipsius quinti etiam pars est, Fall. obs. quinta pars quinti musculi, Plat.

T A B. XIIIX. *Tibiæ & pedes musculi ali-*
quot depinguntur.

FIG. VII.

FIG. VIII.

FIG. IX.



raminis circumferentia carnosus latus exoritur, anteriufq; liuet, & transuerfim ac posterius secundum coxendicis articulum & femoris ceruicē fertur, sensim angustatur, in tendinē validum & amplum cessat, qui in sinum magni rotatoris implantatur, quo

f Circumagitur femur introrsum circumagat & vertat.

foras, Laur.

t 10. Gal. Ves.

Col. Fall. in-

stit. Plat. Ar-

chang. obtura-

tor internus

seu abductor.

vel circumma-

gens. 6. Laur.

u Fallop. inst.

Laur. à totali

nea, que ab in-

terna iliū ossis

sede qua primi

ossis sacri tras-

uerso processui

committitur,

Vesal. ab apē-

dice ossis pubis

parte interna,

Archang.

x Veluti tres

teretes tendi-

nes, Ves. tribus

tendinibus,

Fall. inst. Plat.

tibus, quan-

doq; quatuor,

Et etiā quin-

que Col. in tres

quatuorve,

Arch. variis

tendinibus au-

ctus, Laur.

y Vesalius.

Xⁱ Circumagentium secundus seu obturator internus [tab. 16. & seq. fig. 2. x a c f fig. 5. 6. x supra, char. 9. fig. 13. 14. x] in cōxa pelui latitat, foraminis prædicti partē internam occupat, & priore validior est, & ab illo membrana, cui adnascitur, distinguitur, hic ab interni foraminis abitu^u carnosus & latus exortus, veluti lineis tribus seu inscriptionibus insigniter liuidus apparet, sensim arctatur [tab. 16. fig. 2. a & c ad f] & transuerfim fertur, supra coxendicē extrorsum [tab. 20. fig. 13. x] & supra cauitatem trochleæ instar, efformatum, magnum rotatorē accedens reflectitur & parte qua circumuoluitur carnosus, qua vero sinum tangit, neruosus est, & tribus^x tendinibus [tab. 20. f. 14. st u] teretibus in reflexu ad sinum adaugetur, qui à sese paululum abducti progredientes, vbi sinum præteriēre sede externa seu posteriōre, iterum inuicem collecti tendinem vnicum nerueum constituunt [tab. 20. fig. 13. x & 9.] qui transuerfim ducitur, & in rotatoris magni sinum posteriōrem eiusque radicem cum nouo musculo, vt femur extrorsum circumagat, inseritur. Hoc modo natura musculo robur addidit: si enim totus carnosus fuisset in reflexu, & motu ab ossis duritie læderetur: quare & sinui ligamentum membraneum validum obnascitur, quod læue & humore viscido ad faciliorem musculi circumactum oblitum est. Verum sinus hic lineas duas, leuiter eleuatas ostendit, quæ transuerfim ductæ, velut in sinu tres, tres prædictos tendines diuidunt, quo in hoc

hoc sinu, singuli sinum peculiarem obtineant. Ne
verò tendines huius musculi ex sinu ossis elabantur
statim postquam reflectuntur. Natura providens &
sapiens Marsupium^z carneum creavit, in quo mu-
sculi huius tendo locatur, quod musculos duos. [tab.
21. fig. 16. x x] alterum superiorem, alterum inferiorem
emulatur. Superior [tab. 17. fig. 6. ch. 8.] à coxendicis
ossis processu acuto, quemadmodum & inferior [tab.
17. fig. 6. 13. 14. char. 9. fig. 16. x] ab eiusdem ossis appendi-
ce carnosi & graciles enascuntur, qui ambo, decimū
musculum ad insertionem vsque comitantur^a & si-
mul rotatoris maioris sinui inseruntur, & cum deci-
mo, femoris circumactioni famulantur.

XI.^b Marsupio subijcitur [tab. 20. fig. 14. *] à Fallo-
pio primò explicatus, qui à coxendicis parte poste-
riore satis carnosus & brevis oritur, & tendine valido
& tereti ad femoris exteriorem partem circumdu-
ctus, rotatori maiori posterius, vel in illud spacium,
quod inter vtrumque rotatorem est, inseritur, quò-
temur in gyrum ad posteriora circumagat: & hic in
duos fortè diuidi potest.

Arantius^c postquam vndecimum à Fallopio in-
uentum exposuisset, subiungit & duodecimum his
verbis: resectis à sua origine tibiæ flectendæ auctori-
ous, reque intimius explorata, ecce sub vndecimo
atitatem, alteq; reconditum ac validiorem duode-

Ffff 5

cium

musc. ut tutus incedat, nec ab ossis duritie ledatur: addit non deesse qui musculum
peculiarem à decimo seiunctum contendat, cum decimi musculi portio plane sit.
sic Plat. musc. 10. carnosus partibus inuestitur, semper infra supraq; gracili vna,
aliquando in medio vna, ac si tendo post circumactum in ipsam immitteretur.
Pan. 11. musc. intelligit? a superior ad insertionem vsq; adnatus, inferior ad inser-
tionem vsque exporrectus, Vesal. b Vndecimum prætermisere anatomici, &c.
Fallop. obs. non verò instit. 11. Fallopio acceptus referendus, Arant. in obs. c. 43.

c Laurentius abducentes & circumactores crus sex statuit: quadrigeminos &
bituratores duos: Quadrigemini, sibi omnino similes & parui, situ quasi
versus locati à tubere ischij enati, in trochantera magnū inseruntur: hac ille, quib.
verbis & duos marsupii constituentes & 11. Fall. & 12. Arantij forsitan intelligit.

^z Natura of-
fium sinu non
contenta à su-
periore sinus
parte, unū &
ab inferiore
alterū eduxit
musculum,
qui illum quo
minus sua sede
declinet, quo-
dammodo as-
seruat, Vesal.
idem quoque
carneas por-
tiones 10. mu-
sculo attentas
nominat &
sic 12. muscu-
los constitui
posse, & si
quintum in
tres diuida-
mus, tum 14.
nos habituros
scribit. At Co-
lumbo, marsu-
pium carneū
in quo tendo
collocatus 10.

cimum reperio, qui quidem ab anteriore ossis pubis regione qua foramine peruium est, oppositam habet originem, ligamentali tamen membrana distinctam carneoq; ac penè orbiculari principio præditus, in validum & teretem tendonem degenerat, qui per semicirculum ad exteriorem femoris partem circumductus, vnà cum decimo atque vndecimo, sphæricæ femoris motui perficiuntur: hæc Arantius.

DE MUSCULIS PEDIS.

C A P. XXXIII.

De his consule Gal. lib. de diff. muscul. 33. & 2. adm. anat. 7. & 8.3. vs. part.

^a Vesal. Fall. instit. à nouè musculus perficiuntur, secundi enim digitorū tensoris portione pro 9. proponunt. Sic & Columbus qui musculos extremo pede deseruiantes, qui in tibia siti sint, nominat, & 12. esse vel

PES mouetur^a dupliciter, in rectum & in latera in rectum vel longū dupliciter, vel enim extenditur retrorsum, ex situ ipsius transuerso, aliquouſque obliquè versus terram ductus, idque muscutorum quinque beneficio, qui parte posteriore vnà cum secundo & tertio digitos flectente locantur, qui motus nobis vel cuntibus, vel saltantibus perficitur. Vel flectitur antrorsum à tribus musculis, quibus portio musculi, quem alij nonum faciunt, nos verò portionem musculi secundi, qui digitos tendit, censemus, addi potest: & hi parte anteriore latere ramenti exterioris (internum enim tibiæ latus ad suram vsq; excarne

sumum tredecim: addit enim 1. & 2. digitos flectentes, 1. & 3. digitos extendentes, quos huc retulerit, propterea quod in tibia quoque siti sint: quare octo tantum pedis agnoscit. ^a Plat. pedem mouent musculi octo. & pars musculi pro vno numerata: Archang. musculos mouentes manus inferiores, qui extendant, flectant, in latera torqueant, ideoq; in orbem ducant, nominat, triplices facit, alios à partibus pedes componentibus, alios à partibus in pedis compositionem non ingredientibus, ut femore, tibia, fibula: & hos duplices facit, alios posteriores qui septem sint, alios anteriores qui quinque in quolibet pede; verum Columbum per omnia imitatur & quatuor digitos mouentes in hanc classem retulit, Laurentio pes flectitur & extenditur, flectunt duo, extendunt quatuor, nam ex flectentium 1. & 3. vnum facit & 5. extendentem omittit.

excarne est) vnâ cum primo & secundo digitos extendente locantur: qui motus non vt prior ita validus est, quare neque tam magnis musculis eguit. In latera quoque mouetur & sic nonnihil circumducitur^b, qui motus cum non tam validus sit, priuatos musculos non obtinuit, sed in latera exteriora ab anterioribus, & latera interiora à posterioribus ducitur.

I. ^c Gastrocnimius internus seu extendentium primus [tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 3. 4. 13. 14. ↓] à femoris capite interno circa^d genu duplici^e quasi principio, altero superiore [fig. 13. b] carneo & lato, altero inferiore & exteriori nerueo & liuido [fig. 13. c] exoritur: & illud descendens paulò sub articulo genu cum hoc confunditur, simulq; musculum carneum crassumque efformant, qui circa tibiæ medium, postquam iuxta partem internam [fig. 13. supra e] efformauit, angustior factus in tendinem latum [fig. 13. f] ac nerueum desinit, in cuius tamen medio aliquo vsque adhuc carnosâ portio porrigitur, & cum sequentis [fig. 13. & 14. w] tendine vnitus in simili quidem calcis insertitur: in homine verò subiecto musculo quarto [fig. 14. i] adnascitur, ita vt ab eo ad calcem vsque separari non possit: quare horum duorum tendo cum quarto tendine^e vnum efficiunt, qui calcaneo siue calcis principio [fig. 14. a] inseritur: & hi tres muscoli calcem pedemque sursum ad posteriora trahunt, pedemque terre figunt, seu in posteriora deorsum reflectunt.

II. ^f Gastrocnimius externus, seu extendentium secundus [tab. 16. & seq. fig. 3. 4. 10. 13. & 14. w] à femoris capite externo prodit, priorique omni ex parte similis est, nisi quod primus vltcrius carnosus descen-

^b Vesal. existimat, si musculi anteriores cum posterioribus alternatim contrahantur, in hoc vel illud latus pedem agi. Sic Arch. omnibus succosive agentibus, pes in orbem circumq; quoad fieri potest ducitur: quod autem omnes in actione conueniant, hoc est, omnibus versus suam originem contractis, tum per humo affigitur & stabilitur, Columbus & Arch. ^c Primus Ves.

Col. Fall. institit. Plat. Archang. extendunt quatuor gemelli duo,

dat, soleus & plantaris, Laur. d Supra genu, Columb. ad genu, Fallop. institit. à posteriori, eaq; introrsum versus femur parte, Archang. Vesal. Plat. e Gal. 2. ad anat. reprehendit eos qui volunt duorum primorum musculorum tendines, tertio cuidam commisceri: seq; alteri tamen connexos in calcem inseri: hoc de hominibus verè prodiderunt, Vesal. f 2. Vesal. Col. Fallop. institit. Plat. Archang.

T A B. XIX. *Femoris, tibiae, pedis & digitorum
musculi nonnulli exhibentur.*


FIG. X.



FIG. XI.



FIG. XII.



g Syluio &
Laurentio; ge-
melli, internus
quidem ab in-
terno femoris
capite: exter-
nus autem, ab
externo exor-
itur, hac
Laur.

h Vnus mu-
sculus videtur
duobus prin-
cipijs, nā cor-
pus vnum est,
tendo vnus,
Columb. præ-
ter originem
idem tendo,
eadem caro,
eadem implanta-
tio, Arch.
i De his Vesal-
ius: hoc à ne-
mine notatū,
quod sciam,
præterquam à
Vesalio per
transennā in
administra-
tione dictorū
musculorū:

dat, quod etiam in musculosis citra dissectionem cō-
spicitur: hic cum primo, non procul ab exortu, fi-
brosis nexibus iungitur & ad tibiæ medium connas-
citur [fig. 3d] quare gemellos & nonnulli vocarunt:
qui vbi suræ externam partem efformauit, in tendi-
nem definit, qui prioris tendini ita commiscetur, vt
vnus musculus^h esse videatur, cum venter vnus sit,
tendo vnus, eademque implantatio & hi duo vna
cum quarto suram seu pulpam tibiæ constituunt. At
cum in cruris directione capita illa retrō ferantur, &
sic comprimantur, ne quid mali inde eueniat, singu-
lis principijs, singula ossicula sesaminaⁱ appolita
sunt, vt læui & lubrica sua superficie, qua ex muscu-
lorum substantia emerit & capitum femoris super-
ficiem læuam spectant, cui innituntur, impetum ex-
cipiant, & ne musculi atterantur aut lacerentur im-
pediunt, eisque robur addant.

III.^k Plantaris [tab. 18. & seq. fig. 7. 14. 16. H] sub duo-
bus prioribus in poplite latitat, gracilis est & princi-
pio carneo^l & angusto à femoris capite externo pro-
pè articulum prodit, & obliquè à parte externa, in-
ternam versus descendens dilatatur, sed carnosā par-
te exiguus est, nam mox sub genu in tendinem [fig.
14. 15. 16. p. tab. 16. fig. 2. 4. H] longissimum valdeque te-
nuem & nerueū, quo in humano corpore inter eos,
qui teretes sunt longior non datur, definit, qui quar-
to expansus & validissime illi in progressu nexus, in-
terno lateri sede posteriore^m implantatur; aliquan-
do la-

hos in simiis perpetuo reperi: in homine verò sæpe, alterum deficit, nunc internum,
nunc quoque externum, Fall. pbf. k 3. Vesal. Col. Fall. instit. Plat. Archang. exten-
dentium plantaris qui palmari respondet, Laur. l Ves. nervosus & acutus emer-
git, Arch. m Non autem pedis plantam subit illius musculi modo quem in simia
latum, planè tendinem educere diximus, Vesal. hic in simiis latum tendinem pro-
duxit, vt Galeno placuit, at in nobis in calcem cessat, Col. calci interno implanta-
tur, Fall. instit. Archang. in tendinem per longum degenerat qui ad astragali ter-
gum latefcit, per quod latera pterni in planta totius cutim absumitur, Laur.

do latescit & per calcis latera in totamⁿ plantæ cutim, vt palmaris in manu absimitur. Quando verò deest, vt & palmaris, tum huius tendo à digitorum flexore altero surrogatur. Hicⁿ pedem introrsum vertit & contorquet.

IV. P Soleus [tab. 16. & seq. fig. 2. 7. 14. 16. I] inter pedis musculos maxim⁹ & crassissim⁹ est: prædictis subiacet & qua primi duo illi incumbunt, non secus quàm illi, liuet: hic à fibulæ parte posteriore, quia fibula tibiæ coarticulatur, nerueus & validus oritur, crassiorque factus, latitudine fibulam tibiàmque excedit, & circa tibiæ medium sensim arctatur & paulo supra calcem in tendinem crassum & robustissimum degenerat, qui in anteriore sede longius quàm in posteriori, carniformi substantia enutritur, & cum primi & secundi musculi tendine vnitus [tab. 16. ¶ ω I] calcis parti posteriori, qua eius causa depressa & aspera est, validissimè implantatur q vt pedem extendat & terræ firmet. Verùm quia calcis os extra tibiæ ossis rectitudinem prominet, tendo hic paulo ante insertionē à tibia abscedit [fig. 15. †] & r̄ cavitatem vacuum efformat, per quam etiam laniij^f baculo transmissio integra bruta in macello suspensa, pponunt: hoc enim tendine etiam in homine robustior non inuenitur, & quem Hippocrates chordam^t vocat, vbi ex calcis fractura febres singultuosas & conuulsificas contingere vult.

V. Tibiæus, posticus [tab. 16. fig. 2. 7. 18. 19. K] ossi proximus inter fibulam & tibiæ os sub duob. musculis digitos flectentib. situs est: hic à tibiæ osse & fibula exoritur [f. 18. l] statim carnosus & latus fit, & carnosus ad tibiæ (cuius ossi magna ex parte in longū incūbit)

extre-

a. ad. anat. c. 3. vs. part. aduertit, Ves. r̄ Ves. Pl. t. f̄ Ves. hac cavitās est cui Homerus, Achillem in Hæctoris crure funem traiecisse, illumq. ad currum religatum circa moenia Troia traxisse cecinit: Columb. alt. hoc tendine Hæctorem vinctum fuisse. t̄ De fractis. u Vesal. Columb. Fall. instit. Plat. Archang.

n Detendine
in cutem pedis
inserto vide 3.
vs. part. 11. de
diss. musc. in
musculo ti-
bia 4.

o Col. Fallop.
instit. Arch.
inualidior vi-
detur quā vt
cum quatuor
illis insignibus
musculis in
pedis extensio-
ne conferre
queat, si verò
tantum opus
subire quis cre-
diderit obli-
quo & in in-
ternum latus
motui pedis
suppetias fe-
ret, Vesal. pe-
dem extendit,
Laurent.

p 4. Ves. Col.
Fallop. instit.
Plat. Archang.
extendentium
tertius sive so-
leus à tibia &
perones com-
missura ena-
scitur, Laur.
q In similib.
quodammodo
etiam carneus
calci inseri-
tur, quod Gal.

x Vesal. Col.
adnascitur to-
to ductu, Plat.
super ligamē-
tum illud, de-
currit, Arch.
y In primum
tarsi inferi vo-
luit Galenus
z. adm. anat.
negat, Vesa-
lius. Sub osse
tarsi navicu-
lari vocato,
terminatur in
tarsi ligamen-
tum, Archan.
z Sic & Vesal.
pedem versus
interiore tra-
hit, Columb.
& Fallop. in-
stit. hic in-
trorsum pedes
contorquet,
Archang.
a 6. Ves. Fal-
lop. instit. Pla-
z. anterior seu
octauus pedis
musculus, Co-
lumb. i. ante-
rior, Archang.
flectentium
primus, Ti-
biaus anticus,
Laur. qui fle-
ctentes duos
facit tibiaum

extremam appendicem descendit & ligamēto, q̄ his
duobus ossibus interiacet x adhærescit & fortè exor-
tus sui robur acquirit & in tibiæ media regione à la-
tere interno tantum tendinem teretem nerueum &
validum, qui in musculi substantia aliquousque ini-
tium sumpsit, profert, qui per sinum tibiæ exsculptū
propè malleolum internū sub ipso ligamento trans-
uerso prorepat & obliquè pedis inferiora sub muscu-
lis plantam occupantibus adit [tab. 21. fig. 18. 19. m] &
in y tarso ossis, quod calciformi vicinū est, sedem infe-
riorem validè ipsius processui, huius gratia creato
infitur, vt pedem introrsum trahat: hic quoq; pri-
mo, secundo & quarto suppetias fert, quare pedem
terræ admouet, & interdum in posteriora ducit, vt
summīs z tantum digitis inniti queamus. Hæc de ex-
tendentibus & parte posteriore satis, nunc de fle-
ctentibus seu anterioribus.

VI. a Tibiæus anticus (seu flectentium primus)
[tab. 16. & seq. fig. 1. 7. 8. L] siquidem antè tibiæ ossi
ad latus eius externum adhæret, & inter anteriores
maior existit & lacertam appositè exprimit, muscu-
lisq; digitorū pedis instratus est; hic iuxta b fibulam
vbi tibiæ articulatur, acutus prodit, illic dilatatur,
latere suo interno tibiæ ossis lineæ acutæ committi-
tur & ad tibiæ medium sensim angustatus, multò su-
pra pedem, in tendinem, teretem, nerueum & vali-
dum [fig. 2. & 18. n] & qui aliquando sub cute attolli-
tur desinit, qui sub ligamento transuerso ab appen-
dice inferiore tibiæ fibulæque enatus pedis interiora
adit, & sinu modicè patenti, per tarsum superiorem
delatus in ossis pedij pollicis præposito processui in-
terro

anticum & peronæum bicipitem. b Ex utrisque ossibus & communi illorum li-
gamento, exortus portionem assumit, Vesal. à superiore tibia processu, ortus tendine
unico sed ad finem bifido, in os pedij pollicis præpositum infertur, Laur. ab appendi-
ce tibia propè fibulam, Archang.

terno totus inferitur ^c vt pedem ^d extremum flectat ^c Non enim
& antèrius fursum trahat. Hic quemadmodum & vt Galenus
præcedens vt plurimum ea ^e parte qua sub tarso & voluit in duos
pedio reflectuntur cartilaginem, & sesamoides ossi- tendines diui-
culum à natura ob attritionem collocatum, habent. atur in homi-
ne: at in simiis

VII. ^f Peroneus primus, seu flectentium secun- caudatus non
dus [*tab. 16. & sequent. fig. 1. 3. 8. 9. 10. 12. 16. 18. 19. M*] qui solum duplex
præcedentis musculi lateri externo & toto progressu tendo, verum
committitur & in tibiæ latere externo priuatim re- etiā duo sunt
ponitur: hic à fibulæ appendice superiore parte ex- musculi, quo-
terna carneus ^h nerueusque enatus [*fig. 10. n*] carno- rum anterior
sus redditus, per fibulam cuius lateri aliquousq; con- posteriore mi-
nascitur, incedit; hinc abscedens latere externo li- nor est, ambo
uidus, interno rubicundus & carneus conspicitur, & in pedij os pol-
paulò vltra fibulæ medium deductus, inter vtraq; la- lici præpositū
tera carnea [*fig. 10. p. q*] è medio ferè ipsius corporis implantati,
quod priuatim illi accedit, tendinem validissimum Vesal.
[*fig. 10. r*] sede interna vtrinque carne nutritū pro- d Pedium, &
ducit, qui sensim excarnis redditus & oblique versum præcipue eam
fibulæ appendicis posteriora reflexus, malleoloque pedij partem,
externo [*fig. 10. o*] nudo relicto fissuram malleoli ex- in quam ten-
terni, ligamento transuerso quod à fibula in calcem do infixus est,
talumq; procedit, inuolutus, pertransit & sub planta sursum ducit,
valdè reflexus [*tab. 21. fig. 19. t u*] in radicem ossis pedij ideoq; pedium
quod è regione pollicis est, in ipsius processum, qui flectit & per
in latere externo est: nonnunquam ad illud cui ⁱ me- consequens di-
dius innititur, latior factus inferitur vt pedem sur- gitos pedis qui
sum ex ossibus pedij
innituntur,
Archang.

G g g g

sum ex

^e Fallop. obs.
at in instit.
non meminit.

^f 7. Vesal. Fall. instit. Plat. qui hunc cum sequenti longos vocat: 4. anterior seu
11. pedis musc. Col. 4. anterior Archang. flectentium secundus seu Peroneus biceps.
capite altero à fibula superna epiplysi, altero à medio perones enatus tendinem ge-
minum emittit, Laurent. g Neque inter tibia musc. anteriores, neque posteriores
recenseri deberet, sed priuatim externo lateri reponi autè diceretur, Vesal. Columb.

^h Nerueum, validumq; principium, Vesal. carneo nerueoq; exortu constat,
Columb. Archang.

ⁱ Sic Vesal. & Plat. pollicis aut in illud cui medius innititur, Fallop. instit. in pe-
dij ossa immittitur, Col. Archang. in os pedij è regione pollicis, Laurent.

sum extrorsum ducat & flectat. Verum hic tendo inter ossa & musculos plantæ pedis medius, ducit [fig. 19. t. u] ne si sub cute solum procedat, sursum contractus, musculos in planta sitos comprimatur & in officio impediat: sic in ossis cubiformis sede inferiore sinus latiusculus, nec valdè profundus, humore viscido oblitus & ligamento lubrico circumdatus & quem tendo, non teres ne facilè declinet, sed dilatatus [tab. 21. fig. 19. t] circumducitur, quò firmitus ad finem minime profundum reuoluatur: sic & tendo ibidem ita induratur, vt cartilaginem exprimat, alioquando tendo osseus ac veluti sesamino officulo donatus conspicitur, quò promptius ad angulum acutum flexuræ vim exoluat.

k Vesal. Plat. Galenus 2. ad anat. simiam ab homine duntaxat, in pedis digitorum diductu differre existimant, quod scilicet simia longiores & magis discretos adipiscatur, & insuper quoniam unico tendine tantum hominem vincat, qui ad tarsum reflectatur, cartilagineus inibi fiat, ac in pedis os pollicis prapositum inferi docet: verum in homine tantum profert tendinem qualem

VIII. ¹ Peroneus secundus seu flectentiū tertius [tab. 16. & seq. fig. 3. 8. 9. 10. 18. 19. N] sub præcedenti, tendine ^m excepto, reconditus, ipsique similis, ab eadem fibulæ appendice principio oblongo prodit & carnosus fibulæ attensus descendit, vt vbi fibulam mediam superauit, in tendinem teretem abit, qui versus fibulæ posteriora reflectitur & prædicti musculi tendini lateri anteriori attenditur, & sinui in fibulæ appendicis sede posteriori in sculpto incumbens, & ligamento transuerso circumdatus in priora descendit & ad malleoli exteriorem & inferiorem partem quoque reflectitur & ⁿ scissus & bicornis [t. 19. fig. 10. f] ne extuberaret in pedis ossis, quod digito minimo ^o præponitur processum, validissimè duplici & lata insertione implantatur [t. 21. fig. 19. x] & pedem ^p extrorsum ducit

Galenus priuatim simia tribuit, Vesal. 1. 3. Vesal. Fall. instit. Plat. s. anterior seu 12. pedis musculus, Col. 5. anterior, Arch. flectentis secundi pars, Laur. m Tendinis ipsius anteriore sede exceptam, Ves. sub septimo prorsus occultatus, Plat. n Vesal. Fallop. instit. Plat. ubi una cum quarto in tendinem teretem finit qui inseritur, &c. Col. Arch. o Ves. Plat. in cubiforme os, Fall. instit. in os minimi digiti fertur, Laur. p Exteriora versus trahit, Col. extrorsum contorquet, Archang. flectitur pes & ad latera agitur, Fallop. instit.

ducit & flectit. His nonum addunt Vesalius & Fallopius, [tab. 18. fig. 8. 9. p] qui potius pars secundi digitorum tensoris [tab. 18. fig. 7. 8. 9. P] quam peculiaris musculus existit.

DE MUSCULIS DIGITORUM PEDIS.

C A P. XXXIV.

Galenus hos lib. de diff. muscul. 33. & 2. adm. anat. 9. exposuit.

DE DIGITI quatuor, iisdem penè motibus quibus & manus digiti aguntur, sed pollex non eodem modo quò in manu alijs digitis opposito flexu ducitur, sed eius internodium primum pari ratione cum reliquorum digitorum primis internodijs flectitur, tum eodem ordine situs sit. Mouentur autem vel rectum, vel in latus: si in rectum, tum vel flectuntur versus terram articulis singulis separatim motis, quæ vel recta, digitorum quatuor secundus & tertius articulus & pollicis secundus: vel recta simul & obliquæ, digitorum quinque articuli primi. Si extenduntur fit secundum lineam rectam, & quidem articuli omnes simul: si in latus agantur fit vel extrorsum digitis quatuor ad minimum adductis & minimò à cæteris abducto: vel introrsum pollice à cæteris ab-

a Musculorum digitorum pedis similis ferè series est ac in manu, & iisdem proprijs motibus aguntur, musculis, 22. primi articuli flexus aut rectus est, aut in alterâ partem modicè inclinatus, quare adducuntur & abducuntur; secundum vero pol-

Gggg 2 ris ab-

quatuor digitorum secundi & tertij flexione ac extensione simplici & introrsum latus vergente ducuntur, Vesal. idem Plat. musculi pedis digitis famulantes 22. sunt, quorum alij flectunt, alij extendunt, Columb. musculi mouentes manus inferiores, nati à partibus pedum fabricam ingredientibus, sunt 18. sed ad ea eò oportet quatuor natos à partibus quæ pedis compositionem non ingrediuntur, scilicet digiti 22. numerabuntur, Archang. musculi digitorum 19. sunt, vel si numerum adaugere lubeat 22. flexioni extensionique famulantes, quamvis qui primi internodijs præponuntur, etiam ad latera mouere videantur Fallop. insti flectuntur extenduntur, ad hucuntur & abducuntur musc. 21. flectunt duo, extendunt duo, adducunt 4. abducunt octo, pollicis 4. & digiti minimi abducto. 2. trent.

TABVLA XX. *Femoris & pedis muscu-*
los proponit.

FIG. XIII.



FIG. XV.



FIG. XIV.



ris abducto & digitis quatuor pollicis adductis. Hi motus omnes à musculis viginti tribus absoluuntur, quorum alij in tibia eiusque parte vel anteriore, vel posteriore siti sunt, alij verò in extremo pede locantur.

b 15. digitorum muscul. Vesal. Fallop. instit. Plat. 3. anterior extremi pedis deferuiens, Columb. 3. anterior, Archang. Extenditur pollex duobus, altero à media fibula nato qui sæpè in duos tendines diuiditur, hac Laurent.

c à tibia ossis externo latere, Vesal. à tibia exoritur, Fallop. instit. à media fibula carnosus exilit propè ligamentum,

Columb. Archang. d In neutrum latus insigniter vergens extenditur, Vesal. Extenditur in rectam lineam, Plat. ad ipsum extendendum, Fallop. instit. cum extendit, Columb. & extenditur & flectitur, ideoque sursum attollit, Archang.

e Hic tendo in duos diuiditur, Columb. Archang. sæpè in duos diuiditur, Laurent. f In quibusdam, raris tamen hominum corporibus, alius musculus videtur esse; ego unum solum musculum dicerem, Columb. g Pedi flectendo auxiliū præstat, Columb. huius munus pedum flectere, Archang. h 14. digit. Vesal. Fallop. instit. Plat. 2. anterior extremi pedis, Columb. Archang. extendentium primus qui à summa & externa tibia exortus in tendines quatuor dissectatur, hac Laur.

I. ^b Pollicis tensor, seu extendentium primus [tab. 18. fig. 8. 9. O] in tibiæ anteriore sede cum sequenti cuius lateri interno adiacet, locatus: à tibiæ ^c latere externo, vbi tibiæ os à fibula dehiscit, p̄ncipium carnosum sumit, qui descendens ligamento membranæ tibiæ & fibulæ intercedente toto ductu adnatus, tibiæ sedem anteriorem adit, ac tendine suo tereti sub ligamento transuerso seu annulari [tab. 16. fig. 1. ch. 2.] per pedis superiora pròrepens in pollicis totius longitudinē parte superiore vt eum ^d extendat, inferitur. Aliquando ^e tamen tendo in duos diuiditur, & alter in pollicis articulum vltimum, alter in os pedis, vt id flectat & inferitur: hicque posterior in quibusdam musculus ^f distinctus esse videtur.

II. ^h Digitorum tensor seu extendentium secundus [tab. 16. & seq. fig. 1. 3. 7. 8. 9. P] in tibiæ anteriori sede locatus & sub sexto pedis musculo reconditus à tibiæ summa & extrema appendice, qua fistulæ sub genu connectitur, initio acuto & neruco [tab. 18. fig. 8. ch. 10.] & statim carneo reddito exit & recta secundum fibu-

fibulam descendens in medio versus pedem descen-
su carnosam portionem [*tab. 16. & seq. fig. 1. 8. 9. p*] à la-
tere externo diffundit, quæ deorsum protensa pedis
musculum nonumⁱ quibusdam dictum constituit; i *Vesal. tendi-*
mox vltterius deorsum latus, sub ligamento transuer- *nem illum in*
so tibiæ sedem anteriorem occupante [*tab. 16. fig. 1. ch.* *externa parte*
2.] cui adhæret, ad fibulæ finem in tendinem dege- *producit quem*
nerat [*tab. 18. fig. 8. char. 12.*] qui antequam ligamen- *9. musculum*
tum annulare transeat in tendines teretes quatuor *pedis dixi-*
abit, qui distracti & per pedis superiora delati ad di- *mus, Fallop.*
gitos quatuor (pollice excepto) pertingunt & per *instit. ad finem*
totam eorum longitudinem exporrecti latioresque *ferè fibula car*
redditi, parte superna inseruntur, vt digitorum qua- *nosa huiusce*
tuor articulos tres simul extendant. *musc. radix*
est, Columb.

III.¹ Pollicis flexor seu flectentium primus [*tab.* *gressu pedis*
16. & seq. fig. 2. 7. 16. 17. Q] qui cum sequenti in tibiæ *educit muscu-*
posteriore sede sub musculis suram constituentibus, *lum, Plat.*
totus propemodum carneus, situs est, à parte poste- *1 2. digit. Ves.*
riore ad ipsius fibulæ, cum tibia connexum, carnosus *Fallop. instit.*
prodit [*fig. 16. ch. 13.*] & fibulæ aliquandiu adnatus, *3. digit. Plat.*
tibiæ extremum adit, & ab interno latere tendo (qui *7. extremi pe-*
aliquandiu in carne pronasci [*tab. 21. fig. 16. w*] con- *dis in tibia,*
spicitur) teres prodit [*fig. 16. 17. char. 14.*] qui ad cal- *Col. Archan.*
cis latus internum vbi sinus ipsius gratia exsculptus *pollex peculia-*
& ligamento transverso obductus, obliquè sub mal- *res habet mu-*
leolo & planta transit & ^m nonnunquam in planta *sculos, flectitur*
pedis, portiunculas tendinibus tertij musculi cum *unico à tibia*
quibus commiscetur [*fig. 18. char. 19.*] transmit- *prodeunte, hac*
tit, eundemque præcipuo suo tendine in os polli- *Lauren. pollex*
cis ad primi ossis longitudinem ligamento transuer- *non priuatim*
so exceptus, in secundum os lata insertionem, vt id fle- *vt in manu*
ctat, implantatur. *mouetur,*
Plat.

Aliquando sub planta in tendines duos diuiditur,
& maiorem ad pollicem, minorem ad indicem trans-
mittit, & tum flexor subsequens tantum in tendines

tres diuiditur. Huic tendini priusquam secundo pollicis ossi inferatur, sesaminum officulum magnum lubrica & læui superficie præponitur.

n. 3. digitorum
Ves. Fal. insti.
2. digi. Plat. 6.
extremi pedis
in tibia, Col. 1.
flectentiū seu
dignorum fla-
xor, magnus
seu sublimis,
Lauren.

o Galenus eā
dem atq; in
manu trium
musculorum
functionē pu-
tat, quare pri-
mos etiam ar-
ticulos hic duo
bus musculis
flecti censuit:

Et 2. ad anat.
cum ligamen-
torum trans-
uersorum ope
primos manus
digitorum ar-
ticulos flecti
inuisisset, dicit
Abellis qui ter-
tio digit. inter-
nodio inserun-
tur in pede nō
solum tertios
primosq; arti-
culos in flexio-
nem duci, ve-

rum 1. 2. Et 3. internodium ipsorum ope flecti; at, transuersorum ligamentorum gra-
tia oportere ossibus motum ascribi, non admodum concecimus, Vesal. p. 1. digit.
musc. Ves. Col. Fall. insti. Plat. 2. flectentiū seu minor Et profundus, Laurent.

IV. n. Digitorum flexor magnus, seu flectentiū secundus [tab. 21. fig. 16. 17. 18. R] prædicto adiacet & tibiæ ossi magis quam fibulæ innititur [tab. 21. fig. 18. magis A quam B] à tibia carnosus sub poplite [fig. 16. ch. 16.] exoritur & descendens ferè ad calcem ab interno latere tendinem teretem producit [fig. 16. ch. 17.] qui sub malleolo interno & calcis sinu peculiari [fig. 9. D] & ligamento transuerso à tibiæ appendice enato, delatus, sub planta præcedentis musculi tendini subiectus & cum illo decussationē faciens [fig. 17. inter ch. 17. & 15.] in pedis medio in tendines quatuor diuiditur [fig. 17. ch. 18.] qui ligamenti vincti per tendinum musculi subsequenti sectionem transeūtes, in digitorum quatuor articulum tertium, secundum ossis longitudinem, latiores tamen redditi vt eos flectant & validè astringant & inter se adducant, inferuntur.

V. p. Digitorum flexor alter, seu flectentiū tertius [tab. 21. fig. 16. 17. S] sub planta media situs est, & à calcis ossis sede inferna eiusque tuberculi parte anteriore, principio neruo carnosioq; mixto oritur, q̃ statim ab exortu carnosum euadens, versusq; digitos incedens sensim ad pedis formam dilatatus, ad eius medium in quatuor partes carnosas diuiditur [tab. 21. fig. 16. ch. 21.] quæ diductæ singulæ tendinem teretem producant, qui ad radicem primi articuli, ligamento transuerso excipiuntur, & sectione longa, quemadmodum in manu diuisi, in digitorum quatuor os secundum singuli latefcentes inferuntur. Hic

tur. Hic digitorum quatuor internodium secundum flectit. Huius etiam vniuersæ carnosæ substantiæ tendo latus [*tab. 20. fig. 15. ζ*] pertinaciter subnaſcitur, quod & lati tendinis in manu vices gerit, qui aliquando musculi tertij ^r pedis siue plantaris tendo existit: qui sensus est exquisitissimi ^t, quo externas iniurias, quam citissime perſentiamus.

VI. ^r Adductor pollicis inferior [*tab. 16. & seq. fig. 1. 2. 7. 11. 16. T*] hic pedis lateri interno secundum totam longitudinem muris effigiem referendo, adiacet, & à ^u calce interius penes prædictum, neruosus prodiens, carnosus redditus, pedij ossi pollicis præposito alligatur, & in tendinem teretem degenerat, qui in pollicis os primum extrinsecus implantatur, vt eum à cæteris abducatur.*

VII. Abductor minimi digiti inferior [*tab. 16. & seq. fig. 3. 4. 15. 16. V.*] in pedis parte externa situs à calcis parte exteriori, vbi tuberculo donatur neruco ^z principio enatus, quod carnosum redditum, musculi exquisiti formam exprimit & pedij ossis processui digito minimo præposito affigitur, & in tendinem teretem finit, qui primi ossis parui digiti lateri externo infigitur, vt ab aliis digitis abducatur. Hi tres à tendine crasso & lato, vti in vola manus fiebat, integuntur.

II. IX. X. XI. ^a Siue extendentium 3. 4. 5. & 6.

Gggg 5 Lum-

principio in primum pollicis os inseritur, hac Laurent. u Aligamentis calcem talo connectentibus principium nerueum assumit, Vesal. Fallop. institut. Carnosus ab interiore calcis parte, Archang. à calce exortus, Plat.

x In similibus adhuc vnus est à pedij osse indici præposito in pollicem pronatus. illumque indici quam proxime admouens, quem Galenus 2. adm. anat. cum cæteris in pede repositis, recenset Vesal. y 17. digit. Vesal. Fallop. institut. Plater. 3. digit. Colum. Archang. abductor minimi digiti à calce exortus, aded vt hi (intellige. 6. & 7.) abductores tenari & hypotenari respondeant: hac Laurent.

a 19. 20. 21. 22. digit. Vesal. quatuor muscul. digit. pedis inter 3. & 7. Col. 4. 5. 6. & 7. à partibus pedum nati. Archang. quatuor in pedis planta postremo enarrati, Fall. institut. quatuor tendinibus in pede adnati, Plater. adducunt, digitos lumbrici, 4. à profundi seu digiti flexoris magni tendinibus enati, hac Laur.

q Tendo latus, Vesal. Colum. Arch. Plat.

r Galenus quoque censuit, libro de dissect. mus. tibia musculum quartum faciens.

f Plantam idcirco depilem aliqui censent, quod falsum credo, cum lepori non desit hic tendo, cuius planta nihilo secius pilis referta est, Cocumb.

t 18. digitor. Vesal. Fallop. institut. Plater. 2. digit. Col. Archang. abductor pollicis, qui à calcis interna parte carnosus enatus

T A B. XXI. *Pedis & digitorum pedis musculos ostendunt fig. 16. 17. 18. 19. at 20. li gamenta pedis proponit.*

FIG. XVI.

TAB. XXI.

LIB. IV.

FIG. XIII.

FIG. XIX.

FIG. XVII.

FIG. XX.



b *A tendinib. musculi perforantis, Colum.*

Archæ. Laur.

non à tendinū inuolucris, ut in manu, sed à calcis osse exoriantur: à li-

gamentis enim

tarsi ossa pedis

ossibus in plan-

ta colliganti-

bis musculo-

sum corpus e-

nasceatur, quod

in musculos 4.

graciles dedu-

ctum, digitorū

4. lateri interno inseritur, Ves. Plat.

c. Eadem ratione, qua in manu suis chordis

implantatur, in chōdas exteriores, qua extendunt, Fall. obseru. exiguō tendine la-

teribus digitorum applicantur, ad lateraq; mouent articulum, Fall. instit. termi-

nantur in tertiā ossa. 4. digitorum ut ascendāt ad superiorem horū digitorum par-

tem, sub unguibus in extremos usq; digitos progressi, Arch. d. Sic Fall. obseru. qua-

tuor digitos ad latus internum versus pollicē adducunt, Ves. Plat. Galen. & Ves. 4.

digitos à pollice diuellere volunt, quoniam desinunt in 4. tendines, qui procedūt per

externam partē 4. digitorum, & alligantūr tendini superiori, quem extendere dixi-

mus: progrediuntur autem usq; ad extremos digitos, nec desinunt in primo articu-

lo, quemadmodum voluit Vesal. qui his obliquum duntaxat motum concedit: sed

meum, hoc est in ventum, quod non moueant obliquo motu, sed 4. digitos vere ex-

tendunt, & ab his magis extenduntur, quam ab aliis tendinibus ut sensu oculo-

rum à quouis in secando perito deprehendi facile potest, Columb. extendunt non

minus quam quatuor tendines, secundi musculi anterioris. Archang.

c. 16. digit. Vesal. Fallop. institut. Plater. 18. pedis muscul. Columb. Archang.

extendentium minor, Laurent. ex Galeni sententia duo hic essent musculi, quo-

rum vnus indicem & mediū à pollice abducerent, alter anteriorem & paruum

extrorsum in latus annumerent: dein ex tibia in pollicem alius insereretur: cum

in simia in pollicis superiora, à tibia duo exporrigantur: dein duo in supe-

riori pedis sede: obiquo sita repositi videntur 4. digitos à pollicis abducentes, Ve-

salius. f Fallop. institut. Columb. Archang. à ligamentis in latere tali positis,

Vesal. Plater. à superiori tarso oritur, Laurent.

g Vesal. Fallop. institut. Plater. in s. nonnunquam 4. Columb. in s. Archang.

in 4. interdum. s. Laurent.

Lumbricales dicti [*tab. 21. fig. 17. 18. x*] qui sub pedis planta siti sunt, & à ligamento quatuor tendines b musculi perforantis seu flectentium secundi obuol- uente exorti, teretes ac parui tendinibus musculi digitos extendentis c implantātur, vt articulum d secundum & tertium extendant. Hique roboris gratia carnosam portionem, prædictis tribus subie- ctam à calce acceptam obtinuerunt.

XII. c Abductor digitorum superior [*t. 16. fi. 1. 8. 9. 10. 11. r*] in pedis extremi sede superiore & gibba situs, latus & gracilis est, qui à ligamentis f, quod ad calcē & cubiforme os existit supra tarsum & pedium carnosus oritur, & oblique versus digitos porrectus in partes carnosas g quatuor diuiditur, quæ singulæ tē- dinem teretem efformant: quorum maximus pol- licis

4. lateri interno inseritur, Ves. Plat. c. Eadem ratione, qua in manu suis chordis implantatur, in chōdas exteriores, qua extendunt, Fall. obseru. exiguō tendine lateribus digitorum applicantur, ad lateraq; mouent articulum, Fall. instit. terminantur in tertiā ossa. 4. digitorum ut ascendāt ad superiorem horū digitorum partem, sub unguibus in extremos usq; digitos progressi, Arch. d. Sic Fall. obseru. quatuor digitos ad latus internum versus pollicē adducunt, Ves. Plat. Galen. & Ves. 4. digitos à pollice diuellere volunt, quoniam desinunt in 4. tendines, qui procedūt per externam partē 4. digitorum, & alligantūr tendini superiori, quem extendere diximus: progrediuntur autem usq; ad extremos digitos, nec desinunt in primo articulo, quemadmodum voluit Vesal. qui his obliquum duntaxat motum concedit: sed meum, hoc est in ventum, quod non moueant obliquo motu, sed 4. digitos vere extendunt, & ab his magis extenduntur, quam ab aliis tendinibus ut sensu oculorum à quouis in secando perito deprehendi facile potest, Columb. extendunt non minus quam quatuor tendines, secundi musculi anterioris. Archang.

c. 16. digit. Vesal. Fallop. institut. Plater. 18. pedis muscul. Columb. Archang. extendentium minor, Laurent. ex Galeni sententia duo hic essent musculi, quorum vnus indicem & mediū à pollice abducerent, alter anteriorem & paruum extrorsum in latus annumerent: dein ex tibia in pollicem alius insereretur: cum in simia in pollicis superiora, à tibia duo exporrigantur: dein duo in superiori pedis sede: obiquo sita repositi videntur 4. digitos à pollicis abducentes, Vesal. f Fallop. institut. Columb. Archang. à ligamentis in latere tali positis, Vesal. Plater. à superiori tarso oritur, Laurent.

g Vesal. Fallop. institut. Plater. in s. nonnunquam 4. Columb. in s. Archang. in 4. interdum. s. Laurent.

ficis latere externo versus superiora, secundus indicis, tertius medij, quartus annularis (rarius enim minimo digito ^h exiguus exporrigitur) inseritur, ut digiti ad latera ⁱ moueantur, & ad latus externum abducuntur. Quando vero tendines quatuor tantum habet, tum digiti minimi tendo à pedis musculo tertio externo oritur, quamuis abductor minimi digiti inferior, huic officio satisfacere possit.

XIII. A ligamento primi internodij minimi digiti nonnunquam ab altero annulari principio lato & nerueo enascitur, mox carnosus redditus transuersim incedens super primos digitorum articulos delatus in tendinem latum, sed breuem definit, qui in primum magni digiti articulum nonnihil introrsum inseritur. Huius vsus geminus est, primus ut ipso agente commodius per loca inæqualia incedamus, & sic quasi apprehensio fiat: Alter, ut dum non agit, sit ipsi pedi instar ligamenti, ne dum per plana incedimus, pedis plâta amplior fiat, quâ par sit, sicq; digiti à se inuicem abducantur: de hoc musculo D. Iulius Casserus primus ad nos scripsit.

^k Decem ^l interossei huic subiacent [*tab. 21. fig. 18. 19. Z*] qui ad flexores referendi sunt, qui in planta consistentes carneam molem rudem & indigestam, fibris rectis interstinctam ostendit, quæ à pedij initio proficiscitur, & secundum eius longitudinē ducti, spatia interossea opplent, & in digitorum quinque radices ^m seu ad ligamentum primi internodij

interio-

parū inseruiunt: addit, adduci vnus opera pollicis ossi pedij maximo intus attensi, Laur. l Non ita exacto numero in pede atq; in manu cōprehendi distinguere queūt, quare in musculos proprios subdividere nequeo, quamuis sibi implicatos, quasdam inscriptiones commonstrant, Vesal. quia vtrinq; tendinibus decem quinque digitorum radicibus inseritur, decem musc. loco haberi potest, Plat. m Non ita manifeste desinunt in easdem chordas extendentes digitos, ut in manu, sed potius videntur desinere in ligamentum primi articuli digitorum facti ad hoc, ut magis flectant, quam quod extendant; extensio enim non ita necessaria in digitis pedum est, veluti in manu, Fallop. observat.

^h Semel & admodum obscure illi quoque exiguum tendinem exporrigi animaduerti, Vesal. inseritur in omnes digitos, Col. Arch. nonnunquā et minimo tendinē suppedita- bat Plat. minimū tendinē nō emittit, Laur. i In externum latus abducit Ves. versus minimum abducit, Plat. ad latera mouent, Fall. inst. digitos mouet, oblique extendēs, Col. Arc. Lau. k Inter 3. et 14. dig. pedis, Ves. Fall. inst. locarant inter 7. et 18. Col. Arch. interossei 8. abducunt à pedij ossibus orti & spacia metapedij opplentes flexioni quoq; nō

interiora versus bini inferuntur, quo duobus simul agentibus articulum primum flectant, & altero solo agente ad latus vel extrorsum vel introrsum, prout musculi origo fuerit & situs, ducit. Horum tendinibus breuibus & latiusculis sesamina officula corporis nostri maiora ad musculorum robur adnascuntur.

DE VENIS PEDIS.

CAPVT XXXV.

De his consule Galenum libro de dissect. ven. & arter. 8. & 3. administ. anat. 12.

VENAM cauam in truncum superiorem seu ascendentem, & inferiorem, doctrinae causa, libro primo diuisimus, quorum vterq; ramos suos per ventres, & per artus distribuit: de ascendendo & diaphragma ptransiente, eiusq; ppaginib. per thoracem libro secundo, per caput, libro tertio egimus: quemadmodum de descendente & ramis per infimū ventrem distributis libro primo sermo fuit. At de venis per artus disseminatis, cum alij à ramo ascendente per manum ferantur, alij à ramo descendente per pedes, de illis in prima huius libri parte egimus, de his vero nunc dicendum erit.

Vena caua in ventre infimo ad sacrum os descendens, vbi ad quartam lumborum vertebra peruenit & arteriae magnae substrata fuit [*tab. 22. O*] in truncos duos æquales diuiditur: quorum alter dextrum, alter sinistrum crus adit: at priusquam peritonæi cavitare excidant Iliaci dicuntur [*tab. 22. inter O & G*] horum tam dexter quam sinister statim in ramos duos [*tab. 22. p 5*] interiorem & exteriorem subdiuiditur, à quo varij soboles disperguntur, quemadmodum libro i. explicauimus: inde CERVICALIS dici incipit [*tab. 22. G*] & postquam ramus inter-

nus [p] duabus propaginibus ad os cruris descendit, os pubis [ei] pertransiit, & furculum ad coxendicis acetabulum misit, quo in illius regionis musculi femoris interiora amplexantes disseminetur, ramo cutim in femoris sede interna subit: mox cum ramo crurali interno [char. 2.] iungitur [x] & cessat. At cum eo loci versus femoris plicaturam infimam cavitas quædam sit, ubi cauæ ramus in plures propagines diu di debuit, quo venæ propagatiores firmiores sint Glandulæ frequentes circumpositæ, quæ etiam arteriæ & neruo illâ cum vena descendentibus propugnaculo sunt.

a A CRURALI [tab. 22. G] quæ venarum cæterarum in crus excurrentiū caudex est & à trunci venæ cauæ ramo exteriore [tab. 22. c] pendet, vtrinque rami sex prodeunt.

I. b Saphæna seu malleoli [Θ] quæ insignis & longissima, & quæ vna cum neruo attenso per cruris interiora inter cutim & panniculum carnosum ad genu versus malleolum c internum delata in pedis superiora versus digitos pollicem præsertim varie diuiditur, aliisq; furculis eo missis, commiscetur, Ab hac communiter propagines quatuor per cutim sparguntur: prima duplex est, altera interior [Λ] quæ adhuc in inguinum sede vtrinque ramos ad femoris interiora, inguina & peritonæum mittit: altera exterior [Ξ] & maior quæ in femoris anteriora & exteriora, quemadmodum & interior in soboles definit, secunda ad cruris medium [Π] tibiæ musculum primum adit: tertia ad genu posteriora versus orbiculatim conuoluitur [Ξ] parte vna in patellæ cutim, altera in poplitem: & hæc quando poplitis vena [ch. 6.] solito maior est, penitus deest, vel impense gracilis existit: quarta ad tibiæ medium [Φ ad Ψ vsq;] soboles antrorsum & retrorsum diffundit, qui cū proximis

a Vesal. omnes hos ramos, sed absq; nominib. exponit: Colūbus Saphena,

Ischij & poplitis meminit:

Sylvius et Laurentius venas

sex proponunt, nominib. quibus recēsemus:

Fallop. Saphenam habet &


Ischij, Plat. cutaneas qua-

tuor.

b Cutanea r. Plat.

c Externum Laur.

T A B. XXII. *Venæ causæ in vtrunque pedem
distributionem exhibet.*



ximis venis variè coëunt, rursusq; dirimuntur. Nōnunquam à tibiæ parte interiore seu malleoli anteriorem regionem reflexa ad pedis superiora excurrit [ϕ] & in omnes ferè pedis digitos distribuitur; sed furculis supra pedem & ad digitos, plurimum variat, siquidem in quibusdam cum aliis ramis commixta ad digitum minimum, aliquando versus pollicem & indicem excurrit, quare rarò in eiusdem hominis utroque pede, eadem venarum distributio, numerus & magnitudo existit. Hæc à medicis in vteri affectibus, præsertim in mensium retentione, circa malleolum secari consuevit, quemadmodum etiam à nostris supra pollicem in capitis affectibus pro vena cephalyca inciditur.

II. Ischias minor [Ω] prædictæ opponitur, nam quemadmodum illa cruralis, trunci ramus interior, sic hæc exterior est brevis, quæ extrorsum & transversim in coxendicis articuli cutim anteriorem & eius loci musculos disseminatur. Mox truncus ipse post inguina inter musculos femoris amplexantes immergitur, & de se spargit ordine tertiam.

III. Muscula [char. 1.] quæ gemina est & aliquando sibi mutuo correspondent: harum exterior & minor [char. 1.] tibiæ musculis extendentibus 2. & 4. & in cutim furculos diffundit; interior & maior [char. 2.] quique profundior per femoris musculos ferè omnes, potissimum quintum & tibiam extendentium tertium diuaricatur, & tandem finem eius venæ [ei] quæ per pubis ossis foramen in femur deferitur assumit [χ] qua aucta ad genu usque, sed inter musculos latitans, descendit.

Maxima vero vena CRURALIS dicta [G] in femoris medio sensim posterius contorta soboles exiguas membranis, neruorum crus petentium offert. Deinde emittitur quarta.

& Cutanea 2.
Plater.

IV. Po-

IV. Poplitea, quæ ex duobus ramis cruralibus [char. 3. 4.] vnitis conflatur, à qua in exortu posteriorius sursum furculi in cutim femoris mittuntur, [char. 5.] dein sub cute recta, per medium poplitis flexum delapsa [char. 6.] ad calcem vsque [char. 7. inferius] aliquando ad malleoli externi cutim, aliquando & in inferiorem descendit: à qua in progressu ad suræ cutim ramulos plurimos alios rectos, alios obliquos, alios transuersos inæquabiliter commixtos & coeuntes, spargit. Nonnunquam simplex occurrit, & interdum ramum à vena ad quintum femoris muscolum [char. 2.] missum, ipsa poplitea [char. 3.] assumit, & cum ea iuncta in cutim femoris posteriorius excurrit, & furculos aliquot sursum mittit. Hæc vena est, quæ sub genu ab antiquis frequenter incidebatur.

V. Suralis: cruris vena magna ad femoris inferiora posteriorius ramulos in exortum musculorum trium suram constituentium vtrinque transmissis [ad char. 8. vtrinque] in poplitis regionem in truncum anteriorem & interiorem discinditur: exterior [char. 9.] postquam oblique versus fibulæ cum tibiæ connexionem ramulum [char. 10.] extrorsum in cutim genu anteriorius distribuit, mox sub genu in duos ramos scinditur interiorem [char. 11.] qui cum fibula inter pedis musculos descendit, & vbi eorum arnosa portio finit, etiam cessat, & ad cutim non fertur: exterior verò [char. 12. 13.] secundum tibiæ externam sedem, malleolumque externum, per illosque superiora extrorsum tamen cutim accedit, varios quoque furculos, quemadmodum & poplitea [char. 7.] distribuens, & cum popliteæ furculis, potissimum in pedis dorso se commiscens [char. 10] varium ilium venarum implexum, qui in pedis superiore sede sub cute conspicitur, efficit.

^c Cutanea, 3.
Plater.

f Cutanea 4.
Plat.

Interior [char. 14.] rectà per tibiæ posteriora descendens, à latere interno ramum spargit [ch. 15.] qui per tibiæ internā sedem^f ad calcis & pollicis latus internum sub cute disseminatur, & surculis vicinis vnitur, rursusq; diuaricatur, quemadmodum iā tertio de aliis monuimus: quæ causa sanè est, cur pars hæc crebrò varicibus infestetur: videtur autē hæc venarū & vnio & rursus earum distractio necessaria, ne cute læsa, venisq; aliquot transuersim abfectis, cutis adiacens alimento destituatur. Quare cum in cruribus, tribus aut quatuor locis venæ internæ cum cutaneis vniantur, maxime vero in pede, si vnā & ex superficiariis incidere animus sit, nō est quod adeo in delectu solliciti simus quasi peculiares venæ essent, ex diuersis partibus vel visceribus corporiseductæ, & non ex vno trunco propagatæ.

g Idem monēt
Vesal. Fall. ob-
seru. cum ali-
cubi quatuor
venas ad pedis
superiora per-
tinere in Gale-
no lib. de sect.
ven. legerunt,
totidem venas
pedi tribuunt,
singulis rarum
propriūq; san-
guinis educen-
di mun^o ascri-
bētes: ac i. sta-
tuit, q inter-
num pereptat
malleolum &
saphena & ma-
trix venæ &
virginalis ipsis
vocat. II. ex
teriori assignāt

At truncus interior [ch. 14.] ramo prædicto [ch. 15.] constituto in alto latitat, aliam venam educit, quæ Ischias maior vocatur.

IV. h Ischias maior [ch. 17.] portione maiore per suræ musculos delata soboles exiguas diffundit, & vbi ad separationem tibiæ ossis à fibula accessit, ab anteriori sede propaginē magnam [ch. 18.] educit, quæ ligamento membraneo perforato inter musculos, qui tibiæ anteriorem partē occupant fertur, & in descensu surculos musculis vicinis impertit, & sub ligamento annulari delata in pedis sede superiore, diuisa tamen in musculosam ipsius substantiā distribuitur, & di-

III. in superiori pedis sede recensent, ex venarum ramulo quopiam, pollicis porrigendo adiunctam, illique popletica vena nomen accommodant. IV. renatem vocant, ipsam ex ramulis quibusdam confingentes, qui minimo digito sunt proximi. Verum interim venas in poplite & sub genu in sanguinis missione magis quam pedis venas aperiendas negligunt, uti & omnes in corporis alio reconditas, Vesal. Quare vera est sententia Hipp. libr. de alim. ἑρπύρα πία, ἑρπύρα πία, ἑρπύρα πία. Fallop. observat. h Vena scia, ischy & coxenaica, Columb.

& digitis singulis binos ramulos largitur. Hæc in co-
xendicisⁱ affectibus circa molleolum externum in-
cidi consuevit.

Quod interioris rami [*ch. 14.*] reliquum est inter
dictos musculos posterius porrigitur, pedis humi-
liora petit, & in multos ramulos seriatim absumi-
tur, quorū ferè bini digiti, cuiusq; sedem internam
perreptat, aliquando tamē minimo digito quinque,
medico duos, medio vnum surculum largitur, &
tunc à portione priori tantum in quinque digitos
maiores distribuuntur.

*dis affectibus respondere, internam in mensum retentione, externam in affe-
ctibus ischiadicis, Fall. instit.*

*i Et si paruum
admodum dif-
crimen inter.*

*interiorem sa-
phanam et ex-
teriorē ischin-
dicā appareat,
cum idem ob-
tineant, vñs
tamē compro-
batum ferunt,
alteram magis
altera pradi-*

DE VALVVLIS SEV OSTIO- lis venarum.

CAPVT XXXVI.

DE his primus Auicenna egisse videtur, dū cel-
lulas in venis statuit: has Cl. Hieronymus Fa-
bricius ab Aquapendente^a Patavinus Anatomicus

*a Ostiola ve-
narum nullus
prius vidit,
quam anno
1574. à me*

Hhhh 3

summa cum latitia inter diffecandū observata fuère, Aquapen. valuula membra-
nea in interna capacitate, venarū brachiorum & crurū in cadauere anno 79. sese
obtulère hætenus incognita, fertur anno 79. ineunte, Hieron. Fab. ab Aqua pen-
dente Patavij spectantium oculis subiecisse: quas eodem anno currente ipse quoque
theatro nostro hæc membranas venarum representavi, Fabricij obseru. admoni-
tus, Salamon Albertus. Archangelus venarum & arteriarum distributionem o-
mittens rationem addit, quia hanc rem celeberrimi anatomici, præ cæteris rebus
accuratissime tractarint ab illis petendum: Subiungit, vnum addere volo magni
momenti ab omnibus prætermisum, quod mihi summam admirationem, cum il-
lud comperi, ita excitauit, vt ferè in ectasim ageret, quod est in mediis venis reco-
ditas esse, innumerabiles pene valuulas, quemadmodum in orificiis vasorū cordis.
Hæ venarum valuula maxime conspicua sunt, in diuisione ramorum, vena cava,
quarum alia supernè deorsum, alia inferna sursum spectant: Exempli gratia, ubi
vena cava diducitur in iugularem externam et internam ibi collocata iacent val-
ua superna deorsum spectantes. Hæ valuula venas claudentes, tantum spatij relin-
quunt, quantum satis sit sanguini in superas partes attracto. Quæ si non ad-
essent dum homo, vt dormiat vel vt quiescat decumbit, vniuersi sanguis flui-
dus exi-

*aus existens
irrueret in ce-
rebrum (Cu-
ius vis attra-
ctrix prapotes
est) huius
ventriculos
infarciens &
apoplexiam
committens,
imò mille cere-
bri affectus
prater natu-
rā procreatu-
rus, similiter
in inferioribus
venis: Exem-
pli gratia, v-
bi Vena caua
bipartito scin-
ditur in tibias
progressura.
sunt collocata
Valuula infer-
ne sursum spe-
ctantes: ne
sanguis cum
sit gravis &
fluidus, totus
repente procu-
bat in pedes
inferioresque
partes. In ve-
nis itaque à
natura consti-
tuta sunt val-
uæ, idque ex*

anno 1574. publicè demonstravit, de quibus tra-
ctatum scripsit anno 1603. cusum: & Salomon
Albertus Witebergæ, anno 1579. ostendit, & anno
1584. de iis scriptum euulgavit.

VALVULÆ in venis artuum reperiuntur, quæ
nihil aliud sunt, quam portiuncula tunicæ vena-
rum in earum cavitate eminentes, eamque dimi-
diam intercipientes, & quasi angulum efficiētes:
quare venarum corpus nusquam textu rariore con-
stat, atque vbi membranulæ hæ veluti abscedunt.
Ostiola alij appellare malunt.

Sitæ sunt in venis brachiorum & crurum supra,
subterque, post alarum & inguinum glandulas, &
quidem proxime sub ramorum exortibus, qui è la-
teribus venæ, in partes vicinas nutritionis causa
disseminantur; quo scilicet sanguis ad alias partes
distribuendus, eò loci subsistat, ne totus per vni-
cum eumque ampliorem rectumque canalem de-
feratur, eoque rami minores & oblique propaga-
ti frustrentur. Hæ ad venarum capacitatem mediam
pertingunt, nec ramorum à caua emergentium
meatus occludunt: natura namque valuulas ramis
subiicere maluit, quam ostiis eorum præponere:
Sic enim humorum regurgitatio exclusa fuisset, quæ
tamen necessaria est admodum, quemadmodum
reuulsio media docet. Sic in orificio iugularis ve-
næ, ^b binæ reperiuntur, ne capite nimium reclina-
to, sanguis impetu in cerebrum ruat. At caue

trun-

paruis venarum intervallis, aliàs sursum, aliàs deorsum spectantes in eos præ-
clarissimos usus, quos exposui paucis: hac Archang. Obseruarunt recentiores
quidam in brachiorum & crurum maioribus venis, ostiola quidam, valuula-
rum & membranularum instar. qui sanguinis ad inferiores partes apertæ con-
fluentis impetum sistunt: truncus autem vena caua ob adductum semper est pa-
rens peruiusque, hac tantum Laurent. ^b Vena caua & iugulares ostiis prorsus
fuerunt destituta, Aquapen.

truncus, qua ventrem medium & infimum perreptat (quemadmodum & Arteriæ) his destituitur, quo sanguis sine obstaculo, quoquo versum distribui possit, tum ad substantiæ deperditæ restitutionem, tum ad spiritus generationem: sic quoque venæ externæ exiguæ innumeræ his quoque destituuntur.

Numerus earum incertus est & interualla, quibus disclusæ sunt admodum disparia: communiter tamē geminæ occurrunt, nisi paulo supra ligamenta transuersa, quæ tendines manuum pedum & digitorum continent, & vbi venarum amplitudo coarctari incipit, ibi pauciora apparere incipiunt, donec penitus euanescant. Vbi enim sanguinem plus & diutius remorari conueniebat, duæ valuulæ: vbi minus, vna tantum apposita fuit: potissimum autem vna apposita, vbi ex ramo maiori, minus aliquod vas oblique perducitur. Quoad interuallum, licet per valis longitudinem ferantur, attamen quibusdam locis duorum, aliis trium, quatuorue, aliis quinque digitorum interuallo distincta sunt, vt exempli gratia.

In Cephalica quatenus sub deltoide musculo defertur, valuulæ duæ adfunt, inter se digitis ferè quinque distantes: in Basilica per brachij partem internam progrediente, quatuor valuulæ satis magnæ occurrunt, quarum prima à secunda, interuallo digitorum quatuor: secunda à tertia, trium: tertia à quarta duorum distat: quibus duæ paruæ simul iunctæ succedunt.

Sic in pede, in vena caua, antequam subdiuidatur ad inguina, duæ valuulæ magnæ positæ sunt, mox diuisa in profundiore seu maiorem & in minorem: maior duobus locis binas habet valuulas digitorum ferè quatuor interuallo distantes: sic ad

poplitem vnā: hinc ad suram binā, mox vnica, tādē binā sequuntur. At in trunco minore plures reperiuntur: nam in bifurcationis initio, valuulæ binæ sunt, quibus duorum digitorum interuallo binæ aliæ: rursus trium digitorum interstitio, duæ alię succedunt. Et in eadem saphenam constituyente, vnica occurrit, digitorum quatuor spatio recedens, ab hac binæ: & sub poplite, totidem digitorum interstitio, binæ alię: sub his trium digitorū interuallo, vnica: hanc quatuor digitorum spatio alia sequitur: sic quinque digitorum interuallo, alia occurrit: mox ad talum bina: sub his spatio digitorum triū vnica, & eadem ferè distantia, vltimum conspicitur: reliquum Saphenæ sine valuulis ad pollicis apicem excurrit.

At quo sanguinis validior cursus retardetur valuulæ, hæ non per lineam rectam siue ex eodem latere locatæ sunt, aliās totus sanguis rectâ per vasis partem liberâ defluxisset: quare hæc artificio miro sedē suam variant, ita vt si in parte superiore valuulæ duæ existāt, per interuallum quoddā, aliæ duæ in parte inferiore hæreant, ita vt sequentium membranularum cornua præcedentium media siue conuexa respiciāt, & vicissim, ita tamen, vt in medio se vtrinq; nō contingant, sed tramitē relinquant, quo sanguis deorsum labi, ac in reliquas valuulas æquē incidere possit & sic inferiores valuulæ, quod à superioribus delabitur, remorantur, sanguinis vero transitus minime impeditur.

c Indicis aut
aliorum trium
digitorum vn-
guem imitan-
tur, Aquap.

Figura valuulis sigmoeideis c cordis similes sunt, non verò substantia, nec numero: vel lunæ cornuatæ figurā repræsentant; exterius verò nodis in plantarum ramulis assimilari possunt, nam si in viuentibus brachium ad sanguinem mittendum ligetur, per interualla nodi quidam exterius conspiciuntur, imò in rusticis varicum modo in cruribus intumescere

piuntur: & Varices alia de causa non fiunt, nisi quia sanguis crassior à valuulis his detentus, venas earumq; valuulas dilatat: sine his enim venæ æquiter dilatarentur & intumescerent. Et hæc sursum versus venarum radices apertæ sunt, inferius verò & ad latera, venis connatæ, cum earum portiunculæ int. Quod si eas calamo venæ inserto leuiter inspicies, tum valuulæ vtriculi instar, foras protuberant.

Substantia earum tenuissima est, quò minus spatium occupent, densissima tamen roboris gratia, ne sanguinis violento influxu frangantur.

Vfus, sanguinem ad partes inferiores fluentem retardare, ne impetu quodam fluminis instar, propter artuum decliuem situm, prolabatur & sic partes inferiores alimenti affluxu opprimantur & tumore premantur, superiores verò alimento defraudentur: sed vt in maioribus vasis ceu fonte alimentum subsistat, quò venis exiguis nutrimentum minimè detrit. Dein, cum venæ creatæ sint, non solum vt sanguinem in partes vehant & deriuēt, sed etiam ad eius perfectionē conferant, procul dubio dum cōcoctio- ni incumbunt, valuulæ sanguinis cursum & impetū retardant. Tum, vt venis robur addant, quo in variis venarum distensio nimia & ruptio prohibeatur cum venæ ex substantia membranea, simplici ac tenui conflatae sint. Sic cum artus frequentissimè & vehementer exerceantur, earum calor excitetur, sicque sanguinis copiosus affluxus causari possit, ne ruptionis periculo subiecta sint impediunt: imò etiam ne ex nimio sanguinis attractione partibus principibus alimentum, subtrahatur obstant.

DE ARTERIIS PEDIS.

CAPVT XXXVII.

De his egit Gal. lib. de diff. ven. & art. 9. & 3. adm. anat.
13. & 16. vs. part. 10.

a Ad sacri ossis principium in duos grandes truncos bipartitur Vess. statim in ipsius ossis principio, v: vena caua diuiditur, Plat. Arteria in lumborum regione diuiditur in ramos insignes, quod omnes asserunt, nō in illa parte unde incipit os sacrum, sed in ea præcipue in qua est ligamentum cartilagineū, quo tertia & quarta vertebra lumborū colligantur: veluti etiam vena caua non diuiditur in principio ossis sacri, sed supra corpus

ARTERIA magna circa^a lumborum vertebrae inferiores, vel supra ossis sacri principium in ramos duos insignes Iliacos [tab. 23. v.] diuiditur; horum quilibet vtrinque in duos alios subdividitur, internam vnum, externam alterum [ξ φ] Interior [ξ & tab. 17. lib. 1. p.] propagines duas de se fundit, externam [o & tab. 17. lib. 1. ff.] Musculam inferiorem nominatam, quæ transuersim in musculos ilium ossis sedem externam & coxendicis articulum integentes fertur & absumitur; internam [π & tab. 17. lib. 1. u u.] seu Hypogastricam, quæ recta deorsum fertur, & ad hypogastrij partes, vt vesicam, vterum &c, surculos diffundit: huius rami [ξ] reliquum [sub ε] descendens, primò arteriam vmbilicalem [ι] sui lateris admittit: dein ab externo ramo primæ diuisionis, portionem adsciscit [iuxta φ] sicque aucta, pubis ossis foramen transit, in crus fertur & in musculos pubis os occupantes distribuitur: tertio, in fine cum alia [↓] arteria coit [α.] Exterior verò ramus siue caudex ipse cum vena sua deorsum latus, in ventre adhuc exiitens [supra φ] propaginem extrinsecus Epigastricam dictam [π & tab. 17. lib. 1. ch. 2. 2.] sursum ad abdominis musculos extra vëtris cauitatem mittit: intrinsecus aliam pudendam [v & tab. 17. lib. 1. ch. 15.] quæ secundum pubis os, aliquando extra, aliquando intra peritonæum Arteria existente prore-pit: de

quarta lumborum vertebra, Fallop. obseru. iuxta ossis sacri initium diuisa, Fallop. instit. ad penultimam lumborum vertebra, in nonnullis ad ultimam, in duos ramos diuiditur, Columb.

pit: de quibus consule libri primi caput 20. His constitutis Arteriæ magnæ truncus Iliacus peritonæum transiens, & è ventris cavitatē in crura procidens CRURALIS cōstituit [c & tab. 17. lib. 1. ch. 16.] à quib. vtrinq; rami^b in totū pedē disseminati ppagantur.

I. Muscula cruralis exterior [χ] ex trunci cruralis parte exteriorē procedit & deorsum lata in musculos anteriores, femoris os amplexantes suis furculis absumitur.

II. Muscula Cruralis interna [↓] ex dicti trunci parte interiorē, aliquando prædictæ ex opposito respondens, propagatur & in musculos femoris interiorē sedem occupātes distribuitur: & hæc ad genu demissa, suo quodam ramulo, cum hypogastricæ ramulo [ε] extremo commiscetur [ω.]

III. Poplitea [Γ] cruralis truncus sensim deorsum prorepens & sub poplite, vena maiore comitata descendens, propaginē hanc constituit, quæ furculis aliquot in musculos femoris posteriores excurrit, & cum vena poplitea aliquo vsq; deducitur.


IV. Suralis; truncus in poplite latitans, vel paulò sub ipso, vtrinq; propaginē [Δ Δ] profundam emittit, vt partim in articulo genu, partim in tres pedis musculos suram constituentes, qui illic exoriuntur, absumātur: & hæ venæ quatuor in regione femoris, à caudice exoriūtur: nam hinc per poplitē cum vena interiorē descendens [Θ] partim ad tibiam partim ad pedem fertur; per tibiam verò ipsiusq; musculos immersus, in tres ramos insignes diuiditur [Λ Σ Π.]

V. Tibiæa exterior [Λ] ramus primus insignis & superior ab externa caudicis parte pnatus exterioris venæ ramo ampliore comitatus, secundum fibulam descen-

b Vef. & Plat. hanc distributionem etiam persequuntur. Col. sic, quem admodū vena illa diuiditur ad omnes scilicet musculos, tibiæ pedis, digitorumq;: ad eorū enim extremitatē perueniunt: mittunt insuper arteriolas tum ad inguinis glāculas, tum ad scrotū, tum ad penem sub cute: hac ille. Femur accedunt vtrinq; rami ac in inguinibus diuaticati partim inter musculos perfunduntur, partim per superficiem deducuntur, donec ad extremum vsq; absumpti fuerint, hac Fell. in instit. Cruralis arteria similis ferè ac vena distributio, nisi quod

pauciores eius rami per cutim feruntur: emittit enim in cruris musculos ramos quam plures, dein ad genua, & poplitē distribuitur, tandem & in anticos tibiæ musculos & in posticos, omnes pedes digitos, variè diuaticatur, hac Laur.

T A B. XXIII. *Arteria magna in utrumque
pedem distributionem proponit.*



descendit & in musculos tibiā occupantes, quotifque carnei sunt, absumuntur.

VI. Tibiā posterior elatior [Σ] ramus alter paulo inferius ex posteriore & inferiore sede educitur, qui vsq; ad commixtionem tendinum musculorum suram constituentium, vna cum venā interioris ramo posteriore descendit.

VII. Tibiā posterior & humilior [Π] ramus tertius ex trunci posteriore & exteriorē parte pronatus venā interioris ramo anteriore comitatus per ligamentum membraneum, quod fibulam tibiā iungit musculis occultatus, anterieus & multo ceteris duobus longius excurrit, ligamentū transier sum transi, pedis superiora [ϕ] accedit, & in musculos digitos abducentes diffunditur: quo loci plerumque ipsius arteriæ motum tactu deprehendere possumus.

c Ves. & Plat.
vbi pulsum
sensibilem
edit.

VIII. Caudicis cruralis reliquū per tibiā posteriora descendens [Ξ inferius] inter musculum secundum & tertium digitorum pedis recta descendit, inter calcem & malleolum interiorem, pedis humiliora subit & ad malleolum internum pedi ramulum [\downarrow] offert, qui pollicis musculum accedit, pedisq; superiora aliquo vsque perreptat.

Reliquum [Ω] inter tendines musculorum digitorum pedis in ramulos duos [ab] secatur, quorum quilibet, in furculos quinque absumitur: interior enim [c] pollicis duos, duos indici, vnum medio, exterior vero [b] duos minimo, duos medico, & vnum medio [d] eiusque inferiori sedi largitur.

a Vesal. quoq;
ad hunc modū
ferē distribuit,
& Plat. nervi
ossis sacri qui
& pedis nervi
dici possunt, qui inter ultimas lumborum vertebrae & ossis sacri summam, item a

DE NERVIS A PEDIS.

C A P T XXXVIII.

De his consule Gal. lib. de diff. neruor. 17. 3. ad. anat. 10. &
11. item 16. vs. part. 8.

NERVI

item a

NERVI qui iuxta cruris initium in femur pedemq; totū decurrunt, à spinali medulla exiunt, & quidem parte ea, quæ in lumborū & ossis sacri vertebris consistit: à lumborum enim tribus partibus inferioribus & sacri ossis superioribus quatuor propaganturq; statim in exortu miscentur, & reticulis instar coniuncti procedentes [vide t. 15. lib. 3. fig. 1. M.] in nervos quatuor [t. 24. ch. 57. 60. 66. 71.] vtrinque exeunt: quibus crassities eadem non est, nec ductus eadem, licet omnium principium intra peritonæi cavitatem cōsistat: horumq; primus & tertius breviores sunt, quare ad femur tantum perveniunt: secundus longior, ad tibiam quoque per femur fertur & ille crassior est: quartus verò qui cæteros, vnà iunctos crassitie superat, sic & longitudine, cum per femur & tibiam ad digitorum apices deferatur.

^b Primus [t. 24. ch. 57.] ex commixtione rami tertij aris lumborum cum quarto pari, [circa vertebra 22.] exoritur & supra genu articulum terminatur; hic lumborum musculis incumbēs, paruum rotatorem accedit & in femoris musculos duos extendentes, ramū [58.] ad cutim femoris, anteriori & exteriori sedi ductam, absumitur: maior verò pars [59.] tibie musculo primo & septimo & nono surculos largitur.

Secun-

ibus emerferunt omnes ferè in vnum quasi fasciculum coniecti, parte posteriore, una coxa rima amplam agit in crura protruduntur ponè articulum, amplo operis obditiq; musculo: simul autē musculus qui ibi sunt prout fert dignitas atq; magnitudo suū cuiq; ramum impertunt. Vnde mox alij in crura sparsi, deorsum per interiora feruntur, qui ad pedis inferiora concedunt; alij verò per exteriora in pedis riora atq; superiora pertinentes: alij media inter hos regione positi in musculos suræ livempti absumentur, Arch. Lumborum quinque sunt coniugationes, quorū posteriores rami in rachitis feruntur musculos: anteriores verò in abdominis, femorisq; internos musculos ac testes. Ossis sacri paria sunt sex, quæ partim in femur partim in musculos vicinōs & cutim disseminantur, nec non in collum uteri, sphincteres, musculos ani, vesica & penem: per totum autem pedem nervi quatuor insignes disseminantur, qui ex tribus infernis partibus & quatuor superioribus ossis sacri natiuntur, Laur. ^b Primus Vesal. primus brevior & elatior à tertio lumborum par, Plat. primus & summus, Laur. c. 1. 7. & 9. Vesal. 1. 2. & 9. Plat.

item à 1. 2. 3. ossis sacri foramine exiunt, Columbus, qui quartum nervi distributionem primo, dein duo coniugia, quæ nervum quartum sequuntur recenset, ut in fine huius capituli in margine monuimus. Ex vertebra ossis sacri, quæ sex sunt quinque nervorum, coniugia p̄siliūt, qui omnes in crura univēsum iter habent; at nervi qui ex infimis duabus lumborum vertebris, atque ex ossi sacri quinque forami-

d Secundus, Vesal. secundus & longior à quarto lumborum pari, Plat.

Secundus^d [ch. 60.] è regione coniunctionis tertiæ lumborum vertebræ cum quarta prodit [inter 23. & 24.] & cum vena & arteria crurali per inguina in femur abit, ramumq; insignem à latere interno [61.] venę Saphenæ ad pedis pollicem vsq; attensum iuxta malleolum [62.] descendit: quod propter sectionem venæ poplitis & malleoli interni notandum, ne scalpellum antrorsum actum, neruum præsecet: & quæ admodum Saphena furculos varios in descensu communicat, sic & hic nervus scinditur, quorum præcipuus est [63.] qui circa genu anteriorem interioremque partem occurrit. Maior nerui secundi portio [64.] cum vena & arteria profunda, in femoris musculis anteriores, præcipuè femoris quintû & octauum tibiæ digeritur, ita tamen vt membranis vasa illic colligantibus, soboles exiguas diffundat.

e Tertius Ves. tertius breuior & humilior à quinto lumborum pari, Plat. tertius nervus, Laur.

Tertius [ch. 66.] vbi lumborum vertebra quarta, quintæ articulatur, potissimum enascitur, qui supra femoris musculum septimum delatus, pubis ossis foramen permeat [67.] & femoris musculo nono & decimo quemadmodum & penis musculis à pubis ossis pronatis furculos porrigit & nervos duos ad femoris medium descendentes educit: quorum alter in cutim femoris iuxta inguina [68.] spargitur: alter ad musculum tibiæ secundum, & femoris quinti portionem [70.] absumitur.

f Quartus cruris nervus ex elatioribus quatuor paribus coëuntibus, Vesal. Plat. Lauren. cum primum quatuor nervorum principia exi-

Quartus [ch. 71. 72.] tertio sextuplo crassior est, imò omnium nervorum corporis crassissimus, durissimus, validissimus & siccissimus: hic ex ossis sacri paribus quatuor superioribus (siue ex vigesimo quinto ac trium subsequantium pari) conflatus, femoris posteriora subiens, inter sacrum & ilium os, quatuor fecedunt sinu peculiari deferitur: & à ramo posteriorius

uere uniuntur, maximum corporis nostri nervum constituunt, &c. Columbus, qui hunc primo loco recenset.

sterius [72.] sub femoris musculo primo latitante, cuti nates & femoris posteriora ad medium vsque tegenti, surculi diffunduntur & mox ramos alios vtrinque [73.] & quidem ferè tres ad capita musculorum tibiæ, tertij, quarti, quinti, & femoris quinti distribuit. Hinc ^h inter musculos reconditus infra femoris medium, ramū [74.] in tibiæ musculum quartum mittit, & soboles in cutim iuxta genu spargit; humi-lore dein sede ad femoris capita vtrinque surculum unum [75.] in capita musculorum trium pedis diffeminat. At truncus ipse, in sinu posteriore ipsius genu supoplite [76.] in ramos ⁱ duos crassitie inæquales scaturit, [77.82] qui in tibiā totā & pedem distribuantur, cum in tibiā nullus nisi ab hoc nervo rami mittatur, præter ramum à secūdo pari [61.] qui femoris, tibiæ, & pedis interiora percurrit, cuius tamen vices & quarti ramus [83.] aliquando subit.

^k Exterior [77.] gracilior est, qui statim bifidus fit, [78.79.] & maior exteriorq; [78.] qui statim circa poplitē educitur, secūdam fibulam & malleolum exteriorem, ad pedis exteriora, minimumq; digitum cuti in progressu surculos offerēs descendit. Alter verò & interior, qui aliquando maior [79.] vbi ramū [80.] ad tibiæ sedem anteriore misit, iuxta fibulam inter musculos peroneos dictos occultatus, præpit, & ramulos ipsis impertiēs [81.] versus malleolū externū reuoluit.

^l Interior verò & maior [82.] secundum tibiæ scellam posteriorem sub musculis occultatus cum mu-

Iiii

sculo


membrana, unguibus dirempta, hunc velut in duos nervos dirimere proposuerit, etiam icebit in quamplurimos, nervos diuidere cum nihil aliud sit, quam plures nervi in-
ar plurium rectorum funiculorum protensi & membranis circumdati: ac ea ra-
ione qua quis geminū esse contendet, ego illum decem & octo nervis cōflari asiruā,
um aliquando tot ipsius funiculi numerati occurrerint, Vesal. i Ves. Col. Plat.

^k In poplite ramus exterior, Ves. ramus minor ad flexuram genu Col. poplitem
accedens ramus exterior, Plat. ^l Interior & crassior truncus Vesal. ramus maior
ad flexuram genu. Columb. poplitem accedens ramus interior, Plat.

g Ab hoc in
penem ramus
transmittitur:
statim vbi co-
xendicē egre-
ditur: qui cir-
cumductus ad
pubis os sub ra-
dice penis, cum
suo pari & ve-
na penetrans
per dorsum pe-
nis ad glādem
ipsius perfer-
tur, ut vult
Fall. ego hunc
à ramo infimi
lumborum pa-
ris potius pro-
re crederem,
Plat.

h Galenus ra-
mū hunc tan-
quam geminū
secundum to-
tam femoris
longitudinem
deduxit, cum
in homine u-
nicā obtineat,
circūscriptio-
nem, & si quis
ipsius qua in-
uestitur mem-

TABVLA XXIV. Nervos totius pedis exhibet.



*in Alter ra-
mus maioris
profundiora
petens post fle-
xuram genu,
Columb.*

sculo quinto pedis & digitorū flexoribus in tibia sit-
deorsum fertur, & ad malleoli interioris sedem pe-
steriore reflexus, pedis inferiora accedit & digiti
singulis, furculos binos ferè cōmunicat: hic etiā bi-
partitur & à trunco maiore [inter 82. & 85.] paulò su-
diuisione & parte interiore, ramus [84.] pedit, qui
cutim suræ distribuitur: mox trunco in tibiam dela-
pso, ac sub tibiæ musculis latitāte duos adhuc ramos
propagat: ^m alterum qui antrorsum fertur & qui illi
insignior [85.] qui ligamentū membraneum tibiam
& fibulam connectens, permeat & iuxta illud deor-
sum rapit, musculis pedis digitorū, quibus attendi-
tur, soboles largiens & per ligamentum transuersum
seu annulare, vna cum musculorum dictorū tendi-
nibus transiens, pedis superiora adit & in muscule
pollicis & eos qui digitos abducunt distribuitur.

Alter vero qui minor est, retrorsum fertur [86.] &
posteriorem tibiæ sedem peruadit, & in pedis muscu-
los inter quos defertur, absimitur. Trūcus verò mi-
nor [83.] secundum tibiæ sedem internam, ad mal-
leolum internum hinc ad pedis latus internū ad pol-
licem, in pgressu furculos varios in cutim spargens
n excurrit. Et hæc est neruorum in pedes distributio

*n Columbus,
postquam ner-
uum nostri cor-
poris maxi-
mum, eiusq;*

*distributionem recensuit, subiungit: post tria foramina ossis sacri, sequitur 4. & 5.
in quibusdam, ex quibus egrediuntur duo alia neruorum coniugia, qua post egres-
sum quoq; uniuntur, neruum gignentia qui reflectitur & ad musculos narium di-
stribuitur & cutim illarum: in internam abdominis partē mittit neruulos ad mu-
sculos recti intestini, in nonnullis ad vesica quoq; in feminis ad uterum eius cerui-
cem & vesica musculos, alij ad perinaum & scrotum: ex posteriore parte ossis sacri
per ea foramina neruuli profiliunt, parui admodum breuesq; qui ad musculos dor-
sales, ad nates, ad posterioremq; cutim delegantur.*

DE LIGAMENTIS OSSIS ILII, & sacri & qua in toto pede habentur.

C A P. XXXIX.

De ligamentis cruris & pedis agit Galen. 2. adm. anat. 10.

LIGA-

LIGAMENTA^a quæ ilium & coxendicis os, cum sacro osse, pubis item inter se cōnectunt, & quæ crus pertinent, explicanda nunc sunt, Ligamentū quod ilium os, sacro ossi validissimè connectit, commune est, latū & membraneum^b & robustum quod te ea, qua ossa intercedit [tab. 39. lib. 1. fig. 13. A B C] cartilagineum ligamentum & robore & crassitie quamvis & cartilago intercedat) refert, quod nexum iam arctius constingat; quare nexum hunc si va-
lor impressio fiat, in partu nonnihil cedere posse, quidem ilij ossis & sacri, alij verò & pubis ossium sunt, qui ne nimiū cedāt ligamētis opus habuēre. Quod verò os sacrum coxendici iungit, duplex^c est: aliud ex^d ossis sacri quinti & sexti cōiunctione natum in coxendicis processum acutū infigitur [17. lib. 4. fig. 5. 6. u. tab. 20. fig. 13. 14. i.] Aliud ex eodem deductum, in coxendicis posteriorem sedem seu coxendicem inferitur [tab. 17. fig. 5. x] quo ossa hæc firmius colliguntur: quamvis^e & hoc ligamentum rem intestinum cum suis musculis, cum nullum os iunctum sit, sustineat.

hic pubis ossa,^f licet cartilaginis interuentu colliguntur, geminum tamen ligamentum habent, aliud circulariter ambit, ne in partu, aut alijs femoris artib. magnis frangantur: nam si tantum ossa fuissent, id cōtingere potuisset. Aliud quod foramen ipsum

Iiii 3

occu-

unt: tandem ligamentū inter tibiā & fibulam & ligam: in foraminibus pubis Archangelo ligamenta arthritica (tām brachiorum quàm crurum) dicuntur: femoris latum 2. teres qua duo coxendicem nectunt 3. femoris & tibiæ capitulum 4. inter tibiā & fibulam ea superne & inferne copulans, 5. tibiā cum tarsis ossa copulans, 7. ligamentum transversum in tarso sextuplex, 8. ligam. in pedum ad digitorum extremitatē porrectum, 9. ligamenta communia digitorum quæ singulos deuincientia. b Ilj ligamentum, Lauren. c Sacri ossis vincula Lauren. d Ligamentum inter sacrum os & coxendicis situm, oritur ab extremitate ossis sacri, transversumq; desinit in acutā coxendicis partem, colligat hæc ossa & tenet; licet alter vñs adanci possit, ut scilicet maiori nervo aditus pateat, Col. Ves. Plat. Laur. f Pubis ossis vincula duo, cōmune, & foramen occupās, Laur.

a Ves. & Plat. ligamenta hoc capite propostita eodem penè modo recensent: Lauren. succinētè admodum, Columbus enumerat sequentia 1. membraneū circa femoris caput 2. quod in femoris caput inferitur 3. quod inter capita inferiora & tibiā 4. quod rotulam ambit 5. quod ab osse sacro coxendicem accedit 6. in extremo pede, præter vinculum cōmune, sex alia transversa ut in brachiali, & alia quæ pedis digitis, quemadmodū digitis manus

3 Vincula quæ sunt in pubis foramine, nomen musculum à decimo diuidunt, Col. h Vinculum membraneum crassum, articulis omnibus commune est, in articulo femoris cum osse coxendicis, ilij ac pubis Col. ligamentum coxendicis & femoris primum, Arch. ligamentum femoris commune. Plat. Laurent. i Vesal. Plat. & Ligamentum femoris secundum Col. Archang. ligam. femoris primum, Plat. Laur. i Ves. & Laur. m Sic, Col. Plat. Laur. at Vesalio ex femoris capitis medio prodit & in acetabulum inferitur. n Col. Arch.

occupat^h membraneum est & fibris obliquè deorsum latis constat [tab. 21. fig. 16. b] nam cum ab osse pubis pars, quò leuius esset, ablata fuerit, ligamentum substitutum, quo loco ossis musculos sustineat & simul vtrumq; obturatorem siue femoris 9. & 10. musculum distinguit. Ligamenta cruris triplicia sunt alia enim ad femoris, alia ad tibiæ, alia ad pedis articulationem referri debent.

Femur, coxendicis articulo duplici ligamento nequitur: altero communi^h membraneo, q̃ articulum orbiculatim ambit, [t. 21. fig. 20. MM] quodⁱ Græci ^{ἰχίος}, totius articuli nomine vocarunt; quod cætera articulos ambientia crassitie, duritie, & robore superat, cum articulus hic corpus totum sustinere & motus validos perferre debuerit. Hoc articulo & femoris ceruici accumbit & solum radici magni processus orbiculatim adnascitur, quo motus capitis ipsius femoris non impediuntur. Alterum^k ipsius ligamentum teres est [L] & ob duritiem nervus^l cartilagineus censeri potest: hoc in acetabulo coxendicis situm, ex eius^m profundo seu humiliori sede, vbi adeps siqui oblinitur: quò femoris caput facilius moueatur & acetabuli supercilium cessat [t. 39. lib. 1. fig. 14. c d] ortum ducit & superius in femoris caput medium inferitur, idq; ne femoris caput è sinu suo facile excidat, firmitiorque sit articulatio, siquidem femur graue & veluti à coxendice pendulum sit: quare dum hocⁿ laxatur, & prolixius fit, sæpè numero luxationem causat & aliquando disrumpitur & quamuis os restituitur, luxatus tamen semper claudicat, cum non ut prius rectè cohæreant.

Tibiæ & fibulæ ligamenta sequuntur: o tibiæ primum

o Tibiam cruri alligant præter communia & lata tria valida & rotunda ligamenta, Laur. at Vesal. & Plat. j. x. p Lig. 4. rotulam ambiens Col. ligam. femoris & tibiæ capita cingens, Archang. ligam. tibiæ commune, Plat.

Iiii 4

b Pedis t 5. Plat.
u 2. Plat.

x3. Plat. y Ligamenta cōmunia, Plat. z Ligamentum membranofum inter tibia ac fibulam, Col. Arch. Laur. ligam. tibia musculos continens, Plat. a Ves non modo vnit & vincit sed musculos distinguit, Col. tibia & fibula capita supra. & infra internè deuncit & tibia musculos interiores ab exterioribus secernit, Archang. Laurent. musculos sustinet & ossa simul neclit, Plat.

b Vt pedis & manus eadem est fere compositio, ita vinctulorum, quae ossa cōnectūt, musculosq; cōtinent & firmanant, non dissimilis est structura, nec numerus valde dispar, Laur. in extremi pedis articulo inter ipsos tibiamq; & fibulam prater vinctulorum structis omnib. commune, sex alia cōspiciuntur, quae tendines continent, extremo pedis & digitis inseruientes, Col. quemadmodū in carpo tam externe quam interne vnum est ligamentum transversum idq; sextuplex sic etiam in

b Pedis ligamenta plura sunt, quorum alia tendines ad pedes eorumq; digitos transmissos cōtinent, & tria sunt transversa^e; alia pedis ossa connectunt: Primum^d [tab. 16. fig. 1. 2. ch. 2. tab. 21. fig. 20. YZ] anterius ad articulum pedis cum tibia situm est, quod ossa cōnectit & musculorum aliquot tendines transmittit. Alterum [tab. 21. fig. 20. a] à tibiae osse seu malleolo interno in calcis os inferitur, quod annulos tres veluti ligamenta tria constituit, cum sinus tres ibi sint [tab. 21. fig. 19. ch. 1. 2. 3.] propter tendines pollicis flexoris & digitorum flexoris maioris qui illac transcurrent. Tertium^e [tab. 16. fig. 3. r. & tab. 21. fig. 20. b] à malleolo externo in calcis os, vel à fibula calci implantatur, ossium coniunctionem adiuuat, & sinibus duobus obducitur, ad tendinum vtriusq; peronaei transitum, quemadmodum in musculorum historia ostendimus. At horum ligamentorum, quemadmodum & in carpo usus est, ut primò robur addant, ut tendines musculorum pedis, ne à suo situ facile dimoveantur, contineant & ut tendines hi à ligamenti portionem acquirant, quo vna cum nervorum exilitatibus producantur. Sic in digitorum^f pedis inferna regione, ligamenta etiam transversa, quemadmodum in manu occurrūt, quae tendines digitorum internodium secundum & tertium flectentes, in officio detinent. g Ossa pedis connectentia, vel ad talum, vel tarsum, vel pedium & digitos referuntur.

Talum vel tibiae vel pedis ossibus cōnectunt: quae tibiae

c Sunt etiam transversa ligamenta, interna, externa quae tendines digitos flectentes extendentesq; continent, Laur. d Ad tibia ligamenta, quod tendines contineat, refert Plat. e Ligam. internum & externum pedis tendines continens, Plat. f Vesi. Col. Plat. Est & tertium ligamentorum genus in rectum exporrectum ad extremitatem usq; totum musc. digitorum pedis exporrectum, Archang. habent & singuli digiti vinculum membranosum tendinem firmans, Laur. g His addit membranam latam plures musculos in crure simul complicans: & ligamentum in pedis planta tendinis vicem gerens, Plat.

tibiæ ossibus, horum primū^h commune est & membraneum, quod articulum tibiæ cum talo ambit, reliqua cartilaginosa sunt. Alterum à tali partibus internis [tab. 21. fig. 20. c] quibus malleolo interno excipitur pronatum, tibiæ ossi, qua talum respicit, inseritur. Tertium à tali partibus externis fibulæ ossi, talum respicienti infigitur. Quæ vero talum pedis ossibus connectunt, horum primumⁱ membraneū est, & commune & articulum calcis cum talo cingit. Alterum^k robustius est, & cartilagineum, & à tali sede inferiore iuxta ceruicem oritur, & calci inter duas ipsius cum talo commissuras inseritur. Tertiū^l cartilagineum quoque est & articulum totum exterius ambit, quod ex tali ceruice pronatum ossi naviculari infigitur. Quartum^m validum, à tali ceruice in os tessaræ, vt illi connectat implantatur. Quintumⁿ robustum est, & cartilagineum, quod calcis os, ossi tessaræ simili committit, & articulum amplectitur.

Tarsi quoque ossa ligamentisⁿ durissimis & cartilagineis copulantur, vel vicinis ossibus, vel inter se: vicinis ossibus, vt posterius, os tessaræ ceruici tali: idemq; calcis: Si tria ossa ossi naviculari & antierius pedij ossibus: inuicem verò committuntur, vt in pedis parte superiore seu dorso: sic parte inferiore ligamentum validissimum, & peculiare, quod & externè alligat, & ossium quoque media, cum iis inseratur, inuicem vincit.

Pedij tandem & digitorum^o ligamenta, quæ ea simul connectunt conformatione & ductu manus ligamentis correspondent: & ea quæ pedij ossium interuallis immittuntur, cartilaginea sunt, cætera vero membranea. Hæc de ligamentis pedis.

IIII 5

DE

connectūt, vincula peculiari, hæc Laur. o Extāt quoq; communia ligamenta, quæ singulos digitorum articulos deuinciunt, quemadmodum etiam in manu, Arch.

^h Ligam. tibia caput cū talo iungens commune est, Archang. Laur.

ⁱ 5. Vesal.

^k 3. Vesal.

^l 4. Vesal.

^m Inter tali et tarsi ligamēta posuit, & 6. & 7. loco recensuit Vesal. ad tarsi retulit 2, & 2. posuit, Plat.

ⁿ Ligamentū septē tarsi ossa copulans, quæ admodum illud, quod octo carpi ossa copulabat, & vt hoc in ossa post-brachialis usq; excurreret, ita illud in ossa usque pedij excurrit, Arch. ossa tarsi vicinis colligāt communia ligamēta inuicē vero

primum de femoris osse.

CAPVT XL.

Consule Galenum lib. de oss. 21. de osse femoris, maxime eius
figura & situ 3. vs. part. 9.

23. vs. part. 9. **P**EDIS ossa quadraginta duo sunt, in pede quolibet, quæ in femoris, tibiæ & pedis extremi ossa diuiduntur.

Femoris os sicut & humeri^a vnicum est [tab. 25. fig. 1. 2. 3.] ^{μυρὸν} Græcis, femur^b Latinis à ferendo^c quod his præcipuè partibus animal sustineatur, atq; feratur, dictum: hoc in homine & simia omnium ossium, maximum & longissimū est, in cæteris vero in quib. maiori ex parte delitescit^d ipsa tibia breuius est: hoc à coxa oblique introrsum ad genu ducitur.

Figura ipsius longa est, rotunda & recta, sed non exquisitè cum oblique versus interiora ad genu descendat, propter firmam^e stationem ambulationem & cursum: nam quibus femur natura rectius, quam conuenit, contigit,^e vari & claudi in genu redduntur, quam sane formam^e notare conuenit, etiam Hippocrate monente, ne si fractum restituendum sit, inuertatur: Anterius^f gibba, quod ad^e sessionem vtile est, & ad multa opera, quæ sedentes agimus, cuiusmodi est scribere^e libro ad femur extenso, & vt femur vnū alteri imponamus: in lateribus teres & vtrung; leue: posterius sima & caua: at superius^g in caput,

malibus iuxta clunes latites, & ea qua primò se exerit, tibia os est. Et Aristoteles propriâ femoris & tibia sedem ignorauit, quando asserit aues femore destitui, quod omnino falsum, nam id in auiibus delitescit, Col. e3. vs. part. 9. eius utilitatis occasione non solum hoc, sed etiâ tibiâ magis curuam extrinsecus natura fabricata est: probat Galenus, quod qui plurimum curuus sunt cruribus, tales in vtero vel prima educatione facti, siue duobus pedibus siue altero solo stare velint, firmiore multo & difficiliorè euerfu, quam qui crura habent recta obtinere firmitudinem. f Anterius, exteriusq; gibba, posterius interiusq; sima, de oss. 20. g Superius, caput obtinet ceruici adnatū, ad ceruicem duo processus, vñ extremas superioribus eminentiis protuberat. ceruice, trochantere maiore & minere, Plat. tres apophyses caput

put, ceruicē, duosq; processus, inferius in caput, duabus productionibus & sinibus donatum, desinit.

Caput superius [fig. 1. 2. A fig. 3. XY superius] quod ab appendice orbiculari, quo donatur^h totū efformat [fig. 3. XY superius] crassum est, & omnium quæ in corpore sunt maximū, ita vt Hippocrat. i eximiē *ἐξ ὀφρὸν* articulū vocarit: rotundum & oblongū, quo coxendicis acetabulum profundū & cartilagine adactum rectius subeat, quo articulatio hæc, q̄ p enarthrosin (quæ diarthrosicos species est) fit, validissima sit, idq; propter pondus immensum, quod femur sustinere debuit, cuius nomine etiam ligamentum robustissimum & teres à coxendicis acetabulo pronatum, quo simul copulantur obtinuit, quod in eius sinum [fi. 2. B] profundum & angustū paulò sub vertice situm, implantur: est quoq; læue, cartilagine incrustatum, quo femur faciliē & expeditissimē flecti, extendi in latera moveri & circumuerti possit.

* Cernix [fi. 1. 2. 3. D] capiti subiicitur, quæ oblonga sursum protensa & intrò obliquè reclinata est, ne femur, si totum cū capite acetabulo adhæreat, in motu impediat: ex hac vbi os latiusculū redditū est [sub D] veluti nodi duo educuntur, quos^l processus vocat, qui appendicibus donant [fig. 3. X mediū] quæ in nup natis facile (quemadmodū & caput ipsum) diuelluntur in adultis verò, cum partibus prominentibus vniuntur [fig. 2. Q. cum V fig. 1. a cum b] ita vt appendicis vix vllum vestigium appareat. Horum alter superior [fi. 2. Q V]^m maior est & sursum, simulq; extrorsum vergit: alter inferior [fig. 1. 2. a] qui longe minor est, & retrorsum simulq; introrsum spectat: hos *ῥοχαισῖ- πας* *δὲ* *ῥοχαισῖ* siue rotatoresⁿ vocarunt, vel quod femori rotando facti sint, vel potius, quod his muscoli, qui femoris motus perficiunt, inserantur: illum tamen *μῆσα* *ῥῆ* *χαλ.* *πα* magnum rotatorē,

ἢ *trochæteras* duo. *aur.*

h Sic Laur. ferè totum, Col. Arch.

i Lib. de fracturis.

k *αὐχὴν* seu cernix proluxa ad interiora reclinata, de off. 21. causam cur foras processerit, vide 3. vj. p. 9.

l *Apophyses* duas exiguas cernix habet, quas *trochan- teras* vocant, quorū exteriō maior est, de of. 21. Processus

duo seu rotatores, Ves. Colu. Arch. trochanteres duo, Plat. Laur.

m Omnium corporis processuum, nulli al: eri ossi commissorum, maxim^o facile Ves. maximus est, Plat.

n Quod rotando femori facti sint, Columb. addit Archan. cū illic emergant musc. qui femur rotant: posterius assum- sis Laur.

& sim-

o Cum simpli-
 eter τροχαντή-
 ex dicunt, per-
 petuo externū
 subaudiūt, Ves-
 sal. trochanter
 maior proces-
 sus dicitur, cū
 tamen appen-
 dix sit, Fallop.
 obseru.
 p Gal. de off. 21.
 Ves. Col. Laur.
 q Trochanter
 minor cū prio-
 ri minor et vel
 uti māmillarīs
 sit. & proces-
 sus posterior,
 Plat. trochan-
 tira minus,
 Arch.
 r Vesal. Colu.
 Plat. Laur. ut
 illic exoriātur
 musculi, qui
 femur rotant,
 Arch.
 s Vesal. linea in
 posteriore fe-
 more Col. aspe-
 ritas obliqua,
 Plat.
 t Ves. & Plat.
 in ossis homi-
 nibus & atate
 prouectis 4. im-
 pressionēs, cō-
 pressionēs, Ve-
 sal. alia ibi a-

& simpliciter ο τροχαντήρα : & γλῆσσιν p à natium qua-
 dam imagine, vel quod natium musculi ibi inseran-
 tur, vocarunt: hunc verò q paruum rotatorem no-
 minârunt. At processus hi linea quadam, quæ po-
 sterius eminens ab externo ad internum ducitur, si-
 mul iunguntur: vnde femoris os teres redditur. Ho-
 rum vsus, r collis modo musculorū quorundam
 insertionem admittere, & quibusdam exortus sedem
 præbere. Interiori siquidem musculi primi & secun-
 di femur flectentes tendo infigitur; ad hunc s linea
 etiam aspera [fig. 2. cc] oblique in posteriora deor-
 sum ducitur, & ultra modum in partes duas scindi,
 & caput vtrunq; petere videtur, quæ ad externum
 euidentius terminatur, cui femoris musculus octa-
 uus implantatur, & tenaciter adhærescit, siquidem
 eius beneficio maximè recti stamus.

Ad processum externum, t sinus, impressiones &
 linea notantur. Sinus [fig. 2. x] qui femoris caput re-
 spicit, cui femoris musculus nonus & decimus, infe-
 runtur. Impressiones ad sedem externam gibbam,
 quatuor sunt, qui musculorum quatuor tendines
 excipiunt: prima in posteriore & humiliore sede
 [fig. 2. Q] ampla, vt musculi primi femoris, secunda
 [fig. 1. τ] in anteriore sede magis aspera, vt secundi:
 tertia sede elatiore & externa [fig. 1. & inter τ & υ] quæ
 gibba est, vt tertij: quarta [fig. 1. & 2. γ] in processus
 apice ceteris angustior, vt quarti femoris musculi tē-
 dinem suscipiat. At à radice huius processus, sede an-
 teriore & exteriori tibiæ musculus septimus exoriē.
 Linea vero aspera [fig. .ss] à prima impressione de-
 orsum, per femoris posteriora nonnihil oblique du-
 citur, eiq; femoris musculus primus implantatur.

Iam

speritates & nonnulla impressiones musculorum occasione fabrefacta: vt in mu-
 sculorum descriptionibus patebit, Columb. Partes antica, postica, interna, exter-
 na, inæquales sunt, nullisque exasperantur processibus ad musculorum exortum
 & insertionem, hac Laurent.

Iam vero infra mediam regionē, femur, quo magis descendit [fig. 2. à d ad e] crassius redditur, dilatatur & deprimitur [fig. 2. e] quo vena, arteria & nervus hac tutius ferantur, & tandem in caput amplum latumque exit, quam latitudinem appendix magna, [fig. 3. X Y inferius] constituit: ex hoc capite processus duo, tanquam capita duo [fig. 1. 2. EF] posterius educuntur inter quæ spatium amplum [fig. 2. I] pollicis latitudinē relinquitur, quod tuber è tibiæ capite erumpens suscipit. duo hæc capita extrinsecus aspera sunt, superficie lævia propter cartilaginem circumfusam, ad motum ad genu expeditiorem, quæ retrorsum magis vergunt, & in lateribus vix deprimentur, propter articulationem cum tibia [iunge fig. 1. 2. EF I cum tab. 26 fig. 7. GF I] quæ per Ginglymum, quæ diarthroseos species est, fit, cum duo hæc femoris capita * tibiæ sinibus duobus insideant, & tibiæ tuber inter sinus duos eminens [tab. 26. fig. 7. I. inter GF] à femoris sinu posteriore [tab. 25. fig. 2. I] excipiat: verum & ligamento valido, à tibiæ tubero producto, femur cum tibia non secus, quam superius ipsius caput, cum coxendice, colligatur. Horum capitum alterum internum, quod crassius est, alterum externum, quod latius, magisq; depressum, ne ambo cum tibia æqualiter inarticulentur, & sic motus obliquus^z, qui à popliteo musculo fit, impediatur, qui ab externo capite, vbi sinibus asperum est, prodit: & hæc, vti dictum, tibiæ ossis sinum intrat. Ab his quoq; veluti processibus, pedem mouentes musculi tres primi principium ducunt: quemadmodum

u Infra leniter patet, in duo tubercula desinit, adeo grana ut capita possint appellari, de oss. 2. Inferiori sede femur in duo capita oblonga omnium totius corporis ossium maxima dirimitur, Vesal. femoris, os tandem in duo magna capita exit, Col. femoris extremitas inferior lateat in duas partes, quæ capita producant, Platar. in inferiore femoris parte capita duo & sinus, Laur. Caput inferius processus duos tanquam tubercula emittit, Archang. x Tibia annectuntur tribus validis & rotundis ligamentis, quorum v-

num ab exteriorē totius connexionis parte, ab interiorē alterum, à medio posterioris interiorisq; tertium porrigitur, de oss. 21. y Hoc ligamentū teres, quo femur supra infraq; insignitur, articuli detinendi gratia, in aliis articulationibus minime reperiuntur, idcirco observatione dignū est, Col. 2 Quā in argutū rectū flecti satius erat, Ves. decipitur Vesal. in musculo flectente tibiā ad externā, Col. motū tibiæ rectum tantum præstat, ut flecti in angulū, & in rectam lineā extendi possit, Plat.

T A B. XXV. Fig. 1. & 2. femoris utrumque:
 faciem exhibet: fig. 3. femoris os cum suis app. n-
 dicibus: fig. 4. & 5. patellæ utrumque
 latus ostendit.


TAB. XXV.

LIB. IV.

FIG. I.



II.

III.



IV.

V.



dum in capitis interni latus [M] vbi compressio [fig. 1.K] femoris musculi quintitendo infigitur: sic etiā eorū latera foraminulis cæcis asperfa, quo ligamenta genu articulum continentia inde prodeant.

^a Ves. & Plat. sinus posterioris & anterioris ex Galeno meminit Columbus.

^b Cartilagine nequaquā obductū, & nec latera, Ves.

Sinum quoq; ^a quadruplicem habent, duos in caput medio, & ad caput latera vtrinq; vnum: horum primus anterior [fig. 1.H] leui cartilagine incrustatus, patellæ tuber excipit [fig. 5. g h] alter ^b posterior [fig. 2. I] profundus, asper & inæqualis tibiæ tuber [tab. 16. fig. 7. I] suscipit, tertius ad capitis latus exterius [fig. 1. 2. N] per quem tibiæ musculi quarti tendo, qui hic reflectitur, tutò vehitur: quartus ad caput interius [fig. 2. O] quo tendines musculorum 1. 2. 3. & 5. tibiæ tuto deducantur.

Anterior item ad ceruicis radicem, os amplum & asperum est [fig. 1. f] propter tibiæ musculi octauum exortum: posterior in lineam asperam & inæqualem protuberat [fig. 2. dd] cui femoris musculus quintus infigitur.

^c Vfus femoris ut animalia progrediantur seu molis progressu ad quāquam agendū ab anima cō-

Tandem, intrinsecus secundum longitudinem ossis, sinus amplius existit, nō tam leuitatis causa, quā ut medullam multam pro alimēto contineat: quare ossis pars summa præfertim ima, foraminibus plurimis paruis pertusa est, quo venas sanguinem eò deferentes admittant. ^c

pellantur: & quod ex animalibus progressiuis, alia recta, alia prona incedāt, hanc varietatem efficit varia ligamenti rotundi ac validi à capite femoris in acetabuli insertio: nam si inseratur versus superiorem acetabuli partē, recta progrediuntur animalia ut homo: si versus lateralem, prona incedunt, ut bos equus, Arch.

DE TIBIÆ OSSE VTROQUE.

C A P. XLI.

Vide Galen. lib. de oss. 22. 3. vs. par. 13. de tibiæ optima magnitudine. 3. eiusd. 14. fibulæ vsus triplex. 3. eiusdem. 3.

^a Gal. de oss. 22. ^b Ossa cruris, tibia & fibula,

TIBIA cruris pars est, quæ inter genu, talumque posita est & ossa ^b duo [tab. 26. fig. 1. 2.] quemadmodum

modum & cubitus habet: nam quo ad motum magis expedita sit ex duobus, non autem ex vno, crasso & magno, quod grauius^c & ponderosius & ad motum expeditum ineptum constare debuit. Horum alterum interius *κνήμη* tibia [fig. 3. 4.] alterum exterius *περόνη* fibula [fig. 1. 6.] dicitur.

Tibiæ os quod totius membri^d nomen retinuit & *κνήμη* siue tibia nominatum, fortè quod tibiæ^e instrumento musico simile sit: dicitur quoq; canna maior: hoc interius situm est, & altero crassius & longitudine à femore, cui ipsum annectitur, superatur, humerum verò & reliqua omnia superat.

Figura est longa & triquetra, supra infraq; crassum appendice donatum [fig. 1. 3. A B D D] sinibus, productioribus & linceis varium, quod superius cum femore, inferius cū talo per gynglimon articulatur.

Superior pars (quam caput superius vocāt) latior est inferiore cū femoris^d patandi gratia tibia creata sit, quam latitudinem appendix superposita [tab. 26. fig. 1. 3. A B] efficit: quæ etiam admodum crassa & anteriorius magis [fig. 1. 3. B] quam posterius deorsum vergit. Sinibus duobus^d oblongis [fig. 2. & 7. F G] superficialis cartilagine lubrica incrustatis donatur, quibus femoris capita duo [tab. 25. fig. 2. E F] excipit & sic gynglimus fit: at cum cavitatem capitum altitudini conuenientem non habeant, ^f quo sinuum profunditas adaugeretur, cartilago ^g peculiaris [fig. 8.] quæ semilunam^h seu Græcorum sigma refert, appositae est & ligamentorum beneficio connexa: hæc mobilis est & in ambitu [fig. 8. N] crassa, ita tamen, vt centrum versus semper attenuetur [fig. 8. O O] & centrum non attingit, sed in apices acutos vtrinque fi-

K k k k

nit quæ hætenus

vidi quadrupedibus & auibus, modo quis ex actè genu articulum inspexerit, neq; bassim cum Aristotele lib. de communi animalum gressu & Gal. 3. de part. vs. quadrupedum genus illic esse existimauerit, ubi tibia inferior pars illorum talo coarctatur, Vesal. h Cartilago lunata, Columb. lunaris Plat.

Archang mo-
do tibia, modo
crus ducitur.
Columb.

c 3. vs. part. 13
ubi offis tibia
necessitatem
trahit.

d 3. vs. part. 13.
e De off. 22.

f Et si Galeno
secus visum
fuerit. 3. vsu
par & in com.
Hipp. de fra-
cturis, Ves.

g Non solum in
hominibus ve-
rum in omnib.

T A B. XXVI. Fig. 1. & 2. tibiæ & fibulæ of-
 sa coniuncta anteriore & posteriore facie, fig. 3. &
 4. tibiæ, fig. 5. & 6. fibulæ utrunq; latus exhibet:
 fig. 7. tibiæ caput superius, fig. 9. tibiæ & fibulæ
 caput inferius, fig. 10. & 11. utriusque distinctū
 proponit: at fig. 8. cartilaginem
 circa genu.

FIG. I.

II.

III.


IV.



VII.



VIII.



IX.



X.



XI.



nit [fig. 8. PP] ita tamen vt antcrius apices : proximi sint & dextra sinistra committatur, posteriore verò parte magis distent, cum ligamentum crassissimum illâc transire debuerit. Lubrica quoque est, lævis, mollis, humore vnctuofo plena, quo articuli mobilitate iuuat & ligamenti vice fungatur.

i Eξ οὗ τοῦ νεύρου
ἀναδεδραῖστος ὁ
ὀσθ. 22. tuber
Vesal. Plater.
Processus Ar-
chang. Laur.
tuberculum,
Columb.
k Nulla carti-
lagine inun-
cta, Vesf.

i Tuberculum [fig. 7. HIK] asperum & inæquale è Tibiæ superficie media pronatû, sinus hos duos separat, quod à femoris, sinu [tab. 25. fig. 2. I] duo eius capita inferiora intercedente excipitur : ex cuius k apice [fig. 2. 3. 4. 7. I] aspero & sinuato eiusque posteriore regione [tab. 2. 4. 7. K] ligamentum validum prodit, quod femoris sinui medio [tab. 25. fig. 2. I] infigitur, quo articulus omni ex parte munitus in sede sua continetur. Ab anteriore verò huius regione [fig. 7. H] aspera ac sinuata, ligamenta educuntur, quæ cartilagines tibiæ sinus augentes [fig. 8. LM] tuberculi sedi anteriori iungunt: licet & ligamenti orbicularis, genu amplexantis interuētu connascatur.

l à plerisque
ὡς ἀνθήκων νο-
cata, Vesal.
Plat.

Capitulum ad externum tibiæ latus ex appendice exsurgit [fig. 4. R] quod cartilagine incrustatum appendicis fibulæ sinum superiorem [fig. 5. Q] subit. Sic anterior sedes appendici proxima^l [fig. 1. 3. 7. ab] aspera est & foraminulata, quò tendines musculorû tibiam mouentium fortius inserantur.

Tibia hinc sensim attenuatur lineis & sinibus variis distinguitur, & formam triangularem quadantenus imitatur, habet enim angulum vnum veluti aciem longam, acutam, in anteriore parte situm, alterum in exteriori, tertium in interiori, inter quos planities interiectæ sunt leuiter excauatæ, tum propter leuitatem, tum propter musculorum insertionē & exortum: posterius verò rotundum est.

m Linea pri-
ma tibia Vesf.
(cui tres) Col.

Anterior pars & media in angulum acutum^m & oblongum producit [fig. 1. 3. 77] quæ adeò acu-

tat

ta ut cultri aciem effingat, quare $\alpha\kappa\upsilon\nu\delta\alpha$ seu α spina tibiae, dicitur. Linea altera $^{\circ}$ [fig. 1.2.3.4. $\delta\delta$] quae posterioris sedis externum angulum educit, acuta est, fibulaeque subiecta, quae ligamentum suscipit, quod fibulam tibiae ossi colligat. P linea tertia [fig. 1.2.3.4. $\epsilon\epsilon$] quae posterioris sedis angulum internum constituit, obtusa est, & propemodum teres. Quare lineae hae, tibiae latera tria constituunt, primum [fig. 1.3. ζ] sinuatum & planum, quo cum fibulae latere [fig. 1.5. χ] musculis anterioribus in pedem descendentibus sedem praebet: secundum [fig. 1.3. η] latus internum est & gibbum, quod $\alpha\sigma\iota\kappa\upsilon\eta\mu\iota\omicron\nu$, & quibusdam $\kappa\pi\epsilon\sigma$ contrario sensu dicitur, cum omni prorsus carne destituatur, ceteris lateribus maxime posteriore carnosius; tertium [fig. 2.4. θ] quod tibiae musculi posteriores occupant, & in quo superne alia linea aspera oblique delata occurrit [fig. 2. N. 4. κ] pro musculi poplitei insertione.

Supra caput inferius, extrinsecus sinus ζ quoque est, oblongus versus posteriora ductus [fig. 4. 10. ς] qui fibulae capitis porcionem anteriorem nonnihil asperam [fig. 5. 6. 11. τ] suscipit, sicque fibula tibiae iungitur, at ubi ossa haec coniunguntur ligamentum validum intercedit, quod ipsa & in ambitu, & ubi se tangunt connectit. Sic posterius deprimitur, [fig. 2. 4. 10. m]. & velut sinus tres exhibet, qui musculi quinti pedis & duorum digitorum flectentium tendines tres, ad pedes protensos deducunt.

Inferior tibiae pars seu caput inferius, crassum est, quod ab appendice addita & cartilagine copiosa incrustatum, latiusque redditum, superiore minus est:

Kkkk. 3. cuius
 anteriora $\epsilon\sigma$ aerem nobis adversum progrediamur, hanc facile tibia scindere possit, propter acutiem hanc sicuti acutior sit in navis proa, ut cum pulso facile, minimoq; negotio aqua scindere possit, atq; diducere, ut navis ipsius expeditus sit inq; Archang. ζ Asper nonnihil $\epsilon\sigma$ laevi cartilagine nequaquam incrustatus, Vesal. laevi cartilagine obductus, Col. Sinu amplo aspero, non incrustato, Plat.

huic duo: Angulus acutus tibiae, primus Archang. (tres enim habet) angulus acutus Laur. aded acute porrigitur, ut nusquam posuit concertantes puerorum pedibus invicem petere videamus, quae ad anteriorem tibiae sedem, ubi linea proxime cuti subiecta, hanc cultri modo scindit, quoties ipsa impetu ad tibiae os alliditur, Vesal. n Vesal. Col. Plat. Laur. o Vesal. Col. angulus alter Archang. p Vesal. angulus tertius, Archang. q De oss. 22. ocrea inter preti. r. Cur factus ille, angulus in anteriore parte? an cum in

cuius appendix vnà cum fibulæ appendice, sinum amplum in superficie efformant [fig. 9. defgh] qui talum [tab. 27. fig. 3. 4. 5. G] suscipit: at sinus in tibiæ appendice, quasi geminus [fig. 9. 10. ef] est tuberculo in horum medio leuiter prominente distinctus, [fig. 7. 10. d]

2 Vesal. Col.
Arch. appen-
dix Laur.

u Malleoligib-
bi exterius, in-
trinfecus caui
de off. 22.

x Hipp. de na-
tura oss. Gal.
de oss. 22. per
multi à spazà
lus, talos vo-
cant, sed errāt
penitus, nam si
his utrinq; ta-
lus continetur,
ac contegitur,
ut me citi tan-
gere possis: idē.
Erasmus mal-
leolos in ho-
mine talos si-
mul cum Pli-
nio vocari in-
nuuit, quod nō
nulli Galeni
interpretibus
arripit, ut σφu-
ρα talos reddi-
derint. Ves.

Processum ab interno latere [fig. 1. φ 2. 3. 9. 10. i] crassum habet, qui parte qua sinum respicit [fig. 9. g] cauus est, læuis & cartilagine incrustatus, quo cauitas hæc grādiōr reddatur, sicq; talum sinui insertum, ne sua sede, dimoueat ur cōmodius excipiat: latere verò interno tibiā alteram respicit, u gibus est & excarnis [fig. 2. 3. 9. 10. i] At parte opposita tibiā processum alium habere non potuit, quia in hoc sinus oblongus, quem fibulæ portio subiret, esse debuit, qui sensim dilatatur, & in duo supercilia definitiquare fibula quoque in processum abiit, vt sic tali os ab utroq; processu contineretur, ne in alterutram partem dilabatur: quod si eius luxatio aliquando contingat ad processum internum magis sit, quam externū, cum fibulæ processus longius producat ur.

Dicuntur hi processus σφυρα * malleoli tibiæ quidem, malleolus internus, fibulæ verò malleolus externus.

Malleolus internus [fig. 1. φ 2. 3. 9. 10. i] parte posteriore sedeq; infima sinum asperum habet [fig. 4. 10. k] vt ex eo ligamentum cartilagineum prorumpat, quo tibiæ tali os colligetur. Sic in appēdicis inferiore anterioreq; sede [fig. 1. 3. 9. l] sinus est asper & transuersim oblongus, vnde ligamentum, tali ceruicem [tab. 27. fig. 3. N] tibiæ ossi nectens enascitur.

Tandem hoc os, quemadmodum & fibula intus cauitatem habet medullam continentem: nec foraminibus carent, y

DE

v Vtus tibiæ exeditior progressus, Archang. tibiā pedis causa effecta, Plat.

DE FIBULA.

Alterum os *περόνη*² fibula² nominatur, & sic dicta videtur, quia ut fibula^b in ædificiis dicuntur feramenta, quibus trabes coniunguntur, ita hoc os tibiæ in tibia fibula dicitur, quod tibiæ musculos coniungere videatur: & canna minor vocatur: hoc tibiæ extrinsecus, sicuti radius cubito apponitur, superius quidē sub tibiæ capite [t. 26. fig. 1. C sub A] sinu erē planū & incrustatū [fig. 5. Q] inferius tibiæ sinum longum subit [f. 1. E ad D] vtrinq; tamen per arthrosiam (hoc est leuem inarticulationem, quæ cū motu obscuro fit) quæ^c synarthroseos species est, articulatur. In medio vero dehiscūt [fig. 2. Y inter V & X] quia inter vtrumq; musculi pedis locari possint, præsertim parte superiore cum tibia ibi in sinum flectatur: in quo intervallo ligamentū membraneum [tab. 1. f. 18. K] fibulam tibiāq; medio spatio cōplectens, reponitur: Longitudine tibiæ ossi æqualis est, nā licet supra ad genu non ascendat, infra tamen tibiā excedit: latitudine vero & crassitie longe gracilior, & paulo sub medio versus tibiæ os, nō nihil curvatur & latere externo concava redditur [f. 1. 2. Z] imo nō sicut ac tibia, figurā propemodū angulārē adipiscitur.

Capita duo habet, supra infraq; vnū, quibus appendix coalescit, quæ in processum acutum, nonnihil exasperatum desinunt. Horum superius infra tibiæ caput subsistit [fig. 1. C. sub A] appendice munitum & cartilagine obductum: quod rotundum est, & parte externa insigniter protuberat [fig. 5. 6. C] quod tendinē quarti musculi tibiæ suscipiat, & septimi musculi pedis caput ex eo prodeat. Huius appendix latere interno sinum habet [f. 5. Q] amplum, cartilagine incrustatum, cui caput appendicis ossis tibiæ articulatur [fig. 4. R.]

² Galeno de oss.
^{22.} interpretas
 suram versis.
 at 3. v. s. par. 23.
 fibula tenuis
 admodum &
 multo minus
 quam tibia os
 extrinsecus i-
 psum attensum.
^a Sura & fi-
 bula, Latinis,
 Vesal. Col. Ar-
 chang. Arabi-
 bus facile mi-
 nus, Laur.
^b Archang.
^c Per synar-
 throsin alliga-
 tur, de oss. 22.

Inferius caput in acutum tendit [*fig. 1. E*] & tibiae osse tanto declinuius descendit, quantum tibiae, caput superius fibulam excedit, appendice donatur, [*fig. 1. F 2. 5. 6. 9. n*] quæ crassiescens processum, malleolum externum dictum demittit, qui interiore magis descendit, & ipsius sinus communis [*fig. 7. d e f g h*] talum suscipientis, latus externum constituit [*fig. 9. 11. b*] & cartilagine incrustatur. Malleolus hic interno humilior est, latere externo gibbus est, & aliquousque carne nudus tactu deprehenditur: ab hoc musculi aliquot pedis extremi principium sumunt: intrinsecus sinum asperum habet [*fig. 2. 6. 11. r*] ex quo ligamentum cartilagineum fibulam talo connectens profluit. At supra malleolum sinus quidam [*fig. 2. 6. q*] ligamento transuerso tectus, quod tendines sexti & septimi musculi pedis tutius deducantur, obseruatur.

Inter vtrumque caput, fibulae corpus inæquale est, propter sinus & lineas, propter musculorum inflectionem creatas, ita vt circa medium triangula videatur: antè enim linea acuta & protuberans apparet [*fig. 1. 5. ss*] posterius vero deprimitur, & vtrinque lineam extuberantem habet [*figur. 1. 2. 5. 6. tt uu*] quæ lineæ, fibulae latera tria constituunt [*fig. 1. 5. x 2. 6. β*] sic inferius supra appendicem [*fig. 5. 6. 11. r*] asperitas quædam protuberat, qua sede ligamento valido interueniente, tibiae necitur. ^d

d Fibulae usus
triplex 1. de articulationis ad
astragulum, à

qua extenditur & sustentitur per 2. quod qua potissimum parte ab incidentibus foris ledenda erant, facile omnia tibiae vasa & musculi, hac circumposita est fibula. 3. est in externo femoris capite, quod tibia sustinet, ad id loci enim affirmata ad securitatem simul & firmitudinem non parum confert, 3. usu partium 13. ut radius motionum manus, ita fibula motioni in orbem pedis auxiliatur. Archang.

DE

DE PATELLA SEV MOLA.

CAP. XLII.

De hac Gal. lib. de off. 23. 3. vs. part. 15.

OS quod ipsi genu antèrius præponitur [tab. 25. fig. 4. 5.] Græcis ^aἐπιγονατὶς & ἐπιγονή, à situ, uia ipsi genu incumbat: alijs ^bμύλη mola, à similitudine quadam cum molari lapide: patella ^cCelso à patellæ imagine, vulgò rotula dicitur. Os est femori & ibi commune, licet ab utroque separatum sit, eorum articulationi præpositum, in quolibet genu vnũ: quod ^dsubrotundum est, latum & quæ tibiam affidet, acutum desinens: magnitudine ^emediocri, latitudine vix, at longitudine duos transuersos digitos superans, crassitie dispari cum in extremitatibus tenuis sit, sensimque crassior reddatur, ita vt in medio emineat, vimbonem referat, quare cum in altitudinem extumescat globosum quodammodo est.

Hoc tendinibus crassioribus musculorum femoris septimi octauæ & noni, qui per genu ad tibiam feruntur, parte superiore tota innascitur, à quibus firmatur, ipsique pro ligamento sunt ^f, quod femori ac tibiam committatur, & ab his foris obducitur: intrinsecus vero, cartilagine læui & lubrica, magna ex parte (præsertim qua femur respicit) ad motum expedi-

Kkkk 5 tiorem

^aἐπιγονή, ἐπιγονῆς
Hipp. de natu-
ra off. ἐπιμύ-
λῃς, eidem in
Mochlico; μύ-
λῃ Hipp. de
loc. in hom.
Galen. de
off. 3. vs. part.
15. & ἐπιγ-
γῆς, alijs
μύλαξις.
^bPatella, mo-
la Vesal. Plat.
rotula Laur.
patella, genu
mola, vel scu-
tum vel scuti-
forme os vel
genu rotula,
Col. Archang.
^cRotundum
Gal. de off. or-
biculari &
breui scuto nõ
absimile, à

molaris lapidis rotunditate mola, Ves. penè orbiculare, Col. ferè rotunda & globosa, Archang. i qua drupedibus longius & angustius; in auiibus latius & breuius, Vesal. d. Tota est quanta est rotunditas, quam efficiunt pollicis & indicis extrema sese tamantia, Archang. e. Neq. femori neq. tibiam aliter quam tendinum beneficio commissa: hoc enim priuatim sibi vendicat, quod alteri ossi ligamentorum spe non alligatur sed tendinibus illis ad femoris os validissime constringitur, Vesal. huius ligamenti, cum femori tum tibiam nequitur, quicquid alij dixerint, nam ex appendicibus foris & tibiam ligamenta nascuntur, quibus manifestè molam utrimque vinciri pñe perspicimus, Col. potissimum patella in genu vincitur à vinculis ligamentis, scuti quilibet alius articulus, non nego tamen stabiliri à tendinibus musculorum, ut spectantium, Archang.

f Patella facies exterior lanigata, interior exasperata, Archang.

g Per ginglymon Col per ginglymon, per arthrodiam & per syndesmon, Archang.

h Patella os parvū, molle, cartilaginofum, femoris, & tibia commissuram co-gens, Celsus, os extrinsecus cartilaginofum, Galen. de off. 3. v. s. part. 15. & Mari-

nus cum alijs Anatomicis, os cartilaginofum separatum vocarunt; se forte obseruauerunt patellam cui tendinum substantia innata, ut si debitū emundetur que sola in cœmiteriis occurrat, perquam solida fortiusq; cernitur, non in hominibus tantū, sed etiam bobus, Vesal. non est os cartilaginofum, neq; rurſus adeo diu ut solidum existimari debeat ut substantia qualis duræ appendicis, ut nutrimentum per omnes ſui partes ſuſcipiat, Col. osſea non cartilaginofa ſed non dura ſidaq; ut femoris tibiaſe ſubſtantia ſed ut ſubſtantia durioris appendicis, tale enim efflagitabat illius uſus, Archang. Cartilaginea dum oritur animal, oſſi poſtea fit, & dura valde in adultis apparet, Fallop. obſer. i Hipp. de locis in hor. mola incumbens, humiditatem à carne in articulum deſcendere prohibet. k al. 3. v. s. part. 15. probat exemplo adoleſcentis luſtantis cui mola auulſa, ſuſtinentulo opus fuit, loca decliuiā permeantis.

tiorem obducitur. Et ſi tendines quibus adnaſcitur rectè adimātur, antèrius & in lateribus [fig. 4.] aſperum^f & cæcis foraminibus obſitum conſpicitur: poſterius verò & tubere mediocri prominet [fig. 5. g h] & vtrinque ſinus leuiter inſculpti [fig. 5. i k] cartilagine incruſtati, quorū exterior latior & amplior eſt huiusq; tuber à ſinu, quod inter capita femoris eſt [fig. 1. H inter EF] ſuſcipitur, quemadmodum patella ſinus femoris capita ſuſcipit: quare femur patellam excipit & ab ea excipitur, & ſic cū femore & per ginglymū, cum tibia per arthroidiam articulatur: quare mobilis eſt, ne articuli huius motū difficilem reddat. Eſt quin etiam parte interiore ac inferiore [fig. 5. L] qua in proceſſum ducitur & tibiae elatior eſt eadem reſpicit, aſpera & foraminibus donata, quò tendinibus muſculorum dictorum rectius innāſcatur.

^h Subſtantia ipſius, dum animal oritur cartilaginea eſt, talisq; aliquot menſibus permanet; poſtmodum inſtar cuiuſdam durioris appendicis induratur, tandem oſſea, dura & ſolida, qualis in adultis apparet redditur.

ⁱ Uſus femoris & tibiae articulum laxum egere & firmare, ne antrorſum procedentibus & andulanti-bus femur ad partes anteriores^k labatur & luxetur neue in locis decliuiorib. euntes cedamus, & quo tibia re-

bia recta & retrorsum contracta genu in angulum rectum flecti possit, fortè etiam vt tendines muscutorum dictorum defendat, ne in flexura genu à fenore antrorsum prominente lædantur, sua duritie membris impetum sustinens, quemadmodum de ossiculis sesaminibus supra dictum fuit.

DE PEDIS MINORIS OSSIBVS

qui ad Tarsum referuntur,

C A P. XLIII.

De his agit Gal. lib. de off. cap. 24. 3. vs. part. 6. & 8.

PEDIS extremi seu parui, ossa ^a triginta octo sunt, Tarsi, septem: Pedij siue metatarsi quinque digitorum quatuordecim & sesaminum duodecim: le quibus ordine.

Tarsi ossa ^b septem sunt, ex quibus quatuor ^c nomina propria habent, tria verò à plerisq; sine nomine relicta fuere,

Primum est [tab. 27. fl. 1. 2. 1. & tota fig. 3. 4. 5. 6.] quod ὀστέον & ἄσπις Græcis, & vulgò os balistæ nominatur: hoc tibiæ & fibulæ ossiū appendicibus tanquam firma basis subiaceret, licet soli tibiæ subiectum videatur: quo osse non solum homo, sed reliqua animalia, quæ pedib. in digitos scissis incedunt, donantur.

^d Hoc sed componitur ex tribus ossibus astragalo, pterna & scaphoide, quibus solis nulla est in manu particula, quæ proportionè respondeat, s. sunt simpliciter basis illius instrumti, hæc Gal. Pedis ossa 26. sunt, tali, calcis & naviculare os, 4. tarsi, 7. pedij 14. digitorum & sesamina ossicula. Vesal. Plat. pedis extremi ossa 26. vnde per uno minusquàm manus constar, 7. tarsi, cum brachialis sint octo: 5. pedij 14. digitorum, Col. Arch. 7. tarsi, 5. metatarsi, 14. digitorum, Laur. ^b ὀστέον & pedij ^c primum, de off. 24. Tarsi ossa, 7. Col. Laur. at Ves. 4. Plat. 4. quia tria priora ab his separant: at Arch. tarsus & brachiale ex septem struitur, quorum tamen vnum geminum patitur, propter lineam quandam, quandamque fossulam oblongam, quod in duas partes determinantem vt tanquam octo numerentur, ita tarsus ex v. consurgit, hæc illo quicquid dixerit Aristoteles & illum secuti, Col. ^c Prima & vnum ex quatuor seq. proprium nomen obtinere, postrema tria adhuc sunt sine nomine, Cō. Archang.

a Galen. 3. vs. part. 6. pedis partes manus affimiles dicit, tarsum, pedij & digitos: subiungit, at partem pedis, quæ ipsi tibia, cui totum crus secundum rectitudinem incumbit, subiaceret, vnum nomen quale est tarsus & pedum non ha-

d Sex facies
tanquam tes-
sera obijcit,
quarum supe-
rior est quo-
dammodo cō-
uexa leuibus
quibusdam si-
nibus & emi-
nentiis ina-
qualibus esse-
ta, ut cum ti-
bia ginglymo
iungeretur:
inferior caua,
ut calcem ex-
cipiat: reliqua
quatuor, an-
terior, poste-
rior, dextra
& sinistra,
quasi circum-
fusa, variè
sunt exaspera-
ta, ut usus &
necessitas ex-
postulabant:
hac Archang.
e De off. 24.

d Hoc parte elatiore tuber orbiculare & læue [fig. 5.6. A B C D] cartilagine incrustatum habet, quod femur balistæ, nucis inuersæ aut rotulæ partem quam refert, eiusque tuberis superficies veluti quadrata, & lateribus quatuor terminata: quare τέτραπλος est quatrio à nonnullis nominatur, horum, primum & secundum [fig. 3.5.6. ab A ad B. à C ad D] iuxta ipsius longitudinem, velut in orbem ducuntur: tertium [ab A ad C] anterius: quartum [à B ad D.] posterius fertur. At in medio sinum leuem [fig. 3. E E] lateribus hinc inde prominentibus. [fig. 3. F F] quemadmodum in rotula ad quā funis reflectitur obtinet, quò cum tibiæ ossis appendice [tab. 26. fig. 9. 10. d & f.] per ginglymum copulatur. Latera autem huius plana sunt & decliua, leui cartilagine incrustata, quò malleoli suscipiant, quorum interius [fig. 5. G] exiguo spatio incrustatum, superficietenus tantum comprimitur: & internum malleolum tibiæ suscipit: exterius verò latius est [fig. 6. H] & ampliter sinuatum, longiusque descendit, quò malleolum externum fibulæ, magis descendentem [tab. 26. fig. 9. 11. h] aptè admittat: Si talus cum tibia & fibula iungitur, quæ articulatio pedis recto motui subseruit, & quò facilius & sine ossium attritu fiat, cartilagine utrinque incrustatur.

Præterea latere interno, sinum asperum habet [fig. 5. I] quò ligamentum cartilagineum à malleolo interno pronatum, quò talus tibiæ colligatur, recipit. Sic & externo latere [fig. 6. K] alius sinus qui ligamentum ab externo malleolo productum excipit. Sic parte posteriore ad tuberis radicen ubi tibiæ & calci committitur [fig. 5. post B D] asperitas, partim ut ligamenta à tibia enata excipiat, partim alia in calcem porrigat. Sinus item in hac posteriore sede [fig. 5. 6. L M] pro transitu tendinum musculorum pedis inferiora subeuntium, paratus.

Præterea

reterea nō solum cum tibia & fibula sed etiam cum
 se naviculari coniungitur, quare anterior tali pars
 certicem ^e oblongam [fig. 3. 4. 5. 6. N] producitur,
 uæ in caput rotundum [O] cartilagine lubrica ob-
 ductum definit quod ab ossis navicularis sinu amplo
 [fig. 11. K] & rotundo excipitur, quod pes modicè, mo-
 que obscuro introrsum & extrorsum nonnihil et-
 m in gyrum moueatur.

Ad calcem etiam duplici articulo tali os conne-
 citur: quare inferior tali pars, posterius ^f sinum am-
 plum & profundum [fig. 4. Q] cartilagine obductū
 bet cui calcis ossis caput amplum latumq; [fig. 7. 8.

R] inseritur: antè tubere oblongo & læui
 ominet [fig. 4. S] quod calcis sinus oblongus [fig. 7.

R] parte posteriore suscipit. Inter hæc duo spatia,
 l horum articulorum medio, cavitatis est [fig. 4. T T]

ofunda & exasperata, cui calcis sinus [fig. 7. 8. 9. R]

egione respondet: cuius cavitatis vsus ut muco-

n ^h substantiā ac pinguedinem simul contineat, ad

sa hæc, ne motu crebro exiccentur, humectanda

ligamenta cartilaginea, quæ hoc loco talum calci

atissimè iungunt, pronascentur & contineantur:

are in ossibus emundatis & commissis ⁱ magnum

eruallum hic remanet. Aliquādo etiam parte po-

riore quasi in processulum ^k geminum supra cal-

n, qua ad internam regionem vergit extenditur.

ulla ^l autem appendice donatur, cum pari robore

dique indigeat, neque musculorum insertionem

icipiat neque iisdem principium offerat.

^m Substantia autem ipsius in ortu quidem, quem-

nodum & reliquorum tarfi ossium, calce excepto

tilago est: at in adultis intrinsecus fungosa, ubi

o processus emittit solida & densa, multis tamen

aminibus peruia est.

^f Vesal. ante-
 rius, Col. inte-
 rior, Plat.

^g Vesal. poste-
 rius, Col. inte-
 rior, Plat.

^h Columbus:
 in uiuentibus
 cartilagineis
 ligamentis re-
 pletum, Vesal.
ⁱ Ves. Plat.

^k Columb.



^l Vesal.

^m Sinum am-
 plum non ha-
 bet, quo me-
 dullam asser-
 uet, & ubi p-

ⁿ Calcis

& densissimus, Vesal. non solida, ut aliquis opinatus est, Columbus.

TABVLA XXVII. *Pedis minoris ossa: fig*
1. & 2. omnium compagem superiore & inferiore faci
proponit: fig. 3. 4. 5. 6. tali latera: fig. 7. 8. 9. calcis. fig
10. & 11. navicularis: fig. 12. & 13. tarsi ex 4. ossib.
compositi faciem anteriorem & po-
steriorem exhibet.



n $\pi\lambda\epsilon\pi\alpha$ pedis
os maximum
3. de off. 24.
tarsi secundū,
Col. Archan.
Laurent.
o De off. 24. 3.
vs. part. 8. in-
ferius laue,
posterius &
superius rotū-
dum & pra-
longum, ad
exteriora pe-
dis maximū.
p 3. vs. part. 8.

q Huius figu-
ra tetragona
putatur, at
cum habent
latus ante-
rius, posterius,
superius, infe-
rius, interius
& exterius,
v. letur tessa-
ram imitari,
a. chang.

n Calcis os secundum est [fig. 1. 2. Δ & tota fig. 7. 9.] quod $\pi\lambda\epsilon\pi\alpha$ calx, calcaneum, & pedis calcar dici-
tur, quod omnium pedis summi ossium o maximum
& crassissimum est, propter p firmitudinem, nam pe-
dis extensio & flexio dearticulationis tali opus est
quæ ad tibiæ & fibulæ os fit; ad latera verò circumla-
tio, est dearticulationis ad os naviforme; alij ossium
connexus multi & parui parum prædictis constru-
ctionibus auxiliatur: & quemadmodum talus prin-
cipalissimum est ossium, quæ ad pedes mouēdos per-
tinent, sic calx eorum, quæ ad firmationem; & ni-
calx talo maior esset, non solum talus sed etiam tibi
retrorsum laberetur, rectitudine enim tibiæ subia-
cet & ipsam ferè totam solum sustinet & per hanc fe-
mur & per hoc superiacens corpus: necessariò igitur
insignem magnitudinem obtinuit, alioqui temer-
natura ei tanta onera commisisset: idcirco quoque
firmam ei coniunctionem esse præstitit, non falla-
cem nec errabundam: quare & natura ipsius proce-
sus, ligamentis plurimis, duris, cartilaginosis latis &
rotundis, non solum talo sed alijs etiam ossibus ad-
iacentibus coniunxit, quò firmitudinem cōuenien-
tem seruaret. Quare non solum talo subiacet, eumq;
sustinet, sed eidem quemadmodum & cubiformi
articulatur. Talo quidem elatiori sede capite suo am-
plo [fig. 6. 8. 9. P] ipsius tali sinum [fig. 4. Q] subit, &
calx sinu suo angusto & ferè plano [fig. 7. 8. 9. R] tal-
tuber [fig. 9. S] admittit, at cubiformi sede anteriore
[fig. 11. R] capite suo depresso [fig. 7. i] iungitur 9.
Inferior eius pars [fig. 2. X Y Z] latiuscula est, quò
pes tutius consistat, aspera & inæqualis musculorum
causa. Processum habet asperum [fig. 2. Y Z. fig. 8. Y.
fig. 9. Z] transuersum, iuxta posteriora deorsum la-
tum, à cuius sede anteriore, musculus digitorū qua-
tuor secundum os flectens prodit & carnosà portio
à qua

à qua muscoli digitos pollicis adducentes producuntur: quare inter processum cavitas est, ne dum pes humo affigitur horum musculorum capita, inter calcandum comprimantur.

Caput ipsius seu superior sedes, in pueris appendice donata, teretis corporis speciem refert, quæ impressionem leuem, ac asperitate paululum eleuatam [fig. 7. 8. 9. a b] habet, in quam ligamenta ossis tibiæ & tali inseruntur: sic posterius depressa & vtrinque aspera [fig. 2. 8. 9. c] quo tendo totius corporis maximus & robustissimus qui musculorum 1. 2. & 4. pedis est inseratur. Anterius sinus asperos & profundos habet [fig. 7. V V] qui cum tali sinibus cartilagine opulentur.

Latera verò calcis lata sunt & depressa; horum internum [fig. 2. 8. d d] læue & insigniter sinuatum, in medio tres inscriptiones [fig. 2. 8. e] quo tendinibus quinti pedis muscoli & duorum ultimos articulos flectentium (illac transeuntium reflectuntur) pedisque inferiora petunt, via sit, quemadmodum etiam venis, arterijs & nervis, quamvis etiam à calcis processu defendantur, qui calcis latus internum impense cauum reddit: Externum verò latus [fig. 2. 9. Z] depressum est, asperum & inæquale, è cuius humiliori sede musculus digitum paruum abducens prodit: at sede anteriori sinus parvus [fig. 1. 7. 9. 8] cartilagine incrustatus, sub processu exiguo occurrit, qua tendines septimi ac octavi muscoli pedis transeunt & ad malleoli externi sedem posteriorem reflectuntur. Qua verò parte digitum minimum respicit, anterius lævis, ob cartilaginem qua incrustatur, & parte superiore capite amplo leuiter elato prominet, quo cyboidis ossis sinui ferè plano [fig. 1. 2. ⑥] articulatur: inferne verò sinu obliquo & ad interna vergente cyboidis portionem excipit.

1 Per synarthrosin nectitur de oss. 24.

f Pedis os 2. *Naiculare os tertiū est [f. 10. & 11.] quod Græcis à forma σναφοειδὲς, nauiforme & cymbam referens dicitur, quia oblongum, posterius profundum, antèrius cauum & sede superiore gibbum [f. 11. op] & inferiori cauum [f. 10. 11. qr] est. Hoc in pedis interna parte situm est, huiusque intermedio tarfi præcipua pars talo committitur: nam posteriori sede sinū habet [f. 11. k] profundum & transuersim oblongum [f. 10. lmn] cui tali caput [f. 3. 4. 5. O] inferitur, qui articulus ad Enarthrosin^u obscuram referri debet, cum ipsius motus obscurus sit. Altera pars, capite oblongo, tribus superficiebus distincto prominet, [f. 10. lmn] quibus tria ossa postrema articulantur [f. 1. 2. 12. 13. ch. 1. 2. 3.] verū cum ita læues sint, dubium an excipiant, vel excipiantur.*

u Columb. ad enarthrosin, *Latus externum amplum rotundum & sinuosum [f. 10. qr & 11. q] præsertim vbi ossi quinto iungitur: mox sensim angustatur & in processum internū angustum [f. 10. q] nauis rostrum referens desinit. Internum verò prominet, ita vt tuber insigne constituat, quod sinum inferiorem [f. 10. 11. q] cui eminet, maiorem efficit, vbi tendo musculi sexti pedis reflectitur. Tandem hoc os asperum est superius & inferius, quo inde ligamenta, hoc os talo & tarfi ossibus connectentia, prodeant.*

x Ταρὸς Græcis, quatuor pedis ossiū series: subinde vniuersam superiorem pedis partem intelligunt vt Gal. in lib. de administ. sect. facit, Latinorum plurimi hanc ossium stru. m plantam nuncupant, verū planta nomen latius patet, quare tarfi nomine viar, Ves. vide Gal. 3. vs. part. 6. & 8. qui à tarfi ossibus tria prima separat: & l. v. de oss. 24. explicato astragalo, scaphoide calce & cyboide ait, tria ossa paruula inferi scaphoidis parti, per synarthrosin copulari & post quatuor hæc primam partem pedis quam tarum vocat finiri. Non video, cur tria illa priora à tarfi

assimularunt, quæ ligamentis simul iuncta fornicem à tarso ossibus
 imitantur cum superficiem superiorem conuexam ^{seu iungi debeant,}
 & arcuatam, inferiorem concavam habeant: quare ^{sicuti ab aliis}
 cubiforme calci, tria sequentia cum naviculari iun- ^{anatomicis}
 guntur & simul sursum à terra eleuantur: quia hæc ^{factum fuit,}
 constructio validior est & figendo pedi & corpori su- ^{facientib, qua}
 binendo: domus enim concameratæ firmiores & ^{tuor posteriora, q̄ soli tarso}
 diuturniores sunt: quæ idcirco etiam prominere de- ^{appellatione}
 buere, quò infernè cavitatis relinqueretur, quò par- ^{dignantur, ad}
 tim tendines musculorum, qui sub plantam mittun- ^{brachiale tā-}
 tur, partim ipsi muscoli qui ab inferiore parte tarso ^{tum referri}
 oriuntur & in digitos pedis diriguntur, tuto loco col- ^{debere, tribus}
 locentur: nam si planta plana fuisset, muscoli cum suis ^{primis absq̄}
 tendinibus compressi, nec suo defungi munere po- ^{relatione desi-}
 uissent, nec sine magno dolore id contigisset. Præ- ^{gnatis, Col.}
 erea ubi laterib, hæc committuntur, cartilagine non ^{tarso ex qua-}
 abducuntur sed solum ubi naviculari ossi proxima ^{tuor ossibus, ex}
 unt, reliqua parte ligamentis cartilaginosis copu- ^{duplatis bra-}
 untur: appendicibus quoque destituuntur, & sub- ^{chiale consti-}
 stantia tali & naviculari ossi similia sunt. Quantitate ^{titur, ex plu-}
 tiam & figura discrepant [^{confer. f. 1. cum 2. & 12, cum}
 3.] cum duo prima multò maiora sint, duobus in ^{grandioribus}
 medio positis, & quatuor pedis ossibus iunguntur: ^{& pauciorib,}
 sed de his singillatim. ^{ambulandi}
 instrumentū

Cubiforme os, quartum est [^{f. 12. 13. char. 4.}] ^{uv-}
 cuboides, à forma cubi tessaramue imitante, quod ^{buit, Ves. tar-}
 quasi latera 2 sex habeat: & quia varijs formis prædi- ^{sus ex quatuor}
 tum πολύμορφον 2 multiforme, Arabes grandinosum ^{ossibus constat,}
 vocarunt. Hoc pedis lateri externo calci præponitur ^{Fall. de oss.}
 ceteris maius est & latere primo [^{f. 13. x}] posteri⁹ b cal- ^{Os cuboides,}
 ci [^{f. 7. i.}] inæquali superficie iungitur, & terræ inni- ^{seu pedis quar-}
 titur, ^{tum, de oss 2 4.}
 LIII 2 ^{tarso quartū,}
 titur, ^{Vesal. 4. tarso}

quod ceteris primum) Col. Arch. Laur. os cuboides & os tessaræ quadratum est,
 au. 2 Ves. dicitur cuboides quia habet 4. latera inferius superius & duas partes
 laterales & quemadmodum quodq̄ cubicū corpus sex partib, constat, sic quoq̄ hoc
 quia tessaræ similitudine habet, Fall. de oss. a Ves. Col. Arch. b Committitur
 in glymo diarthroseos, quia et suscipit ita suscipitur cum motu obscuro, Arch.

c Vesal. sinus
duos habet pe-
dij ossa duo ex-
trema susci-
pientes, Col.
d 1. tarsi os
Ves. 5. tarsi,
Col. Archang.
tarsi tria ossa,
Plat.

c Tria tarsi
ossa navicula-
ri coarctata
proprio carent
nomine, at nō

nullis simul
omnia χαλ-
κγεῖν appel-
lantur, Vesal.
tarsi ossa qua-
tuor sunt, tria
χαλκγεῖν ap-
pellant, quia
sunt dura &
cunei ferrei si-
militudinem
habēt, Fall. de
oss. tria inno-
minata sunt
attamen nu-
meri, situs, ac
forma ratione
distinguitur,
Col. idem Ar-
chang. tria in-
nominata à
Fall. χαλκγε-
ῖν dicuntur,
Laur.
f 2. tarsi, Ves.
6. Col. Arch.

titur, dubium an suscipiat, an suscipiatur: secundo latere [fig. 12. α β] antèrius, pedij ossi quarto & quinto superficie c continua cōmittitur, eaq; basis instar fulcit: tertio interius [fig. 12. 13. γ] septimo tarsi ossi iungitur: quarto exterius [fig. 12. 13. δ] quod latus obscurè planum est & quemadmodum duo sequentia latera nulli ossi cohærent; quintum enim latus superius planum sed asperum, [fig. 12. 13. ε] & sextum inferius est [fig. 2. ζ n. fig. 3. ζ] Tandem extrema sedes processum habet sinu medio [fig. 2. n] oblongo & obliquè delato, diuisum, ad quem tendō museuli septimi pedis reuoluitur.

Cuneiforme maius seu tarsi d quintum [fig. 12. ch. 1. fig. 13.] quod quemadmodum & subsequētia c duo χαλκγεῖν, id est, cuneiformia q̃ cuneū referāt, nominarunt: hoc pedis latus interius occupat & è regione pollicis situm, antèrius sinuatum [fig. 13. γ] quo navicularis processus portionem excipiat, quemadmodum retrō, primum pedij os suscipit, q̃ an sinuatum an prominens incertū est, q̃ posterioribus his ossib. cōmune est, quatenus inuicem aut cum pedij ossib. copulantur, ita, vt in modum glenes cōmitti videātur, cum sinus obscuros habeant: videtur tamen hæc pars duo exilia tubercula obtinere, cum pedij os cavitatem duplicem præ se ferat: superior pars modica est, aliquantulum conuexa, qua sexti ossis sinui superficiali iungitur: inferior denique crassior est, quo terræ firmitus hæreat.

f Cuneiforme minus seu tarsi sextum [f. 12. 13. ch. 2.] si partem superiorem qua pedem spectat consideres, latum & non nihil arcuatum est & veluti quadrilaterum apparet: si partem inferiorem qua plantam spectat, angustissimum & quasi in aciem abiens, sicque cunei formā, quemadmodum & septimū illi proximum refert, & alijs cuneorum modo, ad ea arctius iungen-

ingenda interposita videntur. Et hoc & posterius ^{g Plat. ant-}
im naviculari [fig. 3. i] antèrius leuiter prominens ^{rius, Col.}
im pedij osse secundo [fig. 12. x] interius cum quin- ^{h Plat. poste-}
tarsi ossis latere externo exterius cum exteriori se- ^{rius, Col.}
imi iungitur.

i Cuneiforme medium seu tarfi septimum [fig. 12. i 3. tarfi, Ves. 7. Col. Arch.
13. ch. 3.] hoc inter quartū & sextum situatur, qua-
angulo nonnihil simile sed longiusculum, q̃ poste-
us ^k sinu exiguo [f. 13. u] nauiformis tuberculum ^{k Plat. ante-}
scipit: antèrius pedij os tertium admittit [fig. 12. λ] ^{rius, Col.}
lateribus ossis sexti & quarti latera attingit, cunei- ^{l Plat. poste-}
e instar inseritur: inferius processu extuberat [fig. ^{rius, Col.}
θ] cui quintus pedis musculus inseritur, [quatuor
r si ossium sinus nexum faciem anteriorem fig. 12. at po-
riorem fig. 13. exhibet.]

DE OSSIBVS PEDII ET DI- gitorum pedis.

CAPVT XLIV.

De his egit Gal. lib. de off. c. 15. 3. v. s. part.

DE PIVM secunda pedis pars est, quā Græci ^{a π} πε-
διος, Celsus plantam, alij pecten, & q̃ metacarpo
in manu respondeat, metatarsum vocarunt [t. 27. f.
ch. 1. 2. 3. 4. 5.] Ex ossib. ^c quinque cōponitur, q̃ tarfi
ssibus articulantur & digitorū ossa sustinent. Tarsi
videm, aliqua ex parte planis, ijsq; læuib. superficie-
us cōmittuntur [f. 12. i κ λ α β] primū pollicis præ-
ositum, tarfi ossi interno, q̃ indici secundo, q̃ me-
ium tertio [f. 2. inter ρ π] duo reliqua ossi cubiformi
f. 2. iuxta ρ & η] per arthrodiam coarticulantur: &
quemadmodū tarfi ossa antèrius linea recta nō sunt
osita sic & pedij ossium aliud alio magis in postèrio-
a porrigitur: hæc tamē vna serie & acie, quemadmo-
um & digitorū ossa locantur, quod ad stabilitatem
& firmitatem plurimū confert. Oblonga sunt, tere-

a πδ Hip-
pocr. πιδίον
Gal. eius in-
terpretes plan-
tam reddide-
re: pedis vesti-
gium etiam,
Vesal. Col.
b Differt à
postbrachiali
quia ex qua-
tuor tantum
ossibus, pedum
ex quinque
componitur,
Fall. de off.
c Nō quatuor
ut postbra-
chiale, quia
tria ossa habet
pollex, non
duo, ut Gal.
voluit, Ves.

tia, vtrinque in capita desinentia: nam vbi cum tarsalibus ossibus articulantur crassa sunt, ac sinuata & lateribus sibi proxima, quæ sensim à se mutuo recedunt, tenuia fiunt, in medio inter vallū [f. 1. 2. vv] pro musculis interosseis relinquunt. Capita verò inferiora quæ in sinus profundos digitorū, & quidem primorum articulorum inseruntur, [f. 1. 2. § in φ] orbiculata sunt & appendice parte posteriore adaucta; horum capita magis versus superiora, minus versus inferiora diducta sunt, secus quam in manibus fiat, siquidem pedum digiros in extensione plus sursum quam manuum eleuari oportuerit: quæ articulationis generis ad enarthrosin referendum videtur. Horum primum, quod pollicis præponitur, cæterorū crassissimum est, cæterisq; breuius, capiteq; magis orbiculato, quo pollex alijs magis in latera moueatur: quæ parte ea qua tarso articulatur sub capite sedetq; inferiore in tuberculum seu processum prominet [f. 2. π] vt ei tendo septimi musculi pedis inferatur, quo loci sesamina^d duo apposita sunt, alijs maiora & cartilagine incrustata. Secundum os, indicem sustinens longissimum est, quemadmodum & quintum minimo subiectum; huius enim vltimi longitudinem processus insignis [f. 2. ρ] qua tarso articulatur, auget, quod in pedis latus externum producit, quo tendo musculi octauo pedis implatur. Hæc supra infraq; appendicem cartilagine incrustatā obtinere: & tota substantia & sinu longo medullam complectente, metacarpi ossibus respondent: foraminulis quoq; pertusa sunt, quo per ea venulæ & arteriolæ, quemadmodū per cætera ossa, ad ea nutrienda & fouenda subeant.

Digitorum ossa pedij ossib. succedunt, pedis partem tertiam explent & numero quatuordecim sunt, [f. 1. A E. f. 2. A E] cum singuli ex ossibus tribus pollice excepto, ad digitorū manus similitudinem constent,

d Excipi à Sesaminis iurè hac possunt siquidem maiora sunt & cartilagine quadam incrustata quatenus videlicet articulo inhaerent, Col.

e Pes à manu uno osse supe-

ent, [f. 1. 2. & τ υ] à quibus substantia, structura, ac
 u parum discrepant: nisi quod articuli primi, sinu
 ofundiore constant, cum in eos pedij ossium capi
 profundiora inferantur, & quamuis capita pedis
 npla sint, sinum tamen non tam amplum vt manus
 otinuère, vt sic digiti extendendo magis eleuari &
 biectis nonnihil cedere possint, dum stando terræ
 nitimur. At pollex ossibus duobus efformatur [f. 1.
] quo cavitatis pedij anterior sedes firmitus terræ
 nitatur. Verum ossa hæc omnia infra supraq; ap
 indices habent & cartilaginibus firmioribus, ad lu
 icam magis articulationem, quæ per ginglymum
 incrustantur, extremis exceptis, cum nulli ossi al
 ti articulentur, sed ipsis vngues adhæreāt. Interno
 a quoq; breuiores sunt, quā in manu, supernè gibba
 fernè sima, quo tendines muscutorū secundum &
 rtium articulum flectentium, tutissimè admittant:
 prima secundis & secunda tertijs maiora sunt &
 ediū os in quatuor digitis, quadratum esse videtur.
 pollicis ossa in pede quam in manu crassiora sunt
 liqua tenuiora, tādē & medulla referta existunt.
 modum fecit eodem lib. cum 4. tarsi ossa cubum referenti ossi & illi quod cymba
 imilatur articulari, sed parum anatomicè, radit, Vesal.

ratur. hac e-
 nim 27. effor-
 matur ossib. 8.
 brachialis 4.
 postbrachia-
 chialis & 15.
 digitorum: pes
 autem 26. cal-
 ce, talo, navi-
 culari, 4. tar-
 si: 5. pe li: &
 14. digitorum,
 cum tamen
 Gal. 2. com. in
 Hipp. lib. de
 fractur. scribit
 pedi non aliter
 quam manui
 27. adesse ossa:
 parum per-
 pendens se bis
 cubum imitās
 os enumerare:
 aut prater id
 os alia 4. tarsi
 recensere: quē-
 f Sesamina
 cartilagine
 sunt & ut plu-
 rimum ad cō-
 sistentia an-
 nos usq; per-
 durant, exce-
 ptis illis duo-
 bus, quæ in pe-
 de sub pollicis
 primo articu-
 lo reperiuntur,
 Fallop. obs.

DE OSSIBVS SESAMINIS

& vnguibus.

CAP. XLV.

ESAMINA ossa [t. 27. f. 2. ↓ ω] eadem propemo-
 dum serie & numero ac in manib. existunt, duo-
 decim numero, q̄ in quatuor digitis tāto minora mi-
 usq; cōspicua, quātō man⁹ digiti, pedis digitos ma-
 ioritudine superāt. Sed vt pedis pollex ossib. maiorib.
 man⁹ pollex efformatur, sic quoq; sesamina multo
 maiora obtinuit [t. 15. f. 11. quare primo pollicis arti-
 culo ad pedij ossis caput & huic inarticulatur, duo
 signia apposita sunt, q̄ neruæ parti musculi polli-

*g Ves. & Plat.
num Arabes
& verè ocul-
ti illi & tene-
bricosi philoso-
phi rectè sen-
tiant Theolo-
gis disceptan-
dum relinquo,
Vesal.*

*h In cervis,
canibus, lepo-
ribus, utpote
siccis animan-
tibus, ut in
hominibus se-
nibus reperit-
tur, Vesal.*

cis primū os flectentis subijciuntur : & horum inter-
nū ipso exteriore dimidio ferè maius est, adeò vt pisi
maiusculi decorticati dimidiā partē æquet & forma
nonnihil respondeat. Hoc officulum Arabes & Alba-
daram vocāt, ex quo hominem tanquam ex semine
rursus propagandum fabulantur. Secundo yerò pol-
licis articulo subiectum quod exteriore illo multo
minus est, tendini musculi secundum pollicis os fle-
ctenti innectitur: de reliquis vt in manu iudiciū esto.

Bina huc referri possunt officula^h in poplite iuxta
femoris os, capitibus musculorum duorum priorum
pedem mouentium [t. 20. fig. 13. ab] innata, quæ su-
perficie sua lubrica capitum inferiorum femoris ela-
torem sedem spectant: quibus hoc peculiare, qd non
aliorum sesaminum modo, musculorū tendinib. sed
eorū exortib. innitatur: quemadmodū & ossea pars
in senib. cubiformi ossi apposita, quæ in tendine mu-
sculi pedis septimi [t. 21. f. 19. t.] ibi reflexi occurrit.

Præterea quemadmodum articulo, quo postbra-
chiale os minimū digitū sustinēs brachiali neccitur,
externo lateri officulum apponi diximus, sic etiā nō
rarò in pede ad externū lat^{us} articulationis ossis pedij
digitum paruum sustinentis [t. 27. f. 1. 2. µ] quo quin-
tum pedij os, cubiformi ossi articulatur, officulum ad
insertionem tendinis musculi pedis octauī reperitur.

Hæc licet eundem vsum quem in manib. præstare
videantur, in pede tamen efficiunt, vt pes stantib. &
ambulantibus etiā per loca aspera firmior sit hu-
mo æqualiter aptetur, & ne digitī dum stamus aut
ambulamus à lapidibus, vel re aliqua altiore, velut
euerfi, promptè luxentur.

*a Vide Galen.
1. v. f. part. 10.
& 11. Aristo-
teles 3. hist. a
nimal. 9.*

Deniq; pedum digitorū extrema non minus quā
manuum vnguibus cuti extrinsecus commissis & te-
guntur & muniuntur^a de quib. pauca. Vnguīū quos
Græci ὄνυχες vocāt, radix πίζονυχία, summa pars alba
seu lu-

seu lunula candicans ἀνάλων & pellicula radici adnata ἀρρημωὶν dicitur, ut plenius in lib. partium externarum explicauimus: Hos ex concoctionis tertiae excrementis crassioribus pronatos^b volunt, idcirco continuo crescere accretione imperfecta, solius alimenti appositione, quare in longum, non latum, nec profundum augeri, eiusq; nomine ex numero partium viuentium excludendos esse: cum tamen venam arteriam & neruum in vnguium radicem porrigi Galenus^c attestetur, à quibus alimentum vitam & sensum aliarum partium modo assumere voluit. Et sane non solum nerui duo ad vnguium radicem feruntur, sed etiam cum venis sub vnguibus ad digitum summum repunt, non tamen sensu præditos dicimus, cum per ipsoꝝ substantiam non distribuuntur, quemadmodum nec venæ, quæ alimentum radici apponunt: & sanè vngues dentium more, pro alimenti ad radicem appositione augentur, quod factius fuit, cū indies atterantur, idcirco semper in longum potius, quam latum & profundum crescunt.

Substantia^c sunt mediæ naturæ inter ossa & cartilagine: mediocriter duri, quò externorum impetum effugiant: flexiles ne frangantur & cedere possint: pellucidi, quare pro ratione carnis subiectæ vel rubent vel^f liuent: tenues, conuexi, quò digitis se accommodent, quod ad securitatem quoq; confert:

LIII 5

quo

tatis & soliditatis gratia datos, qui si deficiant, imbecillitatem summam indicare. III. vngues, pili, cornua, rostra auium & calcæria, & si quid huiusmodi aliud est, ex cibo gignuntur ad ventitio & ducticio, quæ tum à foemina, tum de suis sibi acquirunt, Arist. 2. gen. animal. 6. IV. non leuiter illorū sententia accedo, qui vngues ex ossis, nerui, cutis, quidam & carnis addunt, portione gigni censent, Vesal. tum à cute, tum à tendinibus musculorū digitos extendentibus originē trahunt, Col. c. 2. adm. anat. d Ves. e Vngues cartilagine sunt & inter eos soli nudi, sicuti dentes inter ossa, ut vi maiori operentur, Plat. in quibusdā animalibus vngues præ nimia duritie nihil ab ossibus differunt, Arist. 3. hist. animal. 11. f De varietate colorum in animalibus. Arist. 3. hist. animal. 9. bilis quæ est in hepate cum disrumpitur vngues puniceo sunt colore, Hippoc. de affect. inter.

b Opiniones de vnguium materia. I. vnguium materia est humidū glutinosum à calore exsiccantū & arefactū ad extremas partes emissū Hip. de carnib. vngues densissimi cū ex materia densissima consent, Hippo. de nat. pueri. II. Empedocles vnguem per congelationem è nerno constitisse ait monente Aristotele, lib. de spirit. 6. hinc forte Foesius in notis in libr. de superfat. Hipp. vngues nervorum clausulas summas vocat, à natura firmi-

§ Quod ego
primus obser-
uavi, Col.
h Commodi-
tatis gratia
ungues fabre-
factos & ex-
trema mem-
bra munita
fuisse ostendit-
Plato in Ti-
maeo. Ungues
recte natura
molita est, ap-
pe qua ceteris
animalib. eos
vel ad usum
alium dederit,
homini ope-
rimenti tantū
gratia excogi-
tarit, digitos e-
nim extremos
integunt &
tuentur, Arist.

quo vero minus vacillent circa radicem ligamento colligantur: & quia illos carni & cuti connasci necessum fuit, cutis unguum radici extrinsecus circūnascitur: caro vero illis interius subnascitur: sub quibus vsq; ad digitorum extremitates tendines: & deferuntur, qui sub iis dilatantur: hanc causam esse volunt, quod adeo exquisitus sensus sub ipsis sit, & quod expunctione dolor summus persentiat.

Vsus^h digitorum extrema quæ mollissima sunt, ne ab externis occurrentibus lædantur tueri; quare duritie sua firmamentum præbent: & manibus quidem rebus minimis apprehendendis, quæ facile effugerēt, nisi digitorum extremis carnosis, durum corpus carnes firmans & stabiliens apponeretur, acutie sua auxilio sunt: pedibus vero ut statione magis resistere possint: at quod iis qui in manibus sunt, fricare & scalpere & defendere possumus, hoc secundarium esse censemus. Sed de unguibus plenius alibi, & quidem peculiari tractatu in quo de pinguedine adipis, & pilis quoq; sermo erit. Et hæc omnium partium corporis nostri vera historia, earundemque verus vsus esto.

CON-

4. part. an. 10. & in fine cap. ungues eadem causa obtinent pedes qua manus: extrema enim munienda operiendaq; potissimum sunt, propter imbecillitatem. Hipp. lib. de superfat. ostendit, unguis vitalitatis signum esse in sætu, & quomodo extremis adnascuntur, lib. de nat. pueri. Digni partibus carneis mollia corpora duntaxat apprehendunt: dura autem sine unguum adminiculo apprehendi nequeunt, quia caro ipsorum tum reflectitur, ob id firmamento indigemus, Vesal.

Finis libri quarti.

CONCLUSIO.

CUM ad finem huius operis peruenerimus, tibi **D E V S**, qui solus immortalis es, tibi inquam Trinuno & Vnirino, Hygiæ & Panacæ parenti sit honoros & gloria in secula, quod pro ineffabili tua misericordia, inexplicabili clementia, inexhausta bonitate (vt qui solus ipsa bonitas & sapientia es) mihi misero peccatori tua adfuiisti gratia, tuoq; auxilio, vt ea quæ nunc ab annis viginti quatuor completis, à quibus Professio hæc in Acad. nostra demandata est, in humani corporis fabrica, ad eò admiranda & suspicienda, inter dissectandum obseruauì & obseruata, communium præceptorum Hippocratis, Aristotelis & Galeni dico, & recentiorum classicorum (qui in le tanquam ex fontibus sua hausere) lectione comprobari cognoui, in hoc opus conferre potuerim. Tibi æterne **D E V S**, quod me vita & beneficiis tota meæ vitæ tempore adeo clementer affeceris; mihiq; tua cura spiritum seruas, sit laus in secula, tibi sapienti **D E O** hymnum cum regio tuo Propheta canam. Etenim:

Massæ recentis rudia adhuc primordia,

Rudisque massæ semina,

Ceu scripta haberes, corporisque lineas,

Motum statumque noueras,

Et membra nondum cum forent, quid adderent

Dies sciebas singuli.

O Domine, tu me protinus susceperas

Aluo parentis editum.

De te pependi spe, parentis pendulus

Infans adhuc ad vbera.

Ab vsq; partu tu Deus meus: tuus

Ex matris aluo me fauor

Est profectus — — — — —

Et

Et os & humeros totiusque corporis
Sic arte mira fabricam
Finxisti, acumen nullum vt humani ingeni
Ratione possit assequi.
Qui me parentis ventre conditum, cutis
Tenello amictu inuolueras:
Compago mira corporis nostri, tuæ
Miraculum est solertia.
Stupenda cuius opera nec nostra assequi,
Sed nec negare mens potest.
Nam nulla nostri tam minuta est corporis
Pars, vt tuam scientiam
Fugiat: nec vlla claustra pectoris latent
Te conditorem pectoris.
Hæc mente tacita cogitanti mihi stupor
Torporq; sensus alligat.
Animus labascit, cum tuæ miracula
Perpendo mecum dextera.
Citius inibo numerum, arene in litore
Quot voluat æstus corpora.
Quamuis ocellis peruigil nunquam meis
Dulcem soporem indulsero.
Resolue mentis intimos sinus Deus,
Latebrasq; nostri pectoris.

AMEN AMEN.

referenda.

FIG. I.




FIG. II.





FIG. I.



FIG. II.



FIG. III.



FIG. IV.



FIG. V.



TABVLÆ SE-
QVENTES OS-
SIVM, VENARVM
ET ARTERIARVM TO-
TIVS CORPORIS COM-
pagem proponunt.

AT LITERARVM, QVÆ
*non solum in his tabulis, sed etiam reliquis
omnibus hoc opere propositis, reperiuntur, ex-
plicationem Appendix exhibebit.*



Mmmm


TAB. I.

T A B. I. *Ossum & cartilaginum viri compago
facie anteriore.*



I. a T.

mmmm



T A B. II. *Osium & cartilaginum viri compago facie posteriore.*



TAB. III. *Ossium & cartilaginum viri compo-
pago, facie laterali.*



TAB. IV. *Ossium & cartilaginum mulieris*
contextus.

TAB. XXIII.

LIB. IV.



TAB.

IV.



TABVLA V. Ossium & cartilaginum pueri
recenter nati constructio.

TAB.

V.

FIG. III.



T A B. VI. *Ossa & cartilagine embryonis proponuntur fig. I. Embryonis quadraginta duorum dierum fig. II. Embryonis circiter trimestris, sceleton.*

FIG. II.




FIG. I.




TABVLA VII. *Vena cana integrā, & ab
vniuerso corpore libera proponitur.*

TAB.

VII.



T A B. VIII. *Arteriam magnam integram &
ab omnibus partibus denudatam cum suis
ramis exhibet.*



TABVLÆ QVATVOR SEQVEN-
tes Valuulas seu Ostiola quæ in venis ma-
nus & pedis reperiuntur proponunt,
quæ ad lib.4.cap.36, refe-
rendæ.

TAB. I. FIG. I. *Brachium ad venæ sectionem
ligatum exhibet: at FIG. II. & III. venas
duas crurum inuersas.*

A Cephalicæ ramus medianam constituens.

BC Basilica B.eius ramus medianam constituens C.

D Mediana ex Cephalicæ & Basilicæ ramis.

*E Mediana per cubiti medium delata supra radium
diuisa.*

F Basilicæ truncus profundus, vel in alto latitans.

G Basilicæ truncus subcutaneus.

HHH Valuulæ in venis brachij.

IK Vena prima cruris.

LM Vena secunda cruris.

NNN Valuulæ gossypio plenæ.

OOO Valuule vacuæ.

TAB. I. FIG. I.




FIG. II.




FIG. III.

T A B. II. *Valuulas in brachio fere dimidio, & ad venæ iugularis internæ exortum ostendit.*

a *Vena subclauia.*

bb *Venæ orificium inter iugularem internam & axillarem.*

c *Valuule duæ ad iugularis internæ exortum.*

d *Iugularis interna aperta.*

e *Eius iuxta caput diuifio.*

f *Glandula sub aure.*

ggggg *Costæ quinque absciffæ.*

h *Valuulæ ad venam axillarem.*

i *Axillaris vena à subclauia produéta.*

k *Axillaris in cephalicam & basilicam diuifio.*

ll *Cephalica seu humeraria.*

mm *Valuule duæ in cephalica, digitis quinque fere distantia.*

n *Musculus deltoys brachij.*


oo *Basilica seu hepatica.*

p q r s *Valuulæ quatuor: quarum prima à secunda, digitorum quatuor: secunda à tertia, trium: tertia à quarta, duorum interuallo distat.*

t *Valuulæ duæ simul iunctæ in basilica.*

u *Ala seu cavitās sub brachio.*

TAB. II.



TAB. III. Venam & Arteriam cruralem exhibet, totiusque venae cruralis ramum minorem seu exteriorem apertum proponit.

a b c d Arteria cruralis per medium diuisa valvulis carens.

c f g Vena cruralis aperta.

h Valvula duae in crurali.

i Cruralis diuisio in ramum profundiorē seu maiorem & exteriorem siue minorem.

k Ramus profundior seu maior.

l Ramus exterior seu minor Saphenam constituens.

m m Valvula binae duobus in locis quatuor fere digitis inter distantes.

n n n Valvula binae tribus in locis: prima in bifurcationis initio alia duorum, alia trium digitorum interstitio.

o Valvula unica à duabus postremis digitis 4. distans.

p Valvula duae ubi ramus popliteus.

q Valvula duae sub poplite digitorum 4. interstitio, ubi nullus ramus occurrit.

r Valvula unica tribus digitis à praedictis distans.

s Valvula unica à praedicta digitorum 4. intervallo.

t u Saphena.


x Valvula à praecedenti digitis 5. distans.

y Valvulae duae ad talum.

z Valvula à prioribus digitorum trium interstitio.

a Valvula ultima Saphenae: reliquum enim valvulis carens.

TAB. III.



TAB. IV. *Vena cruralis eiusque rami profundioris seu maioris cum arteria progredientis valuula, usque ad bifurcationem conspiciendas exhibet.*

8 Cruralis, venæ ramus profundior, cum præcedenti tabulæ ramo k, circa d quod arteriam denotat connectendus : qui in priori tabula male bipartitus pingitur.

2^o Arteria cruralis cum præcedentis tab. d. connectenda.

3ⁿ Valuulæ binæ cum propagine è vena.

7 Poples.

6 Valuula vnica magna cum propagine.

1 Sura.

x Valuulæ duæ sine ramo.


7 Valuula vna cum propagine vtriusque vna.

14 Valuulæ duæ sine propagine.

v Venæ crurales eiusque rami profundioris subdivisæ in ramos duos, qui suas quoque valuulas obtinent, quas persequi nunc non licuit.


TAB.

IIII.



Cum vacaret pagella, Renum hanc mirandam formam
 ponere placuit, qualem à Clariss. Philosopho & Medico D. L.
 hardo Doldio, Norinbergensis Reipub. Ord. amico meo singi
 accepi. Talis autem forma Renum & vreterum reperta fu
 cadauere Andrea Helm Weissenfelsensis, qui Anno 1602. x.
 Etob. ætatis sue anno decimosexto Norinbergæ mortuus est:
 eaquam ex ictu in ventrem supra pubem accepto diuturno
 bo laborasset: & post mortem apertus, talis renum forma se
 hibuit, & puris copia circa utrumque inguen tanta repert
 mensuras duas Norinbergenses aquaret.





GALENVS II. COMPOS.

Medic. κατὰ τόπους.

Χαλεπὸν ἄνθρωπον ὄντα, μὴ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅ-
λως ἀγνοήαντα, τὰ δὲ κακῶς κείνοντα, τὰ δὲ ἀμελέσειον γρά-
ψαντα.

THEATRI ANATOMICI

F I N I S.

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΝΩ.

